
主编单位　南京中医学院

主编　彭怀仁

中医方剂大辞典

第七册



人民卫生出版社

中医方剂大辞典

第七册

主编单位　南京中医学院
主　　编　彭怀仁

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

中医方剂大辞典　第七册/彭怀仁主编.-北京:人民卫生出版社,1996

ISBN 7-117-01889-5

Ⅰ.中…　Ⅱ.彭…　Ⅲ.方剂学-词典　Ⅳ.R289-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 12627 号

中医方剂大辞典

第七册

主编单位　南京中医学院

主编　彭怀仁

人民卫生出版社出版

(北京市崇文区天坛西里 10 号)

人民卫生出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米16开本　88$\frac{1}{2}$印张　2010千字

1996年5月第1版　1996年5月第1版第1次印刷

印数:00 001—3 000

ISBN 7-117-01889-5/R·1890　定价:148.90 元

〔科技新书目 377—166〕

《中医方剂大辞典》顾问委员会名单

（以姓氏笔划为序）

万友生　王绵之　白永波　吴考槃

何　任　张瑞祥　欧阳琦　周仲瑛

施奠邦　钱伯文　徐国仟　董建华

编　写　单　位

主编单位：南京中医学院

协编单位：山东中医学院

上海中医学院

江西中医学院

湖南中医学院

江西省中医药研究所

湖南省中医药研究院

《中医方剂大辞典》第七分册
编委会及编写人员

（以姓氏笔划为序）

前　言

中医方剂，是历代医家临床经验的结晶，是运用中医辨证论治理论指导临床防病治病的主要手段。纵观周、秦以来，新方创制不断增加，载方文献汗牛充栋，组方理论渐趋完善，为炎黄子孙的健康和中华民族的繁衍昌盛，作出了巨大的贡献。在方书的编撰方面，唐以前的方书多出私人之手。如被尊为"方书之祖"的《伤寒论》与《金匮要略》；集简、便、验方而成书的《肘后方》；采集群经，删繁就简的《千金要方》、《千金翼方》；上自神农，下迄唐世，无不采摭的《外台秘要》等，均为私人所编著。由于医药学之发展，与民族之强弱、国家之兴衰有着密切的关系，故自宋代以后，方书之编撰受到了官方的关注，如宋・王怀隐主编的《太平圣惠方》、陈承等主编的《太平惠民和剂局方》、赵佶主编的《圣济总录》、明・朱橚主编的《普济方》、清・吴谦主编的《医宗金鉴》、陈梦雷主编的《古今图书集成・医部全录》等，均为国家级的载方名著，其中《太平惠民和剂局方》是我国官方颁布的第一部成药制剂规范，而《普济方》收载明初以前之方剂达 61739 首之多，《四库全书提要》称为"集方书之大全者"。由于历代王朝关心医药，重视方书，亦促进了民间医药之发展。据不完全统计，自宋至清末的一千余年间民间名医所著的各种方书多达 1400 余种。民国迄今，医药科学突飞猛进，中医方剂学亦随着时代的步伐而不断前进。尤其是在中华人民共和国成立以后，党和政府重视中医中药，中医的古籍与新著不断出版，方剂的实验研究相继开展，中医方剂学已成为全国各中医学院主要课程之一。《中华人民共和国药典》收录的名方验方和复方新制剂，对于中医方剂的推广运用，起到了积极的作用。

在制方理论方面，在宋以前多有方面无论，制方之义不明，后人难以掌握，用之稍有不当，不免影响疗效。金・成无己著《伤寒明理论》，对《伤寒论》中 20 首方剂分析主治之证情，阐述配伍之奥义，开创了方论之先河。自此以后，有自创新方，自释方义者，如金・李杲《脾胃论》、《兰室秘藏》，元・罗谦甫《卫生宝鉴》等；有为前人成方撰写方义者，如明・许宏《金镜内台方议》、洪九有《摄生秘剖》；清・罗美《古今名医方论》、汪昂《医方集解》、吴仪洛《成方切用》、王晋三《古方选注》、张秉成《成方便读》等。尤其值得一提的是，清・吴谦《医宗金鉴・删补名医方论》，是我国第一部由官方修订刊行的方论专著。目前全国各中医院校教材《方剂学》、《中国医学百科全书・方剂学》等著作中的古今名方验方，均由当代名医撰写了方论，对研究方剂配伍原理及临床运用有一定参考价值。

在我国对外文化交往中，中医方书是其内容之一。在日本，成书于公元 984 年的《医心方》，收载了我国唐以前方书中的方剂。在朝鲜，成书于公元 1445 年的《医方类聚》、成书于公元 1610 年的《东医宝鉴》，均引载了我国明代以前方书中的方剂，足见中医方剂在我近邻各国中有着深远的影响。

据近 2000 种中医药文献的不完全统计，中医各科有名称和无名称的方剂已达 13 万首以上，虽然历经王怀隐、赵佶、朱橚等整理，但存在的问题仍然很多。例如古籍所载之方，均据病证

分类，方随病证而列，多无方名目录，欲检一方，殊非易事；同一方剂的出处，众说纷纭，令人莫衷一是，无所适从；同一方剂的名称，因载方文献或版本不同而命名各异，孰先孰后，仓卒难别；有相当一部分方剂的内容，由于辗转传抄刻印，脱、衍、倒、讹比比皆是，以讹传讹，影响疗效；有些常用的名方与验方的不同功效、主治、方论、临证验案、实验研究等资料，分散于各种文献中，汇集不易，难窥全豹；诸如此类，不胜枚举。综上所述，对中医方剂进行一次划时代的、全面的、系统的整理，是一项具有历史意义而又刻不容缓的工作。

《中医方剂大辞典》，对我国上自秦、汉，下迄现代（1986 年）的所有有方名的方剂进行了一次系统的整理，力求使上述各种问题得到合理的解决。以方剂检索而言，本书汇集古今有方名的医方，按照辞书形式编纂，既有目录，又有索引，从而解决检方的难题。以方源而言，本书参考古今各种中医药文献，对每一首方剂的方源进行认真的考证，而注明其原始出处，这对研究方剂的历史，澄清方剂的源流，是十分必要的。以一方多名而言，凡属同方异名，经过反复考证，依据载方文献成书年代之先后，确定正名与异名，并将二者相互挂钩，查正名即可知道异名，查异名即可知道正名，这对了解一方多名和准确地统计方数，有着极大的裨益。以方剂的质量而言，本书尽可能地进行仔细的校勘，使脱者补之，衍者删之，倒、讹者正之，使方剂的内容经过这次整理而准确无误。以方剂容纳的资料而言，本书对所有方剂分散在各种文献中的不同主治、方论、验案以及现代实验研究资料分别设项进行整理筛选，汇集于各方之下，为读者全面了解方剂提供了极大的便利。

早在 1958 年，南京中医学院即开始组织人力，筹备编撰本书，并得到当时的中华人民共和国卫生部的大力支持。到 1961 年底，已从 1700 余种中医药文献中，收集了大量的方剂、并进行了初步的筛选整理，此后因故而停顿。1983 年原中医古籍办公室又将编撰本书的任务下达给南京中医学院，1985 年本书的筹备工作开始恢复，1986 年成立课题协作组。1988 年国家中医药管理局成立以后，又将本书列为局级课题。在编撰过程中，得到了有关各级主管部门的热情关怀，在此表示衷心的感谢！

我们的主观愿望，是将本书编撰成载方最多、资料最全、考证最精的划时代的方剂大典。但由于本书所收资料涉及文献甚多，考证难度极大，撰审任务非常艰巨，加之我们的水平不够和种种客观条件所限制，错误缺点在所难免，敬请读者指正，以便再版时修改。

编 者

凡　例

一、本辞典共收载上自秦、汉，下迄1986年底1800余种中医药及有关文献中有方名的方剂9万余首。其中以1911年以前的方剂为收集重点，1911年以后的方剂则择优选录。

二、本辞典以方剂名称作为辞目。辞目又分为正辞目与副辞目。同一方剂而有不同名称者，以最早出现的方名为正辞目，其余为副辞目。但在有些文献中，先见的方名仅有主治，而无组成、用法，后见的方名有组成、用法、主治者，则以后见的方名作正辞目，先见的方名作副辞目。

三、正、副辞目按方名首字笔划、笔顺排列；方名首字相同的辞目，先按方名字数归类，字数少者排前，多者排后；方名首字、字数均同者，再按第二字之笔划、笔顺排列，依次类推；同名方则按各方方源的成书年代或创方者生卒年代先后排列。

四、凡经增补的文献，因其原著的方剂与增补的方剂年代不同，故均区别开来确定年代，并尽可能在出处中注明。

五、凡正辞目方名有误者，根据始载书的不同版本及有关转载书径予订正，并在备考中加以说明。副辞目方名有误者，径删不录。

六、正辞目内设方源、异名、组成、用法、功用、主治、宜忌、加减、方论选录、临证举例、现代研究、备考等十二项。

1. 方源：叙述正辞目的原始出处。如始载书存在者，注始载书的书名和卷次；始载书已佚者，注现存最早转载书引始载书。若系转引的人名，经追考创方者的著作中有此方者，改从原著收录；原著已佚或创方人无著作传世者，乃注转载书引某某人方。始载书无方名，后世文献补立方名者，注“方出始载书卷X，名见转载书卷X”。

2. 异名：收录各方异名的名称及其出处。如一方有多种异名者，则按所载异名的文献年代先后排列。若仅有始载书的异名者，不注出处。

3. 组成：收录始载书中各方的具体成分，包括药物名称、炮制、用量等内容。方中药物计量单位。1979年前的方剂概用旧制，1979年后新创方均用公制。方中诸药原无用量者，不予增补；后世转载文献已补用量者，则收录于“备考”中。如组成中个别药物无用量，则在备考项说明：“方中某药用量原缺。”如上述某药原无用量，转载书中有用量者，则根据转载文献补入，亦在备考项说明。

4. 用法：收录方剂的制剂、剂型、服用方法与用量等内容。如原书无用法，转载文献已补用法者，则收录于备考项。

5. 功用、主治、宜忌：分别设项收录、叙述各方的功效、主治病证、组方用方的注意事项。凡收录两种以内不同文献的引文资料，均直接摘收引文；凡收录三种以上不同文献的资料，先由编者根据引文内容归纳成主文，然后下列引文。

宜忌项归纳主文，须有三种以上关于疾病、体质、妊娠宜忌和毒副反应的文献资料。若关于

药物配伍宜忌、炮制与煎煮药物器皿宜忌、服药时的饮食宜忌等，均只用引文，不写主文。

6. 加减：仅收录始载书的资料。如加减药物占原方用药比例过多者不录；现代方剂加减不严谨者不录；后世转载书的加减一概不录。

7. 方论选录：择用古今名医对各方组成结构、配伍原理、综合功效、辨证运用、方名释义、类方比较等论述，而有独到见解者。原文精简者，录其全文；文字冗长者，择要摘录。

8. 临证举例：选录古今医家运用各方治疗疾病的实际案例。文字简短者全文照录，文字较长者择要摘录。

9. 现代研究：收摘用现代方法与手段对方剂进行实验研究和剂型改革的资料，包括复方药理作用和主要成分的研究，将传统的成方剂型改造成现代剂型等内容，均以摘要或综述方式撰写。对实验资料，摘录其实验结果，不详述实验方法与操作步骤；对剂型改革，不详述制剂的工艺流程。

10. 备考：凡古今医方中的资料，有不宜收入前述各项而确具参考价值又必须收录者，均在本项叙述。有些方剂经编者研究考证，有必要加以说明者，均在本项说明之。

11. 自功用以下各项，其内容出处与方源项一致者，所录引文不注出处；如上述各项收录有方源以外其它文献引文者，均分别注明出处。凡两条以上引文均根据文献年代排列，并编有顺序号。

以上十二项，以方源、组成、功用或主治为必备项，其余各项有资料则设，无资料则从缺。

七、引文筛选与整理：所有引文资料，均经过编者去同存异，精心筛选。相同的引文，一般从最早的文献中收录；若后世文献论述精辟者，择用后世文献的资料。凡引文中的封建迷信内容一概不录。引文文义不顺或重复者，在不违背原意的前提下，由编者作适当的加工整理。

八、副辞目：凡属副辞目，仅写副辞目的名称与出处，及与相关正辞目的关系。并在相关正辞目的有关项目中与之挂钩呼应：如写作"为某某方之异名"的副辞目，在正辞目异名项挂钩；写作"即某某方加(减)某某药"的副辞目，在正辞目加减项挂钩；其余副辞目，均在正辞目的备考项挂钩。

九、出处标注：正辞目除方源、异名二项标明书名和卷次外，其余诸项均只注书名，不注卷次。副辞目的出处亦标明书名和卷次。

期刊注法统一采用：刊年；(卷)期：起页。

十、药名统一：凡首字不同的中药异名仍保持原貌，如"瓜蒌"不改"栝楼"，"薯蓣"不改"山药"，"玄胡索"、"元胡索"不改"延胡索"。首字相同的中药异名，第二字以下诸字与《中药大辞典》的正名系同音字者，一律改用《中药大辞典》的正名，如"黄芪"改"黄耆"，"芒硝"改"芒消"，"白藓皮"改"白鲜皮"；若非同音字者，仍保留此异名。凡辞目中含有药名者，处理方法同此。

十一、书名统一：为了压缩篇幅，我们根据历代文献的引用情况，对某些常用方书的书名进行了简化。如《备急千金要方》简称《千金》，《太平圣惠方》简称《圣惠》。未经简化者仍用全称。一书多名者，选用一种常用名，如《人已良方》又名《寿世良方》，则统一用《人已良方》。

十二、文字统一：本辞典所用简化字，以中国文字改革委员会《简化字总表》(1964 年第二版)为主要依据。根据中医药学名词术语的要求，少数繁体字如癥瘕之"癥"，橘皮之"橘"等，仍予保留。

十三、文献版本：凡一书有多种版本者，选用善本、足本；无善本者，选用最佳的通行本；其它不同的版本作为校勘、补充。若同一方剂在不同的版本中方名有差异者，以善本、最佳通行本

或较早版本之方名作正辞目，其它版本的方名作副辞目。

十四、本辞典分 11 册出版。1～10 册为正编，书前均设该册“方名目录”，按方名笔划顺序编排。第 11 册为附编，设有全书方名总目录、病证名称索引、参考书目索引、古今度量衡对照表等，以利读者检索。

目　录

九　画

【一】

玳

珀

珍

珊

毒

奏

春

垣

垢

柑

枯

柘

相

枳

柞

柏

枸

南

茸

茜

茂

荜

草

茧

茵

茴

茱

荞

茯

荏

荟

茶

茖

荠

茺

荡

赵

甚

残

砒

砂

牵

厚

威

背

临

韭

削

省

哑

咽

响

咬

星

胃

思

骨

钩

复

香

选

适

毡

重

便

修

保

促

信

侯

顺

皇

泉

追

禹

鬼

饼

胚

胆

胜

胖

脉

胎

闻

炼

炮

烂

洁

洪

洞

洗

活

济

洋

浑

津

将

前

首

养

举

宣

室

宫

类

娄

送

逆

误

诰

诱

祛

祓

祖

神

冠

扁

〔一〕

弭

既

费

屋

退

陟

除

眉

姚

贺

蚤

柔

癸

孩

绒

结

绛

络

绝

检　字

【丿】

【丶】

【乛】

九　画

玳

55548　**玳瑁丸**

【方源】《圣惠》卷二十二。

【异名】七宝丸(《圣济总录》卷六)。

【组成】生玳瑁五两(捣罗为末)　安息香五两(用酒煮似糊,用绢滤去滓)　朱砂二两(细研,水飞过)　雄黄半两(细研)　琥珀一两(细研)　麝香一分(细研)　龙脑一钱(细研)

【用法】上研匀,以安息香糊为丸,如鸡头实大。用童便三合,生姜自然汁半合,相合暖过,研下三丸,不拘时候。

【主治】急风及中恶,不识人,面青,四肢逆冷。

【宜忌】《圣济总录》:孕妇不可服。

55549　**玳瑁丸**

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】生玳瑁屑一两　生金屑半两(细研)　自然铜半两(细研)　不灰木一两(用牛粪火烧通)　珍珠末一两　琥珀一两(细研)　犀角屑一两　铁粉三分(细研)　牛黄一分(细研)　朱砂三分(细研,水飞过)　龙脑一分(细研)　麝香一分(细研)

【用法】上为末,入研了药,重研令匀,以炼蜜为丸,如鸡头实大。每服五丸,煎麦门冬汤嚼下,不拘时候。

【主治】妇人血风,心神烦热,恍惚多惊,不得睡卧。

55550　**玳瑁丸**

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】玳瑁一两　麒麟竭半两　乳香半两　没药半两　须灰(故锦)三分　续断一两　安息香半两

【用法】上为末,以蜜及安息香熬炼,和诸药末为丸,如绿豆大。每服二十丸,食前以温酒送下。

【主治】妇人赤带,下不止。

55551　**玳瑁丸**

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】玳瑁(镑)　丹砂(研)　雄黄(研)　白芥子各半两　麝香(研)一分

【用法】上为末,再同研匀,别以银石器酒煎安息香一两为膏,和丸如绿豆大。每服十丸,温童便送下,不拘时候。

【主治】中风不语,精神冒闷,兼治忽中恶不语。

55552　**玳瑁汤**

【方源】《奇效良方》卷六十五。

【异名】玳瑁散(《医统》卷九十一)。

【组成】生玳瑁　生犀(各以冷水浓磨汁)各二合

【用法】同搅令匀。每服半合,微温,一日四五服为佳。

【主治】时行豌豆疮及赤疮疹子,未发者令内消;已发者,解利毒气,令不太盛。

【方论选录】玳瑁、犀角,其性微寒,以治热毒。二药皆治瘟疫蛊瘴,解百毒,通血脉,消痈肿,故用以解蕴毒,而宜服也。

55553　**玳瑁散**

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】玳瑁屑　延胡索　当归(锉,微炒)　赤鲤鱼鳞(烧灰)　麝香(细研)各三分　琥珀　水蛭(炒令黄)　牡丹　蒲黄　益母草子　香墨各半两

【用法】上为散,入研了药令匀。每服一钱,以温酒调下,不拘时候。

【主治】产后败血冲心,运绝(晕厥)。

55554　**玳瑁散**

【方源】《小儿斑疹备急方论》。

【组成】生玳瑁(水磨浓汁)一合　豮猪心一个(从中取血一皂子大,同研)

【用法】上以紫草嫩茸浓煎汤调,作一服。

【主治】疮疹热毒内攻,紫黑色,出不快。

55555 **玳瑁散**

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】玳瑁(镑)三分 蒲黄 琥珀(别研如粉) 好墨 牡丹(去心)各半两 赤龙鳞(即鲤鱼皮,烧灰) 芎䓖 延胡索 当归(微炙)各三分

【用法】上为散。每服二钱匕,用暖生姜酒调下,淡醋汤亦得,不拘时候。

【主治】产后败血不下,上冲心闷,腹痛。

55556 **玳瑁散**

【方源】《普济方》卷三〇四。

【组成】面末 独头蒜

【用法】上同杵,用玳瑁簪头内疮孔中。虫出愈。

【主治】狐尿疮。

55557 **玳瑁散** 《医统》卷九十一。为《奇效良方》卷六十五"玳瑁汤"之异名。见该条。

55558 **玳瑁郁金汤**

【方源】《通俗伤寒论》。

【组成】生玳瑁一钱(研碎) 生山栀三钱 细木通一钱 淡竹沥二瓢(冲) 广郁金二钱(生打) 青连翘二钱(带心) 粉丹皮二钱 生姜汁二滴(冲) 鲜石菖蒲汁二小匙(冲) 紫金片三分(开水烊冲)

【用法】先用野菰根二两,鲜卷心竹叶四十支,灯芯二小帚(五六分),用水六碗,煎成四碗,取清汤分作二次煎药。

【功用】开窍透络,涤痰清火。

【主治】热陷包络,蒸液为痰,迷漫心孔,其人妄言妄见,疑鬼疑神,神志昏蒙,咯痰不爽。

【方论选录】何秀山:本方以介类通灵之玳瑁,幽香通窍之郁金为君,一则泄热解毒之功,同於犀角,一则达郁凉心之力,灵于黄连。臣以带心连翘之辛凉,直达包络以通窍;丹皮之辛窜善清络热以散火;引以山栀、木通,使上焦之郁火,屈曲下行,以下焦小便而泄。佐以姜、沥、石菖蒲汁,辛润流利,善涤络痰。使以紫金片芳香开窍,助全方诸药透灵;妙在野菰根功同芦笋,而凉利之功,捷於芦根;配入竹叶、灯心轻清透络,使内陷包络之邪热及迷漫心孔之痰火,一举而肃清之。此为开窍透络,涤痰清火之良方。

珀

55559 **珀珠散**

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】琥珀末一钱 珍珠末五分 朱砂末五分 飞滑石六钱 甘草末一钱

【用法】上药合匀,分三服。每服三钱,引用整木通(去粗皮)煎汤调服。

【主治】溺血而诸药不效,所溺之血成块,窍滞不利,茎中急疼欲死者。

珍

55560 **珍奇散**

【方源】《玉案》卷六。

【组成】珍珠 芦甘石(煅) 紫草茸各三钱 麝香 枯矾各二分

【用法】上为细末。吹入耳内。

【主治】耳疮并耳内流脓。

55561 **珍宝饮**

【方源】《玉案》卷五。

【组成】当归 白芍 人参 白茯苓 生地各一钱 蒲黄二钱(炒黑) 香附 川芎 白术 甘草 黄连各八分

【用法】入大枣二个,水煎,食前温服。

【主治】月信一月两至,或数日一至者。

55562 **珍宝散**

【方源】《玉案》卷三。

【组成】珍珠三钱 硼砂 青黛各一钱 冰片五分 黄连 人中白各二钱(煅过)

【用法】上为细末。掺之。

【主治】口内诸疮。

55563 **珍珠丸**

【方源】《幼幼新书》卷十引《吉氏家传》。

【组成】北寒水石(硬尖者)

【用法】细研如粉,以雪水浸三宿,又研,以水澄下脚为度,再研取五钱,为细末,倾出纸

上,摊一宿,收入瓷合内。每服一字,以鸡子清为丸,仍以鸡子清磨下。

【功用】镇心。

【主治】惊风。

【宜忌】大热方可服。

55564 **珍珠丸**

【方源】《幼幼新书》卷十引郑愈方。

【异名】白丸子。

【组成】脑 麝各一字 粉霜 腻粉各一钱

【用法】上研为细末,用糯米汁为丸,如芥子大。每服三丸,糯米汤送下。

【主治】小儿惊风。

55565 **珍珠丸**

【方源】《宣明论》卷十四。

【组成】巴豆霜 腻粉各二钱 滑石二钱 天南星一钱半 蝎梢二十四个 续随子二十四个(去皮) 粉霜一钱半

【用法】上为极细末,以糯米粥为丸,如黄米大。小儿一岁以下,每服一至三丸,十五岁每服五丸至十丸,点茶汤送下;荆芥汤亦得。量虚实加减。

【主治】小儿虚中积热,惊痫等疾。

55566 **珍珠丸**

【方源】《丹溪心法附余》卷二十二引《全婴方》。

【组成】白附子一钱(泡) 滑石一钱 巴豆十五粒(去油) 轻粉一钱 天南星一钱(制) (一方有蝎尾半钱)

【用法】上为末,面糊为丸,如绿豆大。三岁每服一二丸,葱白汤送下。

【主治】小儿急惊风发搐,涎潮壮热及痰嗽壅塞,肚腹胀硬。

55567 **珍珠丸**

【方源】《御药院方》卷十一。

【组成】珍珠末 朱砂 雄黄 轻粉 蝎梢各一钱

【用法】上为细末,粳米饭和为丸,如粟米大。每服二十丸,薄荷汤送下,不拘时候。

【功用】治风化痰。

【主治】《普济方》:惊风发搐。

55568 **珍珠丸**

《医方类聚》卷二四六引《新效方》。为《幼幼新书》卷八引《博济》"真珠丸"之异名。见该条。

55569 **珍珠丸**

【方源】《医方类聚》卷二四四引《医林方》。

【组成】半夏 白面各等分

【用法】上为末,生姜自然汁为丸,如绿豆大。每服三十丸,水煮熟服。

【主治】小儿呕吐不止。

55570 **珍珠丸**

【方源】《医方类聚》卷二五二引《医林方》。

【组成】枯白矾 寒水石(烧过成粉)各等分

【用法】上为细末,水打面糊为丸,如黄米大。每服二十丸,毛香汤温下。

【主治】小儿泻后脾虚,吐食不止。

55571 **珍珠丸**

【方源】《普济方》卷一八〇引《郑氏家传渴浊方》。

【组成】生珍珠一两 麝香 龙脑 人参 天花粉 干葛 白茯苓 甘草 紫草各二两 末砂 黄连各半两

【用法】上为末,酒糊为丸,如鸡头子大。每服用麦门冬汤,细嚼咽下,含化为妙。

【主治】消渴。

55572 **珍珠丸**

《普济方》卷三七〇。为《圣惠》卷八十五"真珠丸"之异名。见该条。

55573 **珍珠丸**

《普济方》卷三七一。即《圣惠》卷八十五"真珠丸"。见该条。

55574 **珍珠丸**

《普济方》卷三八四。为《圣惠》卷八十五"真珠丸"之异名。见该条。

55575 **珍珠丸**

《普济方》卷三八四。为《圣惠》卷八十五"真

珠丸”之异名。见该条。

55576 珍珠丸

《普济方》卷三八五。为《圣惠》卷八十三“真珠丸”之异名。见该条。

55577 珍珠丸

【方源】《婴童百问》卷二。

【组成】白附子 滑石 轻粉各一钱 巴豆十五粒(去油) 全蝎半钱

【用法】上为末,糊丸如小豆大。三岁每服一丸、二丸,葱汤送下。

【主治】小儿急惊风,涎潮壮热,痰气上壅。

55578 珍珠丸

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】天花粉三钱 僵蚕(炒去丝)二钱 珍珠(豆腐内煮半日)三钱 人参三钱 胆星四钱 雄黄二钱 辰砂五钱(水飞一半为衣) 琥珀二钱 礞石(煅)三钱 犀角三钱 麝香五分 牛黄七分 甘草一钱 冰片二分

【用法】上为细末,竹沥为丸,如芡实大,朱砂为衣。薄荷汤送下。

【主治】小儿急慢惊风,痰涎壅盛,癫狂谵妄。

55579 珍珠丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】珍珠 麝香各三钱 熟地 当归各一两半 枣仁 人参 柏子仁各一两 犀角 茯神 沉香各五钱 冰片一钱 虎睛一对

【用法】上为细末,炼蜜为丸,朱砂、金箔为衣。每服五十丸,日午、夜卧各用薄荷汤送下。

【主治】肝虚不寐。

55580 珍珠丸

【方源】《中药成方配本》(苏州)。

【组成】珠粉一钱 西牛黄五分 天竺黄五分 制南星五钱 琥珀三钱 胡黄连二钱 广木香三钱 雷丸三钱 槟榔五钱 炙鸡内金一两 银柴胡三钱 飞朱砂三钱

【用法】上药除朱砂外,各取净末和匀,用米汤泛丸,如芥子大,将朱砂为衣,约成丸四两。每日三次,每次五厘,食前开水化服。乳儿酌减。

【功用】化痰。

【主治】小儿痰多。

55581 珍珠丸

【方源】《江苏省中药成药标准暂行规定汇编》第一册。

【组成】鸡内金五钱 轻粉八分 巴豆霜八分 六神曲九两 枳实(炒)三钱 珍珠一钱 牛黄八分 黄连二钱 陈胆星三钱 天竺黄三钱 川贝母三钱 半夏(制)三钱 桔梗三钱 僵蚕三钱 全蝎三钱 雄黄三钱 玄参三钱 夏枯草五钱

【用法】珍珠、牛黄、轻粉另研极细,余药共轧为细粉,混合再研,过罗,用冷开水泛为小丸,另取朱砂细粉一两六钱为衣。一岁每服二粒,每增一岁增加一粒,十岁以上者十粒为度,日服二次,温开水送下。

【功用】化痰,消积,镇惊。

【主治】由热结痰多引起的咳嗽喘急,腹部膨胀,疳积,虫积,及惊风抽搐。

【宜忌】忌食生冷及不易消化之物。

55582 珍珠丸

【方源】内蒙古自治区蒙药制药厂。

【组成】麝香 牛黄 犀(广)角 珍珠 藏红花 紫檀香 白檀香 海金砂 白云香 沉香 石膏 丁香 诃子 栀子 川楝子 方海 肉桂 草果仁 黑苣胜 白苣胜等二十九味

【用法】上药除牛黄、犀(广)角、麝香、珍珠、藏红花五味各另研细粉外,其余诃子等二十四味分别挑选洁净,按处方要求炮制后,共研成细粉,与上述牛黄等五味细粉兑匀,加牛奶等辅料,凉开水泛丸,朱砂为衣。每服2.5～3.5克,每日一至二次,温开水送服。

【功用】通络化痰,舒筋活血,除湿散风,清热解毒。

【主治】白脉病,半身不遂,风湿,类风湿,肌筋萎缩,神经麻痹,肾损脉伤,瘟疫热病,瘰

疬疮疡，久热不愈。

【备考】白脉病乃蒙医术语，白脉包括大脑，小脑，延脑，脊髓，以及各种神经。白脉病包括口眼歪斜，四肢麻木，肌肉萎缩，偏瘫，小儿麻痹，言语不清，神经衰弱，高血压等症。

55583　珍珠丹

【方源】《医宗说约》卷五。

【组成】皂荚（去筋子）八两　小槟榔（干切）六两　黑白丑（洗净，浮水者不用）各四两　巴豆肉六钱（捶碎，包夏布中）

【用法】上药和一处，用阴阳水十四碗，与药共煮，水尽，取起巴豆晒干，磨为细末，瓷瓶收贮。每服男用七九分，女用六八分，黑糖拌。治水蛊用川贝母、秦艽、花粉各一钱，真苏子九分，煎汤送下三分，隔一日，服药一次。

【功用】追虫去积，消食逐滞，消膨胀，通便结，化痰垢，疏滞气，推陈致新。

【主治】虫积、膨胀。

【备考】《一盘珠》有庄黄，无黑白丑。

55584　珍珠丹

【方源】《全国中药成药处方集》（重庆方）。

【组成】珍珠一钱　炉甘石八两　琥珀七分　龙骨四分　赤石脂四分　钟乳石六分　朱砂五分　血竭二分　象皮五分

【用法】先将炉甘石火煅飞净，珍珠、血竭另研，象皮与朱砂同余药共研细末，合匀后，每两再加冰片二钱研细，玻璃瓶包装。用时外掺患处。

【主治】外症疮疡溃烂，不生肌肉。

55585　珍珠粉

【方源】《饮膳正要》卷一。

【组成】羊肉一脚子（卸成事件）　草果五个　回回豆子半升（捣碎，去皮）

【用法】上同熬成汤，滤净，羊肉切乞马，心、肝、肚、肺各一具，生姜二两，糟姜四两，瓜齑一两，胡萝卜十个，山药一斤，乳饼一个，鸡子十个，作煎饼，各切，次用麻泥一斤，同炒，葱、盐、醋调和。

【功用】补中益气。

55586　珍珠散

【方源】《永乐大典》卷一一四一二引《卫生家宝》。

【组成】晚蚕沙二两　谷精草一两　夜明沙一两　石决明三两（煅）

【用法】上为细末。每一大钱，米泔水调，如赤肿上翳，用猪肝夹药扎定，泔一盏，煎至七分，先熏后服。

【主治】目翳。

55587　珍珠散

《医方类聚》卷二四五引《施园端效方》。为《博济》卷四“真珠散”之异名。见该条。

55588　珍珠散

【方源】《医方类聚》卷七十引《烟霞圣效方》。

【组成】白腻滑石一两　乳香二钱（另研）　盆消七钱

【用法】上为极细末。每用一字，噙水搐之。

【功用】清利头目，截赤定痛。

【主治】目赤痛。

55589　珍珠散

【方源】《普济方》卷三七四引《仁存方》。

【组成】朱砂一分　珍珠末二钱　雄黄一分　全蝎一钱　蝉退七个

【用法】上为末。每服一字至半钱，煎金银薄荷汤送下，竹沥调尤好。

【功用】化痰退热。

【主治】惊风发搐。

55590　珍珠散

【方源】《医方类聚》卷二十三引《必用全书》。

【组成】米珠一字　桂府滑石二两　没药半两　乳香半两　马牙盆消一两　麝香　脑子各少许

【用法】上为极细末。每用一字，噙水，鼻中吹之。妇人，童子吹；男子，女儿吹。

【主治】偏正头疼、眼疼、牙疼。

55591　珍珠散

《普济方》卷八十二。即《圣惠》卷三十二“真

珠散”。见该条。

55592 **珍珠散**

《普济方》卷一〇一。即《圣惠》卷二十“真珠散”。见该条。

55593 **珍珠散**

【方源】《普济方》卷三一七。

【组成】珍珠三分（细研，水飞过） 水精三分（细研，水飞过） 铅霜三分（细研） 人参一两（去芦头） 茯神一两 朱砂一两（细研，水飞过） 雄黄半两（细研） 金箔五十片（细研） 银箔五十片（细研） 琥珀三分（细研）

【用法】上为细末，入研了药令匀。每服半钱，用薄荷汁调下，不拘时候。

【主治】妇人风邪，神识不安，癫狂言语失次，如见鬼神。

55594 **珍珠散**

【方源】《普济方》卷三六九。

【组成】珍珠末 马牙消 寒水石 太阴元精各一分 龙齿 铅霜 朱砂各半两 牛黄 麝香各半两

【用法】上为细末。每服半钱，以新汲水调下，不拘时候。

【主治】小儿热病，心神狂躁，身热如火，头痛烦渴，眠卧不安。

55595 **珍珠散**

《普济方》卷三八五。为《圣济总录》“真珠散”之异名。见该条。

55596 **珍珠散**

【方源】《万氏家抄方》卷三下。

【组成】炉甘石不拘多少（炭火中煅，先用黄连煎汁淬过，焙干） 冰片适量

【用法】用当归、黄连、芍药、生地、薄荷、荆芥、防风、蔓荆子、甘草各等分煎汁，将炉甘石浸一昼夜，焙干，研，入小瓶内，水浸，使出火毒，然后再乳极细，次加冰片，亦乳极细，相和点之。

【主治】烂眩赤眼。

55597 **珍珠散**

【方源】《万氏家抄方》卷四。

【组成】珍珠一分（以纸裹灯上烧过，吹去灰，细研） 琥珀五厘 黄柏末一分半 血竭 孩儿茶 熊胆 轻粉 冰片各一分 麝香五厘 乳香二分 没药二分（俱置箬上，于新瓦上炙去油） 炉甘石二分半（制法：每石四两，用黄连、黄柏、黄芩各五钱，煎汤分作三半碗。将石火煅一炷香，浸在一碗内吃干，再煅一炷香，另浸一碗内吃干，又煅又浸，如此三次，取起细研）

【用法】共研极细末。用苦参、防风、荆芥、甘草、黄柏、大黄各等分煎汤，洗净敷之；如肿，用桃叶、槐叶煎汤，入生矾五钱，冷洗；如再不消，用细茶、川椒、炒盐各一钱，煎汤冷洗自消。

【主治】下疳疮。

55598 **珍珠散**

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【异名】真珠散（《疡科捷径》卷中）。

【组成】黄连末 黄柏末 乳香 没药 孩儿茶 轻粉 官粉（煅） 五倍子（炒） 珍珠（研） 象牙（锉）各等分

【用法】上为末。以米泔水洗净，掺患处。

【主治】下疳疮。

55599 **珍珠散**

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】珍珠粉 片脑 玄明粉 硼砂 人中白 槐皮各等分

【用法】上为末。先以荆芥汤洗患处，后吹前药末于口内。

【主治】痘后舌上生疮，赤者谓之赤口疮，白者谓鹅口疮。

55600 **珍珠散**

【方源】《医方考》卷四。

【组成】琥珀 珍珠粉 铁粉 天花粉 朱砂 寒水石 牙消 大黄（酒浸） 生甘草各等分

【用法】上为末。每服三钱，用薄荷汤调下。

【主治】男、妇、小儿五脏积热，心胸闷乱，口干舌燥，精神恍惚，癫狂等证。

【方论选录】明可以安神，琥珀、珍珠皆明物也，故用之以安神魄；重可以去怯，铁粉、朱砂皆重物也，故用之以定惊狂；寒可以去热，消、黄、水石，皆寒物也，故用之以除积热；热之盛者必渴，天花粉可以生津；火之炽者必急，生甘草所以缓急。

55601　珍珠散

【方源】《便览》卷四。

【组成】珍珠(新大者)一钱　干漆(烧烟净)三钱　莪术(醋煮)三钱　三棱(醋煮)三钱　胡黄连二钱(无黄连代当归五钱)　川芎二钱　红花三钱　白术一钱　黄芩一钱

【用法】上为末。每服五分，米汤或盐汤空心任下。一日一服，不可间断。

【主治】经脉不行，成干血气及癥瘕积聚。

55602　珍珠散

【方源】《回春》卷八。

【组成】枯白矾　雄黄　珍珠　黄柏　官粉(煅过)各等分

【用法】上为末。以米泔水洗疮令净后擦药。

【主治】下疳疮。

55603　珍珠散

【方源】《外科正宗》卷三。

【异名】月白珍珠散(《外科大成》卷一)。

【组成】青缸花五分(如无，用头刀靛花轻虚色翠者代之，终不及缸花为妙)　珍珠一钱(不论大小，以新白为上，入豆腐内煮数滚，研至极细无声方用)　真轻粉一两

【用法】共研千转，细如飞面，方入罐收。凡下疳初起，皮损搽之即愈；腐烂疼痛者，甘草汤洗净，猪脊髓调搽；如诸疮不生皮者，用此干掺，即可生皮；又妇人阴蚀疮，或新嫁内伤痛甚者，亦可搽此极效，汤泼火烧痛甚者，用玉红膏调搽之。

【主治】下疳皮损腐烂，痛极难忍及诸疮新肉已满，不能生皮；又汤泼火烧，皮损肉烂，疼痛不止者。

55604　珍珠散

【方源】《明医指掌》卷八。

【组成】朴消(净者)一钱　芦甘石二钱　麝香少许　片脑少许

【用法】上为极细粉。点眼内眦。

【主治】一切眼病。

55605　珍珠散

【方源】《济阳纲目》卷一〇一。

【组成】炉甘石　黄连各一斤

【用法】上将黄连煎汤，以火煅炉甘石通红，入黄连汤内淬之，如此七次，去黄连不用，将炉甘石研令极细，用水飞过，澄取沙脚，阴干再入乳钵内复研过，每炉甘石末一两，入片脑一钱，研匀。每用少许，先以井花水洗眼净，用金银簪点入眼大小眦头，若多年风烂眼，只入麝香少许，点之。

【主治】暴赤热眼，肿胀痒痛，羞涩。

55606　珍珠散

【方源】《玉案》卷三。

【组成】人中白二钱　铜青五分　珍珠　麝香　牛黄各三分　南枣(煅灰)六分

【用法】上为极细末。吹于患处。

【主治】走马牙疳。

55607　珍珠散

【方源】《诚书》卷八。

【组成】珍珠　海螵蛸　滑石　辰砂各一钱　人参　附子(炮)各二钱　全蝎(制)　甘草(炙)　麝各五分　金箔　银箔各五十片　龙脑一角

【用法】上为末。灯心、麦冬汤下。

【主治】客忤恍惚叫啼，溲赤，吐黄。

55608　珍珠散

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】珍珠　石膏(炒)　赤石脂　轻粉各一钱　白龙骨三钱　冰片二分　孩儿骨(狗胎骨亦可)五分

【用法】上为细末。掺之。

【功用】长肉生肌收口。

【主治】痈疡。

55609　珍珠散

【方源】《尤氏喉科秘书》。

【组成】龙骨一钱（煅） 珍珠一钱 儿茶五分 海螵蛸一钱 参三七二钱 没药 乳香（去油）各五分 降香节一钱（忌用铁器） 象皮一钱（炙脆） 朱砂五分 冰片一厘

【用法】上为细末。用棉花蘸药塞患处，以指按之勿动，二三次即止。

【主治】牙宣。

55610 珍珠散

【方源】《痘疹正宗》卷下。

【组成】珍珠（生研极细，粗恐伤肠胃）一钱 牛黄五分

【用法】上为极细末。以此散或五分或三分蜜水调下。

【主治】舌疔、喉痈、痈疮入喉，结毒内府，及一切要害之毒。

55611 珍珠散

【方源】《张氏医通》卷十五。

【异名】珍珠十宝散（《外科方外奇方》卷二）。

【组成】炉甘石（制如绛雪膏法，净）八两 珍珠（煅，净）一钱 琥珀（净末）七分 龙骨（煅，水飞，净）四分 赤石脂（煅，水飞净）四分 钟乳石（甘草汤煮一伏时，水飞净）六分 朱砂（水飞净）五分 麒麟竭二分 象皮（焙干为末）五分

【用法】上为极细粉。每药一钱，入冰片二分，研匀和调，敷上立长。

【主治】不拘何疾，溃烂不肯长肉者。

【备考】方中珍珠，《外科方外奇方》作“珍珠母”。

55612 珍珠散

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】珍珠（生，研） 绿豆（生，研） 豌豆（烧存性） 发灰各等分 （一方无绿豆，加冰片少许）

【用法】上为散。胭脂调，银针挑破，口含清水，吮去毒血，涂之。

【主治】痘疔。

55613 珍珠散

【方源】《医部全录》卷二七九引《良方》

【组成】蛤粉 牡蛎各等分

【用法】上为细末。绢袋盛，扑。

【主治】阴汗。

55614 珍珠散

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】珍珠一钱五分 玛瑙一钱五分 琥珀一钱五分 珊瑚一钱五分（以上四味俱用豆腐煮过再研） 硼砂五分 熊胆五分（用笋壳盛，烘脆为末） 龙脑四分 麝香二分五厘 瓜竭七分五厘 朱砂（细研水飞）七分五厘 黄连末（去须芦，细研）五分 明乳香（箬上炙干）五分 没药（箬上炙干）五分 芦甘石（按法炮制为主）一两五钱

【用法】上各为细末，用上细粉罗筛过，再照分数称定，合为一处，研万匝，复以棉纸筛下，瓷罐收贮，听用。

【功用】《中药成方配本》：清火止痛，消肿退翳。

【主治】①《医学心悟》：眼目障翳初起。②《中药成方配本》：风火红眼，障翳胬肉，迎风流泪，老年昏花。

【备考】《中药成方配本》有石蟹，无血竭。

55615 珍珠散

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】芦甘石五钱 防风 生地 甘草 连翘 花粉 白芷 大黄各三钱

【用法】上煎浓汁，火煅芦甘石令红，淬汁内，再煅再淬，以汁尽为度，冷定研细末，加冰片二分，研匀掺疮上，以膏盖之。

【功用】生肌。

【主治】痈疡疮口不敛。

55616 珍珠散

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】硼砂 雄精 川连 儿茶 人中白 冰片 薄荷 黄柏各等分 大破珠减半

【用法】上为极细末。以刀点之，吹之立效。

【主治】①《外科全生集》：牙疳、牙根红肿。

②《外科证治全书》,喉痈、喉间红肿疼痛。

55617　珍珠散

《金鉴》卷五十二。为《幼幼新书》卷二十三引《万全方》"真珠散"之异名。见该条。

55618　珍珠散

【方源】《徐评外科正宗》卷二。

【异名】奇效八宝丹(《春脚集》卷四)、八宝丹、珍珠犀黄八宝丹(《梅氏验方新编》七集)、珍珠生肌散(《药奁启秘》)。

【组成】珍珠一钱(人乳浸三日,夏天须每日换乳,研极细如飞面)　血竭五分　儿茶五分　石膏一钱(煅)　炉甘石一钱(以黄连五分煎汁煅淬,研极细,水飞净)　赤石脂一钱(煅)　陈年丝吐头五分(煅存性)　冰片一分二厘

【用法】上各为细末,再称准,共研极匀,瓷瓶收贮,勿令泄气。用时掺疮面。

【功用】生肌长肉,平口收功。

【主治】诸毒脓腐已尽,未收口者。

【备考】方中珍珠,《春脚集》、《梅氏验方新编》均作"珠母"。

55619　珍珠散

【方源】《疡科心得集·家用膏丹丸散方》。

【异名】珍珠生肌散(《增订治疔汇要》卷下)。

【组成】珍珠三钱(生研)　炉甘石一两(煅)　石膏一两五钱(在童便内浸四十九日,朝晒夜露,不可经雨,煅研)

【用法】上为极细末。掺之。

【功用】止痛生肌收口。

55620　珍珠散

《良方合璧》卷下。为《疡科遗编》卷下"金花散"之异名。见该条。

55621　珍珠散

【方源】《理瀹》。

【组成】龙骨(煅)6g　海螵蛸一钱　珍珠三厘　儿茶　朱砂　象皮　乳香　没药　冰片各五分

【用法】上为细末。吹患处;治牙落出血,棉团蘸水蘸药置患处,以指抵实之。

【主治】牙宣、牙落血不止。

【加减】血虚龈痒,加白芷。

55622　珍珠散

【方源】《外科传薪集》。

【组成】珍珠五钱　石膏(煅)五钱　西黄一分　冰片二分

【用法】上为细末。外掺疡面。

【功用】生肌长肉。

55623　珍珠散

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】白石脂(煅)三两　龙骨(煅)五两　石膏(煅)二两　石决明(煅)二十五两

【用法】上为极细粉,过罗,兑入麝香二钱五分,冰片一两,珍珠粉二钱五分,研细混合均匀。用开水将疮口洗净,按患处大小,取药粉敷患处。

【功用】祛毒消肿,生肌长肉。

【主治】疮疡溃烂,流脓流水,肌肉不生,久不收口。

55624　珍珠膏

【方源】《医统》卷九十一。

【组成】珍珠十五粒　豌豆四十九粒　发余(烧灰)不拘多少

【用法】上为末,用干胭脂,水调成膏。先用银簪拨开疔口,将药点入疔内,即皆变为红白色矣。

【主治】痘疔。

55625　珍珠膏

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】虎肉二分　虎胆　冰片各五分　珍珠一钱　蛇骨一钱五分　炉甘石　银朱各二分五厘

【用法】上为细末。调炼蜜用之。

【主治】内外二障及烂眼。

55626　珍合灵片

【方源】《中医方剂临床手册》。

【组成】珍珠层粉　灵芝　甘草

【功用】养心安神。

【主治】心律失常，心悸，失眠。

55627 **珍珠子丸**

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】珍珠一钱 胡黄连二钱 槟榔 牛黄 天竹黄 天南星（制）各五钱 银柴胡 白雷丸 西琥珀 广木香各三钱 鸡内金十具 赤金箔二十张

【用法】上为细末，陈米煎汤泛丸，如芥子大。七岁以下，每服一丸，熟汤送下，惊风加倍。男女大小量病轻重加减，以三十丸为则，每日三次。

【主治】小儿急慢惊风，痰迷心窍，夜卧惊悸，烦躁不宁。

【宜忌】忌食生冷、腥气、油腻、面、蛋等物。

55628 **珍珠母丸** 《医宗必读》卷十。为《本事》卷一"真珠丸"之异名。见该条。

55629 **珍珠母丸** 《医略六书》卷二十五。为《保命集》卷下"珍珠粉丸"之异名。见该条。

55630 **珍珠母丸**

【方源】《中医临症备要》。

【组成】珍珠母 生地 熟地 党参 当归 柏子仁 酸枣仁 茯神 龙齿 沉香

【功用】养肝熄风。

【主治】痴呆。目光不活，言语迟钝，四肢举动亦不灵便，脉象迟缓，兼见头晕、多汗、心悸、艰寐。

【备考】原书治上症，用本方加全蝎。

55631 **珍珠粉丸**

【方源】《保命集》卷下。

【异名】珍珠母丸（《医略六书》卷二十五）。

【组成】黄柏一斤（新瓦上烧令通赤为度） 真蛤粉一斤

【用法】上为末，滴水为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心温酒送下。

【主治】①《保命集》：白淫梦泄遗精及滑出而不收。②《医略六书》：阴虚白浊，脉涩数者。

【方论选录】阳盛乘阴，故精泄也。黄柏降火，蛤粉咸而补肾阴也，兼治思想所愿不得。

55632 **珍珠粉丸**

【方源】《内经拾遗》卷一。

【异名】真珠粉丸（《景岳全书》卷五十七）。

【组成】珍珠三两 蛤粉 黄柏（新瓦上炒赤）各一斤

【用法】上为末，水为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心酒送下。

【主治】溲出白液。

55633 **珍珠粉丸**

【方源】《医统》卷七十引丹溪方。

【组成】黄柏 真蛤粉各一斤 珍珠二两 樗根白皮一斤

【用法】上为末，滴水为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心温酒送下。

【主治】精滑白浊。

55634 **珍珠粉丸**

【方源】《医方考》卷四。

【组成】牡蛎粉（取血色者，炙） 黄柏各一斤 珍珠三钱

【主治】湿热在中、下二焦，令人便浊者。

【方论选录】燥可以去湿，故用牡蛎粉；苦可以胜热，故用黄柏；滑可以去着，故用珍珠。

55635 **珍珠粉丸**

【方源】《女科切要》卷二。

【组成】樗皮（炒黄） 黄柏（盐水炒） 青黛 蛤粉 滑石 珍珠各等分

【用法】上为末，神曲糊丸。

【主治】白浊不止。

【方论选录】方用樗皮、黄柏能燥湿清热，青黛能解郁热，蛤粉咸寒引下，滑石利窍，珍珠宁神定志。

55636 **珍宝三生丹**

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】火麻仁 大黄 山萸肉 山药 菟丝子 枳壳（炒） 槟榔 牛膝各三两 郁李仁 车前子 独活各三两五钱

【用法】上为末，蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，茶、酒任下。

【主治】半肢瘫痪，痖疯。

55637 **珍珀活命丹**

【方源】《玉案》卷五。

【组成】牛黄　琥珀　珍珠　蟾酥　朱砂各一钱　蝼蛄七个　地鳖虫七个

【用法】上为细末，人乳为丸。每服五分，空心白滚汤送下。

【主治】单腹胀。

55638　**珍珠十宝散**　《外科方外奇方》卷二。为《张氏医通》卷十五"珍珠散"之异名。见该条。

55639　**珍珠十宝膏**

【方源】《疡医大全》卷九。

【组成】珍珠一钱(豆腐包煮)　轻粉　杭粉各五钱　潮脑四钱　乳香(去油)　没药(去油)各二钱　白蜡八钱　琥珀八分　冰片三分

【用法】先将猪板油四两，入锅熬化去渣，再入白蜡化净，离火，入研细珠、轻、杭、乳、没五末，将凝始下冰片、琥珀、潮脑和匀，冷定收贮。用时以净手心搌脚，挑放掌心，溶化涂之。

【功用】生肌定痛。

【主治】痈疽火毒及一切刀伤斧砍，咬伤、杖疮。

55640　**珍珠八宝丹**

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】珍珠　象皮　冰片　乳香　没药鸡内金各三钱　生龙骨　赤石脂各二两　血竭　轻粉各四钱　铅粉一两　辰砂二钱

【用法】上为末。掺患处。

【功用】止血定痛，生肌长肉。

【主治】金疮、刀疮，跌扑损伤，或一切疮毒，久不收口。

55641　**珍珠八宝丹**

【方源】《上海市药品标准》。

【组成】珍珠　冰片各 1.5 克　赤石脂 15 克　龙骨　儿茶　血竭各 9 克　乳香　没药　象皮各 6 克　朱砂 3 克

【用法】上为细末。每用少许撒于患处，外贴膏药。

【功用】祛腐生肌，收口止痛。

【主治】疮毒破溃，脓水将尽，久不收口者。

55642　**珍珠八宝丹**

【方源】《中药成方配本》。

【组成】珠粉五分　西牛黄一分五厘　琥珀一钱五分　冰片三分　龙骨三钱　制甘石二钱　黄连五分　煅赤石脂二钱

【用法】上药各取净末，和匀，再研至极细为度，约成粉九钱五分。将药粉掺患处，用白玉膏盖贴。

【功用】生肌收口。

【主治】溃疡臁疮，久不收口。

55643　**珍珠八宝丹**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】赤石脂 9 克　制甘石 9 克　乳香 2 克　海螵蛸 9 克　血竭 2 克　没药 2 克　珠粉 2 克(后下)　冰片 2 克(后下)

【用法】上为细末。外用。

【主治】硬结红斑溃疡型。

55644　**珍珠人牙散**

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】人牙(煅)五钱　珍珠一钱　血竭五分

【用法】上为散。每服四五分，酒浆调服。

【主治】痘疮毒伏心肾，黑陷神昏。

55645　**珍珠天麻丸**

【方源】《普济方》卷三七〇。

【异名】真珠天麻丸(《袖珍小儿》卷二)。

【组成】天南星(炮)　天麻　白附子(炮)各一钱　腻粉半钱　巴霜一字　芜荑(炮炒)　全蝎　滑石各一钱半

【用法】上为末，水煮细面糊为丸，如绿豆大。每服一岁五丸，二岁十丸，随大小加减，薄荷汤点茶送下。以通为度。

【主治】急惊风，痰热壅盛，吊肠锁肚撮口。

55646　**珍珠龙脑丸**

【方源】《普济方》卷一七七。

【组成】人参　神砂　珍珠各半两　银箔五十片　脑子一钱　天花粉一两　黄连半两(去须)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如鸡头米大。每服一丸,细嚼,用麦门冬汤送下,空心、临午及卧时服。

【功用】镇心安神。

【主治】消渴。

55647 珍珠生肌散

《增订治疔汇要》卷下。为《疡科心得集·家用膏丹丸散方》"珍珠散"之异名。见该条。

55648 珍珠生肌散

《药奁启秘》。为《徐评外科正宗》卷二"珍珠散"之异名。见该条。

55649 珍珠冰片散

【方源】《疮疡经验全书》卷二。

【组成】珍珠 红绒末 人中白(煅) 鸡内金(煅存性) 铜青 青靛 黄连 孩儿茶 细牙茶各一钱 枯矾二钱 冰片五分 麝香二分

【用法】上为细末。先用蚌水漱净患处,每掺入之,一昼夜一二十次。

【主治】骨槽风。

55650 珍珠拨云散

【方源】《全国中药成药处方集》(沙市方)。

【组成】飞甘石二两 硼砂二钱(煅) 珍珠 麝香各三分 番硇砂五分 荸荠粉八钱 琥珀 熊胆各五分 正梅片一钱二分 云黄连(泡水)五分 末砂三分

【用法】上为极细末,装小玻璃瓶内,严密封固,勿使药性挥发。用消毒牙签尖端蘸凉开水一滴,再蘸药末少许,点入大小眼角。每日约点二或三次。点药后闭目休养。

【主治】风热上壅,结膜发炎,目红肿痛,热泪羞明,翳障遮睛,睑痒赤烂。

【宜忌】结膜无炎症忌用。

55651 珍珠胃安丸

【方源】广州白云山制药总厂。

【组成】珍珠层粉 陈皮 徐长卿 豆豉 生姜 甘草

【用法】上药磨粉,过 100 目筛,混匀,水泛制丸。每服 1.5 克,一日四次,饭后及睡前服。

【功用】和中宽胃,行气止痛。

【主治】胃及十二指肠溃疡。

55652 珍珠退翳散

《普济方》卷八十。即《直指》卷二十"真珠退翳散"。见该条。

55653 珍珠象牙膏

【方源】《寿世保元》卷九引黄宾江方。

【组成】珍珠(用豆腐一块,切两片,将珠铺在内,两片合住缚定,入水煮三炷香为度,研细末)一钱 象牙末一钱 天花粉末五分 官粉末一钱 白蜡一钱 香油五钱

【用法】上共合一处,入碗内,重汤煮化,澄成膏,纸摊,贴患处。

【主治】顽疮恶毒,年久不愈。

55654 珍珠琥珀散

【方源】《医门八法》卷四。

【组成】珍珠 琥珀 牛黄各五分

【用法】上为细末。每服一字,土蜂窠煎汤为引。

【主治】小儿久咳成风,痰壅气闭。

55655 珍珠滚痰丸

【方源】《串雅内编》卷一。

【组成】半夏五十粒 巴豆三十粒(去壳)

【用法】二味同煮,待半夏熟烂,取出巴豆止用半夏,烘干为细末,米糊为丸,如莱子大末砂为衣,晒干。每服七丸,用萝卜汁送下。大人倍之。

【主治】小儿痰塞心胸,及癫痫痰厥与喉闭有痰者。

55656 珍珠龙脑生肌散

【方源】《便览》卷四。

【组成】降真香五钱(用香油滚七次) 儿茶五钱 牙末二钱 枯矾二分 珍珠二分 片脑二分

【用法】上为极细末,瓷罐收,黄蜡封口。用清米泔水洗净拭干,掺上。

【主治】下疳、牙疳、诸色疳疮。

55657 珍珠黄金丹长药

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】五倍子 31 克 硫黄 46 克 珍珠 3 克 金箔 125 张 樟脑 31 克 枳壳 62 克 雄黄 31 克 白矾 3 克 炒樗根白皮(臭椿) 25 克

【用法】上为细末,外用。

【主治】白癜风。

55658 珍珠犀黄八宝丹

《梅氏验方新编》七集。为《徐评外科正宗》卷二"珍珠散"之异名。见该条。

珊

55659 珊瑚散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】珊瑚三分 龙脑半钱 朱砂一分

【用法】上先研珊瑚、朱砂如粉,次入龙脑,更研令匀。每以铜箸取一米许点之,每日三四次。

【主治】眼赤痛,后生肤翳,远视不明,痒涩。

55660 珊瑚散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】珊瑚半两

【用法】上为细粉。每点时,取如黍米大,纳在翳上,一日两次。

【主治】小儿眼有障翳。

55661 珊瑚蒸

《串雅外编》卷二。为《医说》卷一引许胤宗方"黄耆防风汤"之异名。见该条。

55662 珊瑚膏

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】玄精石一斤(为粗末) 桂府滑石一斤(为粗末) 黄连十两 秦皮十两(切细) 龙胆草十两 苦楝根十两 五倍子十两 当归五两 赤芍药五两 大栀子五两 杏仁五两 蕤仁五两(捣破) 槐枝二斤(切三寸许) 柳枝二斤(切三寸许)

【用法】玄精石至五倍子七味,用大锅盛水二大桶,煎至一半去滓,将细生绢滤过,瓷器盛放;当归至柳枝七味,亦用水二桶,煎至一半去滓,再将细生绢滤过,亦用瓷器盛放;白沙蜜五斤,先用小油搽锅内,慢火炼蜜紫色为度,将前二次煎成药水同煎数沸,再用生绢滤过,再熬至一半,入铜锅内,下硼砂五两,猪胆(大者)五个,慢火煎,用铁铲不住手搅,熬成稀膏。以珊瑚半两为粗末,用水一大碗,煎数沸,去滓不用,入前熬成稀膏半斤内,又下炉甘石二两,黄丹二两,用水飞过,将铁铲不住手搅,煎成稠膏,下上等片脑一钱,麝香一钱,研细,入药内搅匀,于瓷器内盛放。每用皂角子一大块,冷水半鸡子壳许,于小盏内浸化研开,点眼或洗眼亦得,临卧点用奇效。

【主治】远年近日不睹光明,一切杂患病眼五轮不损者。

55663 珊瑚膏 《疡医大全》卷十一。为《寿世保元》卷六引薛巡兵方"仙传珊瑚紫金膏"之异名。见该条。

55664 珊瑚紫金膏 《中国医学大辞典》引验方。为《寿世保元》卷六引薛巡兵方"仙传珊瑚紫金膏"之异名。见该条。

毒

55665 毒淋汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】金银花六钱 海金沙三钱 石韦二钱 牛蒡子二钱(炒捣) 甘草梢二钱 生杭芍三钱 三七二钱(捣细) 鸦胆子三十粒(去皮)

【用法】先将三七末、鸦胆子仁开水送服,再服余药所煎之汤。

【主治】花柳毒淋,疼痛异常,或兼白浊,或兼溺血。

【加减】若兼受风者,可加防风二三钱;若服药数剂后,其疼瘥减,而白浊不除,或更遗精者,可去三七、鸦胆子,加生龙骨、生牡蛎各五钱。

55666 毒腐散

【方源】《济众新编》卷五。

【组成】砒霜 蟾酥各一钱 巴豆(去油)

白丁香　轻粉各五分　麝香　大蜘蛛　蛇含草　雄黄各四分　糯米三钱（青黛水浸）

【用法】上为末，黄蜡、松脂、香油调敷患处。

【主治】连珠瘰疬。

55667　毒油神膏

【方源】《青囊全集》卷上。

【组成】香油一斤　藤黄二两

【用法】上药熬枯去渣，入白蜡二两。

【功用】杀虫止臭，退红除肿。

【主治】一切取割铅码枪子、硫黄硝毒、火疮肉烂、挪接痛甚。

【加减】接骨，加紫草、苏木、生地、红花、川柏、归尾；凉血生肌，入四六、甘石、龙骨粉、象皮、云连、川柏、白芷；拔毒生肌，入甘石、红粉；涂火疮，入轻粉、梅片。

【宜忌】此膏头部禁用，入口伤人，慎之慎之。

55668　毒消滤水饮

【方源】《喉科种福》卷三。

【组成】犀角八钱　黄芩四钱　栀子四钱　僵蚕五钱（酒炒）　青黛五钱　黄连三钱　木通四钱　生大黄一两（泡服）　知母四钱　牛子四钱　芒消四钱　龙胆草三钱　全蝉四钱（去土）　生石膏一两

【主治】瘟疫白喉，病已入里，证极危险者。

【加减】大便不闭，去芒消，加甘草一钱，大黄煎服。

【宜忌】方中芒消孕妇忌服。

奏

55669　奏凯和解饮

【方源】《救偏琐言·备用良方》。

【异名】木七（《痧症全书》卷下）、六十三号小过方（《杂病源流犀烛》卷二十一）。

【组成】金银花　土贝母　牛蒡子　山药　白扁豆　山楂　荆芥　当归各一钱　人参四分　甘草三分

【用法】水二钟，加核桃肉一个，莲肉六粒，煎七分，空心温服。

【功用】调理和解。

【主治】痘疮收痂，厚而滋润，寝食俱安者。

春

55670　春风散

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】僵蚕　黄连（俱锉）　朴消　白矾　青黛各五钱

【用法】腊月初一，取猪胆五六个，将上药装入胆内，缚定，用青纸裹，将地掘一方坑，长阔一尺，上用竹竿横吊，以胆悬定于内，候至立春日取出，置当风处吹干，去皮，以药研末，密收吹喉。

【主治】咽喉肿痛，缠喉风闭塞。

【备考】《理瀹》无青黛，有薄荷；朴消作"火消"。

55671　春水散

【方源】《医方类聚》卷七十引《烟霞圣效方》。

【组成】青盐　白矾　花碱　盆消　朴消各一两　黄丹二钱　绿豆粉二两　薄荷半斤（取霜）

【用法】将前五味取生姜自然汁一两和匀，于铁器内枯干，与他药同为细末。入龙脑少许，点之。

【功用】除昏退翳，截赤定疼。

【主治】目翳，赤眼。

55672　春冰散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】大黄（生）一两　盆消二两　薄荷　甘草（微炒）各三两

【用法】上为细末。每服二钱，食后新水一盏调服，入蜜少许亦可。

【主治】脾肺积热，咽喉赤肿疼痛。

55673　春冰散

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】枯矾　青盐各三钱　黄丹（水飞）二钱　雄黄二分　冰片三分　盆消（锅内煅

白)一两

【用法】上为极细末。点眼。

【功用】除瘀热。

【主治】风眼。

55674　**春和膏**

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】白芷　当归　木香　川附子　穿山甲　木通　防风　荆芥　番木鳖　白芥子　僵蚕　青皮　核桃各二两　川草乌各一两　生半夏三两　生军三两　南星三两　青葱四两　蒲公英三两

【用法】上切碎,用麻油十二斤浸三日,煎枯去渣,黄丹收膏,熔入松香五钱候冷,再加丁香四两,肉桂二两,琥珀一两,麝香三钱,为末。和匀收贮,用时摊贴之。

【主治】阴寒痰毒,乳疖。

55675　**春泽汤**

【方源】《普济方》卷一三三引《御药院方》。

【组成】泽泻三钱　猪苓三钱　赤茯苓　白术各二钱　官桂一钱　人参　柴胡　麦门冬各二钱

【用法】上㕮咀,依证如法修制。每服五钱,水一盏半,灯草二十根,同煎八分,去滓,空心服。

【主治】伤寒表里不解,发渴饮水,小便赤涩,阴阳不分,疑贰之间。

55676　**春泽汤**

【方源】《得效》卷二。

【组成】人参　白术　茯苓　泽泻　猪苓

【用法】水煎服。

【主治】伤暑烦渴,引饮无度,兼治伤寒温热,表里未解,烦渴引水,水入即吐,或小便不利。

【临证举例】水逆证　《中医杂志》(1983.1)马某某，女性，回族。患儿于半年前某日中午外出拾柴，劳累汗出，口渴难忍，回家后暴饮生冷水二瓢，自觉胃脘胀满，夜寐不安,半夜后吐出清稀痰涎半碗许始得安睡。第二天晨起即觉口干,渴欲饮水,水入则吐,半年来未见好转，亦未延医诊治。就诊时心下胀满，活动时，胃脘有振水声，呕吐清水后腹中肠鸣，漉漉有声，脘腹微痛，喜热恶冷，大便微溏，小便不利，四肢欠温。舌质淡，苔白腻水滑，脉弦滑稍缓，诊为水逆之证。治以温化，春泽汤增损治之。处方：桂枝 9 克，茯苓 9 克，炒白术 9 克，猪苓 9 克，泽泻 10 克，党参 6 克，生姜 6 克，代赭石 12 克（先煎)。每日一剂，水煎温服，连服五剂，药后呕吐止，诸症减轻，继进前方去代赭石十剂，后以六君子汤加味而竟全功。

【备考】《证治要诀类方》春泽汤,为五苓散加人参。

55677　**春泽汤**

【方源】《医钞类编》卷十。

【组成】人参　白术　茯苓　泽泻　猪苓　肉桂　甘草(炙)

【用法】加生姜、大枣,水煎服。

【主治】肠虚泄泻,小便不利。

55678　**春笋丹**

【方源】《痘疹仁端灵》卷十四。

【组成】春笋尖(晒干为末)五钱　雄鸡冠血(若少,多用鸡血亦可)　羊心血　猪尾血(三血合用以布盛阴干)二两一钱　老虾(打成饼,焙干)二两一钱　紫草三钱　老鹰爪三分　穿山甲(前爪)

【用法】上为末。每用一匙,如虚者,保元汤调下,热者,干汁汤调下,俱用鹿血三分服。

【主治】痘疮初起。

【备考】方中穿山甲用量原缺。

55679　**春容散**

【方源】《古今医鉴》卷九引黄宾江方。

【组成】白附子六钱　枯矾三钱　硫黄五钱　黑铅(炒枯)三钱　密陀僧二两　轻粉一钱　黄丹(飞过)一钱　麝香二分

【用法】上为末。先将冷水擦红处,湿后以末药擦之,不可擦破。

【主治】面上肺风疮。

【宜忌】忌酒色恼怒。

55680 春雪膏

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】蕤仁二钱(去皮,细研) 脑子一钱(别研) 杏仁十四个(去皮尖) 朴消(别研) 硼砂(别研)各半钱

【用法】上将蕤仁、杏仁研细,次入诸药研匀成膏子。每用一粟米许点之。

【主治】风毒气攻冲眼目,翳膜遮障,隐涩难开,或发肿痛,攀睛胬肉。

55681 春雪膏

【方源】《普济方》卷七十三引《卫生家宝》。

【组成】南硼砂二钱 脑子半钱 蕤仁(去壳)二钱

【用法】上研细烂,乳汁调成膏。以铜箸点之。

【功用】去翳膜。

【主治】赤眼,翳膜。

55682 春雪膏

【方源】《局方》类七(淳祐新添方)

【异名】蕤仁春雪膏(《原机启微》卷下)、春雪眼药膏(《吉人集验方》)。

【组成】脑子二钱半(研) 蕤仁(去皮壳,压去油)二两

【用法】用生蜜六钱,将蕤仁、脑子同和。每用铜箸或金银钗股,大小眦时复少许点之,治连眶赤烂,以油纸涂药贴。

【主治】肝经不足,内受风热,上攻眼目,昏暗痒痛,隐涩难开,昏眩赤肿,怕日羞明,不能远视,迎风流泪,多见黑花。

【备考】《医方一盘珠》有熊胆,无脑子。

55683 春雪膏

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【异名】玄明春雪膏(《医统》卷六十一)

【组成】硼砂三钱 脑子一钱 通明朴消半两

【用法】上为细末,入乳钵研,再用细绢罗过。每用小钱光弦者点津液,沾药末,入目中,闭霎时,令药匀,方开眼,泪出为度。

【主治】眼目赤肿,翳障羞明。

55684 春雪膏

【方源】《医学正传》卷五引东垣方。

【组成】朴消不拘多少。

【用法】上药置豆腐上蒸化,待流下,以瓷器盛之。点眼。

【主治】赤眼。

55685 春雪膏

【方源】《得效》卷十五。

【组成】寒水石 石膏 滑石 赭石 朴消各五钱 甘草三钱

【用法】上为末。每服二钱 井水调下。

【功用】凉心除烦。

【主治】热极壅盛,心热烦闷。

55686 春雪膏 《玉机微义》卷二十九。即《卫生宝鉴》卷十"加味春雪膏"。见该条。

55687 春雪膏

【方源】《永乐大典》卷一一四一三引《野夫多效方》。

【组成】好净蜜一斤 川黄连四两(于砂锅内加甜水三碗,慢火熬至一半,绢滤滓) 猪胆三个(取汁) 生姜四两(切细烂研,取汁) 轻粉一钱 南硼砂一钱 梅花脑子半钱 麝香半钱 蕤仁十个(去皮净,钵研如泥用) 斑蝥 芫青 红娘子各五个(肥大者,去头翅足,焙,研极细)

【用法】前四味,慢火熬一顿饭久,看稀稠得所,取下火来,候冷,入轻粉、蕤仁等五味研,再入斑蝥、红娘子等三味,同研千百遍,瓷盒内收。每用竹杖子或骨柱子点粟米大,夜卧用。

【主治】眼内翳膜遮障,瘀肉攀睛涩痛。

55688 春雪膏

【方源】《普济方》卷七十五。

【组成】脑子一钱 蕤仁二钱(去壳) 麝香半钱

【用法】上为极细末,用蜜相和。点眼中。

【主治】风赤眼。

55689 春雪膏

【方源】《普济方》卷七十八。

【组成】川黄连四两(洗净,用水三碗,煎至半碗,去滓,再用水一碗,煎至一盏,二者并作一处,慢火熬一小盏,用瓷器盛,不犯铁器)　豮猪胆一个(取汁)　生羌活一两(洗净,和皮捣取汁)　白砂蜜一斤　麝香　片脑　轻粉各半钱(细研)　乳香少许(细研)

【用法】前四味,滤过熬成膏,再入后四味,搅匀,瓷器盛贮。用时加入拨云膏。

【主治】眼生翳膜上星者。

55690　春雪膏

【方源】《普济方》卷八十六。

【组成】朴消十斤

【用法】上用水一桶,将消搅匀,入锅内煎,先下萝卜一个,同煮熟,又下二个萝卜,煮熟为度,同新绵铺上,在绢罗上滤过,再煎数沸,再滤过瓦盆内,明早去水,已结白牙子,却收猪胆汁,浇在消上,用猪胞或牛胞盛,扎定盒中,三七日取出,用生绢袋盛之,当风挂,却用脑子、麝香入之,随意研匀,入研器内密封。用灯心蘸药,点两眦头良。

【主治】眼疾。

55691　春雪膏

【方源】《医统》卷二十七。

【组成】真绿豆粉一斤　真薄荷叶六两(同豆粉和匀,安于密甑中,上以瓦盆盖密,勿令泄气,蒸一时,待冷取下)　沉香五钱(另研)　白硼砂五钱　冰片五分　砂仁五钱(另研)　真柿霜四两

【用法】上以瓷瓶收贮窨土地上,不时调白水细呷之。

【功用】豁痰开结。

【主治】五膈五噎。

55692　春雪膏

【方源】《惠直堂方》卷四。

【组成】白胶香(拣净为末,筛过)一两　蓖麻子仁(红壳者佳,捣极烂)四十九粒

【用法】上二味擦拌匀,入瓷碗内,上盖一小碗,用面糊封口,重汤煮三炷香收贮,用时以重汤烊化,乌金纸贴摊。

【功用】消肿止痛,又能使皮薄易溃,呼脓收口。

【主治】一切肿毒,疬串,无论已破未破。

55693　春雪膏

【方源】《集验良方》卷四。

【组成】蕤仁(去心膜油极净)四两　冰片一钱　芦甘石(用黄柏、黄连、栀子煎浓汁,倾银罐内,将甘石煅红,入汁内七次)一两

【用法】先将蕤仁研细,再入冰片研之,又入芦甘石,再研半日,收贮点眼。

【主治】眼目红赤羞明,沙涩痛痒。

55694　春盘面

【方源】《饮膳正要》卷一。

【组成】白面六斤(切细面)　羊肉二脚子(煮熟,切条道乞马)　羊肚、肺各一个(煮熟切)　鸡子五个(煎作饼,裁旛)　生姜四两(切)　韭黄半斤　蘑菇四两　合子菜　蓼芽　胭脂

【用法】上用清汁下胡椒一两,盐、醋调和。

【功用】补中益气。

【备考】方中后三味药用量原缺。

55695　春温汤

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】人参　巴戟天　白术　杜仲各五钱　肉桂一钱　菟丝子五钱　破故纸三钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人下身冰冷,非火不暖,交感之时,阴中无温热之感。

55696　春雷丸

《理瀹》。为《集验良方》卷二"三阴春雷丸"之异名。见该条。

55697　春蕨散

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】新生蕨菜不拘多少

【用法】阴干为细散。每服三钱匕,空心陈米饮调下。

【主治】产后痢疾。

55698　春风一醉散

【方源】《医方类聚》卷七十引《烟霞圣效

方》。

【组成】汉防已 草龙胆 当归(去芦头) 赤芍药各等分 木通减半(去粗皮)

【用法】上为细末。每服三钱,临卧用温酒一大盏送服。

【主治】赤眼暴发,疼痛不可忍者。

55699 春疫五仙膏

【方源】《理瀹》。

【组成】姜 葱 蒜各一斤,大黄八两 皂角四两

【用法】麻油熬黄丹,收滑石六两,搅匀贴。

【主治】春疫。

55700 春雪眼药膏

《吉人集验方》。为《局方》卷七(淳祐新添方)"春雪膏"之异名。见该条。

55701 春季补肾肾沥汤

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】牛膝一两(去苗) 人参三分(去芦头) 五味子三分 白茯苓三分 附子一两(炮裂,去皮脐) 熟干地黄一两 续断三分 覆盆子三分 狗脊三分 防风三分(去芦头) 磁石一两(捣碎,水淘去赤汁,以绵绢包之) 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服五钱,以水一大盏,用羊肾一对,切去脂膜,人生姜半分,大枣三个,每与磁石包子同煎至五分,去滓,食前温服。

【主治】肾虚。

【宜忌】春季宜用。

垣

55702 垣衣散

【方源】《圣惠》卷四十一。

【组成】垣衣五合(晒干,捣罗为末) 铁精一合 合欢木灰二两 水萍末一合

【用法】上药相和,为极细末。旋以生油调如膏。涂于不生处,日夜再涂,即生。

【主治】眉发髭不生。

【备考】本方方名,《普济方》引作"生发墙衣散"。

垢

55703 垢腻散

【方源】《医方类聚》卷一六五引《急救仙方》。

【组成】梳齿内垢腻不拘多少。

【用法】食之。即吐恶物。

【主治】蛊毒。

柑

55704 柑仁散

【方源】《洞天奥旨》卷六。

【组成】柑子核

【用法】每岁一粒,以阴阳瓦焙干枯,为末。热陈酒送下。即盖被出汗而愈。

【主治】妇人里外吹乳。

55705 柑皮汤

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】柑子皮(焙干)

【用法】上为末。每服三钱,白汤调下。

【主治】产后发渴,及经血过多,发渴者。

55706 柑皮散

《寿亲养老》卷四。为《圣济总录》卷一四六"柑皮煮散"之异名。见该条。

55707 柑皮煮散

【方源】《圣济总录》卷一四六。

【异名】柑皮散(《寿亲养老》卷四)、柑皮煎散(《普济方》卷二五三)。

【组成】柑子皮二两(洗,焙干)

【用法】上为散。每服三钱匕,水一盏,煎三五沸,温服;或人少量盐末,沸汤点服。末效再服。

【主治】酒毒昏闷烦渴,或醉不醒。

55708 柑皮煎散 《普济方》卷二五三。为《圣济总录》卷一四六"柑皮煮散"之异名。见该条。

55709 柑叶定痛散

【方源】《点点经》卷一。

【组成】柑子叶四两 葱白根三两 生姜片二两

【用法】上共捣烂如泥,用锅烙热,铺盖痛处,白布裹紧,将盐炒热,包烙。痛立止。随服异功散。

【主治】酒病初发,形如感冒,被医误治,三焦受伤,死血凝结不化作痛,滞注胸膈,大痛不移。

枯

55710 枯药

【方源】《魏氏家藏方》卷七引《李防御五痔方》。

【异名】独圣散(《普济方》卷二九六)、枯痔散(《外科十三方考》)。

【组成】好白矾四两 生砒二钱半 朱砂一钱(生研,令十分细)

【用法】上为细末,将生砒安在建盏中,次用白矾末盖之,用火煅令烟绝,其砒尽随烟去,只是借砒气于白矾中,将枯矾取出,研为细末,须是研令十分细。先看痔头大小,将所煅白矾末抄在手掌心上,入生朱末少许,二味作一处,以口津唾就掌心调令稀稠得所,用篦子涂在痔上,周遭令遍,一日上三次。须仔细看痔头颜色,只要色转焦黑,乃是取落之渐,至夜自有黄膏水流出,以布帛衬之,水尽多为妙,乃是恶毒之水,切勿它疑,至中夜更上药一遍,至来日依旧上药三次。纵有些小疼痛不妨。换药时用粗碗一只,盛新水或温汤在痔侧,以羊毛笔一管轻手刷洗痔上,去了旧药,却上新药,仍用护药,次用荆芥汤洗之。三两日之后,黄膏水流出将尽,痔头焦黑为度,以篦子敲打痔头,见得渐渐坚硬黑色,却于枯药中增添生朱,减退白矾,自然药力慢缓。须用药三两日以后方可增减,且以日子渐渐取之庶不惊人,全在用药人看痔头转色,增减厚薄敷药,方是活法。

【功用】枯痔。

【主治】痔疮。

【备考】此药只是借用砒气,又有朱砂在内少解砒毒,所以不甚疼痛者,盖非专用毒药也。

55711 枯药

【方源】方出《医学纲目》卷二十七,名见《医部全录》卷二〇八。

【组成】赤脚蜈蚣一条(香油煎酥,纸上挹干) 乳香二钱 没药二钱 麝香 粉霜各五分 人指甲五钱

【用法】上除麝香另研,余俱用泥裹煨干为末。以鹅毛管盛药吹患处。如有水,即时出尽,不疼,其物结一硬丁,用线系在上揭落之。

【功用】枯痔。

【主治】痔。

55712 枯矾散

【方源】《普济方》卷二九九引《海上方》。

【组成】黄连七个 玄胡索七个 飞矾一块(如钱大)

【用法】上为细末。搽口上。

【主治】口疮。

55713 枯矾散

【方源】《济生》卷八。

【组成】白矾(枯)半钱 脑子一字(别研)

【用法】上为末。先用鱼腥草煎汤,放温洗痔,次用药少许掺患处。

【主治】五痔,痒多痛少,或脓或胀,或漏血不止。

55714 枯矾散

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】烧枣子(存性) 枯白矾

【用法】上为末。干用油调,湿则干敷。如不效,再加五倍子(存性)、青黛。

【主治】疳疮。

55715 枯矾散

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】黄柏末 枯矾末

【用法】和匀。干掺疮上。

【主治】疳、臁疮。

55716 枯矾散

【方源】《普济方》卷三六〇。

【异名】白龙骨散。

【组成】白矾（煅） 白龙骨各等分

【用法】上为末。每用少许敷之。

【主治】婴儿因剪脐，风伤于外，致脐疮不干。

55717 **枯矾散**

【方源】《赤水玄珠》卷十六。

【组成】枯矾

【用法】上为末。每服一钱，生姜汤调下。吐之立愈。

【主治】痰晕。

55718 **枯矾散**

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】枯矾五钱 石膏（煅） 轻粉 黄丹各三钱

【用法】上为末。温汤洗净患处，搽药。

【主治】妇人三阳风湿下流，凝结不散，脚丫作痒，湿烂；或足底弯曲之处痒湿。

55719 **枯矾散**

【方源】《灵验良方汇编》卷一。

【组成】枯矾 龙骨各二钱 黄丹一钱半 麝香一分 干胭脂七分

【用法】上为细末。先以棉签拭去脓，后以鹅毛管盛药放入耳中。如无干胭脂，只用上四味亦可。

【主治】聤耳流脓。

55720 **枯矾散**

【方源】《经验方》卷下。

【组成】臭花娘子草根（水浸一宿，捣汁）

【用法】以枯白矾研细，入汁内，晒干，再取汁如前，数次其矾色绿，研细收贮。烂喉痧每服五分，开水冲下，庶可出痰；如症重者，须连服下七次，以呕痰为度，立见消肿；凡遇喉风，吹喉取吐亦可。

【主治】烂喉痧。

55721 **枯矾散**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】枯矾一钱 制僵蚕一钱 硼砂三分 薄荷三分 大梅片一分 雄精一钱 胆矾一分 山豆根二分 苦甘草一分

【用法】上为散，加麝香少许。吹之。

【功用】开痰闭。

【主治】一切风火喉症。

55722 **枯骨丸**

《普济方》卷一八九引《指南方》。为《素问》卷十一“四乌鲗骨一藘茹丸”之异名。见该条。

55723 **枯桑膏**

【方源】《济急丹方》卷上。

【组成】经霜桑叶十余斤（在树枯者更妙）

【用法】刷去叶上虫窠鸟粪，以清水洗过，置锅水煎，渐干渐加，至半日沥汁，去叶再熬半日，量加白蜜收膏。每服三钱，白滚汤送下。

【主治】瘫痪。

【临床举例】瘫痪 吾乡史扶九翁，瘫痪有年，不能举步，忽得老人授此方，服后日行数里。

55724 **枯痔方**

【方源】《医宗说约》卷六。

【组成】明矾四两 白砒四钱 轻粉三钱 朱砂二钱

【用法】先将矾入铜杓内煅滚，次入砒末搅匀，以矾枯为度，去火毒片时，次入轻、砂，再研极细，瓷罐收贮。每日辰午申三时以温汤洗净，四边须先用护痔散护住好肉，再以唾津调药末涂痔上。七八日自然枯尽，方上生肌散。

【主治】痔疮翻出。

55725 **枯痔方**

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】金色密陀僧五两 生矾一两 枯矾一两

【用法】另用黄占三两，麻油三两，化开入前药末搅匀，众手为丸，如梧桐子大，雄黄五钱，青黛二钱为衣。每服八分，再加二分，渐加至二钱，白汤送下。其痔结成一块，从大便而下。

【主治】痔漏。

55726 **枯痔疗**

【方源】《中医外科学》。

【组成】红砒　明矾　朱砂　雄黄　没药

【用法】第一步：取红砒 0.3 克、明矾 0.6 克（捣碎），混合均匀后，置瓦壶内，四面用炭火烘，火力须猛，约烧 2～3 小时（黑烟消逝，白烟出现即可）将瓦壶取出，待冷却后，即可得雪白的明矾与砒的化合物。第二步：①明矾与砒的化合物 4 份，朱砂 1 份，雄黄 2 份，没药半份。②米饭（干米计算）8 份（煮成糊状）。把①项的四种成分先混合，捣碎，研成均匀粉末，并取出一成，与②项的米糊二成混合调匀，如太干可和开水，至可能搓成铁钉状的药锭，经过阴干或烘干，即可使用。在距齿线上 0.3～0.5 厘米处，沿肠壁纵轴成 25°～35°方向旋转插入粘膜下痔核中心，一般深约 1 厘米，插钉多少，按痔核大小而定，一般每痔 1 次插 4～6 根，间距 0.3～0.5 厘米，应使钉外露 1 毫米，才能保持固定和防止插口出血。

【功用】腐蚀痔核。

【主治】痔疮。

55727　枯痔药

【方源】《外科百效》卷三。

【组成】白砒二钱（为末）　白矾五钱（为末）

【用法】二味入铁杓内，先入白矾末一钱，又放砒一钱于正中，又放白矾一钱，砒一钱，白矾盖面，将慢火熬至烟净，出火毒，入后药：儿茶一钱，血竭五分，蛇含石一钱（火煅，醋淬），芫花二分、朱砂五分，雄黄、硼砂各一钱，乳香、没药各五分（焙，去油），轻粉五分、炉甘石一钱（醋淬）。上为极细末，合五分之一，用液津调开，捏作薄饼子，阴干，听用。

【主治】痔疮。

【备考】本方方名，《外科十三方考》引作“枯痔散”。

55728　枯痔药

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】明矾一两　红砒　白砒各三钱

【用法】共入阳城罐内，外围炭火，烧至矾熔烟起，即砒毒，忌立上风闻气，俟烟尽矾枯去炭，次日取出研粉。每取一钱，加水飞朱砂一分，再研和匀，临用以津调药，时拂乃愈。

【主治】痔漏。

55729　枯痔液

【方源】《中医外科学》。

【组成】明矾（硫酸铝钾）6 克　石炭酸（酚）1 克　黄连 2 克　普鲁卡因 1 克　枸橼酸钠 1.5 克　甘油 20 毫升　蒸馏水加至 100 毫升

【用法】(1)将黄连用蒸馏水洗净，煎熬三次合并过滤备用，得溶液①；(2)将酚溶液加于甘油中得溶液②；(3)取适量的蒸馏水加热将明矾溶于水中，再加入枸橼酸钠及普鲁卡因，得溶液③；(4)将溶液②缓缓不断加热搅拌下加入溶液③，得溶液④；(5)最后将溶液①与④合并，加蒸馏水至全量过滤，再用 3 号玻璃球滤过，装瓶封口，普通蒸气消毒 30 分钟备用，溶液应呈金黄色透明液体，pH3.5。将药注射于痔核内。

【功用】使内痔硬化或坏死脱落。

【主治】痔疮。

55730　枯痔散

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】白矾二两　蟾酥二钱　轻粉四钱　砒霜一两　天灵盖（青盐水浸，煅赤，清水内淬七次）四钱

【用法】上为极细末，入小新铁锅内，上用瓷碗密盖，盐泥封固，炭火煅至二炷香，待冷取药，研极细末，铅罐收贮。每日上午葱汤洗净，用津唾调捻如钱厚，贴痔上令著，以薄绵纸接软掩上，搽束其药，不使侵好肉上；若内痔，至晚再换一次。至六七日，其痔枯黑坚硬住药，待其裂缝自落，换落痔汤洗之。

【功效】枯痔。

【主治】痔疮突出。

55731　枯痔散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】红砒不拘多少（放旧瓦上火煅，白烟将尽取起） 枯矾各一钱 乌梅（烧存性）二钱（一加白灵药五分）

【用法】上为极细末。用时以口津湿手指，蘸药于痔头、痔身上搓撚，一日二次。初敷不肿，五六日出臭水，出尽，其痔干枯，不用上药。轻者七八日全愈，重者半月收功。

【主治】痔漏。

55732 枯痔散

【方源】《疡科捷径》卷中。

【组成】鳖头一个（漂净，酥炙，研为细末，每四钱加白砒一两） 白矾二两 轻粉四钱 净蟾酥二钱

【用法】上为细末，用小铁锅一只，入药在内，上用碗盖，碱泥封固，炭火煅三柱香为度，研末。每日辰、午、申三时上药三次。七八日其疮自落，后用玉红膏、生肌散长肉收功。

【功用】枯痔。

【主治】痔疮。

55733 枯痔散

【方源】《验方新编》卷七。

【组成】红砒（放旧瓦上火煅，白烟将尽取起，净末）一钱 枯矾二钱 真乌梅肉（烧存性）二钱 朱砂（飞净）三分

【用法】上为极细末。用时以口浸湿手指，蘸药于痔头痔身上搓撚，一日三次。初敷不肿，五六日出臭水，出尽，其痔干枯，不用上药，轻者七八日全愈，重者半月收功。

【主治】诸痔。

55734 枯痔散

【方源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】明矾一两 白砒三钱

【用法】上为细末，入阳城罐内，外围炭火，炼至烟起，烟即砒毒，人不可闻，候烟尽，矾枯去炭，次日取研至无声为度。四围搽之，不可使药流入中孔，致令大痛。

【主治】痔疮。

55735 枯痔散

【方源】《疡科纲要》。

【组成】砒霜一两 生白矾二两 轻粉四钱 蟾酥二钱

【用法】先将砒、矾入铁锅中，以碗盖密，煅二炷香时，冷定取药细研，另研轻粉，蟾酥和匀用之。

【功用】蚀恶肉。

【主治】痔漏，恶疮，顽肉死肌，腐不脱者。

55736 枯痔散

《外科十三方考》。为《魏氏家藏方》卷七引《李防御五痔方》“枯药”之异名。见该条。

55737 枯痔散

《外科十三方考》。即《外科发挥》卷八“如神千金方”。见该条。

55738 枯痔散

《外科十三方考》。为《医部全录》卷二〇八引刘河间方“法制枯药”之异名。见该条。

55739 枯痔散

《外科十三方考》。为《准绳·杂病》卷六“周先生枯痔法”之异名。见该条。

55740 枯痔散

【方源】《外科十三方考》。

【组成】白砒三钱 白矾一两 白番卤三钱

【用法】上为末，入紫泥罐内，将盐泥封固罐口，以炭火煅红，视其青烟已尽，白烟将起，上下红彻时，将罐取下，放于地上一夜，将药取出，研末备用。

【主治】痔瘘。

55741 枯痔散

【方源】《外科十三方考》引黄济川方。

【组成】白砒五钱 白矾一两五钱 硼砂二钱 雄黄二钱 硫黄二钱

【用法】上为末。以砂罐一只，先将前四昧放入罐中，封固扎好，架于炉上烧之，视其青烟已尽，白烟刚起时，用箸于封口纸上戳一豆大之孔，将硫黄从孔中倾入罐中，看纸上挂牌时，即为火候适度之徵，将罐移开火炉，冷后取药，研末备用。

【主治】痔瘘。

55742　枯痔散

【方源】《外科十三方考》引周伯纯方。

【组成】白砒一两　枯矾五钱　明雄一两　倭硫黄五钱

【用法】先将前三味入砂锅内，用泥固罐口，中开一孔，以火煅之，待孔中烟尽时，加入硫黄，如前封之，再煅至烟尽，取出研末备用。用时以蜂蜜调涂痔上，一日三次。黄水出尽，其核自落。

【主治】痔瘘。

55743　枯痔散

【方源】《外科十三方考》引林梦九方。

【组成】白砒五钱　白矾二两　雄黄一钱　炉甘石二钱　冰片五分

【用法】先将砒、矾研末，放入干燥砂罐底部铺平，次加炉甘石末，再加雄黄于其上，每次加药，必须铺平，最后将罐口用皮纸密封，放在杠炭火上煅之，即可见浓烟透过皮纸冒出，待无烟时，将罐取放地上，俟冷却后，取出药物，同冰片研末备用。用时将需要药末，加入适量清水调和，使成糊状，涂于痔核之上。黄水流尽，痔核即落。

【主治】痔瘘。

55744　枯痔散

【方源】《外科十三方考》引陈庆华方。

【组成】白砒二两　白矾二斤　食盐一两　雄黄一两　百草霜一两　冰片四两

【用法】先将前四味入罐煅过，取出，同后二味研末备用。

【主治】痔瘘。

55745　枯痔散

《外科十三方考》。即《外科百效》卷三"枯痔药"。见该条。

55746　枯瘤方

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【异名】一井散(《杂病源流犀烛》卷二十六)。

【组成】硇砂　粉霜　雄黄各二钱　轻粉　没药　乳香各一钱　土黄三钱　麝香少许

【用法】上为细末。以津调涂瘤顶外边歇一韭叶，先花纸贴之，上以小黄膏贴之。

【主治】瘤。

【备考】土黄：《杂病源流犀烛》：土黄乃造作所成。方用信石二两，木鳖仁二钱，去油巴豆五钱，硇砂二钱。各研为末，和匀，以石脑酒和成一块，油纸包裹，埋于地坑四十九日，取出劈作小块，瓷器装，听用。

55747　枯瘤方

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】砒　硇砂　黄丹　雄黄　粉霜　轻粉各一钱　斑蝥二十个(生用)　朱砂一钱　乳香三钱　没药一钱

【用法】上为末，粥糊为丸，捏作棋子样，晒干。先灸破瘤顶，三炷为则，上以疮药饼盖上，用黄柏末，以水调贴之。数日自然干枯落下。

【主治】瘤。

55748　枯瘤方

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】白砒　硇砂　黄丹　轻粉　雄黄　乳香　没药　硼砂各一钱　斑蝥二十个　田螺(大者，去壳)三枚(晒干，切片)

【用法】上为极细末，糯米粥调安，捏作小棋子样，晒干。先灸瘤顶三炷，以药饼贴之，上用黄柏末水调盖敷药饼。候十日外其瘤自然枯落。次用敛口药。

【主治】瘤初起成形未破者，及根蒂小而不散者。

55749　枯瘤散

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】灰苋菜(即藜藿，晒干，烧灰)半碗　荞麦(烧灰)半碗　风化石灰一碗

【用法】三味和一处，淋汁三碗，慢火熬成霜，取下配后药：番木鳖三个(捣去油)，巴豆六十粒(捣去油)，胡椒十九粒(擦去粗皮)，明雄一钱，入言一钱。上为末，入前药和匀，以瓷瓶收贮，不可见风。以滴醋调匀，用新羊毛笔蘸药点瘤当头，瘤有碗大，则点药如龙眼核大，若茶杯大，则点药如黄豆大，干则频频点

之。其瘤干枯自落。如血瘤破，以发灰掺之，粉瘤破，以白麻皮烧灰掺之，外以膏护好。

【功用】敛口收功。

【主治】血瘤、粉瘤

55750 枯瘤膏

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【异名】枯瘤子药(《普济方》卷二九四)。

【组成】草乌半斤 川乌四两 干桑耳 桑朽木各三两 细白石灰三碗(陈者) 桑柴灰二碗

【用法】上药烧令存性，同二灰研匀，用水一桶淋汁，如法熬成膏。敷之。

【主治】瘤。

55751 枯瘤膏

【方源】方出《得效》卷十九，名见《仙拈集》卷四。

【组成】甘草

【用法】煎膏。笔蘸涂瘤傍四围，干后复涂，共三次；然后以大戟、芫花、甘遂等分为末，醋调，别笔涂敷其中。不得近著甘草处。次日缩小，又以甘草膏小晕三次，中间仍用大戟、芫花、甘遂如前法，自然焦缩。

【主治】小瘤。

55752 枯瘤膏

【方源】《准绳·疡科》卷五。

【组成】草乌四两 川乌二两 干桑耳 桑朽木各一两半 矿石灰 桑柴灰 荞麦秸灰各一碗

【用法】上将草乌、川乌、桑耳、桑朽木共烧成灰，和矿石灰、桑柴灰、荞麦秸灰一处，装人酒漏内，以棕塞其漏窍，用水一斗煎滚淋汁，慢火熬浓，以十碗取一碗为度，以厚实瓷器收贮，密封固。如用，入矿石灰调匀为糊，点瘤顶上，以湿纸数重贴药上，如若未干不须贴，若留久药干，以唾调涂。直待十分黑腐，以刀剪刮取之，腐肉未尽，又点又刮，如怕剪刮者，却用井金散点之，以渐腐烂自去，不用针刀，后却以膏药贴之，去尽腐肉为度。

【主治】六瘤、瘰、疬、痔漏。

55753 枯瘤子药

《普济方》卷二九四。为《卫生宝鉴》卷十三“枯瘤膏”之异名。见该条。

55754 枯后生肌散

【方源】《外科集腋》卷三。

【组成】血竭 轻粉 龙骨 象皮 海螵蛸 乳香各一钱

【用法】上为末，用煮熟鸡蛋黄十五个，熬油一小钟，调匀。患处用甘草汤洗净，鸡羽扫上，以膏盖之。

【主治】瘿瘤枯后。

55755 枯矾龙骨散

【方源】《疡科捷径》卷下。

【组成】龙骨二钱 枯矾一钱 麝香一分

【用法】上为细末。掺之。

【主治】小儿脐风。

55756 枯热清心散

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】寒水石一两 黄连二两 辰砂三分

【用法】上为末。每服二钱，浓煎甘草汤调下。

【主治】伤寒日久郁热，谵语狂乱。

55757 枯痔水澄膏

《景岳全书》卷六十四。为《魏氏家藏方》卷七引《李防御五痔方》“水澄膏”之异名。见该条。

55758 枯痔宽肠方

【方源】《济阳纲目》卷九十五。

【组成】大黄(湿纸煨) 枳壳(去瓤，炒) 当归(酒洗)各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，好酒或白汤吞下。

【功用】宽大肠，使大便软滑，不与痔相碍。

【主治】痔漏。

55759 枯草慈菇化毒丸

【方源】《疬科全书》。

【组成】夏枯草五两 川贝母(去心) 山慈菇(去皮毛) 蒲公英 广陈皮 全蝎 枳

壳桔梗　栀子　白芷　半夏　柴胡　金银花各二两　沉香　生甘草　杜胆星各一两

【用法】上为末，米糊为丸，如绿豆大。每服三钱，早、晚饭后淡盐汤送下。

【主治】花柳病。

柘

55760　柘根酒

《普济方》卷五十四。即方出《千金》卷六，名见《圣惠》卷三十六"铁浆酒"。见该条。

55761　柘根煎

【方源】《普济方》卷三六五。

【组成】柘根弓

【用法】以水五升，煮取二升，去滓更煎，取五合。细细敷之，数数为之。

【主治】小儿心热，口内生疮，重舌、鹅口及燕口者。

55762　柘黄汤

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】柘黄　枳壳(去瓤，麸炒)　白术　地丁各一两半　黄耆(锉)　人参　款冬花　桔梗(炒)各二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后血风，通身浮肿。

相

55763　相传丸

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】天门冬(去心，焙)　麦门冬(去心，焙)　贝母(去心，焙)　紫菀(去土)　百合　桔梗(炒)　人参　杏仁(汤浸，去皮尖双仁，炒)　生干地黄(焙)　桂(去粗皮)　半夏(汤煮软，切，焙干)　甘草(炙)　阿胶(炒至沸)　陈橘皮(汤浸，去白)各三两

【用法】上为末。煮糯米粉，并黄蜡一两成粥，更人蜜再熬匀，和前药为丸，如樱桃大。每服一丸，用生姜细嚼送下，嗽时服。

【主治】肺寒外内合邪，停饮寒痰，咳嗽，语声不出，口中如含霜雪，咽喉妨闷，状若梅核，噎塞不通，膈气痞气；及咳嗽脓血。

55764　相传汤

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】五味子　芍药各一两　半夏　细辛　紫苑　杏仁　桂各三分　甘草一分　人参半两

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盏，生姜三片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺气不足，寒邪外乘，咳嗽多痰，肢体疼倦，恶寒发热，呕逆恶心，鼻塞清涕，咽干喘满。

55765　相思丸

【方源】《圣惠》卷五十六。

【组成】相思子一个　蓖麻子一个　巴豆一个(去皮心)　朱砂末一字　蜡一分

【用法】上药合捣令熟。先取麻子许大含之，即以灰围患人前头，旋吐药于灰中，吐尽即止。

【主治】猫鬼。眼见猫狸，杂有所闻，心腹刺痛。

枳

55766　枳子汤

【方源】《医心方》卷九引《僧深方》。

【组成】陈枳子一个　美豉一升　茱萸五合(去目，末)

【用法】枳、茱合研为散。以水二升半，煮豉三四沸，滤去滓，汁着铜器中，纳散如鸡子大，搅和合，顿服之，羸人再服。

【主治】反胃吐逆，不能安谷。

55767　枳巴丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】枳壳(去瓤，每两片入巴豆去壳者一粒，合在内，以线扎定，用米醋煮软烂黑色，去巴豆，锉碎，焙干)。

【用法】上为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，腊茶汤送下，不拘时候。疾作服之，不宜多服。

【主治】酒食所伤，遂成痔疾，发则便血。

55768 **枳术丸**

【方源】《内外伤辨》卷下引张洁古方。

【组成】白术二两　枳实（麸炒黄色，去瓤）一两

【用法】上为极细末，荷叶裹烧饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸，用白汤送下，不拘时候。

【功用】①《内外伤辨》：治痞，消食，强胃。②《中国药典》一部：健脾消食，行气化湿。

【主治】①《普济方》：老幼虚弱，食不消，脏腑软，气不下降，胸膈满闷。②《金鉴》：胃虚，湿热饮食壅滞，心下痞闷。

【方论选录】白术苦甘温，其甘温补脾胃之元气，其苦味除胃中之湿热，利腰脐间血，本意不取其食速化，但令人胃气强实，不复伤也；枳实味苦寒，泄心下痞闷，消化胃中所伤，是先补其虚，而后化其滞，则不峻利也；荷叶色青形空，食药感此气之化，胃气何由不上升乎？更以烧饭和药，与白术协力，滋养谷气，而补令胃厚，再不至内伤，其利广大也。

【备考】本方方名，《北京市中药成方选集》引作“二味枳术丸”。

55769 **枳术丸**

【方源】《女科万金方》卷五。

【组成】枳实　木香各一两　白术　砂仁各二两

【用法】薄荷汤煮饭为丸。滚汤送下。

【主治】妇人呕吐，因宿食种下病根，每遇食厚物即发，气多，脾胃不和者。

55770 **枳术丸**

《医方类聚》卷一〇四引《经验秘方》。为原书同卷“养胃枳壳丸”之异名。见该条。

55771 **枳术丸**

《普济方》卷一九二。即《保命集》卷中“枳实丸”。见该条。

55772 **枳术丸**

【方源】《丹溪治法心要》卷四。

【组成】白术二两　枳实一两　半夏一两　神曲一两　麦芽一两　山楂一两　姜黄五钱　陈皮五钱　木香二钱半

【用法】上为末，荷叶饭为丸服。

【主治】痞，心下满而不痛者。

55773 **枳术丸**

【方源】《文堂集验方》卷一。

【组成】白术（面炒）　赤芍（酒炒）各二两　枳实（面炒）一两　广皮一两

【用法】用新荷叶汤，煮老黄米为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，或百丸，以米饮送下。

【主治】食积泻，或胀或痛，痛甚而泻，泻后痛减，得食又痛，粪色白者。

【加减】如体寒，加干姜（炒黄）五七钱，同为丸。

55774 **枳术汤**

【方源】《金匮》卷中。

【异名】枳实白术汤（《外台》卷八引《备急》）、枳实汤（《产育宝庆集》卷上）、白术汤（《准绳·女科》卷五）。

【组成】枳实七个　白术二两

【用法】以水五升，煮取三升，分三次温服。腹中软即当散也。

【主治】心下坚大如盘，边如旋盘，水饮所作。

【宜忌】忌桃、李、雀肉等物。

【方论选录】①《金匮玉函经二注》：心下，胃土脘也，胃气弱，则所饮之水，入而不消，痞结而坚，必强其胃，乃可消痞。白术健脾强胃，枳实善消心下痞，逐停水，散滞血。②《金鉴》：上脘结硬如盘，边旋如杯，谓时大时小，水气所作，非有形食滞也。用枳实以破结气，白术以除水湿，温服三服，则腹软结开而硬消矣。此方君枳实，是以泻为主也。然一缓一急，一补一泻，其用不同，只此多寡转换之间耳。

55775 **枳术汤**

【方源】《济生》卷四。

【组成】肉桂（去皮，不见火）三分　附子（炮，去皮脐）　细辛（洗，去土叶）　白术各一两　桔梗（去芦，锉，炒）　槟榔　甘草（炙）各

三分 枳实(面炒)二分。

【用法】上㕮咀。每服四钱,水一盏半,加生姜七片,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】饮癖气分,心下坚硬如杯,水饮不下。

55776 **枳术汤**

【方源】《云岐子脉诀》。

【组成】白术一两 枳实(麸炒) 甘草各半两。

【用法】上㕮咀。每服半两,加生姜七片,水煎,食后温服。

【主治】脉缓,四肢烦满,气促不安。

55777 **枳术汤**

【方源】《明医指掌》卷九。

【组成】木香六分 陈皮八分 槟榔八分 桔梗七分 枳壳(炒)八分 白术(炒)三分 紫苏叶六分 五灵脂(炒)一钱 肉桂五分 半夏(姜制)七分 白茯苓六分 甘草五分

【用法】上锉一剂。水二钟,加生姜三片,煎八分,空心服。

【主治】孕妇饮食过度,致伤胃气,胸膈膨胀。

55778 **枳术汤**

【方源】《金鉴》卷四十八。

【组成】枳实(炒)二两 白术(土炒)二两

【用法】加生姜,水煎服。

【主治】因素有水饮,产后轻虚浮肿,心胸胀满,名曰气分者。

55779 **枳术散**

【方源】《古今医鉴》卷六。

【组成】枳实(麸炒)三钱 白术(土炒)三钱

【用法】上锉一剂。用水二钟,煎至一钟,温服。

【主治】心下窄狭不快。

55780 **枳叶酒**

【方源】《医统》卷五十九。

【组成】枳叶六十斤

【用法】上细锉。以水四石,煮取四斗九升,以酿五斗米,如常法,另煮枳叶汁,渍米并和酿,封七日,酒出。饮之。

【主治】岭南脚气,从足至胫肿满,连骨痛者。

55781 **枳皮酒**

【方源】方出《肘后方》卷三,名见《得效》卷十三。

【组成】枳树皮一升

【用法】上细切。以酒一升,渍一宿,每服五合至一升。酒尽更作。

【主治】中风,身体强直,不得屈伸,反复者。

55782 **枳朴汤**

【方源】《古今医彻》卷一。

【组成】枳壳(麸炒) 厚朴(姜汁炒) 桔梗 柴胡 广皮各一钱 山楂 葛根各一钱五分 甘草二分(炙)

【用法】加砂仁、生姜,水煎服。

【主治】伤寒传里,发热口干,胸满烦躁,甚则谵语揭衣,里实者。

【加减】如寒未除,加紫苏一钱;伤面食,加卜子一钱;邪在下,加青皮、枳实各一钱,去枳壳,服四五剂;邪已变化,如未大便,用猪胆或蜜煎导之。

55783 **枳芎散**

【方源】《医方大全》卷五引《济生》。

【组成】枳实(炒) 川芎各半两,粉草(炙)二钱半。

【用法】上为末。每服二钱,以生姜、大枣汤调下,酒亦可。

【主治】左胁刺痛,不可忍者。

55784 **枳芎散**

【方源】《金鉴》卷四十三。

【组成】枳壳 抚芎 郁金 甘草

【主治】瘀血轻之左胁痛。

55785 **枳壳丸**

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】枳壳一两(麸炒微黄,去瓤) 丹参半两 赤茯苓一两 川升麻一两 黄耆一两

（锉） 防风三分（去芦头） 羌活一两 人参一两（去芦头） 羚羊角屑二分 薏苡仁二两 桂心一两 生干地黄二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，薄荷汤送下，不拘时候。

【主治】偏风不遂，心神烦闷，言语謇涩。

【宜忌】忌生冷、油腻、猪、鸡肉。

55786 枳壳丸

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 葳蕤三分 玄参三分 蔓荆子三分 防风三分（去芦头） 麦门冬一两半（去心，焙） 沙参三分（去芦头） 羚羊角屑半两 栀子仁三分 地骨皮三分 赤芍药半两 甘菊花半两 大麻仁一两 川大黄一两（锉碎，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以温浆水送下，不拘时候。

【主治】热毒风，心神烦躁，头目眩晕，大肠壅滞。

【宜忌】忌炙爆、热酒、猪肉。

55787 枳壳丸

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】枳壳三两（麸炒微黄，去瓤） 天门冬一两半（去心，焙） 独活一两半 白蒺藜一两半（微炒，去刺） 牛蒡子一两 薏苡仁一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后以温水送下。

【主治】风热，头面皮肤瘙痒，烦闷，生瘖瘰。

55788 枳壳丸

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】枳壳一两半（麸炒微黄） 天门冬一两半（去心，焙） 独活一两 黄连一两（去须） 防风一两（去芦头） 白蒺藜一两（微炒，去刺） 乌蛇二两（酒浸，去皮骨，炙微黄） 苦参一两（锉） 菌桂一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温水送下，不拘时候。

【主治】热毒风冲头面，痒如虫行。

55789 枳壳丸

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 木香一两 槟榔一两 麦门冬一两半（去心，焙） 羚羊角屑一两 赤芍药一两 赤茯苓二两 前胡二两（去芦头）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】膈气胀满，吃食妨闷，脚手烦疼，渐加羸瘦，四肢无力。

55790 枳壳丸

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 木香半两 草豆蔻三分（去皮） 赤茯苓三分 当归三分（锉，微炒） 桂心三分 莳萝一两 荜茇一两 人参三分（去芦头） 胡椒半两 白术三分 诃黎勒皮一两 桔梗三分（去芦头） 干姜半两（炮裂，锉） 槟榔三分 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为末，以酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以姜、枣汤送下，不拘时候。

【主治】膈气，脾胃久冷，气滞呕逆，不能下食。

55791 枳壳丸

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 石膏一两（研，水飞） 牛蒡子半两（微炒） 前胡一两（去芦头） 防风半两（去芦头） 羚羊角屑三分 赤茯苓三分 半夏一两（汤洗七遍去滑） 川大黄三分（锉碎，微炒） 甘草半两（炙微赤，锉） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后良久，煎竹叶汤送下。

【主治】痰热，心膈烦满，头痛目旋运，不纳饮食。

55792 枳壳丸

【方源】《圣惠》卷五十八。
【组成】枳壳一两(麸炒微黄,去瓤)　川大黄一两(锉碎,微炒)　川芒消一两
【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前以生姜汤送下。
【主治】大肠结实。

55793　**枳壳丸**
【方源】《圣惠》卷五十九。
【组成】枳壳一两(麸炒微黄,去瓤)　黄连一两(去须,微炒)　芜荑仁一两(微炒)
【用法】上为末,以软饭和丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前以粥饮送下。
【主治】气痢,久不止。

55794　**枳壳丸**
【方源】《圣惠》卷六十五。
【异名】苦参丸(《圣济总录》卷十八)
【组成】枳壳四两(麸炒微黄,去瓤)　苦参八两(锉)
【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后以温酒送下。
【主治】一切风热生疮疥。

55795　**枳壳丸**
【方源】《圣惠》卷六十六。
【组成】枳壳一两半(麸炒微黄,去瓤)　玄参一两　漏芦一两半　川大黄一两半(锉碎,微炒)　黄耆二两(锉)　营实一两　牛蒡子二两(微炒)　露蜂房半两(微炙)
【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以粥饮送下,不拘时候。
【主治】瘰疬结肿,穿溃生脓。

55796　**枳壳丸**
【方源】《圣惠》卷七十一。
【组成】枳壳三分(麸炒微黄,去瓤)　槟榔半两,桂心三分　吴茱萸半两　鳖甲一两(涂醋炙令黄,去裙襕)　当归半两(锉,微炒)　诃黎勒皮三分　川大黄一两(锉碎,微炒)　陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙)　芎䓖半两　木香半两。
【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以暖酒送下。
【主治】妇人心腹气滞,两胁胀痛,不能饮食。

55797　**枳壳丸**
【方源】《圣惠》卷七十五。
【组成】枳壳一两(麸炒微黄,去瓤)　人参一两(去芦头)　肉桂一两(去皱皮)　白术一两　干姜半两(炮裂,锉)　麦门冬一两半(去心,焙)　半夏一两(汤洗七遍去滑)　陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)　葛根一两(锉)　白茯苓一两　甘草半两(炙微赤,锉)。
【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以生姜粥饮送下,不拘时候。
【主治】妊娠恶阻,心中烦闷,头眩,闻食气即呕逆,四肢无力,不自胜举。

55798　**枳壳丸**
【方源】《圣惠》卷八十八。
【异名】牵牛子丸(《圣济总录》卷一七六)。
【组成】枳壳半两(麸炒微黄,去瓤)　川大黄三分(锉碎,微炒)　牡丹一分　黄柏半两(锉)　桂心一分　牵牛子半两(生用)　甘遂一两(煨微黄)
【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服二丸,以温水研破服之,一日二次。
【主治】小儿癖气,胁下妨闷,手足微肿。

55799　**枳壳丸**
【方源】《圣惠》卷八十八。
【异名】调中丸(《圣济总录》卷一七五)。
【组成】枳壳半两(麸炒微黄,去瓤)　木香半两　人参三分(去芦头)　赤茯苓半两　川大黄一两(锉碎,微炒)　柴胡三分(去苗)　桂心一分
【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服三丸,以温水化破服之,一日三次。
【主治】小儿乳癖,呕吐,腹胀实热。

55800　**枳壳丸**
【方源】《圣济总录》卷九。
【异名】枳壳人参丸(《普济方》卷九十六)。
【组成】枳壳(去瓤,麸炒)一两半　防风

（去叉）一两 人参一两半 羌活（去芦头）一两半 羚羊角（镑）一两半 升麻二两 甘菊花（未开者良，微炒）一两 葛根（锉）一两 薏苡仁（炒）一两 桂（去粗皮）一两 黄连（去须）二两 熟干地黄（切，焙）二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十，渐加至三十丸，空心温酒送下，一日二次。

【主治】偏风，手足一边不遂，筋骨烦痛。

55801 枳壳丸

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】枳壳（去瓤，微炒） 羌活（去芦头） 防风（去叉） 人参 羚羊角（镑）各一两半 白茯苓（去黑皮） 升麻 熟干地黄（焙） 黄连（去须）各二两 甘菊花 干姜（炮） 薏苡仁（炒） 桂（去粗皮）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹温酒送下，一日二次。

【主治】偏风不遂。

55802 枳壳丸

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒）一两半 赤茯苓（去黑皮） 防风（去叉） 人参 干姜（炮） 黄连（炒，去须） 薏苡仁 升麻 桂（去粗皮）各一两 菊花 生干地黄（焙）各二两 羌活（去芦头） 羚羊角（镑）各一两半。

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前温酒送下。

【主治】热毒风上攻头面。

55803 枳壳丸

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒）二两 牵牛子（拣择）四两（一半炒，一半生，捣罗取粉一两半，余者不用） 陈橘皮（汤浸，去白，焙）半两 槟榔半两（锉） 木香一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五至二十丸，食后生姜汤送下。欲利加丸数。

【功用】调顺三焦，平匀气脉，消痰滞，利胸膈，祛风，利大小肠。

【主治】三焦约。少腹肿痛，不得大小便。

55804 枳壳丸

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒） 人参 五味子 柴胡（去苗）各半两 石斛（去根） 诃黎勒皮 甘草（炙，锉）各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十至十五丸，食后生姜汤送下。

【功用】匀气宽膈。

【主治】痰癖，胁肋刺痛。

55805 枳壳丸

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒，捣末，米醋二升别煎如膏） 木香 薏苡仁 黄连（去须） 大黄（锉，炒） 人参 白茯苓（去黑皮） 附子（炮裂，去皮脐） 蠡实（微炒） 郁李仁（汤浸，去皮尖，别研）各一两

【用法】上除煎研外为末，入郁李仁同研匀，入枳壳煎中和搜，如硬入少炼熟蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹煎黄耆汤送下，日晚再服。

【主治】痃气急痛，呕吐酸水，食物多噎。

55806 枳壳丸

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒） 人参 甘草（炙，锉） 石斛（去根） 牛膝（酒浸，切，焙） 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，炒，研） 鹿角胶（炙燥） 薏苡仁 当归（切，焙） 犀角屑各一两半 槟榔仁（锉） 诃黎勒皮各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，空心、食前温酒送下，一日二次。

【主治】腰膝冷痛，气闷烦热。

55807 枳壳丸

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒）一两半 白术 人参 甘草（炙，锉） 地骨皮各一两 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）一两半

【用法】上为末和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前米饮送下。

【主治】骨蒸劳瘦，饮食不为肌肤。

55808　**枳壳丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇〇。

【组成】枳壳(去瓤，麸炒)　厚朴(去粗皮，姜汁炙)各一两　犀角(镑)半两　桑根白皮(炙，锉)一两　槟榔(煨)二个　柴胡(去苗)一两半　半夏(汤洗，焙干，为末，姜汁和作饼，晒干)　大黄(锉，醋拌炒)各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服二十丸，空心酒送下。

【主治】走注疼痛，如锥刺皮肤；风气心腹四肢疼痛。

55809　**枳壳丸**

【方源】《圣济总录》卷一三三。

【组成】枳壳(去瓤，麸炒)三两　生干地黄(焙)　防风(去叉)　五加皮(锉)各二两　羌活(去芦头)一两　黄耆(锉)三两。

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，早、晚食前温酒送下。

【主治】毒气下注，脚膝肿赤作疮。

55810　**枳壳丸**

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】枳壳(去瓤，麸炒)　防风(酒浸一宿，去叉，焙)　槐花(麸炒)　荆芥穗　薄荷　甘草(炙)各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，米饮送下，一日三次，不拘时候。

【主治】牡痔，肛边生鼠乳，出脓血。

55811　**枳壳丸**

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】枳壳二两(浆水浸一日，去瓤，煮令烂，研作糊)　木香(炒)一两。

【用法】上将木香为末，和入枳壳糊内为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】妊娠腹痛，一切气疾。

55812　**枳壳丸**

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】枳壳(去瓤，麸炒黄)四两　干姜(炮裂)二两　白术(锉，炒)三两　半夏二两(汤洗去滑，焙干)

【用法】上为末，生姜汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，渐加至二十丸，食前温米饮送下。

【主治】妊娠痰盛，呕逆恶心，头目旋晕。

55813　**枳壳丸**

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】枳壳(去瓤，麸炒)一两半　大黄(微炒)二两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心米饮送下。未通再服，以通为度。

【主治】妊娠大便结塞不通，脐腹硬胀，不能安卧，气上喘逆。

55814　**枳壳丸**

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】枳壳(去瓤，麸炒)　防己各二两　诃黎勒皮半两　大黄(炒)一两　当归(切，焙)二两　郁李仁(去皮，别研)半两　桑根白皮(锉)一两

【用法】上除研者外，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜、紫苏汤送下，不拘时候。

【主治】产后肿满，烦闷咳喘。

55815　**枳壳丸**

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】枳壳(去瓤，麸炒)一两一分　诃黎勒(煨，去核)二两　当归(切，焙)　大黄(锉，炒)　防己　芍药(微炒)各三分　郁李仁(酒浸，去皮)一两　木香　芎䓖　甘草(炙，锉)各半两　牵牛子一两(炒，捣取半两用)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，煎桑白皮、枣汤送下。

【主治】产后头面浮肿，两胁痛者。

55816　**枳壳丸**

【方源】《普济方》卷三九三引《全婴方》。

【组成】半夏（炮七次，炒） 枳壳（麸炒）

【用法】上为末，姜汁糊为丸，如小豆大，小者芥子大。每服二十丸，皂子橘皮汤送下。

【主治】婴儿百日外，腹胀气粗，心下满急；及腹胀咳嗽。

55817 枳壳丸

【方源】《传信适用方》卷三。

【组成】好厚枳壳不拘多少（去瓤，细切，麸炒黄色）

【用法】上为末，每末一两，入胡桃肉一个，研匀，以蜜为丸，如弹子大。每服一丸，空心细嚼，米饮或温酒送下，并用井花水淋洗。

【主治】肉痔。

55818 枳壳丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】枳壳（用酸米醋浸三日，铫内炒焦黑，存性）

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮送下。

【主治】脏毒。

55819 枳壳丸

【方源】《济生》卷四。

【组成】皂角（去黑皮，微炒） 枳壳（去瓤，麸炒） 川大黄二两（锉，微炒） 羌活（去芦） 木香（不见火） 橘红 桑白皮（蜜水炙） 香白芷各二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心米饮或姜汤送下。

【主治】肠胃气壅风盛，大便秘实。

55820 枳壳丸

【方源】《御药院方》卷三

【组成】京三棱（炮） 蓬莪术（炮）各二两二钱 白术 青皮（去白） 陈皮（去白） 白茯苓（去皮）各一两半 槟榔 木香 枳壳（麸炒，去瓤） 半夏（汤洗七次）各一两 黑牵牛三两（炒）

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后温生姜汤送下。

【功用】升降滞气，消化宿食，祛痰逐饮，美进饮食。

【主治】中焦气涩，胸膈痞闷，食饮迟化，四肢困倦，呕哕恶心。

55821 枳壳丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】木香三钱 枳壳（麸炒） 麻仁（炒黄） 大黄各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后温水送下。

【功用】《济阴纲目》：通气凉血润肠。

【主治】产后大小便涩滞，及饭食不化。

55822 枳壳丸

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】枳壳不拘多少（锉片，麦面炒过，以清油润透一宿，焙干）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如芡实大。儿小者，每服一至二丸，用甘草、糯米煎汤化下；儿大者，丸如绿豆大，每服三十至五十丸，食前温米清汤送下；小腑热闭，用车前子煎汤，候温，空心服之。

【主治】大腑虚闭，气连日不通，或痢后里急；小便热闭。

55823 枳壳丸

【方源】《医方类聚》卷一八四引《经验秘方》。

【组成】枳壳二两，好黄连二两。

【用法】上为细末，以猪脏长一尺，入光草乌头二个在内，线结定两头，将二碗醋煮烂，去草乌，将猪脏研成膏，和前药末为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮汤送下。

【主治】肠风下血。

55824 枳壳丸

《医方类聚》卷一五三引《瑞竹堂方》。为原书同卷“七仙丹”之异名。见该条。

55825 枳壳丸

《外科精义》卷下。即《圣济总录》卷一三〇“疏转枳壳丸”。见该条。

55826 枳壳丸

【方源】《普济方》卷一九二引《经验良方》。

【组成】枳壳(炒)　香附子(炒,去毛)　茴香(微炒)　萝卜子(微炒)各等分

【用法】上为末,煮面糊为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,空心煎橘叶汤送下。

【主治】遍身黄肿,外肾亦肿。

55827　枳壳丸

【方源】《普济方》卷一八一。

【组成】枳壳(麸炒,去瓤)　蓬莪术各半两　姜黄　半夏(洗七次)　甘松(去土)各一钱　陈皮(去白)　大麦(炒)各七钱半

【用法】上为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食后陈皮汤送下。

【功用】消导滞气。

【主治】酒食所伤,胸中噎塞不通。

55828　枳壳丸

【方源】《普济方》卷一九四。

【组成】枳壳　芫花各等分

【用法】上用酽醋浸芫花透,将醋再煮枳壳烂,擂芫花为末,共和为丸,如梧桐子大。每服数丸,温白汤送下。

【主治】蛊胀。

55829　枳壳丸

【方源】《普济方》卷二九七。

【组成】先穗子三两　皂角一两(去皮,酥炙黄)　枳壳二两(去瓤,生)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心服。

【主治】肠风痔漏,久不愈者。

55830　枳壳丸

《丹溪心法附余》卷二十二。为《婴童百问》卷五"枳壳防风丸"之异名。见该条。

55831　枳壳丸

【方源】《梅氏验方新编》卷二。

【组成】枳壳(整个,去瓤)四两(每个入巴豆三粒,麻线十字扎定,用水五六碗煮透,去豆,将枳壳切碎,晒干)　橘红皮一两　青皮(去瓤)一两　广木香(不见火,研)三钱

【用法】上为细末,陈老酒,陈粳米粉打糊为丸。临卧服五十丸。

【主治】噎膈。

55832　枳壳丸

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】吴萸　枳壳　滑石　白芍　升麻　樗根皮

【用法】共研粉,乌梅肉和丸。空心白汤送服。

【主治】麻后白痢气滞。

55833　枳壳汤

【方源】《苏沈良方》卷三。

【异名】桔梗枳壳汤(《活人书》卷十八)、枳壳桔梗汤(《得效》卷十一)、枳桔汤(《症因脉治》卷四)。

【组成】桔梗　枳壳(炙,去瓤)各一两

【用法】上锉,如麻豆大。用水一升半,煎减半,去滓,分二次服。

【主治】伤寒痞气,胸满欲死。

55834　枳壳汤

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】枳壳(去瓤,麸炒)三两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服。

【主治】风瘙痒。

55835　枳壳汤

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】枳壳(去瓤,麸炒)二两　人参　赤茯苓(去黑皮)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至六分,去滓温服。

【主治】劳风,涕唾稠粘。

55836　枳壳汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】枳壳(去瓤,麸炒)一两半　厚朴(去粗皮,生姜汁炙)　白术　人参　赤茯苓(去黑皮)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加生姜半分(拍碎),同煎至半盏,去滓,食前温服。

【主治】伤寒后,心腹气滞胀满,不能饮食。

55837 **枳壳汤**

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒） 滑石 大腹皮（锉）各半两 甘草（炙，锉） 青橘皮（去白，切，炒） 络石根 紫苏茎叶 朴消 麦门冬（去心，焙） 冬葵子各三分 前胡（去芦头） 赤芍药各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，葱白三寸（切），煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】伤寒后，小便不通，脐腹痛，气胀，攻上喘促。

55838 **枳壳汤**

《圣济总录》卷四十二。为《圣惠》卷三“人参散”之异名。见该条。

55839 **枳壳汤**

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【异名】枳壳散（《本事》卷三）、枳壳煮散（《证治宝鉴》卷九）。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒）一两 京三棱（炮，锉）一两 干姜（炮）半两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）半两 甘草（炙）半两 益智仁一两 陈橘皮（汤浸，去白，焙）一两 木香 肉豆蔻（去壳）各半两 蓬莪术（锉） 槟榔（锉） 桂（去粗皮）各二两 青橘皮（汤浸，去白，焙）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，加生姜三片，大枣一个（擘），煎至八分，去滓热服，不拘时候。

【功用】顺气宽中，消散积聚。

【主治】上焦有寒，胸膈满闷，背膂引痛，心腹膨胀，胁肋刺痛，食饮不下，噎塞不通，呕吐痰涎，口苦吞酸，羸瘦少力，短气烦闷，及痃癖积聚，惊忧恚气。

【方论选录】《本事方释义》：枳壳气味苦寒，入足太阴；三棱气味苦平，入足厥阴；橘皮气味苦辛微温，入手足太阴；益智仁气味辛温，入足太阴；莪术气味苦辛，入足厥阴，与三棱同功；槟榔气味辛温，入足太阴、太阳；肉桂气味辛热，入足厥阴；干姜气味辛温，入手足太阴；厚朴气味苦辛微温，入手足太阴；甘草气味甘平，入脾；青皮气味苦辛温微酸，入足厥阴；木香气味辛温，入脾；肉豆蔻气味辛温，入足太阴、阳明；佐姜、枣和荣卫。此宽中顺气之方，能治五种积气，三焦痞塞，心疼腹胀，痃癖诸症，使中宫之气流畅，勿令不宣也。

55840 **枳壳汤**

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒）半两 苦参 甘草（生，锉）各一两 灯心二小束（切）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，加盐半钱，茶末半钱，去滓温服，食后再服。以篦子于喉中引令吐，吐定更服，以痰尽为度。吐后宜服茯苓汤。

【主治】风痰心痛，每食粘滑等物，即吐清水，痛连胸背不可忍者。

55841 **枳壳汤**

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒）一两半 桔梗（去芦头，炒） 人参 前胡（去芦头） 桂（去粗皮）各一两 槟榔（微煨，锉）半两 鳖甲（去裙襕，醋炙）一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，加生姜半枣大（拍破），同煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】痃气腹胀，两肋急满，不能饮食，头痛壮热，身体疼痛。

55842 **枳壳汤**

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒）三分 黄连（去须，炒） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）各一两 甘草（炙，锉） 阿胶（炙燥）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，空心温服。一日二次。

【主治】濡泻，暴下不止。

55843 **枳壳汤**

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒）一两 甘草（炙，锉）半两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）一两半

干姜(炮)　赤茯苓(去黑皮)各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎至八分,去滓,空心、日午温服。

【主治】久冷痢。

55844　枳壳汤

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】枳壳(去瓤,麸炒)　甘草(炙,锉)各一分　大腹皮三钱(锉)　百合　牵牛子(炒)　赤茯苓(去黑皮)各一两　赤芍药　桑根白皮(锉)各三分　郁李仁(汤浸,去皮尖双仁,阴干)半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎至八分,去滓,空心、食前温服。以通为度。

【主治】大肠壅结不通,腹胁胀满膨闷,不下食者。

55845　枳壳汤

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】枳壳(去瓤,麸炒)一两　黄耆(锉)二两　芎䓖　丹参　当归(切,焙)　槟榔(锉)各一两半　芍药　黄芩(去黑心)各一两一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕,以水一盏半,煎至八分,去滓,空心、食前温服。

【主治】肠痔肿痛生核,或发寒热。

55846　枳壳汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】枳壳(去瓤,麸炒)　甘草各三分　胡椒一分　人参一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后霍乱吐利,厥逆不食。

55847　枳壳汤

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】枳壳(去瓤,麸炒)　芍药　人参　黄耆(锉)　木通(锉)　当归(切,焙)　桂(去粗皮)　蒺藜子(炒,去角)　鸡骨(醋炙)　大黄(锉,炒)各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕,水一盏,煎七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后乳结核,或成痈肿,发热疼痛。

55848　枳壳汤

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】枳壳(去瓤,麸炒)五两　栀子仁七个　豉(微炒)二合　大黄(锉,炒)二两

【用法】上为粗末。每服四钱匕,水二盏,煎至一盏,去滓温服,空心、晚后各一次。

【主治】乳石发动,干呕。

【加减】壮强者,加大黄一两。

55849　枳壳汤

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】皂角黄仁　枳壳　青皮各半两

【用法】上为细末。每服一钱,米饮调下。

【主治】肠风痔疾。

55850　枳壳汤

《鸡峰》卷十八。为《圣济总录》卷五十四"枳壳散"之异名。见该条。

55851　枳壳汤

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】枳壳一两(去瓤,麸炒)　干姜半两(炮)　甘草半两　前胡(去芦)一两　木香一两　半夏一两(汤洗七次)

【用法】上为末。每服一钱,水一小盏,加生姜三片,陈皮一片,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿痰实壮热,心膈烦闷,气不调顺,不早治恐生惊痫者。

55852　枳壳汤

《卫生家宝产科备要》卷六。为《本事》卷十引孙真人方"滑胎枳壳散"之异名。见该条。

55853　枳壳汤

【方源】《保命集》卷下。

【异名】枳壳散(《症因脉治》卷一)。

【组成】枳壳(麸炒,去瓤)三两　桔梗三两　黄芩一两半

【用法】上锉。每日早用二两半,水三盏,煎至二盏,匀作三服,午时一服,申时一服,临卧时一服。三日七两半服尽,再服生半夏汤。

【主治】①《保命集》:久痰胸膈不利,上焦

发热者。②《症因脉治》：胸前热结，口噤不语，右脉沉滑。

55854 **枳壳汤**

【方源】《保命集》卷下。

【组成】枳壳三两（炒） 黄芩一两

【用法】上为粗末。每服半两，水一盏半，煎一盏，去滓温服。

【主治】妇人怀胎腹胀。

55855 **枳壳汤**

【方源】《保命集》卷下。

【异名】枳芩散（《郑氏家传女科万金方》卷三）。

【组成】枳壳半两 黄芩半两 白术一两

【用法】上为粗末。每服五七钱，水一盏，煎至七分，食前空心服。

【功用】《景岳全书》：进食和中。

【主治】①《保命集》：妇人胎漏，及因事下血。②《景岳全书》：恶阻。

55856 **枳壳汤**

《朱氏集验方》卷六。为《博济》卷三“乌金散”之异名。见该条。

55857 **枳壳汤**

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】枳壳半斤（面炒，去瓤） 绵黄耆半斤（洗）

【用法】上为末。每服二钱，常汤调下，不拘时候。

【主治】远年近日肠风下血。

55858 **枳壳汤**

【方源】《普济方》卷一八五。

【组成】枳壳 滑石各二两 甘草一两

【用法】上㕮咀。每服三钱，用冷臭橘叶七片同煎，温服。连进三服即解。

【主治】胸痹，胁下秘结。

55859 **枳壳汤**

【方源】《普济方》卷三九三。

【组成】枳壳（去瓤，炒） 青皮（去瓤） 木香 丁香 当归 缩砂仁 陈皮（去白）各等分

【用法】上为细末。烧盐汤调下。

【功用】宽中进食。

【主治】小儿脾胃不和，癖积胀满。

55860 **枳壳汤**

【方源】《疮疡经验全书》卷二。

【组成】枳壳 射干 升麻 生地 黄芩 前胡 金银花 连翘 大黄（炒） 甘草节 犀角汁（临服加之）

【用法】用水二钟，煎一钟，一日三服。

【主治】训疽，一名爆疽。因肺经受热，疽发于两手五指头上者。

55861 **枳壳汤**

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】枳壳 陈皮 厚朴 大腹皮 甘草

【主治】痘疹误服参、耆，喘急腹胀。

55862 **枳壳汤**

《杏苑》卷五。为《医学正传》卷五引《局方》“秘方枳壳汤”之异名。见该条。

55863 **枳壳汤**

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】枳壳 苏梗 桔梗 陈皮 甘草

【主治】肠痹，中气壅闭，气逆上冲而喘者。

55864 **枳壳汤**

【方源】《诚书》卷八。

【组成】槟榔 枳壳 防风 橘皮 木通 紫苏 赤芍药

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】惊痫陡作。

55865 **枳壳汤**

《种痘新书》卷四。为《治痘全书》卷十四“枳壳散”之异名。见该条。

55866 **枳壳汤**

【方源】《一盘珠》卷十。

【组成】枳壳 大黄各一钱 甘草五分

【主治】麻疹便闭。

55867 **枳壳汤**

《嵩崖尊生》（锦章书局本）卷九。即原书三瀼堂本“旋覆汤”。见该条。

55868　**枳壳汤**

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】枳壳　陈皮　厚朴　山楂　杏仁　苏子　大腹皮

【主治】疹后误服参、耆，喘急腹胀者。

55869　**枳壳汤**

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】枳壳　川朴　大黄　甘草　紫草　木通　陈皮　生地　楂粉

【主治】食积气滞下痢，误食猪肉，喘胀气急，泻如败卵。

55870　**枳壳饮**

【方源】《传信适用方》卷三。

【组成】枳壳(水浸，去瓤，麸炒)

【用法】上为粗末。每服一大钱，加阿胶二片，生姜五片，葱白五茎，水一大盏，煎至六分，去滓，入蜜少许，空心温服。次用葱白十茎，烂研涂脐心中，即以手巾蘸葱汤，自内肾腰间浴熨至小腹下，少顷气透即通。

【主治】老人大便风秘不通，搴涩妨闷，或用蜜煎导类不能通者。

55871　**枳壳酒**

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】枳壳(去瓤，麸炒)　柏白皮各半斤　五叶草一斤

【用法】上细锉，生绢袋盛，以酒一斗，浸七日。每温饮一盏，并服不妨，常令有酒力。佳。

【主治】刺风。

55872　**枳壳散**

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】枳壳一两(麸炒微黄，去瓤)　石膏二两　子芩半两　柴胡一两(去苗)　玄参一两　赤茯苓半两　川升麻三分　射干二分　羚羊角屑半两　甘草半两(炙微赤，锉)　麦门冬二分(去心)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾实热，咽喉干，头痛心烦，四肢壅闷。

55873　**枳壳散**

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】枳壳三分(麸炒微黄，去瓤)　前胡半两(去芦头)　川升麻半两　赤茯苓半两　子芩半两　麦门冬三分(去心)　沙参三分(去芦头)　玄参半两　茅根半两(锉)　甘草半两(炙微赤，锉)　木通半两(锉)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺脏壅热，心胸不利，少欲吃食。

【宜忌】忌炙煿，猪、鸡、犬肉。

55874　**枳壳散**

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】枳壳三分(麸炒微黄，去瓤)　人参三分(去芦头)　栀子仁半两　黄耆三分(锉)　白术三分　甘草一分(炙微赤，锉)

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒已愈，气未平复，劳动起早而复发。

55875　**枳壳散**

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】枳壳一两(麸炒微黄)　防风二两(去芦头)　甘草二两(炙微赤，锉)　汉防己一两　麻黄一两(去芦头根节)　人参一两(去芦头)　羚羊角屑一两　细辛一两　茵芋一两　秦艽一两(去苗)　桂心一两　附子一两(炮裂，去皮脐)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入竹沥一合，更煎一两沸，放温，拗开口灌之，不拘时候。

【主治】中风口噤不开，心胸满闷。

55876　**枳壳散**

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】枳壳三分(麸炒微黄，去瓤)　防风半两(去芦头)　川升麻半两　白鲜皮半两　麦门冬一两(去心，焙)　白蒺藜三分(微炒，去刺)　羚羊角屑三分　羌活三分　桑根白

皮三两（锉） 麻黄半两（去根节） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾肺风热，攻皮肤，生瘖𤺋，瘙痒不止，愈而复发。

55877 **枳壳散**

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】枳壳三两（麸炒微黄，去瓤） 赤茯苓一两 黄耆一两（锉） 人参一两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉） 当归三分 白术一两 地骨皮半两 酸枣仁三分（微炒）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳烦热，身体疼痛少力，不欲饮食。

55878 **枳壳散**

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 桑根白皮一两（锉） 牛蒡子一两（微炒） 石膏二两 川升麻一两 汉防己三分 赤茯苓一两 黄芩三分 大青三分 沙参三分（去芦头） 麻黄三分（去根节） 甘草半两（生用）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，一日三四次。

【主治】乳石发热，心神烦躁，身体赤肿，胸中满闷。

55879 **枳壳散**

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 白术一两 诃黎勒一两半（煨，用皮） 桂心一两 人参一两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗末。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】腹虚胀满，不下食。

55880 **枳壳散**

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 木通半两（锉） 五加皮半两 槟榔一两 独活半两 黄芩半两 羚羊角屑半两 川大黄一两（锉碎，微炒） 赤芍药一两 紫苏茎叶三分 赤茯苓三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【功用】《普济方》：消肿利小便，兼补气虚。

【主治】脚气，春夏防发，或稍心肠壅闷，脚膝烦疼，大肠不利，小便赤少。

55881 **枳壳散**

【方源】《圣惠》卷四十七

【组成】枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 黄芩三分 前胡三分（去芦头） 半夏三分（汤洗七遍去滑） 赤茯苓三分 木香三分 人参三分（去芦头） 槟榔三分 川大黄三分（锉碎，微炒）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】中焦壅热，关隔不通，中逆喘急。

55882 **枳壳散**

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 桔梗一两（去芦头） 鳖甲一两（涂醋炙令黄，祛裙襕） 人参一两（去芦头） 槟榔七分 柴胡五两（去苗） 芎䓖三分 桂心一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 赤茯苓二两 木香三分 川大黄一两（锉碎，微炒） 当归五分（锉，微炒） 赤芍药三分

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】痃癖气胀，心肋急痛，不能下食，四肢少力。

55883 **枳壳散**

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 泽泻一两 白术一两 前胡一两（去芦头） 汉防己一两 旋覆花一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】支饮，头痛目眩，心下痞满。

55884　**枳壳散**

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】枳壳三分(麸炒微黄，去瓤)　厚朴三分(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟)　甘草三分(炙微赤，锉)　臭椿根三分(炙黄，锉)　地榆三分(锉)　紫草三分

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】赤白痢，冷热未调，下痢不止。

55885　**枳壳散**

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】枳壳二两(麸炒微黄，去瓤)　槐子二两(微炒令香)　防风二两(去芦头)　羌活一两　黄耆一两(锉)　白蒺藜一两(微炒，去刺)　甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为细散。每服二钱，食前以粥饮调下。

【主治】痔疾，下部肿结，痒痛不止。

55886　**枳壳散**

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】枳壳二两　木香半两　鬼箭羽一两　鬼臼一两　槐子仁二两

【用法】上为粗散。以慢火炒令热，用青绢包裹，看冷暖熨之。

【主治】妇人痔疾，痒痛不可忍。

55887　**枳壳散**

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】枳壳半两(麸炒微黄，去瓤)　甘草半两(炙微赤，锉)　黄连半两(去须)

【用法】上为细散。每服半钱，蜜水调下。

【主治】小儿身上生热疮，心躁，皮肤焮痛。

55888　**枳壳散**

【方源】《普济方》卷一一一引《圣惠》。

【组成】枳壳(去瓤，麸炒)　黄耆(炙，锉)　苍耳(炒)　白术(微炒)　蒴藋(锉)　白蒺藜(炒)　防风(去芦，生用)　升麻(生用)　栀子仁各三分　漏芦(去芦头)　黄连(去须)　人参　天门冬(去心，焙)　防己　干姜(炮)　芎䓖　丹参(去苗土，炙)　麻黄(去根节，煎，掠去沫，焙)　白芷(微炒)　甘草(炙，锉)　葛根(锉)各半两　玄参(坚者)三两　乌蛇(酒浸，去皮骨，炙)一两

【用法】上为散。每服二钱匕，加至三钱匕，空心、夜卧时以温酒调下。

【主治】大风癞病，热毒风入五脏，眉发坠落，身体头面生疮。

55889　**枳壳散**

【方源】《传家秘宝》卷中。

【组成】白术(炒)　芎䓖　陈橘皮(去白，焙)　官桂　细辛　甘草(炙)　枳壳(炒，去白)　当归　芍药　人参　茯苓　厚朴(去皮，姜汁炙焦)各等分

【用法】上为细末。每服二钱，水一大盏，煎至六分，去滓温服。

【功用】中利胸膈，补和脾胃，通顺三焦。

55890　**枳壳散**

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】枳壳(去瓤，麸炒)二两　牛黄(研)　白芷各一两

【用法】上为散。每服三钱匕，空心温酒调下。

【主治】中风手足无力，口中涎出，多在右边者。

55891　**枳壳散**

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】枳壳(去瓤，麸炒)一两半

【用法】上为散。每服二钱匕，食后用温浆水调服，一日三次。

【主治】风气壅滞，腰脚疼痛。

55892　**枳壳散**

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】枳壳(去瓤，麸炒)二两　苦参　蒺藜子(炒去角)　蔓荆实各一两

【用法】上为细散。每服二钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】皮肤风瘙痒，麻痹。

55893 **枳壳散**

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【异名】枳壳汤(《鸡峰》卷十八)。

【组成】枳壳(汤浸，去瓤，切作片子，焙干)五两 滑石(研细)一两 桂(去粗皮)二两 厚朴(去粗皮，涂生姜汁炙)二两

【用法】上为散。每一两药末，更入腻粉半钱，拌和均匀。每服一钱匕，空腹时用冷米饮调下。

【主治】三焦约，大小便不通。

55894 **枳壳散**

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】枳壳 胡桃各七个 皂荚(不蛀者)一挺

【用法】上就新瓦上，以草火烧令烟尽，取研极细，分为八服。临卧、二更及五更时各一服，荆芥茶调下。

【主治】赤痢不止。

55895 **枳壳散**

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】枳壳(去瓤，麸炒) 芍药(锉炒) 人参各一两半 黄耆(锉，炒) 鸡骨(炙) 木通(锉) 当归(焙令香，锉) 桂(去粗皮)各一两 蒺藜子(微炒，去角)半两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，一日三次。

【主治】乳痈坚硬。

55896 **枳壳散** 《圣济总录》卷一四二。为原书卷一四一"枳壳熨方"之异名。见该条。

55897 **枳壳散**

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】枳壳(去瓤，麸炒)三分 槟榔(锉) 木通(锉)各一两 大黄(锉，微炒)半两 诃黎勒四个(二个煨，二个生，各取皮用) 大腹皮三个(锉)

【用法】上为散。每服二钱匕，用童便一盏，加葱白二寸，煎取七分，去滓调下，不拘时候。

【主治】妊娠大小便不通，心腹胀闷。

55898 **枳壳散**

【方源】《本事》卷三引庞老方。

【组成】枳壳(去瓤，锉，麸炒) 白术各半两 香附子一两(麸炒，舂去皮) 槟榔三钱

【用法】上为细末。每服二钱，米饮调下，一日三服，不拘时候。

【主治】心下蓄积，痞闷，或作痛，多噫败卵气。

【方论选录】《本事方释义》：枳壳气味苦寒，入足太阴；白术气味甘温，入手足太阴；香附子气味苦平，入足厥阴；槟榔气味辛温，入足太阴。此心下积聚痞闷，脘中不爽，多噫败卵气，胀疼者，皆由中气馁弱不振，以甘温守中，而用破气消积之药攻病，则正气不伤而宿病顿去矣。

55899 **枳壳散**

《本事》卷三。为《圣济总录》卷五十四"枳壳汤"之异名。见该条。

55900 **枳壳散**

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】枳壳 紫苏 百合 香附 葱根 黄连 甘草 杏仁 瓜蒌仁 川芎 白芍 当归 熟地

【主治】妊娠大便不通。

55901 **枳壳散**

【方源】《普济方》卷三九三引《全婴方》。

【组成】枳壳一两(麸炒，为细末) 巴豆二十一粒(同上炒黄，去豆)

【用法】上为末。三岁每服半钱，沙糖汤调下；或作丸子，白糊为丸，如小豆大，每服三十丸，桑白皮汤送下。

【主治】小儿痞气，腹胀喘急。

55902 **枳壳散**

《三因》卷十七。为《本事》卷十引孙真人方"滑胎枳壳散"之异名。见该条。

55903 **枳壳散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】枳壳(去瓤，麸炒) 木馒头(麸炒)各等分

【用法】上为细末。每服二钱，空心、食前温酒调下。

【主治】肠风下血不止，及大便急涩。

55904　枳壳散

《妇人良方》卷五。为《博济》卷四“枳壳饮子”之异名。见该条。

55905　枳壳散

【方源】《直指》卷四。

【组成】枳壳(制)五两　甘草(炙)一两半

【用法】上为末。每服二钱，浓煎木瓜汤调下。

【功用】疏导毒气。

【主治】脚气。

【加减】如要快利，更加麻仁。

55906　枳壳散

【方源】《直指》卷九。

【组成】枳壳五两(制)　甘草(炙)一两半　杏仁(去皮，炒)　阿胶(炒酥)　生地黄各一两

【用法】上细锉。每服三钱，加生姜五片，蜜三匙，乌梅一个同煎，空腹服。

【主治】虚劳，大便秘涩。

55907　枳壳散

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】小柴胡汤加枳壳　防风

【功用】利风热，解血热。

【主治】小儿惊风，虚中壅实。

55908　枳壳散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】枳壳(麸炒，去瓤)　槐子(微炒黄色)　荆芥穗各半两

【用法】上为细末。每服三钱，空心薄粟米粥调下，如人行一二里地再用粥压之，一日二三服。

【功用】散风疏壅，清热宽肠。

【主治】肠风痔瘘，便血无数，疼痛不可忍者。

【备考】方中槐子，《杏苑》作“槐花”。

55909　枳壳散

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】枳壳五钱(麸炒)　赤茯苓一两　当归一两　荆三棱(炮)一两　木香五钱　诃黎勒五钱

【用法】上为细末。每服五钱，沸汤点服。

【主治】伤寒汗下后，脐上有动气者。

55910　枳壳散

【方源】《得效》卷三。

【组成】枳壳(去瓤，炒)二两半　甘草(炙)七钱半

【用法】上为末。每服二钱，浓煎葱白汤调下，不拘时候。

【主治】气疾，胁间痛，如有物以插然。

55911　枳壳散

【方源】《普济方》卷一八七。

【组成】枳壳(去瓤，麸炒微黄)三十个(一方加桂各等分)

【用法】上为散。每服方寸匕，米饮调下，日三夜一。

【主治】胸痹，心下结痞，急痛彻背，短气烦闷，自汗出者。

55912　枳壳散

【方源】《普济方》卷二〇五。

【组成】枳壳一两(麸炒微黄，去瓤)　诃黎勒皮一两半

【用法】上为散。每服一钱，煎生橘皮汤调下，不拘时候。

【主治】久患膈气，心腹痞满，咽喉噎塞，不下饮食。

55913　枳壳散

【方源】《普济方》卷二九七。

【组成】枳壳　木鳖子　防风　萆薢各二钱

【用法】上为末。每用半两，水三升，煎至三五沸，熏洗三五次即效。

【主治】肠风痔漏。

55914　枳壳散

【方源】《普济方》卷二九七。

【组成】枳壳二两　贯众二两　荆芥一两

大白皮一两　黄连半两　蛇床子半两　苍耳根一把　干姜半两(泡)　柏枝一把　薤头一把　黑豆半升　无名异半两　冬青叶一把　地骨皮半两

【用法】上为粗末。每用一大合，用水三大碗，煎至一碗，先熏后洗，一日二三次。

【主治】痔漏。

55915　枳壳散

【方源】《普济方》卷三四三。

【组成】枳壳(小厚实者，麸炒，去瓤，又方用糯米浸，控干，炒赤色尤佳)二两

【用法】上为细末。每服二钱，空心沸汤调下，一日三次。

【功用】养胎益气，安和子脏；瘦胎易产，抑阳降气。

【主治】难产及胎中一切恶疾。

【宜忌】忌登高厕。

【加减】若大便秘涩，加防风；体弱，加大当归(去尾)，木香各等分；如胎肥壅溢，动止艰难，临产难生，加乳香、发灰。

【方论选录】枳壳能逐水，消胀满逆气，临月多服，则当产之时，无胀满逆气，产道顺而易生。

55916　枳壳散

【方源】《普济方》卷三四三。

【组成】枳壳二两　桑白皮一两(锉，以水三碗，与枳壳同煎，煮干取出，去瓤洗净，细切，焙干，只用桑白皮)　人参半两　糯米二两(炒黄色)　木香一钱(不见火)　甘草一两(炙)　麦蘖半两(炒黄)

【用法】上为细末。每服二钱，入盐少许，沸汤点服，一日五次，不拘时候。

【功用】滑胎调气，利胸膈，消积滞，和脾胃，进饮食。

【主治】妊娠诸疾。

55917　枳壳散

【方源】《普济方》卷三五六。

【组成】枳壳　甘草　糯米各等分

【用法】上同炒为末。米饮白汤调下，一日三五服，不拘时候。

【功用】妊娠易产。

【主治】难产。

55918　枳壳散

【方源】《证治要诀类方》卷三。

【组成】防风　川芎　细辛　枳壳　桔梗　干葛　甘草

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】孕妇脚肿。

55919　枳壳散

【方源】《广嗣纪要》卷十三。

【异名】枳壳瘦胎散(《妇科玉尺》卷二)。

【组成】商州枳壳(炒)五两　炙粉草一两　香附(炒黑)一两　(一方有炒糯米半两)

【用法】上为末。每服二钱，空心白汤调服。

【功用】令儿易产。

【主治】妊妇胎肥，至八月以后胎气壅盛者。

【加减】若妊妇稍弱者，单服恐胎寒腹痛，胎弱多惊，可加当归一两，木香半两(不见火)。如此则阳不致强，阴不致弱，二气调和，有益胎嗣。

55920　枳壳散

【方源】《保婴撮要》卷十四。

【组成】枳壳(去瓤，麸炒)　槐花　荆芥　皂角子仁(炒)　猬皮(炙)各等分

【用法】上为末。每服一钱，滚汤送下；作丸服亦可。

【主治】痔疮肿痛下血。

55921　枳壳散

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】枳壳二两(炒)　黄连一两　槐花五钱(炒)　白芍一两　甘草二钱半　地榆五钱　(一方加当归、生地黄、防风)

【用法】上锉五剂。水煎，空心服。

【主治】大便下血。

55922　枳壳散

《准绳·类方》卷三。为《局方》(人卫本)卷九(吴直阁增诸家名方)“滑胎枳壳散”之异

名。见该条。

55923　枳壳散

【方源】《治痘全书》卷十四。

【异名】枳壳汤(《种痘新书》卷四)。

【组成】紫草　枳壳　生地　大黄

【主治】痘欲回未回,壮热不退,痰实烦闷,大便坚实,卧则哽气者。

【备考】《种痘新书》本方用枳壳二钱,生地一钱,紫草二钱,酒制大黄八分。

55924　枳壳散

《症因脉治》卷一。为《保命集》卷下"枳壳汤"之异名。见该条。

55925　枳壳散

《张氏医通》卷十五。为原书同卷"瘦胎饮"之异名。见该条。

55926　枳壳散

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】大枳壳三个(剖开去瓤)　阿魏六分　杏仁十粒

【用法】将后二味研匀,装枳壳内,湿绵纸包七层,慢火内炙存性,去阿、杏,研末。分作三服,烧酒调下。

【主治】噎膈反胃。

55927　枳壳散

【方源】《痘疹会通》卷四。

【组成】紫草　枳壳　生地　大黄

【用法】淡竹叶,灯心为引。

【主治】痘疹,大热毒盛者。

55928　枳壳散

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】枳壳(烧存性)

【用法】上为细末。麻油和敷患处。

【主治】产后阴门破伤,或阴肿下脱内出。

55929　枳壳散

【方源】《古今医彻》卷三。

【组成】枳壳　木通　生地　当归　广皮　金银花各一钱　甘草三分　钩藤二钱

【用法】加灯心一握,用水煎服。

【主治】乳吹,乳房作胀。

55930　枳芩散

《郑氏家传女科万金方》卷三。为《保命集》卷下"枳壳汤"之异名。见该条。

55931　枳杏丸

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】杏仁一两(汤泡,去皮尖,别研)　枳壳二两(先研为末)

【用法】上为细末,神曲糊为丸,如梧桐子大。每服四十或五十丸,食前米饮、生姜汤送下。

【主治】大小便涩少。

55932　枳连丸

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】陈枳壳三两　川黄连三两　槐花(炒)

【用法】上为末,水泛为丸,如梧桐子大。每服七十丸,白汤送下。

【主治】痢疾,里急后重。

55933　枳实丸

【方源】《外台》卷十五引《延年秘录》。

【组成】枳实(炙)　蒺藜子　苦参各六分　人参四分　独活　天门冬(去心)　菌桂各三分　白术四分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,加至十五丸,用薄荷酒送下,一日二次。

【主治】风热气发,冲头面热,皮肤生风疹,瘙痒甚,生疮,不能多食。

【宜忌】忌蒜、热面、鲤鱼、桃李、雀肉、生葱。

55934　枳实丸

【方源】《千金》卷五。

【组成】枳实一两半　菊花　蛇床子　防风　白薇　浮萍　蒺藜子各一两　天雄　麻黄　漏芦各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如大豆许。五岁儿饮用十丸,加至二十丸,一日二次。五岁以上者,随意加之;儿大者,可为散服。

【主治】小儿风瘙,痒痛如疥,搔之汁出,遍

身痞瘰，如麻豆粒，年年喜发，面目虚肥，手足干枯，毛发细黄，肌肤不光泽，鼻气不利。此则少时热盛极，身体当风，风热相搏所得者，不早治之，成大风疾。

55935 枳实丸

【方源】《外台》卷七引《广济方》。

【组成】枳实六分 犀角四分 前胡四分 青木香八分 麦门冬（去心）八分 赤茯苓八分 苦参六分 芍药六分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，空腹以饮送下，一日二次。

【主治】胸膈气胀满，吃食心下妨闷，虚热，手足烦痛，渐羸瘦，不能食，四肢无力。

【宜忌】忌生菜、热面、油腻、炙肉、酢、蒜。

55936 枳实丸

【方源】方出《外台》卷十二引《广济方》，名见《普济方》卷三九一。

【组成】牛膝八分 桔梗六分 芍药六分 枳实八分（炙） 白术六分 鳖甲八分（炙） 茯苓八分 人参六分 厚朴六分（炙） 大黄六分 桂心六分 槟榔六分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，空腹温酒送下，一日二次。老小微利。

【主治】腹中癖气。

【宜忌】忌生冷、油腻、小豆、粘食、苋菜、醋、生葱、猪肉。

55937 枳实丸

【方源】《外台》卷十四引《广济方》。

【组成】枳实（炙） 防风 羌活 人参 羚羊角各六分（屑） 甘菊花 干葛 薏苡仁 桂心各四分 茯苓 升麻 黄连 干地黄各八分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，空腹以酒送服，一日二次。服麻子汤补后，次服本方。

【主治】偏风不遂。

【宜忌】忌生葱、酢物、猪肉、冷水、芜荑、生菜、热面、荞麦、鸡鱼、蒜笋、陈臭物。

55938 枳实丸

【方源】《旅舍》。

【组成】大黄半两 牵牛（微炒，取末）半两 枳实（麸炒，去瓤） 人参一钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温水送下。未动，再加丸数服之。

【主治】风痹痰实，大便秘涩，头目眩晕，腹满烦渴；伤寒胃热有燥屎，谵语狂乱，及结胸痛痞，痈疡疮疖。

【备考】方中枳实用量原缺。

55939 枳实丸

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】枳实（去瓤，麸炒）一两半 天门冬（去心，焙） 独活（去芦头） 蒺藜子（炒） 人参 防风（去叉） 桔梗（炒）各一两一分 黄连（去须） 薏苡仁（炒）各一两 桂（去粗皮）半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，粟米饮或温酒送下，一日二次，不拘时候。

【主治】风瘙瘾疹，头面肿痒。

55940 枳实丸

《圣济总录》卷十一。为原书同卷“独活丸”之异名。见该条。

55941 枳实丸

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】枳实（去瓤，麸炒）一两 白术 槟榔（锉） 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各三分 甘草（炙，锉） 生姜（切，炒）各一分 赤茯苓（去黑皮） 青木香 桂（去粗皮） 昆布（洗去咸，焙） 诃黎勒皮 大黄（煨，锉）各半两 草豆蔻（去皮）一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜、木瓜汤送下。

【主治】气久积不散，心膈满闷，四肢不收，痞塞不通。

55942 枳实丸

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】枳实五两(去瓤,麸炒,捣为末,炼蜜和丸,如弹子大)　皂荚刺(烧存性,为末)三两

【用法】上每用药一丸,皂荚末一钱半,以水一盏,同煎至七分,加麝香少许,放温服下。

【主治】肠痔下血。

55943　枳实丸

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】枳实(麸炒黄)　槐荚(麸炒黄)　皂荚(猪牙者,涂酥炙)　大黄(炒令焦黄)各一两

【用法】上为末,面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心、食前荆芥、腊茶送下。

【主治】肠风。

55944　枳实丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】枳实(麸炒黄)一两半　陈橘皮(去白)一两半　萝卜子一两(炒)　人参(去芦头)半两　木香半两

【用法】上为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食后浓煎木瓜汤送下。

【主治】脾胃积寒,气不升降,中脘痞闷,心腹作痛,发歇无常。

55945　枳实丸

【方源】《保命集》卷中。

【组成】枳实(麸炒)五钱　白术一两(锉)

【用法】上为细末,烧饼为丸,如梧桐子大。每服五十丸,米饮送下。

【功用】进食逐饮。

【主治】气不下降,食难消化。

【备考】本方方名,《普济方》引作"枳术丸"。《脉因症治》:以曲糊丸。

55946　枳实丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】白术二两　枳实　半夏　神曲　麦芽各一两　姜黄　陈皮各半两　木香一钱半　山楂一两

【用法】上为末,荷叶蒸饭为丸,如梧桐子大。每服一百丸,食后姜汤送下。

【主治】积聚痞块。

【备考】《景岳全书》有苍术五钱。

55947　枳实丸

【方源】《普济方》卷一八三。

【组成】枳实六分　犀角四分　前胡四分　青木香八分　麦门冬(去心)　赤茯苓各八分　苦参　芍药各六分　黄橘皮　甘草　川芎　桔梗　牵牛(生熟使)　羌活　茯苓　草豆蔻　大腹皮各一分　鳖甲(醋炙)半两　吴茱萸三铢

【用法】上为末。每服二钱,水一盏,煎一两沸,空心和滓服。

【主治】胸膈胀满,心下虚热,脚手烦疼,逐渐羸瘦,不能饮食,四肢无力。

【备考】本方方名,据剂型当作"枳实散"。

55948　枳实丸

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】陈枳实　厚朴　槟榔　木香

【功用】消导。

【主治】内伤四肢不举,忽尔倒仆,手足偏枯,外无表症,唯内热便秘尿赤,右脉滑实。

【加减】小便不通,加黄连、木通。

55949　枳实汤

【方源】《鬼遗》卷三。

【组成】枳实(炙)　射干　升麻　干地黄　黄芩　前胡各三两　犀角一两半　大黄二两半　麝香半两(一方有甘草二两)

【用法】上㕮咀。以水九升,煮取三升,分三次温服。

【主治】瘰疽。

55950　枳实汤

【方源】方出《千金》卷十六,名见《普济方》卷一二〇。

【组成】竹叶二升　枳实三两　青葙子　白前各一两　吴茱萸　黄芩各二分　栝楼根　麦门冬各二两　生姜六两　前胡(一作芍药)　半夏各五两

【用法】上㕮咀。以水八升,煮取二升,分三次服。

【主治】热气，手足心烦热如火。

55951 **枳实汤**

【方源】《千金》卷十七。

【组成】枳实三个 大枣十四个 半夏五两 附子二个 人参 甘草 白术 干姜 厚朴各二两

【用法】上㕮咀。以水七升，煮取二升半，每服八合，一日三次。

【功用】下气。

【主治】胸中满闷。

55952 **枳实汤**

【方源】《千金翼》卷二十二。

【异名】枳实散(《圣惠》卷六十二)。

【组成】枳实(炙) 芍药 干地黄 前胡 黄芩 通草各三两 知母 芎䓖 细辛 茯苓 黄耆 人参 甘草(炙)各二两

【用法】上㕮咀。以水一斗一升，煮取三升五合，去滓，分四次服。

【主治】男子发背，肋结块气，或经一月不已，苦寒热者。

55953 **枳实汤**

【方源】《外台》卷三引《广济方》。

【组成】枳实三个(炙) 栀子十四个(擘) 葱白(切)一升 香豉半升 鼠屎二十七个

【用法】上以水一斗，煎取二升五合，分三次温服，服后相去如人行六七里，进一服。

【功用】内消不利。

【主治】天行温热愈后数日，劳而复发者。

55954 **枳实汤**

【方源】《幼幼新书》卷三十七引《婴孺方》。

【组成】枳实(炙)六分 防风 秦艽 鸡舌香 熏陆香各二分 麝香一分 沉香 黄芩 白蔹 升麻各四分 大黄 木香各十分

【用法】上以水五升，煮取一升八合。五六岁儿服五合，七八岁服六合。

【主治】小儿着风热，瘖瘰坚如麻豆，抓之皮剥汁出，或竟身头面年年常发有时。

55955 **枳实汤**

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】枳实(去瓤，麸炒) 防风(去叉) 麻黄(去根节，先煎，掠去沫，焙干) 芎䓖各一两半 杏仁(去皮尖双仁，炒)一两 半夏(为末，生姜汁和作饼，晒干) 细辛(去苗叶)各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至一盏，去滓，入竹沥半合，更煎沸，早、晚食前温服。

【主治】风头晕倒眼眩，脑项急痛。

55956 **枳实汤**

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】枳实(去瓤，麸炒) 木香各一分 朴消三分 大黄(锉，微炒)一两 甘草(炙)半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，去滓温服。

【主治】伤寒，脉沉在里，而反发汗，津液越出，大便难，表虚里实，遂发谵语，其人如狂者。

55957 **枳实汤**

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】枳实(去瓤，麸炒) 栀子仁各一分 豉二合(绵裹) 雄鼠粪十七个(微炒)

【用法】上为粗末。用淘米泔二盏，先煎取一盏半，后下药，再煎取八分，去滓，分作二服，食前温服，未效再服。

【主治】伤寒大病愈后，劳复阴阳易。

55958 **枳实汤**

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】枳实(去瓤，麸炒)二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，羊乳一盏，羊脂一弹子大，煎至七分，去滓热服，不拘时候。

【主治】霍乱卒哕。

55959 **枳实汤**

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】枳实(陈者，去瓤，麸炒)四个 桂(去粗皮)一两 厚朴(去粗皮，涂生姜汁炙令烟出)四两 栝楼(去皮)一个

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水二盏，入薤白一握，同煎至一盏，去滓温服，空心、日午、临卧各一服。

【主治】风寒客于肝经，著于胸上，膈脘痞闷。

55960　枳实汤

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】枳实(去瓤，麸炒)　柴胡(去苗)　当归(切，焙)　芎䓖　甘草(微炙，锉)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，用水一盏，煎至七分，去滓，食后、夜卧温服。

【主治】髓实证，气勇悍，烦躁惊热。

55961　枳实汤

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】枳实(去瓤，麸炒)　茯神(去木)　葛根(锉)　石膏各二两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】内热暴渴不止。

55962　枳实汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】枳实(去瓤，麸炒)半两　栝楼实一个(并瓤用)　厚朴(去粗皮，生姜汁炙)三两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，用水二盏，煎至一盏，去滓温服，空心、日晚各一服。

【主治】胸痹。

55963　枳实汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】枳实(去瓤，麸炒)四个　厚朴(去粗皮，生姜汁炙)三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，用水二盏，加薤白一握(切)，煎至一盏，去滓温服，空心、日晚各一服。

【主治】胸痹。

55964　枳实汤

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】枳实(去瓤，麸炒)二两　白术三两　桂(去粗皮)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜半分(切)，煎至七分，去滓温服，一日三四次。

【主治】留饮不消，心下痞坚，时复作痛。

55965　枳实汤

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】枳实(去瓤，麸炒)　木香　槟榔(锉)　甘草(炙，锉)　吴茱萸(汤浸，焙干，炒)　葶苈(纸上炒令紫色)各半两　杏仁(汤浸，去皮尖双仁，炒)三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，用水一盏，加生姜一分(拍碎)，同煎至七分，去滓，空心、食前温服，一日二次。

【主治】肺积息贲，上气胸满咳逆。

55966　枳实汤

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】枳实(麸炒)　白术各一两　半夏(汤洗，去滑，晒干)　前胡(去芦头)各二两　桂(去粗皮)　甘草(炙，锉)各一两　赤茯苓(去黑皮)二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，生姜一小块(拍碎)，同煎至八分，去滓温服，空心、日午、临卧各一服。

【主治】寒癖，饮食不化，心下虚满如水状。

55967　枳实汤

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】枳实(去瓤，麸炒)　升麻　甘草(炙，锉)　桑根白皮(锉，炒)　知母(焙)　紫菀(去苗土)　白术　黄耆(细锉)　赤茯苓(去黑皮)　秦艽(去苗土)　黄芩(去黑心)　麦门冬(去心，焙干)各等分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，用水一盏，葱白两茎，同煎至七分，去滓温服。

【主治】水气。

55968　枳实汤

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】枳实(去瓤，麸炒)　草豆蔻　杉木节(锉)　大腹皮(锉)　青橘皮(汤浸，去白，焙)　白术各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜三片，煎至一盏，去滓，食前温服，一日三次。

【主治】风毒，心腹虚胀，脚气痹弱，不能行步。

55969 枳实汤

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】枳实（去瓤，麸炒） 苦参 车前子各一两 黄连（去须）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎取八分，去滓，食后服，临卧再服。

【主治】目风大毒，赤肿胀痛，热泪出。

55970 枳实汤

《圣济总录》卷一五五。为《圣惠》卷七十五"槟榔散"之异名。见该条。

55971 枳实汤

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】枳实（去瓤，炒黄）两片 芍药一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕，用水半盏，煎至三分，去滓，加清酒半合，更煎三五沸，分温二服，空心、午间、晚后各一服。

【主治】小儿风疹，皮肤肿。

55972 枳实汤

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】枳实（去瓤，麸炒） 赤茯苓（去黑皮） 石膏（捣碎）各半两。

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】乳石发，壅热烦闷，渴躁。

55973 枳实汤

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】枳实（去瓤，麸炒令黄） 前胡（去芦头） 槟榔（锉） 木通（锉）各一两 甘草（炙）半两 大黄一两半（锉，炒）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，用水一盏，煎取七分，去滓温服。但得微利即愈。

【主治】乳石发动，大小肠壅滞不通。

55974 枳实汤

《圣济总录》（文瑞楼本）卷一八四。为《圣惠》卷三十八"枳实散"之异名。见该条。

55975 枳实汤

《产育宝庆集》卷上。为《金匮》卷中"枳术汤"之异名。见该条。

55976 枳实汤

【方源】《医方类聚》卷一三〇引《济生》。

【组成】枳实（去瓤，麸炒）半两 厚朴（姜制，炒）一两 大黄（酒蒸） 甘草（炙）各三钱 桂心（不见火）二钱半

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，大枣二个，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热胀。腹胀发热，大便秘实，脉多洪数。

【加减】呕者，加半夏一分。

55977 枳实汤

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】枳实（去瓤，锉片，麦麸炒微黄） 赤茯苓（去皮）各半两 甘草六钱 半夏七钱（汤煮透，滤，锉，焙干） 桔梗七钱半（锉，炒）

【用法】上㕮咀。每服二钱，用水一盏，加生姜二片，煎至七分，温服，不拘时候。

【主治】伤风伤寒，胸满气促，咳嗽不爽，食多夹痰吐出。

55978 枳实汤

【方源】《普济方》卷七十三。

【组成】半夏（汤洗七次，焙）五两 前胡（去芦）四两 枳实（炒）二两 细辛（去苗叶，焙）一两 乌梅七个

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱，用水二盏，加生姜五片，煎取一盏，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】目暴肿痛痒者。

55979 枳实汤

【方源】《普济方》卷一三七。

【组成】枳实一两（炙） 橘皮 半夏各一两 生姜 厚朴各三两

【用法】上以水六升，煮取三升，去滓，分三次温服。

【主治】人病寒饮，气上冲心，胸痞喘急。

【加减】咽痛，加桔梗一两。

55980　**枳实汤**

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】枳实(麸炒)　木香　炙草各一钱　厚朴(姜制)二钱　槟榔一钱五分

【用法】加生姜三片，水煎服。快利为度，后以四君子汤加陈皮和之。

【主治】新产后宿食为病，腹中胀痛，里急窘迫，身热口渴，六脉数实。

55981　**枳实汤**

【方源】《症因脉治》卷四

【组成】厚朴　陈皮　麦芽　陈枳实

【主治】肠胃停食泄痢。

55982　**枳实汤**

《医林绳墨大全》卷一。为方出《圣惠》卷四十二，名见《普济方》卷一八七"枳实散"之异名。见该条。

55983　**枳实汤**

【方源】《古今医彻》卷一。

【组成】枳实一钱五分　陈神曲(炒)一钱　莱菔子一钱五分(炒，研)　青皮一钱　豆豉一钱　茵陈一钱　广皮一钱　山栀一钱(炒)　黄芩一钱　厚朴一钱(姜制)

【用法】加生姜一片，水煎服。

【主治】食疸。

55984　**枳实汤**

【方源】《古今医彻》卷一。

【组成】枳实(麸炒)　紫厚朴(姜制)　广皮各一钱　山楂一钱半　柴胡七分　莱菔子(炒研)一钱　炒砂仁末五分

【用法】加生姜一片，水煎服。

【主治】胸满，右关脉有力，吐蛔不止。

55985　**枳实汤**

【方源】《医学金针》卷三。

【组成】枳实三钱　半夏四钱　生姜八钱

【用法】水煎服。

【主治】气实诸痛。

55986　**枳实酒**

【方源】《普济方》卷一〇八引《简易》。

【组成】枳实不拘多少

【用法】上药用面炒黄，切片，去粗皮。每用二大钱，用酒浸少时，去枳实，但饮酒最妙；再用水煎枳实，洗患处尤佳。一方醋浸，令浥浥炒热，用绵裹熨疹上。

【主治】遍身白疹，瘙痒不止。

55987　**枳实散**

【方源】方出《肘后方》卷四，名见《普济方》卷一八七。

【组成】枳实

【用法】上为末。每服方寸匕，日三服，夜一服。

【主治】①《肘后方》：胸痹，胸中坚痞忽痛，肌中若痹，绞急如刺，不得俯仰，其胸前皮皆痛，不得手犯，胸满短气，咳嗽引痛，烦闷自汗出，或痛引背膂。②《千金》：小儿久痢，淋沥，水谷不调，形羸不堪大汤药者。

【备考】《圣惠》用枳实二两(麸炒微黄)，捣为细散。每服二钱，以清粥饮调下，不拘时候。

55988　**枳实散**

【方源】方出《医心方》卷二十三引《肘后方》，名见《普济方》卷三五二。

【组成】枳实　芍药各等分(并炙)

【用法】上为末。每服方寸匕，一日三次。

【主治】产后虚烦不得眠。

55989　**枳实散**

【方源】《外台》卷十二引《范汪方》。

【组成】枳实八分(炙)　桂心五分

【用法】上为末。每服方寸匕，以酒送下，一日三次。

【主治】①《外台》引《范汪方》：胸痛。②《圣济总录》：心腹卒胀痛，胸胁支满欲死。

【宜忌】忌生葱。

【备考】《圣济总录》用枳实、桂各一两，为细散。每服二钱匕，米饮调下。

55990　**枳实散**

【方源】《外台》卷十二引《深师方》。

【异名】白术枳实散(《圣济总录》卷六十

一）。

【组成】枳实四枚（炙） 神曲一两（熬） 白术一两

【用法】上为末。每服方寸匕，以酒送下，一日三次。

【主治】胸痛。

【宜忌】忌桃李、雀肉等。

55991 枳实散

【方源】张文仲引徐王方（见《外台》卷十九）。

【组成】枳实半斤（炙） 桂心一斤 茯苓 白术各五两

【用法】上为散。每服方寸匕，加至二匕，以酒送下，一日三次。宜春、秋服。

【功用】消肿利小便，兼补。

【主治】脚气肿满，兼风虚冷胀，不能食。

【宜忌】忌生葱、酢物、桃李、雀肉等。

55992 枳实散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】枳实一两（麸炒令黄） 川大黄一两半（锉，微炒） 川朴消一两半 郁李仁一两半（汤浸，去皮尖，微炒） 芎䓖三分 牛蒡子三分（微炒）

【用法】上为细散。每服一钱，以蜜水调下，不拘时候。

【主治】脾脏风毒壅热，鼻塞干燥，大肠秘涩。

55993 枳实散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】枳实（麸炒微黄） 柴胡（去苗） 赤茯苓 泽泻 前胡（去芦头） 半夏（汤洗七遍去滑）各三分 犀角屑半两 甘草半两（炙微赤，锉） 桑根白皮半两（锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒，痰滞胸膈，烦热头痛，不思饮食。

55994 枳实散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】枳实（麸炒微黄） 栀子仁 麻黄（去根节） 柴胡（去苗） 桂心各一两 豉二合

【用法】上细锉，和匀。每服半两，以水一大盏，煎至五分，去滓热服，未汗再服，不拘时候。

【主治】伤寒大病已解，劳复如初。

55995 枳实散

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】枳实一两（麸炒令微黄） 人参一两（去芦头） 干姜半两（炮裂，锉） 白术三分 桂心三分 甘草半两（炙微赤，锉） 桔梗三分（去芦头） 木香半两 半夏半两（汤洗七遍，去滑）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】时气后，脾胃气虚，心腹虚胀，吃食不消。

55996 枳实散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】枳实三分（微炒令黄） 独活一两半 石膏一两 蒴藋一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以酒一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风头晕，起倒无定。

55997 枳实散

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】枳实一两（麸炒微黄） 黄耆一两（锉） 青葙子一两 白前一两 黄芩半两 栝楼根一两 麦门冬一两半（去心，焙） 柴胡一两（去苗） 地骨皮一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳烦热，不欲饮食，四肢少力。

55998 枳实散

【方源】《圣惠》卷三十八。

【异名】枳实汤（《圣济总录》文瑞楼本卷一八四）。

【组成】枳实三分(麸炒微黄)　前胡一两(去芦头)　赤芍药三分　青橘皮三分(汤浸，去白瓤，焙)　当归三分(锉，微炒)　白术三分　大腹皮三分(锉)

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣二个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】乳石发动，因服冷药太过，致心膈痞满，腹内疼痛，不思饮食。

55999　**枳实散**

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】枳实一两(麸炒微黄)　前胡一两(去芦头)　槟榔一两　木通　木香半两　川大黄三两(锉碎，微炒)　甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，温服，不拘时候。

【主治】乳石发动，胸膈疼结，不下饮食，大小肠壅滞，胁肋妨闷。

【备考】方中木通用量原缺。

56000　**枳实散**

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】枳实半两(麸炒微黄)　款冬花三分　赤茯苓三分　甘草半两(炙微赤，锉)　杏仁一两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄)　陈橘皮三分(汤浸，去白瓤，焙)　人参三分(去芦头)　干姜半两(炮裂，锉)　半夏三分(汤洗七遍去滑)　麻黄一两(去根节)　桂心三分

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三个，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】上气，胸中满塞，不得喘息。

56001　**枳实散**

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】枳实一两(麸炒微黄)　半夏一两(汤洗七遍去滑)　桂心一两　青橘皮三分(汤浸，去白瓤，焙)　木香三分　诃黎勒皮一两　当归三分　人参三分(去芦头)　白术三分　甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脏腑久冷，或忧恚结聚，致逆气，心腹满急，呕吐不下食，腹胁疼痛。

56002　**枳实散**

【方源】方出《圣惠》卷四十二，名见《普济方》卷一八七。

【异名】枳实汤(《医林绳墨大全》卷一)。

【组成】枳实一两(麸炒微黄)　木香半两　前胡一两(去芦头)　陈橘皮一两(汤浸，去白瓤，焙)　赤茯苓一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，温温频服之。

【主治】胸痹，心下坚痞，胸背缓急，心腹不利。

【备考】方中赤茯苓，《医统》作“赤芍药”。

56003　**枳实散**

【方源】方出《圣惠》卷四十二，名见《普济方》卷一八六。

【组成】枳实三分(麸炒微黄)　青橘皮一两(汤浸，去白瓤，焙)　桂心三分　细辛三分　桔梗三分(去芦头)

【用法】上为散，每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心痹，胸中气坚急，心微痛，气短促，咳唾亦痛，不能食者。

56004　**枳实散**

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】枳实一两(麸微炒)　桂心一两　诃黎勒一两(煨，用皮)

【用法】上为细散。每服一钱，生姜汤调下，不拘时候。

【主治】心腹卒胀满，胸膈不利，难下饮食。

56005　**枳实散**

【方源】方出《圣惠》卷四十七，名见《普济方》卷三十六。

【组成】枳实半两(麸炒微黄)　人参三两

（去芦头） 陈橘皮二两（汤浸，去白瓤，焙） 吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干，微炒）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】反胃，呕哕吐食，及噎闷。

56006 枳实散

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】枳实半两（麸炒微黄） 木香半两 槟榔半两 诃黎勒皮半两 甜葶苈半两（隔纸炒令紫色） 赤茯苓半两 五味子半两 甘草半两（炙微赤，锉） 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为散。每服三钱，水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】息贲气，腹胁胀硬，咳嗽见血，痰粘不利。

56007 枳实散

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】枳实一两半（麸炒微黄） 半夏一两（汤浸七遍去滑） 白术一两半

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，一日三四次。

【主治】癖结，不能饮食，心下虚满如水者。

56008 枳实散

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】枳实三分（麸炒微黄） 附子一两（炮裂，去皮脐） 紫苏茎叶三分 白术二两 人参三分（去芦头） 川大黄三分（锉碎，微炒） 大腹皮三分（锉） 麦门冬三分（去心） 半夏三分（汤洗七遍去滑） 甘草一分（炙微赤，锉） 吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干，微炒）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三个，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】胸中痰饮，冷热不调，食不消化，体重多卧。

56009 枳实散

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】枳实一两（麸炒微黄） 射干一两 川升麻一两 生干地黄一两 犀角屑一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 前胡一两半（去芦头） 麝香一分（细研）

【用法】上为粗散，入麝香令匀。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】瘰疽。毒气不散，皮肉暗黑，疼痛不可忍。

56010 枳实散 《圣惠》卷六十二。为《千金翼》卷二十二"枳实汤"之异名。见该条。

56011 枳实散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】枳实一两（麸炒微黄） 麦门冬半两（去心） 陈橘皮五分（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，葱白七寸，煎至六分，去滓温服，不拘时候

【主治】妊娠伤寒，四日至六日以来，加心腹胀，上气，渴不止，食饮不多，腰疼体重。

56012 枳实散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】枳实三分（麸炒微黄） 人参三分（去芦头） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 麦门冬三分（去心） 赤茯苓三分 半夏半两（汤浸七遍去滑） 甘草半两（炙微赤，锉） 藿香半两 枇杷叶半两（拭去毛，炙微黄）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠气壅，心胸不利，痰逆，不思饮食。

56013 枳实散

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】枳实三分（麸炒微黄） 木香三分 桂心半两 当归三分（锉，微炒） 槟榔一两 白术半两 牡丹三分，益母草半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】产后两胁胀满，气壅烦闷。

56014　**枳实散**

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】枳实(麸炒)　槐实(炒)　木贼各半两

【用法】上为散。每服二钱匕,煎皂荚子汤调下,不拘时候。

【主治】痔疾下血。

56015　**枳实散**

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】枳实(去瓤,麸炒)　当归(切,炒)　牛膝(去苗,酒浸,切,焙)　桑根白皮(锉)各一两　大黄(略炒)　牡丹皮　甘遂各半两　防己三分　人参　猪苓(去黑皮)　青橘皮(去白瓤,炒)各一两　槟榔(锉)　木香(炮)各半两

【用法】上为散。每服二钱匕,用沸汤点服,一日二次。

【主治】妇人血分,身体浮肿,心腹烦满。

【备考】《普济方》有甘草,无甘遂。

56016　**枳实散**

【方源】《本事》卷七。

【组成】枳实一两(麸炒,去瓤)　白芍药(炒黄)　雀脑芎　人参(去芦)各半两

【用法】上为细末。每服二钱,食前姜枣汤调下,酒亦得,一日三次。

【主治】男子两胁疼痛。

【方论选录】《本事方释义》:枳实气味苦寒,入足太阴;白芍气味酸微寒,入足厥阴;雀脑芎气味辛温,入足少阳、厥阴;人参气味甘温,入足阳明;姜枣汤调送,或酒送,俱取其调和荣卫,先升后降也。男子两胁疼痛,皆由肝气乘中,故以苦寒、酸寒、辛温之药升降其气,而以甘温之品和其中,疼自止矣。

56017　**枳实散**

【方源】《普济方》卷一八七。

【组成】枳实(麸炒微黄,去瓤)　厚朴各三两(去皮,炙香,姜汁制)　桂心　半夏各一两(汤洗七次去滑)　前胡(去芦)

【用法】上为散。每服三钱,水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓稍热服。

【主治】胸痹,心下坚痞缓急,气结不通。

【备考】方中前胡用量原缺。

56018　**枳实散**

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】陈枳实　莱菔子　麦芽　山楂肉

【主治】食积,肚腹胀急,按之实痛,脉右关多滑,或沉实,或滑动,或弦急。

56019　**枳实膏**

【方源】《幼幼新书》卷三十七引《婴孺方》。

【组成】枳实(炙)四分　茺蔚子　防己各五分　升麻六分　竹叶七合　石膏二两　芒消十二分

【用法】用麻油一升四合,煎四五沸,去滓,收膏。外涂疮上。

【主治】小儿风疹及肿。

56020　**枳茹酒**

【方源】《千金》卷八。

【组成】枳实(上青)

【用法】取上药刮取末,欲至心止,得茹五升,微火炒去湿气,以酒一斗渍,微火暖令得药味。随性饮之。

【主治】急风缓风,口僻眼急。

56021　**枳香散**

【方源】《松峰说疫》卷二。

【组成】枳壳五钱　木香一钱

【用法】上为末。每服一钱,滚水调下,不应再服。

【主治】瘟疫呃逆。

56022　**枳桔汤**

《症因脉治》卷四。为《苏沈良方》卷三"枳壳汤"之异名。见该条。

56023　**枳梗汤**

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】枳壳　桔梗　甘草各等分

【用法】水煎,温服。

【主治】结胸痞气,胸满不利,烦闷欲死,不论寒热通用。

【加减】表热或寒热往来,加柴胡、黄芩;内

热，加黄连；痰喘，加瓜蒌仁；口燥，加天花粉，去半夏。

56024 枳梗汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】川贝母 薏苡仁 桑白皮 地骨皮 葶苈子 枳壳 桔梗 杏仁 甘草

【主治】肺痈肺痿，寸口脉实者。

56025 枳椇粥

【方源】《老老恒言》卷五。

【组成】枳椇子

【用法】煮粥，醉后次早空腹食之。

【功用】除烦清热，解酒毒，解烦渴。

【主治】《药粥疗法》：醉酒，烦热，口渴。

【备考】枳椇子10～15克 粳米30～60克，先将枳椇子煎取浓汁，去滓，入粳米煮为稀粥。

56026 枳橘汤

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】橘枳汤（《杏苑》卷四）。

【组成】橘皮八钱 枳壳一钱半 生姜四钱

【用法】水煎，食远温服。须审气滞何部，以引经药导之。

【主治】胸痹，胸中气塞，短气。

【加减】郁甚，加姜黄少许。

56027 枳橘散

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】枳壳 橘红 姜黄各二钱 甘草一钱

【主治】右胁痛。

56028 枳橘熨

【方源】《济阴纲目》卷七。

【组成】枳实 陈皮各四两

【用法】上炒令香熟，以绢袋盛之，遍身从上至下，及阴肿处，频频熨之，冷则换之，直至喉中觉枳实气，则痛止肿消便利也。

【功用】行气。

【主治】妇人阴肿如石，痛不可忍，二便不利。

56029 枳壳饮子

【方源】《博济》卷四。

【异名】枳壳散（《妇人良方》卷五）。

【组成】枳壳二两（去皮，麸炒） 半夏一两（汤洗七遍，以生姜汁浸三宿，麸炒令黄） 红芍药一两 柴胡（去芦）一两半 黄芩一两半

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，生姜一块（劈破），大枣二个，同煎至八分，去滓温服。候五心烦热及身体壮热、潮热退方住服。

【主治】妇人手足烦热，夜卧多汗，肌肉黄瘁，经候不匀，四肢烦倦，心腹满闷，状似劳气。

56030 枳壳浸酒

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】枳壳五两（麸炒微黄，去瓤） 秦艽四两（去苗） 独活四两 肉苁蓉四两 丹参五两 蒴藋五两 松叶（切）一升

【用法】上细锉，用生绢袋贮，以清酒二斗五升，浸五七宿。每服暖酒一小盏，不拘时候。

【主治】风瘙痒，皮中如虫行之状。

56031 枳壳浸酒

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】枳壳（刮取上面青末）三斤

【用法】上以微火炒去湿气，以酒二斗浸之，其药瓶常令近火，微暖，令药味得出。七日后，随性饮之。

【主治】风，口偏眼急。

56032 枳壳煮散

【方源】《本事》卷七。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒黄） 细辛（去叶） 桔梗（炒） 防风（去钗股） 川芎各四两 葛根一两半 甘草二两（炙）

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，煎至七分，滤去滓，空心、食前温服。

【主治】悲哀烦恼伤肝气，致两胁骨疼痛，筋脉紧急，腰脚重滞，两股筋急，两胁牵痛，四

肢不能举，渐至脊膂挛急。

【方论选录】《本事方释义》：枳壳气味苦寒，入足太阴；细辛气味辛温，入足少阴；桔梗气味苦辛平，入手太阴；防风气味辛甘微温，入足太阳；川芎气味辛温，入足少阳、厥阴；葛根气味辛甘平，入足阳明；甘草气味甘平，入足太阴，能缓药之性。此由肝气不舒，故用苦降升散之药，再佐以甘缓，及姜之和卫，使升降不致偏胜也。

56033　枳壳煮散

《证治宝鉴》卷九。为《圣济总录》卷五十四“枳壳汤”之异名。见该条。

56034　枳壳煮散

【方源】《类证治裁》卷二。

【组成】枳壳　桔梗　甘草　细辛　葛根　肉桂　橘红　苏子　姜　枣

【主治】肝咳，胁痛。

56035　枳壳锉散

【方源】《直指》卷十七。

【组成】厚朴(制)　枳壳(制)　北桔梗各半两　甘草(炙)　大黄(蒸)各一分

【用法】上锉。每服三钱，加生姜五片，大枣二个，乌梅一个，煎服。

【主治】热证胀满。

56036　枳壳煎丸

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】枳壳三两(麸炒微黄，去瓤，捣罗为末，以米醋二升，慢火熬如饧)　五灵脂一两　川大黄一两半(锉碎，微炒)　蓬莪术一两　桂心一两　木香一两　川乌头一两(炮裂，去皮脐)　诃黎勒皮一两　当归一两(锉，微炒)

【用法】上为细末，入前煎中，搜和为丸，如梧桐子大。每服十五丸，渐加至三十丸，食前生姜汤送下。

【主治】妇人痃癖气，呕吐酸水，腹胁胀痛，面色萎黄，不能饮食。

56037　枳壳煎丸

【方源】《普济方》卷二二〇引《博济》。

【组成】枳壳(去瓤，麸炒)四两　厚朴(去皮，姜汁制)　杏仁(去皮尖双仁，炒)　吴茱萸(洗)　干姜(炮)　附子(炮裂，去皮脐)各半两　艾叶(伏通者，揉如绵)四两

【用法】上为末，以酽醋一斗，于银石器内煎艾得所，次入药末同煎，杵为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，空心温酒或生姜汤送下。

【主治】脾元虚冷，泄泻，不思饮食，时多干哕。

56038　枳壳熨方

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【异名】枳壳散(《圣济总录》卷一四二)。

【组成】枳壳四两　诃子皮二两

【用法】上捣碎。于铫子内炒令热，以帛裹熨之，冷即再炒熨之。

【主治】忽患诸痔有头，疼痛不可忍。

56039　枳实熨方

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】枳实(生用)八两

【用法】上捣碎，以醋浸令浥浥，炒热，用熟帛包裹，熨疹上，冷即易。分作两包子，更相炒熨尤佳。

【主治】风白疹。

56040　枳实熨方

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】枳实一个

【用法】在石上磨令滑泽，钻安柄子，蜜涂炙令暖，熨之，冷更易之，肛缩入即止。

【主治】积冷下痢脱肛。

56041　枳椇子丸

【方源】《得效》卷七。

【组成】枳椇子二两　麝香一钱

【用法】为上末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤吞下。

【主治】消渴。饮酒多，发积为酷热，熏蒸五脏，津液枯燥，血涩，小便多，肌肉消铄，专嗜冷物寒浆。

56042　枳马二仙丹

【方源】《外科十三方考》卷下。

【主治】胸腹痞胀,嗳气不食,面浮目黄,心悸胁鸣,漉漉作声,小便短赤。

56051　**枳石平胃散**

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】热苍术　厚朴　广皮　甘草　枳实　石菖蒲　山楂肉　莱卜子

【主治】食滞胃家,外冒表邪,寒凝抑遏,皆发谵语。

56052　**枳朴二陈汤**

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】枳实　厚朴　半夏　白茯苓　广皮　甘草

【功用】消食化痰,利气宣导。

【主治】食积。胃家有痰,饱满不食,恶心呕吐,或攻四肢,肩背作痛,下遗大肠,时泻时止,或时吐痰,口中觉甘,脉滑大。

56053　**枳朴大黄丸**

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】枳实　厚朴　大黄(酒煨)各等分

【用法】炼蜜为丸,如芡实大。每服一丸,用大栀子一个(擘破),淡豆豉三粒,水煎浓汁化下。

【主治】小儿伤食,腹满烦热,及伤寒后食复。

56054　**枳朴大黄丸**

【方源】《育婴秘诀》卷三。

【组成】枳实(炒)　厚朴(姜汁炒)　大黄(酒蒸)各等分　槟榔减半

【用法】上为细末,神曲糊丸,如黍米大。姜汤送下。

【功用】攻下。

【主治】小儿伤食证,导之不去者。

56055　**枳朴大黄汤**

《赤水玄珠》卷四。为《金匮》卷中"厚朴大黄汤"之异名。见该条。

56056　**枳朴大黄汤**

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】陈枳实　厚朴　广皮　甘草　大黄

【主治】食积腹胀,一条扛起,痛而欲利,利后稍减,脉右关多滑,或见沉实,或见滑动,或见弦急。

56057　**枳朴平胃散**

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】枳实　厚朴　苍术　陈皮　甘草

【主治】食气霍乱,病在中,胸前饱闷,胀痛嗳气,吐泻交作,呕出食物,泻下酸馊,脉滑大,或沉实。

56058　**枳朴香砂汤**

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】枳壳　厚朴　香附　砂仁

【主治】气结腹痛,心腹胀者。

56059　**枳朴柴陈汤**

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】柴胡　黄芩　半夏　甘草　陈皮　白茯苓　枳壳　厚朴　赤芍

【主治】泄泻,脉滑有热者。

56060　**枳壳人参丸**

《普济方》卷九十六。为《圣济总录》卷九"枳壳丸"之异名。见该条。

56061　**枳壳大黄汤**

【方源】《医便》卷二。

【组成】枳壳一钱半　槟榔一钱　厚朴一钱　大黄壮实者五七钱,虚人三四钱

【用法】上用水一钟半,先煎三味至一钟,下大黄再煎二三沸,热服。得快利为妙。

【主治】痢初一二日,元气未虚。

56062　**枳壳大黄汤**

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】大黄　枳壳　桔梗　甘草

【主治】燥伤气分,下利白积,腹中作痛,脉洪数。

56063　**枳壳大黄汤**

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】枳壳　大黄　陈皮　木通　葛根　厚朴　甘草

【主治】酒积腹痛,痛而欲利,利下黄沫,天明即发,饮酒痛甚,小便赤涩,脉沉数者。

【加减】胸满闷，加豆蔻、砂仁。

56064 **枳壳川连汤** 《症因脉治》卷四。为《医学正传》卷五引《局方》"秘方枳壳汤"之异名。见该条。

56065 **枳壳木香丸**

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒）二两 木香 大黄（纸裹煨）各半两 槟榔（锉） 郁李仁（汤浸，去皮尖，焙，研） 芎䓖各一两

【用法】上为末，入郁李仁拌匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，食后、临卧，温生姜汤送下。

【主治】留饮宿食不消。

56066 **枳壳木香散**

【方源】《养老奉亲》。

【组成】木香一两 神曲（杵末，炒）四两 京三棱四两（炮） 青橘皮（去瓤）三两 甘草三两（炮） 益智（去皮）二两 白芷一两 桂三两 莪术三两（炮） 白术（微炒）二两 枳壳（麸炒，炮）

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，加生姜、盐各少许，同煎至七分，并滓热服。

【功用】和脾胃气。

【主治】脾胃不和，胸膈痞闷，心腹刺痛。不思饮食者。

【备考】方中枳壳用量原缺。

56067 **枳壳化滞汤**

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】枳壳 厚朴 神曲 广皮 莱菔子 麦芽 砂仁

【主治】大肠胀。肠鸣而痛，濯濯有声音。

【加减】热者，加川连；便硬，加大黄。

56068 **枳壳半夏汤**

【方源】《得效》卷四。

【组成】枳壳 半夏 黄芩 桔梗各二两 甘草五钱

【用法】上锉散。每服四钱，加生姜三片，桑白皮七寸，乌梅一个，煎服。末效，加葶苈子、马兜铃、防己、薄荷。

【功用】除痰热，下气宽中，利膈清上。

【主治】痰热痞满。

56069 **枳壳半夏汤**

【方源】《普济方》卷三六八。

【组成】枳壳一两（泡，去瓤，炒） 半夏一两（汤泡七次）

【用法】上分二服。用水一盏，加生姜十片，煎至一小碗，大人分二服，十岁以下儿分作五服。

【主治】伤寒呕者；小儿呕逆。

56070 **枳壳防风丸**

【方源】《婴童百问》卷五。

【异名】枳壳丸（《丹溪心法附余》卷二十二）。

【组成】枳壳（麸炒） 防风（去芦） 独活（去芦） 大黄（煨）各一钱 前胡（去芦） 当归 麻黄（去节）各一钱

【用法】上为细末，面糊为丸，如黍米大。每服十丸，食后米饮送下。

【主治】小儿龟背龟胸，鹤膝行迟。

56071 **枳壳羌活丸**

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒）二两 羌活（去芦头） 牡荆实 人参各一两半 防风（去叉） 芍药 白茯苓（去黑皮） 白芷各二两 细辛（去苗叶） 当归（切，焙） 甘草（生用）各一两 牡丹皮二两半 芎䓖三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如大弹子大。每服一丸，水一盏，煎至八分，食后细呷。

【主治】妇女血风攻注，四肢麻木瘙痒，有如虫行，或肌生赤肿疼痛，肩背拘急，神情倦怠。

56072 **枳壳青皮饮**

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】枳壳 青皮 大腹皮各等分

【主治】三焦胀满，气满肤中，空空然响。

【加减】上焦胀，加桔梗；中焦胀，加苏梗；下焦胀，加木通。

56073 **枳壳青皮饮**

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】枳壳　青皮　木通　苏梗

【主治】气结腹痛，痛攻胁肋。

56074　**枳壳栀子汤**

【方源】《伤寒图歌活人指掌》卷四。

【组成】枳壳一个　肥栀子三个　豉一两

【用法】清浆水二盏半，空煮退八分，纳二药，煎取九分，下豉煎，去滓服。覆令汗出。

【主治】伤寒劳复，发热者。

56075　**枳壳荆芥散**

【方源】《普济方》卷二九七。

【组成】荆芥　防风　栝楼　木通　当归　皂角刺　甘草　陈皮　茯苓　枳壳各等分

【用法】上为末。每服半两，水一盏，煎至七分，和滓空心温服。后用淋洗药：甘松、风眼草、蒴藋（用根叶茎全）、华葱各等分，为粗末。每用药一两，水二碗，煎三五沸，痒痛时淋洗。

【主治】肠风痔漏，并脏毒下血，脱肛疼痛。

56076　**枳壳前胡汤**

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】枳壳　前胡　防风　赤茯苓　苏梗　桔梗　甘草

【用法】水煎服；气急者，以沉香磨水兑服。

【主治】麻疹后咳嗽气急。

【备考】原书用本方治上症，去甘草、桔梗、苏梗，加苏子、芥子、莱服子、葶苈、栝蒌霜。

56077　**枳壳除痔丸**

【方源】《普济方》卷二九六。

【组成】大枳壳四两（去瓤，别为末）　大草乌四两（不去皮尖，别为末）

【用法】上以草乌细末，入猪大脏内，用醋四五斤，煮脏十分烂为度，余醋些小，捣候脏烂，入枳壳末，再捣匀为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，空心、临卧时温米饮送下。片时以臭椿皮煎汤外洗。

【主治】痔漏。

【宜忌】忌热饮食。

【加减】审是热毒气者，减草乌，增入黄连，槐花之类。

56078　**枳壳桔梗汤**　《得效》卷十一。为《苏沈良方》卷二“枳壳汤”之异名。见该条。

56079　**枳壳桔梗汤**

【方源】《得效》卷十二。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒）　桔梗（去芦）　青皮（去瓤）　陈皮（去白）各五钱　木香三钱　当归　粉草各五钱

【用法】上为散。每服二钱，水一盏，加生姜二片，煎汤，温服。

【主治】邪正交争，冷热不调，腹痛呕吐。

56080　**枳壳桔梗汤**

【方源】《医方类聚》卷五十六引《修月鲁般经》。

【组成】赤茯苓二两　半夏二两　枳壳　赤芍药各二两　桔梗二两　甘草半两　（一方加白术二两）

【用法】每服四钱，加生姜、大枣，水煎服。

【功用】行气下膈，快中焦，开痞胀，解寒邪，和荣卫，除烦闷，治痰逆。

【主治】感冒时邪，荣卫受邪，壅滞不通。

【加减】治湿嗽有痰者，加白术；治妇人妊娠恶阻而不食者，加当归；调理病后虚烦不得卧者，加竹茹。

56081　**枳壳宽肠散**

《赤水玄珠》卷二十六。为《局方》（人卫本）卷九（吴直阁增诸家名方）“滑胎枳壳散”之异名。见该条。

56082　**枳壳理中汤**

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】炮姜一钱半　白术一钱半（炒）　枳壳一钱半（炒）　赤芍一钱半　肉桂一钱半（去皮）　砂仁三钱（炒灰）

【用法】水煎浓汁，去滓温服。

【主治】产后恶露冲脾，胀满，脉沉滞者。

【方论选录】产后脾虚气滞，血瘀不消，故冲逆于中，而胀满不止，不治必成血臌。白术健脾运化以退胀，枳壳泻滞宽中以除满，赤芍破血降瘀，肉桂暖血温经，炮姜温中以逐

冷滞，砂仁和胃以祛瘀血。水煎温服，使脾健气强，则瘀血顿化，胀满自已，何血臌之足忧哉！

56083 **枳壳黄连汤**

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】枳壳 川连 甘草

【主治】积热咳嗽，热结大肠者。

56084 **枳壳黄耆丸**

【方源】《普济方》卷二九五引《经验良方》。

【组成】枳壳 黄连各五两 白鸡冠花 黄耆各一两 荆芥二两半

【用法】上为末，糊为丸。每服三十丸，荆芥汤送下。

【主治】痔。

【备考】《医方类聚》引《经验良方》有槐花一两半，防风一两，白芍三两半。

56085 **枳壳滑胎散**

《局方》（校经山房本）卷九（吴直阁增诸家名方）。即原书（人卫本）卷九"滑胎枳壳散"。见该条。

56086 **枳壳疏肝散**

【方源】《杂病源流犀烛》卷十。

【组成】枳壳 枳实 川芎 柴胡 陈皮 香附 白芍 炙草

【主治】肝实火盛之左胁痛。

56087 **枳壳瘦胎散**

《妇科玉尺》卷二。为《广嗣纪要》卷十三"枳壳散"之异名。见该条。

56088 **枳壳橘皮汤**

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】茯苓 白术各一两半 人参 枳壳各一两 陈橘皮三分

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏半，加生姜七片，同煎至七分，去滓温服，每日二三次。

【主治】痰气停积，胸中痞满，呕吐，不思饮食。

56089 **枳连二陈汤**

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】枳实一钱（拌炒川连八分） 竹沥半夏 广皮 赤苓 山楂各一钱半 滑石三钱（包） 木通 葛根各七分 生炙草二分

【主治】风寒夹食积痰饮，脘痛痞胀。

56090 **枳连导滞汤**

【方源】《活幼心法》卷末。

【组成】陈枳壳（去瓤，炒） 黄连 山栀仁（炒黑）各六分 赤芍 前胡 连翘（去心蒂）各四分 三棱 莪术（俱醋炒） 槟榔 甘草各三分

【用法】水煎，食远服。

【主治】小儿腹痛属热者。

【加减】如热甚，大便秘者，加酒炒大黄一钱二分，微利之。

56091 **枳实二陈汤**

【方源】《医林绳墨大全》卷一。

【组成】枳实 陈皮 茯苓各一钱五分 半夏二钱 甘草五分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】外伤风寒，中气不清，胸膈满闷。

56092 **枳实三百丸**

【方源】《百一》卷十四。

【组成】枳实 槐花（生用）各半两 皂角刺一两半（生用，半烧存性）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，约可得三百丸。每服三十丸，食前米饮送下；酒下亦可。

【主治】肠风久而下脓血，日数十度者。

56093 **枳实大黄汤**

《医学发明》（拔粹本）。即原书（人卫本）卷八"导气除湿汤"。见该条。

56094 **枳实大黄汤**

《普济方》卷一四二。为《金匮》卷中"栀子大黄汤"之异名。见该条。

56095 **枳实大黄汤**

【方源】《回春》卷五。

【组成】枳实 大黄 槟榔 厚朴各二钱 木香五分（另研） 甘草三分

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】食积痛,并积热痛,大便不通者。

56096　枳实大黄汤

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【组成】赤芍　青皮　枳实　桃仁(去皮尖)　金银花　槐花　黄芩(酒炒)　大麻仁　连翘各一钱　大黄三钱

【用法】水煎,微温服。

【主治】痧毒结于大肠。

56097　枳实天麻汤

【方源】《活人心统》。

【组成】白术　陈皮　半夏　天麻　人参　甘草(炙)　枳实(炒)　茯苓(去木)　川芎

【用法】上用水二钟,加生姜三片,煎七分服,滓再煎服。

【主治】痰湿气虚所致之眩晕。

【加减】痰火脉数口干,去半夏,减人参,加贝母、酒炒黄连;手足厥冷脉迟者,加附子。

56098　枳实木香丸

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】枳实(去瓤,麸炒)二两　木香　陈橘皮(汤浸,去白,焙)　人参　海藻(水洗去咸,焙)　葶苈(纸上炒令紫色)各一两　芍药(锉)　丁香各三分

【用法】上为末,煮枣肉和丸,如梧桐子大。每服二十丸,渐加至三十丸,用炒豆煎汤送下,空心、日午、夜卧各一服。

【主治】肺积,息贲气上者。

56099　枳实分消汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】川厚朴(去皮,姜汁炒)五钱　枳实(麸炒)二钱半　大黄(酒蒸)一钱半　官桂一钱二分　甘草(炙)一钱五分

【用法】上锉。加生姜、大枣,水煎服。

【主治】热胀,腹胀发热,脉浮数,饮食如故。

【加减】呕吐,加半夏;自利,去大黄;寒多,加干姜。

56100　枳实白术汤

《外台》卷八引《备急》。为《金匮》卷中"枳术汤"之异名。见该条。

56101　枳实半夏丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】枳实一两(麸炒黄色,去瓤)　半夏一两半(汤洗七次,切作片子,焙干)　白术三分　蓬莪术半两　白茯苓一分(去皮)

【用法】上为细末,用生姜汁煮面糊为丸,如梧桐子大。每服六七十丸,陈橘皮汤送下,不拘时候。

【功用】消痰顺气,利胸膈,进饮食。

56102　枳实半夏汤

【方源】《准绳·类方》卷一引《局方》。

【组成】枳实　半夏各等分

【用法】上加麦蘖,每服七钱,水二盏,加生姜五片,煎八分,温服,不拘时候。

【主治】内伤饮食。

56103　枳实半夏汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】枳实(去瓤,麸炒)　半夏(为末,生姜汁制作饼,焙)　木香　干姜(炮)各半两　五味子三分　人参　青橘皮(汤浸,去白,焙)　甘草(炙,锉)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加生姜三片,大枣一个(擘破),同煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后短气不足。

【备考】方中人参、青橘皮用量原缺。

56104　枳实半夏汤

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】半夏一两(切作片子,汤洗七次,去滑)　陈橘皮(去白)一两　枳实(汤浸,去瓤,薄切,麸炒黄)半两

【用法】上㕮咀。每服五钱,水一盏半,加生姜十片,煎至一盏,去滓温服,不拘时候。

【主治】痰饮停留,胸膈痞闷,或咳嗽气塞,头目昏重,呕哕恶心,项背拘急。

56105　枳实半夏汤

【方源】《医钞类编》卷十三。

【组成】枳实　法半夏　神曲　麦芽　枳

椇子

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】酒停胸膈，化为痰饮。

56106 **枳实芍药散**

【方源】《金匮》卷下。

【组成】枳实（烧黑，勿大过） 芍药各等分

【用法】上为散。每服方寸匕，一日三次，以麦粥送下。

【功效】《金匮要略浅注》：调和气血之滞。

【主治】产后腹痛，烦满不得卧；痈脓。

【方论选录】《金匮要略本义》：产妇血流不快，积于腹中作痛，心烦胁满不得卧，此为实邪。法应开散而行其瘀滞，则诸病可已。枳实烧黑者，入血中行积也；加以芍药走血分，而血瘀可散矣；以麦粥下之者，即大麦粥取其滑润宜血，且有益胃气也。

56107 **枳实导滞丸**

【方源】《内外伤辨》卷下。

【异名】枳术导滞丸（《脾胃论》）、导气枳实丸（《医学入门》卷八）。

【组成】大黄一两 枳实（麸炒、去瓤） 神曲（炒）各五钱 茯苓（去皮） 黄芩（去腐） 黄连（拣净） 白术各三钱 泽泻二钱

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十至七十丸，食远温开水送下。

【功用】《中药制剂手册》：祛湿清热，消积导滞。

【主治】①《内外伤辨》：伤湿热之物，不得施化，而作痞满，闷乱不安。②《中药制剂手册》：脾胃湿热引起的胸满腹痛，消化不良，积滞泻泄，或下痢脓血，里急后重。

【方论选录】《医方集解》：此足太阴、阳明药也，饮食伤滞，作痛成积，非有以推荡之则不行，积滞不尽，病终不除。故以大黄、枳实攻而下之，而痛泻反止，经所谓"通因通用"也；伤由湿热，黄芩、黄连佐以清热，茯苓、泽泻佐以利湿；积由酒食，神曲化食解酒，温而消之；芩、连、大黄苦寒太过，恐伤胃气，故又以白术之甘温，补土而固中也。

【备考】本方加木香、槟榔，名"木香导滞丸"（见《医学正传》卷二）。本方方名，《金匮翼》引作"导滞丸"。

56108 **枳实导滞汤**

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】枳实 山楂肉 连翘 半夏（姜制） 黄连（酒炒） 木通 甘草 紫草茸

【用法】水煎，加槟榔末服之。

【主治】伤食郁遏，痘疹热久不出，而内实者。

56109 **枳实导滞汤**

《片玉痘疹》卷六。为《医部全录》卷四九〇引《幼幼全书》"枳实导滞散"之异名。见该条。

56110 **枳实导滞汤**

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】枳实（炒）三钱 白术（炒焦）五钱 茯苓三钱 黄芩（酒炒）二钱 黄连（姜汁炒）三钱 泽泻（炒）二钱 大黄（酒蒸）一两 神曲（炒）四钱 生姜三片

【用法】水煎，食远服。

【主治】伤湿热之物，痞闷不安。

【方论选录】此枳术丸合三黄汤，而兼五苓之制，以祛湿热宿滞也。

56111 **枳实导滞汤**

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】小枳实二钱 生锦纹一钱半（酒洗） 净楂肉三钱 尖槟榔一钱半 薄川朴一钱半 小川连六分 六和曲三钱 青连翘一钱半 老紫草三钱 细木通八分 生甘草五分

【功用】下滞通便。

【主治】温病热症，里有积滞。

【方论选录】凡治温病热证，往往急于清火，而忽于里滞。不知胃主肌肉，胃不宣化，肌肉无自而松，即极力凉解，反成冰伏。此方用小承气合连、槟为君，苦降辛通，善导里滞；臣以楂、曲疏中，翘、紫宣上，木通导下；佐以甘草和药，开者开，降者降，不透发而自透发。每见大便下后，而疹瘫齐发者以此，此为消积下

滞，三焦并治之良方也。

56112　枳实导滞散

【方源】《医部全录》卷四九〇引《幼幼全书》。

【异名】枳实导滞汤《片玉痘疹》卷六。

【组成】枳实　山楂肉　连翘　半夏(姜制)　酒黄连　木通　酒大黄　甘草　紫草

【用法】水煎，与槟榔末同服。

【主治】痘疹内实不出。

56113　枳实连槟丸

《医略六书》卷二十八。为《宣明论》卷十一“枳实槟榔丸”之异名。见该条。

56114　枳实青皮汤

【方源】《医便》卷二。

【组成】白术一钱半　枳实　青皮　陈皮　黄连(姜汁炒)　麦芽　山楂肉　神曲(炒)各一钱　甘草三分　酒大黄一钱七分

【用法】用水二钟，煎一浅钟，温服。

【主治】食热物过伤太阴、厥阴，呕吐，膨胀下痢，伤之轻者。

56115　枳实栀子汤　《千金》卷十。为《伤寒论》“枳实栀子豉汤”之异名。见该条。

56116　枳实厚朴汤

【方源】《家塾方》。

【组成】枳实一钱二分　厚朴一钱八分

【用法】上以水一合五勺，煮取六勺，送下承气丸八分。

【主治】腹满，或燥屎不通者。

56117　枳实桔梗汤

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】枳实(麸炒)七个　陈橘皮(汤浸，去白，焙)　桔梗(炒)各半两　甘草(炙)一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一枣大(拍破)，薤白五寸(切)，煎至八分，去滓温服。

【主治】胸痹。心下气坚，疗刺不可俯仰，气促，咳唾引痛，不能食。

56118　枳实柴胡汤

【方源】《普济方》卷一三三引《济生》。

【组成】枳实半两(麸炒令紫色，去瓤)　柴胡(去苗)二两　黄芩一两半　人参半两　甘草(炙)一两半

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，大枣一个，同煎至七分，去滓温服，一日三次，不拘时候。

【主治】虚烦昏闷，呕逆恶心，往来寒热，胸膈闷，肢节痛，日晚所发潮热者。

56119　枳实消痞丸　《兰室秘藏》卷上。为原书同卷“失笑丸”之异名。见该条。

56120　枳实消痞丸

【方源】《明医指掌》卷五。

【组成】枳实一钱(炒)　山楂肉一钱　黄连(炒)一钱　神曲(炒)一钱　甘草(炙)一钱　猪苓一钱　泽泻八分(去毛)　厚朴(姜汁拌炒)八分　砂仁八分(炒)　陈皮一钱　人参一钱(去芦)　黄芩一钱(炒)　干姜八分　姜黄八分　白术(炒)一钱

【用法】上为末，蒸饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后白汤送下。

【主治】食积，心下虚痞，按之痛者。

56121　枳实消滞汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】枳实　厚朴　神曲　广陈皮　莱菔子　麦芽

【主治】外感遗尿，身体发热，神志不清，小便自出而不觉，尿色黄赤，右脉滑实，食填太仓者。

56122　枳实理中丸

《活人书》卷十八。为《外台》卷三引《崔氏方》“增损理中丸”之异名。见该条。

56123　枳实理中丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】人参(去芦头)　干姜(炮)　甘草(炙)　白术　枳实(麸炒)　茯苓(去皮)各一两　附子(炮，去皮脐)半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两作四丸。每服一丸，水一大盏，煎至六分，和滓温服，不拘时候。

【主治】胸痹，心下痞，留气结胸，胸满，胁下逆气抢心。

56124 **枳实理中丸**

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】人参 白术 茯苓各一两 甘草 干姜各七钱半 枳实六钱 黄芩二钱半

【用法】上为蜜丸，如弹子大。每服一丸，沸汤化下。

【主治】太阴病误下，寒实结胸，及伤寒诸吐利后，胸痞欲绝，高起而痛，手不可近。

【加减】如渴，加天花粉；汗利不止，加牡蛎。

56125 **枳实理中丸**

【方源】《寒温条辨》卷五。

【组成】枳实（麸炒） 瓜蒌 牡蛎粉 白术（土炒） 甘草各一钱 干姜（炒）八钱 人参 黄连 黄芩各三钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡子黄大。以热汤化服一丸。觉腹中热，胸中豁然矣，未热加丸再服。

【主治】伤寒误下虚逆，气不调理，结胸欲绝，心胸高起，手不可近。

56126 **枳实理中汤** 《易简方》。即《外台》卷三引《崔氏方》“增损理中丸”改作汤剂。见该条。

56127 **枳实理中汤**

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】枳实 干姜 人参 白术 甘草 砂仁 桔梗 陈皮 厚朴

【用法】加生姜，水煎服。仍用生姜二三两捣滓，擦胸中。

【主治】寒结胸，心下满闷，按之痛；及胃口着寒，伤生冷者。

【加减】寒甚，加熟附子；生冷饮食，胃口着寒，加草果、丁香；有寒痰，加半夏。

56128 **枳实理中汤**

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】白术二钱（炒） 枳实一钱半（炒） 炮姜三钱 茯苓二钱 炙草六分

【用法】水煎，去滓温服。

【功用】温中化滞开结。

【主治】脾亏寒滞，不能运化，而痞结于中，脐腹疼痛，饮食减少，脉细滑者。

【方论选录】白术健脾元以运化，枳实破滞气以消痞，炮姜温中逐冷，炙草益胃缓中，茯苓渗湿以和脾。水煎，温服，俾寒化滞行，则脾强气旺而痞结自开，何患疼痛不退，饮食不进乎。

56129 **枳实理中汤**

【方源】《一盘珠》卷四。

【组成】人参 白术 甘草 干姜 枳实 木香 茯苓

【用法】灯心为引

【主治】脾虚腹满，肠鸣飧泄，饮食不化。

56130 **枳实槟榔丸**

【方源】《宣明论》卷十一。

【异名】枳实连槟丸（《医略六书》卷二十八）。

【组成】枳实 槟榔 黄连 黄柏 黄芩 当归 阿胶（灰炒，细研） 木香各半两

【用法】上为末，水和为丸，如小豆大。每服三十丸，温米饮送下，一日三次，不拘时候。

【功用】安养胎气，调和经候，久服通和血气，宽膈美食。

【主治】①《宣明论》：癥瘕痞块，有似妊孕。②《医略六书》：妇女鬼胎，脉涩数者。

【方论选录】妇人身感异气，腹怀鬼胎，日久失下，遂成瘀热腹胀。方中黄连清心脾之火，黄柏清肾膀胱之火，黄芩清肺肠之火，木香醒脾胃之气，枳实消痞满，槟榔泻滞气，当归养血荣经脉，阿胶补阴益血脉。白蜜以丸之，蟹爪以下之，务使异气消散，则鬼胎无不速下，而经府亦得肃清，何瘀热腹胀之足患哉。

【备考】《医略六书》：白蜜为丸，用蟹爪汤送下。

56131 **枳实薤白汤**

《医学入门》卷七。为《金匮》卷上“枳实薤白

桂枝汤”之异名。见该条。

56132 枳桔二母汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】枳壳 知母 川贝母 瓜蒌仁 苏子 桔梗

【功用】清热理气，兼消痰火。

【主治】外感胸痛，肺气壅塞。

56133 枳桔二陈汤

《金鉴》卷四十六。为《医学入门》卷八“枳梗二陈汤”之异名。见该条。

56134 枳桔二陈汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】枳壳一钱半 桔梗二钱 半夏二钱 茯苓一钱半 甘草一钱 陈皮(去白)一钱半 杏仁十五粒 苏子(炒，研)八分 生姜六分

【用法】水煎服。

【主治】痰壅气喘。

【加减】如咳，加麻黄五六分。

56135 枳桔二陈汤

【方源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】陈皮 半夏 桔梗 枳壳 白茯神 甘草 白豆蔻 黄耆 苏子 山栀各等分

【用法】加生姜三片为引。

【主治】七情之气，结成痰气，形如梅核；或如破布棉絮，在咽喉之间，咽不下，咯不出；或中脘痞满，气不舒畅，痰涎壅盛，上气喘息；或因痰饮恶心。

56136 枳桔大黄汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】枳实 桔梗 大黄 大腹皮 桑白皮 广皮 甘草

【主治】肺热、胃火熏蒸，肠热肠结，腹胀作痛，喘息倚肩，不得仰卧，烦闷咳逆，大便结，脉右关上溢。

56137 枳桔平胃散

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】平胃散加枳实 桔梗

【主治】内伤呃逆，食滞中宫。

56138 枳桔泻白散

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】枳壳 桔梗 桑白皮 地骨皮 甘草

【主治】肝气壅盛，心腹胀满，胁肋刺痛，气秘便结，脉左关沉实。

56139 枳桔栀豉汤

【方源】《湿温时疫治疗法》。

【组成】生枳壳一钱至一钱半 焦山栀二钱至三钱 苏薄荷八分至一钱 苦桔梗一钱至一钱半 淡豆豉二钱至三钱 青连翘二钱至三钱 青子芩一钱至一钱半 生甘草四分至六分 西茵陈二钱至三钱 贯众二钱至三钱 鲜竹叶三十片

【主治】湿温时疫，热重于湿，兼受风邪而发者。

56140 枳桔柴胡汤 《张氏医通》卷十六。为原书同卷“柴胡枳桔汤”之异名。见该条。

56141 枳梗二陈汤

【方源】《医学入门》卷八。

【异名】枳桔二陈汤(《金鉴》卷四十六)。

【组成】二陈汤加枳壳 桔梗

【功用】宽胸膈，化痰气。

【主治】①《医学入门》：痞满。②《金鉴》：痰饮子嗽；小儿停痰哯乳，胸膈膨满，呕吐痰涎；小儿湿痰懒食，倦怠嗜卧，面色多黄，痰多者。

56142 枳梗半夏汤 《得效》卷二。为《局方》卷四“桔梗汤”之异名。见该条。

56143 枳缩二陈汤

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】砂仁 枳实 茯苓 半夏 陈皮 甘草(炙)

【用法】加生姜五片，水煎服。

【功用】理脾胃，顺气宽膈，消痰饮。

56144 枳缩二陈汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】枳实(麸炒)一钱 砂仁七分 白茯苓(去皮) 贝母(去心) 陈皮 苏子(炒)

瓜蒌仁 厚朴(姜汁炒) 香附(童便炒)各七分 川芎八分 木香五分 沉香五分 甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，入竹沥磨沉、木香服。

【主治】关格，上下不通。

56145 枳缩二陈汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】枳实(麸炒) 砂仁 半夏(姜汁制) 陈皮 香附各二钱 木香 草豆蔻 干姜(炒)各五分 厚朴(姜汁炒) 茴香(酒炒) 玄胡索各八分 甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，入竹沥磨木香同服。

【主治】痰涎在心膈上，攻走腰背，呕哕大痛。

56146 枳缩二陈汤

【方源】《杏苑》卷二。

【组成】枳壳一钱 缩砂仁七个 半夏 茯苓各一钱五分 橘皮一钱 甘草五分

【用法】上㕮咀。用水煎熟，食远温服。食消，身热未退，再以小柴胡汤加白术、陈皮。

【主治】病瘥后，食伤复热。

56147 枳壳地骨皮散

【方源】《不居集》下集卷一。

【组成】地骨皮 秦艽 柴胡 枳壳 知母 当归 鳖甲 乌梅一个 桃柳头七个 生姜三片

【主治】风劳骨蒸壮热，肌肉消瘦，少力多困，盗汗者。

【备考】方中地骨皮、秦艽、柴胡、枳壳、知母、当归、鳖甲用量原缺。

56148 枳实栀子豉汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】枳实栀子汤(《千金》卷十)、栀豉枳实汤(《医学入门》卷四)。

【组成】枳实三个(炙) 栀子十四个(擘) 豉一升(绵裹)

【用法】上以清浆水七升，空煮取四升，纳枳实、栀子，煮取二升，下豉，更煮五六沸，去滓，分二次温服。复令微似汗。

【主治】大病愈后劳复者。

【方论选录】《伤寒贯珠集》：大病新愈，血气未复，余热未尽，而强力作劳，余热之气，因劳而外浮。故以枳实、栀子以下热，豆豉以散热。盖亦表里之剂，而气味轻薄，适宜于病后复发之体耳。

56149 枳壳栀子大黄汤

【方源】《伤寒图歌活人指掌》卷四。

【组成】枳壳一个 肥栀子三个 豉一两 大黄(如薄棋子大)五六个

【用法】水煎服。

【主治】伤寒食复发热。

56150 枳实芍药甘草汤

《准绳·伤寒》卷四。为《云岐子保命集》卷下“枳实芍药干姜甘草汤”之异名。见该条。

56151 枳实导滞化毒汤

【方源】《麻科活人》卷四。

【组成】枳实 青皮 麦芽 木通 连翘 赤苓 牛蒡子 山楂肉 槟榔 厚朴 甘草

【用法】加灯心为引，水煎服。

【主治】麻疹饮食过伤，腹满胀痛。

56152 枳实薤白桂枝汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】枳实薤白汤(《医学入门》卷七)、栝楼薤白桂枝汤(《金匮要略心典》卷中)。

【组成】枳实四个 厚朴四两 薤白半斤 桂枝一两 瓜蒌实一个(捣)

【用法】上以水五升，先煮枳实、厚朴，取二升，去滓纳诸药，煮数沸，分三次温服。

【功用】《金匮要略释义》：通气开泄。

【主治】胸痹，心中痞气，气结在胸，胸满，胁下逆抢心。

【方论选录】《金匮要略释义》：阴气结于胸间，故以枳实泄其胸中之气，厚朴泄其胁下之气，桂枝通心阳，瓜蒌、薤白开结宣气，病邪自去。

56153 枳实大黄栀子豉汤

《千金》卷十。为《金匮》卷中“栀子大黄汤”之异名。见该条。

56154　**枳实芍药干姜甘草汤**

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【异名】枳实芍药甘草汤(《准绳·伤寒》卷四)。

【组成】芍药半两　甘草半两　枳实(麸炒)半两　干姜(炮)半两

【用法】上锉细。每服五钱,水煎服。

【主治】伤寒汗下后,气逆,利不止,属寒者。

柞

56155　**柞木汤**

【方源】《普济方》卷二八三引《王蘧得效方》。

【组成】竹叶四两　柞叶四两　地榆根　萱草根　干荷叶各一两　甘草节一两

【用法】上为散。每药半两,加水二碗,煎至一碗,分二服,早、晚各一服,并渣再煎。

【主治】发背,及诸般痈肿。

【宜忌】忌一切饮食毒。

56156　**柞本汤**

【方源】《普济方》卷二八三引《卫生家宝》。

【异名】柞木饮子。

【组成】柞木叶(焙干)　地榆根(刷洗去土,切片,煨)　萱草根(洗去土,切片,焙干)　干荷叶各等分

【用法】共为粗末。将大斗瓶一只,入药半瓶,却灌新水令瓶满,煎折二分存八分,温服无时,不拘多少,饮多为妙。如赤肿未结,即自大便中下,其状如碎猪肉,勿以为怪;如疮黑赤,恶候坏证,定结成头,服之两日,黑定变赤,其赤处变成红,候穿,用贴敛药。

【主治】发背,及诸般痈肿。

56157　**柞木饮**

《回春》卷六。为《本草纲目》卷三十六引《产宝》“催生柞木饮”之异名。见该条。

56158　**柞木散**

《本事》卷六。为《苏沈良方》卷九“柞叶汤”之异名。见该条。

56159　**柞叶汤**

【方源】《苏沈良方》卷九。

【异名】柞木散(《本事》卷六)、柞木饮子(《外科精要》卷上)。

【组成】柞木叶(干)四两　干荷叶四两　萱草根(干)二两　甘草节一两　地榆一两

【用法】上细锉。每服半两,水二碗,煎去半,分二服,早、晚各服二服,滓并煎作一服。有脓血者自安,脓血在内者自大肠下,未成者自消。有疮者贴下药:通明牛皮胶一两(水半升,熬令化)黄丹一两,入胶中煮三五沸。上放温冷,以鸡羽敷疮口,有疮即敛,未成疮者涂肿处即内消。

【主治】发疽。

【方论选录】《本事方释义》:柞木叶气味苦平,入足厥阴;干荷叶气味苦辛平,入足少阳、厥阴;金樱根(萱草根)气味甘凉,入足厥阴,能利湿解毒;甘草节气味甘平,入足太阴,最能解毒,通行十二经络;地榆气味咸苦微寒,入手足阳明,此治痈疽发背之方也。大凡诸毒之发,皆由湿热壅痹,致气血凝滞而成,凉血之药,必兼分利湿热,则源头既清,病自消散矣。

56160　**柞皮汤**

【方源】《霉疠新书》。

【组成】柞木皮　土茯苓各三钱　银花　荆芥　地黄　芍药　防风各二钱　牛膝　木瓜　黄柏各一钱

【用法】上㕮咀。以水五合,煮取二合半,去滓温服。

【主治】霉疮皮肤溃烂。

56161　**柞木皮汤**

【方源】《救急选方》卷下。

【组成】柞木皮二钱　当归三分　川芎三分　金银花一钱　大黄五分　甘草一分

【用法】水煎服。

【主治】鼠咬伤。

56162 柞木饮子

《外科精要》卷上。为《苏沈良方》卷九“柞叶汤”之异名。见该条。

56163 柞木饮子

《普济方》卷二八三。为原书同卷引《卫生家宝》“柞木汤”之异名。见该条。

56164 柞木饮子

《济阴纲目》卷十。为《本草纲目》卷三十六引《产宝》“催生柞木饮”之异名。见该条。

56165 柞木化醒汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】玄参 麦冬各二两 柞木枝三钱 甘草五分 人参一两 天冬三钱 黄芩 贝母各二钱

【用法】水煎服。

【主治】肥胖好饮，素性畏热，一旦得病，自汗如雨，四肢俱痿，且复恶寒，小便短赤，大便或溏或结，饮食亦减，是痿病已成。

柏

56166 柏汤

【方源】《寿亲养老》卷三。

【组成】嫩柏叶

【用法】上以线系，垂挂一大瓮中，纸糊其口，经月视之，如未甚干，更闭之，至干则取出为末，如嫩草色。如不用瓮，只密室中亦可，但不及瓮中者青翠，若见风则黄矣。此汤可以代茶，夜话饮之，尤醒睡。如太苦，则少加山芋尤佳。

【功用】《臞仙活人心方》：轻身益气，耐寒暑，去湿止饥。

【主治】《臞仙活人心方》：吐血，衄血，痢血，崩血。

56167 柏茶

【方源】《医学入门》卷三。

【组成】侧柏叶

【用法】晒干，煎汤，代茶饮。

【功用】止血滋阴。

【主治】血证。

【备考】本方方名，《东医宝鉴》引作“侧柏汤”。

56168 柏土散

【方源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】猪槽下土（炒） 黄柏末

【用法】上以蜜调和，涂患处。

【主治】烟火丹。属足三阳经风热者，从两足跗起赤色肿痛；属少阴肾经火热者，从足底心起。

【备考】原书治上症，宜内服滋阴抑火之药，使水旺足以制火，外以本方兼治。

56169 柏子丸 《外科理例·附方》。为《普济方》卷三三三引《指南方》“柏子仁丸”之异名。见该条。

56170 柏子散

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】侧柏子二十五个

【用法】上研烂，冷熟水淘，纱帛滤去渣，入蜜再调，连进二服。

【主治】赤痢。

【宜忌】忌食鱼腥、肉等物。

56171 柏仁散

【方源】方出《千金》卷五，名见《奇效良方》卷六十四。

【组成】防风一两半 柏子仁 白及各一两

【用法】上为末。以乳和，敷囟上，每日一次。十日知，二十日愈。

【主治】小儿囟开不合。

56172 柏公汤

【方源】《袖珍》卷一引《经验方》。

【组成】柏皮三两 黄芩二两 黄连一两

【用法】上㕮咀。每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服。

【主治】伤寒下痢，亦治久血热痢。

【加减】腹痛，加山栀子；小便不利，加赤茯苓、阿胶。

56173 柏艾饮

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】生地三钱　淮山药二钱　莲仁(去心)二钱　柏子仁(去净油)　丹皮　萸肉各一钱五分　泽泻(盐水炒)一钱　生荷叶一张(干者不效)

【用法】水煎,去滓,加生艾叶捣汁半酒杯冲服。

【主治】鼻衄。

56174　**柏术丸**

【方源】《吴氏医方汇编》卷五。

【组成】黄柏(酒炒)四两　川牛膝(酒炒)三两　苍术(制)四两　木瓜二两

【用法】上为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服三四钱,淡盐汤送下。

【主治】湿热下注。

56175　**柏石散**

【方源】《中医耳鼻喉科学》。

【组成】黄柏 30 克　石膏 30 克　枯矾 15 克

【用法】研为细末。外敷。

【功用】清除湿热。

【主治】旋耳疮,风热湿邪浸渍,黄水淋漓者。

56176　**柏叶丸**

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】柏叶一两(微炙)　夜明砂一两(以糯米炒令黄)

【用法】上为末,用牛胆汁拌和为丸,如梧桐子大。每服二十丸,临卧时以竹叶汤送下;至五更初再服二十丸,以粥饮送下。

【功用】明目。

【主治】青盲。

56177　**柏叶丸**

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】柏叶一两(微炙)　续断三分　芎䓖三分　禹余粮二两(烧,醋淬七次)　艾叶三分(微炒)　阿胶一两(捣碎,炒令黄燥)　牡蛎一两(烧为粉)　地榆一两(锉)　熟干地黄一两　当归三分(锉,微炒)　丹参三分　鮀甲一两(炙微黄)　鹿茸一两(去毛,涂酥炙微黄)　鳖甲一两(涂醋炙微黄)　赤石脂一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前温酒送下。

【主治】妇人崩中漏下不止,渐加黄瘦,四肢无力,腹内疼痛,不思饮食。

56178　**柏叶丸**

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】柏叶(去梗)　黄连(去须)　阿胶(炙令燥)　地榆(锉)　当归(焙)各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,温米饮送下,不拘时候。

【主治】脓血久痢,腹内疼痛。

56179　**柏叶丸**

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】柏叶　乌梅肉(晒干)各一两　皂荚一梃(去皮并子,水浸透,捣研取汁)

【用法】上三味,除皂荚外,为末,将皂荚汁和丸,如梧桐子大。每服十丸,食前温熟水送下。

【主治】肠痔肿痛,时有脓血。

56180　**柏叶丸**

【方源】《秘传大麻风方》。

【组成】侧柏叶(九蒸九晒)

【用法】上为末,炼蜜为丸。每服百丸,一日三次,开水送下。

【功用】能生眉发。

【主治】大麻风,眉发脱落。

56181　**柏叶汤**

【方源】《金匮》卷中。

【组成】柏叶　干姜各三两　艾三把

【用法】上以水五升,马通汁一升,合煮取一升,分温再服。

【主治】吐血不止者。

【方论选录】《张氏医通》:血逆不止,当责之于火旺。故用柏叶治其旺气;即兼姜、艾之辛温散结,使无留滞之患;更加马通导之下行。非近世专用柏叶、棕灰、血余之属可比。

56182　**柏叶汤**

【方源】《普济方》卷一八八引《指南方》。
【组成】青柏叶一把　干姜三片　阿胶三片(炙)
【用法】上用水二升,煮至一升,去滓,别绞马通汁一升,和煎取一升,一服尽之。
【主治】①《普济方》引《指南方》:吐血不止。②《鸡峰》:吐血至一斗,脉细小,气奔急者。

56183　柏叶汤
【方源】《圣济总录》卷九十六。
【组成】柏叶(去梗,焙)　甘草(炙,锉)　阿胶(炒燥)　黄芩(去黑心,锉)　竹茹(切)　生干地黄(切)各一两
【用法】上为粗末。每服四钱匕,水一盏半,同煎至八分,去滓温服,不拘时候。
【主治】小便出血不止。

56184　柏叶汤
【方源】《圣济总录》卷一五二。
【组成】柏叶二两　芍药三分
【用法】上㕮咀,如麻豆大。每服五钱匕,水一盏半,煎至八分,入酒半盏,再煎至一盏,去滓温服。
【主治】妇人下血不止,脐下疞痛。

56185　柏叶汤
【方源】《圣济总录》卷一六一。
【组成】柏叶(炙干)二两　当归(切,焙)　禹余粮(烧,醋淬七次)各一两半
【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,入薤白二寸,细切,同煎至七分,去滓,食前温服,一日三次。
【主治】产后血不止,兼漏下。

56186　柏叶汤
【方源】《普济方》卷二一五引《十便良方》。
【组成】生地黄三两　柏叶小半握　黄芩一两　阿胶三升
【用法】上前三味切,以水二升,煮取七合,去滓,入阿胶,分作五六服。
【主治】小便下血。

56187　柏叶汤
【方源】《卫生宝鉴》卷九。
【组成】柏叶(东南枝上摘取者)一秤
【用法】上以水一桶,煮三沸,去滓,甕盛起,旋熬蚕沙调服。初服苦涩,三五日后甜,十日四肢沉重,便赤白痢,一月后发出疮疙瘩,四十日疮破后,疮上敷药。
【主治】　疠风。

56188　柏叶汤
【方源】《回春》卷四。
【组成】侧柏叶　当归　生地黄　黄连　枳壳　槐花　地榆　荆芥各等分　甘草(炙)减半
【用法】上锉一剂。加乌梅一个,生姜三片,水煎,空心服。
【主治】肠风下血。
【备考】《寿世保元》有"川芎"。

56189　柏叶汤
【方源】《医方简义》卷三。
【组成】侧柏叶二钱　生地一两　炒蕲艾五分
【用法】上加荷叶一片,水煎服;或加藕汁一杯冲入,更加童便一盏冲服。
【主治】血热妄行,吐血盈碗。

56190　柏叶饮
【方源】《朱氏集验方》卷六。
【组成】侧柏叶多用(入白矾水煮,焙干)　川百药煎(炒)　蔓荆子(炒)各等分
【用法】入乳香末,浓米饮调下。
【主治】便血。

56191　柏叶乳
【方源】《经验广集》卷二。
【组成】人乳一大杯　侧柏叶(捣取汁)
【用法】上调令和,空心热服。
【主治】淋病。

56192　柏叶酒
【方源】《圣惠》卷九十五。
【组成】柏叶二十斤(捣碎,以水一石,煮取汁五斗)　黍米一石(淘净)　细曲十斤(捣碎)

【用法】上以柏叶汁渍曲发动，即炊米熟，候冷拌和令匀，入瓮密封，一七日开，压取酒。一日三度，量力饮之。以愈为度。

【主治】①《圣惠》：传尸骨蒸，瘦病。②《平易方》：风痹，历节作痛。

56193　柏叶散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】青柏叶一两　生干地黄一两　阿胶一分(捣碎，炒令黄)

【用法】上为末。以水一大盏半，煎至一盏，去滓，别搅马通汁一合，相和，更煎一二沸，分温三服，不拘时候。

【主治】伤寒吐血不止。

56194　柏叶散

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】柏叶　黄芩　桂心　阿胶(捣碎，炒令黄燥)各一两　甘草半两(锉，生用)　熟干地黄一两

【用法】上为散。每服五钱，以水二大盏，煎至五分，去滓，温温频服。

【主治】虚损，小便出血。

56195　柏叶散

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】柏叶二两(微炙)　黄芩二两　车前子二两　甘草二两(炙微赤，锉)　阿胶二两(捣碎，炒令黄燥)

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入生地黄半两，竹叶二七片，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】小便出血，心神烦热，口干，眠卧不安。

56196　柏叶散

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】寒食收柏叶(烧灰)一斤　露蜂窠半两(微炙)　蜣螂五个(烧灰)　密陀僧半两　腻粉一钱　石灰一钱

【用法】上为细散，浓煎浆水，淋洗疮后，用鸡子清调贴之。

【主治】一切久恶疮不愈。

【备考】方中石灰用量原缺，据《普济方》补。

56197　柏叶散

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】柏叶一两(微炙)　牛角䚡二两(烧灰)　芎䓖半两　禹余粮一两(烧，醋淬七遍)　黄耆一两(锉)　白芍药三分　龙骨一两　白术三分　丹参三两　枳壳一两(麸炒微黄，去瓤)

【用法】上为细散。每服二钱，食前用温酒调下。

【主治】妇人带下五色，四肢黄瘦，心烦食少。

56198　柏叶散

【方源】《圣惠》七十三。

【组成】柏叶一两半(微炙)　续断一两半　芎䓖一两半　禹余粮二两半(烧，醋淬七遍)　艾叶一两(微炒)　阿胶一两(捣碎，炒令黄燥)　赤石脂一两　牡蛎一两(烧为粉)　地榆一两(锉)　生干地黄一两(锉)　当归一两半(锉，微炒)　鹿茸一两(去毛，涂酥炙微黄)　龟甲一两半(涂酥炙令黄)　鳖甲一两半(涂酥炙令黄)

【用法】上为细散。每服二钱，食前以粥饮调下。

【主治】妇人元气虚弱，崩中漏下，面色萎黄，消瘦乏力，腹中疼痛，不思饮食，亦治白带。

①《圣惠》：妇人崩中漏下，不问年月远近。②《普济方》：妇人崩中漏下，渐加黄瘦，四肢无力，腹内疼痛，不思饮食。③《景岳全书》：元气虚弱，崩中漏血，年久不愈，亦治白带。

56199　柏叶散

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】柏叶(焙)　蒲黄各一两　木香　乌鱼骨(去甲，炙)　棕皮　当归(洗，切，焙)　妇人油发(与棕皮二味烧灰)各半两　阿胶(炙燥)一两

【用法】上为细散。每服一钱匕,用糯米粥饮入地黄汁少许,暖令温调下,不拘时候服。

【主治】吐血后,胸中痞,口干。

56200 **柏叶散**

《圣济总录》(文瑞楼本),卷一三四。即原书(人卫本)"柏叶膏"。见该条。

56201 **柏叶散**

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】柏叶(炙黄)二两 芎䓖 芍药 白芷 干姜(炮) 牡丹(去心)各一两 当归(焙)半两

【用法】上为散。每服二钱匕,食前温酒调下。

【主治】妇人带下,腹痛。

56202 **柏叶散**

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】侧柏叶 芍药 艾各三分 熟干地黄(焙) 禹余粮(醋淬) 麒麟竭各一两 当归(锉,焙) 牛角䚡(炙)各三分

【用法】上为细末,研匀。每服二钱匕,生姜米饮调下。

【主治】妇人伤中血下兼带,成白或赤,脐下疞痛。

56203 **柏叶散**

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】柏叶三分 阿胶 当归 熟地黄 赤芍 牡蛎各半两

【用法】上为细末。每服二钱,米饮调下,不拘时候。

【主治】妇人赤白带下,腹内疞痛,四肢烦疼,不欲饮食,日渐羸瘦。

56204 **柏叶散**

【方源】《本事》卷三。

【组成】柏叶 麻黄(去根节) 山栀子(去皮) 枳壳(去瓤,锉,麸炒) 羌活(去芦) 羊肝石 白蒺藜(炒去角) 升麻 子芩(去皮) 防风(去钗股) 牛蒡子(隔纸炒) 荆芥穗 茺蔚子 大黄(湿纸裹,甑上蒸)各半两 苦参一两 乌蛇一条(酒浸,去皮骨,焙干)

【用法】上为细末。每服二钱,温水调下,一日七八服。

【主治】疠风。

【方论选录】《本事方释义》:柏叶气味苦辛微寒,入足太阴,麻黄气味辛温而散,入足太阳;山栀子气味苦寒,入手太阴、少阴;枳壳气味苦寒,入脾;羌活气味辛温,能行水,入足太阳;羊肝石气味淡平,入足少阳、厥阴,能解药毒;白蒺藜气味甘辛温,入足厥阴,能明目;升麻气味苦辛微温而散,入足阳明;子芩气味苦寒,入手太阴;防风气味辛甘平,入足太阳;牛蒡子气味苦辛平微寒,入手太阴;荆芥气味辛温,入足厥阴;茺蔚子气味辛甘微温,入手足厥阴;大黄气味苦寒,入手足阳明;苦参气味苦寒,入手足少阴;乌蛇气味甘平,善能治风,入足少阳、厥阴。此治疠风之方也。血分中热气阻痹脉络,不主流行,必成疥癣,久则延为疠风。故用凉血药兼以疏风。古人有云:治风先治血,血行风自灭也。

56205 **柏叶散**

【方源】《产宝诸方》。

【组成】柏叶不拘多少(瓦上焙干)

【用法】上为末。每服三钱,米饮调下。

【主治】①《产宝诸方》:血崩不止。②《杂病源流犀烛》:忧恚吐血,烦满少气,胸中疼痛者。

56206 **柏叶散**

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】侧柏叶四两 何首乌 地骨皮 白芷各二两

【用法】上为粗末。每用半两,入生姜十片,水一大碗,煎五七沸,去滓,淋洗髭须,临睡用。

【功用】荣养髭须。

56207 **柏叶散**

【方源】《普济方》卷一八八引《澹寮方》。

【组成】侧柏叶(蒸干) 人参各一两(焙

干)

【用法】上为细末。每服二钱,入飞罗面二钱,新汲水调如稀糊,啜服。

【主治】吐血下血,其证因内损,或因酒食劳损,或心肺脉破,血气妄行,血如涌泉,口鼻俱出,须臾不救。

56208　柏叶散

《普济方》卷一九〇。为《救急选方》卷上引《卫生家宝》"侧柏散"之异名。见该条。

56209　柏叶散

【方源】《普济方》卷二一二。

【组成】柏叶二两　地榆一两(锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】久血痢,小肠结痛不可忍。

56210　柏叶散　《普济方》卷三〇〇。即《圣济总录》卷一三四"柏叶膏"。见该条。

56211　柏叶散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】侧柏叶(炒黄,为末)　蚯蚓粪(韭菜田内者佳)　黄柏　大黄各五钱　赤豆　轻粉各三钱

【用法】上为细末。新汲水调搽。

【主治】三焦火甚,致生火丹,作痒或作痛,延及遍身。

【备考】《金鉴》有雄黄,或用香油调搽,主治缠腰火丹。

52612　柏叶散

【方源】《医略六书》卷二十五。

【组成】柏叶三两　大黄一两　黄芩一两

【用法】上为散。每服三钱,米饮调下。

【主治】脏毒,脉盛者。

【方论选录】热蕴于中,不能输化,而有伤脏气,故下血紫黑,乃为脏毒焉。柏叶芳香,力能醒脾开胃,专主凉血止血;黄芩苦寒,性善宽肠清肺,专解膈热移热;大黄荡涤蕴热,以解热毒。使毒化热解,则脏气清和,而血室完固,安有下血紫黑为脏毒之患乎?此解毒之剂,为脏毒下血之专方。

56213　柏叶膏

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】柏叶(炙干,为末)四两　杏仁(去皮,研)四十个　头发一拳大　盐(研)半两　乳香(研)一分　黄蜡一两　油一升

【用法】上先煎油沸,次下五味药,以发消尽为度,次下黄蜡搅匀,瓷器中收贮。先以热小便洗疮,以绵揾干后以药涂上,即以软帛包裹,勿令寒气侵入,每日一洗一换,如疮渐愈,即三四日一换。

【主治】冻疮,手足指欲坠,及耳欲落。

【备考】本方方名,《普济方》引作"柏叶散"。

56214　柏叶膏

【方源】《圣济总录》(人卫本)卷一三四。

【组成】柏叶(焙)　栀子仁各一两　胡粉(研)半两。

【用法】上为末,以羊髓五六合,火熔消,和药,以木椎研三五百遍。涂患处,一日三次。

【主治】汤火伤。

【备考】本方方名,原书(文瑞楼本)作"柏叶散"。

56215　柏叶膏

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】新柏叶(去木取叶,不要坟墓上者,寺中最佳)三斤

【用法】清水淘洗,控干,木臼中捣,旋洒些腊水,只取一二盏许,俟捣得烂,用新绵滤取自然汁,生绢重滤过,银盂内重汤慢火熬成膏,旋炼旋添白沙蜜二两,俟如稠饴,用新瓶收之。每服少许,含化。

【主治】吐血下血。

56216　柏皮丸

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】黄柏(削去粗皮,焙)

【用法】上为末,用米饮和丸,如粟米大。每服十丸,食前米饮送下。

【主治】热泻。

56217　柏皮丸

【方源】《医方类聚》卷一四一引《施圆端效方》。

【组成】黄连 黄柏 芍药 槐花(炒)各二两

【用法】上为细末,滴水为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前米饮送下,一日二次。

【主治】脏毒便血,疼痛呕哕。

56218 柏皮丸

【方源】《本草纲目》卷三十五引《孙探元集效方》。

【组成】川黄柏皮(刮净)一斤(分作四分,三分用酒、醋、童便各浸七日,洗、晒、焙;一分生炒黑色)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心温酒送下。

【主治】脏毒痔漏,下血不止。

56219 柏皮丸

【方源】《本草纲目》卷三十五引陆一峰方。

【组成】黄柏一斤(分作四分,三分用醇酒、盐汤、童便各浸二日,焙,研;一分用酥炙,研末) 猪脏一条

【用法】先将猪脏去膜,入药在内,扎紧,煮熟,捣为丸。每服五十丸,空心温酒送下。

【主治】诸虚赤白浊。

56220 柏皮汤

【方源】《外台》卷二(注文)引《范汪方》。

【异名】黄连阿胶汤(《圣济总录》卷三十三)、阿胶汤(《此事难知》)。

【组成】黄柏二两 黄连四两 栀子仁十四个(擘) 阿胶一两(炙)

【用法】上切。以水六升,煮前三味,取二升,去滓,纳胶令烊,温分再服。

【主治】伤寒后下利脓血。

【宜忌】忌猪肉、冷水。

【备考】本方改为丸剂,名"黄连阿胶丸"(见《杏苑》)。

56221 柏皮汤

【方源】《外台》卷六引《删繁方》。

【组成】黄柏三两 黄连五两 人参三两 茯苓四两 厚朴四两(炙) 艾叶一升 地榆三两(炙) 榉皮四两(炙) 阿胶三两

【用法】上切。以水一斗,煮取三升,去滓,下胶,煎取二升,分三服。

【主治】下焦虚寒,大便洞泄不止。

【宜忌】忌猪肉、冷水、醋等。

56222 柏皮汤

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】柏白皮 黄柏 蕤仁各一两 黄连三分(去须) 苦竹叶二握

【用法】上锉细。以水三升,煎取二升,去滓,稍热淋洗,冷即重暖用之。

【主治】眼赤烂,痒痛不止。

56223 柏皮汤

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】黄柏 黄连 黄芩各等分

【用法】上为散。每服五钱,水二盏,煎至一盏,去滓温服。

【主治】黄疸。瘀热在里,或湿热相搏,一身面目悉黄如橘。

56224 柏皮汤 《鸡峰》卷十。为《伤寒论》"栀子柏皮汤"之异名。见该条。

56225 柏皮汤

【方源】《直指》卷十三。

【异名】黄连柏皮汤(《医学入门》卷四)。

【组成】柏皮三两 黄芩二两 黄连一两

【用法】上锉。每服四钱,水一大盏,煎七分,入阿胶末半钱,再煎少顷,温服。

【主治】①《直指》:协热泄泻,亦治血痢。②《医学入门》:热毒吐血。

56226 柏皮汤

【方源】《元戎》卷四。

【组成】生地黄 甘草 黄柏 白芍药各一两

【用法】上㕮咀。用醇酒三升,渍之一宿,以铜器盛,米饮下蒸一炊时久,渍汁半升,食后服。

【主治】衄血、吐血、呕血等失血虚损,形气不理,羸瘦不能食,心忪少气,燥渴发热。

56227　柏皮汤　《普济方》卷二一六，即《圣济总录》卷九十五"柏白皮汤"。见该条。

56228　柏皮散

【方源】《外台》卷二十一引《广济》。

【组成】老柏白皮四两　乌梅肉二两(熬)　细辛　地肤子各四两

【用法】上为散。每服二方寸匕，食后清酒送下，一日三四服。

【主治】雀目。

56229　柏皮散

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】黄柏(蜜炙)　榆蛀虫(炙干)各一钱　麝香少许(研)

【用法】上为细末。以盐浆水洗疮后，唾调药，纸花子贴之。

【主治】无名恶疮，年深不愈。

56230　柏皮散

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】黄柏末三分　细瓷末一分　甘草末一钱

【用法】上为细末，和匀。干敷疮上。

【主治】恶疮，久不收口。

56231　柏皮散

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】黄柏皮

【用法】上为末。甑汗调和，涂敷疮上。

【主治】小儿燕口疮。

56232　柏皮散

《永乐大典》卷一〇三三引《全婴方》。为《伤寒论》"栀子柏皮汤"之异名。见该条。

56233　柏皮散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】赤小豆　天南星(生用)　黄柏各一两　土朱一分

【用法】上为细末。新汲水调成膏子，摊在纸上贴之。

【主治】一切风热毒气，赤肿疼痛。

56234　柏皮膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】柏皮(去黑皮，用白肉)三斤

【用法】以猪脂煎，去滓，候凝，随意使之。

【主治】①《鬼遗方》火疮。②《普济方》：乳痈。

【备考】方中柏皮用量原缺，据《普济方》补。

56235　柏皮膏

【方源】《医方类聚》卷一九四引《千金月令》。

【组成】柏皮五两　生地黄半斤　桑白皮二两　杏仁(研碎)　大青各三两　竹叶二升(切)

【用法】上切，以炼猪脂三斤，缓火煎三上三下，绞去滓，密贮。日夜三易。

【功用】止痛灭瘢。

【主治】汤火疮。

56236　柏皮膏

【方源】《幼幼新书》卷三十八引《婴孺方》。

【组成】柏皮　槐白皮三合　生地汁　蛇含(生)各八分　栀子仁六分　甘草　黄柏各四分

【用法】上切，以猪脂一升半，小火煎为膏，去滓。敷患处。

【主治】汤火伤。

56237　柏皮膏

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】柏树白皮末四两　猪脂半斤(炼为油)　伏龙肝末四两

【用法】上同熬成膏，滤去滓，入瓷器中收。每用时，薄薄涂之，上以油单隔，软帛裹。

【主治】灸疮久不愈。

56238　柏皮膏

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】柏白皮三两　当归一两　薤白五两　猪脂一斤

【用法】上四味，除薤白、猪脂外，细锉，熬脂令沸，下诸药煎，候薤白赤黑色，以绵布绞去滓，瓷合盛。涂敷疮上，日三五次。

【主治】灸疮发肿，火毒疼痛。

56239 柏皮膏

【方源】《普济方》卷二九〇。

【组成】鸡子三个(煮熟,去白用黄,入深厚黑盏内,子慢火上熬成黑油出为度) 轻粉半钱 川黄连 槟榔 木香各一分(为末)

【用法】上用鸡子油调,封疮口,以干为度。如疮依前热赤如火烧,四畔肿硬不退,再用白及散涂之。

【主治】疮口穿溃不愈。

【备考】本方名柏皮膏,但方中无柏皮,疑脱。

56240 柏母丸

【方源】《囊秘喉书》卷下。

【组成】贝母六钱 川柏(蜜炙)一两 冰片一钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如青豆大。每服一丸。

【主治】痰火郁结,咽喉不利。

56241 柏灰散

【方源】《玉案》卷四。

【组成】侧柏叶(取法,春东、夏南、秋西、冬北,煅灰存性)

【用法】每服二钱,空心滚汤调下。

【主治】脏毒下血,诸药不效者。

56242 柏花丸

【方源】《囊秘喉书》卷下。

【组成】贝母四钱 川柏(蜜炙)一钱 百合二钱 款冬花二钱五分 冰片三分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如青豆大。每服一丸。

【主治】肺热咳嗽。

56243 柏连散

【方源】《得效》卷十。

【组成】胡粉(炒) 黄柏(炙) 黄连各等分

【用法】上为末。以面脂或猪脂调敷,一日三次。

【主治】面上有热毒恶疮。

56244 柏连散

【方源】《奇效良方》卷十三。

【组成】侧柏叶(焙干为末) 黄连(为末)

【用法】上二味,同煎为汁服之;或用热水调二钱服亦可。

【主治】蛊痢。大便下黑血如茶脚色,或脓血如靛色者。

56245 柏连散

【方源】《幼科发挥》卷二。

【组成】生黄柏 生地黄各等分 白槟榔减半

【用法】上为细末。搽患处。

【主治】心脾有热,舌上生疮。

56246 柏枝汤

《普济方》卷一五一引《经验良方》。为《肘后》卷八"柏枝散"之异名。见该条。

56247 柏枝饮

《幼科类萃》卷二十三。为《幼幼新书》引《王氏手集》(见《永乐大典》卷一〇三三)"柏枝散"之异名。见该条。

56248 柏枝饮

【方源】《幼科折衷》卷上。

【组成】干柏枝 干藕节(一方加白芍、犀角汁同服)

【用法】上为末。入蜜,沸汤调服。

【主治】久嗽气逆,面目浮肿,吐血衄血。

56249 柏枝油

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】柏枝(干者) 椒红 半夏各三两

【用法】上㕮咀。用水二碗,煎至半碗,入蜜少许,再煎一二沸,每用时入生姜汁少许,调匀,擦无发处,每日两次。

【功用】去风生发。

56250 柏枝散

【方源】《肘后》卷八。

【异名】柏枝汤(《普济方》卷一五一引《经验良方》)。

【组成】柏东向枝(晒干)

【用法】上为末。每服方寸匕。

【主治】疾疫流行。

56251 柏枝散

【方源】《幼幼新书》引《王氏手集》(见《永乐大典》卷一〇三三)。

【异名】柏枝饮(《幼科类萃》卷二十三)。

【组成】柏枝(干者) 藕节(干者)各等分

【用法】上为末。三岁儿每用半大盏,以藕汁入蜜,沸汤调下。

【主治】小儿衄血、吐血。

56252 柏实散

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】柏实 桂(去粗皮,锉)各等分

【用法】上为细散。每服二钱匕,米饮调下,一日三次。

【主治】胸痛。

56253 柏香丸

【方源】《银海指南》卷三。

【组成】侧柏叶(同大黄拌蒸数次) 香附(制)

【用法】水法丸。每服二钱。

【主治】胬肉攀睛,或眼生血瘀。

56254 柏姜散

【方源】《喉证指南》卷四。

【组成】黄柏二钱 干姜八分

【用法】合焙成炭(存性),研极细末。吹之。

【主治】喉证,阴虚火盛。

56255 柏桂汤

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】茯苓一两 甘草梢(生用)三钱 栀子(炒)三钱 黄柏(酒炒)三钱 肉桂一钱

【用法】水煎服。

【主治】杨梅毒结于宗筋,势烂腐落。

【方论选录】毒结宗筋,实肾毒也,故茯苓、黄柏以治之;毒必逐之使出,故栀子、甘草梢以达之;筋属肝,故肉桂以疏散之。

56256 柏根散

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】乌蛇三寸(浸,去皮,于瓦上烘干) 黄柏根皮四寸(焙干) 杏仁三七个(烧存性)

【用法】上为末。食盐浆水洗了,入腻粉,津调,涂帛子上贴之,甚时再上。

【主治】无名恶疮。

56257 柏莲汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】人参 麦冬 玄参各五钱 茯苓 柏子仁 丹皮各三钱 丹参二钱 半夏 莲子心各一钱 生枣仁三钱

【用法】水煎服。

【主治】怔忡。

56258 柏莲汤

【方源】《人己良方》。

【组成】扁柏叶三钱(炒黄色) 莲肉二钱(炒焦)

【用法】用水一碗,煎滚,人蜜糖半小盅,和匀,频服,当茶饮。

【主治】小儿红白痢,不论新久,或身热,或闭口痢。

56259 柏脂膏

【方源】《卫生宝鉴》卷十三引颜和卿方。

【组成】柏油一斤 黄蜡半斤 杏仁四十五个(锉) 朴消一抄

【用法】上于铁器内熬,老生葱三根一顺搅五七沸,滤过成膏。搽疮。

【主治】干湿癣。

56260 柏胶丸

【方源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】雄黄(同蜜煎老,去蜜) 小茴香各三钱 川黄连 侧柏叶各一两 广胶八两(切断,以牡蛎粉八两,炒成珠,去牡蛎) 熊胆一钱 槐角子(一荚四五粒者佳)四两

【用法】研细,炼白蜜为丸。每服三钱,早、晚白汤送下。荤用鸡蛋,素用豆腐过口。

【功用】内消。

【主治】痔漏。

【加减】如痔痛极者,加乳香(去油)、没药(去油)各二钱,蟾酥一钱五分。

56261 柏粉膏

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】轻粉

【用法】上为末，用生柏油调，随疮大小摊纸上；先用米泔水煎甘草洗过，贴之，布扎紧勿动。先三日痛，次二日痒，再二日共七日去药，已愈。

【主治】血风等疮。

56262 **柏黄丸**

【方源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】生地黄　黄柏（炒）各一斤

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八九十丸，空心、食前米饮送下。

【主治】肠风脏毒，下血鲜红。

56263 **柏黄散**

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】黄芩一两二钱半　当归　柏叶　蒲黄各一两　生姜五钱　艾叶二钱半　生地黄六两　伏龙肝二两七钱

【用法】上㕮咀。用水二升，煎取八合，分为二服。

【主治】经血不止。

56264 **柏黄散**

【方源】《医学纲目》卷三十四。

【组成】黄芩一两二钱半　侧柏叶　蒲黄各一两　伏龙肝一两

【用法】上㕮咀。用水二升，煎取八合，分为二服。

【主治】经血不止。

56265 **柏棉饮**

【方源】方出《医林绳墨大全》卷九，名见《卫生鸿宝》卷五。

【组成】棉花子半斤（烧存性，净一两）　柏子仁一两（烧存性，净三钱）

【用法】上为末。每服三钱，空心淡酒调服。

【主治】赤白带下。

56266 **柏蛤散**

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】黄柏（以瓷锋刮末）　蛤粉末各等分

【用法】掺疮上。

【主治】下疳湿疮。

【方论选录】《医略六书》：湿热浸渍，经久不化，而下注阴中，伤肌烁肉，故阴内生疮丐。黄柏清热燥湿以存阴，蛤粉利水益阴以解毒，务使肾水受益，则湿热自化，而经府清和，阴疮无不痊愈矣。疮湿干掺，疮干油调，盖以经气之干湿为转旋也。然热胜则疮干，当以黄柏为君；湿胜则疮烂，当以蛤粉为君。

56267 **柏蒜丸**

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】黄柏（蜜煮令焦）　大蒜（煨令熟烂，去皮）

【用法】以黄柏为末，研蒜作膏为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心粥饮送下，一日三服。

【主治】妊娠脐下刺痛，大便白，昼夜三五十行。

56268 **柏煎丸**

【方源】《普济方》卷三九八。

【组成】黄柏（去粗皮，蜜炙）　黄连（去须）　胡黄连　芦荟　诃黎勒皮各等分

【用法】上为末，熬猪胆汁和丸，如黄米大。每服十丸，米饮送下。

【主治】小儿惊疳，身热颊赤，发枯皮燥，烦满吐痢。

56269 **柏墨散**

【方源】方出《圣惠》卷八十二，名见《闫氏小儿方论》。

【组成】黄柏末　釜下墨煤　乱发（烧灰）各一分

【用法】上药同研细。少少敷之。

【主治】①《圣惠》：小儿脐风，汁出不止。②《闫氏小儿方论》：小儿断脐后为水湿所伤，或绷袍湿气伤于脐中，或解脱风冷所乘，致令小儿四肢不和，脐肿多啼．不能乳哺。

56270 **柏霜散**

【方源】《外科真诠》卷下。

【组成】黄柏　雄黄各二钱　没药　轻粉　枯矾　粉霜各一钱　冰片三分　朱砂五分　孩儿茶三钱　蜗牛十只

【用法】上为细末。猪胆汁调敷患处。

【主治】杨梅癣，浑身腥臭，或干而起白屑，或肉碎而流红水者。

56271　**柏黛散**

【方源】《洞天奥旨》卷十三。

【组成】黄柏二钱　青黛二钱

【用法】上各为末。以麻油调搽。

【主治】日晒疮，火斑疮。

56272　**柏子仁丸**

【方源】《普济方》卷三三六引《肘后》。

【组成】柏子仁一升　茯苓末二升

【用法】上捣，合乳和服十丸。即佳。

【主治】妇人无病触禁，久不生子。

56273　**柏子仁丸**

【方源】《千金》卷四。

【组成】柏子仁　黄耆　干姜　紫石英各二两　蜀椒一两半　杜仲　当归　甘草　芎䓖各四十二铢　厚朴　桂心　桔梗　赤石脂　苁蓉　五味子　白术　细辛　独活　人参　石斛　白芷　芍药各一两　泽兰二两六铢　藁本　芜荑各十八铢　干地黄　乌头(一方作牛膝)　防风各三十铢　钟乳　白石英各二两

【用法】上为末，炼密为丸，如梧桐子大。每服二十丸，酒送下。不知，加至三十丸。

【功用】补益，令人肥白。

【主治】妇人五劳七伤，羸冷瘦削，面无颜色，饮食减少，貌失光泽，及产后断续无子。

56274　**柏子仁丸**

【方源】《千金翼》卷七。

【组成】柏子仁　白石英　钟乳　干姜　黄耆各二两　泽兰九分(取叶，熬)　藁本　芜荑各三分　芎䓖二两半　防风五分　蜀椒一两半(去目及闭口者，汗)　人参　紫石英　石斛　赤石脂　干地黄　芍药　五味子　秦艽　肉苁蓉　厚朴(炙)　龙骨　防葵　细辛　独活　杜仲(炙)　白芷　茯苓　桔梗　白术　桂心各一两　当归　甘草(炙)各七分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空肚温酒送下，不知，增至三十丸，以知为度。

【功用】令人肥白。

【主治】妇人五劳七伤，羸弱瘦削，面无颜色，饮食减少，貌失光泽，及产后半身枯悴，伤坠断绝无子。

【宜忌】禁食生鱼、肥猪肉、生冷。

56275　**柏子仁丸**

【方源】《圣惠》卷四十一。

【组成】柏子仁三两　酸石榴皮二两　秦椒三两(去目及闭口者，微炒去汗)　何首乌二两　马齿苋二两　莲子草二两　白芷二两　旋覆花二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以熟水送下，晚食前再服。

【功用】壮血脉，乌须发。

【主治】髭鬓早白。

【宜忌】忌大蒜、生葱等。

56276　**柏子仁丸**

【方源】方出《圣惠》卷四十六，名见《普济方》卷一五九。

【组成】柏子仁一两　五灵脂一两　甜葶苈一两(隔纸炒令黄色)　虾蟆头一个(烧灰)　杏仁一两(汤浸去皮尖双仁，麸炒微黄)

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温粥饮送下，日三四服。

【主治】久嗽，肌体虚羸，不思饮食。

【备考】方中虾蟆头用量原缺，据《普济方》补。

56277　**柏子仁丸**

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】柏子仁一两　泽兰半两　芎䓖半两　桂心半两　黄耆半两(锉)　禹余粮一两(烧，醋淬五次)　人参半两(去芦头)　熟干地黄一两　五味子半两　白术半两　木香半两　厚朴三分(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟)　当归三分(锉碎微炒)　续断三分　白茯苓三分　紫石英一两(细研，水飞过)　附子三分(炮裂，去皮脐)　白薇三分　牛膝三分(去

苗） 干姜三分（炮裂，锉） 干漆半两（捣碎，炒令烟出） 防风半两（去芦头） 牡丹半两 细辛半两 赤石脂一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒送下。

【功用】补虚助脾，思饮食，强气力。

【主治】妇人风虚劳冷，脾胃乏弱，四肢羸困，不欲饮食。

56278 柏子仁丸

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】柏子仁三合 干漆三分（捣碎，炒令烟出） 鳖甲一两半（涂醋炙令黄，去裙襕） 当归三分（锉碎，微炒） 紫石英三分（细研，水飞过） 白术三分 肉苁蓉三分（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 干姜三分（炮裂，锉） 桂心三分 牛膝三分（去苗） 赤芍药三分 附子三分（炮裂，去皮脐） 芎䓖三分 木香三分 熟干地黄三分 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 琥珀三分 麝香半两（细锉）

【用法】上为末，入麝香研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】妇人冷劳气，腹胁疼痛，不思饮食，四肢少力，渐加羸瘦。

56279 柏子仁丸

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】柏子仁一两 熟干地黄一两半 防风三分（去芦头） 黄耆三分（锉） 人参三分（去芦头） 麦门冬一两半（去心，焙） 当归半两（锉，微炒） 续断三分 羚羊角屑半两 白茯苓三分 泽兰一两 桂心半两 芎䓖半两 白术半两 酸枣仁三分（微炒） 紫石英一两（细研，水飞过） 附子三分（炮裂，去皮脐） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为末，人研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前温酒送下。

【主治】产后风虚劳损，四肢羸弱，心神虚烦，不能饮食，少得眠卧。

56280 柏子仁丸

【方源】《普济方》卷三三三引《指南方》。

【异名】柏子丸（《外科理例·附方》）、女科柏子仁丸（《饲鹤亭集方》）。

【组成】柏子仁（锉，另研） 牛膝 卷柏各半两 泽兰叶 续断各二两 熟地黄三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下。

【功用】养血益阴。

【主治】阴虚血弱，水少火盛，经候微少，渐渐不通，手足骨肉烦疼，日渐羸瘦，渐生潮热，脉象微数。

【方论选录】《医方集解》：此手足少阴、厥阴药也。柏子仁安神而养心，地黄、续断、牛膝补肝肾而益冲任，卷柏、泽兰、活血脉而通经闭。

56281 柏子仁丸

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】柏子仁 远志（去心） 干地黄各一两半 桂心 茯神 芎䓖 人参 丹参 防风 沉香各一两 菖蒲 甘草各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】心虚恐畏，腹胁暴痛，志意不乐。

56282 柏子仁丸

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】柏子仁一分 防风（去叉） 黑豆（煮令烂，研作膏用） 白蒺藜（炒）各半两 车前子一两 甘菊花半两 附子（炮裂，去皮脐） 羌活（去芦头） 黄耆（蜜炙，细锉）各半两

【用法】上除黑豆外，捣为细末，炼蜜同黑豆膏拌和为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心、食前盐汤送下。

【主治】肝气久虚，四肢筋脉怠惰，三焦气不顺，上攻眼生黑花。

56283 柏子仁丸

《圣济总录》卷四十二。为《圣惠》卷三“补肝

柏子仁丸"之异名。见该条。

56284 **柏子仁丸**

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】柏子仁(别研)　熟干地黄(焙)　肉苁蓉(酒浸三日,切作片子,焙干)　牛膝(酒浸一伏时,切,焙)　补骨脂(炒熟)　巴戟天(去心)　茴香子(炒)　五味子(炒)　木香　远志(去心)各一两

【用法】上十味,捣九味为末,入柏子仁研令匀,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服十五至二十丸,空心、食前用淡生姜汤或温酒送下。

【功用】散痞满,进饮食。

【主治】三焦俱虚,气道涩滞,痞满,饮食不思。

56285 **柏子仁丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】柏子仁(研)　薏苡仁　乌麻仁　车前子　枸杞子　菴蔄子　菟丝子(酒浸,别捣末)各一两　牡荆子　青葙子　五味子　蛇床子　桂(去粗皮)　菊花　山芋各半两　熟干地黄(焙)　肉苁蓉(酒浸,切,焙)　白茯苓(去黑皮)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心温酒送下。

【功用】补肝元。

【主治】肝虚,视物漠漠,不能远见,睛轮昏暗涩痛,翳晕时聚时散。

56286 **柏子仁丸**

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】柏子仁(炒)　泽兰叶　甘草(炙,锉)　当归(切,焙)　芎䓖各一两　白术　白芷　桂(去粗皮)　细辛(去苗叶)各半两　防风(去叉)　人参　牛膝(去苗,酒浸,切,焙)　麦门冬(去心,焙)各一两半　生干地黄(焙)　石斛(去根)各一两　厚朴(去粗皮,生姜汁炙,锉)　藁本(去苗土)　芜荑各半两　附子(炮裂,去皮脐)　干姜(炮)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,温酒或米饮送下,不拘时候。

【功用】补益。

【主治】产后虚热,羸瘦困倦。

56287 **柏子仁丸**

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】柏子仁(研)一两　巴戟天(去心)二两　远志(去心)　五味子各一两　牛膝(去苗,酒炙,切,焙)二两　熟干地黄(焙)三两　桂(去粗皮)一两　肉苁蓉(酒浸,切,焙)二两　鹿茸(去毛,酥炙)　菟丝子(酒浸一宿,别捣)各一两半　补骨脂(炒)二两　干漆(炒烟出)一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空腹及晚食前温酒送下。

【主治】五劳七伤,骨髓虚惫,肢体羸悴。

56288 **柏子仁丸**

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】柏子仁(炒,研)　干地黄各二两　茯苓　枳实(麸炒,去瓤)　桂(取心)　五味子　附子(炮,去皮脐)　石斛(去苗)　鹿茸(去皮,截作片子,酥炙)　酸枣仁　覆盆子　沉香　黄耆各一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心温酒送下。

【主治】臂痛,不得屈伸,筋脉挛拘。

56289 **柏子仁丸**

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】柏子仁四分　人参　半夏　茯苓　牡蛎　五味子　白术　净麸各三分　木香一分

【用法】上为细末,枣肉为丸,如梧桐子大。每服二十丸,米饮送下,不拘时候。

【主治】虚劳多汗。

56290 **柏子仁丸**

【方源】《本事》卷六。

【组成】新柏子仁(研)　半夏曲各二两　牡蛎(甘锅子内火煅,用醋淬七次,焙)　人参(去芦)　麻黄根(慢火炙,拭去汗)　吴白术　五味子(拣)各一两　净麸半两(慢火炒)

【用法】上为末,枣肉为丸,如梧桐子大。每

服三五十丸，空心米饮送下，一日二次。得效减一服 好愈即住。作散调亦可。

【功用】戢阳气，止盗汗，进饮食，退经络热。

【主治】《医方集解》：阴虚盗汗。

【方论选录】《医方集解》：心血虚则睡而汗出、柏子仁味甘辛平，养心宁神为君；牡蛎、麦麸咸凉，清燥收脱为臣；五味酸敛涩收，半夏和胃燥湿为佐；麻黄根专主肌表，引参术以固正气为使。

56291 柏子仁丸

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】柏子仁（别研） 当归（洗） 熟地 白茯苓 丹皮 卷柏 白芍药 石斛 巴戟（去心） 肉苁蓉（酒浸） 山药 杜仲 白薇 蒲黄 枳壳 肉桂 京三棱（煨） 莪术（煨） 覆盆子 枸杞子各一两 附子（炮，去皮脐）半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温酒或米饮送下。

【主治】妇人血闭不通，渐成痨瘵。

56292 柏子仁丸

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】山茱萸四两 远志（去心） 柏子仁各半两 覆盆子 山药（另取末）各一两

【用法】上为细末，用山药、白面同酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前温酒送下，一日二次。

【功用】补益元气，充实肌肤。

56293 柏子仁丸

【方源】《奇效良方》卷三十四。

【组成】柏子仁 枸杞子（炒）各一两 地肤子一两半 韭子三两（须十月霜后采者，酒浸，晒干，微炒）

【用法】上为细末，以煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以粥饮送下。

【主治】虚劳梦泄。

56294 柏子仁丸

【方源】《女科秘要》卷四。

【组成】柏子仁（炒，另研） 牛膝 薄荷各五钱 泽兰叶 川断各二两 地黄三两

【用法】上为末，炼蜜为丸。空心米汤送下。兼服泽兰汤。

【主治】阴虚血弱，火甚水亏而经闭。

【宜忌】忌用毒药。

56295 柏子仁汤

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】柏子仁 虎头骨（涂酥炙）各一两 人参 茯神（去木） 犀角屑 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒黄） 远志（去心） 小草各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎取七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】煎厥，气逆多怒，肝气不治。

【备考】方中小草，《普济方》作“甘草”。

56296 柏子仁汤

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】柏子仁（酒浸一宿，晒干） 桂（去粗皮） 人参 白术（米泔浸一宿，锉，炒） 干姜（炮） 甘草（炙） 防风（去叉） 山芋 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 芎䓖 芍药 黄耆 磁石（煅，醋淬七次） 乌头（炮裂，去皮脐） 白茯苓（去黑皮）各一两半

【用法】上㕮咀。每服三钱匕，先以水三盏，煮羊肾一只，取汁一盏，去羊肾，下药，加生姜一枣大（拍碎），同煎至七分，去滓，食前温服。

【功用】补不足。

【主治】肾间有水，使人耳聋。

56297 柏子仁汤

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】新罗参 黄耆 茯神 瓜蒌根 天门冬（去心） 麦门冬（去心） 甘草各一两 北五味半两（炒） 柏子仁半两 熟地二两

【用法】上为粗末。每服五钱，水一盏半，生姜三片，大枣三个，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】滋养营卫，调心顺气。

【主治】上焦虚热，烦躁，口苦，四肢倦怠，津液内燥。

56298　柏子仁汤

【方源】《济生》卷六。

【组成】当归（去芦，酒炒）　芎䓖　茯神（去木）　小草　阿胶（锉，蛤粉炒成珠子）　鹿茸（燎去毛，酒蒸，焙）　柏子仁（炒）各一两　香附子（炒去毛）二两　川续断（酒浸）一两半　甘草（炙）半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，生姜五片，煎至七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】妇人忧思过度，劳伤心经，致崩中下血。

【备考】方中甘草用量原缺，据《普济方》补。

56299　柏子仁汤

【方源】《济生》卷七。

【组成】柏子仁（炒）　白芍药　防风（去芦）　茯神（去木）　当归（去芦，酒浸）　芎䓖　附子（炮，去皮脐）各一两　细辛（洗，去土叶）　桂心（不见火）　甘草各半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肝气虚寒，两胁胀满，筋脉拘急，腰膝小腹痛，面青口噤。

56300　柏子仁汤

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】柏子仁　川芎　茯神　阿胶　小草　香附各一钱　当归　续断　熟地各一钱五分　龙齿　甘草　棕灰各五分。

【用法】加生姜三片，水煎，入盐少许，空心服

【主治】妇人思虑伤心，不能藏血，以致崩漏。

56301　柏子仁汤

【方源】《准绳·类方》卷三。

【组成】人参　半夏　白茯苓　陈皮　柏子仁　甘草（炙）　麝香少许（另研）

【用法】加生姜煎，入麝香调匀和服。

【主治】关格。

【加减】加郁李仁更妙。

【方论选录】《法律》卷五：此方用六君子汤去白术之滞中，加柏子仁、郁李仁之润下，少加麝香以通关窍，非不具一种苦心，然终不识病成之理，不知游刃空虚，欲以麝香开窍，适足以转闭其窍耳。

【备考】《张氏医通》有白术，无半夏。主治胃虚关格，脉虚微无力。

56302　柏子仁饮

《圣济总录》卷四十二。为原书卷四十一“桂附汤”之异名。见该条。

56303　柏子仁酒

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】柏子仁（生研）二两　鸡粪白（炒）二两　桂（去粗皮）二两　生姜（不去皮，切）一两

【用法】上为粗末，共炒令焦色，乘热投酒六升，候冷滤去滓。每服七分一盏，空心、日午、夜卧服。

【主治】中风失音不语。

56304　柏子仁散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】柏子仁一两　羌活一两　枳实一两（麸炒微黄）　前胡一两（去芦头）　赤茯苓一两　甘草半两（炙微赤，锉）　五加皮一两　赤芍药一两　细辛一两　白蒺藜一两（微炒，去刺）　桂心一两　防风一两（去芦头）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肝脏风，上焦虚热，腹下坚满，关节疼痛，筋脉抽掣。

56305　柏子仁散

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】柏子仁一两　人参三分（去芦头）　虎头骨一两（涂酥炙令黄）　知母三分　茯神三分　犀角屑三分　远志三分（去心）　桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　小草三分

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肝脏气逆，不欲见人，面青多怒。

56306 **柏子仁散**

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】柏子仁 桂心 赤芍药 半夏(汤浸洗七次去滑) 人参(去芦头) 当归(锉，微炒) 独活各一两 甘草半两(炙，微赤，锉) 犀角屑 远志(去心) 麦门冬(去心) 麻仁各一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心脏风邪，恍惚迷闷，饮食不下。

【备考】方中柏子仁至独活七味用量原缺，据《普济方》补。

56307 **柏子仁散**

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】柏子仁半两 附子一两(炮裂，去皮脐) 莽草一两(微炙) 石斛一两(去根节，锉) 牛膝一两(去苗) 萆薢半两(锉) 赤芍药半两 防风半两(去芦头) 桂心半两 山茱萸半两 细辛半两 白术半两 芎䓖半两 羌活一两 天麻一两 麻黄一两(去根) 甘草一两(炙微赤，锉)

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】风，遍身如虫行。

56308 **柏子仁散**

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】柏子仁 巴戟 天雄(炮裂，去皮脐) 牛膝(去苗) 天门冬(去心，焙) 川椒(去目及闭口者，微炒去汗) 菟丝子(酒浸三宿，晒干，别捣)各一两 肉桂二两(去皴皮) 石南三分 续断三分 当归三分

【用法】上为细散。每服二钱，空心及晚食前以温酒调下。

【功用】益气血，利四肢，强腰脚，除湿痹。

【主治】风劳。

56309 **柏子仁散**

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】柏子仁三分 羌活半两 当归三分(锉碎，微炒) 防风半两(去芦头) 赤箭三分 桂心半两 芎䓖三分 白附子半两(炮裂) 牛膝三分(去苗) 桑寄生三分 藿香三分 仙灵脾三分 麝香一分(研入)

【用法】上为细散，研入麝香令匀。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】妇人风虚劳冷，气血不调，手脚挛急，头目旋眩，肢节烦疼痛。

56310 **柏子仁散**

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】柏子仁 远志(去心) 人参(去芦头) 桑寄生 防风(去芦头) 琥珀(细研) 当归(锉，微炒) 熟干地黄 甘草(炙微赤，锉)各半两

【用法】上为散。每服以水一大盏，入白羊心一个(切)，先煎至七分，去滓，下药五钱，更煎至四分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：产后妄言乱语，皆由内虚，是血邪气攻心。②《济阴纲目》：产后元气虚弱，瘀血停滞，妄言乱语，乍见鬼神。

56311 **柏子仁散**

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】柏子仁一两

【用法】上为细散。一二岁儿每服一字，用粥饮调下。三四岁儿每服半钱，一日三四服。

【主治】小儿惊啼，状如物刺。

56312 **柏子仁散**

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】柏子仁(生研细)二两 桂(去粗皮，为末)一两

【用法】上二味共和匀。别用大豆一升，鸡粪白三合同炒令黄，投酒三升，乘热滤去滓，每用酒一盏，温调药二钱匕，空心、日午、夜卧服。

【主治】中风失音不语，半身不遂。

56313 **柏子仁散**

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】柏子仁(研)　冬瓜子(炒)　冬葵子(炒)　白茯苓(去黑皮)各三两

【用法】上为散。每服二钱匕，以温酒调服，食后、日午、临卧各一服。

【主治】面皯疱。

56314　柏子仁散《宣明论》卷二。为《圣济总录》卷四十一"桂附汤"之异名。见该条。

56315　柏子仁散

【方源】《婴童百问》卷四。

【组成】防风　柏子仁各等分

【用法】上为末。以乳汁调涂囟门上。

【主治】囟门不合。

56316　柏子仁粥

【方源】《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】柏子仁10～15克　蜂蜜适量　粳米50～100克

【用法】先将柏子仁去尽皮壳杂质，稍捣烂，同粳米煮粥，待粥将成时，兑入蜂蜜适量，稍煮一、二沸即可。每天服食二次。

【功用】润肠通便，养心安神。

【主治】慢性便秘，心悸，健忘，失眠。

【宜忌】平素大便稀溏者、患病发热者忌食。

【加减】年老体弱者，可将蜂蜜换为胡桃肉。

【方论选录】柏子仁味甘而有油，气微香，性平无毒，入心、肝、脾经，有一定抗衰老效果，临床实践证明它是一味理想的滋补强壮，养心安神良药。凡是血虚老人，体弱患者，都可经常食用。适用于素体阴亏、年老虚衰、产后羸弱等肠燥便秘之症。另外，蜂蜜甘而滋润，能滑利大肠，内服可使大便通畅。对肠燥便秘，体虚而不宜攻下通便药物的甚为适宜。二药同米煮粥，其味颇佳，患者乐于服食，可收滋补强壮，养心润肠之效。

56317　柏子仁膏

【方源】《卫生总微》卷十六。

【组成】柏子仁(拣净)　松子仁　胡桃仁各等分

【用法】上研和膏。每服如弹子大，热汤化下，未快再服。

【主治】大便秘涩。

56318　柏叶洗方

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】侧柏叶四两　苏叶四两　蒺藜秧八两

【用法】共为粗末。装纱布袋内，用水五至六斤，煮沸30分钟，去滓浸洗。

【功用】清热、润肤、止痒。

【主治】牛皮癣(白疕风)，鱼鳞癣(蛇皮癣)及其他皮肤干燥脱屑类皮肤病。

56319　柏白皮汤

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】柏白皮(焙干，锉)二斤　酸石榴枝一握(烧灰，细研)

【用法】先将柏白皮为粗末，每用四钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，下石榴枝灰一钱半匕，更煎至八分，空心服，至晚再服。

【主治】小便不禁。

【备考】本方方名，《普济方》引作"柏皮汤"。

56320　柏竹沥膏

【方源】《三因》卷十六。

【组成】慈竹一段(去两头节)　黄柏(去粗皮，刮细者，满填竹内)

【用法】用砖对立，置竹砖上，两头各安净碗，以干竹火烧令沥出，尽收之，以钗股铜筷点。

【主治】赤眼障翳。

56321　柏脂醖酒

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】炼成柏脂十斤(研为末，炼如松脂法)　糯米一石　细曲十五斤　石灰一石

【用法】先炒石灰，以木札着灰中试之，火出为度，以地骨皮锉五斗，以水一石五斗，煮取九斗半，去滓，以淋石灰三次澄，以灰汁和曲与柏脂粉拌米，用汁、米、曲、柏脂粉多少，一如常醖法，次于净器，著曲、米、汁、粉在内，

蜜封四七日，开压去滓，取清酒。每服五合至七合，常令酒气相接取效。

【功用】生发，坚眉鬓。

【主治】大风癞。

【宜忌】忌触外风冷。其米泔及糟不得令豕畜食。

56322 **柏子安心汤**

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】人参　茯神　柏子仁各三钱　远志一钱　菖蒲三分　当归　生地各五钱　五味子十粒　贝母　黄连各五分

【用法】水煎服。

【主治】舌出血。

56323 **柏子坠痰丸**

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】黄耆二两　云苓一两　栝楼仁六钱（去油）　半夏八钱　胆星八钱　陈皮四钱　麦冬八钱　贝母五钱　犀角二钱　牛黄三分　青礞石五钱　急性子五钱

【用法】共为细末，水打为丸。每服一钱半。先服固精明目丸，待有好转，再服本方。

【主治】两眼不疼不红，外观无异，但视物歪斜（中心性视网膜脉络膜炎）。

56324 **柏子建宫丸**

【方源】《医略六书》卷二十七。

【组成】熟地三两　当归三两（酒炒）　白芍一两半（酒炒）　川芎八钱（炒）　阿胶三两（麸炒）　艾叶一两五钱（醋炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三钱，温酒送下。

【主治】血虚宫冷，不孕，脉数濡弦微涩者。

【方论选录】当归养血以荣血海，熟地补血以滋冲任，川芎行血中之气，白芍敛经中之阴，阿胶补任脉之血，艾叶暖子宫以调血气也。蜜以丸之，酒炒以行之，使血海充足，则子宫温暖而冲任化育有权，天下无不孕之妇矣。

56325 **柏子养心丸**

【方源】《医部全录》卷三三一引《体仁汇编》。

【组成】柏子仁（蒸，晒，去壳）四两　枸杞子（酒洗，晒）三两　麦门冬（去心）　当归（酒浸）　石菖蒲（去毛，洗净）　茯神（去皮心）各一两　熟地（酒蒸）　元参各二两　甘草（去粗皮）五钱

【用法】上为末，内除柏子仁、熟地黄蒸过，石器内捣如泥，余药末和匀，加炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，临睡白汤送下。

【功用】①《医部全录》引《体仁汇编》：补血宁神，滋阴壮水。②《医统》：宁心保神，益血固精，祛烦热惊悸，聪明不忘。

56326 **柏子养心丸**

【方源】《医统》卷七十引《集验方》

【组成】柏子仁（鲜白不油炽者，以纸包捶去油）　白茯神　酸枣仁各二两　五味子半两　当归身　生地黄各二两　甘草　辰砂（细研）　犀角（镑）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如芡实子大，金箔为衣。每服一丸，午后、临卧时津嚼。

【主治】心劳太过，神不守舍，合眼则梦，遗泄不常。

【备考】《丸散膏丹集成》有黄耆。治血虚内热，失眠心悸，及妇女经少，瘦损潮热。

56327 **柏子养心丸**

《中国药典》一部。为《北京市中药成方选集》“柏子养心丹”之异名。见该条。

56328 **柏子养心丹**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【异名】柏子养心丸（《中国药典》一部）。

【组成】柏子仁二钱五分　黄耆一两　茯苓二两　酸枣仁（炒）二钱五分　川芎一两　当归一两　半夏曲一两　甘草一钱　人参（去芦）二钱五分　肉桂（去粗皮）二钱五分　五味子（炙）二钱五分　远志（炙）二钱五分

【用法】上为细粉，炼蜜为丸，重三钱，朱砂为衣。每服一丸，日服二次，温开水送下。

【功用】补气养血，安神益智。

【主治】心血不足，精神恍惚，怔忡惊悸，失眠健忘。

56329　柏子养心汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】生黄耆　麦冬　枣仁　人参　柏子仁各一钱　茯神　川芎　远志(制)各八分　当归二钱　五味子十粒　炙甘草五分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】妊娠子烦，左寸脉微弱者。

56330　柏子养心汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】柏子仁　茯神　丹参各四钱　枣仁二钱　枸杞　熟地各三钱　玉京二钱　泽兰五钱　夏枯草三钱

【用法】水煎，温服。

【功用】养心益肾。

【主治】经行无定期，色较正常，血量少，性情急躁，时或抑郁不舒，心悸，怔忡，多梦，食少胸闷，舌质淡红，苔薄白，脉沉而弦数。

【加减】虚烦口渴，无自汗及欲呕者，加栀子炭二钱，豆豉一钱。

56331　柏术四制丸

【方源】《玉案》卷二。

【组成】川黄柏(去皮)四斤(酥炙一斤，人乳浸一斤，童便浸一斤，盐水浸一斤)　茅山苍术(刮去皮)二斤(川椒炒八两，破故纸炒八两，五味子炒八两，当归炒八两)

【用法】拣去同炒之药，只用苍术、黄柏，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心酒下。

【功用】滋阴抑火，开胃进食，能除周身之湿。

56332　柏叶沐头丸

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】生柏叶一两　附子(生，去皮脐)半两　猪膏五两

【用法】上先将柏叶、附子为末，炼猪膏和为二十丸。每用一丸，用布裹之，纳沐头汤中洗头。

【功用】令发长不落。

【主治】脉极虚寒，鬓发堕落。

56333　柏叶黄耆散

【方源】方出《圣惠》卷三十七，名见《普济方》卷一八八。

【组成】生干地黄四两　黄芩　柏叶　甘草(炙微赤，锉)各一两　阿胶(杵，爆令碎、黄燥)　黄耆(锉)各二两

【用法】上为散。每服三钱，于食后用糯米粥饮调服。

【主治】吐血，日夜不止。

56334　柏叶鹿茸丸

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】柏叶一两　当归　干姜各三分　阿胶半两　鹿茸一两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下。

【主治】冲任气虚，脐腹疼痛，漏下赤白。

56335　柏桂生麦汤

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】麦冬一两　黄柏三钱　生地五钱　肉桂三分

【用法】水煎服。

【主治】肺燥肾虚，小便不通。

栀

56336　栀子丸

【方源】《外台》卷三十六引《小品方》。

【组成】栀子仁七个　黄连五分　黄柏三分(炙)矾石四分(烧)　大枣四个(炙令黑)

【用法】上为末，以蜜为丸，如小豆许。每服七丸，空腹时服；如未除，更服。

【主治】小儿[illegible]痢不止。

56337　栀子丸

【方源】《千金》卷六。

【组成】栀子仁三升　芎藭四两　大黄六两　豉三升　木兰皮半两　甘草四两

【用法】上为末，以蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，稍加至十五丸，一日三次。

【主治】酒渣鼻疱。

56338　栀子丸

【方源】方出《圣惠》卷五十五，名见《普济方》卷一九五。

【组成】栀子仁一两 栝楼子一两(炒) 苦参一两(锉)

【用法】上为末，以醋渍鸡子黄白二枚，用和药末，为丸如梧桐子大。每服三十丸，温水送下，一日四五次。

【主治】黄汗，体热，大小便不利

56339 栀子丸

【方源】《普济方》卷九十三引《海上名方》

【组成】山栀子(去皮) 草乌头(炮) 干姜(炮)各半两

【用法】上为末，煮枣肉为丸，如绿豆大。每服三丸，渐加至七丸，常服二丸，细嚼，茶、酒任送下。

【主治】瘫痪风。

56340 栀子丸

《得效》卷三。为《千金》卷十“茵陈丸”之异名。见该条。

56341 栀子汤

【方源】方出《肘后方》卷二，名见《外台》卷一引《古今录验》。

【组成】大黄 麻黄各二两 栀子仁十四个 豉一升

【用法】上以水五升，煮取三升，分二次服。当小汗及下痢。

【主治】时气病起诸劳复。

56342 栀子汤

【方源】《外台》卷二引《范汪方》。

【组成】栀子十四个 豉一升 桂心二两 麻黄二两 大黄二两

【用法】上㕮咀。以水七升，先煮麻黄掠去沫，纳余药，更煮取二升，去滓温服一升，一日二次。当小汗及下利。

【主治】伤寒愈以后，饮食劳复。

【宜忌】忌生葱。

56343 栀子汤

【方源】《外台》卷三十七引《小品方》。

【组成】栀子仁二两 甘草(炙) 芒消(汤成下) 黄芩各二两

【用法】上切。以水五升，煮取二升，分二次温服。取利即愈。

【主治】因热食及啖诸热饼肉，致小便稠数者。

56344 栀子汤

【方源】《外台》卷三十七引《小品方》。

【组成】栀子仁十四个 大黄三两 黄芩二两

【用法】上切。以水五升，煮取三升，去滓，分三次服。微利，又当数进餐食，自得眠睡。

【主治】因食少热在内，致夜眠不得睡者。

56345 栀子汤

【方源】《医心方》卷二十引《深师方》。

【组成】黄芩三两 栀子四个 豉三升

【用法】上㕮咀。以水五升，先煮栀子、黄芩，令得三升，绞去滓，乃纳豉，煮令汁浓，绞去滓。平旦服一升，一日三次。

【功用】解散石毒。

【主治】服石，口中伤烂，舌痛。

56346 栀子汤

【方源】方出《外台》卷二十二引《古今录验》，名见《普济方》卷二九九。

【组成】大青四两 山栀子 黄柏各一两 白蜜半升

【用法】上切。以水三升，煎取一升，去滓，下蜜更煎一两沸，含之。取愈止。

【主治】口疮，咽喉中塞痛，食不得入。

56347 栀子汤

【方源】《外台》卷三引《延年秘录》。

【组成】栀子三两 黄芩三两 豉一升(熬，绵裹) 葱白(切)一升 石膏四两(碎，绵裹) 干葛四两(切)

【用法】上切。以水七升，煮取二升六合，去滓，分三次温服，如人行八九里再服。

【主治】天行一二日，头痛壮热，心中热者。

【宜忌】忌面、酒、生冷等物。

56348 栀子汤

【方源】《外台》卷四引《延年秘录》。

【异名】栀子散(《圣惠》卷五十五)。

【组成】栀子仁四两　黄芩三两　柴胡四两　升麻三两　龙胆草三两　大黄三两　栝楼三两　芒消二两

【用法】上切。以水九升,煮取二升八合,去滓,分三次温服,相去四五里进一服。

【主治】遍身黄如橘,心肋满急。

【备考】《圣惠》本方用法:上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

56349 栀子汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】栀子三十个　当归　芍药各二两　蜜五合　生姜五两　羊脂一两

【用法】将栀子以水一斗,煮取六升,纳后药,煎取二升,分三次服,一日三次。

【主治】产后儿生处空,流血不尽,小腹绞痛。

56350 栀子汤

【方源】《千金》卷十。

【组成】栀子十四个　恒山三两　车前叶二七个(炙干)　秫米十四粒

【用法】上㕮咀。以水九升,煮取三升,分三服,未发前一服,发时一服,发后一服。以吐利四五行为愈;不止,冷饭止之。

【主治】疟,经数年不愈者。

56351 栀子汤

【方源】《千金》卷十九。

【组成】栀子仁　芍药　通草　石韦各三两　石膏五两　滑石八两　子芩四两　生地黄　榆白皮　淡竹叶(切)各一升

【用法】上㕮咀。以水一斗,煮取三升,去滓,分三次服。

【主治】肾劳实热,小腹胀满,小便黄赤,末有余沥,数而少,茎中痛,阴囊生疮。

56352 栀子汤

【方源】《千金》卷二十二。

【组成】栀子仁二七个　芒消二两　黄芩　甘草　知母各三两　大黄四两

【用法】上㕮咀。以水五升煮减半,下大黄,取一升八合,去滓,纳芒消,分三次服。

【主治】表里俱热,三焦不实,身体生疮及发痈疖,大小便不利。

56353 栀子汤

《千金翼》卷十八。为《金匮》卷中"栀子大黄汤"之异名。见该条。

56354 栀子汤

【方源】《外台》卷二引《广济方》。

【组成】栀子十四个(擘)　香豉一升(绵裹)　葱白一握(切)　粟米三合　雄鼠屎二七个(烧令烟绝,末)

【用法】上以水八升,煮取二升三合,去滓,纳鼠屎,分三次服。服别相去如人行六七里。

【主治】伤寒因食劳复,头痛壮热。

【宜忌】忌面、炙肉、蒜。

【加减】须利,纳芒消五分。

56355 栀子汤

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】栀子仁十四枚　豉一合

【用法】上药相和,分为二服。每服以水一中盏,入生姜半分,煎至六分,去滓温服。不拘时候。

【主治】伤寒五六日,大下之后,余热不去,心中结痛,欲解者。

56356 栀子汤

【方源】《普济方》卷三十四引《圣惠》。

【组成】栀子仁二十枚　升麻　黄芩　大青　茯神(去木)各二分　甘草(炙,锉)五钱

【用法】上为末。每服三钱,水一盏,豉五十粒,煎七分,去滓,入蜜半合,更煎三二沸,食后温酒服。

【主治】腹热气逆,口苦烦渴。

【宜忌】忌热面,炙煿。

56357 栀子汤

【方源】《苏沈良方》卷三。

【组成】栀子二两　附子(炮)一两

【用法】每服三钱,水一大盏、薤白三寸,同煎至五分,温服。

【主治】胸痹切痛。

【临证举例】胸痹 泗州有人病岁余，百方不愈，服此二服顿愈。

56358 栀子汤

《圣济总录》卷四十。为《伤寒论》“栀子豉汤”之异名。见该条。

56359 栀子汤

《圣济总录》卷四十二。为《圣惠》卷三“栀子散”之异名。见该条。

56360 栀子汤

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】山栀子仁半两 枳壳（去瓤，麸炒）一分 大黄（锉，炒）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入豉二十粒，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】黄疸，心中懊憹，烦热。

56361 栀子汤 《圣济总录》卷六十。为《圣惠》卷五“泻热栀子散”之异名。见该条。

56362 栀子汤

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】栀子仁 地骨皮 麦门冬（去心，焙） 柴胡（去苗）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入竹茹，小麦各少许，煎七分，去滓温服。

【主治】虚劳骨节烦热，盗汗不止。

56363 栀子汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】栀子仁半两 黄连（去须）一两半 黄芩（去黑心）一两 枳实（麸炒）三分 龙胆一两 甘草（炙）三分 芍药一两 大黄（锉，炒）一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，食后温服，临卧再服。

【主治】目赤涩疼痛。

56364 栀子汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】山栀子七个 大黄末三钱

【用法】上取山栀子钻透入煻灰火煨熟，以水一升半，煎至八合，去滓，入大黄末搅匀，食后旋旋温服。

【主治】赤目。

56365 栀子汤

《圣济总录》卷一〇五。为原书同卷“洗眼三黄汤”之异名。见该条。

56366 栀子汤

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】山栀子 升麻 决明子（微炒） 黄芩（去黑心）各三分 黄连（去须） 干蓝叶 大黄（锉，炒）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓，入朴消末半钱匕，再煎沸，放温服，临卧再服。

【主治】风热毒气，忽冲眼肿，白睛似水泡，疼痛不可睡卧。

56367 栀子汤

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】栀子仁半两 犀角屑一两 木通（锉） 黄芩（去黑心）各半两 大黄（锉，炒） 瞿麦穗各一两 黄连（去须）三分 车前子一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，入竹叶七片，煎至八分，去滓，投芒消半钱匕，食后温服，临卧再服。

【主治】肝心热毒，目生疮及磣痛。

56368 栀子汤

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】栀子仁 甘草各一两

【用法】上为细末。以水二升，煎至一升半，去滓，温浸指上，一日三五次。

【主治】代指。

56369 栀子汤

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【异名】栀子仁汤（《普济方》卷三五四）。

【组成】栀子仁一两半 石膏四两 黄芩（去黑心）一两半 泽泻二两 柴胡（去苗）一两半 赤芍药二两 萎蕤一两半 车前草（切）半两

【用法】上为粗末。每服四钱匕，水一盏半，

加淡竹叶十片，同煎至八分，去滓，食前服。

【主治】妊娠大小便不通，脐腹胀痛。

56370 **栀子汤** 《圣济总录》卷一八四。为张文仲引陶氏方(见《外台》卷二)"豉薤汤"之异名。见该条。

56371 **栀子汤**

【方源】《普济方》卷三五二。

【组成】芍药四两　牡丹　虻虫各三两　栀子十四个

【用法】上用水五升，煮取二升，分为三服。

【主治】产后月水不调，及腹内胀不除，身强痛。

56372 **栀子汤**

【方源】《幼科类萃》卷六。

【组成】栀子仁　木通　当归尾　白芷各二钱　防风　甘草各一钱

【用法】上为细末。麦门冬汤送下。

【主治】小儿心脏积热，小便赤肿，口内生疮。

56373 **栀子汤**

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】甘草　柴胡一两　漏芦　连翘　山栀各二钱　黄芩　防风　人参各二钱　茯苓　黄耆二钱二分

【用法】每服一两，水煎服。

【主治】疮疡，久发热不已。

【备考】方中甘草、茯苓用量原缺。

56374 **栀子汤**

【方源】《易氏医案》。

【组成】黑山栀　人参　麦冬　乌梅

【主治】妇人身倦怠，呵欠，口干饮冷，饮食不进，脉右寸微沉，右尺洪大侵上。

【方论选录】方中山栀炒黑，以去三焦屈曲之火，人参、麦冬以收肺中不足之金，乌梅酸以收之，火势既降，金体自坚，气畅血和而愈。

【临证举例】肺火病　一妇人患浑身倦怠，呵欠，口干饮冷，一月不食，强之食数粒而已。诸治不效。次年更甚，肌消骨露。诊之三焦，脉洪大侵上，脾肺二脉微沉，余部皆和平。以栀子汤饮之，进二服，即知饥喜食，旬日气体充实如常。

56375 **栀子汤** 《张氏医通》卷十五。为原书同卷"栀子仁散"之异名。见该条。

56376 **栀子汤**

【方源】《古今医彻》卷二。

【组成】栀子一钱(炒黑)　山楂二钱　橘核一钱　荔枝核一钱　泽泻一钱　枳实一钱　归尾一钱　茯苓一钱　小茴香一钱(盐水焙)　柴胡七分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】疝气或左或右，疼痛肿大。

56377 **栀子饮**

【方源】《明医指掌》卷六。

【组成】山栀(炒)半两　桃仁(炒)半两　枳壳(炒)半两　山楂半两　(一方加吴茱萸)

【用法】姜汁同顺流水煎服。

【主治】虚而挟热疝。

56378 **栀子饮**

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】栀子(炒黑)　白芍(炒)　黄芩(炒)　柴胡　陈皮　甘草　神曲(炒)　麦芽(炒)　当归

【用法】白水煎服。

【主治】小儿腹痛因热而作，面赤作渴。

56379 **栀子套**

【方源】《圣济总录》卷一四〇。

【组成】栀子壳半个(填车脂满壳中)

【用法】上套在指上，如痛处稍痒，刺自然出，以镊子取之。钳指亦依此法。

【主治】签刺在爪甲中，痛不可出。

56380 **栀子酒**

【方源】《普济方》卷一九五。

【组成】栀子　茵陈各一束

【用法】上以无灰酒二大碗，煎至八分，三更时分服之。

【主治】黄疸。

【宜忌】忌油腻、湿面、豆腐、生冷等物。

56381 **栀子散**

【方源】《圣惠》卷三。

【异名】栀子汤（《圣济总录》卷四十二）。

【组成】栀子仁二十一个 川升麻三分 黄芩三分 大青三分 茯神三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入豉五十粒，煎至六分，去滓，入蜜半合，更煎三二沸，每于食后温服。

【主治】胆实热，精神不守。

【宜忌】忌热面，炙爆。

56382 **栀子散**

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】栀子仁一两 石膏二两 白茅根一两（锉） 赤茯苓一两 犀角屑一两 木通一两（锉） 黄芩一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入生地黄半两，淡竹叶二七片，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】膀胱实热，心腹烦闷，小便不利。

【宜忌】忌炙煿热面。

56383 **栀子散**

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】栀子仁三分 黄连三分（去须） 黄柏三分（锉） 川大黄二分（锉碎，微炒） 芦根一两（锉） 葛根一两（锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入豉半合，葱白二茎，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒五日，头痛壮热，四肢烦疼，不能饮食，呕逆不定。

56384 **栀子散**

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】栀子仁 桂心 麻黄（去根节） 川大黄（锉碎，微炒） 甘草（炙微赤，锉）各一两 豉二两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒新愈后，因食早起动多而劳复。

56385 **栀子散**

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】栀子仁一两 黄芩一两 石膏一两 杏仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 葛根一两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入葱白二茎，豉五十粒，煎至五分，去滓热服，衣覆取汗，不拘时候。

【主治】时气二日，头痛背强，身热恶寒。

56386 **栀子散**

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】栀子仁 葳蕤 茯神 麦门冬（去心） 川升麻 知母 犀角屑 沙参（去芦头） 黄芩 川大黄（锉碎，微炒） 甘草（炙微赤，锉）各一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气，热毒攻心，面目俱赤，发狂不识人。

56387 **栀子散**

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】栀子仁 紫草 白鲜皮 黄芩 秦艽（去苗）各一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气三日外，若忽觉心满，坚硬，脚手心热，则变为黄。

56388 **栀子散**

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】栀子仁三分 黄芩三分 石膏一两 葛根一两（锉） 柴胡一两（去苗） 麦门冬一两（去心焙）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入豉五十粒，葱白三茎，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病一日，头疼壮热，心中烦闷。

56389 **栀子散**

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】栀子仁一两　葛根一两(锉)　茵陈一两　土瓜根一两　川升麻一两　川大黄一两(锉碎,微炒)　川芒消一两　木通一两(锉)　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服五钱,以水一大盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热病六日,胃中瘀热,皮肤赤黄,心神烦闷,大小便不利。

56390　栀子散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】栀子仁半两　秦皮三分　蔓荆子三分　白芷三分　细辛三分　玄参三分　决明子三分　葶苈子三分　防风三分(去芦头)　车前子三分　赤茯苓三分　枳壳三分(麸炒微黄,去瓤)　蕤仁三分(汤浸,去赤皮)　甘菊花三分　黄芩三分

【用法】上为细散。每服一钱,于食后煎竹叶汤调下。

【主治】眼赤,风泪出,痒,及胎赤障翳,睑急痛。

【宜忌】忌炙煿、油腻、生菜、热面。

56391　栀子散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】栀子仁一两　黄连一两(去须)　枳壳三分(麸炒微黄,去瓤)　龙胆一两(去芦头)　赤芍药一两　甘草三分(炙微赤,锉)　川大黄一两(锉碎,微炒)　柴胡一两半(去苗)　大青一两

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,食后温服。

【主治】上焦壅热,眼睛疼痛,大小便秘涩,心神烦躁,不得眠卧。

56392　栀子散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】栀子仁一两　木通一两(锉)　黄芩半两　甘草半两(炙微赤,锉)　羚羊角屑一两　决明子半两

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,每于食后温服。

【主治】眼小眦生赤脉,冲贯黑睛,视物昏暗。

【宜忌】忌炙煿、热面。

56393　栀子散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】栀子仁半两　豉二合(不捣)　陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙)　甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为散。分为三服,每服以水一中盏,入生姜半分,煎至六分,去滓温服。

【主治】霍乱,吐下后烦渴。

56394　栀子散　《圣惠》卷五十五。为《外台》卷四引《延年秘录》"栀子汤"之异名。见该条。

56395　栀子散

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】栀子仁一两　豉二合　川大黄一两(锉碎,微炒)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,一日四五次。

【主治】酒疸,心中懊痛。

56396　栀子散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】栀子仁一两　川大黄一两　黄连一两(去须)　白及一两　牡蛎一两　白蔹一两　木通一两(锉)　川升麻一两　黄芩一两

【用法】上为细散。每用以鸡子白调涂故帛上,贴肿处。燥复易之。

【功用】散肿气。

【主治】痈已溃后。

56397　栀子散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】栀子仁半两　子芩一两　龙齿二两　石膏二两　钩藤一两　吴蓝一两　川大黄三两(锉碎,微炒)

【用法】上为散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓温服。

【主治】小儿热痫,不知人,迷闷,嚼舌仰目。

56398　栀子散

【方源】《圣济总录》卷一三四。
【组成】栀子仁 白矾灰等分
【用法】上为散。用黄胶熬膏,调涂之。
【主治】汤火所伤。

56399 **栀子散**
【方源】《直指》卷十八。
【组成】栀子仁(制) 枳壳各半两 北梗 北前胡 青木香 赤茯苓 车前子 甘草各一分
【用法】上锉。每服三钱,新水煎服。
【主治】肾气虚,中有热,小腹、外肾、肛门俱热,大小便不通。
【加减】壮热,加柴胡;大便秘,加大黄。

56400 **栀子散**
【方源】《普济方》卷三〇一。
【组成】栀子一个(去瓤) 明矾(末)
【用法】上将明矾末装入栀子内,面糊合口,火烧热存性,为末。洗净,干掺上。
【主治】下疳疮。

56401 **栀子散**
【方源】《普济方》卷三〇六。
【组成】栀子皮(烧灰) 石硫黄末
【用法】上为末。外敷疮上,一日一易,救急用二三次愈。
【主治】狂犬伤。

56402 **栀子散** 《普济方》卷三五三。为《圣惠》卷七十八"栀子仁散"之异名。见该条。

56403 **栀子散**
【方源】《叶氏女科》卷二。
【组成】山栀仁(炒) 萝卜子(炒)各等分
【用法】上为末。每服一钱,米饮调下。
【主治】妊娠子肿,属湿热肿满者。

56404 **栀子煎**
【方源】《千金》卷十八。
【组成】栀子仁 枳实 大青 杏仁 柴胡 芒消各二两 生地黄 淡竹叶(切)各一升 生玄参五两 石膏八两
【用法】上㕮咀。以水九升,煮取三升,去滓,下芒消,分三次服。
【主治】皮实,肺病热气。

56405 **栀子膏**
【方源】《医心方》卷十八引《小品方》。
【组成】栀子二十个 白蔹五两 黄芩五两
【用法】上㕮咀。以水五升,麻油一升合煎,令水气竭,去滓冷之,淋疮。
【功用】去热毒,宽肌皮。
【主治】卒被火烧,苦剧痛闷绝,不识人。

56406 **栀子膏**
【方源】《圣惠》卷九十。
【组成】栀子仁一两 川升麻一两 犀角屑三分 蛇衔一两 蓝叶五合(切) 生地黄二两 黄芩一两
【用法】上细锉,以猪脂一斤半,同人铛内,于微火上煎十余沸,滤去滓,膏成,于瓷盒中盛。涂于故帛上,贴之。
【主治】小儿热毒疮。

56407 **栀子膏**
【方源】《圣惠》卷九十一。
【组成】栀子仁半两 川升麻半两 犀角屑半两 蛇衔三分 蓝叶一两 生地黄一两 黄芩半两 川大黄一两
【用法】上为细末,以猪脂一斤,同于锅内,以微火煎令药色变,滤去滓,以瓷盒盛。候冷,涂之。
【主治】小儿熛疮。

56408 **栀子膏** 《圣济总录》卷四十九。为《圣惠》卷三十七"滴鼻栀子仁煎"之异名。见该条。

56409 **栀仁汤**
《医钞类编》卷六。为《明医杂著》卷六"栀子仁汤"之异名。见该条。

56410 **栀芩汤**
【方源】《妇科玉尺》卷二。
【组成】山栀 黄芩 当归 元参 枳壳 苏梗 广皮 白芍 杜仲
【用法】水煎服。
【主治】痛胎。妊娠时常腹痛。

56411　**栀附丸**

【方源】《医级》卷八。

【组成】栀子(炒)　附子(制)各等分

【用法】上为末,米糊作丸。每服一钱五分,茴香、木香汤送下。

【主治】疝痛,攻冲胸胁,呕吐不止。

56412　**栀香饮**

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】炒栀子　荆芥各三钱　茯苓五钱　甘草　乳香末　丹砂末　木香末各一钱

【用法】水煎,调服。

【主治】因肝郁不舒,气郁化火以犯心,以致心痛之极,苦不欲生,彻夜呼号,涕泗滂沱者。

56413　**栀姜饮**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】山栀仁十五个(炒焦)

【用法】水一盏,煎至六分,入生姜自然汁三匙令辣,再煎少沸,热饮。或入川芎一钱尤妙。

【主治】胃热作痛。

【加减】如用此及劫痛药不止者,须加玄明粉一钱服之。

56414　**栀桂丸**

【方源】《济阳纲目》卷七十六。

【组成】桂枝　山栀子(炒)　乌头(炮,细切)

【用法】上为细末,姜汁糊丸,如梧桐子大。每服四五十丸,空心白汤送下。

【主治】疝气,按之不痛者。

56415　**栀豉汤**

《寿世保元》卷二。为《伤寒论》"栀子豉汤"之异名。见该条。

56416　**栀萸丸**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】山栀仁(炒焦)三两　吴萸　香附各五钱

【用法】上为末,蒸饼为丸,如花椒大。每服二十丸,生地黄(酒洗)同生姜煎汤送服。

【主治】气实心痛。

56417　**栀黄散**

【方源】《诚书》卷十五。

【组成】大黄(炒)　升麻　黄芩各五钱　栀子仁　甘草各一分

【用法】上为散。取一钱,水煎服。

【主治】疮疖初起,烦热。

56418　**栀子仁丸**

【方源】《济生》卷五。

【组成】栀子仁

【用法】上为末,溶黄蜡等分和为丸,如弹子大。空心茶酒嚼下。半月效。

【主治】酒渣鼻。肺热鼻发赤瘰。

【宜忌】①《济生》:忌酒、炙煿。②《金鉴》:忌辛辣之物。

56419　**栀子仁汤**

【方源】方出《千金》卷二十,名见《圣济总录》卷五十三。

【异名】泻脬汤(《三因》卷八)。

【组成】石膏八两　栀子仁　茯苓　知母各三两　蜜五合　生地黄(切)　淡竹叶(切)各一升

【用法】上㕮咀。以水七升,煮取二升,去滓,下蜜,煮二沸,分三次服。

【主治】膀胱实热,转胞不得小便,头眩痛烦满,脊背强,腰中痛,不可俯仰。

【加减】须利,加芒消三两。

56420　**栀子仁汤**

【方源】《活人书》卷十六。

【异名】柴胡散(《普济方》卷一三五)、阳毒栀子汤(《准绳·伤寒》卷三)。

【组成】栀子仁一两　柴胡一两半(去苗)　川升麻二两　黄芩二两　赤芍药一两　大青一两　石膏二两　知母一两　甘草半两(炙赤,锉)　杏仁二两(汤浸,去皮尖双仁者,麸炒微黄)

【用法】上为粗末。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,豉一百粒,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】阳毒伤寒,壮热,百节疼痛。

56421 栀子仁汤

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】栀子仁 柴胡（去苗） 朴消（别研） 茵陈蒿各半两

【用法】上除朴消外，各为细末。用水三大盏，煎至二大盏，去滓，下朴消，搅令匀，分三次温服，不拘时候。取利为度。

【主治】伤寒急黄。

56422 栀子仁汤

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】栀子仁一分 芎䓖半两 酸枣仁（炒）一两 陈橘皮（去白，炒） 人参 白茯苓（去黑皮）各半两 豉（炒）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一大盏，加生姜三片，煎至七分，去滓，食前温服，一日二次。

【主治】伤寒后，虚烦不得眠睡，呕逆。

56423 栀子仁汤

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】山栀子仁四七个（锉）

【用法】以浆水一升半，煎至五合，去滓，空心、食前分二次温服。

【主治】赤白痢，并血痢。

56424 栀子仁汤

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】栀子仁十个 黄芩（去黑心） 大黄（锉炒）各三两 豉二合

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，入香豉一合，煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】乳石发，体热烦闷，口中疮烂，表里如烧，痛不能食。

56425 栀子仁汤

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】栀子仁二十一个 甘草（炙令赤色，锉）二两 人参二两 黄连（去须）二两

【用法】上为粗末。每服四钱匕，用水二盏，煎至一盏，去滓温服，早晨、日午、晚后食前各一次。

【主治】乳石发，下痢。

56426 栀子仁汤

【方源】《卫生总微》卷七。

【组成】栀子仁二十一个 豉二合 薤白一握（切）

【用法】上以水二大盏，同煎至一盏，去滓，量大小分作数服，不拘时候。

【主治】小儿伤寒热毒攻于肠胃，下赤汁，或如烂肉鸭肝，壮热腹痛。

56427 栀子仁汤

【方源】《外科精义》卷下引《普济生灵方》

【异名】六味栀子仁汤（《景岳全书》卷六十四）、栀子仁散（《杏苑》卷八）。

【组成】郁金 枳壳（去瓤） 升麻 栀子仁 牛蒡子 大黄各一两

【用法】上为细末。每服三钱，蜜水调下。

【主治】时气头面赤肿。

56428 栀子仁汤

【方源】《伤寒图歌活人指掌》卷四

【组成】栀子仁 赤芍药 大青 知母各一钱 升麻 黄芩 石膏 杏仁各二钱 柴胡一钱半 甘草半钱 豉一百枚

【用法】上用水三盏，煎至一盏半，去滓，分二次服。

【主治】伤寒发狂烦躁，面赤咽痛，潮热。

56429 栀子仁汤

《普济方》卷三五四。为《圣济总录》卷一五七“栀子汤”之异名。见该条。

56430 栀子仁汤

《普济方》卷三六九。为《伤寒论》“栀子甘草豉汤”之异名。见该条。

56431 栀子仁汤

【方源】《明医杂著》卷六。

【异名】栀仁汤（《医钞类编》）卷六。

【组成】郁金 枳壳（麸炒） 升麻 山栀仁（炒）各等分

【用法】每服五钱，水煎服。

【主治】①《明医杂著》：时毒肿痛，大便秘结。②《医钞类编》：热燥而咳者。

56432 栀子仁汤

《张氏医通》卷十六。为《圣惠》卷九十二"栀子仁散"之异名。见该条。

56433 栀子仁饮

【方源】《圣惠》卷七十四。

【异名】栀子石膏汤(《胎产秘书》卷上)

【组成】栀子仁一两　川升麻三两　黄芩一两　生地黄二两　大青二两　石膏三两(捣碎)

【用法】上为细末。每服半两,用水一中盏,入葱白七寸,豉四十九粒,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妊娠热病,斑出黑色,小便如血,气急胎欲落。

56434 栀子仁散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】栀子仁　川升麻　柴胡(去苗)　石膏　生干地黄　甘草(炙微赤,锉)　葛根(锉)各一两。

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,入生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒五六日,心膈烦躁,壮热,不得卧。

56435 栀子仁散

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】栀子仁　黄连(去须)　枳壳(麸炒微黄,去瓤)　龙胆(去芦头)　赤芍药　甘草(炙微赤,锉)　川大黄(锉碎,微炒)各半两

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,煎至五分,去滓,食后温服。

【主治】时气热毒未除,心胸烦闷,毒气上攻,两眼赤肿。

56436 栀子仁散

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】栀子仁一两　葱白十一茎　豉一合　雄鼠粪十四个　甘草半两(炙微赤,锉)　麻黄一两(去根节)　枳壳一两(麸炒微黄,去瓤)

【用法】上为粗末。每服半两,以水一大盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。有微汗,便愈。

【主治】时气已解数日,劳复发者。

56437 栀子仁散

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】栀子仁一两　黄芩一两　柴胡一两(去苗)　川升麻一两　龙胆一两(去芦头)　川大黄一两(锉碎,微炒)　栝楼一个(干者)　川芒消一两　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,入葱白二茎,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热病遍身黄如橘色,心胁满急。

56438 栀子仁散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【异名】栀子散(《普济方》卷三五三)。

【组成】栀子仁半两　犀角屑三分　赤芍药三分　黄芩半两　柴胡一两(去苗)　川大黄一两半(锉碎,微炒)　甘草半两(炙微赤,锉)　木通一两(锉)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,入生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后伤寒,烦热不解,大小便涩。

56439 栀子仁散

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】栀子仁　甘草(炙微赤,锉)　黄连(去须)　黄芩各半两

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓温服。

【主治】小儿胃中热,日渐肌瘦。

56440 栀子仁散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】栀子仁　黄芩　犀角屑　龙胆(去芦头)　赤芍药　黄连(去须)　川大黄(锉,微炒)　甘草(炙微赤,锉)各半两

【用法】上为散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓温服。

【主治】小儿眼风热涩赤痛。

56441 栀子仁散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】栀子仁一两　槐花半两(微炒)

【用法】上为细散。每服半钱，用温水调下，不拘时候。

【主治】小儿卒热，毒气攻脑，鼻衄。

56442 **栀子仁散**

【方源】《圣惠》卷九十二。

【异名】栀子仁汤（《张氏医通》卷十六）。

【组成】栀子仁五个 茅根半两（锉） 冬葵根半两 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿小便不通，脐腹胀闷，心神烦热。

56443 **栀子仁散**

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】栀子仁半两 黄柏三分（微炙，锉） 当归半两（锉，微炒） 地榆三分（微炙，锉）黄连一两（去须，微炒）

【用法】上为细散。每服半钱，以粥饮调下，一日三四次。

【主治】小儿热痢，腹痛，心烦口干，小便赤黄，不欲饮食。

56444 **栀子仁散**

《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》。为《伤寒论》"栀子甘草豉汤"之异名。见该条。

56445 **栀子仁散**

《杏苑》卷八。为《外科精义》卷下引《普济生灵方》"栀子仁汤"之异名。见该条。

56446 **栀子仁散**

【方源】《张氏医通》卷十五。

【异名】栀子汤。

【组成】栀子仁（熬黑）一两 白鲜皮 赤芍药 升麻各五钱 寒水石（如无，石盐代之） 甘草（炙）各三钱

【用法】上为散。每服一二钱，水煎，调紫草茸末半钱匕服之。

【主治】痘疹毒盛色黑，便秘。

56447 **栀子仁粥**

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】栀子仁一两 豉一分 人参半两（去芦头） 柴胡半两（去苗） 雄鼠粪二七个

【用法】上以水二大盏，煎取一大盏，去滓，纳粟米半合，煮作稀粥，温服，不拘时候。

【主治】伤寒已愈，因食过多，骨瘦头痛，壮热。

56448 **栀子仁粥**

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】栀子仁五个 白米五合

【用法】先以水三升，煎栀子至二升，滤去滓，即下米煮粥，候熟，空心食之。

【主治】发背痈疽，热极上攻，目涩，小便赤。

56449 **栀子仁煎**

【方源】《千金》卷六。

【组成】栀子仁 蕤仁 决明子各一两 车前叶 秦皮各一两六铢 石膏二两（碎如小豆大） 苦竹叶二合 细辛半两 赤蜜三合

【用法】上㕮咀。以井花水三升，煮取七合，去滓下蜜，更煎，取四合，以锦滤之，干器贮，密封，勿使草芥落中，仰卧，以药汁细细敷目中。

【主治】肝实热，目眦痛如刺。

56450 **栀子饮子**

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】栀子仁一两 瞿麦半两 木通半两（锉） 苦竹叶半两 黄芩一两 甘草半两（炙微赤，锉） 豉一合

【用法】上为细末。每服半两，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病生疱疮，状如豌豆。

56451 **栀子豉汤**

【方源】《伤寒论》。

【异名】栀子香豉汤、香豉栀子汤（《伤寒总病论》卷三）、栀子汤（《圣济总录》卷四十）、加减栀子汤（《云岐子脉诀》）、栀子豆豉汤（《准绳·幼科》卷五）、栀豉汤（《寿世保元》卷二）。

【组成】栀子十四个（劈） 香豉四合（绵裹）

【用法】上以水四升，先煮栀子，得二升半，

纳豉，煮取一升半，去滓，分为二服，温进一服。得吐者止后服。

【功效】《伤寒贯珠集》：散胸中邪气，彻热，除烦止躁。

【主治】伤寒汗吐下后，虚烦不得眠，心中懊侬、胸脘痞闷，饥不能食，脉数，苔薄黄腻。

①《伤寒论》：发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者，必反复颠倒，心中懊恼；发汗若下之，而烦热胸中窒者；伤寒五六日，大下之后，身热不去，心中结痛者；阳明病，脉浮而紧，咽燥口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒反恶热，身重，若发汗则躁，心愦愦，反谵语，若加温针，必怵惕，烦躁不得眠，若下之，则胃中空虚，客气动膈，心中懊侬，舌上胎者；阳明病下之，其外有热，手足温，不结胸，心中懊侬，饥不能食，但头汗出者。下利后更烦，按之心下濡，为虚烦者。②《肘后方》：霍乱吐下后，心腹烦满。③《普济方》：感冒发为寒热，头痛体痛。④《准绳·幼科》：小儿痘疹，虚烦惊悸不得眠。

【宜忌】凡用栀子汤，病人旧微溏者，不可与服之。

【方论选录】①《伤寒来苏集》：栀子苦能泄热，寒能胜热，其形象心又赤色通心，故除心烦愦愦，懊侬结痛等症；豆形象肾，制而为豉，轻浮上行，能使心腹之邪上出于口，一吐而心腹得舒，表里之烦热悉除矣。②《成方便读》：栀子色赤入心，苦寒能降，善引上焦心肺之烦热屈曲下行，以之先煎，取其性之和缓；豆豉用黑豆窨而成，其气香而化腐，其性浮而成热，其味甘而变苦，故其治能除热化腐，宣发上焦之邪，用之作吐，似亦宜然，且以之后入者，欲其猛悍，恐久煎则力过耳。

【临证举例】①伤寒懊侬　《名医类案》：江应宿治都事靳相庄患伤寒十余日，身热无汗，怫郁不得，卧非躁非烦，非寒非痛，时发一声，如叹息之状。医者不知何证，迎予诊视曰：懊侬怫郁证也。投以本汤一剂，十减二三，再以大柴胡汤下燥屎，怫郁除而安卧，调理数日而起。②神经衰弱　《河北中医》(1985；2：14)：用栀子豉汤加减治疗神经衰弱106例，结果痊愈55例，显效33例，好转15例，无效3例。总有效率97.3%。辨证加减：肝阳上亢，灼伤心神型，加龙胆草，生地黄；心脾两虚，气血不足型，加甘草、人参、茯苓、白术；心肾不交，虚火妄动型，加生地黄、何首乌、丹皮。③鼻衄　《新中医》(1985；3：46)：余某，女，73岁。近十日每日上午10～11时自觉心烦、胸中如窒，随即鼻出鲜血，半小时后缓解。诊之血色鲜红，舌红、苔薄黄，脉弦稍数。用炒栀子、淡豆豉各15克，白茅根10克，服二剂即止。

56452　栀子豉汤

《千金》卷二十四。为《伤寒论》"栀子甘草豉汤"之异名。见该条。

56453　栀豆饮子

《普济方》卷三八四。为《圣济总录》卷六十一"豉栀汤"之异名。见该条。

56454　栀豉饮子

《医学纲目》卷三十七。为《圣济总录》卷六十一"豉栀汤"之异名。见该条。

56455　栀子二陈汤

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】炒栀子一钱　川芎五分　胆星五分　半夏　陈皮　茯苓　甘草

【用法】水一钟半，加生姜三片，煎服。滓再煎。

【主治】刺心嘈杂，干噎。

【备考】方中半夏、陈皮、茯苓、甘草用量原缺。

56456　栀子人参散

【方源】方出《圣惠》卷四十七，名见《普济方》卷四十三。

【组成】赤石脂一两　乌梅肉一两　栀子仁一两　人参一两(去芦头)　甘草半两(炙微赤，锉)　川升麻一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】走哺。下焦壅热，气逆不续，呕吐不禁。

56457 栀子干姜汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】栀子十四个（劈） 干姜二两

【用法】以水三升半，煮取一升半，去滓，分二次服，温进一服。得吐者止后服。

【主治】伤寒，医以丸药大下之，身热不去，微烦者。

【方论选录】①《医学入门》：盖丸药不能除热，但损正气，邪气乘虚留于胸中而未深入，则身热不去而微烦。是用山栀苦寒以吐烦，干姜辛热以益气。②《伤寒来苏集》：丸药大下，寒气留中，心微烦而不懊侬，则非吐剂所宜也。用栀子以解烦，倍干姜以逐内寒而散表热。

56458 栀子大青汤

【方源】《活人书》卷十九。

【组成】升麻 栀子仁各二两 大青 杏仁（去皮尖） 黄芩各一两半

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，细切葱白三寸，煎至一盏，去滓温服。

【主治】①《活人书》：妊妇发斑，变为黑色。②《普济方》：妊娠妇人七月，伤寒壮热，赤斑变为黑斑，溺血。

56459 栀子大青汤

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】生地五钱 升麻八分 栀子一钱半 黄芩一钱半 大青三钱 葱白三个

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】妊娠伤寒，火郁不解，营阴受伤而夹湿热，故斑发青紫，胎动不安，脉数弦大者。

【方论选录】栀子清利三焦以降火热，大青解利郁热以泄斑狂，生地滋热伤之阴，条芩安热迫之胎，升麻升阳散热，葱白通阳安胎也。水煎温服，使郁热顿解，则营阴暗复，而血气融和，斑无不化，胎无不安矣。

56460 栀子大黄汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】枳实大黄栀子豉汤（《千金》卷十）、栀子汤（《千金翼》卷十八）、大黄散（《圣惠》卷五十五）、大黄汤（《圣济总录》卷六十）、枳实大黄汤（《普济方》卷一四二）。

【组成】栀子十四个 大黄一两 枳实五个 豉一升

【用法】以水六升，煮取三升，分三次温服。

【主治】①《金匮》：酒黄疸，心中懊侬，或热痛。②《肘后方》：酒疸，心懊痛，足胫满，小便黄，饮酒发赤斑黄黑。

【方论选录】《金匮玉函经二注》：栀子、香豉皆能治心中懊侬，大黄荡涤实热，枳实破结逐停，去宿积也。

【备考】本方方名，《外台》引作“栀子枳实豉大黄汤”。

56461 栀子大黄汤

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】栀子 豆豉 枳实 大黄 茵陈

【主治】伤寒懊侬，又兼心下热痛，发黄。

56462 栀子五味汤

【方源】《外台》卷四引《许仁则方》。

【组成】栀子二十个 柴胡三两 黄芩三两 茵陈三两 芒消六两

【用法】上切。以水八升，煮四味，取二升六合，去滓，纳芒消搅令消，分三次温服，如人行十里久，更服之效。

【功用】取利。

【主治】急黄服麻黄五味汤汗出后，病势未歇，经三五日者。

56463 栀子五物汤

【方源】《活人书》卷十九引《广济方》。

【异名】栀子五物散（《普济方》卷三三九）。

【组成】栀子 前胡 知母各二两 黄芩一两 白石膏四两

【用法】上锉，如麻豆大。每服抄五钱匕，用水一小盏半，煎至一盏，去滓服。

【主治】妊娠伤寒，头痛壮热。

56464 栀子五物汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】葛根 麦冬 知母 陈皮 焦栀 柴胡 黄芩 白术 前胡 甘草 赤苓 香薷 石膏 升麻 葱白

【主治】冬月触冒严寒，寒气感于太阳经，不即发病，藏于肌肤，日久蕴积，至夏发为热病。壮热，头疼面赤，口干，昼夜烦扰，甚或登高弃衣，狂言妄语，多致坠胎。

【方论选录】用升麻、石膏以解积热，柴、芩、葛根以解表热，知、栀以解里热，薷、草、赤苓以解暑热，麦冬解心经之热，前胡解痰饮之热，术、陈理胃安胎，葱白为引。积热解则痛自已，而胎自安然，后用凉血固肾之药也。

56465　栀子五物散

《普济方》卷三三九。为《活人书》卷十九引《广济方》"栀子五物汤之异名。见该条。

56466　栀子升麻汤

【方源】《活人书》卷十七。

【异名】栀子升麻散(《得效》卷一)。

【组成】栀子十个(切碎)　升麻一两半　生地黄半斤(切碎用)　柴胡(去芦)　石膏各二两半

【用法】上锉，如麻豆大。每服抄五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓频服。病不解更作。

【功用】《医学入门》：清肌解热。

【主治】①《活人书》：晚发伤寒，三月至夏为晚发。②《医学入门》：兼治温热及虚烦不止。

56467　栀子升麻汤

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】升麻　白芍药　干葛　山栀子　蓝叶　甘草各等分

【用法】上为散。灯心同煎服。

【主治】天行麻痘，疮子未出，潮热如火，谵语，小便涩难。

56468　栀子升麻汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】茵陈　山栀　黄芩　大黄　柴胡　升麻　龙胆

【用法】加灯心，用水煎服。

【主治】发黄，面目悉黄如金，小便浓而少，诸药不效者。

【加减】人弱大便实，去大黄，加木通，猪苓。

56469　栀子升麻汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】升麻　柴胡　栀子　生地

【用法】水煎服。

【功用】探吐。

【主治】阳毒发斑、发狂；温热病发狂。

56470　栀子升麻散

《得效》卷一。为《活人书》卷十七"栀子升麻汤"之异名。见该条。

56471　栀子乌梅汤

【方源】《活人书》卷十八。

【组成】栀子半两　黄芩半两　甘草半两(炙微赤)　柴胡一两　乌梅肉十四个(微炒用)

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盏半，生姜三片，竹叶十四片，豉五十粒，煎至七分，去滓温服。

【主治】伤寒后，虚烦不得眠，心中懊侬。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作"乌梅汤"。

56472　栀子乌梅汤

【方源】《伤寒全生集》卷四。

【组成】栀子一钱　黄芩一钱　柴胡二钱　甘草一钱　乌梅二个　人参一钱　麦冬一钱　竹叶十四片

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】伤寒愈后，热气与诸阳相并，阳气未复，不眠。

【备考】方中诸药用量原缺，据《准绳·伤寒》补。

56473　栀子六合汤

【方源】《元戎》。

【组成】四物汤四两　栀子　黄芩各半两

【用法】上为粗末。水煎服。

【主治】妊娠伤寒，汗下后，不得眠者。

56474　栀子六味散

【方源】《外台》卷三引《许仁则方》。

【组成】栀子三十个(擘)　干葛五两　茵

陈二两 蜀升麻三两 大黄五两 芒消五两

【用法】上为散。每服三方寸匕，以饮送下。服之须臾，当觉转则利也。如经一两食顷不利，且以热饮投，又不利，即斯须臾服一方寸匕，还以饮投，得利为度。后适寒温将息，更不须服此也。

【主治】天行病，或伤寒，服鸡子汤汗泄后病不退者。

56475 栀子石膏汤

【方源】方出《千金》卷十，名见《外台》卷二。

【组成】栀子仁三七个 石膏五两 鼠屎(尖头大者)二十个 香豉一升

【用法】上㕮咀。以水七升，煮取三升，分三次服。

【主治】伤寒温病后或食或饮或动作劳复。

56476 栀子石膏汤

《胎产秘书》卷上。为《圣惠》卷七十四"栀子仁饮"之异名。见该条。

56477 栀子石膏散

【方源】方出《圣惠》卷十四，名见《普济方》卷一四六。

【组成】栀子仁一两 石膏三两 雄鼠粪三七个 豉二两 川大黄二两(锉碎，微炒) 枳壳一两(麸炒微黄，去瓤)

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒新愈后，起早，饮食过度劳复。

56478 栀子竹茹汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷四。

【组成】山栀三钱 陈皮二钱 竹茹一钱半

【用法】加姜汁，水煎服。

【主治】胃热干呕。

56479 栀子豆豉汤

【方源】《普济方》卷一四六引《德生堂方》

【组成】枳实 山栀子各一钱 厚朴二钱 大黄(另研) 豆豉各三钱

【用法】上㕮咀。分作二服。每服水一盏半，生姜三片，煎至一大盏，却下大黄再煎，去滓温服。

【主治】伤寒六七日后，因酒食所伤，胁腹疼，大便结，发热，发渴。

56480 栀子豆豉汤

《准绳·幼科》卷五。为《伤寒论》"栀子豉汤"之异名。见该条。

56481 栀子杏仁汤

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】山栀 升麻 黄芩 芍药 石膏 知母 杏仁 柴胡 甘草

【用法】加豆豉，水煎服。

【主治】伤寒，壮热疼痛，内外皆热，发斑，谵语发狂。

56482 栀子郁金汤

【方源】《不居集·下集》卷十一。

【组成】栀子 郁金 贝母 丹皮 苏子 黄连 橘红 茯苓 红曲 茜根 香附

【用法】上以水煎，冲服益元散。

【主治】虚损，积痰积瘀。

56483 栀子金花丸

【方源】《宣明论》卷四。

【异名】既济解毒丸(原书同卷)、金花丸(《活法机要》)、小金花丸(《保命歌括》卷十)，三黄金花丸(《医方集解》)、大金花丸(《保命集》卷中)。

【组成】黄连 黄柏 黄芩 栀子各半两

【用法】上为末，滴水为丸，如小豆大。每服二三十丸，新汲水送下。小儿丸如麻子大，每服三五丸。

【主治】中外诸热，寝汗咬牙，睡语惊悸，溺血淋闭，咳血衄血，瘦弱头痛，骨蒸，肺痿喘嗽。

56484 栀子金花丸

【方源】《穷乡便方》。

【组成】栀子仁三两 黄芩 黄柏 麦门冬各二两 杏仁 半夏 桔梗各一两 黄连四钱 薄荷八钱

【用法】上为末，面糊为丸。每服三钱，食远

时淡姜汤送下。

【主治】火病，舌干口燥者。

56485　**栀子金花丸**

《医方集解》。为《准绳、类方》卷八"金花丸"之异名。见该条。

56486　**栀子金花丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】栀子(炒)二百八十八两　黄柏一百四十四两　黄连十二两　黄芩二百八十八两　天花粉一百四十四两　大黄二百八十八两　知母九十六两

【用法】上为细粉，过罗，用冷开水泛为小丸。每服二钱，日服二次，温开水送下。

【功用】泻热润燥，生津止渴。

【主治】头晕目眩，鼻干出血，牙痛咽肿，口舌生疮。

【宜忌】忌辛辣食物。孕妇忌服。

56487　**栀子金花丸**

【方源】《中国药典》一部。

【组成】栀子 116 克　黄连 4.8 克　黄芩 192 克　黄柏 60 克　大黄 116 克　金银花 40 克　知母 40 克　天花粉 60 克

【用法】粉碎成细粉，过筛，混匀，用水泛为丸。每服 9 克，一日一次。

【功用】清热泻火，凉血解毒。

【主治】肺胃热盛，口舌生疮，牙龈肿痛，目赤眩晕，咽喉肿痛，吐血衄血，大便秘结。

【宜忌】孕妇慎用。

56488　**栀子金花汤**

【方源】《张氏医通》卷十六。

【异名】金花汤(《胎产心法》卷上)。

【组成】黄连　黄芩　黄柏　栀子各一钱

【用法】上以麻沸汤二升渍渍，须臾绞去滓，分二次温服。

【主治】①《张氏医通》：热毒内蕴。②《胎产心法》：妊娠伤寒，发热大渴者。

【备考】方中诸药用法原缺，据《胎产心法》补。

56489　**栀子金花汤**

【方源】《金鉴》卷五十八。

【组成】黄芩　黄连　黄柏　大黄　栀子

【用法】水煎服。

【主治】痘中厥逆，因阳毒内攻，热极反寒，致热厥，爪甲色红，小便赤涩，痘色更见紫黑，烦躁闷乱者。

56490　**栀子柏皮汤**

【方源】《伤寒论》。

【异名】柏皮汤(《鸡峰》卷十)、柏皮散(《永乐大典》卷一〇三三引《全婴方》)。

【组成】肥栀子十五个(劈)　甘草一两(炙)　黄柏二两

【用法】上以水四升，煮取一升半，去滓。分二次温服。

【主治】①《伤寒论》：伤寒，身黄发热者。②《鸡峰》：衄血，或从口出，或从鼻出，暴出而色鲜，衄至一二斗，闷绝者。

【方论选录】《温病条辨》：栀子清肌表，解五黄，又治内烦；黄柏泻膀胱，疗肌肤间热；甘草协利内外。三者其色皆黄，以黄退黄，同气相求也。

【备考】《鸡峰》本方用法：为粗末。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

56491　**栀子柏皮汤**

【方源】《云岐子保命集》卷上。

【组成】大黄　柏皮各二两　栀子十五个

【用法】上锉，如麻豆大。每服一两，水三盏，煎服。

【主治】燥热发黄。

【加减】发黄，大便自利不止者，加黄连，黄柏皮各三两(生)，减大黄。

56492　**栀子柏皮汤**

【方源】《玉机微义》卷四十五。

【组成】栀子　柏皮　黄连各等分

【用法】上㕮咀。每服一两，水煎服。

【主治】身热不去，大便利而烦热身黄者。

56493　**栀子柏皮汤**

【方源】《寒温条辨》卷五。

【组成】栀子三钱　甘草三钱　茵陈三钱

黄柏三钱

【用法】水煎，温服。

【主治】伤寒，湿热郁于肌表，身热发黄者。

56494 **栀子荆芥汤**

【方源】《医统》卷六十六。

【组成】栀子 荆芥 黄芩 川芎 白芷 白芍药 桔梗 生地黄 升麻 枳壳（麸炒） 大黄各一钱 甘草二分

【用法】上用水二盏，煎八分，食后服。

【主治】头面生疮。

56495 **栀子茵陈汤**

【方源】《会约》卷十一。

【组成】栀子七个 茵陈 泽泻 黄柏 赤苓各三钱 甘草一钱

【用法】水煎，空心服。

【主治】身热发黄，小水不利，脉实口渴。

【加减】如大便燥结，加大黄四钱；口渴，加生石膏五钱。

56496 **栀子茯苓汤**

《兰室秘藏》卷下。为原书同卷“大芜荑汤”之异名。见该条。

56497 **栀子厚朴汤**

【方源】《伤寒论》。

【组成】栀子十四个（劈） 厚朴四两（炙，去皮） 枳实四个（水浸，炙令黄）

【用法】以水三升半，煮取一升半，去滓，分二服，温进一服。得吐者止后服。

【主治】伤寒下后，心烦腹满，卧起不安者。

【方论选录】①《医学入门》：以山栀之苦，以吐虚烦；枳，朴之苦，以泄腹满。②《伤寒来苏集》：心烦则难卧，腹满则难起，起卧不安，是心移热于胃。栀子以治烦，枳、朴以泄满，此两解心腹之妙剂也。

56498 **栀子香豉汤**

《伤寒总病论》卷三。为《伤寒论》“栀子豉汤”之异名。见该条。

56499 **栀子胜奇汤**

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】栀子 石膏 草决明 防风 荆芥 木贼 蒺藜 蝉蜕 羌活 黄芩 蔓荆子 谷精草 菊花 甘草 密蒙花

【用法】上为细末。每服二钱，临卧时热茶调下。

【主治】脾胃热毒，心肺二经火邪冲目，致患胬肉攀睛，久而不退者。

56500 **栀子胜奇散**

【方源】《原机启微》卷下。

【组成】蛇蜕 草决明 川芎 荆芥穗 蒺藜（炒） 谷精草 菊花 防风 羌活 密蒙花 甘草（炙） 蔓荆子 木贼草 山栀子 黄芩各等分

【用法】上为细末。每服二钱，食后、临睡热茶清调下。

【主治】阳跻受邪，内眦生赤脉缕缕，根生瘀肉，瘀肉生黄赤脂，脂横侵黑睛，渐蚀神水，锐眦亦然，俗名攀睛者，并有眵泪，羞涩难开。

【方论选录】以蝉蜕之咸寒，草决明之咸苦，为味薄者通，通者，通其经络也；川芎，荆芥穗之辛温，白蒺藜、谷精草之苦辛温，菊花之苦甘平，防风之甘辛为臣，为气辛者发热，发热者，升其阳也；羌活之苦甘温，密蒙花之甘微寒，甘草之甘平，蔓荆子之辛微寒为佐，为气薄者发泄，发泄者，清利其诸关节也；以木贼草之甘微苦，山栀子，黄芩之微苦寒为使，为厚味者泄，泄者，攻其壅滞有余也。

【备考】方中“蛇蜕”，《审视瑶函》作“蝉蜕”。

56501 **栀子栝楼汤**

【方源】《痎疟论疏》。

【组成】 栀子五钱（去壳，取仁，用甘草水浸一宿取出，晒干，捣筛，为末） 栝楼根（取大三围者，去皮，捣烂，以水澄粉晒干）七钱 香豉小半合（取如法修事者） 淡竹叶（东流水洗，切）小半升 葛根（秋露润透，阴干，锉碎）一两一钱 猪苓（锉，去粗皮，切片，东流水浸一宿取出，同升麻、麻黄等分，水润拌蒸一炷香，勿令泄气，去升麻，麻黄，晒干）九钱 滑石一两（取洁白者，以竹刀刮净，研如粉，

每两用牡丹皮二两同煮三柱香，去牡丹，以东流水淘过，晒干）　牡丹皮（铜刀削去骨，锉碎，同桃仁等分，酒润，蒸晒三次，去桃仁）七钱　知母（槐砧上锉碎，干木臼中捣烂）五钱　生姜（切）七钱

【用法】上以水三升五合，煮取升半，去滓，分三次温服。

【主治】瘅疟。

56502　**栀子柴胡汤**

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】栀子　柴胡　黄芩　竹茹　知母　甘草

【主治】少阳余热未尽而致的不得卧。睡中盗汗，小便色黄，夜多烦躁，口苦舌干，不得安睡，脉左关数者。

56503　**栀子柴胡散**

《保婴撮要》卷十三。为原书同卷"栀子清肝散"之异名。见该条。

56504　**栀子菖蒲汤**

【方源】《准绳·幼科》卷五。

【组成】栀子一钱三分　石菖蒲　紫草茸各一钱二分　山豆根　生犀　黄连各一钱一分　羌活　木通　白僵蚕　杏仁　韭子　鼠粘子各一钱　升麻　蝉蜕　薄荷七分

【用法】上锉散。每服五钱　水煎，食远服。

【主治】小儿痘证，因热毒生风，瘖哑不语。

【备考】方中升麻、蝉蜕用量原缺。

56505　**栀子黄芩汤**

【方源】《集验背疽方》。

【异名】排脓内补散（《普济方》卷二八二）。

【组成】漏芦　连翘　山栀子仁　黄芩（去心）各二两半　黄耆（生用）一两　防风　石韦（如无，以桑白皮代之）　生甘草　犀角　人参　苦参　白茯苓各二钱半

【用法】上为粗末。每服四钱，水一中盏，煎至六分，去滓温服。

【功用】退热。

【主治】发背疮溃后，因饮食有伤，调摄不当，发热不住。

56506　**栀子黄柏汤**

【方源】《秋疟指南》卷二。

【组成】生栀二钱　茵陈一钱半　黄柏一钱半　大黄一钱半　生甘八分　条芩一钱半　麦冬一钱半　川连一钱

【用法】上用水炖，半饥服。

【主治】伤暑，气血流溢，湿热外瘀，肌肤微肿，遍体蒸黄，溲溺短涩，甚则气粗喘逆。

【加减】若大便燥秘，倍大黄，加玄明粉。

56507　**栀子清肝汤**

《医学入门》卷八。为《保婴撮要》卷十三"栀子清肝散"之异名。见该条。

56508　**栀子清肝汤**

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】牛蒡子　柴胡　川芎　白芍　石膏　当归　山栀　牡丹皮各一钱　黄芩　黄连　甘草各五分

【用法】上用水二钟，煎八分，食后服。

【主治】少阳经虚，肝火风热上攻，遂成发疽，痛连颈项、胸乳、太阳等处，或寒热晡甚，胸满，口苦舌干。

56509　**栀子清肝汤**

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】山栀　菖蒲　柴胡　当归　黄芩　黄连　丹皮　甘草　牛蒡子

【用法】先以生猪脂、地龙、百草霜为末，和葱汁，捏如枣核大，棉包塞耳几日，待软挑出，后服此药。

【主治】耵耳。因风热搏于耳中津液，结硬成块，壅塞耳窍，气脉不通，致疼痛不止，耳聋。

56510　**栀子清肝饮**

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】白芍一两　炒栀子　茯苓各三钱　半夏二钱　甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】春温过热，致春月伤风，日晡发潮热，不恶寒，独语如见鬼状者。

56511　**栀子清肝散**

【方源】《保婴撮要》卷十三。

【异名】栀子柴胡散(《保婴撮要》卷十三)、柴胡栀子散(《保婴撮要》卷十五)、柴胡栀子饮(《幼科发挥》卷四)、栀子清肝汤(《医学入门》卷八)。

【组成】柴胡 栀子 (炒) 牡丹皮 茯苓 川芎 芍药 (炒) 当归 牛蒡子 (炒) 各七分 甘草二分

【用法】水煎,子母同服。

【主治】小儿三焦及足少阳经风热,耳内生疮作痒,或出水疼痛,或发热。

56512 栀子葱豉汤

【方源】《卫生鸿宝》卷五。

【组成】栀子 (炒) 黄芩 升麻各二钱 生地二钱 青黛八分 豆豉四十九粒 杏仁(去皮尖)十二粒 石膏 (煅)一钱半 葱白七寸

【用法】水煎服。

【主治】孕妇热病,斑出赤黑色,小便如血,气急欲绝。

56513 栀子滑石汤

【方源】《医统》卷十八。

【组成】大黄 黄柏各二两 栀子十五个 滑石四两

【用法】水六升,煮四升,去滓澄清,更取一升,顿服。

【主治】黄疸, 腹满,小便不利, 面赤自汗。

56514 栀子解郁汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】黑山栀二钱 瓜蒌果一个 (切) 连翘二钱 薄荷二钱 葛根二钱 苏梗一钱五分 豆豉三钱 郁金二钱

【用法】加淡竹叶二十张, 白茅根五钱,煎服。

【主治】结胸。风热内郁,则胸脘烦闷,心神焦躁。

56515 栀子解毒汤

【方源】《种痘新书》卷十一。

【组成】栀子 黄芩 黄连 石膏 知母 牛子 连翘 升麻 柴胡 防风 赤芍 甘草

【主治】麻疹热毒盛壅,火热熏蒸,肌干肤燥,目赤唇紫,毛发焦竖,烦渴不宁,惊狂颠谵,二便秘结,而出不快者。

【加减】大便秘,加酒大黄;烦燥,加麦冬;嗽甚,加杏仁、桔梗、花粉;惊谵,用镇惊丸;无汗,腠理秘,加大黄,再用紫苏煎水,令热气蒸之,或用酒遍身擦之,然后以被盖片时,其麻即出。

56516 栀子薤豉汤

【方源】《伤寒总病论》卷四。

【组成】好豉半升,薤白二两 肥栀子十六个

【用法】上用水二升半,煮栀子、薤白将烂,下豉再煮十数沸,去滓,分减服。解下恶物愈。

【主治】疮痘发斑,下利赤黄,或脓血,遍身发热。

56517 栀连二陈汤

【方源】《活幼心法》卷三。

【组成】黄连(姜汁炒) 栀子(姜汁炒)各五分 白茯苓八分 制半夏四分 陈皮(去白) 炙甘草各二分

【用法】生姜一片同煎,缓缓服。吐止即勿服。

【主治】痘症起发灌脓时,毒火上腾,吐而酸苦有声,吐讫反快,痘色红紫者。

56518 栀连二陈汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】陈皮 半夏 白茯苓 甘草 葛根 山栀 川连 竹茹

【主治】外感胃热兼痰饮之呃逆,脉滑大而数;或内伤痰火上冲之呃逆。

56519 栀连平胃散

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】山栀 川黄连 熟苍术 厚朴 广皮 甘草 葛根 木瓜 秦艽

【主治】口眼㖞斜,右关脉弦数者。

56520　**栀连平胃散**

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】苍术　厚朴　广皮　甘草　山栀　黄连

【主治】头痛，膏粱积热者，口渴唇焦，二便赤涩，脉洪数。

56521　**栀连平胃散**

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】山栀　川黄连　苍术　厚朴　陈皮　甘草　葛根　竹茹

【主治】内伤积热冲攻之呃逆，脉沉数者。

56522　**栀连平胃散**

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】厚朴　陈皮　甘草　山栀　葛根　熟苍术　川连　枳壳

【主治】酒热成积腹痛，脉右关滑数者。

【加减】小便赤，加木通、滑石；大便结，加大黄、芒消；胸满闷，加砂仁、白蔻仁；目黄疸色，加柴胡、胆草。

56523　**栀连平胃散**

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】平胃散加川连　山栀　枳壳　桔梗

【主治】酒积腹痛，利下黄沫。

56524　**栀连正气散**

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】山栀　黄连　藿香　厚朴　广皮　半夏　甘草　苍术　竹茹　白茯苓

【主治】胃火旺之呕吐，脉洪数者。

56525　**栀连戊己汤**

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】山栀　川黄连　白芍药　甘草

【功用】清脾火，兼清肝火。

【主治】热气积于脾中之积热痿软，脉弦数者。

56526　**栀连四物汤**

【方源】《医林纂要》卷八。

【组成】四物汤加黄连　栀子各二钱

【主治】挟暑挟热而经阻，或因怒伤经，血少目暗，或经期伤热，及郁怒气逆，相火并作，血逆上出者。

56527　**栀连泻火汤**

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】生地一两　当归　丹皮各五钱　炒栀子　天花粉各三钱　黄连二钱　吴茱萸一钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人发癫，因肝火炽盛，郁结而成者。

【加减】热入血室，加柴胡一钱。

56528　**栀连枳壳汤**

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】枳壳　厚朴　广皮　甘草　山栀　川黄连

【主治】脾热身肿，面肿目黄，烦躁不卧，皮肤常热，小便赤，大便时泄时结，常肿不退，脉右关弦数。

56529　**栀连枳桔汤**

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】山栀　黄连　桔梗　甘草　青皮　木通　苏梗

【主治】胸胁里热作痛，气道壅滞，寒热，咳嗽气逆，有汗，脉沉数者。

【备考】原书用本方治上症，与黄芩泻白散同用。

56530　**栀连茵陈汤**

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】栀子　川连　茵陈

【功用】清在里湿热。

【主治】中焦湿热发黄者。

56531　**栀连柴胡汤**

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】山栀　黄连　柴胡　黄芩　半夏　广皮　甘草

【主治】肝火呕吐，脉左关洪数。

56532　**栀连柴胡汤**

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】柴胡　黄芩　广皮　甘草　竹茹

半夏 栀子 川连

【主治】少阳胆热不得卧，脉弦而紧。

【备考】原书用本方治上症加竹茹。

56533 栀连清肺饮

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】山栀 川连 桔梗 甘草 杏仁 天花粉 黄芩 薄荷

【主治】伤热咳嗽，面赤潮热，右脉洪数。

56534 栀桃枳楂散

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】山栀 桃仁 枳核 山楂各等分

【用法】上为末。于砂钵内入姜汁，用水荡起，煎，热服。

【主治】阳明湿热传入太阳，恶寒发热，小腹连毛际间闷痛不可忍。

【加减】加吴萸，治食积与瘀血成痛，及冷热不调疝气。

56535 栀豉枳实汤

《医学入门》卷四。为《伤寒论》"枳实栀子豉汤"之异名。见该条。

56536 栀豉枳黄汤

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】山栀 枳壳 柴胡各一钱 香豉五钱 大黄三钱 (人壮积坚者五钱)

【用法】水煎，温服。

【主治】食复发热。

【加减】如内热，加黄芩；腹胀，加厚朴；伤肉，加山楂；伤面饭，加神曲。

56537 栀子仁涂敷方

【方源】《普济方》卷二七七。

【组成】栀子仁 石灰 地椒 黄柏 (涂蜜，炙) 铅丹各半两

【用法】上为散。涂敷疮上，一日三五次。

【主治】炙疮，疼不可忍。

56538 栀子甘草豉汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】栀子豉汤(《千金》卷二十四)、栀子仁散(《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》)、栀子仁汤(《普济方》卷三六九)、栀子豉加甘草汤(《温病条辨》卷二)。

【组成】栀子十四个(擘) 甘草二两(炙) 香豉四合(绵裹)

【用法】上以水四升，先煮栀子、甘草，取二升半，纳豉，煮取一升半，去滓，分二服，温进一服。得吐者止后服。

【主治】①《伤寒论》：发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者，必反复颠倒，心中懊侬，少气者。②《千金》：石毒，因食宿饭、陈臭肉及羹宿等发者。

56539 栀子生姜豉汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】栀子十四个(劈) 生姜五两 香豉四合(绵裹)

【用法】上以水四升，先煮栀子、生姜，取二升半，纳豉，煮取一升半，去滓，分二服，温进一服，得吐者止后服。

【主治】发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者，必反复颠倒，心中懊侬，呕者。

56540 栀子石膏香豉汤

【方源】《伤寒总病论》卷三。

【组成】栀子十六个 石膏四两 香豉一两(绵裹)

【用法】上用水三升， 先煮二味至二升半，下豉，煮取一升半，去滓，温饮一盏；一法，汤成入雄鼠矢二七枚(末)。

【主治】伤寒劳复如初，自汗出者，脉浮滑，烦躁甚者。

56541 栀子豆豉陷胸汤

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】栀子 豆豉 半夏 川连 瓜蒌霜

【主治】食滞中焦，兼有痰凝，以致懊侬者。

56542 栀子豉加甘草汤

《温病条辨》卷二。为《伤寒论》"栀子甘草豉汤"之异名。见该条。

56543 栀子豉加姜汁方

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】栀子豉汤加姜汁五匙

【主治】阳明温病，下后虚烦不得眠，心中懊憹，甚至反复颠倒，呕吐者。

56544　栀子枳实豉大黄汤

《外台》卷四。即《金匮》卷中“栀子大黄汤”。见该条。

56545　栀子香豉淡竹叶汤

【方源】《痎疟论疏》。

【组成】栀子(去壳取仁，用甘草水浸一宿取出，焙干，捣筛为末)十三个　香豉小半合(用大黑豆三斗，六月内淘净沥干，蒸熟取出摊席上，待微温以青蒿覆之，每三日一看，待黄衣上遍即取，晒干，筛净，更用东流水拌润，干湿得所，以汁出指间为度，安瓮中，筑实，上以桑叶盖之，厚三四寸，以泥密封，日中晒七日取出，摊晒一时许，又用秋秫拌入豆内，复安瓮中，晒七日取出，摊晒一时许，复安瓮中，晒七日，如此七遍取出，蒸之，摊令气歇，复收极净瓷瓮中，筑极实，密封瓮口，一月后即成矣)　淡竹叶(粟米泔洗三遍，切碎)半斤，甘草(去头尾，蜜水润透，涂酒，炙黄色，锉碎)四钱　蜀漆(连根收采者佳，临用时去根，以甘草锉细，将东流水润透，拌入蜀漆内蒸之，勿使气漏矣，冷去甘草，取蜀漆，锉碎，又拌甘草水，干湿得所蒸之矣，冷晒干)一两　常山(临用去苗，同甘草末水润拌蒸矣，冷去甘草，取常山，锉碎，再用好酒拌润一宿取出，熬，捣)一两五钱　鳖甲(取九肋者，三两，洗去甲外黑皮，甲里皮肉置罐中，用酽醋煮干取出，炙燥，锉碎)一两三钱　石膏(研细，甘草水飞澄，晒，再研)二两　乌梅十枚(汤润，去核，入米中蒸烂，焙干)

【用法】上以水三升五合，煮取一升半，去滓，分三次温服，未发前令三服尽。

【主治】心疟。

枸

56546　枸杞丸

【方源】《医心方》卷十三引《录验方》。

【组成】枸杞子三升　干地黄(切)一升　天门冬(切)一升

【用法】上为细末，晒干，以绢罗之，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，一日二次。

【主治】劳伤虚损。

56547　枸杞丸

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】枸杞子(九炊九晒)二两　巴戟天(穿心紫色者，去心)　旋覆花(择净)　蜀椒(去目及闭口，炒出汗)各一两。

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，腊茶清送下，不拘时候。

【主治】肝肾风气上攻，眼生黑花。

【备考】本方方名，《普济方》引作“枸杞子丸”。

56548　枸杞丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】石斛(去根)一两　鹿茸(去毛，酥炙)　地骨皮各一分。

【用法】上焙为末，以红枸杞子自然汁二合，无灰酒一合，白蜜半两，熬成膏为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心用温酒或生姜盐汤送下。

【功用】平补。

【备考】本方方名，《普济方》引作“平补枸杞子丸”。

56549　枸杞丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】枸杞子(净择)一斤　肉苁蓉(酒浸，切，焙)　干枣肉　石斛(去根)各八两　远志(去心)六两　菟丝子(酒浸一宿，另捣)　续断各五两　熟干地黄十两　天雄(炮裂，去皮脐)二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。五日后，加至四十丸；十日后，加至五十丸；二十日后，加至六十丸；三十日后，却减十丸；减至三十丸止。

【功用】益气补精。

【备考】本方方名，《普济方》引作“枸杞子丸”。

56550 **枸杞丸**

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】枸杞子十两　甘菊花四两　桂(去粗皮)一两半　白茯苓(去黑皮)　茯神(去木)　熟干地黄各一两

【用法】上为细末,炼蜜五两,入薄荷汁半盏,同熬得所为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心、食前温酒送下。

【功用】补真气,壮丹田,悦颜色,充肌肤。

56551 **枸杞丸**

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】苁蓉　枸杞　川椒(取红)　甘菊各等分　巴戟减半。

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心酒送下。

【功用】明目活血。

【主治】眼目昏暗。

56552 **枸杞丸**

【方源】《普济方》卷七十八引《卫生家宝》。

【组成】木贼一两(去节,童便浸一宿,净洗三五次)　枸杞子一两(炒干)　家菊花一两(去枝叶)　削皮苍术三两(泔水浸一夕,净洗)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如禾穗子大。每服一丸,食后用好茶嚼下 。

【主治】远年近日,翳膜遮障,内外障眼。

56553 **枸杞丸**

【方源】《医方类聚》卷一九七引《经验秘方》。

【组成】枸杞一斤(用青盐二两,芝麻二两,小茴香二两,川椒二两同炒,候枸杞微黄,去余药不用)　熟干地黄(酒蒸,焙干)　白茯苓　白术　甘菊花各三两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服四五十丸,空心温酒送下,干物压之。

【功用】活血驻颜,暖水脏。

56554 **枸杞丸**

【方源】《普济方》卷二一七。

【异名】枸杞子丸(《医统》卷七十)。

【组成】枸杞子(冬采者佳)　黄精各等分

【用法】上为细末,相和捣成块,捏作饼子,干复捣末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心温酒送下。

【功用】补精气。

【主治】《医统》:肾虚精滑。

【备考】方中二药用量原缺,据《医统》补。

56555 **枸杞丸**

《仙拈集》卷二。为《明医指掌》卷六"枸杞子丸"之异名。见该条。

56556 **枸杞汤**

【方源】《医心方》卷十二引深师方。

【组成】枸杞根五升(锉皮)　石膏一升　小麦(一方小豆)三升

【用法】上切。加水至没手,合煮麦熟,汤成去滓,适寒温服之。

【主治】消渴,唇干口燥。

56557 **枸杞汤**

【方源】《外台》卷十七引《古今录验》。

【组成】枸杞叶十斤　干姜二两　桂心一两　甘草五两(炙)　大麻子仁二升

【用法】上切碎。以河水三斗,煮取九升,去滓,每服一升,一日三次。

【主治】虚劳少气,骨节中微热,诸疼痛。

【宜忌】忌海藻,菘菜,生葱。

56558 **枸杞汤**

【方源】方出《千金》卷十七,名见《圣济总录》卷四十八。

【组成】枸杞根皮(切)二升　石膏八两　白前　杏仁各三两　橘皮　白术各五两　赤蜜七合

【用法】上㕮咀。以水七升　煮取二升,去滓,下蜜,煮三沸,分三服。

【功用】泄气除热。

【主治】①《千金》:肺实热,胸满仰息。②《圣济总录》:肺热实。凡右手寸口、气口以前脉阴实者,苦肺胀,汗出气喘逆,咽中塞,如欲呕状。

56559 **枸杞汤**

【方源】《千金》卷二十一。

【异名】栝楼根汤(《圣济总录》卷五十八)、栝楼汤(《普济方》卷一七八)。

【组成】枸杞枝叶一斤　栝楼根　石膏　黄连　甘草各三两

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分五服，日三夜二；剧者多合，渴即饮之。

【主治】消渴或痈疽。

①《千金》：消渴。②《圣济总录》：发背痈疽，热渴闷乱。③《普济方》：渴而利者。

56560　枸杞汤

【方源】《千金》卷二十一。

【组成】枸杞根(白皮，切)五升　麦门冬三升　小麦二升

【用法】上以水二斗煮，麦熟药成，去滓，每服一升，一日二次。

【主治】①《千金》：虚劳，口中苦渴，骨节烦热或寒。②《圣济总录》，消渴，舌干体瘦。

【备考】本方方名，《普济方》引作"地骨皮散"。

56561　枸杞汤

【方源】方出《圣惠》卷三十四，名见《圣济总录》卷一二〇。

【组成】枸杞根　东引槐枝　东引柳枝各三两　黑豆半升(炒热，锉皮)

【用法】上为细末，入于铜铛中，微火炒令黄，下炒了黑豆相和，以水三大盏，煎十余沸后，入酒一升，更煎一两沸，滤取汁，热含冷吐。

【主治】齿风疳，根与肉离，疼痛，吃食不得。

56562　枸杞汤

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】枸杞子　海桐皮(锉)　白芷　苦参　防风(去叉)　甘草(炙，锉)　麻黄(去根节，煎，掠去沫，焙)　牛膝(切，酒浸一宿，焙)各一两　桂(去粗皮)　酸枣仁各半两。

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜二片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肝气攻注，遍身筋脉抽掣疼痛，四肢无力。

【备考】本方方名，《普济方》引作"枸杞子汤"。

56563　枸杞汤

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】枸杞叶(焙干)不拘多少

【用法】上切碎。每服三钱匕，水一盏，生姜三片，大枣一个(擘)，煎至七分，去滓温服，每日三次。

【主治】卒短气。

56564　枸杞汤

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】枸杞

【用法】上为粗末，每服三钱匕，水一盏，生姜一枣大(切碎)，煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】卒短气。

56565　枸杞汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】枸杞根(锉)　黄耆(锉)各三分　甘草(炙，锉)　麦门冬(去心，焙)　桂(去粗皮)各半两　粳米一两。

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，生姜一分(拍碎)，煎至一盏，去滓，空腹服，夜卧再服。

【主治】虚劳，骨肉疲疼，吸吸少气，少腹拘急，腰背强痛，心中惊悸，咽干唇燥，面无颜色，饮食减少，忧愁嗜卧。

56566　枸杞汤

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】枸杞　黄耆(锉，炒)　附子(炮裂，去皮脐)各二两　芎䓖　人参　芍药　茯神(去木)　甘草(炙，锉)　羌活(去芦头)　桂(去粗皮)各一两　防风(去叉)三分　半夏(汤洗去滑)一两半。

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，用水一盏半，加生姜五片，煎取八分，去滓温服。

【主治】肉极虚羸，寒气所加，体重怠堕，四

肢不举，肢节疼痛，饮食减少，坐卧不安。

56567 **枸杞汤**

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】枸杞子（炒）半两 赤芍药 山芋 升麻各一两半 蒺藜子（炒） 茯神（去木）各二两 防风（去叉）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎取七分，加生地黄汁一合，去滓温服，临卧再服。

【主治】风邪客于睑肤，令眼睑垂缓，甚则眼闭难开。

56568 **枸杞汤**

【方源】《鸡峰》卷四。

【组成】枸杞 荨麻根 枸椒根 蒴藋根各等分。

【用法】上为粗末。煎汤淋洗。

【主治】脚气。

56569 **枸杞汤**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】枸杞子 肉苁蓉 茯苓各一钱 五味子七分 人参 黄耆 山栀仁 熟地，石枣肉 甘草各五分 生姜一片 灯心一握。

【用法】早空心温服。

【主治】肾虚精滑。

56570 **枸杞饮**

【方源】《养老奉亲》。

【组成】枸杞根白皮一升 小麦一升（净淘）粳米三合（研）。

【用法】上以水一斗，煮前二味，取七升汁，下米作饮，渴即渐服之。

【主治】老人烦渴口干，骨节烦热。

56571 **枸杞茶**

【方源】《遵生八笺》卷十三。

【组成】枸杞子（深秋摘红熟者）

【用法】同干面拌和成剂，捍作饼样，晒干，研为细末，每江茶一两，杞子末二两，同和匀，入炼化酥油三两，或香油亦可，旋添汤搅成膏子，用盐少许，入锅煎熟饮之。

【功用】明目。

56572 **枸杞酒**

《医心方》卷二十六引《大清经》。为《外台》卷十七引《延年秘录》“生枸杞子酒”之异名。见该条。

56573 **枸杞酒**

【方源】《千金》卷二十七。

【组成】枸杞根一百二十斤（切） 干地黄末二斤半 桂心 干姜 泽泻 蜀椒末各一升商陆末二升。

【用法】以东流水四石，煮杞根一日一夜，取清汁一石，渍曲一如家酿法，熟取清，贮不津器中；余药以绢袋贮，纳酒底，紧塞口，埋入地三尺，坚覆上，三七日后开之，其酒赤如金色。旦空腹服半升，恶疾人以水一升，和酒半升，分五服。

【功用】补养，灭瘢痕。

56574 **枸杞酒**

【方源】《外台》卷十七。

【组成】米一石（黍糯并得酿酒米，用上好曲末一斗，加五升弥佳） 枸杞三十斤（去赤皮，半寸锉之，以水一石，浸之三日，煮取五斗汁） 生地黄二十斤（洗去土，细切，共米同炊之） 秋麻子三斗（微熬细粉，蒸气出，以枸杞汤淋取汁） 豆豉二斗（以枸杞汤煮取汁）。

【用法】上药地黄共米同蒸，余三物药汁，总合得五斗，分半渍米，馈半及曲和酿饭，如人肌温，总和一段，盖瓮口，经二七日，压取封泥，复经七日。初一度酿，用麻子二斗，多即恐令人头痛。日可饮三杯。

【功用】补中逐水，破积去瘀，逐热破血，利耳目，长发，坚筋骨，强阴，利大小肠，填骨髓，长肌肉，破除结气。

【主治】五内邪气，消渴，风湿，胸胁间气，头痛，五劳七伤，胃中宿食，鼻衄吐血，内湿风疰，恶血石淋，伤寒瘴气，烦躁满闷，虚劳喘息及脚气肿痹。

【宜忌】慎芜荑、生冷、陈宿猪、犬、鸡、鱼、面、蒜、油腻、白酒、房室等。

【备考】方中用法项用量原缺,据《圣惠》补。

56575　**枸杞酒**

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】枸杞根一石(锉,不生塚上者,净洗,去苍三寸,以水二石,煮取一石,去滓,入小麦曲末十斤,候曲发,即用半糯米秫共一石,净淘,炊之令熟,摊冷暖得所,即下后药)　桃仁三升(去皮尖,麸炒令微黄)　大麻仁二升(炒令香熟)　乌麻仁二升(炒令香,三味并捣碎)　甘菊花十两　生地黄一斗(切)

【用法】上都捣熟,入上件曲米中,搅拌令匀,入子瓮中,候发定,即泥瓮头,三七日令熟,初开,先下筒取清,然后压如常法。冬温夏冷,随性饮之,不令至醉为妙。

【功用】长筋骨,留容颜。

56576　**枸杞酒**

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】枸杞子二斤　生地黄汁三升

【用法】上每于十月采枸杞子,先以好酒二升,于瓷瓶内浸二十一日,开封再入地黄汁,不犯生水者,同浸,勿搅之,却以纸三重封头,候至立春前三十日开瓶。空心暖饮一杯。

【功用】变白轻身,乌髭发。

【主治】精血虚损。

【宜忌】忌食芜荑、葱。

56577　**枸杞酒**

【方源】《韩氏医通》卷下。

【组成】枸杞子五钱　黄连(炒)三钱　绿豆一钱

【用法】上药绢袋盛之,凡米五升,造酒一樽,煎一袋,窨久乃饮。

【主治】火证。

56578　**枸杞酒**

【方源】《医方考》卷三。

【组成】枸杞子一斗,酒二斗。

【用法】上同煎,或渍之。随量饮三五杯。

【主治】肝劳,面目青口苦,精神不守,恐畏不能独卧,目视不明者。

【方论选录】肝为劳伤,故令目视不明。经曰:味为阴,味厚为阴中之阴。枸杞味厚,故足以养厥阴之阴;煮以纯酒,取其浃洽气血而已。

【备考】用法项中或渍之及用量,据《增补内经拾遗方论》补。

56579　**枸杞散**

【方源】方出《圣惠》卷五十七。名见《普济方》卷三〇六。

【组成】枸杞叶　盐各少许

【用法】上同捣熟后,敷于疮上。

【主治】犬咬伤。

56580　**枸杞散**

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】枸杞根　地龙(捣)

【用法】上枸杞根取新者,刮去浮赤皮,只取第二重薄白皮,晒干,捣罗为末,每称一两,别入地龙末一钱和匀。先以热齑汁洗濯患处,用药干掺,日用三次。

【主治】痔疾。

56581　**枸杞散**

【方源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】枸杞根(正月采,洗去土,阴干)

【用法】上杵为末。每服三钱匕,空心、日午、夜卧各一服,水调下,或温酒亦得。连服一季。又于四月采苗,五月服;七月采叶,八月服,十月采子,十一月服,余法同前。

【功用】去风润肌,壮筋骨,进饮食。

56582　**枸杞散**

《普济方》卷二七三引鲍氏方。为原书同卷“牛黄丹”之异名。见该条。

56583　**枸杞粥**

【方源】《圣惠》卷九十七。

【异名】枸杞叶粥(《寿亲养老》卷四)。

【组成】枸杞叶半斤(切)　粳米二合。

【用法】上药以豉汁相和,煮作粥,以五味末、葱白等,调和食之。

【功用】《寿世新编》:益肾气。

【主治】①《圣惠》:五劳七伤,庶事衰弱。②

《寿世新编》:肝家火旺血衰。

56584 枸杞粥

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】枸杞苗四两(切) 葱白七茎(切) 薤白十四茎(切) 豉(炒)一合 粳米(净洗)三合

【用法】上用水三升,先煎枸杞、葱,薤,豉等,取一升半,去滓,下米煮作粥,空心食之。

【主治】伤寒后,虚羸劳热,背膊烦疼。

56585 枸杞粥

【方源】《长寿药粥谱》。

【组成】枸杞子 30 克 粳米 60 克

【用法】上加水适量,煮粥。供早点或晚餐服食,四季均可。

【功用】补肾益血,养阴明目。

【主治】中老年人肝肾不足,腰膝酸软,头晕目眩,久视昏暗,以及老年性糖尿病。

【宜忌】凡脾胃虚弱,经常泄泻的老人忌服。

56586 枸杞煎

【方源】《千金》卷十二。

【组成】枸杞子一升(九月采)

【用法】上以清酒六升,煮五沸,出取研之熟,滤取汁,令其子极净,晒子令干,捣为末,和前汁微火煎,令可丸。每服二方寸匕,一日二次,加至三匕,酒调下。亦可丸服,每服五十丸。

【功用】补虚羸,久服轻身不老。

56587 枸杞煎

【方源】《千金》卷二十二。

【组成】枸杞三十斤(锉。叶生至未落,可用茎叶,落而未生可用根)

【用法】上以水一石,煮取五斗,去滓,将滓更入釜与水依前煮取五斗,并前为一斛,澄之去淀,釜中煎之,取二斗许,更入小铜锅子煎,令连连如饴,或器盛重汤煮更好。每日早朝服一合半,日再服。初服一合,渐渐加之。

【功用】轻身益气,令入有力;预防痈疽。

【主治】虚劳。

56588 枸杞煎

【方源】《大清经》引贺兰方(见《医心方》卷十三)。

【组成】枸杞根(切)大一石 薯蓣 藕根各二大升 牛膝 茯苓 石斛 杜仲各大一斤 茅根 芦根各大一斗 枣膏大一升 地黄煎大二升 麦门冬煎大二升 蜜大一升 千岁葛汁煎大二升 冬时苏大二升。

【用法】上以水大三斛,入枸杞根,煮取五斗汁,去滓,加薯蓣、藕根,煮取一大斗;次以牛膝、茯苓、石斛、杜仲,加水五斗,煮取一大斗;次以茅根,芦根,入水一斛,煮取一斗,加枣膏,煮令减半,混合三汁,煎令减三分之二;次加地黄煎大二升,麦冬煎大二升;次加蜜大一升;千岁葛汁煎大二升;冬时苏大二升,稍煎令如饴,稍冷,纳漆器,密封。始服如弹子大一丸,一日三次。(一方加生姜汁煎五合)。

【功用】补虚羸,除寒热,益气力,长肌肉,止腰痛,充五脏,利小便,益精气,止泄精。久服耳目聪明,阴气长强,坚筋骨,填脑髓,养神安魄。

【主治】五内邪气,热中消渴,周痹风湿,胸腹游气,客热头痛,内伤大劳虚损,头面游风,风头眼眩,五癃,脚弱痿,四肢拘挛,膝痛不可屈伸,伤中少气,阴消脑疼,忧患惊邪恐悸,心下结痛,烦满咳逆,口焦舌干,好唾,胸中痰水,水肿,阴下湿痒,小便余沥,脚下瘦痛,不欲践地,身中不足,四肢沉重,时行呕哕,折跌绝筋,积聚,五劳七伤,目暗清盲热赤痛。

56589 枸杞煎

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】枸杞根(切)三斗(净洗漉干) 生地黄汁二升 鹿髓一升 枣膏半升。

【用法】上先将枸杞根,以水五斗,煎去一斗,去滓澄清,纳铜锅中,煮取汁三升;纳地黄汁、鹿髓、枣膏,以慢火煎如稀饴。每服半匙,温酒调服,一日三次。

【功用】填骨髓,补虚劳,益颜色;久服延年,老者返少,身轻目明。

56590　枸杞煎

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】枸杞根(洗,刮,去苗土,细切)三斗(勿取塚墓上者。以水七斗,煮取三升)　生地黄汁三斗。

【用法】上相和,入银锅内,以文火煎如稀饴,用瓷器盛,密封盖。每服半匙,空心时以酒调服,晚再服。

【功用】大补益,令人充悦,久服延年。

【主治】诸风。

56591　枸杞煎

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】生枸杞根(细锉)一斗(以水五斗,煮取一斗五升,澄清)　白羊脊骨一具(锉碎)

【用法】上以微火煎取五升,去滓,收瓷盒中。每取一合,与酒一小盏,合暖,食前温服。

【主治】频遭重病,虚羸不可平复。

56592　枸杞煎

【方源】《博济》卷五。

【组成】枸杞子不拘多少(去蒂子)

【用法】上用清水洗净,掏出控干后,入夹布袋子内,于净砧上取自然汁,澄一宿,去其清水,入石器内,慢火煎成膏子,取出,入瓷器内收贮。每服半匙,以温酒调下。久服大有所益,如合时天暖,其榨下之汁,更不用经宿,其膏煎下,三二载并不损坏。如久远服,多煎亦无妨。

【功用】明目驻颜,行步康健,壮元气,润悦肌肤。

56593　枸杞煎

【方源】《传信适用方》卷二引苏连叟方。

【组成】枸杞　白茯苓(末)　白沙蜜　黄蜡少许

【用法】生取枸杞自然汁,于银石器内熬成膏,入白茯苓末、白沙蜜、黄蜡少许。每服一匙,温酒盐汤化下。

【功用】明目。

56594　枸杞煎

《普济方》卷七十三。即《圣惠》卷三十二“点眼枸杞煎”。见该条。

56595　枸杞煎

《奇效良方》卷五十七。为方出《外台》卷二十一引崔氏方,名见《圣惠》卷三十二“枸杞汁点眼方”之异名。见该条。

56596　枸杞膏

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】甘枸杞子一斤

【用法】上药放砂罐内,入水煎十余沸,用细绢罗滤过,将渣挤出汁净,如前再入水熬,滤取汁,三次,去渣不用,将汁再滤入砂罐内,慢火熬成膏,入瓷器内,不可泄气。不论男妇,早、晚用酒调服。

【功用】生精,补元气,益荣卫,生血,悦颜色,延年益寿。

【主治】诸虚百损。

56597　枸杞膏

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】枸杞二、三斤(肥大赤色者)

【用法】上药以乳汁拌,蒸烂,捣膏,加水煎,拧出浓汁,去滓,加蜜,又熬成膏,贮瓷器内。每服四五茶匙,早上以温开水或龙眼肉汤、参汤调下。

【主治】读书劳目力,年过四十,阴气半衰,神光渐减,两目昏花。

【加减】夏月,加辽五味子二两。

56598　枸杞羹

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】枸杞叶一斤　羊肾一对(切)　羊肉(切)三两　葱白七茎(切)

【用法】上以五味汁煮作臛,空腹食之。

【主治】虚劳羸瘦。

56599　枸苓丸

【方源】《普济方》卷七十二。

【组成】白茯苓八两　真枸杞子四两(酒浸蒸)　当归二两(酒洗)　青盐二两(别研)　菟丝子二两(酒蒸)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服七十丸,空心白汤送下。

【主治】肾脏虚，水不上升，眼目昏暗，远视不明，渐生内障。

56600 **枸橘汤**

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】枸橘全个 川楝 秦艽 陈皮 防风 泽泻 赤芍 甘草各一钱五分。

【用法】水煎服。

【主治】子痈。

56601 **枸杞子丸**

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】枸杞子三两 干姜一两（炮裂，锉） 白术一两 川椒二合（去目及闭口者，微炒去汗） 吴茱萸三分（汤浸七遍，焙干微炒） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温酒送下。

【主治】痃癖冷气，不能饮食，四肢羸瘦少力。

56602 **枸杞子丸**

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】枸杞子一两，白茯苓一两，黄耆一两（锉） 鸡胜胵一两半（微炙） 栝楼根三分 泽泻半两 牡丹半两 山茱萸半两 麦门冬一两半（去心，焙） 牡蛎一两（烧为粉） 桑螵蛸三分（微炒） 车前子三分。

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】消肾，久渴不愈，困乏，小便滑数，心神虚烦。

56603 **枸杞子丸**

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】枸杞子二两 牛膝一两（去苗） 熟干地黄二两 漏芦三分 当归三分（锉，微炒） 酸枣仁三分（微炒） 人参一两（去芦头） 防风三分（去芦头） 羚羊角屑三分 桂心三分 白茯苓一两 黄耆一两（锉） 羌活三分 麦门冬一两（锉，去心，焙） 五加皮三分 白术三分 芎䓖三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温酒或荆芥汤送下，不拘时候。

【主治】产后风虚劳损，四肢疼痛，心神虚烦，不欲饮食。

56604 **枸杞子丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】枸杞子二两 熟干地黄 人参（去芦头） 茯神 附子（炮裂，去皮脐） 覆盆子 五味子 薯蓣 菟丝子（酒浸三日，晒干，别捣为末） 肉苁蓉（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 石斛（去苗根，锉） 山茱萸 桂心各一两。

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日服三十丸，渐加至四十丸，空心温酒送下。

【功用】益颜色，养精气，壮筋骨，强力倍志。

【主治】虚损。

56605 **枸杞子丸**

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】枸杞子（汤洗） 菊花（拣净） 肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙） 桂（去粗皮） 黄耆（涂酥炙，锉） 牛膝（酒浸一宿，焙） 生干地黄（酒浸一宿，焙） 远志（去心） 山芋各二两 柏子仁（酒浸，焙炒） 人参 白茯苓（去黑皮）各一两半。

【用法】上为末，以浸药酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心用温酒或盐汤送下。

【功用】平补心肾，延年驻颜。

56606 **枸杞子丸**

《圣济总录》卷一八六。为原书卷一八五“延年丸”之异名。见该条。

56607 **枸杞子丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【异名】老鸦丹。

【组成】枸杞子 葶苈子 菟丝子（酒浸软，别捣） 覆盆子 当归（洗，焙） 熟干地黄（洗，焙） 干山药 白茯苓（去皮） 白芍药 白术 白蒺藜（炒去刺） 牛膝（酒浸一

宿) 香白芷 延胡索 荜澄茄各一两 破故纸二两(炒)。

【用法】上为细末,用无灰酒煮面糊为丸,如梧桐子大,候干,以苍耳叶罨一宿。每服三十丸至五十丸,空心温酒或盐汤送下。

【功用】滋补真元,通流血脉,润泽颜色,久服乌髭须,延年耐老。

56608 枸杞子丸

【方源】《直指》卷十七。

【组成】枸杞 菟丝子(酒浸,研,焙) 白茯苓 黄耆(炙) 牡蛎粉 牛膝 熟地黄(洗) 麦门冬(去心)各一两 鸡内金(微炙)一两半 桑螵蛸 瓜蒌根各三分 山茱萸 牡丹皮各半两。

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食前粥饮送下。

【主治】消肾,久渴困乏,小便滑数。

56609 枸杞子丸

《普济方》卷八十一。即《圣济总录》卷一〇九"枸杞丸"。见该条。

56610 枸杞子丸

《普济方》卷二一八。即《圣济总录》卷一八五"枸杞丸"。见该条。

56611 枸杞子丸

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】枸杞子八两 生地黄二两(酒洗) 熟地黄二两(酒洗) 天门冬(酒洗,去心)二两 麦门冬(去心)二两 当归(去芦,全用,酒洗)四两 白芍药(酒拌匀,晒干,炒)二两 锁阳(酥炙)二两 人参(去芦)一两 黄柏(酒炒,忌铁)一两。

【用法】上除枸杞子、生熟地黄、天麦门冬捣膏外,余各为细末,同前药捣匀,米糊为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,空心淡盐汤送下。

【功用】补养。

56612 枸杞子丸

《医统》卷七十。为《普济方》卷二一七"枸杞丸"之异名。见该条。

56613 枸杞子丸

【方源】《明医指掌》卷六。

【异名】枸杞丸(《仙拈集》卷二)。

【组成】枸杞子四两 南星二两 半夏二两 黄柏(酒炒)四两 苍术(盐炒)三两 山楂三两(去核) 白芷二两 神曲(炒)二两 滑石(炒)三两 昆布四两 吴茱萸四两。

【用法】上为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服七十丸,空心盐汤送下。

【主治】木肾。

56614 枸杞子汤

《普济方》卷十五。即《圣济总录》卷四十一"枸杞汤"。见该条。

56615 枸杞子酒

【方源】《医心方》卷十三引《极要方》。

【异名】神仙枸杞子酒(《圣惠》卷九十五)。

【组成】枸杞子五大升(干者,碎) 生地黄三大升(切) 大麻子五大升(碎)

【用法】上于甑中蒸麻子使熟,放案上摊去热气,冷暖如人肌,纳地黄,枸杞子相和得所,入绢袋中,以无灰清酒二大斗浸之,春、夏五日,秋、冬七日,取服,任性多少,常使体中微有酒气。

【功用】《寿亲养老新书》:明目驻颜,轻身不老,坚筋骨,耐寒暑。

【主治】虚羸,黄瘦,不能食。

56616 枸杞子酒

《附广肘后方》卷四。为《外台》卷十七引《延年秘录》"生枸杞子酒"之异名。见该条。

56617 枸杞子散

【方源】《外台》卷十二引《删繁方》。

【组成】枸杞子五升 干姜五两 白术五两 吴茱萸一升 蜀椒三合(汗) 橘皮五两

【用法】上六味,切,捣五味,三筛下为散,取枸杞子燥,瓷器贮,研晒如作米粉法,七日晒之,一晒一研,取前药散和之,又研。每服一方寸匕,和酒食进之。

【功用】长阳气。

【主治】百病。

56618 **枸杞子散**

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】枸杞子一两 萆薢一两 牛膝一两（去苗） 天麻一两 萆薢一两 茯神三分 羚羊角屑三分 芎䓖三分 茵芋三分 防风三分（去芦头） 生干地黄三分。

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肝中风，致筋脉舒缓，举脚不知高下，目多冷泪，肢节无力。

56619 **枸杞子散**

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】枸杞子一两 黄耆一两半（锉） 人参一两（去芦头） 桂心三分 当归一两 白芍药一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，大枣三个，饴半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】虚劳，下焦虚伤，微渴，小便数。

56620 **枸杞子散**

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】枸杞子一两 五味子三分 覆盆子三分 白芍药三分 白龙骨一两 麦门冬一两（去心，焙）

【用法】上为细散。每服二钱，以温粥饮调下，不拘时候。

【主治】虚劳，小便精出，口干心烦。

56621 **枸杞子散**

【方源】《圣惠》卷四十。

【组成】枸杞子一两 白茯苓一两 杏仁一两（汤浸，去皮） 细辛一两 防风一两（去芦头） 白芷一两。

【用法】上为细散。先以腻粉敷面三日，即以白蜜一合和散药，夜卧时先用浆水洗面敷之。

【主治】面皯皰。

【宜忌】不得见风日，能常用大佳。

56622 **枸杞子煎**

【方源】《外台》卷十七引《张文仲方》。

【异名】神丹煎。

【组成】枸杞子三升 杏仁一升（去皮尖，研） 生地黄（研取汁）三升 人参十分 茯苓十分 天门冬半斤（捣汁，干者为末亦得） 白蜜五升 牛髓一具（无亦得） 酥五升

【用法】上各别依法料理，先煎汁等如稀饴，纳诸药煎，候如神膏，入水不散即成。一服两匙，酒和服之。

【功用】安五脏，好颜色，延年长生。

【主治】万病，并妇人久无子，冷病。

【宜忌】忌鲤鱼、酢物。

56623 **枸杞叶粥**

《寿亲养老》卷四。为《圣惠》卷九十七“枸杞粥”之异名。见该条。

56624 **枸杞叶羹**

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】枸杞叶三两 青蒿叶一两 葱白一握（去须，切） 豉一合

【用法】上先以水三大盏，煎豉取汁一盏五分，去豉，下枸杞叶等，煮作羹，调和食之。

【主治】骨蒸劳，肩背烦疼，头痛，不能下食。

56625 **枸杞根方**

【方源】《千金》卷二十七。

【组成】枸杞根（切）一石 小麦一斗（干净，择）

【用法】水一石六斗，煮枸杞根，取六斗，澄清，煎取三升，纳小麦于汁中，渍一宿，晒二日，往返令汁尽，晒干为末。每服方寸匕，以酒调下，一日两次。一年之中，以二月、八月各合一剂。

【功用】养性，遐龄，不老。

56626 **枸杞根汤**

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】枸杞根 栝楼根 麦门冬（去心，生） 黄连（去须）各一两半 土瓜根（干者） 知母 车前子（去土）各一两。

【用法】上锉，如麻豆。每服五钱匕，水一盏半，入生地黄半分，切，同煎至八分，去滓温

服,一日三次。

【主治】胃热干渴,饮水不止。

56627 **枸杞根饮**

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】枸杞根皮 菰根 李根白皮 葛根(四味并洗,锉)各二两 甘草(炙)一两 牡蛎(炒)二两 石膏(碎)五两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎至八分,去滓温服,不拘时候。

【主治】消渴,饮水无度,小便旋利,心中热闷烦躁。

56628 **枸杞根散**

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】枸杞根 槐白皮各二两 胡桐泪 细辛各一两 川椒一分(去目及闭口者,微炒去汗)

【用法】上为散。每用半两,以水二大盏,煎至一盏,去滓,热含冷吐。

【主治】齿龈宣露,脓血口臭。

56629 **枸杞根散**

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】枸杞根一两

【用法】上为散。和腊月猪脂敷之。

【主治】小儿湿癣。

56630 **枸杞浸酒**

【方源】《圣济总录》卷八。

【异名】枸杞防风酒(《医统》卷八)。

【组成】枸杞子 晚蚕沙(炒)各半升 恶实(炒) 苍耳子(炒)各一升 防风(去叉) 大麻子(炒)各二升 茄子根二斤(洗令净,细切,蒸一复时,须是九月九日采) 牛膝(酒浸,细切) 恶实根(切,炒)各一斤 桔梗(锉,炒) 羌活(去芦头,锉) 秦艽(去苗土,焙) 石菖蒲(九节者,锉)各二两

【用法】上以夹绢袋盛,用好酒三斗浸,密封闭,勿令通气,七日方开,开时不得面对瓶口。每服一盏,空心、食前、临卧温服。常令有酒容。

【功用】悦泽颜色,滋润皮肤,退风,益气强力。

【主治】中风,身如角弓反张,及妇人一切血风,上攻下注。

56631 **枸杞煎丸**

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】枸杞根叶花不拘多少(木臼中烂捣,水煮一复时,绞取浓汁五升,入酒五升,同熬成膏) 肉苁蓉(酒浸,切,焙) 附子(炮裂,去皮脐) 白术各二两 熟干地黄(焙) 何首乌(锉碎,用大豆蒸透,焙干,去豆) 补骨脂(炒)各三两

【用法】上为末,以煎膏和丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心温酒送下。

【功用】补虚,益气,乌髭。

56632 **枸杞煎丸**

【方源】《遵生八笺》卷六。

【组成】枸杞子根三十斤(取皮,九蒸九晒)

【用法】上为粉,取根骨清水煎之,添汤煮,去渣,熬成膏,和上粉为丸,如梧桐子大。每服三五十丸。

【功用】增寿。

56633 **枸杞羊肾粥**

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】枸杞叶一斤 羊肾一对(细切) 米三合 葱白十四茎

【用法】上细切,加五味煮粥如常法。空腹食。

【主治】阳气衰,腰脚疼痛,五劳七伤。

56634 **枸杞羊肾粥**

【方源】《饮膳正要》卷二。

【组成】枸杞叶一斤 羊肾一对(细切) 葱白一茎 羊肉半斤(炒)

【用法】上四味拌匀,入五味,煮成汁,下米熬成粥,空腹食之。

【功用】《药粥疗法》:益肾阴,补肾气,壮元阳。

【主治】①《饮膳正要》:阳气衰败,腰脚疼痛,五劳七伤。②《药粥疗法》:肾虚劳损,阳气衰败,腰脊疼痛,腿脚痿弱,头晕脑鸣,听力减

退或耳聋，阳萎，尿频或遗尿。

【宜忌】《药粥疗法》：以冬季食用为好，对阳盛发热，或性功能亢进者，不可选用。

【备考】《药粥疗法》本方用法：将新鲜羊肾剖开，洗净，去内膜，细切；再把羊肉洗净，切碎。用枸杞叶煎汁，去滓，同羊肾、羊肉、葱白、粳米一起煮粥，待粥成后，加入细盐少许，稍煮即可。

56635 枸杞防风酒

《医统》卷八。为《圣济总录》卷八"枸杞浸酒"之异名。见该条。

56636 枸杞还童丸

【方源】《普济方》卷二一八引《德生堂方》。

【组成】茅山苍术一斤（四两酒浸，四两米泔浸，四两盐水浸，四两醋浸，各浸已日，将苍术和合作一处，自初伏一日为始，早晨朝东晒，日午南晒，至晚西晒，夜则露天明放，至伏尽日收起不晒，如遇天阴下雨，收藏至晴明日再晒）　西枸杞子一斤（晒干，另研细用）。

【用法】上为末，和匀，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸；空心枣盐汤或酒送下，或米饮汤下亦可。

【功用】益气延年。

【主治】肝肾俱冷，眼目昏花，饮食少进。

【临证举例】延年　古杭陈鉴，以此常服，年近九十，亲笔传神不减少年；余人服之，咸有效验。

56637 枸杞根酿酒

【方源】《外台》卷十七引《延年秘录》。

【组成】枸杞根（切）一石五斗　鹿骨一具（炙，碎）

【用法】上以水四石　煎取六斗，去滓澄清，曲一斗（须干好），糯米一石，炊，如常法造酒，酒熟，密封头，然后压取清酒服。

【功用】除风，补益，悦泽人。

【主治】风冷虚劳。

56638 枸杞菖蒲酒

【方源】《千金》卷七。

【组成】枸杞根一百斤　菖蒲五斤

【用法】上细锉，以水四石，煮取一石六斗，去滓，酿二斛米酒熟。稍稍饮之。

【主治】缓急风，四肢不随，行步不正，口急及四体不得屈伸。

56639 枸杞菟丝汤

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】枸杞子　菟丝子　覆盆子　青葙子　熟地　防风　薄荷　玄参　密蒙花　当归　石决明　龙胆草

【用法】上水煎，磨石蟹汁冲入，食后服。

【主治】枣花翳内障。

56640 枸杞石决明酒

【方源】《医心方》卷十三引杂酒方。

【组成】石决明干者一大斤（洗，炙）　枸杞根白皮小一斤

【用法】上细切，盛绢袋，以清酒四斗五升渍之，春五日，夏三日，秋七日，冬十日，去滓。始服，多少不拘。

【功用】轻身，补肾气，和百节，好颜色，延寿肥健。

【主治】腰脚疾，疝瘕，诸风痹，恶血，目翳，目赤膜痛，眨眨泪出，瞽盲。

56641 枸杞汁点眼方

【方源】方出《外台》卷二十一引崔氏方，名见《圣惠》卷三十二。

【异名】枸杞煎（《奇效良方》卷五十七）。

【组成】枸杞叶　车前子叶各等分

【用法】上于手中熟挼，使汁欲出，又别取桑叶二三重裹之，悬于阴地经宿，乃摘破桑叶取汁，细细点目中。不过三五度，翳自当烂。

【主治】①《外台》：眼中翳少轻者。②《圣惠》：眼涩痛，兼有翳者。

柳

56642 柳木膏

《普济方》卷二七二。为《圣惠》卷六十一"柳皮膏"之异名。见该条。

56643 柳叶汤

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】生柳叶三斤(细切,冬用皮)

【用法】以水一斗五升,煮取七升。适寒温洗之,一日三次。

【主治】漆疮。

56644　柳叶散

《保婴撮要》卷十一。为《校注妇人良方》卷二十四"柳华散"之异名。见该条。

56645　柳仙散

【方源】《囊秘喉书》卷上。

【组成】薄荷一钱　儿茶八分　青黛五分　川连四分　冰片二分五厘

【用法】先取野蔷薇根煎汤漱口,后吹此药。

【主治】口舌碎痛。

56646　柳白散

【方源】方出《圣惠》卷五十七,名见《普济方》卷三〇八。

【组成】柳白皮一两　半夏一两

【用法】上并烧为灰,细研。以水调涂之。

【主治】蜘蛛咬作疮,久不愈者。

56647　柳皮膏

【方源】《圣惠》卷六十一。

【异名】柳木膏(《普济方》卷二七二)。

【组成】柳白皮五斤　楸皮五斤　木通一斤　枳壳半斤　皂荚一斤　木香末三两

【用法】上为细末,以水八斗,煮取汁二斗,去滓,移于小锅子中,下木香,煎至七升,去滓,又移于小锅中,以慢火煎,搅勿住手,炼如饧,捻得成丸即住,以细帛裹收之。每日涂于帛上贴之,取平复为度。

【主治】诸疮愈后,疮瘢胬肉未消;瘰疬风结。

【备考】方中楸皮,《普济方》作"楸叶"。

56648　柳灰散

【方源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】柳枝(烧灰)五钱　荆芥(炒,末)二钱　滑石三钱　生甘草二钱。

【用法】上为末。水调涂之。

【主治】天灶丹。

56649　柳光散

【方源】《玉案》卷六。

【组成】斑蝥(去翅足)　大风子各二钱　川槿皮　枯矾　轻粉各三钱　白砒五分

【用法】上为细末。醋调擦患处。

【主治】一切顽癣。

56650　柳华散

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【异名】柳叶散(《保婴撮要》卷十一)。

【组成】黄柏(炒)　蒲黄　青黛　人中白(煅)各等分

【用法】上为末。敷之。

【主治】热毒口疮。

56651　柳华散

【方源】《医学心悟》卷三。

【异名】柳花散(原书卷六)。

【组成】真青黛　蒲黄(炒)　黄柏(炒)　人中白各一两　冰片三分　硼砂五钱

【用法】上为细末。吹喉。

【主治】喉疮,并口舌生疮,走马牙疳,咽喉肿痛。

56652　柳豆散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】赤小豆二合(炒熟)　黑豆二合(炒熟)　柳枝一握(锉)　地骨皮一两　柳蠹末半分(合)

【用法】上为散。每用四钱,以水一大盏,煎至七分,去滓,热含冷吐。

【功用】去齿根下热毒。

【主治】齿龈风肿。

56653　柳花丹

【方源】《圣惠》卷九十五。

【异名】柳黄丹(《普济方》卷二六五)

【组成】柳絮矾一两　铅霜一两

【用法】上为细末,以枣肉为丸,如梧桐子大。每服五丸,以冷金银汤送下。若路行走马,热渴不彻,即含化七丸,或常含一丸,终不患渴。

【功用】镇心神。

【主治】男子三焦壅热，烦渴不止；脚气，乳石发动，狂躁不彻。

56654 **柳花散**

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】黄柏一两 淀花半两

【用法】上为散。临卧干掺。误咽也不妨。

【主治】口疮。

56655 **柳花散**

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】玄胡索一两 黄柏（去粗皮） 黄连各半两 青黛二钱（另研） 密陀僧（另研）三钱

【用法】上为细末。每用少许，敷贴口疮上，食后、临卧用。有津即吐。

【主治】口舌生疮。

56656 **柳花散**

【方源】《普济方》卷一八八引《经效良方》。

【组成】柳絮不拘多少（焙干）

【用法】上为细末。温米饮送下。

【主治】吐血。

56657 **柳花散**

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】柳花五七钱 紫草一两二钱 升麻九钱 归身七钱半。

【用法】上为末。每服七钱，葡萄煎汤调下。

【主治】室女发热经行。

56658 **柳花散**

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】黄柏（净，末）一两 青黛三钱 肉桂一钱 冰片二分

【用法】上为细末，共再研，瓷罐收贮。每用少许，吹之。

【主治】思烦太甚，多醒少睡，虚火发动，口破色淡，斑白点细，甚者陷露龟纹，脉虚不渴。

56659 **柳花散**

【方源】《幼科指掌》卷四。

【组成】人中白 青黛 黄柏末 蒲黄各等分

【用法】上为末。冰片少许，研细敷上。

【主治】小儿走马牙疳。

56660 **柳花散**

《医学心悟》卷六。为原书卷三“柳华散”之异名。见该条。

56661 **柳花散**

【方源】《种痘新书》卷十。

【组成】柳花七钱 紫草一两 升麻七钱 当归八钱 赤芍六钱

【用法】上为末。每服七钱，葡萄煎汤送下。

【主治】女子出痘，火毒回炽，致血妄行，非经行之期于发热之时而经水忽至者。

56662 **柳青丸**

【方源】《妇科玉尺》卷二。

【组成】川黄连（姜汁炒三次）三两

【用法】上为末，米糊为丸，如绿豆大。每服三五分至七八分，以陈皮、半夏汤送下。须于未交三月前十日服起。

【主治】妊娠三月，心经火甚而堕胎。

56663 **柳青散**

【方源】《疡科捷径》卷上。

【组成】川连二钱 川柏四钱 梅片一钱 薄荷五钱 淡芩二钱 儿茶四钱 白芷一钱 甘草五分 青黛二钱五分

【用法】上为细末。吹之。

【主治】大人口破。

56664 **柳青散**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】薄荷五分 儿茶八分 黄连四分 青黛三分 冰片一分

【用法】上为细末。先用蔷薇根汤漱口，后吹之。

【主治】口舌破碎。

56665 **柳枝汤**

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】嫩柳枝半两 茵陈三两 苦参五两 狼牙草三两 青葙叶三两 桃枝五两 槐白皮四两 蒴藋五两 麻黄三两（去根节）

【用法】上细锉和匀。每取一斤，以水五斗，煮取四斗，去滓，更入盐及朴消各二两，搅匀，

看冷热，于温室中洗浴。洗罢，衣覆汗出愈。

【主治】风瘙皮肤生瘖瘟，搔之肿痒。

【宜忌】切慎外风。

56666　柳枝汤

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】柳枝一握(切)　地骨皮　细辛　防风(去芦头)　杏仁(汤浸，去皮尖双仁)　蔓荆子各一两　盐半两　生地黄一升(切)

【用法】上细锉和匀。每用一两，以水一大盏，酒一盏，同煎至一盏，去滓，热含就于患处良久，倦即吐之，含尽为度，一日二次。

【主治】齿根出露，摇动疼痛。

56667　柳枝汤

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】垂柳枝　槐白皮　桑白皮　白杨皮各一握。

【用法】上细锉。每用半两，以水一大盏，煎至七分，去滓，入盐一钱，搅令匀，热含冷吐。

【主治】齿龈肿，连耳脑肿疼。

56668　柳枝汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】柳枝(锉)半两　柴胡(去苗)　鳖甲(去裙襕，醋炙)各二两　大黄(煨)　青橘皮(汤浸，去白，焙)　木香　甘草(炙，锉)各半两

【用法】上为粗末。每服四钱匕，水一盏半，入青蒿一握(切)，小麦二百粒，同煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】虚劳肌热，烦躁少力，痰嗽颊赤，潮热，夜多盗汗，饮食无味，日渐羸瘦，五心烦热，骨节痠疼。

56669　柳枝汤

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】柳枝(切)　槐枝(切)　黑豆各一合　蜀椒(去目并合口，炒出汗)半两　盐　细辛(去苗叶)　羌活(去芦头)各一分

【用法】上除椒、盐外，并为粗末。先以水六盏，煎取二盏，去滓，入椒，盐，再煎取一盏，通口漱之，不拘时候，以愈为度。

【主治】齿痛，连牙颔疼。

56670　柳枝汤

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】杨柳枝(指大，长三尺)二十枝

【用法】水煮令极热，以故帛及毡掩肿处，取热柳枝更互捍之，如此取愈。

【主治】小儿水癞偏大，上下不定，疼痛不可忍

56671　柳枝汤

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】羌活　独活　地骨皮　防风(去芦头)　柳枝皮各一两　小椒半两(去目)　苍术八两(拣净，去粗皮)

【用法】上为细末。每用二钱，水一盏，入柳枝，黑豆少许，同煎至七分，去滓，食后热漱冷吐，一日三二次。

【主治】牙根宣露，动摇疼痛。

56672　柳枝散

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】寒食杨柳枝(门傍插者)一两　人参一分

【用法】上为散。每服一钱匕，新水调下，并二服。

【主治】鼻衄不止。

56673　柳枝散

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】柳枝　桑枝　槐枝各一握(烧灰)　丹砂(研入)一分　皂荚(不蛀者，炙令赤)一分　麝香(研)一钱　小蓟根半两　凝水石(研)二两　生干地黄(焙)半两

【用法】上为细散。揩齿。

【主治】齿龈血出。

56674　柳枝散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】柳枝　槐枝(各长四寸)一握(切碎)　盐四两　皂角(不蛀者)七梃

【用法】上同入瓷瓶中，黄泥固济，糠火烧一宿后，冷取出，研细。擦牙。

【功用】牢牙去风。

【主治】牙齿诸疾。

56675 **柳枝膏**

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】柳枝（锉）一握 防风（去叉，锉） 细辛（去苗叶，锉） 盐花各一分

【用法】用水三盏，煎至一盏半，去滓更煎成膏，以瓷器收。每用薄纸，剪如柳叶，涂药贴齿上。

【主治】齿历蠹。

56676 **柳枝膏**

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】麻油半斤 黄丹三两 乳香一分 柳枝一握

【用法】如常法熬成，然后入乳香搅匀，贮器中。外贴。

【主治】灸疮。

56677 **柳枝膏**

【方源】《普济方》卷四〇七。

【组成】垂柳枝五两 苦参二两 黄芩一两（一方用黄连一两）

【用法】上为粗末。每用三匙头，以水两碗，煎至一碗，滤去滓，研入好墨半匙头，拌令匀，再熬成膏，以瓷盒盛，候冷。每用少许，涂子疮上。

【主治】漆疮，四肢壮热。

56678 **柳根酒**

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】柳根三斤（须水所经露出者，锉）

【用法】用水一斗，煮取五升，用米三升，酿之酒成。每服半升，空心、日午、夜卧各一服。

【主治】瘤瘿。

56679 **柳黄丹**

《普济方》卷二六五。为《圣惠》卷九十五“柳花丹”之异名。见该条。

56680 **柳黄散**

【方源】《囊秘喉书》卷下。

【组成】黄连 黄柏 蒲黄 青黛 硼砂 胡黄连 芒消各等分 冰片少许

【用法】上为细末。吹之。

【主治】喉痛，口舌生疮，破烂。

56681 **柳绿散**

【方源】《医方类聚》卷二五五引《新效方》。

【组成】人中白

【用法】上为末。入铜青，和令如柳色。疮湿则干掺，干则油调。

【主治】牙疳，并口、鼻、耳边疳疮。

56682 **柳绿散**

【方源】《普济方》卷六十七。

【组成】青黛 蒲黄 雄黄 枯白矾各等分（一方有五倍子无雄黄）

【用法】上为细末。贴患处。

【主治】牙疳。

【加减】慢牙疳，敷此药少加信。

56683 **柳絮散**

【方源】《圣济总录》卷一三二。

【组成】柳絮（捣末） 腻粉各等分

【用法】上为末。灯盏中油调涂之。

【主治】面䘌疮，作脓窠如香瓣。

56684 **柳絮散**

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】柳絮 谷精草 石决明 夜明沙各等分

【用法】上为散。每服一钱匕，豮猪肝一片批开，掺药在内，以线子扎定，米泔一大盏，煮至五分取出，乘热以汤熏眼，良久服之，一日一次。

【主治】小儿斑疮入眼。

56685 **柳木耳饼**

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】柳木耳一两 龙葵根一两（锉） 黄连三分（去须） 川芒消一两 麦饭石三分（烧，醋淬三遍） 雄雀粪一分 乳香一两 杏仁一两（其疮有头作孔者，煨，去皮尖；无孔者，和皮捣用之）

【用法】上为散，用浆水和，捏作饼子，如五钱厚。贴疮头，以单帛抹之，一日二易之。

【主治】痈疽疮肿，热焮疼痛。

56686 **柳木耳饼**

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】老柳树上木耳二两 黄连一两(去须) 龙葵根一握(净洗去土,切) 乳香一两 人粪半两 杏仁一两(汤浸,去皮尖)

【用法】上药相和,捣三五百杵,捏作饼子,厚五钱以来。一依疮大小贴之,恐药不住,以单帛勒之,病者觉痒及冷应心,则不得以手搔之,如人行三十里,一换,须臾痒不可忍,四畔便皱,脓即已也,急去其药,以甘草温汤洗之,用膏药贴之,每日一换。皆须甘草汤洗之,以愈为度。

【主治】乳石气发背,疮赤黑色。

56687 **柳白皮汤**

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】柳白皮三升

【用法】上细锉,如棋子大。以水一石,煎取六斗,取一小瓮子,可受一石者,纳汤瓮中,以两木横瓮底,脚踏其上,汤不得过三里穴,如此三度,即消。浸时,使汤常热佳。

【主治】脚气缓弱,疼痹肿满。

56688 **柳枝浴汤**

【方源】方出《千金》卷五,名见《普济方》卷三八四。

【组成】柳枝(细切)

【用法】煮汁,浴儿。

【主治】小儿生一月至五月,乍寒乍热。

【加减】若渴,绞冬瓜汁服之。

56689 **柳根熨方**

【方源】方出《肘后方》卷五,名见《千金》卷二十三。

【组成】柳根(削取上皮)

【用法】熟捣,火温,帛囊贮。熨乳肿处,冷更易之。一宿即愈。

【主治】乳痈二三百日,众疗不愈,但坚紫色青。

56690 **柳蛀粪熨**

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】柳蛀粪二升

【用法】甑上炊一饭顷;如无柳蛀粪,用大豆五斗蒸熟。摊于床上,著旧夹衣盖衬,令患人卧,蒸熨所患处。

【主治】柔风,筋骨疼痛。

56691 **柳絮矾散**

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】柳絮矾半两 铅白霜一两 马牙消一分 芒消一分

【用法】上为散。每服一字匕,冷水调下。

【主治】小儿疳渴不止。

56692 **柳枝当归膏**

【方源】《东垣试效方》卷三。

【组成】当归尾(尖细梢,水浸)一两 杏仁(浸,去皮尖)一百个 黄丹(细研,水飞)六两 肥嫩柳枝三两半(切如一寸,水洗净,令干) 肥嫩桃枝一两半(洗净,令干) 芝麻油一斤

【用法】先令油热,下桃、柳枝熬令半焦。以绵裹当归、杏仁,同熬至桃、柳枝黑焦为度,去药滓,滤油澄净,抹去铫子中滓秽净,再上火令沸,旋旋入黄丹,熬,滴水中不散为度,或只于纸上摊透为度。

【主治】一切热疮。

【备考】本方方名,《医学纲目》引作"热疮寒膏药"。

56693 **柳蚛屑浴汤**

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】柳蚛屑一斤 蒴藋根一斤 黄栌木一斤(锉) 盐二合

【用法】以水五斗,煎至三斗,去滓,暖室中看冷热洗浴。

【主治】风瘾疹。

【宜忌】洗浴后,宜避风。

56694 **柳酸乌梅膏**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】乌梅 30 克 水杨酸 2 克

【用法】取食盐 10 克,用开水 50 毫升,溶化后,将乌梅放入,浸泡一日,去核,放入乳钵加食醋 15 毫升,捣烂,最后,加水杨酸混合即

成。外用。

【主治】鸡眼。

56695 **柳枝煎防风丸**

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】倒垂柳枝二斤 桑枝二斤 槐枝二斤 天蓼木枝二斤 仙灵脾叶二斤

【用法】上锉，以水七斗，于大银锅中，煎取一斗，尽滤去滓；用晚蚕沙一升，炒令香，捣罗为末，入药汁中相和，再煎稀稠得所，取出，用瓮合盛，每用酒调下后丸药：

防风一两（去芦头） 羌活一两 五味子一两 人参一两（去芦头） 五加皮一两 白蒺藜一两（微炒，去刺） 赤茯苓一两 白鲜皮一两 甘菊花一两 松子一两（去壳） 乌蛇三两（酒浸，去皮骨，炒令黄） 露蜂房一两（微炙）

上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温酒一中盏，入煎成药一茶匙调匀，食前送下。

【主治】大风疾，体生疮肿，瘙痒出脓，风毒极甚者。

柱

56696 **柱灵散**

【方源】《袖珍》卷二引《圣惠》。

【组成】良姜（细切，麸炒） 厚朴 五灵脂（明净者）各等分

【用法】上为细末。热醋调服一钱。立止。

【主治】心腹大痛，甚危急。

柿

56697 **柿汤**

【方源】《卫生家宝产科备要》卷六。

【组成】干柿一个

【用法】上切，水一大盏煮熟，热呷。温即再暖，令热呷吃。

【主治】产后呕逆，气乱心烦。

56698 **柿饼**

【方源】《医宗必读》卷七。

【组成】柿饼（烧存性）

【用法】每服一钱，酒送下。数服即效。

【主治】反胃噎塞。

56699 **柿皮散**

【方源】《普济方》卷二一二。

【组成】柿木皮（大柿亦可用，晒干更焙）

【用法】上为末。每服二钱，米饮调下。

【主治】脓血不止，上充下脱。

56700 **柿灰散**

【方源】《本草纲目》卷三十引《叶氏方》。

【组成】干柿三枚（烧存性）

【用法】上为末。陈米饮调服。

【主治】小便血淋。

56701 **柿灵丹**

【方源】《杂病广要》引《寿世仙丹》。

【组成】黑牵牛六钱（三钱炒，三钱生） 大黄六钱 广木香六钱 阿魏（瓦焙） 丁香 槟榔各二钱四分 香附（生用）四钱

【用法】上为极细末，每用柿饼七个，每个开孔，入药末三分半，仍以柿饼合口，放老米饭上蒸过，慢火瓦上焙干。每服一饼，早、午、晚各嚼食一枚，能饮，烧酒送下；不能饮，白滚汤下。数日即消。

【主治】十种蛊胀。

【宜忌】忌盐、醋百日。

56702 **柿饼丸**

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】棉花核（炒黑，去壳）三两 侧柏叶（炒黑）四两 槐米（炒）一两

【用法】柿饼蒸烂，捣为丸。每服四五钱，清晨滚汤送下。

【主治】肠风下血。

56703 **柿饼饭**

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】柿饼（切细）

【用法】杂干饭内，同蒸食。

【主治】反胃。

【宜忌】不用水，亦勿以它药杂之。

56704 **柿饼粥**

【方源】方出《证类本草》卷二十三引《食疗本草》，名见《长寿药粥谱》。

【组成】柿(研末)　粳米

【用法】先以粳米煮粥，欲熟时，下柿末，更煮二三沸。小儿与奶母同食。

【功用】《长寿药粥谱》：健脾润肺，涩肠止血。

【主治】①《证类本草》引《食疗本草》：小儿秋痢。②《长寿药粥谱》：老人吐血，干咳带血，久痢便血，痔漏下血等出血病证。

【宜忌】《长寿药粥谱》：有胃寒病的老人忌服；忌食螃蟹。

【备考】《长寿药粥谱》本方用柿饼二三枚。

56705　柿根膏

【方源】《准绳·疡医》卷三。

【组成】紫背草　柿子根皮

【用法】上砍烂，糟炒。缚之。

【主治】蜘蛛背。

56706　柿钱散

【方源】方出《证类本草》卷十二引《简要济众方》，名见《洁古家珍》。

【组成】丁香一两　干柿蒂一两(焙干)

【用法】上为散。每服一钱，煎人参汤下，不拘时候。

【主治】伤寒咳噫不止，及哕逆不定。

56707　柿蒂汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】干柿蒂七枚　白梅三枚

【用法】上为粗末，只作一服。用水一盏，煎至半盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒呕哕不止。

56708　柿蒂汤

《济生》卷二。为原书同卷注文引《卫生家宝》"顺气汤"之异名。见该条。

56709　柿蒂汤

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】丁香　柿蒂　山栀　人参　茯苓　陈皮　半夏　良姜　甘草　竹茹　黄连

【用法】加生姜七片，水煎服。

【主治】肝经之症，怒气满胸，发喊连声不绝，神思疲倦。

【加减】虚人，加知母、黄柏。

56710　柿蒂汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷九。

【组成】柿蒂　黄柏　黄连　生地　侧柏叶　丹皮　白芍　木通　茯苓　泽泻

【用法】水煎服。

【主治】心与小肠实热而致血淋，血色鲜红，脉数而有力。

56711　柿蒂饮

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】柿蒂三钱

【用法】水煎服。

【主治】呃逆。

56712　柿蒂酒

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】柿蒂七个(烧存性)

【用法】上为末。黄酒冲服。

【主治】呃逆。

56713　柿蒂散

《袖珍》卷一。即《济生》卷二注文引《卫生家宝》"顺气汤"。见该条。

56714　柿蒂散

【方源】《奇效良方》卷三十五。

【组成】干柿蒂(烧存性)

【用法】上为末。每服二钱，空心米饮调下。

【主治】血淋。

56715　柿蒂散

【方源】《点点经》卷三。

【组成】菖蒲　枣仁　胆星　厚朴　陈皮　葶苈　杷叶(去毛，炙)　半夏　腹皮　香附　桔梗　桂心

【用法】柿蒂七个为引。

【主治】痰火上攻之喘。

56716　柿煎散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】白菊花　绿豆壳　谷精草各一两

【用法】上㕮咀。每服二钱，干柿一枚，粟米

泔汁一大盏，慢火煎干，去滓，食后临睡只吃柿肉，一日三枚，倍加尤好。如婴孩小，乳母可服。或用煮过柿子去核，薄切，焙为细末，抄半钱，温米泔水调服，不拘时候。与儿服亦可。

【主治】小儿痘疮后，目生翳膜。

56717 柿精散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】谷精草五钱　柿饼一个

【用法】每日水煎，并柿饼同食。

【主治】障翳。

56718 柿霜丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十四。

【组成】柿霜　硼砂　天冬　麦冬各二钱　玄参一钱　乌梅肉五分

【用法】炼蜜为丸。含化。

【主治】久嗽喉痛。

56719 柿蘸散

【方源】《济阳纲目》卷二十八。

【组成】不蛀皂角一锭（去皮弦）

【用法】劈作两片，去子，每孔内入去皮巴豆一粒，以线扎定，童便浸一宿，火上炙干，为细末。每用一字，临睡用干柿蘸嚼吃下。如无干柿，以白砂糖代之。

【主治】喘嗽久不愈。

【宜忌】忌汤水诸物。

56720 柿蒂丁香饮

【方源】《一盘珠》卷三。

【组成】干姜　人参　甘草　白术　丁香　柿蒂各一钱

【主治】虚寒呃逆。

【加减】如四肢厥冷，加附子、肉桂各五分。

柽

56721 柽叶散

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【异名】独圣散（《麻科活人》卷二）。

【组成】西河柳

【用法】青茂时采叶，晒干，为末。每服一二钱，茅根煎汤调下。

【主治】发热六七日以后，明是疹子却不见出者。

56722 柽叶煎

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】柽叶半斤（细锉，如无叶，枝亦得）荆芥半斤（细锉）

【用法】以水五升，煮取二升，滤去滓，澄清；再入白蜜五合，梨汁五合，竹沥五合相和，以新瓷瓶盛，用油单子盖紧，系于釜中，以重汤煮，勿令水入，从初五更煮至日出后即住。每服一小盏，一日三服。

【主治】一切风，不问远近。

56723 柽花散

【方源】《医方类聚》卷二十四引《烟霞圣效方》。

【组成】柽柳花（无花用叶，无叶用枝，然不及用花）　蛤粉　当归　甘草各等分

【用法】上为末。每服四钱，温水调下。略睡，良久再服。

【主治】遍身风瘙痒，重则昏迷不省。

56724 柽枝煎

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】嫩柽枝三斤　牛蒡根五斤　石榴二十颗（和皮捣碎。如无，即用枝二斤代之）　生木瓜二颗（和皮细切；如无生者，即用干者倍用代之）　桑根白皮五两（如无，以桑枝细锉代之）　羚羊角屑三两　生姜三两（细切）　乌鸡粪一两　乌蛇三两（酒浸，去皮骨，炙微黄）　天麻一两　羌活一两　防风一两（去芦头）　桂心一两　白蒺藜一两　仙灵脾一两　附子一两（生，去皮脐）

【用法】上药柽枝与牛蒡根锉细，以水五斗，煮待牛蒡根烂，至二斗已来，即去滓，澄滤，用煎石榴皮至乌鸡粪六味，至五升，滤去滓，将乌蛇以下八味研末，入前煎中，别入好酒二升，白蜜一升，以慢火熬，用柳木篦不住手搅令稀稠得所，以瓷器盛。每服一茶匙，空心及晚食前以温酒调下。

【主治】一切风。

【宜忌】忌毒鱼、动风物。

56725 **怪叶葛根汤**

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】西河柳　前胡　葛根　荆芥穗　贝母　元参　知母　麦冬　甘草

【用法】水煎服。

【主治】麻疹，邪热壅于肺，发热而喘者。

【备考】原书用本方治上症，去甘草。

故

56726 **故纸散**

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】破故纸

【用法】炒，为末。每服一钱，热汤调下。

【主治】小儿遗尿。

56727 **故扇散**

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】故扇(烧灰)一分　麻黄(取根节)三分

【用法】上为散。每服半钱匕，乳汁调下。

【主治】小儿盗汗。

56728 **故锦散**

【方源】《普济方》卷一六三。

【组成】故锦一寸

【用法】烧灰。茶清调服。

【主治】喘。

56729 **故纸四神丸**

《全国中药成药处方集》(吉林方)。为《内科摘要》卷下"四神丸"之异名。见该条。

胡

56730 **胡豆汁**

【方源】《圣济总录》卷一八八。

【组成】胡豆二合

【用法】上煮取汁，勿用盐，随意饮之。

【主治】消渴。

56731 **胡芦丸**

【方源】《普济方》卷二四一引仁存方。

【组成】苍耳(五月五日采，九蒸九晒)二两　左缠藤(取嫩叶，晒干)二两　胡芦巴二两(一两同海金沙炒赤色，去沙不用；一两同去壳巴豆十四粒炒巴豆色赤，去豆不用)

【用法】上为末，醋糊为丸。每服四十丸，盐汤送下。

【主治】风毒脚气。

56732 **胡连丸**

【方源】《博济》卷四。

【组成】胡黄连　丁香　密陀僧各半两　肉豆蔻一个

【用法】上药同研细，入麝香一分，和匀，次入绿豆末少许，同水和为丸，如麻子大。儿三岁以下一丸，三岁以上五丸。脑疳，鼻痒及赤烂，黄连汤下；脾虚羸瘦，泻痢，四肢虚肿，青州枣汤下；肝疳，眼涩生疮，甘草汤下；骨疳，冷地卧，爱吃土，紫苏茶汤调下；肺疳，上气喘急，橘皮汤下；筋疳，泻血，盐汤下；虫疳及泻无定，生姜汤下；常服，米饮下。

【主治】小儿疳积，泻痢。

56733 **胡连丸**

《幼幼新书》(人卫本)卷二十引《庄氏家传》。即原书同卷(古藉本)"胡黄连丸"。见该条。

56734 **胡连丸**

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】条芩四两(沉水者)　白术(无油者)二两　莲肉(去心)二两　砂仁(微炒)一两　炙草一两

【用法】上为末，用山药五两作糊为丸。米饮送下。

【功用】安胎。

【主治】胎动不安。

56735 **胡连丸**

【方源】《良朋汇集》卷四。

【组成】柴胡　胡黄连各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服二三丸，放银器中，黄酒化开，再入水五分，重汤煮二三十沸，温连药渣饮尽，重者再一服。

【主治】小儿盗汗。

56736 **胡连散**

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】胡粉三钱 黄连末一钱 五倍子末一钱

【用法】上为散。先以甘豆汤净洗，拭令干，以药末敷于疮上，一日二次。

【主治】阴生疮肿痛。

56737 **胡连散**

《普济方》卷四〇七。为《幼幼新书》卷三十一引张涣方“胡黄连散”之异名。见该条。

56738 **胡桃丸**

【方源】《三因》卷十。

【组成】白茯苓 胡桃肉（汤去薄皮，别研） 附子（大者）一枚（去皮脐，切作片，生姜汁一盏，蛤粉一分，同煮干焙）各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，米饮送下；或为散，以米饮调下，食前服。

【主治】肾消，亦云内消。多因快情纵欲，极意房中；年少惧不能房，多服丹石及失志伤肾，遂致唇口干焦，精溢自出，或小便赤黄，五色浮浊，大便燥实，小便大利而不甚渴。

56739 **胡桃丸**

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】破故纸 杜仲 萆薢 胡桃仁各四两

【用法】上为细末，次入胡桃膏子拌匀，再捣千余下，丸如梧桐子大。每服三十至五十丸，空心温酒盐汤下。

【功用】益精补髓，强筋壮骨，延年益寿，悦心明目，滋润肌肤，令壮年高人脏腑不燥结。

【宜忌】《普济方》：忌羊血。

56740 **胡桃丸**

【方源】《普济方》卷二四九。

【组成】胡桃肉（浸，去皮，研焙） 破故纸 大枣（煮，去皮核）各等分

【用法】上为末，以枣和丸，如梧桐子大。每服四五十丸，食前温酒送下。

【主治】小肠气，疝气，痛不可忍。

56741 **胡桃丸**

【方源】《回春》卷五。

【组成】乳香 沉香 木香 母丁香 大茴香 干姜 杜仲（姜汁炒去丝） 没药 菟丝子（酒制） 破故纸（酒炒）各等分 胡桃四个（去壳）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。黄酒送下。

【主治】腰痛。

56742 **胡桃汤**

【方源】《得效》卷五。

【组成】胡桃肉三个 生姜三片

【用法】水煎，临卧食毕，饮汤三两呷，又再嚼，如前饮汤，就枕即安。

【主治】痰喘。

56743 **胡桃汤**

【方源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】胡桃肉 补骨脂 杜仲各四两（一作各四钱）

【用法】上㕮咀，分二贴。用水二钟，煎七分，空心服。

【主治】肾虚腰痛。

56744 **胡桃饮**

【方源】《卫生鸿宝》卷三。

【组成】胡桃肉（连皮）三个 橄榄核三个（烧存性） 雄黄（水飞）三分 甘草（浓煎汁） 生蜜数匙

【用法】上和匀，搅去滓，时时温服数匙。

【功用】解胎毒。

56745 **胡桃酒**

【方源】《普济方》卷二八六引《神效方》。

【组成】胡桃七个

【用法】上烧过，阴干为末。酒调服，不过三服。

【主治】便痈。

56746 **胡桃散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】胡桃肉（汤浸，去皮） 破故纸（炒）

大枣(煮,去皮核)各等分

【用法】上为细末。每服二钱,食前温酒调下。

【主治】小肠气。

56747　**胡桃散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】萵苣子　胡桃肉(去涩皮)各等分

【用法】上为细散。每服三钱,热酒调下,不拘时候。

【功用】下奶。

56748　**胡桃散**

【方源】《朱氏集验方》卷五引《夷坚志》。

【组成】生姜二钱　人参三寸(作四段)　胡桃二个(去壳)

【用法】上为散。入夜含于口中。

【主治】咳嗽。

56749　**胡桃散**

【方源】《普济方》卷二四七。

【组成】胡芦巴　桃仁(去皮尖,炒)各等分

【用法】上为末。每服二钱,食前酒调下。

【主治】诸疝气。

56750　**胡桃散**

【方源】《医统》卷四十二。

【组成】胡桃仁(去油)四两　皂角刺(炒焦)二两　故纸(微炒)一两半　槐花(炒)一两

【用法】上为末。每服二钱,米饮或汤调下。

【主治】肠风便血。

【宜忌】老人更宜服。

56751　**胡桃散**

【方源】《医学六要》卷七。

【组成】核桃仁一个(去皮,捣烂)　穿山甲(炒)一钱

【用法】上捣合一处,黄酒调服。

【主治】妇人少乳,乳汁不行。

56752　**胡桃散**

【方源】《医学心悟》卷六。

【组成】大胡桃一枚　全蝎二只

【用法】以大胡桃剖开口,将全蝎纳入,烧灰存性,研末。热酒冲服。

【主治】鱼口便毒。

56753　**胡桃粥**

【方源】《本草纲目》卷三十引《海上方》。

【组成】胡桃肉一升

【用法】细米煮浆粥一升,相和顿服。即瘥。

【功用】《长寿药粥谱》:补肾益肺润肠。

【主治】①《本草纲目》引《海上方》:石淋痛楚,便中有石子者。②《长寿药粥谱》:老年肾亏腰疼,腿脚软弱无力,肺虚久咳,气短喘促,慢性便秘,小便淋漓不爽,病后衰弱。

【宜忌】《长寿药粥谱》:宜作早晚餐或点心服食;大便稀薄之老人不宜食用。

56754　**胡桃膏**

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【异名】还春膏(《普济方》卷四十九)。

【组成】新小胡桃三个

【用法】和皮捣细,用乳汁二盏,于银石器内文武火熬,竹篦搅成膏。每用先净洗髭发,再以笔蘸点髭发。

【功用】荣养髭发。

56755　**胡荽丹**

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】乌鸡一只(令净)　胡荽子适量

【用法】胡荽子入鸡缝之,煮熟食之。不效,再如法服食一只乌鸡。

【主治】反胃。

56756　**胡荽汤**

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】胡荽　车前子　木通(锉)　防己　瞿麦穗　犀角(镑)　黄连(去须)各等分

【用法】上为散。每服五钱匕,水一盏半,煎至八分,去滓,食后温服,一日三次。

【主治】小肠风热,小便黄赤,涩结不通。

56757　**胡荽饮**

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【异名】胡荽煎(《仙拈集》卷一)。

【组成】胡荽(五月五日采,预收阴干。春、夏采叶,秋、冬采根)半斤

【用法】以水七升,煮取一升半,去滓。每服

一盏，一日三次，不拘时候。

【主治】乳石热气结滞，经年数发。

56758 **胡荽饼**

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】胡饼 胡荽（净择作齑）

【用法】以胡饼裹胡荽食之。

【主治】肠风泻血。

56759 **胡荽酒**

【方源】《圣惠》卷八十四。

【异名】胡荽散（《普济方》卷四〇三）

【组成】胡荽三两

【用法】上细切。以酒二大盏，煎令沸，沃胡荽，便以物合定，不令气出，候冷去滓，微微从项以下喷背膂及两脚，胸腹令遍，勿喷于面。

【主治】小儿痘疹，欲令速出。

56760 **胡荽散**

《普济方》卷四〇三。为《圣惠》卷八十四“胡荽酒”之异名。见该条。

56761 **胡荽散**

【方源】《经验良方》。

【组成】胡荽子 小茴香各五钱 桂 肉豆蔻各二钱

【用法】上为末。每服二钱。

【主治】疝气腹胀，久泻。

56762 **胡荽煎**

《仙拈集》卷一。为《圣济总录》卷一八四“胡荽饮”之异名。见该条。

56763 **胡粉丸**

【方源】方出《千金》卷十八，名见《外台》卷七引《救急方》。

【组成】胡麻一升 胡粉一两

【用法】上为末。明旦空腹，以猪肉臛汁啖尽之。

【主治】蛔虫攻心腹痛。

【宜忌】《外台》引《救急方》：忌生冷、猪肉、鱼鸡、蒜酢滑等七日。

【备考】《外台》引《救急方》本方用生真胡麻一合，胡粉半合（熬捣）。先以猪肉脯一片，空腹啖，咽汁，勿咽肉，后取胡粉和胡麻搜作丸，以少清酒使成顿服尽，十岁以上斟酌增减。

56764 **胡粉丸**

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】胡粉半两（微炒） 黄连末一分（微炒） 青黛半两（细研） 麝香一钱

【用法】上为细末，以猪胆一个，取汁和丸，如黄米粒大。每服五丸，以粥饮下，不拘时候。

【主治】小儿内疳，下痢不止，昏沉多睡。

56765 **胡粉丸**

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】胡粉三分 豮猪胆三个 麝香一分 牛黄一分

【用法】上为末，用胆汁浸蒸饼和丸，如绿豆大。五岁儿每服七丸，以温水下。看儿大小以意加减。

【主治】小儿腹内有蛔虫，时时疞痛。

56766 **胡粉丸**

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】胡粉（研） 砒霜（研） 寒水石（煅研）各一两

【用法】上为细粉，滴水为丸，如鸡头大。发前新汲水吞下一丸。即大吐，至来日困睡为验。

【功用】吐痰。

【主治】一切疟疾及一切痰疾。

56767 **胡粉丸**

《圣济总录》卷七十六。为《局方》卷二“神效胡粉丸”之异名。见该条。

56768 **胡粉丸**

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】胡粉一钱 雄黄（研）一钱 雌黄（研）一钱

【用法】上研匀，用乌鸡子三个，取白调药，入净瓷盏内，于饭上炊，令硬软得所，丸如梧桐子大。每服三十丸至四十丸，温热水下。转下恶物为验。

【主治】风热气毒瘰疬。

56769 **胡粉丸**

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】胡粉(研)半两　鸡子一个

【用法】将鸡子打头上破如钱眼大，入定粉于鸡子壳内，以纸糊定，用水一升入铫子内，慢火煮熟，取出去壳。每服与梧桐子大哺之，一日三五度。

【主治】小儿疳痢，渴不止。

56770　**胡粉丸**

【方源】《普济方》卷一九七。

【组成】豉一分(研如膏)　黄丹半两　胡粉半两　砒霜一分

【用法】上为细末，以软饭并豉膏同丸，如梧桐子大。临发前以冷醋汤送下三丸。

【主治】一切疟。

【宜忌】忌食热物。

56771　**胡粉丹**

【方源】《普济方》卷三九九引《医方妙选》。

【组成】青州大枣五十两(蒸熟取肉)　水银半两　胡粉一两　雄黄半两(水磨飞研)

【用法】上拌匀，用枣肉和如黍米大。每服一粒，苦楝根煎汤下。

【主治】小儿蛲虫发动，甚者成痔瘘瘑疥。

56772　**胡粉丹**

【方源】《医统》卷六十六。

【组成】胡粉　密陀僧　白芷　白附子　白茯苓各等分

【用法】上为末。先用萝卜煎汤，洗面净后用羊乳调药，至夜敷患处，次早洗去。

【主治】男子、妇人面生黑斑点。

56773　**胡粉散**

【方源】方出《肘后方》卷五，名见《普济方》卷三〇一。

【组成】胡粉　黄柏　黄连各等分

【用法】上为末。粉之。

【主治】①《肘后方》：恶疮，似火自烂。②《普济方》：阴疮。

【备考】《普济方》本方用黄柏、黄连各三分，胡粉一合。上为末，调涂，一日三次；妇人绵裹枣核大，纳之。

56774　**胡粉散**

【方源】方出《外台》卷二十九引《肘后方》，名见《圣济总录》卷一四五。

【组成】胡粉

【用法】每服一钱匕，以水服之。

【主治】卒从高堕下，瘀血胀心，面青，短气欲死。

56775　**胡粉散**

【方源】《外台》卷二十四引《深师方》。

【异名】粉散(《鬼遗》卷四)、黄连散(《圣济总录》卷一二九)。

【组成】胡粉二分(熬)　黄连三分　甘草二分(炙)　茼茹二分

【用法】上为末，以粉敷疮上，一日三次。

【主治】瘰疽，浸淫多汁。

56776　**胡粉散**

【方源】方出《千金》卷二十五，名见《普济方》卷三〇七。

【组成】大蒜　胡粉

【用法】上捣和，敷之。

【主治】众蛇毒。

56777　**胡粉散**

【方源】方出《千金》卷二十五，名见《普济方》卷三〇八。

【组成】乌麻油　胡粉

【用法】上药合调如泥。涂于伤处，干则易之。

【主治】蜘蛛咬人。

56778　**胡粉散**

【方源】方出《医心方》卷二十五引《子母秘录》，名见《圣惠》卷九十二。

【组成】胡粉　雄黄各等分

【用法】著中。

【主治】①《医心方》引《子母秘录》：小儿谷道虫痒；②《圣惠》：小儿蛲虫蚀下部。

【备考】《圣惠》本方用法：上为细末。每用少许，敷于下部中。

56779　**胡粉散**

【方源】方出《圣惠》卷三十六，名见《普济

方》卷二九九。

【组成】胡粉一两　牛黄一两

【用法】上药相和，安于铫子中，于暖灰上研令匀。少少含之。

【主治】口疳疮。

56780　胡粉散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】胡粉一两　黄连一两（去须）　水银一两（与胡粉同研令星尽）　糯米二十粒　赤小豆十四粒

【用法】上为末，以麻油和诸药，并水银调令匀。薄薄涂之。

【主治】热毒恶疖，及诸疮肿。

56781　胡粉散

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】胡粉　黄连（去须）　蛇床子　白蔹各半两

【用法】上为末。面脂调涂，湿即干贴之。

【主治】干癣痒不止。

56782　胡粉散

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】胡粉三分　干姜一分（炮裂，锉）　生栗子二分（阴干，去壳）

【用法】上为末。用敷疮上。

【主治】金疮，内漏血。

56783　胡粉散

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】胡粉一分　黄连一两（去须）　糯米二十一粒　赤小豆十四粒　吴茱萸半分　水银一两（点少水入胡粉研令星尽）

【用法】上为末。即以麻油和诸药，调匀涂之。

【主治】小儿头上生恶疮，及疳疮，软疖。

56784　胡粉散

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】胡粉一分（炒令黄）　黄连半两（末）

【用法】上药细研令匀。敷于疮上。

【主治】小儿燕口生疮。

56785　胡粉散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】胡粉二钱　白龙骨（末）二钱　胡黄连（末）二钱

【用法】上药同炒，更研令细。每服半钱，以鸡子清调下，一日三四服。

【主治】小儿无辜疳痢，鼻中干塞，眼内有白晕，黄昏不见物，体热心烦，口干，头上生疮。

56786　胡粉散

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】胡粉半两　麝香（研）半钱

【用法】上为细散。归卧净揩牙，漱口讫，干贴。

【功用】止血牢牙。

【主治】牙宣出血不止。

56787　胡粉散

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】胡粉　龙骨粉各一钱匕

【用法】上药并炒令黄。每用半钱匕，空心以鸡子清调服，一日二次。

【主治】小儿诸疳，无辜鼻中出清水，眼上有白晕，或患痢体热，口干生疮，脚肿眼涩，腹中有虫，喜饮冷水。

56788　胡粉散

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】胡粉（研）一分　枣七个（大者，去核，入胡粉在内）

【用法】上药煅赤，取出候冷，细研为散。每服半钱匕，米饮调下，空心、午后各一次。

【主治】小儿久痢，无问冷热疳痢。

56789　胡粉散

【方源】方出《幼幼新书》卷五引张涣方，名见《卫生总微》卷一。

【组成】胡粉（细研）　干姜（烧灰，细研）　白石脂（烧存性，细研）各一钱

【用法】上同再研。每用一字或半钱，敷脐中，时时用。

【主治】婴儿脐疮肿湿，经久不愈，若至百

日即危急。

56790　**胡粉散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】龙骨　胡粉(炒黄色)　白矾(飞过)　黄连(去须)各等分

【用法】上为细末。每服半钱,乳食前温米饮调下。

【主治】小儿下痢,日夜频并。

56791　**胡粉散**

《儒门事亲》卷十三。为《千金》卷二十一(注文)引《古今录验》"铅丹散"之异名。见该条。

56792　**胡粉散**

【方源】《济生》卷八。

【组成】胡粉一分　砒半分　硫黄(别研)一分　斑蝥一个　麝香少许　蝎梢七个　雄黄(别研)一分　大草乌一个(生用)

【用法】上为细末。先用羊蹄根蘸醋擦动,次用药少许擦患处。

【主治】一切癣。

56793　**胡粉散**

【方源】《直指》卷二十四。

【组成】胡粉(炒微黄)　白矾(煅)　铣丹(煅)　黄连(净)　轻粉各二钱　胭脂一钱　麝香少许

【用法】上为末。先以温浆水入盐洗拭后掺药;如疮干,麻油调敷。

【主治】月蚀疮。

56794　**胡粉散**

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】杭粉一两　轻粉　石膏(煅)　蛤粉各三钱

【用法】上为极细末。将泡挑破,揩干掺之;或用丝瓜叶捣汁调搽亦好;如冬月无此,用染布青缸汁调搽。

【主治】天泡红肿发热,急胀疼痛。

56795　**胡粉散**

【方源】《济阳纲目》卷一〇五。

【组成】松脂　大黄　白敛　赤小豆　胡粉各等分

【用法】上为末。以鸡子清调敷。

【主治】唇生肿核。

56796　**胡粉散**

【方源】《金鉴》卷五十。

【组成】胡粉　甑带灰　干姜　白石脂　棉灰各等分　麝香少许

【用法】上为细末。每用一钱,于婴儿断脐后,敷脐带间,用软绢新棉封裹之。

【功用】避尿湿,风邪。

56797　**胡粉膏**

《医心方》卷十七引《极要方》。为方出《肘后方》卷五,名见《鬼遗》卷五"水银膏"之异名。见该条。

56798　**胡粉膏**

【方源】方出《外台》卷三十引《肘后方》,名见《普济方》卷二八一。

【组成】水银　胡粉

【用法】研令匀。涂之。

【主治】①《外台》引《肘后方》:燥癣。②《普济方》:一切干湿癣,瘙痒。

【备考】《普济方》本方用:胡粉二两,水银一分。合研令匀,以醋调成膏。涂之,仍以纸贴,一日三五次。

56799　**胡粉膏**

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】胡粉三分　黄连三分(去须)　甘草一钱(炙微赤,锉)　麝香一钱(细研)

【用法】上为末,用腊月猪脂,调令得所。每以少许,涂于疮上。

【主治】紧唇疮,疼痛不可忍。

56800　**胡粉膏**

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】胡粉四两　油半斤　蜡二两半　乳香半两(细研)　麝香一钱(细研)　没药半两(细研)

【用法】上以文火煎令油熟,下胡粉,后下蜡,临成下麝香、乳香、没药,搅勿住手,待似星花上来,即住,以瓷器内盛。于故帛上涂贴,一日换二次。

【主治】一切痈疽发背，日夜发歇，疼痛不止。

56801 **胡粉膏**

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】胡粉（炒） 白矾（烧令汁尽）各等分

【用法】上为末，用青羊脂和成膏。以少许涂敷瘜肉上。

【主治】鼻中瘜肉不通。

56802 **胡粉膏**

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】胡粉（炒研）

【用法】上以牛酥调如膏。每含如杏仁大，咽津。

【主治】口疮。

56803 **胡粉膏**

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】胡粉（研）三两 水银二两 皂荚十挺（捶，以水浸，接滤，取浓汁）一升

【用法】上先熬皂荚汁至五合，下粉、水银，以柳篦搅令匀，瓷盒内盛。先以盐水洗疮，取涂磨疮上，一日三五次。

【主治】瘑疥疮有虫。

56804 **胡粉膏**

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【组成】胡粉 炭灰各半两

【用法】上以猪膏，量药调和。涂疮孔上，出水便瘥。

【主治】金疮中风寒水，肿。

56805 **胡粉膏**

【方源】《卫生总微》卷十八。

【组成】松脂 苦参 黄连（去须）各一两半 大黄（生） 胡粉各一两 黄芩 水银各一两一分 白矾半两 蛇床子三分

【用法】上为细末，以腊月猪脂和研至不见水银星为度。敷之。

【主治】小儿头疮久不愈，经隔年岁。

56806 **胡麻丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇一。

【组成】胡麻仁（炒） 杏仁（去皮尖双仁，炒研）各三两 黑豆黄二两 桂（去粗皮）一两 生地黄（捣绞取汁）一升

【用法】上药先将地黄汁，入银锅中煎三两沸，次入杏仁膏，余药并为末，投入同煎令稠，丸如梧桐子大。每服十丸，早食后温酒下，临卧再服。

【主治】髭发白。

56807 **胡麻丸**

【方源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】胡麻半斤（拣去土，研碎）

【用法】上以米醋三升，瓷器中煮尽醋后，入茯苓、人参、云母粉各一两，同丸如梧桐子大。每服二十丸，甘泉水下，不拘时候。

【功用】延年返老，补填骨髓，保固三田。

56808 **胡麻丸**

【方源】《卫生总微》卷十九。

【组成】胡麻四两（炒香） 羊踯躅一两（焙）

【用法】上为末，炼蜜和丸，如麻子大。每服七丸，渐加至二十一丸，热水送下，一日二次，见效为度。已破者，更用黑母牛粪，烧灰研末敷之。

【主治】小儿瘰疬。

56809 **胡麻丸**

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】天麻 升麻 白附子（炮） 人参 细辛 川芎 木贼 定风草 穿山甲（去土，炒黄色） 丹参 玄参 何首乌（酒浸） 紫参 蔓荆子 防风 威灵仙各一两 全蜈蚣一对

【用法】上为细末。每用二两，用胡麻一斤，炒香为末，拌匀，入蜜和丸，都分为九十丸。每服一丸，细嚼，温浆水下，日进三服，不拘时候。淡白粥服一百二十日，不再发。

【主治】大风。

56810 **胡麻丸**

【方源】《幼科发挥》卷上。

【组成】胡麻仁（炒） 苦参 甘菊花 大

力子(炒)　石菖蒲　何首乌　威灵仙　蔓荆子　乌梢蛇(酒浸,去皮骨,取肉焙干)各等分

【用法】上为末,酒为丸,如麻子大。竹叶汤下。

【主治】小儿疥癣。

56811　**胡麻丸**

【方源】《解围元薮》卷三。

【组成】胡麻一斤　苦参五斤(酒浸七日)　荆芥穗四斤　稀莶草叶(净)三斤　苍耳草叶(净)三斤　紫背浮萍二斤

【用法】上药蒸透晒干,先将稀、苍二味蜜拌蒸一伏时,晒干后共为末,酒糊为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每服百丸,茶、酒俱可下,日进三次。

【主治】大风、大疠、中风。

56812　**胡麻丸**

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】苦参五钱　何首乌　胡麻仁(炒)　蔓荆子(炒)　威灵仙　荆芥穗　白蒺藜(炒,去刺)　牛蒡子(炒)各三钱　石菖蒲一钱五分　干菊花三钱

【用法】上为末,酒糊为丸,如粟米大。竹叶灯心汤送下。

【主治】小儿风疮疥癣。

56813　**胡麻丸**

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】大胡麻四两　防风　威灵仙　石菖蒲　苦参各二两　白附子　独活各一两　甘草五钱

【用法】上为细末,新安酒浆跌成丸子。每服二钱,形瘦者一钱五分,食后、临卧,白滚汤送下。

【主治】①《外科正宗》:癜风初起皮肤作痒,后发癜风,渐至开大者,②《麻科活人》:风热瘾疹,及疹后搔痒生疮,日久不愈。

【宜忌】忌动风发物、海腥、煎炒、鸡、鹅、羊肉、火酒等件,愈后戒百日。

56814　**胡麻汤**

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】胡麻三两　熟干地黄二两　人参一两(去芦头)　甘草一分(炙微赤,锉)　麦门冬二两(去心,焙)　藁本三分

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至五分,去滓,食前温服。

【主治】虚劳绝伤羸极,气少不足,四肢消瘦。

56815　**胡麻饭**

【方源】《解围元薮》卷四。

【组成】大枣二十一个(去核)

【用法】每个枣内填满宫粉,每日以三个和米半升,煮饭食之。七日枣完疮愈。

【主治】疠疮初起。

56816　**胡麻饮**

【方源】《普济方》卷二〇六。

【组成】人参　胡麻仁　橘皮　枇杷叶各等分

【用法】上罗匀,以水一斗煮枇杷叶,取五升,下药煮取三升,纳麻仁,稍饮之。

【主治】呕哕。

56817　**胡麻饮**

【方源】《解围元薮》卷四。

【组成】金银花　赤茯苓　明天麻　胡麻各一两　防风　荆芥　羌活　独活　僵蚕　连翘　五加皮　地骨皮　当归　黄芩　黄连　杜仲　牛膝　黑牵牛　苡仁　角刺各五钱　土茯苓一两

【主治】疠疮初起。

56818　**胡麻油**

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【异名】胡麻油膏(《普济方》卷五十三)。

【组成】胡麻油一合　木香(醋浸一宿,焙,杵末)半两

【用法】上药于银器内微火煎三五沸,绵滤去滓。旋滴耳中。以愈为度。

【主治】耳聋。

56819　**胡麻散**

【方源】《医心方》卷六引《古今录验》。

【组成】胡麻(熬令香)

【用法】于臼内捣碎，即以纱罗筛之数，筛之若不数，筛即脂出。每服一小升，一日一次。服尽药一斗三升，永无腰脚之疼。多服即减食。

【功用】辟谷不饥。

【主治】腰脚疼，不可忍，不能立。

56820 胡麻散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】胡麻 桂心 甘草（炙微赤，锉） 人参（去芦头） 泽泻 黄耆（锉） 白茯苓各一两 五味子 麦门冬（去心，焙） 地骨皮 天门冬（去心）各半两 熟干地黄二两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入薤白两茎，生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳不足，咳逆上气，不欲饮食，四肢乏力。

56821 胡麻散

【方源】《普济方》卷五十引《博济》。

【组成】胡麻子三两（轻爁） 何首乌三两 蔓荆子一两 威灵仙一两 九节菖蒲一两 苦参一两 荆芥穗 菊花 沙苑白蒺藜 鼠粘子（炒）各一两

【用法】上药洗净控干。如治大风，每服一钱，薄荷茶、酒任下，日五七服，不拘时候。如才觉便服，半月见效；如已患年岁，须服一月，方始见功，及五十日可减一半，服及百日其须发自生；如治皮肤风疾，瘙痒疥癣之类，即入下四味，与前六味为末，以薄荷自然汁和酒调下一钱；若肾脏风攻注，亦宜服之。如吃此药至三五日，须频暖浴，贵其汗出也。

【主治】五癞，头面遍身生赤黑，麻木，鼻内闻腥秽，须发退落。

56822 胡麻散

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】胡麻（炒令香熟） 枳壳（去瓤，麸炒）各二两 防风（去叉） 蔓荆实 威灵仙（去土） 苦参 何首乌（米泔浸透，去黑皮，切，麸炒干） 芎藭 荆芥穗 甘草（炙）各一两 薄荷（用叶）半两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下；或炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，温酒下亦得。

【主治】脾肺风毒攻注，皮肤瘙痒，手足生疮，及遍身瘖瘰，发赤黑靥，肌热疼痛。

56823 胡麻散

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】胡麻一斤（去浮者，一半煮熟，一半生用） 天麻 乳香（研） 何首乌 苍耳 松花 角蒿 款冬花 克颇草 菖蒲 人参 苦参 玄参 沙参 丹参 威灵仙（去土）各二两 甘菊花三两 蔓荆实 紫参二两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下。如病深，渐加至三钱匕，服之旬余，若觉遍身疼痛是效。

【主治】恶风。

56824 胡麻散

【方源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】胡麻子 白茯苓（去黑皮） 生干地黄（焙） 天门冬（去心，焙）各八两

【用法】上为细散。每服方寸匕，食后温水调下。

【功用】益寿延年，去客热。

56825 胡麻散

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】苦胡麻半升 天麻二两 乳香三分

【用法】上为细末。每服三钱，荆芥腊茶下。

【主治】癞病。

【宜忌】忌盐酒房事一百二十天。

56826 胡麻散

【方源】《扁鹊心书》。

【组成】紫背浮萍（七月半采）一斤 黑芝麻（炒）四两 薄荷（苏州者佳）二两 牛蒡子（炒） 甘草（炒）各一两

【用法】上为末。每服三钱，茶、酒任下，一日三服。

【主治】疠风，浑身顽麻，或如针刺，遍身疼

痛,手足瘫痪。

56827　胡麻散

【方源】《直指》卷二十四。

【组成】胡麻子十二两　苦参　荆芥穗　何首乌各八两　威灵仙　防风　石菖蒲　牛蒡子(炒)　菊花　蔓荆子　蒺藜(炒去刺)　甘草(炙)各六两

【用法】上为末。每服二钱,食后薄荷汤点服;或好茶清亦得。

【主治】①《直指》:风气挟热,瘾疹瘙痒,②《疮疡经验全书》:大麻风。

56828　胡麻散

【方源】《局方》卷一(续添诸局经验秘方)。

【组成】胡麻十二两　苦参　荆芥各八两　甘草(炙)　威灵仙各六两　何首乌(洗,焙)十两

【用法】上为细末。每服二钱,食后薄荷茶点服;或酒调、或蜜汤点亦得。服此药后,频频洗浴,贵得汗出。

【主治】脾肺风毒攻冲,遍身皮肤瘙痒,或生疮疥,或生瘾疹,用手搔时,浸淫成疮,久而不瘥,愈而复作;面上游风,或如虫行,紫癜白癜,顽麻等风;或肾脏风,攻注脚膝生疮。

56829　胡麻散

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】胡麻子(赤色扁者佳,另研)五两　白芷二两　何首乌二两　防风二两　蔓荆子一两五钱　甘菊花一两　升麻二两　威灵仙二两　苦参(酒炒)三两　川当归二两　川芎二两(酒炒)　牛蒡子二两(微炒,另研)　白蒺藜三两　荆芥穗二两　薄荷叶二两　片黄芩二两　白芍(酒炒)二两　黄连(酒炮一日炒)二两

【用法】上为细末。每服三钱,食远服。秋分后至春分,白酒调服;春分后至秋分,清茶调服。或用米糊细为丸,食远白汤下亦可。

【主治】紫白癜风并癣,及面上酒渣,又名粉渣面刺。

56830　胡麻散

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】薄荷叶　胡麻子各一两　甘菊花五钱　白蒺藜　威灵仙　苦参　白芷　荆芥穗　川芎　防风　黄芩　牛蒡子各一两

【用法】上研极细末。每服二钱,温酒送下。

【功用】消风止痒,清血解毒。

【主治】风热瘾疹,皮肤作痒,日轻夜重,见风尤甚,心烦腹痛,苦楚不堪。

【宜忌】忌食鱼、肉、糖、葱、蒜。

56831　胡麻粥

【方源】《普济方》卷二一八。

【组成】胡麻(其实六棱者)　巨胜(其实八棱者)各等分

【用法】上药蒸晒各九遍。每服取二合,用汤浸,布裹挼去皮,再研,水滤取汁煎饮,和粳米煮粥食之。

【功用】益气力,坚筋骨。

【主治】五脏虚损羸瘦。

【加减】虚而吸吸者,加胡麻用。

56832　胡麻粥

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】乌油麻不以多少(去皮蒸一炊,晒干,再微炒香熟)　白杭米一升　胡麻半升

【用法】如常煮粥法,临熟加蜜糖空心食之。

【功用】壮颜色,润肌肤,润肺止嗽。

56833　胡麻膏

【方源】《圣惠》卷四十一。

【组成】胡麻油一升　腊月猪脂一升　乌鸡脂一合　丁香一两半　甘松香一两半　零陵香三两　芎䓖二两　竹叶二两　细辛二两　川椒二两(去目)　苜宿香三两　白芷一两　泽兰一两　大麻仁一两　桑根白皮一两　辛夷一两　桑寄生一两　牡荆子一两　防风三两(去芦头)　杏仁三两(汤浸,去皮尖双仁)　莽草一两　柏叶三两

【用法】上细锉,米醋浸一宿,滤出,纳入油、猪脂、鸡脂中,以慢火煎,候白芷色焦黄,膏成,绵滤去滓,以瓷盒盛。净洗头,涂之,一

日二次。三十日发生。

【功用】长发，令速生及黑润。

56834 胡麻膏

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】胡麻膏一汁 韭头一斤

【用法】上药相和，慢火煎令韭焦黄，去韭。每日二合，温酒调下。服之百日，去皯黯，皮肤充盈。

【功用】益寿延年，老人复少。

56835 胡麻膏

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】胡麻膏一斗 熏陆香二斤（以水五斗洗，取屑入膏中同煎）

【用法】上药相和，以慢火煎令水尽，滤去滓，盛于不津器中。每日服二合，温酒调下。

【功用】延年。

56836 胡椒丸

【方源】《外台》卷十引《古今录验》。

【组成】胡椒 荜茇 干姜各三两 白术二两 桂心 高良姜 人参 款冬花 紫菀 甘草（炙）各二两

【用法】上为细末，蜜和为丸，如梧子大。每服五丸，一日二服。不知，增之，以知为度。

【主治】咳嗽上气，胸满，时复呕沫。

【宜忌】忌生冷、醋、滑、猪、鱼、肉、蒜、桃李、雀肉、生葱、海藻、菘菜。

56837 胡椒丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】胡椒三分 木香三分 沉香三分 桂心三分 蝉螂二分（微炒） 阿魏一分（面裹煨，面熟为度）

【用法】上为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸，以热生姜酒下，不拘时候。

【主治】肾气冷气卒攻，脐腹撮痛不可忍。

56838 胡椒丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】胡椒末一钱 蟾酥一字（浸过）

【用法】上药同研令相得，丸如麻子大。以绵裹于痛处咬之。有涎即吐却。

【主治】牙痛。

56839 胡椒丸

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】胡椒一两 荜茇一两 干姜三分（炮裂，锉） 白术一两 桂心三分 诃黎勒皮三分 人参三分（去芦头） 款冬花半两 紫菀一两（洗，去苗土） 甘草一两（炙微赤，锉） 赤茯苓一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为末，炼蜜和捣三二百杵，丸如梧桐子大。每服三十丸，以姜橘汤下，一日三四服。

【主治】久上气，心腹虚冷，胸满不食，时复呕沫。

56840 胡椒丸

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】胡椒一两 桂心三分 芎䓖三分 当归三分（锉，微炒） 高良姜一两（锉） 附子一两（炮裂，去皮脐） 木香半两 白术三分 草豆蔻一两（去皮）

【用法】上为末，炼蜜和捣三五百杵，丸如梧桐子大。每服三十丸，以热酒送下，不拘时候。

【主治】妇人脾胃久冷，心腹虚胀，面无颜色，四肢羸瘦，不思饮食。

56841 胡椒丸

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【异名】干姜丸（《鸡峰》卷十二）

【组成】胡椒一两 乌头（炮裂，去皮脐） 干姜（炮） 赤石脂各半两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，空心、食前米饮送下。

【主治】脾胃虚冷，大肠滑泄，饮食不化。

56842 胡椒丸

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】胡椒 高良姜 乌头（炮裂，去皮脐）各一两

【用法】上为细末。米醋三盏，熬令硬软得所，丸如皂子大。每服一丸，盐汤嚼下；妇人醋

汤下。

【主治】心痛,精神闷乱。

56843　**胡椒丸**

【方源】《圣济总录》卷一七四。

【组成】胡椒四十九粒　槟榔一枚(锉)　斑蝥七枚(去翅足)

【用法】上为细末,烧粟米饭为丸,如黄米大。一二岁儿每服三丸,三岁以上五丸,煎菖蒲汤下。

【主治】小儿心痛。

56844　**胡椒丸**

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】胡椒　蝎梢(炒)　甘遂(炒)各等分

【用法】上为末,用烧饭为丸,如黍米大。每服二丸,乳食前陈米饮送下。

【主治】小儿腹胀。

56845　**胡椒丸**

【方源】《普济方》卷三十六引《十便良方》。

【组成】胡椒三十颗　麝香一钱(细研)

【用法】上捣破胡椒,入麝香,用酒一中盏,煎至半盏,稍热服。

【主治】寒气攻胃。

56846　**胡椒丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】胡椒五十粒　斑蝥二十一个(去头足翅)　川楝子十个(炮,去核)　淡豆一百个　茴香(淘去沙,炒)半两　香附子(去毛)一两

【用法】上药将斑蝥同炒讫,去斑蝥为末,米醋丸,如绿豆大。每服十五丸,热酒送下。

【主治】偏坠。

56847　**胡椒丸**

【方源】《普济方》卷二〇六引《澹寮方》。

【异名】半夏丸。

【组成】胡椒二十一粒　丁香十四粒　半夏七粒(汤浸去滑)

【用法】上为细末,生姜自然汁为丸,如鸡头子大。每用一丸,以干枣一枚,擘破去核,入药在内,以湿纸裹煨熟,放温,以米汤烂嚼下。

【主治】呕吐。

56848　**胡椒丸**

【方源】《普济方》卷二十引《医方大成》。

【异名】浮椒丸(《得效》卷四)。

【组成】陈茱萸二两　胡椒　蚌粉(炒赤色)各一两

【用法】上为末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,用温酒或盐汤下,遇发时服。甚者不过二三服即效。

【主治】脾疼不可忍,及冷气痛。

56849　**胡椒丸**

【方源】《普济方》卷一九一引《海上名方》。

【组成】巴豆十枚(去皮膜心,用竹纸数重,出油尽为度,频换纸)　胡椒二百粒(生用)

【用法】上为末,醋糊为丸,如绿豆大。每日一丸,淡姜汤下,食后服,实者日二服,虚者一服。如小便频数为效,服一两月大效。

【主治】十种水气,脚肿胀,上气喘满。

【宜忌】忌面食咸物,大忌湿面。

56850　**胡椒丸**

【方源】《普济方》卷二〇三。

【组成】胡椒末一两　木瓜汁一升　硇砂(研极细)一钱

【用法】上将木瓜汁,浸椒、砂二末,搅匀,微火熬令稠和,丸如梧桐子大。每服十丸,藿香汤送下。

【主治】霍乱转筋,诸药不除。

56851　**胡椒丸**

【方源】《济阳纲目》卷一〇一。

【组成】胡椒

【用法】上为末,黄蜡熔化为丸,如绿豆大。每服五七丸,食后茶清送下。

【主治】老人冷泪不止。

56852　**胡椒汤**

【方源】方出《圣惠》卷四十七,名见《普济方》卷二〇二。

【组成】鸡屎白半合(微炒)　胡椒三十粒　高良姜半两(锉)　桂心半两　木瓜一两(干

者） 麦门冬一两（去心，焙）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】霍乱烦闷欲死。

【备考】《医统》有陈皮，无鸡屎白。

56853 胡椒汤

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】胡椒 吴茱萸（汤浸净，炒） 肉豆蔻（去壳）各半两 人参 桂（去粗皮） 干姜（炮）半两

【用法】上为末。每服五钱，以水一盏半，煎至八分，去滓温服。

【主治】霍乱转筋。

56854 胡椒汤

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】胡椒三七粒 木香二钱 糯米一合

【用法】上同炒，以米熟为度，粗捣筛，分作三服。每服水一盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】胃气逆，干呕烦闷。

56855 胡椒汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】胡椒一分 干姜半两（炮） 诃黎勒皮一两（炒） 甘草三分（炙）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】产后霍乱，吐利不止，腹痛。

56856 胡椒汤

【方源】《三因》卷十一。

【异名】豆椒散（《普济方》卷二〇一）、胡椒散（《医统》卷八十二）。

【组成】胡椒七粒 绿豆三七粒

【用法】上为末。煎木瓜汤调下。

【主治】霍乱吐利。

56857 胡椒汤

【方源】《局方》卷十（宝庆新增方）。

【组成】红豆 肉桂（不见火）各一两 胡椒六两 干姜（焙）三两 桔梗（焙）三十两 甘草（炒）七两

【用法】上为细末。每服一大钱，入盐少许，沸汤点服，不拘时候。

【功用】温暖脾胃，去寒顺气。

【主治】脾胃受寒，胸膈不利，心腹疼痛，呕逆恶心。

56858 胡椒饼

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】胡椒

【用法】上药研末，以饭捣烂，入胡椒末，和一处，贴伤处。不过一二饼，即出。

【主治】箭头及竹木刺入肉，不得出者。

56859 胡椒散

《医统》卷八十二。为《三因》卷十一“胡椒汤”之异名。见该条。

56860 胡蜂酒

【方源】《中国药典》一部。

【组成】胡蜂（鲜者）100克 白酒1000毫升

【用法】胡蜂入酒浸泡15天，滤过。每服15～25毫升，一日二次。

【功用】祛风除湿。

【主治】急性风湿病，风湿性关节炎。

【备考】服后偶有皮肤瘙痒，次日可自行消失。

56861 胡芦巴丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】胡芦巴一两 茴香子一两 木香半两 桂心半两 当归半两（锉，微炒） 附子一两（炮裂，去皮脐） 阿魏半两（研入） 硫黄一两（细研） 青橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 沉香半两 白豆蔻半两（去壳） 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，别研如膏）

【用法】上为细末，入研了药令匀，好酒一升半，先熬桃仁膏令稠，拌和诸药末，捣三二百杵，丸如梧桐子大。每服二十丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】肾脏气虚，下焦积冷，气攻腹胁胀满，脐下疼痛，面色青黑，足胫多冷。

56862 胡芦巴丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】胡芦巴一两(微炒)　沉香一两　桂心一两　硫黄一两(细研,水飞过)　附子一两(炮裂,去皮脐)　茴香子一两　槟榔一两　青橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙)　鹿茸一两(涂酥,微炙)　干姜半两(炮裂,锉)　补骨脂一两(微炒)　木香一两

【用法】上为末,入硫黄研令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心以温酒下。

【功用】补暖下元,祛逐冷气。

【主治】诸虚。

56863　胡芦巴丸

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】胡芦巴(微炒)　巴戟天(紫者,去心,炒)　肉苁蓉(酒浸,切,焙)各二两　楝实(去皮,醋浸一宿,焙)　桂(去粗皮)　补骨脂(炒)　蛇床子(酒浸一宿,焙)　牛膝(酒浸一宿,切,焙)各一两　蓬莪术(醋浸一宿,煨,锉)三分　附子(炮裂,去皮脐)　茴香子(炒)各一两半

【用法】上为末,炼蜜为丸,如小豆大。常服二十丸,空心炒盐生姜汤送下;酒下亦得。

【主治】肾气虚损,阳气痿弱。

56864　胡芦巴丸

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】胡芦巴(炒)　山芋　泽泻各一两　吴茱萸(汤洗,焙干)　干姜(炮)　牡蛎粉　当归(切,焙)　附子(炮裂,去皮脐)各半两

【用法】上为末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心、食前温酒送下。

【主治】肾脏虚,冷气上攻,心腹疼痛,冷汗出,四肢少力,面色黧黑。

56865　胡芦巴丸

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】胡芦巴二两　附子(炮裂,去皮脐)　硫黄(研)各三分

【用法】上为末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸至三十丸,盐汤送下。

【主治】肾脏虚冷,腹胁胀满。

56866　胡芦巴丸

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】胡芦巴　补骨脂各一钱　木香　茴香子(炒)各一分　楝实(炒)半两　硇砂(研)一钱　铜绿(研)一钱　五灵脂(研)　腻粉(研)各一分　巴豆三钱(去皮心膜,不出油,研)　草乌头半两(用麸和巴豆同炒黑色)

【用法】上为末,用姜葱汁和丸,如豌豆大。每服三五丸,空心炒盐酒送下。

【主治】寒癖留滞不消。

56867　胡芦巴丸

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】胡芦巴　补骨脂(炒)　肉苁蓉(酒浸,微炒)　巴戟天(去心)　附子(炮裂,去皮脐)　白豆蔻(去皮)　荜茇　茴香子(炒)　丁香　木香　硫黄(别研)　沉香(锉)　蓬莪术(煨)　桂(去粗皮)　当归(切,炒)　桃仁(去皮尖双仁,麸炒,别研)　阿魏(面和作饼子,炙黄)各一两　肉豆蔻(去壳)　槟榔(锉)各六个

【用法】上为末,用清米醋煮面糊为丸,如梧桐子大。每服十五丸,渐加至二十丸,空心、食前盐汤送下;小肠气,炒生姜酒送下;妇人心痛,醋汤送下。

【主治】脾劳,大便不调,呕逆腹胀,羸瘦少力,饮食无味,面色萎黄。

56868　胡芦巴丸

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】胡芦巴　补骨脂(炒)　白豆蔻(去皮)　萆薢　青橘皮(去白,焙)　茴香子(炒)　附子(炮裂,去皮脐)　肉苁蓉(酒浸,切,焙)　牛膝(酒浸,切,焙)　桂(去粗皮)　防风(去叉)　菟丝子(酒浸,捣)各一两

【用法】上为细末,酒煮面糊为丸,如绿豆大。每服二十丸,空心生姜盐汤送下。

【主治】阴疝,气攻疼痛。

56869　胡芦巴丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】胡芦巴半两　茴香子(炒香)三两

王瓜 巴戟天各一两 苍术（麸炒黄，刮去皮）三两

【用法】先将王瓜、苍术二味同捣令匀，焙干后与诸药为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前温酒或盐汤送下。

【功效】壮阳益气，暖元脏，补虚乏，轻腰膝，止腹痛。

56870 胡芦巴丸

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】胡芦巴 巴戟天（去心） 天麻 桂（去粗皮） 附子（炮裂，去皮脐） 硇砂（研） 茴香子（炒） 楮实（炮，去核） 没药（研） 天雄（炮裂，去皮脐） 陈橘皮（去白，切，焙） 益智（炒） 京三棱（炮）各一两 木香半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、日午、临卧温酒送下。

【功用】补益。

【主治】诸虚。

56871 胡芦巴丸

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】胡芦巴（浸一宿）四两 破故纸四两（炒香）

【用法】上为细末，用大木瓜一个，切顶去瓤，填药在内，满为度，复用顶盖之，用竹签签定，蒸熟取出，烂研，同前末填尽药末搜和为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温酒送下。

【主治】一切寒温脚气，腿膝疼痛，行步无力。

56872 胡芦巴丸

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】胡芦巴 破故纸（炒） 川楝子（去核，炒） 茴香（炒） 川椒（取红） 青盐（别研） 山药 青橘皮（去白） 陈橘皮（去白） 附子（炮，去皮脐）各等分

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温酒送下。

【主治】下焦阳惫，脐腹冷痛，小便白浊，肌肤消瘦，饮食减少，及膀胱疝气。

56873 胡芦巴丸

【方源】《直指》卷十八。

【组成】胡芦巴（炒） 川楝子（蒸，去皮核，焙）各四两 川乌（炮，去皮脐） 大巴戟（去心）各一两半 茴香（炒）三两 吴茱萸（半酒半醋浸一宿，焙干）二两半 牵牛（炒，取末）二两

【用法】上为末，酒面稀糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下。

【主治】肾经虚冷，膀胱气痛，或阴肿偏坠，或小腹有物如卵，上下走痛。

56874 胡芦巴丸

【方源】《局方》卷八（续添诸局经验秘方）。

【组成】胡芦巴（炒）一斤 吴茱萸（汤洗十次，炒）十两 川楝子（炒）一斤二两 大巴戟（去心，炒） 川乌（炮，去皮脐）各六两 茴香（淘去土，炒）十二两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心用温酒吞下；小儿五丸，茴香汤下。

【主治】大人、小儿小肠气，蟠肠气，奔豚气，疝气，偏坠阴肿，小腹有形如卵，上下来去，痛不可忍，或绞结绕脐攻刺，呕恶闷乱。

56875 胡芦巴丸

【方源】《普济方》卷二一七引《瑞竹堂方》。

【组成】附子（炮，去皮脐） 川乌（炮，去黑皮） 沉香 酸枣仁 当归（去芦） 川芎 柏子仁（去壳） 胡芦巴 巴戟 破故纸（微炒） 龙骨 牡蛎（煨） 天雄（炮） 赤石脂 鹿茸（酥炙） 茴香各二两 泽泻半两 生硫黄一两半（用明者佳）

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心盐汤米饮下，日一二次。

【功用】关锁精气，升降阴阳。

【主治】虚损。

56876 胡芦巴丸

【方源】方出《丹溪心法》卷四，名见《济阳纲目》卷七十六。

【组成】茴香　破故纸　吴茱萸(盐炒)各五钱　胡芦巴七钱　木香二钱半

【用法】上为末,萝卜捣汁为丸。盐汤送下。

【主治】肾气疝。

56877　**胡芦巴丸**

【方源】《普济方》卷二四七引《鲍氏方》。

【组成】胡芦巴一斤　大巴戟六两

【用法】上同炒为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服十五丸,空心酒盐汤送下。

【主治】大人、小儿小肠气、盘肠气,偏坠阴肿,小肠有形如卵,上下痛不可忍,或绞结绕脐,呕吐闷乱。

56878　**胡芦巴丸**

《普济方》卷二二二。为原书同卷引《博济》"补骨脂丸"之异名。见该条。

56879　**胡芦巴丸**

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】胡芦巴一两六钱　茴香一两二钱　巴戟各六钱　吴茱萸一两　川楝子肉一两八钱

【用法】上为末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,温酒空心送下。

【主治】疝气疼痛。

56880　**胡芦巴汤**

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】胡芦巴(炒)　川芎　木香　京三棱(煨)　白术　官桂(去皮)　白蒺藜(微炒)　当归　益智　陈橘皮(去白)各一两　沉香　附子(炮,去皮脐)　舶上茴香(微炒)各一两半　干姜半两(炮)　甘草三分(炙令黄)　苦楝子三两(取肉,不用核)

【用法】上为细末。每服二钱匕,煎沸汤点服,不拘时候。

【主治】元气虚损,腹胁雷鸣,中脘胀满或发冷痛。

56881　**胡芦巴汤**

【方源】《普济方》卷四十三。

【组成】胡芦巴　沉香　芎䓖　陈橘皮(汤浸,去白,焙)　茴香子(轻炒)　人参　白茯苓(去黑皮)各半两　附子(炮裂,去皮脐)一两　木香　益智(去皮)　桂(去粗皮)　干姜(炮)　甘草(炙)各一两　白术三分

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,以水一盏,入生姜三片,大枣三个(擘),同煎七分,去滓,空心温服,一日二次。

【功用】平补三焦。

【主治】三焦俱虚。

56882　**胡芦巴饮**

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】胡芦巴　白茯苓(去黑皮)　舶上茴香各一两　肉豆蔻(去壳)　木香　附子(炮裂,去皮脐)各半两　沉香三分

【用法】上㕮咀,如麻豆大。每服三钱匕,水一盏,盐一捻,煎至七分,去滓,空心、食前温服。

【主治】肾脏气冷,腹痛呕逆,腹胁胀满,四肢少力,不思饮食。

56883　**胡芦巴散**

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】胡芦巴一两　丁香一两　舶上茴香一两　沉香三分　肉豆蔻半两(去皮)

【用法】上为散。每服二钱,水一中盏,入盐一捻,煎至六分,和滓,空心、食前热服。

【主治】肾脏气冷,呕逆腹胀,四肢少力,不思饮食。

56884　**胡芦巴散**

【方源】《苏沈良方》卷七。

【组成】胡芦巴(微炒)　三棱(锉,醋浸一宿,炒干)各一两　干姜一分(炮)

【用法】上为末。每服二钱,温生姜汤或酒调下。

【主治】气攻,头痛如破者。

【临证举例】头痛　姻家有病疟,愈后头痛,号呼十余日,百方不效,用一服如失。

56885　**胡芦巴散**

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】胡芦巴　补骨脂(炒)各二两　荜茇　荜澄茄　茴香子(炒)　木香　丁香　楝

实 桂（去粗皮） 槟榔 巴戟天（去心） 京三棱（微锉） 青橘皮（汤浸，去白焙） 附子（炮裂，去皮脐） 枳壳（去瓤麸炒）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，水、酒共一盏，同煎三五沸，温服；如作丸，用酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心盐汤送下。

【主治】肾脏虚惫，腰膝疼，小肠膀胱等气攻冲。

56886 胡芦巴散

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】胡芦巴 茴香 破故纸 川楝子 巴戟各一两 青橘皮 桂各三分 良姜 干姜各半两 斑蝥一分

【用法】上为细末。每服二钱，入盐煎服，不拘时候。

【主治】肾经膀胱虚，攻刺疼痛。

56887 胡芦巴散

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】胡芦巴 破故纸 巴戟 荜澄茄 川楝子 沉香 茴香 桂心各一两 附子四两（炮用） 桃仁三两 乌头半两

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，入盐一捻，煎至七分，空心服。

【主治】脾元积冷，脐腹强急，痛引腰背，面色萎黄，手足厥冷，胁肋胀疼，小便频数，及盲肠小肠一切气痛。

56888 胡芦巴散

【方源】《直指》卷十八。

【组成】胡芦巴（炒）一两

【用法】上为末。每服二钱，茴香炒紫，用热酒沃，盖定，取酒调下。

【主治】小肠气攻刺。

56889 胡芦巴散

【方源】《普济方》卷一五四。

【组成】胡芦巴 杜仲 胡椒

【用法】上为细末。每服二钱，先嚼胡桃二个，食前酒调服。

【主治】腰痛。

56890 胡芦巴散

【方源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】胡芦巴 益智仁 大茴 蓬术 牵牛子 山萸肉 酒牛膝 川断 川芎 防风 甘草

【用法】上为末。每服二钱，酒送下。

【主治】小肠气。小腹引睾丸连腰脊而痛。

56891 胡桐泪汤

【方源】《慈幼新书》卷二。

【组成】白芷 麦冬 当归 生地 花粉 石膏 细辛 升麻 干葛 胡桐泪

【主治】小儿卧时，开口当风，吸入风邪，留连不解，令齿缝酸痛。

56892 胡桐泪散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】胡桐泪一两（烧赤，细研） 石胆一两（细研） 黄矾一两（烧灰，研） 芦荟一两（细研） 光明砂半两（细研） 麝香一分（细研） 川升麻一两 细辛三分 乱发灰一分 当归半两 牛膝半两（去苗） 芎䓖半两

【用法】上为散，入研了药，更研令匀。每用先以甘草汤洗漱令净，后用药敷之，有涎即吐却，一日三次。

【主治】①《圣惠》：齿漏疳，龈上生疮肿痛。②《御药院方》：足阳明胃经虚，风热所袭，传流齿牙，攻注龈肉，则至肿结妨闷，甚者与龈间津液相博，化为脓汁。

56893 胡桐泪散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】胡桐泪一两 波斯盐绿一分 石胆半两 丁香一两 生干地黄二两

【用法】上为细散。每服一字，涂敷齿根下。

【功用】固齿生肌。

【主治】牙齿根宣露摇动。

56894 胡桐泪散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】胡桐泪一两 槐树根 白蔷薇根 垂柳梢 李树根各五两

【用法】上为粗散。每用半两，以水二大盏，煎至一盏，去滓，热含冷吐。

【主治】骨槽疼痛，龈肿齿疏。

56895　胡桐泪散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】胡桐泪一分　川升麻一分　白矾灰一分　细辛　独活　麝香(细研)　当归　附子(炮裂，去皮脐)　白芷各半分

【用法】上为细散。夜临卧时，先揩齿，漱口令净，用少许贴之。

【功用】牢牙定痛。

【主治】齿痛。

56896　胡桐泪散

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】胡桐泪一两　丹砂半两　麝香一分

【用法】上为极细散。常用揩齿。

【主治】牙齿历蠹，齿根黯黑。

56897　胡桐泪散

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】松节一两　细辛半两　胡桐泪一两　蜀椒一分(去目及闭口者，微炒)

【用法】上为散。分五次用，每次以酒二盏，煎十余沸，去滓，热含冷吐。

【主治】骨槽风痛，龈肿齿疏。

56898　胡桐泪散

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】生地黄一斤(取汁)　白矾半两(枯，研)　麝香一分(细研)　胡桐泪半两(细研)

【用法】上为极细末，与生地黄汁相和令匀，于银器中，即以文武火慢慢煎成膏。每用一字，食后、夜卧以药于牙龈上涂之。有津即咽。

【主治】骨槽风痛，龈肿齿疏。

56899　胡桐泪散

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】胡桐泪一两　铜绿一钱　麝香少许

【用法】上药同研令匀。每用药少许，以鸡翎扫之。

【主治】小儿牙疳疮。

56900　胡桐泪散

《金鉴》卷六十五。为《御药院方》卷九“胡桐律散”之异名。见该条。

56901　胡桐律散

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】胡桐津一分　麒麟竭一分　白矾灰一分　黄丹一分

【用法】上为细末。每用一字，贴牙齿缝，不拘时候。

【主治】小儿口齿疳，䘌血。

56902　胡桐律散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】胡桐律二钱半　生地黄　升麻各半两　川芎一两　白芷半两　细辛二钱半　烧寒水石二两(研)　青盐(研)　麝香(研)各半钱

【用法】上为细末。每用少许，擦牙痛处，吐津，误咽不妨，日用五七次。

【功用】牢牙止痛。

56903　胡桐律散

【方源】《御药院方》卷九。

【异名】胡桐泪散(《金鉴》卷六十五)。

【组成】胡桐律　川芎　细辛　白芷各半两　生地黄一两　青盐二钱半(研)　寒水石(烧通赤，出火毒)二两

【用法】上为细末。每用涂贴患处，吐津，误咽不妨，无时，日用五七次。

【主治】齿龈肿闷，宣露血出。

56904　胡桃灰散

《普济方》卷七十。为《圣济总录》卷一二一“揩齿胡桃灰散”之异名。见该条。

56905　胡桃涂方

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】初结青胡桃一颗(取外皮用)　石硫黄一皂子许(研如粉)

【用法】上先取胡桃皮切，研如膏，入硫黄末和匀。涂之。

【主治】紫癜风并白癜风。

56906　胡荽子散

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】胡荽子 补骨脂各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，食前陈米饮调下。

【主治】肠风下血不止，变成痔疾。

56907 **胡荽根汁**

【方源】方出《外台》卷二十八引《必效方》，名见《圣济总录》卷一四七。

【组成】胡荽根

【用法】捣取汁半升，和酒服，不拘时候。

【主治】蛊毒。

56908 **胡粉涂方**

【方源】《圣济总录》卷一三三。

【组成】胡粉 石灰（研，罗）各三分

【用法】上炼猪脂调如糊。涂疮上，水即出。

【主治】诸疮中水毒攻肿。

56909 **胡萝卜粥**

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】胡萝卜 粳米

【功用】①《本草纲目》：宽中下气。②《长寿药粥谱》：健胃，补脾，助消化。

【主治】《长寿药粥谱》：老人食欲不振或消化不良，皮肤干燥症、夜盲、以及高血压、糖尿病等。

【备考】《长寿药粥谱》本方用胡萝卜适量，粳米半斤，将胡萝卜切碎，同粳米煮粥，作早晚餐。

56910 **胡黄连丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十三引《万全方》。

【组成】胡黄连 当归（锉，微炒） 诃黎勒皮 木香各半两 青橘皮（汤浸，去白瓤，焙） 紫苏子 杏仁（汤浸，去皮尖，麸炒微黄）各一分 麝香一钱（研入）

【用法】上为末，用粟米饭和丸，如绿豆大。每服三丸，以粥饮下。

【主治】小儿肺疳，不欲乳食，时复腹痛。

56911 **胡黄连丸**

【方源】《颅囟经》卷上。

【组成】胡黄连 蟾酥各等分。

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。五岁儿每服二丸，熟水送下。

【主治】小儿热疳。

56912 **胡黄连丸**

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】胡黄连一两 青羊角屑半两 熊胆一分 蛇黄半两（捣碎，细研如粉） 青黛一分（别研）

【用法】上为末，更同研令匀，用黄牛胆汁和丸（如无黄牛胆，即用大羊胆和丸），如绿豆大。每服七丸，食后竹叶汤下。

【主治】胆实热，精神不安，起卧不定，口中多苦。

【宜忌】忌炙爆壅热物。

【备考】方中青羊角屑，《普济方》作“羚羊角屑”。

56913 **胡黄连丸**

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】胡黄连 天灵盖（涂醋，炙令微黄） 赤茯苓 川升麻 川大黄（锉碎，微炒） 地骨皮 知母 犀角屑 人参（去芦头） 麦门冬（去心，焙）各一两 鳖甲三两（涂醋，炙令黄，去裙襕） 黄芩 前胡（去芦头） 桔梗（去芦头） 赤芍药 当归（锉，微炒） 木通（锉） 防风（去芦头）各三分 甘草半两（炙微赤，锉） 柴胡二两（去苗）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温水送下，不拘时候。

【主治】虚劳骨热，四肢羸瘦少力，不思饮食。

【宜忌】忌苋菜。

56914 **胡黄连丸**

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】胡黄连半两 柴胡一两（去苗） 赤芍药三分 鳖甲二两（涂醋炙令黄，去裙襕） 知母半两 犀角屑三分 川升麻半两 玄参半两 人参半两（去芦头） 地骨皮三分 当归半两 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 茯神三分 枳壳三分（麸炒

微黄,去瓤)　麦门冬一两半(去心,焙)　紫菀三分(洗去苗土)　川大黄三分(锉碎,微炒)　甘草半两(炙微赤,锉)　秦艽三分(去苗)　槟榔半两　桔梗半两(去芦头)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以粥饮下,不拘时候。

【主治】妇人热劳烦闷,四肢黄瘦疼痛,时有咳嗽,不欲饮食。

56915　胡黄连丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】胡黄连　母丁香　黄连(去须,微炒)　芦荟(细研)　熊胆各半两　蟾头一个(涂酥炙焦黄)　麝香一分(细研)

【用法】上为末,用牛胆和丸,如绿豆大。若小儿心脏疳,煎芜荑、甘草汤下三丸;食疳泻血,或赤白者,以新汲水下三丸;吐逆不止及水泻,生姜汤下三丸;眼疳,羊子肝血和酒,看多少,微煎过,下三丸。

【主治】小儿五疳,面色黄瘦,身体壮热,虽吃乳食,不能消化,眼目涩痛,胸膈痰涎,爱食酸咸,常多泻痢。

56916　胡黄连丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】胡黄连　芦荟(细研)　麒麟竭　地龙(微炒)　熊胆(研入)各半两　蟾酥半钱

【用法】上为末,用面糊和丸,如黄米大。每服三丸,空心以粥饮送下,晚食后再服。

【主治】小儿一切疳。

56917　胡黄连丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】胡黄连　人参(去芦头)　地龙(微炒)　代赭(细研)　赤石脂各半两　蜗牛肉二七个　大蜣螂五个(去翅足,微炒)　猪牙皂荚二挺(去黑皮,涂酥炙焦黄,去子)　青黛(研入)　木香　蟾酥(研入)　黄连(去须)　槟榔　朱砂(细研)　麝香(细研)　天麻　当归(锉,微炒)　犀角屑　干蝎(微炒)　蝉壳(微炒)　芦荟(细研)　羌活　使君子　白芜荑　驴胎耳(炙令焦黄)　牛黄(细研)　蛤蚧(头尾全者,涂酥炙微黄)各一分

【用法】上为末,入研了药令匀,以豮猪胆汁和丸,如绿豆大。每服三丸,空心以粥饮下。

【主治】小儿风疳,㓾鼻揉眼,不知痒处。

56918　胡黄连丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】胡黄连　芦荟(细研)　天竺黄(细研)　犀角屑　胭脂(研入)　羚羊角屑各半两　麝香(细研)　干蝎(微炒)　白僵蚕(微炒)　天浆子(微炒)　牛黄(细研)　朱砂(细研)　雄黄(细研)各一分　蟾酥一钱(研入)

【用法】上为末,都研令匀,以猪胆汁浸蒸饼糊丸,如麻子大。每服三丸,以粥饮下,不拘时候。

【主治】小儿风疳,身体壮热,或时吐逆,心神烦躁。

56919　胡黄连丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】胡黄连一分(末)　天竹黄半两　芦荟半钱　熊胆半钱　腻粉半钱　麝香　牛黄　雄黄　朱砂　龙脑各一钱

【用法】上为细末,用软饭和丸,如粟粒大。每服五丸,以粥饮下,一日三服。

【功用】退上焦热。

【主治】小儿惊疳。

56920　胡黄连丸

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】胡黄连半两　虾蟆一个(涂酥炙焦黄)　蛇蜕皮灰一分　麝香一分(细研)　牛黄半分(细研)　使君子一分

【用法】上为末,以面糊和丸,如绿豆大。每服五丸,以粥饮下,一日三四服。

【主治】小儿奶疳,壮热体瘦。

56921　胡黄连丸

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】胡黄连末半两　朱砂三分　麝香一分　蛇蜕皮一条(烧灰)　波斯青黛三分　蟾酥一杏仁大　芦荟三分

【用法】上为末,用猪胆一个　取清酒一

盏,和药末,都于铫子内熬如膏,丸如绿豆大。五岁至七岁,每服五丸,三岁以下,每服三丸,以粥饮下,一日三服。

【主治】小儿干疳,瘦弱不能乳食,发竖脑干,肌体柴瘦。

56922 **胡黄连丸**

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】胡黄连半两 青黛半两(细研) 木香一分 蜗牛二七个(炒令微黄) 地龙半两(微炒) 蟾酥一钱(研入) 黄连半两(去须) 槟榔一分 蜣螂五个(微炒,去翅足) 朱砂一分(细研) 麝香一分(细研) 当归一分(微炒) 犀角屑一分 干蝎一分(微炒) 蛇蜕皮一分(烧为灰) 芦荟一分(细研) 独活一分 牛黄一分(细研) 猪牙皂荚五挺(去皮,涂酥炙焦黄)

【用法】上为末,以猪胆汁和丸,如绿豆大。每服五丸,以粥饮下,一日三服。

【主治】小儿脊疳,肌肤羸瘦,背脊骨高,身体寒热,面无颜色。

56923 **胡黄连丸**

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】胡黄连半两(为末) 青黛一分(细研) 麝香一钱(细研) 金箔五十片(细研) 银箔五十片(细研) 雄黄一分(细研) 朱砂半两(细研,水飞过)

【用法】上研令匀,用酒煮面糊为丸,如绿豆大。每服五丸,以温茶下,一日三服。

【主治】小儿眼疳,白翳不退。

56924 **胡黄连丸**

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】胡黄连半两 旱莲子半两 乌梅肉半两(微炒) 知母半两 龙胆半两(去芦头) 牛黄一分(细研) 青黛半两(细研)

【用法】上为末,以枣瓤和丸,如绿豆大。每服五丸,以甘草汤下,一日三服。

【主治】小儿疳渴,黄瘦壮热,不欲乳食。

56925 **胡黄连丸**

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】胡黄连一分 人参一分(去芦头) 柴胡半两(去苗) 羚羊角屑一分 麦门冬半两(去心,焙) 鳖甲半两(涂醋炙令黄) 地骨皮一分 秦艽半两(去苗) 黄耆一分(锉,微炒) 木香一分 犀角屑一分 甘草一分(炙微赤,锉) 葳蕤一分

【用法】上为末,炼蜜和丸,如绿豆大。每服七丸,以温水下,一日三服。

【主治】小儿骨热,烦躁黄瘦,饮食无味。

56926 **胡黄连丸**

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】胡黄连三分 干蟾三分(酒浸去骨,微炙) 麝香一分(细研)

【用法】上为末,都研令匀,炼蜜和丸,如绿豆大。每服五丸,以粥饮下,一日三四服。

【主治】小儿骨热。

56927 **胡黄连丸**

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】胡黄连半两 木香一分

【用法】上为末,用糯米饭和丸,如绿豆大。每服五丸,以粥饮下,一日三四服。

【主治】小儿疳痢,腹痛不止。

56928 **胡黄连丸**

【方源】《博济》卷四。

【组成】胡黄连半两 肉豆蔻一个 槟榔一个 诃子二个(以一个煨,一个生用) 丁香半两 红雪一两 密陀僧半两

【用法】上研细末,入麝香一分和匀,次入绿豆末少许,同水和为丸,如麻子大。三岁以下一丸,三岁以上五丸。脑疳鼻痒及烂,黄连汤下;脾胃羸瘦,泄痢,四肢虚肿,青州枣汤下;肝疳,眼涩生疮,甘草汤下;骨疳,卧冷地,爱食土,紫苏茶调下;常服,米饮下;肺疳,上气喘急,橘皮汤下;筋疳,泻血,盐汤下;虫疳及泻无定,生姜汤下。

【主治】小儿疳痢;脑疳,鼻痒及烂;脾胃羸瘦,泄痢,四肢虚肿;肝疳,眼涩生疮;骨疳,卧冷地,爱食土;肺疳,上气喘急;筋疳,泻血;虫疳及泻无定。

56929　胡黄连丸

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】胡黄连一两　熊胆一分　青黛一分(研入)　地黄一分　羚羊角屑　青葙子各半两

【用法】上为末,研匀,用牛胆汁和丸(如无牛胆,即用大羊胆和丸),如绿豆大。每服七丸,食后煎竹叶汤下。

【主治】胆实热,精神不安,起居不定,口中多苦。

56930　胡黄连丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】川黄连五钱　胡黄连五钱　朱砂一钱(另研)　(一方用虾蟆半两,不烧)

【用法】上为细末,入朱砂末,都填入猪胆内,用淡浆水煮,以杖于铫子上,用线钓之,勿着底,候一炊久取出,研入芦荟、麝香各一分,饭和为丸,如麻子大。每服五七丸至二三十丸,食后米饮送下。

【功用】《御药院方》:镇惊散热截疳。

【主治】①《小儿药证直诀》:小儿肥热疳;②《鸡峰》:小儿心经积热。

56931　胡黄连丸

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】胡黄连　犀角(镑)　鳖甲(醋炙,去裙襕)　诃黎勒皮(半生半熟)各一两　桔梗(锉炒)　升麻(锉)　地骨皮　知母(焙)　黄芩(去黑心)各一两一分　甘草(炙、锉)　白茯苓(去黑皮)　人参各三分　栝楼一个(大者)　柴胡(去苗)一两半

【用法】上为末,用猪胆二十个,取汁及蜜四两,搅和匀,慢火煎成膏,丸如梧桐子大。每服二十丸,食后以乌梅煎童子小便送下;如腹痛,用糯米饮下。

【主治】劳热,骨节烦疼,心膈躁闷。

56932　胡黄连丸

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】胡黄连半两　木香　蛤蚧(酥炙)各一分　蜗牛子(去壳)二七个　人参　雄黄(研)各半两　牛黄(研)　丹砂(研)各一分　干地龙(炒)三分　青黛(研)　干蟾(烧灰)　黄连(去须)　槟榔(锉)　当归(切,焙)　天麻　犀角(镑)　干蝎(炒)　蝉蜕(炙)　芦荟(研)　羌活(去芦头)　独活(去芦头)　芜荑仁　麝香(研)　驴胎耳(炙)各一分　蜣螂(炙)五个　赤石脂(研)　代赭(捣研)各半两　猪牙皂荚二挺(炙,去皮子,别捣研)

【用法】上为末,猪胆汁和丸,如黍米大。每服二三丸,空心用温米饮下。

【主治】小儿一切疳泻,惊风天钓。

56933　胡黄连丸

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】胡黄连　黄连(去须)各半两　丹砂(研)　木香各一分

【用法】上为末,用豮猪胆填药在内,取线紧系,以杖子一条,横于铫子上,将药胆挂上面,勿念着铫底,用浆水煮一炊时取出,入芦荟、麝香各一分,研细和匀,米饭为丸,如黍米大。每服五丸至七丸,米泔温水下。

【主治】小儿干疳体热。

56934　胡黄连丸

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】胡黄连半两　黄连(去须)　白芜荑仁各一两　木香半两

【用法】上为细末,豮猪胆和于盏内,坐饭甑中蒸两度,为丸如粟米大。每服二十丸,米饮下。

【主治】小儿干疳,饮食如常,肌体羸瘦,时作寒热,皮毛枯焦,嘿嘿不慧。

56935　胡黄连丸

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】胡黄连半两　蛇蜕(炙)一分　虾蟆(炙)半两　青黛(研)一分　蜗牛(炒)半两　木香一分　诃黎勒皮半两　麝香一分

【用法】上为末,用饭为丸,如绿豆大。每服三五丸,米饮下。虫出为度。

【主治】小儿气疳,下痢腹胀。

56936　胡黄连丸

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】胡黄连一分 芎䓖 蓬莪术(煨,锉) 青橘皮(去白,焙) 陈橘皮(去白,焙)各半两 干姜(炮)一钱 京三棱(煨,锉)三分

【用法】上为末,每抄一钱匕,入巴豆十粒,去皮心膜,入冷油内,慢火煎黑色,研细,煮醋面糊为丸,如黍米大。一岁一丸,薄荷汤下。

【主治】小儿疳痢,皮毛焦枯,肌体羸瘦,喜食酸咸,心腹胀,发热。

56937 **胡黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】胡黄连末 白芜荑仁末 芦荟(研) 麝香(研)各一分 巴豆五粒(去皮心膜,出油,研)

【用法】上合研匀细,煮面糊和丸,如粟米大。每服五丸至七丸,柳枝汤下,不拘时候。

【主治】小儿疳痢。因哺乳不节,生冷过度,下痢不止,面黄肌瘦,腹胀发热。

56938 **胡黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】胡黄连 蛤蚧(酥炙) 牛黄(研) 犀角屑 天麻 人参 肉豆蔻仁 大黄(研细,炒)各半两 雄黄(研如粉)一分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如麻子大。每服五丸,空心、午后各一服,温水下。

【主治】小儿五疳。

56939 **胡黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】胡黄连 夜明砂 五灵脂各半两 柴胡(去苗)一两 麝香(研)半钱 鳖甲(去裙襕,醋炙) 人参各半两

【用法】上为末,用猪胆汁煮面糊为丸,如绿豆大。每服十丸至十五丸,米饮下,不拘时候。

【主治】小儿骨热劳疾,面黄肌瘦,发热,夜卧有汗。

56940 **胡黄连丸**

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】胡黄连 黄连(去须)各半两 丁香 芦荟 五灵脂 干姜(炮裂) 槟榔(锉)各一分 木香 麝香(研)各一钱

【用法】上为末,用炊饼为丸,如麻子大。每服三五丸,温米饮下。

【主治】小儿血痢不止。

56941 **胡黄连丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十九引《惠眼观证》。

【组成】胡黄连 诃子肉(炮)二钱 朱砂一钱半

【用法】上为末,烂饭为丸,如鸡头子大。每服七至十丸,甘草、姜汤送下。

【主治】小儿痢疾。

56942 **胡黄连丸**

【方源】《幼幼新书》(古籍本)卷二十引《庄氏家传》。

【组成】胡黄连 黄连 柴胡各一两 乌犀 赤茯苓 使君子 黄芩 鳖甲(炙)各半两

【用法】上为细末,猪胆面糊为丸,如绿豆大。每服一二十丸,熟水送下。

【功用】生肌,消疳黄。

【主治】骨蒸潮热羸瘦。

【备考】本方方名,原书(人卫本)作"胡连丸"。

56943 **胡黄连丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十二引《庄氏家传》。

【组成】胡黄连 牛黄 朱砂 麝香少许 芦荟 青黛 钩藤(炙) 贯众 腻粉少许 鹤虱 雷丸 天竺黄各等分

【用法】上为末,面糊为丸,如粟米大。每服三丸。如有惊食,只取下食,如无,不动。

【功用】化涎消食。

【主治】小儿惊疳。

56944 **胡黄连丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十六。

【组成】胡连半两 没药 木香各一分

【用法】上为末,糯米饭为丸,如绿豆大。每服五丸,米饮下,一日三四次。

【主治】疳痢,腹痛不止。

56945 胡黄连丸

【方源】《卫生总微》卷十一。

【组成】胡黄连(炒) 芜荑(拣净,炒) 夜明砂各一分

【用法】上为末,猪胆汁和丸,如黍米大。每服十丸,陈米饮下,不拘时候。

【主治】血利下多,久而不愈,或作脏毒,下血带青黄色。

56946 胡黄连丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】使君子仁二两 丁香 木香 厚朴(去粗皮,姜汁浸一宿,炒紫色) 胡黄连 肉豆蔻(面裹煨熟) 没石子各一两 芦荟一分(别研)

【用法】上为细末,次入研者药和匀,煮粟米饮为丸,如黍米大。每服二十丸,乳食前橘皮汤送下。

【主治】小儿脾疳,虽能饮食,不生肌肉,或时下利,小便白浊。

56947 胡黄连丸

【方源】《活幼口议》卷十八。

【异名】大胡黄连丸(《袖珍小儿》卷五)。

【组成】胡黄连 芦荟 草黄连 肉豆蔻(炮) 桂 人参 朱砂 麝一字 使君子(去壳) 木香 钩藤 龙齿 白茯苓各一两

【用法】上各生用,为细末,取獖猪胆两个裂汁和末令匀,却入袋内盛之,以绳扎定,汤煮半日,取出切破袋子,更入蓖砻子二两(微炒),黄丹一两,二味别研如粉,入前药和匀,捣五百杵,为丸如绿豆大。但是疳与痢,用粥饮送下五七丸,子幼者三丸,不吃粥饮,乳头令吮。

【主治】婴孩小儿一切疳候及一切虚痢,他药无功者。

56948 胡黄连丸

【方源】《丹溪心法》卷五。

【组成】胡黄连五分 阿魏一钱半(醋浸) 神曲二钱 麝香四粒 炒黄连二钱

【用法】上为末,猪胆汁为丸,如黍米大。每服二三十丸,白术汤送下。

【主治】疳病腹大。

【方论选录】方中胡黄连去果子积;阿魏去肉积;神曲去食积;炒黄连去热积。

56949 胡黄连丸

【方源】《医方类聚》卷二五五引《经验良方》。

【组成】陈皮(去白)一两 川楝肉(炒) 宣连 神曲 青皮(去白) 使君子(煨,去壳) 麦芽 龙胆草各半两 胡黄连 夜明砂 白芜荑(炒) 干姜 乌梅各二钱

【用法】上为末,曲糊为丸,如黍米大。每服三十丸,米饮下。

【主治】小儿毛发焦落,腹大气喘,肌体羸瘦,吃食炭土生米,寒热往来,下痢脱肛;亦治交奶,不长肌肉,性情不悦。

56950 胡黄连丸

【方源】《普济方》卷三八〇引《傅氏活婴方》。

【组成】芦荟半两 茴香(炒)半两 使君子半两 芜荑(炒)三钱 胡黄连半两 黄连半两 川楝子半两 陈皮半两 木香三钱 青黛半两 龙胆草半两 轻粉一钱 夜明砂(炒)半两 巴豆四十九粒(去油) 脑麝少许

【用法】上为末,煮胆汁糊为丸,如麻子大。每服五十丸,空心饮汤下。

【主治】小儿瘦疳渴泻,壮热,肚大青筋,腹内虚鸣,牙宣口臭,腹内虫痛,多睡,好饮水,叫啼不止。

56951 胡黄连丸

【方源】《普济方》卷三八二。

【组成】胡黄连 芦荟各半两 金箔八片 黄连半两(去须,芦荟同为末,入备猪胆内,阴干,去皮膜,研) 银箔五片 青黛一分 丹砂一钱 牛黄半钱 麝香 真珠一钱 犀角二钱 龙脑半钱(八味同研)

【用法】上为末，面糊和丸，如黍米大。一岁儿二丸三丸，二岁儿以上加减，食前米饮下。

【主治】小儿一切惊疳积热，咬奶疳气。

56952 **胡黄连丸**

【方源】《普济方》卷三八二。

【组成】胡黄连　苦楝子各一两　青黛半两　芦荟一分

【用法】上为末，以糯米饮和丸，如绿豆大。每服一丸，荆芥汤下。

【主治】小儿脊疳，肌肤羸瘦，背脊骨高，身体寒热，面无颜色。

56953 **胡黄连丸**

【方源】《医统》卷四十六。

【组成】胡黄连　鳖甲　犀角　诃黎勒　赤茯苓　甘草(炙)各一两半　黄芩　地骨皮　知母(炒)　桔梗　升麻各一两　柴胡一两半　人参二分　栝楼一个

【用法】上为细末，用猪胆二十个，取汁，同蜜四两搅匀，慢火熬成膏，搜和为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后乌梅汤和童便下；如腹痛，糯米饮下。

【主治】热痨，骨节烦疼，心膈躁闷；亦治虚劳骨蒸。

【宜忌】忌苋菜。

56954 **胡黄连丸**

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】胡黄连　银柴胡　人参　地骨皮　犀角　知母　秦艽各三钱二分　鳖甲五钱　牛黄一钱(另研)　当归　茯神　半夏(姜制，作曲用)　杏仁各四钱二分(另研)　紫菀一钱七分。

【用法】上为末，和匀，炼蜜搜剂，捣千余下，丸如梧桐子大。每服五十丸，食前米汤送服。

【主治】一切虚劳，骨蒸潮热，吐咯嗽血，咳嗽声嘶，痰喘不宁，心神恍惚，夜梦遗精。

56955 **胡黄连汤**

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】胡黄连　皂荚(去皮，涂酥炙令黄)　白槟榔　郁李仁(汤浸，去皮尖双仁，炒干，研如粉)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，一日三次，不拘时候。

【主治】呀呷咳嗽。

56956 **胡黄连汤**

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】胡黄连　柴胡(去苗)　鳖甲(去裙襕，醋炙)　甘草(炙，锉)　白蒺藜(炒)　黄耆　附子(炮裂，去皮脐)各半两　威灵仙(去土)一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，童子小便、酒共半盏，乌梅一个(拍碎)，同煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳，寒热心忪，骨节痠疼。

56957 **胡黄连饮**

【方源】《幼幼新书》卷二十六。

【组成】胡黄连　黄药子　人参　甘草(炙)　白术(炒)　秦艽　柴胡各等分

【用法】上㕮咀。每服二钱，水一盏，嫩桃柳枝各七寸，乌梅少许，煎八分，澄清作两分，食后、卧时各一服。小便赤，验，便清止药，便成肌进食。大抵十五岁儿宜此。

【主治】疳热，泻无时，饮食进退，面黄黯黑，日渐瘦瘁。

56958 **胡黄连散**

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】胡黄连一两　人参三分(去芦头)　赤茯苓一两半　柴胡一两半(去苗)　鳖甲一两半(涂醋炙令微黄，去裙襕)　栀子仁三分　麦门冬一两半(去心，焙)　赤芍药三分　甘草半两(炙微赤，锉)　桔梗一两(去芦头)　槟榔半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以童子小便一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳骨热，四肢烦疼，口干心躁。

【宜忌】忌苋菜。

56959 **胡黄连散**

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】胡黄连一两　人参一两(去芦头)　赤茯苓一两　柴胡一两(去苗)　栀子仁一两　麦门冬一两(去心)　犀角屑一两　青橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙)　桔梗一两(去芦头)　槟榔半两　鳖甲二两(涂醋炙令黄,去裙襕)

【用法】上为散。每服四钱　以童子小便一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热劳,心神烦热,食少乏力。

【宜忌】忌猪肉、苋菜、醋物。

56960　胡黄连散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】胡黄连三分　天灵盖一两(涂醋,炙令黄)　鳖甲一两半(涂醋,炙令黄,去裙襕)　柴胡一两(去苗)　赤芍药三分　生干地黄一两　当归三分　地骨皮一两　黄耆一两(锉)　麝香一分(细研)　大黄　木香　青蒿　黄芩　犀角各一分

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,入生姜半分,桃、柳心各七茎,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妇人热劳体瘦,经脉不通,四肢疼痛,口干烦渴,不得眠卧,饮食全少。

56961　胡黄连散

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】胡黄连一分　犀角屑一分　牛黄一分(细研)　龙胆一分(去芦头)　川大黄一两(锉碎,微炒)　麦门冬半两(去心,焙)　甘草一分(炙微赤,锉)　知母一分

【用法】上为细散。每服半钱,以沙糖水调下。

【主治】小儿温壮,常欲饮水。

56962　胡黄连散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】胡黄连一分　牛黄一分(细研)　麝香半分(细研)　犀角屑一分　朱砂半两(细研,水飞过)

【用法】上为细散。用乳汁调下一字,二岁以上,用温水调下半钱,不拘时候。

【主治】小儿惊热不退。

56963　胡黄连散

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】胡黄连一分　犀角屑一分　生地黄汁二合　羊子肝一具(研,取汁)　麝香半钱(细研)　蜜半合

【用法】上捣胡黄连、犀角,细研为散,入麝香令匀,以羊子肝汁、地黄汁、蜜等调令匀。每服一茶匙,煎竹叶熟水调下药汁。

【主治】小儿疳热,渴,干瘦。

56964　胡黄连散

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】胡黄连一分　知母一分　鳖甲半两(涂醋,炙令黄,去裙襕)　柴胡半两(去苗)　地骨皮一分　黄芩一两　栀子仁一分　川升麻一分　犀角屑一分　甘草一分(炙微赤,锉)　杏仁一分(汤浸,去皮尖仁双,麸炒微黄)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿骨热瘦瘁,心神烦躁,不得睡卧。

56965　胡黄连散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】胡黄连一分　珍珠末一分(研入)　栀子仁半两　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为细散,入珍珠粉,同研令匀。每服一字,浓煎竹叶汤调下,不拘时候。

【主治】小儿肝脏久积风热毒上攻,两眼赤痛。

56966　胡黄连散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】胡黄连末半两　白龙骨末半两　白矾半两(烧令汁尽)　胡粉一分(微炒)

【用法】上为细散。一岁儿每服一字,二岁儿每服半钱,以米饮调下。

【主治】小儿疳痢久不愈,肌肉消瘦,面黄发焦,啼叫不恒。

【备考】本方方名,《幼幼新书》引作“黄连

散”。

56967 **胡黄连散**

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】胡黄连一分 母丁香一分 桂心一分 木香一分 犀角屑半分 肉豆蔻一分（去壳） 当归一分（锉，微炒） 麝香一分（细研）

【用法】上为细散。每服半钱，以粥饮调下，一日三四服。

【主治】小儿冷热气不和，恶暴下痢，腹内疼痛。

56968 **胡黄连散**

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】胡黄连 獭肝（炙） 芜荑仁（焙） 秦艽（去苗土） 白术（锉）各一分 柴胡（去苗） 鳖甲（去裙襕，醋炙）各半两

【用法】上为散。每服三钱匕，取猪肾一只，小便一合，别煎酒二合沸，浸小便与肾，入药，以碗盖，候通口即服，猪肾不吃。

【主治】虚劳，嗜欲过伤，肾气衰竭，咳嗽唾涎，瘦弱不能食。

56969 **胡黄连散**

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】胡黄连 黄连（去须） 龙胆各二两 桑螵蛸 知母 秦艽（去苗土） 柴胡 枳壳（去瓤） 人参 桔梗 射干 白术各一两

【用法】上洗，锉，炒黄为散。每服三钱匕，以葱、薤白、槐柳心、乌梅肉浸童子小便调下，或只用槐枝、小麦煎亦得，空心、日午、夜卧各一次。

【主治】急劳发热，羸瘦颊赤，口干，心神烦躁。

56970 **胡黄连散**

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】胡黄连 菊花各二两 黄芩（去黑心） 大黄（锉） 井泉石各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，用猪子肝二两，竹刀细锉，以新汲水三合，搅和滤取汁调下。小儿每服一钱匕。

【主治】目风睑眦暴肿，日渐长大，如梅李核，或胬肉疼痛，或小儿疳障。

56971 **胡黄连散**

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】胡黄连一分 升麻半两 铅霜（研）一分

【用法】上除铅霜外，捣罗为散，再同和匀。每服半钱匕，绵裹含化咽津，一日三五度，不拘时候。

【主治】咽喉中壅塞如核，连颊肿痛。

56972 **胡黄连散**

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】胡黄连 犀角屑 白羊肝（切，焙，为末）各一分 麝香（研）一钱

【用法】上为散。每服半钱匕，空心、日午用生地黄汁小半盏调下。

【主治】小儿干疳瘦瘁。

56973 **胡黄连散**

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】胡黄连 葛根（锉） 玄参 枇杷叶（拭去毛，炙黄） 甘草（炙）各一分 麦门冬（去心，焙）半两

【用法】上为散。每服一钱匕，以水一盏，入生姜少许，煎至五分，去滓，入蜜少许，再煎一两沸，放温服。

【主治】小儿疳渴，引饮不止。

56974 **胡黄连散**

【方源】《幼幼新书》卷三十一引张涣方。

【异名】粉连散、胡连散（《普济方》卷四〇七）。

【组成】胡黄连 胡粉各半两 白矾灰一分

【用法】上为细末。生油调涂。

【主治】阴肿生疮。

56975 **胡黄连散**

【方源】《幼幼新书》卷二十引《茅先生方》。

【组成】胡黄连 麦门冬 干葛 玄参 甘草（炙） 枇杷叶（炙去毛）各等分

【用法】上为末。每服一钱,水七分,生姜一片,煎五分,入蜜三五滴,同煎至四分,温服。

【功用】解诸热。

【主治】小儿诸渴及疳渴。

56976　**胡黄连散**

【方源】《幼幼新书》卷二十六。

【组成】胡黄连　旱莲子　龙胆　青黛　乌梅肉(微炒)　知母各半两　牛黄一分

【用法】上为散,枣瓤为丸,如绿豆大。每服五丸,甘草汤下,一日三次。

【主治】小儿疳渴黄瘦,壮热不乳。

56977　**胡黄连散**

【方源】《宣明论》卷十四。

【组成】胡黄连　槟榔各半两　麝香少许(别研)

【用法】上为细末,研细点之。如口疮,每服半钱,麝香一字,和匀贴之。

【主治】一切新久赤目疼痛,不能坐卧,并大小人口疮。

【宜忌】忌食鱼、猪、油腻物。

56978　**胡黄连散**

【方源】《卫生宝鉴》卷十一引麻孝卿方。

【组成】胡黄连五分　细辛　宣黄连各三钱　藿香一钱

【用法】上为末。每用半钱,干掺口内,漱千漱吐之。

【主治】口糜。

56979　**胡黄连散**

【方源】《普济方》卷一八九。

【组成】生地黄　胡黄连各等分

【用法】上为末,用猪胆汁为丸,如梧桐子大。每服五十丸,临卧煎茅花汤下。

【主治】吐血,衄血。

【备考】本方方名,据剂型,当作"胡黄连丸"。

56980　**胡黄连散**

【方源】《普济方》卷三六九。

【组成】胡黄连　栀子仁　牛黄(细研)　甘草(炙微赤,锉)各半两　子芩一两

【用法】上为细散,研入牛黄令匀。每服半钱,以蜜水调下,不拘时候。

【主治】小儿热病,壮热心闷。

56981　**胡黄连散**

【方源】《婴童百问》卷十。

【组成】人参　胡黄连　草果　槟榔　甘草　柴胡各等分

【用法】上锉散。水一盏,煎之三分服。

【主治】小儿疟疾。

56982　**胡黄连散**

【方源】《医统》卷八十一。

【组成】胡黄连一钱　五倍子五分　孩儿茶二分　麝二厘

【用法】上为极细末。先洗,后上药。

【主治】疳疮。

56983　**胡黄连煎**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【异名】点眼黄连煎(《圣济总录》卷一〇五)。

【组成】胡黄连一分(末)　黑豆一分(去皮)　黄柏一分(末)　龙脑一钱(细研)　麝香一钱(细研)　熊胆一分(细研)　牛黄一分(细研)　鹅梨汁一升

【用法】上先将前三味相和,于银器中,以水二大盏,煎至一半,滤去滓,入梨汁及研了药,以文火熬成煎,倾于瓷瓶内盛,密封,入地坑内埋四十九日,取出。每以铜箸头取少许点之。

【主治】眼风赤痛烂,怕见风日,磣痛不可忍。

56984　**胡堇草方**

【方源】《普济方》卷三〇二。

【组成】胡堇草

【用法】绞汁,涂金疮上。

【功用】止疼痛,散血。

【主治】五脏、荣卫、肌肉、皮肤中瘀血。

56985　**胡麻油膏**

《普济方》卷五十三。为《圣济总录》卷一一四"胡麻油"之异名。见该条。

56986 **胡麻浸酒**

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】胡麻(炒,捣,粗罗)一斤

【用法】上用生绢囊贮,以酒一斗五升,浸七日后,每服三合,稍稍服之,加至四五合。以愈为度。

【主治】中风,口面㖞斜。

56987 **胡椒馄饨**

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】胡椒 干姜(炮)各半两 诃梨勒皮四个

【用法】上为末,取精羊肉四两,细切和药,以面裹作小馄饨子,煮熟,空腹食之。以饱为度。

【主治】气痢。

56988 **胡蜣螂散**

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】胡蜣螂两个(去翅足,微炒) 赤芍药一分 柴胡半两(去苗) 熊胆半分(细研) 鳖甲一分(涂醋,炙令黄,去裙襕) 川大黄一分(锉碎,微炒) 枳壳一分(麸炒微黄,去瓤) 赤茯苓一分 紫菀一分(洗去苗土) 甘草一分(炙微赤,锉) 人参一分(去芦头) 生姜半分(切,烧灰) 麝香一钱(细研) 蛇黄一分(细研) 牛黄一分(细研)

【用法】上为细散。每服半钱,以温水调下,一日三服。

【主治】小儿骨热,黄瘦不食,多卧。

56989 **胡木星饮子**

【方源】《治痘全书》卷十三。

【异名】猪尾膏。

【组成】朱砂 郁金

【用法】入片脑少许,以新汲水调匀,然后取猪尾血一二滴,入药汁服,治黑陷,随木香汤、紫草汤入酒调下。

【主治】痘疮毒尽在外,血泡欲作脓窠者;及痘疮黑陷。

【宜忌】若在正出之时,不宜用。

56990 **胡氏双金丸**

【方源】《医方类聚》卷二五一引《简易方》

【异名】双金丸(《普济方》卷三九五)。

【组成】金液丹 青州白丸子各等分

【用法】上为细末,面糊和丸,如黍米大。每服五十丸,米饮下。

【主治】小儿泄泻不止,胸膈痰喘,吐逆,欲生风证。

【临证举例】小儿慢惊风 渠家小儿,自五月患脏腑,至七月不止,遂作慢惊候,以此药投一服,徐用白粥压下即愈,再六七服遂安。

56991 **胡氏夺命散**

《永类钤方》卷二十二。为《理伤续断方》"至真散"之异名。见该条。

56992 **胡氏牡丹散**

【方源】《妇人良方》卷二十一。

【组成】白芍药 当归 五加皮 地骨皮 人参各半两 没药 桂心各二钱 牡丹皮三钱

【用法】上为细末。每服二钱,水、酒各半盏,如不饮酒,只用水一盏,开元钱一枚,麻油蘸之,同煎七分,去滓,通口服。煎不得搅,吃不得吹。

【主治】妇人产后虚羸,发热自汗,欲变蓐劳;或血气所搏,及经候不调,或发寒热,自汗羸瘦。

56993 **胡氏孤凤散**

【方源】《妇人良方》卷十八。

【组成】生白矾

【用法】上为末。每服一钱,以熟水调下。

【主治】产后闭目不语。

56994 **胡芦巴煮散**

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】胡芦巴 沉香 马蔺花 蓬莪术(煨,锉) 茴香子(炒)各一两半 楝实(取肉,麸炒) 木香 姜黄 槟榔(锉) 桂(去粗皮)各一两 附子(炮裂,去皮脐)三分 甘草(炙,锉)半两

【用法】上为散。每服三钱匕,水半盏,酒半盏,同煎至七分,空心、食前和滓温服。

【主治】阴疝攻痛。

56995 **胡连芎归汤**

【方源】《幼科指掌》卷四。

【组成】胡黄连　川黄柏　黄芩　当归　川芎　小生地　白芍药　胆草　人参　鳖甲　知母　陈皮　柴胡　麦冬　甘草

【用法】水煎服。

【主治】小儿疳劳，五心烦热，潮热往来，盗汗夜渴，食少骨蒸，形容枯瘦，渴泻饮水，肚硬如石，面气如银，嗽喘发热，或痰中有血丝者。

56996 **胡连闭管丸**

《外科传薪集》。为《外科正宗》卷三"黄连闭管丸"之异名。见该条。

56997 **胡连追毒丸**

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】胡黄连一两(切片，姜汁拌炒)　麝香二分　刺猬皮一两(炙，切片，再炒黄为末)

【用法】上为细末，软饭为丸，如麻子大。每服一钱，食前酒服。服药后，脓水反多，是药力到也，勿惧。

【功用】①《外科正宗》：追脓毒。②《北京市中药成方选集》：消肿解毒，清热化痔。

【主治】痔漏不拘远年近日，有漏通肠，污从孔出者。

【宜忌】《北京市中药成方选集》：忌辛辣食物。

56998 **胡粉牛黄丸**

【方源】《卫生总微》卷十三。

【组成】胡粉三钱　牛黄一钱　麝香一钱

【用法】上为末，用豮猪胆一个，取汁，浸蒸饼和丸，如绿豆大。五岁儿每服七丸，温水送下。

【主治】小儿蛔动，腹内时时疼痛。

56999 **胡粉涂敷方**

【方源】《圣济总录》卷一三八。

【组成】胡粉　赤小豆　糯米　山茱萸　黄连(去须)各一两　水银半两

【用法】上除水银外，捣罗为散，生油调如糊，后取水银于掌中，以津唾研如泥，入药内研匀。先以椒汤洗丹上，拭干，用药涂敷，一日三两遍。

【主治】风丹。

57000 **胡麻延寿丹**

【方源】《扶寿精方》。

【组成】春季三月用：胡麻　秋石　何首乌　生地黄　粉甘草各四两

秋季三月用：前三味各四两　熟地黄四两　甘草一两

夏、冬二季用：前三味各四两　白茯苓四两　甘草一两

【用法】上为细末，每一料，用炼蜜一斤为丸，如梧桐子大。空心、午间食远、临卧各一服，好酒下。

【功用】交通心肾，水火既济，坎离交媾，袪宿病，生新血，乌须黑发，聪耳明目，健步，保生延年。

57001 **胡麻枕耳方**

【方源】方出《肘后方》卷六，名见《圣济总录》卷一八一。

【组成】熬胡麻

【用法】以葛囊贮，枕之。虫闻香则自出。

【主治】蚰蜒入耳。

57002 **胡麻茯苓面**

【方源】《医统》卷八十七引苏轼方。

【组成】胡麻(去皮，九蒸、晒)　白茯苓(去皮)

【用法】入少白蜜调食。

【功用】益气力、延年。

【主治】痔疾。

57003 **胡麻将军散**

【方源】《点点经》卷三。

【组成】二花二钱　当归一钱　穿山甲　牛子　山栀　黄芩　黄柏各一钱半　黄连六分　大黄二钱　芒消二钱　大胡麻一钱半　小胡麻一钱半　甘草四分

【主治】酒伤成癖成疥，虫毒入腹，通身浮肿，肚腹膨胀疼痛，大烧不退，气喘不安，肠鸣不休。

57004 胡麻续肌散

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】胡麻半斤　天麻二两　乳香三分（别研）

【用法】上为细散，入乳香和匀。每服二钱匕，用荆芥腊茶调下。服药半月后，两腰眼中灸二七壮，次常服补药。

【主治】大风癞疾。

【宜忌】忌房室、盐酒一百日。

【备考】本方方名，《普济方》引作"乳香散"。

57005 胡椒半夏丸

【方源】《普济方》卷一六三。

【组成】半夏　干姜各一两　胡椒　丁香各一分

【用法】上为细末，生姜自然汁煮薄糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，细嚼，食后干柿汤送下。

【主治】虚寒喘嗽，冷痰不止。

57006 胡椒红丸子

《医方类聚》卷一〇二引《王氏集验方》。即《局方》卷三（绍兴续添方）"红丸子"加良姜。见该条。

57007 胡椒红丸子

【方源】《普济方》卷一九六引《如宜方》。

【组成】三棱　陈皮　青皮　莪术各一两　胡椒　干姜各二两

【用法】上为末，醋胡为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三十丸，空心生姜汤送下，或煎二陈加砂仁汤送下。

【主治】谷疸，因饥中过食伤胃，蕴热瘀滞，腹满，心郁怔忡。

57008 胡椒青盐丸

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】附子二个（九钱重者，炮，去皮脐，切细）　青盐二两（别研）　厚朴（去粗皮，生姜汁浸，炙）　人参（去芦头）　木香　白术　沉香（锉）　丁香　茴香（炒）　破故纸（炒）　川楝子（去核取肉，杵，炒）　肉豆蔻（面裹煨香）　黄耆（蜜炙）　杜仲（去粗皮，生姜汁浸一宿，微炒，焙干）　胡椒各一两

【用法】上为细末，却入青盐酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服一丸，空心盐汤送下。

【主治】下焦虚弱，脚膝无力，多倦瘦怯，不美饮食。

57009 胡椒宣气丸

【方源】《普济方》卷一九二。

【组成】厚朴（姜汁制，用巴豆二八粒，轻手破，同厚朴四两炒热，去豆用）　菌头萝子一两　羌活一两　藿香半两　木香一两

【用法】上为末，用蒜磨水打糊为丸，如绿豆大。每服三十丸，用灯心、枣汤下，用木通汤下亦得，不拘时候。

【主治】浮肿。

57010 胡椒理中丸

【方源】《外台》卷九引《古今录验》。

【组成】胡椒　荜茇　干姜　款冬花　甘草（炙）　橘皮　高良姜　细辛各四两　白术五两

【用法】上为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服五丸，一日二次。

【主治】①《外台》引《古今录验》：咳嗽逆气，不能饮食，短气。②《局方》：肺胃虚寒，气不宣通，咳嗽喘急，逆气虚痞，胸膈噎闷，腹胁满痛，迫塞短气，不能饮食，呕吐痰水不止。

【宜忌】忌桃李、雀肉、生菜、海藻、菘菜。

57011 胡燕窠敷方

《圣济总录》卷一三三。为方出《圣惠》卷六十五，名见《普济方》卷二七六"胡燕窠涂敷方"之异名。见该条。

57012 胡尚书壮阳丹

【方源】《扶寿精方》。

【组成】莲肉（水浸，去皮心）八两　甘枸杞　芡实　干山药　白茯苓（去皮）　山茱萸（去核）各四两

【用法】上为细末，熟糯米一升，炒黄色为末，白糖五两，酥油五两拌匀，瓷器贮。每服五六匙，早朝沸水汤、酒任调下，干物压之。

【功用】滋补元阳,美颜益寿。

57013　**胡黄连点眼方**

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】胡黄连(去须,锉如豆大)一两　蜜陀僧(研)半两　蜜四两(重汤煮)

【用法】上先将黄连于蜜内浸一宿,次日入蜜陀僧末和匀,用白瓷碗盛,却用黑豆一斗于锅内,以水煮候热,却将药碗放在豆上,勿令豆汁入内,候豆熟为度,取出用绵滤过,入龙脑半钱匕,以银石器盛。三日后点眼,不拘时候。

【主治】肝肺热盛,目赤生胬肉。

57014　**胡黄连麝香丸**

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】麝香黄连丸(《卫生总微》卷十二)。

【组成】胡黄连　白芜荑(去扇)各一两　木香　黄连各半两　辰砂(另研)一分　麝香(锉,研)一钱

【用法】上为细末,面糊为丸,如绿豆大。每服五七丸至十丸,米饮下;三五岁以上者,可服十五至二十丸,不拘时候。

【主治】小儿疳气羸瘦,白虫。

【备考】本方方名,《普济方》引作"麝香丸"。

57015　**胡燕窠涂敷方**

【方源】方出《圣惠》卷六十五,名见《普济方》卷二七六。

【异名】胡燕窠傅方(《圣济总录》卷一三三)。

【组成】胡燕窠一个(取最大宽者,用抱子处,余处不用)

【用法】上为细散。先以水煎甘草,及入盐少许,净洗,干便以窠末敷之,一日二三次便愈;若患恶疮,以醋和裹之,每日两易。

【主治】湿病疮。

封

57016　**封口药**

【方源】《医统》卷七十九。

【组成】牡蛎(煅存性)　赤石脂(生研)　国丹各等分

【用法】上为细末。香油调涂疮口。待消肿散血合口,再加血竭干掺之。

【主治】肉皮损伤破裂者。

57017　**封口药**

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】乳香　没药　儿茶　当归　杉皮灰各一钱　麝香五厘　片脑一分　猪母肸叶一钱(如无此叶,葛叶、毛藤子叶亦可)

【用法】上各另研细末,和匀,入麝香,次入片脑,再和匀,瓷器收贮。如缺唇,先以小气针作三截针之,用绢线一条,两头搓猪毛,以唾蘸湿,抹封口药于线上,将药线三截穿定,却以麻药抹缺处,以剪刀口抹封口药,薄剪去些皮,以线即缝合,就以鸡子黄油搽患处,以金毛狗脊毛薄铺于上,却以封口药末搽于上,每日用药水轻洗去,搽油换药,每日一次,待八日剪去线,搽药。

【主治】刀斧伤,割喉断耳缺唇,伤破肚皮,跌破阴囊皮碎。

57018　**封囟散**

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【组成】柏子仁(炒)　细辛(去苗叶)　防风(去叉)　白及各一两　草乌头(炮)半两

【用法】上为细散。乳汁调涂囟开处。

【主治】小儿解颅,囟门开解。

57019　**封囟散**

【方源】《幼幼新书》卷六引张涣方。

【组成】蛇蜕皮一两(烧灰)　防风　大黄(湿纸裹,火煨存性)　白及各半两

【用法】上为细末,入青黛半两研匀。每用半钱,以豮猪胆汁调匀,纸摊,四边各留少白纸,用淡醋生面糊贴囟上,不住以温水润,一伏时换。

【主治】小儿肾经虚热解颅,囟不合,囟填,囟陷下不平。

57020　**封囟散**

【方源】《幼幼新书》卷六引《王氏家传》。

【组成】柏子仁 防风 天南星各四两

【用法】上为细末。每用一钱，猪胆汁调匀，稀稠得所，摊绯帛上，随囟大小贴，一日一换，时时汤润。

【主治】囟开崎陷，咳嗽鼻塞。

57021 **封囟散**

《婴童百问》卷四。为《千金》卷五"三物细辛敷方"之异名。见该条。

57022 **封脐丸**

【方源】《良朋汇集》卷四。

【组成】肉豆蔻（面裹煨熟）一钱五分 雄黄末一钱

【用法】上为末，醋糊为丸，如黄豆大，晒干。用一丸醋泡，少时放脐内，以膏贴之。

【主治】小儿泻吐。

57023 **封脐丹**

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】丁香七个 肉果一个 牙皂二两（去筋） 大倍子一个（炒） 麝香五厘

【用法】上为末，醋调为丸，如绿豆大。入脐，外贴膏药。

【主治】痢疾水泻，并妇人白带。

57024 **封脐艾**

【方源】《医方类聚》卷一五三引《瑞竹堂方》

【组成】海艾 蛇床子各一两 木鳖子二对（生用）

【用法】上为细末，和匀。作一纸圈，于内可以容熨斗，将药用绵包裹定，安在纸圈内，放在脐上，用熨斗熨之，每日熨烙。

【主治】腰膝痛，脐腹冷痛，老人、弱人、妇人小儿泄泻。

57025 **封脐散**

【方源】《圣惠》卷七十六。

【组成】雄鼠粪七枚（两头尖者） 干姜枣许大 甑带如鸡子大（以上并烧作灰） 锦灰半两 绯帛灰半两 胡粉三钱（炒令黄） 麝香少许

【用法】上为细末。看脐欲落不落，取药半钱至一钱，封脐便愈；如未患脐肿湿时，先得之，永不患。

【主治】婴儿脐不落，肿湿。

【宜忌】烧药时切不得令灰入。

57026 **封脐散**

【方源】《圣惠》卷八十二。

【异名】神灰散（《圣济总录》卷一六七）。

【组成】胡粉一分 雄鼠粪七枚（烧为灰） 甑带一两（烧为灰） 干姜灰半分 绵帛灰半分 白石脂半分

【用法】上为细末。加麝香末一钱，看脐欲落不落，即封脐，便愈；如未患敷之，即终不患。

【主治】小儿脐肿湿久不愈，脐不落者。

【宜忌】烧药时，不得令有别灰也。

57027 **封脐散**

【方源】《幼幼新书》卷四引张涣方。

【组成】好川当归半两（洗去土，焙干） 天浆子三个（微炒） 乱发一钱（烧灰存性）

【用法】上为细末，入麝香一字拌匀。用药一字至半钱，敷脐中，时时用。

【主治】婴儿脐风。初生断脐之后，因乳母不慎，或洗浴水入脐中，或儿尿在绷袍之内，湿气伤于脐中，或解脱，风冷邪气所乘，令儿脐肿多啼，不能哺乳者。

57028 **封脐散**

【方源】《普济方》卷三六五引《卫生家宝》。

【组成】细辛不拘多少

【用法】上为末。以醋调，涂脐上。

【主治】小儿口疮。

57029 **封脐散**

【方源】《普济方》卷三六〇。

【组成】甑带灰 乱发灰 白姜灰 红绵灰（四灰不可加别灰） 南星 白敛 当归 赤小豆 五倍子各一钱（为末） 血竭 龙骨 赤石脂（煅） 海螵蛸 百草霜 胭脂各半钱（别研）

【用法】上为末。湿则干掺；干则清油涂。

【主治】因浴儿水入脐中，或尿湿绷袍，至

脐中受湿，肿烂成疮；或解脱风邪所袭，入于经络则成风痫；或脐肿烂不干，久则发搐者。

【宜忌】忌生水调涂。

57030　**封脐散**

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】红绵（烧灰）　黄牛屎（煅）　干胭脂

【用法】上为末。疮湿，干掺；疮干，清油调敷。

【主治】小儿脐疮。

57031　**封脐散**

【方源】《准绳·幼科》卷一。

【组成】红绵灰　黄牛粪灰　龙骨　发灰　干胭脂各半钱

【用法】上为极细末。湿则干掺；干则清油涂脐。

【主治】小儿脐中肿湿，经久不愈。

57032　**封脐散**

【方源】《准绳·幼科》卷一。

【组成】当归头（去芦）一钱　绵（缚脐带烧灰）一钱

【用法】上为极细末。入麝香一小字，同研少许，干掺脐。

【主治】小儿脐内出水，汁不干。

57033　**封脐散**

【方源】《玉案》卷六。

【组成】生南星

【用法】上为末。封脐。不可再见风。

【主治】小儿脐风撮口。

57034　**封脐散**

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】旧大红绒（烧灰）　南星　白敛　赤石脂　海螵蛸　五倍子　脂坯（烧）各等分

【用法】上为末。干掺。

【主治】小儿脐疮。

57035　**封脐散**

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】龙骨一钱（煅）　红棉灰一钱　归头一钱（焙）

【用法】上为细末。断脐带后，用少许干掺脐内。

【主治】小儿脐风。

57036　**封脐膏**

【方源】《宋氏女科》。

【组成】五倍子不拘多少

【用法】上为末。津吐调匀，填脐内，封固，用绵缚之。

【主治】产后虚汗不止。

57037　**封脐膏**

【方源】《证治宝鉴》卷八。

【组成】文蛤（炒存性）二两　巴霜六钱　麝香三分　乳香　没药　雄黄　儿茶各六钱（一方有红豆、砂仁、丁香）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如扁豆大。放脐中，不拘何等膏药封之。

【主治】泄泻。

57038　**封脐膏**

【方源】《良朋汇集》卷三。

【组成】穿山甲五钱　木鳖仁三钱　香油一斤

【用法】将油入锅内，炸药黑色去滓，下黄丹七两，搅，滴水成珠后，下乳香、没药各三钱半，冷温下麝香一分搅匀。任意摊贴。预先贴肚脐一张，则无肚腹泻痢等症。

【主治】夏月失其盖被，乃至肚腹不调。

57039　**封脐膏**

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】大黄　黄芩　黄柏　枳实各一两　槟榔八钱　黑白牵牛各三钱　当归　槐花各五钱　地榆一两　木香三钱（后入）　生姜　麻油八两　黄丹四两

【用法】上药熬成膏。白多者，先用生姜三片，茶叶一钱，红糖三钱煎服；赤多者，或口噤者，用川连一钱，地榆一钱，茶叶八分煎服；后以膏药摊贴脐上。

【主治】痢疾。

【宜忌】忌油腻、酒浆、烟、面、荤腥。

57040　**封髓丹**

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】黄柏三两 缩砂仁一两半 甘草二两

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前用苁蓉半两切作片子，酒一大盏，浸一宿，次日煎三四沸，去滓服。

【功用】降心火，益肾水。

【主治】虚损。

57041 **封髓丹**

【方源】《医方类聚》卷一五三引《经验秘方》。

【组成】商黄柏 刘寄奴 新莲蕊 破故纸（羊肠煮）一两 母丁香 蛤蚧（微炒）一对 枣针各半两

【用法】上为细末，酒糊丸，如梧桐子大。每服五十丸，渐加至七八十丸，空心温酒送下。

【功用】降心火，益肾水，升阳壮气，添精补髓。

【主治】诸虚。

57042 **封髓丹**

《古今名医方论》卷四。为《元戎》卷十"正凤髓丹"之异名。见该条。

57043 **封髓丹**

《杂病源流犀烛》卷十八。为原书同卷"大凤髓丹"之异名。见该条。

57044 **封髓丹**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】黄柏三两 甘草（炙）七钱 砂仁一两 苁蓉（炙）五钱 莲须五钱 芡实（炒）五钱

【用法】共研为细粉，过罗，用冷水泛为小丸，每十六两丸药，用朱砂五钱，滑石三两为衣，闯亮。每服三钱，日服二次，温开水送下。

【功用】滋阴降火，固精封髓。

【主治】肾气虚弱，相火妄动，梦遗滑精，阳关不守。

57045 **封口金疮药**

【方源】《伤科大成》。

【组成】乳香 没药各四钱 木鳖仁二钱 轻粉二钱 煅龙骨一钱 血竭一钱 白及一钱 老松香一钱 虻虫一钱 白敛一钱 五倍子二钱

【用法】上为细末。将熟猪油八两，菜油八两，同熬透，入白蜡三钱化溶，再入药末搅匀。摊贴。

【功用】生肌肉。

【主治】金疮破烂未收口者。

57046 **封脐固阳膏**

【方源】《良朋汇集》卷二。

【组成】大附子（姜汁制，阴干）一两 蟾酥四钱 麝香五钱 升硫一钱六分

【用法】上为末，用淫羊藿二两，白酒二碗，入羊藿熬，煎好时去藿不用，将酒熬成膏，和药末为二十四丸，瓷罐盛。每用一丸，放脐中，不拘甚膏药封之。

【主治】阳痿。

57047 **封裹虎骨膏**

【方源】《普济方》卷三一〇。

【组成】虎骨连项锁骨一穿 鲮鲤甲连项锁骨一穿 败龟背骨一个（以上三味烧成灰，研细为末） 狗头骨（火煅） 花乳石二两（煅令化） 雄鼠粪（尖者，炒）一两 日炙沙二两（即雨后地卷皮是也，净者，火煅）

【用法】上为细末。每用一大匙，醋煮粟米入药，乘热搅匀，摊在帛子上，裹痛处，一日一次洗换新药。

【主治】伤折。

57048 **封脐雄鼠粪散**

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】雄鼠粪（微炒）七枚 胡粉半两 大枣三分（去核） 麝香一钱（细研） 绵帛灰一钱

【用法】上为散。看脐欲落不落，即用药以敷之，不令风入。

【主治】小儿初生至七日以来，脐风肿欲落。

荆

57049 荆公散

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】黄耆二两　山药二两　远志一两(去心)　茯苓　茯神各一两　桔梗　炙甘草各三钱　麝香一分　木香二分五厘　砂仁二钱

【用法】上为末。每服二钱，酒送下。

【主治】梦遗失精，及惊悸郁结。

【加减】有力者，去黄耆，加人参一两。

57050 荆术散

【方源】《永类钤方》卷二十引《集验方》。

【异名】冲和散。

【组成】荆芥穗　赤芍各一两　制苍术二两　甘草半两(炒)

【用法】上为细末。每服一二钱。伤风伤寒，壮热咳嗽，鼻塞声重，生姜、葱白汤送下；伤风潮热，或变蒸发热，薄荷汤送下；风热伤肺，鼻涕气粗，紫苏汤送下；暴卒急惊风热，宜疏风散调下；久病后急慢惊热，宜保婴全蝎散调下；发汗，去节麻黄汤调下；盗汗、自汗，牡蛎、浮麦汤调下；丹毒风热，煎四顺饮汤调下；眼暴赤热肿，煎羌活、黄芩、生地黄汤调下；口舌腮项热肿生疮，煎防风牛蒡子汤调下；咽喉肿痛，重舌，煎升麻、枳壳、大黄、防风、薄荷汤调下。

【功用】疏风顺气。

【主治】小儿一切热证，伤风伤寒，壮热咳嗽，鼻塞声重；伤风潮热，或变蒸发热；风热伤肺，鼻涕气粗；急慢惊风；自汗，盗汗；丹毒风热，眼暴赤热肿，口舌腮项热肿生疮，咽喉肿痛，重舌。

57051 荆叶蒸

【方源】《串雅外编》卷二。

【组成】荆叶不限多少。

【用法】置大瓮中，其下着火温之，病人置叶中，须臾当汗出，蒸时旋旋吃饭，稍倦即止。便以被盖避风，仍进葱豉酒，豆酒亦可。以愈为度。

【主治】脚风湿痛不止。

57052 荆兰汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】荆芥穗　贯众　甘草　蜀椒(去目)　泽兰　芍药各二两

【用法】上为粗末。每用三大匙，水三碗煎沸，倾盆内，先坐熏之，覆令密，勿泄出药气，通手即淋渫。

【主治】五痔痛不可忍。

57053 荆防方

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】荆芥穗二钱　防风二钱　僵蚕二钱　金银花四钱　牛蒡子三钱　丹皮三钱　紫背浮萍二钱　干地黄三钱　薄荷一钱半　黄芩三钱　蝉蜕一钱半　生甘草二钱

【功用】疏风解表，清热止痒。

【主治】急性荨麻疹，血管神经性水肿。

【加减】恶寒重，发热轻，风团皮损偏白者，去薄荷，重用荆芥，加干姜皮；兼吐泻、腹痛者，加周氏回生丹，每次7—10粒。

【方论选录】以荆芥、防风、薄荷、蝉衣为主药。荆芥驱散气分风邪；防风散骨肉之风；薄荷清轻凉散，解风热之邪，又可疏表透疹解毒；蝉衣凉散风热，开宣肺窍；牛蒡子疏散风热，解毒透疹；浮萍升散开窍；僵蚕祛风散结；银花、黄芩解毒清肺热；丹皮、干生地理血和血；生甘草解毒，调和诸药。

57054 荆防汤

【方源】《眼科应验良方》。

【组成】荆芥八分　蔓荆子八分　赤芍八分　川芎八分　防风八分　车前子一钱　蝉蜕六分(去翅足)　菊花一钱　生地一钱五分(切片)　青葙子八分　甘草四分

【用法】加生姜一薄片为引。

【主治】眼白珠有红，微痛者。

【加减】心火旺，眼大角红肿者，加黄芩八分(酒炒)，木通八分，淡竹叶九片。

57055 荆防汤

【方源】《古今医彻》卷一。

【组成】防风 荆芥 前胡 桔梗 广皮 枳壳各一钱 甘草三分

【用法】加生姜一片，水煎服。

【主治】伤风咳嗽。

57056 荆防汤

【方源】《古今医彻》卷三。

【组成】防风 荆芥 生地 枳壳 葛根各一钱 细辛三分 蔓荆子七分(焙，研) 黄柏五分(酒炒黑)

【用法】水煎服。

【主治】外感风寒，齿痛寒热。

57057 荆防饮

【方源】《冯氏锦囊·外科》卷十九。

【异名】荆防散(《疡医大全》卷三十)。

【组成】荆芥 防风 丹皮 天花粉 橘红 连翘 甘草 粘子(炒，杵) 元参 赤芍 羌活 金银花各等分

【用法】水煎服。

【主治】赤丹游走。

57058 荆防饮

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】荆芥 防风 桔梗 甘草 桑白皮 杏仁

【主治】伤风咳嗽。

【方论选录】此方用桔梗开肺窍；桑白皮、杏仁泻肺气；荆芥、防风将肺中之风轻轻泻出。

57059 荆防饮

【方源】《古今医彻》卷一。

【组成】防风 荆芥 鼠粘子(焙研) 前胡 桔梗 苏薄荷 陈皮 葛根各一钱 甘草二分 山楂肉一钱五分

【用法】加生姜一片，芫荽一撮(无则用子)，水煎服。

【主治】发疹，形密似针头，其色淡如桃花，咳嚏，泄泻者。

【加减】如发透，去荆防；胸膈不宽，加枳、朴；痰多，加苏子；泻甚，去鼠粘；咽痛，加射干；火毒，加玄参；腹痛，加茯苓、厚朴；二剂后去荆防，加薄荷一钱，枳壳一钱。

57060 荆防散

《疡医大全》卷三十。为《冯氏锦囊·外科》卷十九“荆防饮”之异名。见该条。

57061 荆防散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】荆芥一两半 防风一两半 米仁五两(炒) 通草四两 川芎八钱 茯苓三两 陈皮一两半 香附一两半(醋炒) 紫苏一两半

【用法】上为散。每服三钱，生姜皮汤送下。

【主治】产后离褥太早，冒风致湿，经络不能流通，遍体浮肿，脉浮涩者。

【方论选录】荆芥理血疏风，防风疏风燥湿，米仁健脾气以渗周身之湿，紫苏理血气以泄遍体之风，川芎入血海行血滞；香附调气海行气滞；通草利湿通肺气；茯苓渗湿和脾气；陈皮利中气调胃气。为散姜皮汤下，使风邪和解，则经络清和，脾胃健运，湿无不化，何遍身浮肿有不退乎。

57062 荆防散

【方源】《医医偶录》卷一。

【组成】荆芥一钱 防风 苏梗 川芎 陈皮各八分 杏仁二钱 甘草 姜皮各三分

【主治】小儿外感终日发热，或拘束肢冷，鼻塞流清涕，咳嗽，头痛，脉浮而不渴者。

57063 荆防散

【方源】《镐京直指》。

【组成】荆芥一钱五分 防风一钱五分 川芎八分 葛根二钱 羌活一钱 桔梗一钱 甘草五分 薄荷一钱 广郁金二钱 老姜三片

【主治】痢疾初起，表邪不解，发热恶寒，头痛脉浮，舌苔白滑。

57064 荆芥丸

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】荆芥穗四两 细辛(去苗叶) 芎䓖 白僵蚕(炒) 各一两 天麻一两半 羌

活(去芦头) 防风(去叉) 蒺藜子(炒,去角)各二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如鸡头子大。每服一丸,食后细嚼,荆芥茶送下;温酒亦得。

【主治】诸风头旋,目痛眩,肢体拘急,手足少力。

57065 荆芥丸

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】荆芥穗十二两 天麻(去苗) 附子(炮,去皮脐) 白附子(炮) 乌药(洗,焙) 当归(洗,焙) 川芎各一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每一两作十丸,朱砂为衣。每服一丸,食后细嚼,茶、酒任下。

【主治】一切风邪,上攻头面,眩晕多痰,咽膈不利,口目瞤动,偏正头痛;或伤风头痛,发热鼻塞声重。

57066 荆芥丸

【方源】《医方类聚》卷二五八引《保童秘要》。

【组成】浮萍 荆芥子(净择洗)各等分

【用法】上为末,用水为丸,如芥子大。每服一丸。

【主治】小儿急慢惊风,出汗者。

57067 荆芥丸

【方源】《普济方》卷二七二。

【组成】荆芥末

【用法】上以地黄自然汁熬成膏,和荆芥末为丸,如梧桐子大。每服三五十丸,茶、酒任下。

【主治】身上一切疮。

57068 荆芥丸

【方源】《普济方》卷二八〇。

【组成】荆芥穗不拘多少

【用法】上为细末,蒸烂。入萝卜于木石器内,烂捣为丸,如梧桐子大。每服三四十丸。食后茶汤、熟水任下。

【主治】疥疮,及风热疮。

【宜忌】服荆芥药,忌食无鳞鱼。

57069 荆芥丹

【方源】《幼幼新书》卷九引丁时发方。

【组成】水银 青黛(炒)各二钱 铅一钱(用水银结砂子) 天南星(炮) 荆芥各三钱 蝎一钱半 朱砂 乳香(炒,研)各半钱

【用钱】上为末,细研匀,冷水再研为丸,如梧桐子大。每服一丸,熟水化下。

【主治】小儿一切急慢惊风,夜卧多啼。

57070 荆芥汤

【方源】《普济方》卷十五引《圣惠》。

【组成】荆芥穗 牡丹皮(去心) 川芎 蔓荆子 柴胡(去毛) 羌活 鳖甲(醋炙) 天灵盖(酥炙,炒黑色) 沉香 甘草 当归各一钱 连翘子半两 秦艽三铢

【用法】上为细末。每服二钱,水一盏,先煎令沸后,入药末,一搅便泻出,食后、临卧时和滓服。一方,去滓温服。

【主治】一切男子肝脏壅热,血气皆滞,有所劳伤,肝家自感风劳之气,筋脉羸弱,目视昏暗,欲睡还觉,常多瞋怒,头旋目晕,面色青,浑身瘦瘁,口中多涎,小便黄赤。

57071 荆芥汤

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】荆芥穗 旋覆花各四两 前胡(去芦头) 甘草(炙) 麻黄(去根节) 芍药 芎䓖 半夏(汤洗七遍)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,入葱白三寸,鸡苏三叶,同煎至七分,去滓温服。

【主治】风气肌肉瞤动,头目昏眩,四肢烦疼。

57072 荆芥汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】荆芥穗四两 前胡(去芦头) 旋复花各三两 甘草(炙)二两 白术 半夏(汤洗七遍,焙干) 麻黄(去根,不去节) 芍药各一两

【用法】上为粗末。再服三钱匕,水一盏,加生姜三片,大枣三枚(擘破),煎至七分,去滓热服,不拘时候。

【主治】伤寒初得一二日至三日，头痛痰逆，肢体烦躁，恶风，身热憎寒。

57073 **荆芥汤**

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】荆芥穗 木通各四两 羌活 芎䓖 甘草（炙） 麻黄（去根节，煎，掠去沫） 独活各一两

【用法】上为粗末。每服三钱，水煎，温服。

【主治】中风伤寒，头目昏眩，憎寒壮热，四肢烦倦。

57074 **荆芥汤**

《圣济总录》卷二十九。为《圣惠》卷十四“荆芥散”之异名。见该条。

57075 **荆芥汤**

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】荆芥穗一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓冷服，不拘时候。

【主治】呕血。

57076 **荆芥汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】荆芥穗 防风（去叉） 甘菊 旋复花 芎䓖 枳壳（去瓤，麸炒） 甘草（炙）各一两 石膏二两 黄芩（去黑心）半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜半分（切），煎取七分，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】风热毒气，攻冲阳经，头痛目疼，连绕眉头。

57077 **荆芥汤**

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】荆芥穗 臭橘 厚朴（去粗皮）各半斤

【用法】上为粗末。每用二两，水五升，煎取三升，避风处淋渫。

【主治】五痔疼痛，连阴湿痒。

57078 **荆芥汤**

《圣济总录》卷一四四。为《圣惠》卷六十七“荆芥散”之异名。见该条。

57079 **荆芥汤**

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】荆芥穗一两 人参 木香 芍药 生干地黄（焙） 秦艽（去苗土） 柴胡（去苗） 当归（切，焙） 半夏（生姜自然汁制，焙干） 乌药 芎䓖 甘草（炙）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，同煎至七分，去滓，空心、日午、临卧服。

【主治】妇人血风劳气，肢体羸瘦，饮食减少，疼痛寒热。

57080 **荆芥汤**

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【组成】荆芥穗 芎䓖 细辛（去苗叶） 威灵仙（洗，锉） 甘草（炙）各一两 皂荚半两（不蚛者，去皮，涂酥炙）

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎至六分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】妊娠血气壅滞，身体生疮，心神不宁。

57081 **荆芥汤**

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】荆芥穗 麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙） 干姜（炮） 五味子 石膏 甘草（炙） 人参 芍药各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后伤寒，头目昏痛，咳嗽痰壅，肢节疼痛。

57082 **荆芥汤**

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】荆芥（浓煎，绞汁）半升

【用法】上汁顿服；再将荆芥浓煎汤，置盆内，令病人坐在上，熏之淋之。

【主治】产后血虚，风邪入中，牙关紧急，手足瘛疭，项强目直视，脉紧大者。

57083 **荆芥汤**

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】薄荷叶 荆芥穗 牛蒡子 甘草

各一两

【用法】上为粗末。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】小儿瘙痒成瘾疹者。

57084　**荆芥汤**

【方源】《魏氏家藏方》卷七引《李防御五痔方》。

【组成】荆芥不拘多少(生锉)

【用法】上为粗末，用水三两碗，入瓶内。先用枯药涂，再常常水煎，洗患处。如用了，依旧入瓶内用火煨之，可用三五次。

【主治】痔疮。

57085　**荆芥汤**

【方源】《三因》卷十六。

【异名】甘桔汤(《易简方》)、三神汤(《医方类聚》卷七十四引《济生》)、荆芥散(《医方类聚》卷七十四引《澹寮方》。

【组成】荆芥穗半两　桔梗二两　甘草一两

【用法】上为散。每服四钱，水一盏，加生姜三片，煎至六分，去滓温服。

【主治】风热壅肺，咽喉肿痛，语声不出，喉中如有物哽，咽之则痛甚。

57086　**荆芥汤**

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】地骨皮三两　何首乌三两　荆芥穗　苦参　海桐皮二两　草乌头一两

【用法】上㕮咀。生绢袋盛，用水三升，煎数沸，盛在盆内，乘热熏疮口，通手淋洗。挹干以后，四蜕散贴之。

【主治】臁疮。

【备考】方中荆芥穗、海桐皮用量原缺。

57087　**荆芥汤**

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】荆芥　脑荷　升麻　细辛各等分

【用法】上为末。每服二钱，以沸汤点，漱口含咽，并擦牙。

【主治】风热齿痛。

57088　**荆芥汤**

【方源】《得效》卷六。

【组成】荆芥　樗树皮各等分

【用法】上为散。治血崩，每服二钱，水一盏，煎至七分，去滓温服；如血痢，则为末，冷醋调，徐徐呷服；白痢，热醋调下。

【主治】白痢、血痢，或妇人血崩。

57089　**荆芥汤**

【方源】《医方类聚》卷一八三引《修月鲁般经》。

【组成】荆芥　好茶

【用法】上为散。水煎，洗痔。

【主治】痔疮。

57090　**荆芥汤**

【方源】《普济方》卷一八八引《经验良方》。

【组成】荆芥连根

【用法】上药洗净捣汁，半盏饮之；或以穗为末，熟水调，温服。

【主治】吐血、咯血，九窍出血。

57091　**荆芥汤**

《普济方》卷四十六。为《圣济总录》卷十五“除风荆芥汤”之异名。见该条。

57092　**荆芥汤**

《普济方》卷一〇七。为《圣济总录》卷十二“天麻丸”之异名。见该条。

57093　**荆芥汤**

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】荆芥　黄柏

【用法】先用上药煎汤，洗患处；后用黄白真蚌粉、荆芥、青黛为末，干掺疮上。

【主治】玉茎上生疮。

57094　**荆芥汤**

【方源】《普济方》卷三五〇。

【异名】独活汤。

【组成】荆芥　独活　防风各等分

【用法】上细锉。每服半两，水一盏半，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。如牙关紧，用白梅蘸脑子揉便开。

【主治】产后中风不省。

57095　**荆芥汤**

【方源】《医方类聚》卷七十三引《御医撮要》。

【组成】荆芥十穗 川椒七粒 盐一分

【用法】先以盐于铫子中炒，以水三大盏，煎十余沸，热含冷吐。

【主治】牙齿风，疼痛不可忍。

【宜忌】忌猪、鱼、酱、蒜、面、醋。

57096 荆芥汤

《医统》卷四十六。为《直指》卷八"荆苏汤"之异名。见该条。

57097 荆芥汤

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】荆芥 防风 薄荷 地肤子

【功用】辛凉散表。

【主治】表有湿热，腹胀大，身热，脉浮。

57098 荆芥汤

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【异名】金五(《痧症全书》卷下)、五号观象方(《杂病源流犀烛》卷二十一)。

【组成】荆芥 防风各一钱 川芎三分 陈皮 青皮 连翘各八分

【用法】用水二钟，煎至七分，稍冷服。

【主治】①《痧胀玉衡》：痧有郁气不通者。②《痧症全书》：阳痧，手足暖，腹痛者。

【加减】食不消，加山楂、莱菔子；心烦热，去川芎，加黑山栀；有积，加槟榔；痰多，加贝母、白芥子；气壅，加乌药、香附；血壅，加桃仁、红花；郁闷不舒，加细辛；食积，加三棱、莪术；大便不通，加枳实、大黄；暑热，加香薷、紫朴；小便不通，加木通、泽泻；喉痛，去川芎，加薄荷、射干、大力子；咳嗽，加桑皮、马兜铃。

57099 荆芥汤

【方源】《治痧要略》。

【组成】荆芥 陈皮 香附 枳壳 薄荷 红花各八分 郁金二分

【用法】水煎，稍冷服。

【主治】痧因于气郁者。

【加减】食滞，加莱菔子；痰多，加白芥子；气壅，加乌药；血壅，加桃仁、红花；心烦热，加山栀；伤暑，加青蒿、银花。

57100 荆芥汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十八。

【组成】荆芥 防风 朴消

【用法】先将上药煎汤，洗患处；次用木鳖子散调敷。

【主治】翻花痔，肿溃不堪者。

57101 荆芥汤

【方源】《名家方选》。

【组成】荆芥 麻黄各八分，桂枝

【用法】水煎，温服。

【主治】风疹，恶寒发热者。

【备考】方中桂枝用量原缺。

57102 荆芥汤

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】荆芥 防风 川芎 乌药 薄荷 藁本 桔梗 黄芩 苍耳子 石菖蒲

【主治】疹潮时被寒风吹入鼻内，热毒不散，结于肺窍，致鼻塞不闻香臭。

57103 荆芥饮

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】荆芥穗 栀子仁 黄芩(去黑心) 蒲黄各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓冷服，不拘时候。

【主治】呕血不止。

57104 荆芥饮

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】荆芥穗 旋覆花 前胡(去苗)各三两 芍药 半夏(生姜汁制，去毒) 甘草各一两(炙) 麻黄(去节，煎，掠去沫，焙)一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠感风冷，咳嗽痰壅，头目昏痛。

57105 荆芥饮

【方源】《医钞类编》卷七。

【组成】荆芥 茅花各一钱 当归 生地

各三钱　白芍二钱　辛夷五分　木通五分

【用法】水煎服。服后仰卧片时立止。

【主治】鼻衄不止。

57106　荆芥散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】荆芥一两　附子一两(炮裂,去皮脐)　前胡一两　麻黄二两(去根节)　甘草半两(炙微赤,锉)　白术一两　人参一两(去芦头)　陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)

【用法】上为末。每服四钱,以水一中盏,入生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓稍热服,不计时候。以衣覆出汗。

【主治】伤寒二日,头项强,四肢烦疼。

57107　荆芥散

【方源】《圣惠》卷十四。

【异名】荆芥汤(《圣济总录》卷二十九)。

【组成】荆芥三分　鸡肶胵　桑螵蛸二七个(微炒)　葱白二七茎　鼠一只(烧为灰,别细研)　薤白二七茎

【用法】上为细末,和匀。分为五服,以水一大盏,煎至五分,去滓,入鼠灰末半钱,搅令匀,温服,不拘时候。

【主治】伤寒后未平复合阴阳,为易病,气欲绝者。

57108　荆芥散

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】荆芥一两　牛蒡子三分(微炒)　蔓荆子半两　天麻半两　人参半两(去芦头)　黄芩三分　防风半两(去芦头)　乌蛇肉二两(酒浸,微炒)　独活半两　赤茯苓一两　苦参一两(锉)　枳壳半两(麸炒微黄,去瓤)

【用法】上为细散。每服二钱,用温酒调下,不拘时候。

【主治】风热皮肤瘙痒,生瘖瘟。

57109　荆芥散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】荆芥三分　细辛三分　石膏二两　前胡一两(去芦头)　枳壳二两(麸炒微黄,去瓤)　半夏半两(汤洗七遍去滑)　槟榔一两　赤茯苓一两　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,入生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】脚气,心神烦闷,四肢无力,膈上痰壅,口干头痛,不欲饮食。

57110　荆芥散

【方源】《圣惠》卷六十七。

【异名】荆芥汤(《圣济总录》卷一四四)。

【组成】荆芥一握　淡竹茹一鸡子大　当归一两(锉,微炒)　地黄汁一分

【用法】以水一大盏半,煎至七分,去滓,下地黄汁,分为二服,常于食前服之。

【主治】①《圣惠》:伤折,瘀血在内,烦闷刺痛。②《圣济总录》:伤损吐唾出血。

57111　荆芥散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】荆芥三分　芎䓖半两　人参三分(去芦头)　当归半两(锉碎,微炒)　白术三分　桂心三分(去苗)　防风半两(去芦头)　生干地黄三分　柴胡三分(去苗)　鳖甲三分(涂醋,炙令黄,去裙襕)　牡丹半两　赤芍药半两　枳壳三分(麸炒微黄,去瓤)　羚羊角屑三分　酸枣仁三分(微炒)　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,入生姜半分,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】妇人血风劳气,经脉涩滞,四肢拘急烦疼,不能饮食,渐加羸弱。

57112　荆芥散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】荆芥　黄耆(锉)　熟干地黄　当归(锉,微炒)　桑耳　地榆(锉)　樗白皮(微炙,锉)　皂荚刺(微炒)　干姜(炮裂,锉)　槐豆(微炒)　牛蒡子(微炒)　甘草(炙微赤,锉)各半两

【用法】上为细散。每服二钱,食前以粥饮调下。

【主治】妇人风虚,大便后时时下血。

57113　荆芥散

【方源】《史载之方》卷上。

【组成】荆芥穗一分 防风 芍药 诃子皮 羌活 甘草各一分 白蒺藜半两 厚朴十铢（去皮） 木香三铢

【用法】上为细末。每服三钱匕，以水一盏，加大枣一个，同煎，和滓服，不拘时候。

【功用】凉肝，轻益其胃。

【主治】飧泄，肝热刑脾而泄，肠鸣，腹支满，口胶渴，溲赤，六脉轻弦。

57114 荆芥散

【方源】《史载之方》卷上。

【组成】荆芥穗 连翘 羌活 牡丹皮 黄芩 杏仁 当归 芍药 山栀子 大黄（醋煮） 蔓荆子各一分

【用法】每服三钱，水一盏，加生姜一片，半夏末少许，同煎，取三四沸，食后和滓服。

【主治】肝涎与血相聚，两胁下非时气痛不安，如生积聚，腹中鼓动，摇闷不安，甚则生气块，上冲咽喉，头目俱迸，口舌胶粘，小便赤黄，冲心而痛，夜卧不安，脉洪大沉实而有骨力。

【加减】大府不甚秘，减大黄；若大府秘甚，酌量加服大黄末。

57115 荆芥散

【方源】《普济方》卷九十三引《护命方》。

【组成】荆芥穗 防风（去叉） 桑寄生 羌活（去芦） 独活（去芦） 芍药 干蝎（去土皮，炒） 白花蛇（酒炙，去皮骨） 天麻 附子（炮裂，去皮脐） 半夏（汤洗七次，炒） 麻黄（去根节） 木香 蔓荆实（去白皮） 芎䓖 白僵蚕（炒）各半两 龙脑（研） 沉香（研） 麝香（研） 丹砂（研）各半钱 牡丹皮 桂（去粗皮）各三钱

【用法】上为散。然后入砂、龙脑、麝香，再同研匀。每服二钱，食后浓煎生姜、薄荷汤调下。

【主治】中风瘫痪，肢节沉重，筋骨无力，闷倒不知，大腑热者。

57116 荆芥散

【方源】《伤寒总病论》卷二。

【组成】天南星 草乌头（肉白者，生用） 荆芥穗各半两 石膏一两

【用法】上为细末。每服二钱半，加陈茶一钱，生姜汁半呷，薄荷三叶，水两盏，煎至八分，温服，一日三次。

【主治】①《伤寒总病论》：伤寒头痛。②《局方》（续添诸局经验秘方）：伤寒头痛，鼻塞流涕，声重咽干，胸膈满闷，头痛如破。

57117 荆芥散

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】荆芥穗 麻黄（去根节，汤煮，掠去沫，焙） 羌活（去芦头） 独活（去芦头）各等分

【用法】上为细散。每服二钱匕，食后、临卧腊茶或温酒调下。

【主治】风瘙痒，搔之成疮。

57118 荆芥散

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】荆芥穗半两 乌头尖一分 雄黄（研）一钱 白僵蚕（直者，炒）一分

【用法】上为散。每服一钱匕，荆芥茶调下。每服药讫，卧少时。

【主治】风邪客阳经，头目重痛，及头面虚汗，连脑疼痛。

57119 荆芥散

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】荆芥穗一两 大黄二两（并生用）

【用法】上为散。每服二钱匕，温生姜蜜汤调下；未通再服。

【主治】大便不通。

57120 荆芥散

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】荆芥穗 当归（切，焙） 赤芍药各一两半 黄连（去须）一两

【用法】上为散。每服二钱匕，水一盏半，煎至一盏，滤去滓，热洗泪出为度。

【主治】肝气壅滞，热毒不得宣通，目急痒痛。

57121 **荆芥散**

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】干荆芥穗五两　干薄荷叶三两　木贼二两　蝉壳二两(洗去尘土,焙干)　蛇蜕皮一钱(炒黄,别研为细末)

【用法】上为末,次入蛇蜕皮末拌匀。每服一钱匕,腊茶或酒调下,不拘时候。

【主治】风毒上攻头目。

57122 **荆芥散**

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】荆芥穗　藿香叶各一两　芎䓖　莎草根(炒去毛)各二两　石膏(研如粉)一两半　龙脑(研)一钱

【用法】上为散。每服二钱匕,食后荆芥汤调下。

【主治】肺壅脑热,鼻渊不止。

57123 **荆芥散**

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】荆芥穗不拘多少

【用法】以瓦罐子盛,盐泥固济,只留一窍,用炭火烧,候出清烟,便拨去火,用湿泥塞了窍子,放冷取出,研为细散。每用末五钱匕,入麝香一钱匕,腻粉五钱匕,同研匀细,先以口含盐浆水抓洗令破,帛子揾了,生油调药涂患处。

【主治】多年湿癣。

57124 **荆芥散**

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】荆芥穗(陈者)　狗脊(去毛,锉)各一两

【用法】上为细末。每服二钱匕,浓煎木贼汤调下;若泻血甚者,加酸石榴皮等分为散,淡醋汤调下,不拘时服。

【主治】痔疾下血。

57125 **荆芥散**

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】荆芥(去茎)　枳壳(去瓤,麸炒)各一两

【用法】上为末,拌匀。每服二钱匕,入腊茶末一钱,以热汤点服,不拘时候。

【主治】①《圣济总录》:肠风。②《普济方》:脱肛。

57126 **荆芥散**

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】荆芥穗　当归(切焙)　续断　芎䓖(锉)各一两

【用法】上为散。每服二钱匕,温酒调下,不拘时候。

【主治】伤折风肿。

57127 **荆芥散**

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】荆芥穗　人参　白术　当归(切细,焙)　黄耆　芍药　桂(去皮)各一两　柴胡(去苗)二两　甘草(炙)半两

【用法】上为末。每服五钱,水二盏,煎至一盏,去滓温服。

【主治】荣卫虚弱,外为风邪相乘,翕翕发热,淅淅恶寒,无有时度,肢节如解,手足酸痛,头目昏晕,久不治成劳气者。

57128 **荆芥散**

《中藏经·附录》。为原书同卷"古卿古败散"之异名。见该条。

57129 **荆芥散**

【方源】《续本事》卷二。

【组成】荆芥　石膏(煅)各等分

【用法】上为细末。每服二钱,加生姜三片,连须葱白三寸,用水一盏,同煎至七分,食后服。

【主治】头风。

57130 **荆芥散**

【方源】《三因》卷十五。

【组成】荆芥穗　槐花(炒焦)各一两　石菖蒲一两半

【用法】上为末。每服二钱,食前米饮调下,一日二服。

【主治】脉痔下血。

57131 **荆芥散**

【方源】《杨氏家藏书》卷二。

【组成】荆芥四两　防风（去芦头）　白蒺藜（炒，去刺）　白僵蚕（炒去丝嘴）　杏仁（去皮尖，炒）　甘草（炙）各一两

【用法】上为细末。每服二钱，食后茶清调下。

【主治】肺风皶疱。

57132 **荆芥散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】荆芥穗　薄荷叶（去土）　细辛（去叶土）　甘草（炙）各等分

【用法】上为细末。每服二钱，茶调下；或用药五钱，水一大碗，煎三五沸，通口慢慢盥漱亦得。

【主治】风虫牙痛，牙槽浮肿。

57133 **荆芥散**

《卫生家宝产科备要》卷六。为《妇人良方》卷十九引华佗方“愈风散”之异名。见该条。

57134 **荆芥散**

【方源】《保命集》卷下。

【组成】小柴胡汤加荆芥穗五钱　枳壳五钱（麸炒，去瓤）

【用法】煎服。

【主治】产后经水适断，感于异证，手足牵搐，咬牙昏冒，服秦艽汤前证已退者。

57135 **荆芥散**

【方源】《保命集》卷下。

【组成】荆芥穗一两三钱　桃仁五钱（去皮尖，炒）

【用法】上为细末。每服三钱，温水调服。

【主治】产后风虚血眩，精神昏昧。

【加减】微喘，加杏仁（去皮尖，炒）、甘草（炒）各三钱。

57136 **荆芥散**

【方源】《百一》卷十四。

【异名】荆砂散（《仙拈集》卷二引《集简方》）。

【组成】荆芥穗　缩砂仁各等分

【用法】上为细末。每服三大钱，用糯米饮调下，不拘时候，一日三次。

【主治】①《百一》：肠风下血。②《仙拈集》引《集简方》：溺血。

57137 **荆芥散**

【方源】《妇人良方》卷一。

【组成】荆芥穗

【用法】用灯盏（多着灯芯），好麻油点灯，就上烧荆芥焦色，为细末。每服三钱，童便调下。

【主治】妇人崩中，连日不止。

57138 **荆芥散**

【方源】《妇人良方》卷五。

【组成】荆芥　雀脑芎各三两　当归　人参各半两　桂心　牡丹皮　羌活　防风　苦梗　大腹子　甘草　蒲黄　白茯苓　枳壳　厚朴　半夏　杏仁　款冬花各三分　附子（炮）　干地黄　鳖甲　白芍药　北柴胡　黄耆各一两　干姜　木香各半分　沉香一分

【用法】上为细末。每服二钱，加生姜三片，大枣一个，水一盏，煎至七分，温服。

【主治】血风诸般疾，产后诸疾。

57139 **荆芥散**

【方源】《朱氏集验方》卷十引梁国佐方。

【组成】荆芥根（瓦上焙干焦，存性）　茴香各等分

【用法】上为末。每服三钱，温酒调下。

【主治】血崩年深。

57140 **荆芥散**

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】荆芥　熟艾　木鳖子（去壳）各半两　寒水石（煅）三钱

【用法】上㕮咀。每用半两，入橘叶四十九片同煎，令香熟，却以有盖桶子，于盖子上开口，倾药汁在内，乘热熏；稍温，则以手浇水，略略洗之。仍留汁更可用一次。

【主治】痔疮。

57141 **荆芥散**

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】荆芥穗　当归　赤芍药各一两　黄连二两

【用法】上为粗末。每用二钱，水二盏，煎三沸，滤去滓，热洗眼。

【主治】肝塞滞，热毒不可宣通，目急痒痛。

57142　荆芥散

《医方类聚》卷七十四引《济衮方》。为《三因》卷十六"荆芥汤"之异名。见该条。

57143　荆芥散

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】陈皮(去白)　麻黄(去节)　香附子　甘草各一两　荆芥穗　厚朴各二两　草果仁三个　白芷　桂心各半两

【用法】上为粗末。每服四钱，加生姜三片，大枣二个，水煎服。

【主治】时气风温，寒热瘴疟，往来潮热。

57144　荆芥散

【方源】《医学纲目》卷三十七。

【组成】防风　天花粉　羌活　生地黄　当归　蝉蜕各等分

【用法】水煎服。

【主治】小儿赤丹。

【备考】本方名荆芥散，但方中无荆芥，疑脱。

57145　荆芥散

《普济方》卷四十。即《直指》卷十四"香荆散"。见该条。

57146　荆芥散

【方源】《奇效良方》卷六十五。

【组成】荆芥少许

【用法】烂研，用新井水以布帛滤过，入麻油一滴许打匀，令饮之，便不乱闷；麻豆已出，用黄蜡煎青胶(即牛皮胶)饮，即安。

【主治】麻痘子兼瘙痒或瘾疹，大便自通。

【方论选录】荆芥治血风；以麻油打匀，此滑窍之理；又以黄蜡煎青胶水服则安，此滋血行荣卫，荣卫既顺，麻疹出矣。

57147　荆芥散

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】防风　荆芥　升麻　甘菊　木通　黄芩(炒)　羌活　甘草　蔓荆子

【用法】水煎服。

【主治】风热上壅，耳闭塞或耳鸣及出脓。

57148　荆芥散

【方源】《赤水玄珠》卷十五。

【组成】荆芥穗一两　朴消二两

【用法】用萝卜、葱同煎汤，洗患处。

【主治】肾肿。

57149　荆芥散

【方源】《疡科选粹》卷二。

【组成】木鳖仁　当归头　甘草节　大黄各一钱　荆芥穗二钱

【用法】上为细末。酒、水各半煎成，空心饮之。即下积，以粥汤补止。

【功用】攻里。

【主治】背疮毒深者。

57150　荆芥散

【方源】《济阳纲目》卷四十四。

【组成】荆芥穗(微炒)

【用法】上为末。每服三五钱，再以大豆黄卷用热酒沃之，取汁调下。

【主治】新产血虚发痉，及汗后中风发热者。

57151　荆芥散

【方源】《济阳纲目》卷五十九。

【组成】荆芥(烧灰，置地上出火毒)

【用法】上为末。每服三钱，陈米汤调下。

【主治】酒色伤心肺，口鼻俱出血。

57152　荆芥散

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】生地五钱(炒炭)　荆芥五钱(炒灰)　白芍一钱半(醋炒)　白术一钱半(炒炭)　当归三钱(醋炒)　木香一钱　茯苓一钱半　血余灰三钱　败棕灰三钱　荷叶三钱(炒黑)

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】劳伤挟风邪而冲任不调，经血失守，崩漏腹痛，脉弦浮数者。

【加减】血热，加丹皮灰；血滞，加延胡灰；血中气滞，加香附炭(醋炒)；血气虚脱，加赤

石脂（醋煅）；咳嗽，加桑皮；气虚，加人参；阴血虚，加阿胶珠（蒲黄灰炒），胃中寒，加炮姜炭（淡盐水炒）。

【方论选录】生地炭凉血滋血，兼去血中之湿以止血；荆芥灰和血疏风，能去经络之湿以抚血；当归身养血归经；白芍药敛阴和血；白术炭健脾燥湿；广木香调气醒脾；血余灰去瘀生新以除漏；败棕灰涩血固经以定崩；白茯苓渗湿和脾；荷叶灰升阳止血。血热加丹皮灰以凉血止血；血滞加醋炒香附炭，以调血中之气，亦兼止血；血气滑脱，加醋煅赤石脂，以涩滑脱之血，最能固下；咳嗽加桑皮以肃金气；虚加人参以扶元阴；血虚加阿胶以补任脉之阴，蒲黄灰炒以止冲脉之血；胃中寒加炮姜以缓中宫之冷，淡盐水炒以摄虚阳之动，且能坚肾以固冲任之虚脱也。

57153 **荆芥散**

【方源】《异授眼科》。

【组成】荆芥 蔓荆子 白菊 白芍 香附 苍术（炒） 草决明（炒） 甘草各等分

【用法】上为细末。每服一钱，黑豆汤送下。另点虎液膏。

【主治】肝经风邪，致目遇风作痒。

57154 **荆芥粥**

【方源】《养老奉亲》。

【组成】荆芥一把（切） 青粱米四合（淘） 薄荷叶半握（切） 豉五合（绵裹）

【用法】以水煮取荆芥汁，下米及诸味煮作粥，入少盐醋，空心食之。常服佳。

【主治】老人中风，口面㖞偏，大小便秘涩，烦热。

57155 **荆苏汤**

【方源】《直指》卷八。

【异名】荆芥汤（《医统》卷四十六）。

【组成】荆芥 苏叶 木通 橘红 当归 桂 石菖蒲各等分

【用法】上锉。每服四钱，水煎服。

【主治】失音。

57156 **荆沥方**

【方源】《千金》卷八。

【异名】竹沥汤（《金匮翼》卷一）。

【组成】荆沥 竹沥 生姜汁各三合

【用法】上药相和暖之，为一服，每日旦服煮散，午后服此。平复愈后乃止。

【功用】《千金方衍义》：治风逐湿祛痰。

【主治】①《千金》：患风，多热。②《圣济总录》：偏风不随，心中烦闷，言语謇涩。

【备考】本方方名，《医方类聚》引作“荆沥汤”。《圣济总录》本方用法：三味相和再暖，每服三合，以酒调下。

57157 **荆沥方**

【方源】《千金》卷十四。

【组成】荆沥二升 白鲜皮 茯神各三两 人参二两 白银十两（以水一斗，煮取三升）

【用法】上㕮咀。以荆沥入银汁中煮取一升四合，分三次服，相去如人缓行十里，进一服。

【主治】风气内动，心虚惊悸不定，羸瘦。

【方论选录】《千金方衍义》：惊悸虚羸多由风气内动，虽用人参益气，茯神安神，然必首推荆沥治风逐湿，解热消痰，佐以白鲜皮兼祛肌表风热。白银煮汤煎服以镇心肺之怯也。

【备考】本方方名，《普济方》引作“荆沥汤”。

57158 **荆沥汤**

【方源】《千金》卷八。

【组成】荆沥三升 麻黄 白术 芎䓖各四两 防风 桂心 升麻 茯苓 远志 人参 羌活 当归各二两 母姜一升（切，取汁） 防己 甘草各二两

【用法】上㕮咀。以水一斗五升，煎麻黄两沸，去沫，次下诸药，煮取三升，去滓，下荆沥、姜汁，煎取四升，分四次服，日三夜一。

【主治】心虚寒。阴气伤寒损心，惊掣悸，语声宽急混浊，口㖞，冒昧，好自笑，厉风伤心者。

【方论选录】《千金方衍义》：本方虽用荆沥清火涤痰为君，姜汁开导经络为佐，全赖参、

甘维持胃气，运行药力，桂心鼓动于中，麻黄开发于外，升麻提系于上，防己引泄于下，远志通达心经，又以苓、术匡佐人参，羌、防辅弼麻黄，芎、归协济桂心，统摄荆沥、母姜，共襄涤痰祛风活血之功。所谓治风先治血，血行风自灭也。

57159 **荆沥汤**

【方源】《普济方》卷八十九引《指南方》。

【组成】牛黄三分(别研) 人参 麦门冬(去心)各二两 升麻 铁精各一两(别研) 龙齿 茯苓 天门冬(去心) 栀子仁各二两

【用法】上除牛黄、铁精外，余药为末。每服五钱，水二盏，入竹沥、荆沥各一合，煎一盏，去滓，入牛黄、铁精各一匙，再煎一两沸，温服。

【主治】①《普济方》引《指南方》：中风，虚热狂言，恍惚惊悸。②《鸡峰》：诸风疾有热者，及风痉疾。

57160 **荆沥汤**

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】荆沥 竹沥 生葛汁各一升 生姜汁三合

【用法】上药和匀去滓，瓷器中煎三五沸，每服一盏，平旦、日午、晡时、夜卧各一服。服讫觉四体有异，以次更服防风汤。

【主治】初得中风，四肢不收，心神昏愦，眼不识人，不能言语。

57161 **荆沥汤**

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】荆沥(旋入) 麦门冬(去心，生用)二两 地骨皮(刮洗，焙)二两 人参一两 白茯苓(去黑皮)一两 栀子仁一两 甘草(炙)一两半 黄芩(去黑心)一两 芎䓖一两 桂(去粗皮)一两 细辛(去苗叶)一两 杏仁(汤浸，去皮尖双仁，炒)一两 豉(炒微干)一合半 防风(去叉)一两 海桐皮一两 石膏一两半 竹沥(旋入)

【用法】上除荆、竹沥外，㕮咀如麻豆大。每服十二钱匕，以水四盏，加生姜一分(切)，煎取二盏，去滓，入荆、竹沥各一合，更煎五沸，分四次服，日三夜一，间食服之良。

【主治】中风半身不随，心虚风热，发即恍惚烦闷，筋脉挛急。

57162 **荆沥汤**

《普济方》卷十八。即《千金》卷十四“荆沥方”。见该条。

57163 **荆沥汤**

《医方类聚》卷十五。即《千金》卷八“荆沥方”。见该条。

57164 **荆实汤**

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】荆实(揉去白皮)一两半 芎䓖半两 防风(去叉)半两 酸枣仁(炒)半两 薏苡仁(炒)一两半 犀角(镑)三分 桑根白皮(锉)一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一枣大，拍碎，煎至八分，去滓，空心、日午、临卧温服。以愈为度。

【主治】首风颈项紧急，骨节疼痛。

57165 **荆枳汤**

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】荆芥穗 枳壳(炒) 槐花 香附 紫苏茎叶 甘草(炙)各等分

【用法】上为末。每服二钱，米汤调下。

【主治】气滞发痔。

57166 **荆砂散**

《仙拈集》卷二引《集简方》。为《百一》卷十四“荆芥散”之异名。见该条。

57167 **荆神饮**

【方源】《解围元薮》卷四。

【组成】荆芥穗四两

【用法】水五六碗，煎去三分之二，滤清服；又以一斤煎汤，先熏后洗。不过三四次即愈。

【主治】疠疮初起。

57168 **荆荷散**

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】荆芥 薄荷各等分。

【用法】上为末。童便、酒冲服。

【主治】产后中风。

57169 **荆菊酒**

【方源】《元和纪用经》。

【组成】蔓荆实 甘菊 地骨皮 术

【用法】上药各以绢袋盛，纳酒中，春、秋三日，冬七日。每服温一两盏。大益人。

【主治】损心虚寒，头痛，性气反常，语声冒昧，关节不利，心手不遂，骨间寒热，目中泪出，齿发不荣。

【宜忌】忌桃、李、雀、鸽、乌头、石膏。

57170 **荆菊散**

【方源】《元和纪用经》。

【组成】蔓荆实(去萼) 甘菊各三两 地骨皮 术各六两

【用法】上为末。每服方寸匕，酒调服。

【主治】损心虚寒，头痛，性气反常，语声冒昧，关节不利，心手不遂，骨间寒热，目中泪出，齿发不荣。

57171 **荆黄汤**

【方源】《医方大成》卷七引《局方》。

【组成】荆芥四两 大黄一两。

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一盏，煎六分，空心服。

【主治】①《医方大成》引《局方》：风热结滞，或生疮疖；风热上壅，脏腑实热，咽喉肿痛，大便秘结。②《得效》：恶疮生背胁、头脑、四肢要害处。

【宜忌】非实热不可服。

57172 **荆黄汤**

【方源】《保命集》卷中。

【组成】荆芥穗一两 人参五钱 甘草二钱半 大黄三钱

【用法】上为粗末，都作一服。水一盏，煎至一盏，去滓，调槟榔散二钱，空心服。

【主治】①《保命集》：上焦气热所冲，暴吐，脉洪而浮者。②《疡科选粹》卷六：心经之火郁于肺经，干疥搔痒，皮枯屑起，便秘者。

57173 **荆黄汤**

【方源】《袖珍》卷二引张子和方。

【组成】大黄 荆芥穗 防风各等分

【用法】上为粗末。水煎，去滓服。以利为度。

【主治】头目眩晕。

57174 **荆黄汤**

《内经拾遗》卷二。为《宣明论》卷十五“倒换散”之异名。见该条。

57175 **荆黄汤**

【方源】《普济方》卷三九二。

【组成】枳壳 大黄 荆芥 朴消 栀子 甘草各等分

【用法】上为末。每用一钱，灯心汤调服，一日二三服。立下。

【主治】小儿气闭不通，脏腑痞结。

57176 **荆黄汤**

【方源】《疡科选粹》卷六。

【组成】荆芥穗五钱 人参二钱五分 大黄一钱五分 甘草一钱 槟榔一钱五分 木香七分五厘 轻粉五厘

【用法】槟榔以后三味为细末，荆芥穗等四味水煎，去滓，调末服。

【主治】心经之火郁于肺经，干疥瘙痒皮枯，屑起，便秘者。

57177 **荆黄散**

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】麻黄(去根节)一分 细辛(去叶土) 全蝎(去毒，炒) 藿香叶各半两

【用法】上为细末。每服一钱，荆芥汤调下，不拘时候。

【主治】偏正头疼，及洗头伤风。

57178 **荆黄散**

【方源】《明医指掌》卷五。

【组成】荆芥二钱 人参一钱 甘草五分 大黄六分

【用法】上锉一剂。水煎，调槟榔末一钱，磨木香五分，温服。

【主治】上焦气热所冲之暴吐。

57179 **荆槐散**

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】荆芥穗　槐花(炒)　枳壳(麸炒,去瓤)　黄耆(锉)各等分

【用法】上为末。每服二钱匕,米饮调下,不拘时候。

【主治】鼠乳牡痔,便血,疼痛不可忍者。

57180　**荆槐散**

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】槐花　荆芥穗各等分

【用法】上为末。擦牙;另煎点服。

【主治】牙宣出血,或痛。

57181　**荆三棱散**

【方源】《卫生总微》卷十七。

【组成】荆三棱(炮)　斑猫(去足并翅)各等分

【用法】上为细末。每服半钱,米饮调下。

【主治】小儿疝气偏坠,一大一小。

57182　**荆三棱散**

【方源】《普济方》卷一七一。

【组成】荆三棱(煨,锉)　蓬莪术(煨,锉)各二两　益智(去皮,炒)　缩砂仁　槟榔(锉)　青橘皮(汤浸,去白,焙)　丁香　姜黄各半两

【用法】上为散。每服二钱,沸汤点服,不拘时候。

【主治】积聚,心腹胀满,醋心,呕吐冷痰,不思饮食。

57183　**荆三棱散**

【方源】《普济方》卷一七二。

【组成】荆三棱一两(煨,锉)　桂心三分　丁香半分　益智三分(去皮)　木香五钱　大腹皮一两(锉)　前胡一两(去芦)　白术二分　厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟)　干姜半两(炮裂,锉)　蓬莪术二分　郁李仁一两(汤浸,去皮,微炒)　青橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)　赤茯苓一两　川大黄一两(锉碎,微炒)

【用法】上为粗散。每服三钱,水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓,食前稍热服。

【主治】积聚气,脾胃虚弱,不能化谷,及宿食不消,腹胁痛。

57184　**荆三棱散**

【方源】《普济方》卷三四九。

【组成】荆三棱　熟地黄　鳖甲各一两　桂心　当归　桃仁各三分　川芎　牡丹皮　刘寄奴　赤芍药各半两　大黄(炒)　牛膝三分

【用法】上为粗末。每服三钱,水一大盏,加姜黄三片,煎至七分,去滓温服。

【主治】产后积血不散,结聚成块,或时寒热,不思饮食。

57185　**荆芥饮子**

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】荆芥一两　川大黄二两(锉碎,微炒)　芎䓖一两　蒲黄一两　当归二两(锉,微炒)　桂心一两　甘草半两(炙微赤,锉)　䗪虫三十个(去翅足,微炒)　桃仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸微炒黄)

【用法】上锉,分为十服。每一服以水一大盏,煎至五分,去滓,食前温服。候下尽恶血为度,后服补益丸散。

【主治】伤损后腹中疼痛,瘀血不出,令人短气,大小便不通。

57186　**荆芥洗剂**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】荆芥9克　防风9克　枫子仁9克　土槿皮9克　五骨皮9克　地骨皮9克　皂角10克　陈醋500毫升

【用法】用时加温,每日或隔日泡手足二三小时,连续二三周,泡后可上西药(苯甲酸6克,水杨酸12克,凡士林加至100克)

【主治】手足癣。

57187　**荆芥煮散**

【方源】《传家秘宝》卷中。

【组成】荆芥　旋覆花各四两　前胡　甘草(炙)　麻黄(去根节)　芍药　川芎　半夏各一两

【用法】上为末。每服二钱,用水一大盏,加

葱白、薄荷，同煎至七分，温温服之。

【主治】风痹，头目昏眩，四肢烦疼。

57188 **荆芥穗汤**

【方源】《慈幼新书》卷一。

【组成】川黄连 荆芥穗 生地黄 生甘草

【用法】与指迷七气汤（去桂，加大黄、钩藤、僵蚕）同用。

【功用】疏利郁结。

【主治】小儿胎气兼风邪入脐，致患撮口，气息喘急，啼声不出，或肚上青筋，吊疝内气引痛。

【加减】大便秘，加大黄；小便少，加木通。

57189 **荆芥穗散**

【方源】方出《妇人良方》卷八，名见《普济方》卷三二一。

【组成】荆芥穗 黄耆 熟地黄 当归 桑耳 地榆 樗白皮 皂角刺 干姜 槐豆 牛蒡子 甘草各等分

【用法】上为细末。每服二钱，空心粥饮调下。

【主治】妇人肠风，酒痢。

57190 **荆芥穗散**

【方源】《普济方》卷三五〇。

【组成】荆芥穗 熟干地黄各二两

【用法】上为细末。每服六钱，温服，不拘时候。

【主治】产后中风，或口噤，或角弓，或狂言如见鬼，或搐搦如痫，及一切风血。

57191 **荆沥饮子**

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】荆沥三合 生葛根汁二合 蜜一匙 竹沥三合

【用法】上药相和令匀，温服二合，不计时候。

【主治】中风失音不语，手足转动不得。

57192 **荆沥饮子**

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】荆沥三合 竹沥三合 梨汁三合

【用法】上药相合令匀，令温，分两次灌之。

【主治】妊娠中风痉，口噤。

57193 **荆沥饮子**

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】荆沥二合 生葛根汁一合 蜜一匙 竹沥二合 生地黄汁一合

【用法】上药相和令匀，温服半合，不拘时候。

【主治】小儿中风，失音不语，手脚不能转动，心神烦热。

57194 **荆蓬煎丸**

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】荆三棱二两（锉，酒浸，冬三日，夏一日） 蓬莪术二两（锉，醋浸，冬三日，夏一日，上二味用去皮巴豆二十斤，同于银石器内用文武火炒令干黄色为度，拣去巴豆不用） 木香 枳壳（麸炒，去瓤） 青皮（汤浸，去白） 川茴香（微炒） 槟榔（锉）各一两

【用法】上为细末，水煮面糊和丸，如豌豆大。每服30丸，食后温生姜汤送下。

【功用】破痰癖，消癥块，通利三焦，升降阴阳，顺一切气，消化宿谷。

【主治】冷热积聚，胃膈痞闷。

57195 **荆三棱煎丸**

【方源】《普济方》卷一六八引《博济》。

【组成】荆三棱（煨，锉） 蓬莪术（煨，锉） 芫花（醋炒焦） 半夏（汤洗七次，焙） 青橘皮（去白，炒）各一两 硇砂（去石，研） 附子（炮裂，去皮脐） 桂（去粗皮） 延胡索（醋炒） 大戟（腻粉调，酒炙） 干漆（炒烟出） 猪牙皂（去皮子，炙） 五灵脂各半两

【用法】上为末，分作三份。用好醋三升，入药二份，熬成膏，再入一份，和丸如绿豆大。每服五丸，食后生姜汤送下。

【主治】五积六聚，血气块，聚散不定，及一切气积不和。

57196 **荆三棱煎汤**

《普济方》卷一七一。即《圣济总录》卷七十二“京三棱汤”。见该条。

57197 **荆防二妙丸**

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】荆芥 防风 苍术 黄柏

【主治】外感痿症。阳明经下部湿热，下肢瘫痪，痿弱不能举动，关节重痛，脉沉数者。

57198 **荆防五苓饮**

【方源】《穷乡便方》。

【组成】荆芥七分 防风 泽泻各一钱 柴胡八分 木通 甘草各三分 赤茯苓 猪苓各一钱五分

【用法】加生姜三片，空心服。

【主治】夏日疫病。

【加减】虚者，加人参三分。

57199 **荆防五积散**

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】苍术二钱(米泔浸透) 荆芥 防风 陈皮各一钱 厚朴(姜汁炒) 桔梗 枳壳(麸炒) 当归(酒洗) 干姜 白芍(酒炒) 茯苓各八分 白芷 川芎 半夏(铿) 肉桂各七分 甘草六分

【用法】加生姜三片，葱三茎，醋、水各半煎服。先服独行散，次服荆防五积散一二剂。

【主治】崩漏初起。

57200 **荆防化瘆汤**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】荆芥9克 防风9克 白芷9克 白鲜皮15克 炒牛蒡子9克 苦参12克 蝉蜕9克 地肤子9克 茯苓6克 甘草9克

【用法】水煎，内服。

【主治】荨麻疹。

57201 **荆防牛蒡汤**

【方源】《金鉴》卷六十六。

【组成】荆芥 防风 牛蒡子(炒，研) 金银花 陈皮 花粉 黄芩 蒲公英 连翘(去心) 皂刺各一钱 柴胡 香附子 甘草(生)各五分

【用法】上用水二钟，煎至八分，食远服。

【主治】外吹乳初起。因乳母肝胃气浊，更兼于吮乳睡熟，鼻孔凉气袭入乳房，与热乳凝结，以致乳房肿痛，寒热往来，烦躁口渴者。

57202 **荆防平胃散**

【方源】《症因脉治》卷三。

【异名】荆芥防风汤(原书卷四)。

【组成】荆芥 防风 苍术 厚朴 陈皮 甘草

【主治】外感痿症。阳明经上部风湿，上肢瘫痪，痿弱不能举动，关节重痛，热气甚，脉浮数者。及风气霍乱，内兼食滞者。

57203 **荆防甘桔汤**

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】荆芥 防风 桔梗 甘草 薄荷

【主治】风热痰嗽，脉浮数者。

57204 **荆防四物汤**

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】荆芥6克 防风3克 酒生地15克 当归12克 酒白芍9克 川芎3克

【功用】养血活血除风。

【主治】真睛破损。伤眼剧痛，羞明难睁，流泪或流血，视物不清，重者不能见物。

【方论选录】方中四物汤养血活血，以补伤后之虚，行血脉之瘀；荆芥、防风除风以祛来乘之邪。此方久服，既有助于损伤的恢复，又能防止变生他疾。

57205 **荆防生地汤**

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】防风 荆芥各一钱 赤芍 生地 银花各八分 木通五分 甘草三分

【主治】身痒难忍者。

57206 **荆防白菊散**

【方源】《青囊全集》卷上。

【组成】荆芥一钱五分 防风一钱五分 白菊三钱 西羌一钱五分 姜虫一钱五分(炒) 归尾三钱 赤芍一钱五分 谷精一钱五分 粉草五分 蛇退一条(焙枯，研)

【功用】散肿除痛。

【主治】眼目外伤。

57207 **荆防发表汤**

《痘疹定论》卷四。为《活幼心法》卷二“防风

发表汤”之异名。见该条。

57208 **荆防地黄汤**

【方源】《验方新编》卷十。

【组成】荆芥一钱 熟地四钱 山药二钱 丹皮 防风 云苓 山萸 生甘草各一钱

【用法】加生姜二大片为引，并加黄酒冲服三四剂。

【功用】补血散毒。

【主治】小儿痘疮初起，血虚不易灌浆者。

57209 **荆防芎苏散**

《方剂辞典》引《济生》。即原书“芎芷香苏散”加荆芥、防风。见该条。

57210 **荆防安胎散**

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】人参 当归（酒洗） 白术（土炒）各三钱 生地 天麻各二钱 麦冬一钱（去心） 条芩八分 荆芥 防风各三分 陈皮 甘草各四分

【用法】水煎服。

【主治】孕妇破伤失血，或吐衄血，忽患口噤、项强、背直之类中风证者。

57211 **荆防灵仙散**

【方源】《青囊全集》卷上。

【组成】荆芥一钱五分 防风一钱五分 灵仙三钱 川芎一钱 当归三钱 藁本二钱 薄荷八分 羌活一钱五分 陈皮一钱 白芷一钱五分 乳没一钱五分 僵虫一钱五分 粉草八分

【主治】外伤头痛顶疼。

57212 **荆防败毒散**

【方源】《医学正传》卷八。

【异名】消风败毒散（《医学六要·治法汇》卷五）。

【组成】柴胡 甘草 人参 桔梗 川芎 茯苓 枳壳 前胡 羌活 独活 荆芥穗 防风各四分

【用法】上细切，作一服。用水一盏，煎至七分，温服；或加薄荷五叶。

【功用】①《景岳全书》：发散痘疹。②《金鉴》：疏解寒热。

【主治】痈疽疮疡初起，发热，脉浮数，及水肿邪在表者。

①《医学正传》：伤寒温毒发斑重者。②《外科理例·附方》：一切疮疡时毒，肿痛发热，左手脉浮数者。③《景岳全书》：痘疹，及时气风毒邪热。④《法律》：风水、皮水，凡在表宜从汗解者。⑤《医方集解》：肠风下血清鲜者。⑥《金鉴》：脑疽、甘疽、赤白游风、疥疮初起有表证，虚者。

【临证举例】耳目赤肿《准绳·疡医》：一人耳面赤肿作痛，咽干发热，脉浮数。先以荆防败毒散二剂，势退大半，又以葛根牛蒡子汤四剂而痊。

【备考】《医学六要·治法汇》有生姜三片。

57213 **荆防败毒散**

【方源】《外科心法》卷七。

【组成】芎藭 茯苓 枳壳 前胡 柴胡 羌活 独活 荆芥 防风各一钱

【用法】每服一两，水煎服。

【主治】小儿黄水疮，瘰疮。

【临证举例】①黄水疮 一小儿头面患疮数枚，作痒，出水，水到处皆溃成疮，用绿豆粉、松香为末，香油调敷，饮以荆防败毒散而愈。②瘰疮 一小儿头面胸腹患水泡数枚，溃而成疮。此因风邪乘于皮肤而然。饮荆防败毒散，更以牛粪烧存性为末敷之而愈。

57214 **荆防败毒散**

【方源】《摄生众妙方》卷八。

【组成】羌活 独活 柴胡 前胡 枳壳 茯苓 防风 荆芥 桔梗 川芎各一钱五分 甘草五分

【用法】上用水一钟半，煎至八分，温服。

【主治】①《摄生众妙方》：疮肿初起。②《金鉴》：血风，遍身骚痒之疹；风温汗少者；及痘夹瘾，毒火郁遏，伤于阴血，血热相搏，浮游之火散布皮肤之间，与痘相类而出，片片如云头突起者。

【临证举例】接触性皮炎 《吉林中医药》

(1986;2:28):李某某,男,35 岁。因搬运六六粉,出现头面皮肤瘙痒,灼热,搔后出现米粒或黄豆大小皮疹,一天后遍及上半身,并渗出黄水,伴恶寒发热,心烦,经治而愈。五个月后上症复发,而额、背部出现李子大脓疮,红肿焮痛,用抗生素、激素类药均无效。舌质稍红,苔厚白、脉浮。用上方加土茯苓煎汤内服,外用苍耳草、苦参、蛇床子煎汤熏洗,日二三次,十七剂后症状全愈。九年后随访未复发。

57215　荆防败毒散

【方源】《直指·附遗》卷三引《伤寒蕴要全书》。

【组成】独活　前胡　人参　茯苓　川芎　枳壳　桔梗　甘草　荆芥　牛蒡子　薄荷各一钱　防风一钱半　羌活一钱

【用法】上㕮咀。水煎服。

【主治】瘟疫。

【加减】内热,加黄芩一钱;口渴,加天花粉一钱。

【备考】《瘟疫论》有柴胡一钱。

57216　荆防败毒散

【方源】《医统》卷九十一。

【组成】荆芥　防风　羌活　独活　柴胡　前胡　川芎　桔梗　枳壳　天麻　地骨皮各等分

【用法】水煎服。微汗热退为佳。

【主治】小儿痘疹始终热毒之甚者。

【加减】初出不快,加紫草、紫苏、姜蚕、葱白;泄泻、加猪苓、泽泻,去紫草;热胜谵语,烦渴,加辰砂六一散调服。

57217　荆防败毒散

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】穿山甲　甘草　红花　羌活　当归　川芎　赤芍　生地　银花　荆芥　防风　木通　枳壳　乌药　天花粉各一钱　槐米末二钱　牛胶五钱

【主治】便毒,初起之时,寒热交作,两腿牵绊肿起,不能屈伸。

57218　荆防败毒散

【方源】《幼科指南》卷下。

【组成】生地　防风　荆芥　红花(酒洗)　黄芩　连翘　牛蒡子　升麻　玄参　黄柏(酒炒)　桔梗　人参　甘草

【用法】水煎服。

【功用】清热解毒。

【主治】小儿麻疹发热,面燥腮赤,目胞亦赤,呵欠烦闷,乍寒乍热,咳嗽喷嚏,手足稍冷,惊悸多睡。

57219　荆防败毒散

【方源】《回春》卷八。

【组成】防风　荆芥　羌活　独活　柴胡　前胡　薄荷　连翘　桔梗　枳壳　川芎　茯苓　金银花　甘草

【用法】上锉。加生姜,水煎,疮在上,食后服;在下,食前服。

【功用】散毒。

【主治】痈疽疔肿,发背乳痈,憎寒壮热,甚者头痛拘急,状似伤寒,一二日至四五日者。

【加减】大便不通,加大黄、芒消;热甚痛急,加黄芩、黄连。

57220　荆防败毒散

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】人参　赤茯苓　羌活　独活　前胡　薄荷　柴胡　枳壳　川芎　桔梗各等分　甘草减半　牛蒡子　防风　荆芥　连翘　金银花

【主治】余毒痈肿。

【加减】病在头,加白芷、升麻;上身,倍加桔梗;手,加薄桂;腰,加杜仲;腿足,加牛膝、木瓜。

【备考】方中牛蒡子、防风、荆芥、连翘、金银花用量原缺。

57221　荆防败毒散

【方源】《医部全录》卷四二〇引《幼科全书》。

【组成】生大黄　防风　荆芥穗　酒红花　牛蒡子　升麻　元参　人参　桔梗　酒芩　酒柏　甘草

【用法】水煎服。

【主治】小儿诸热。

57222 荆防败毒散

【方源】《医略六书》卷二十一。

【组成】荆芥一两半 防风一两半 桔梗八钱 枳壳一两半(炒) 茯苓一两半 大力子三两(炒) 蝉衣一两半 橘红一两半 甘草八钱

【用法】上为散。每服三钱,水煎,去滓温服。取汗。

【功用】散风清膈。

【主治】风毒内攻,清肃之气不行,故耳窍被扰,耳内作痒,脉浮数者。

【方义】荆芥散血分之风;防风散气分之风;桔梗清利咽膈以清耳窍;枳壳破滞化气以平逆气;茯苓清治节,甘草和中气,大力子疏风解热,广橘红利气除痰,净蝉衣轻扬解散,善蜕皮肤,肃清耳窍,耳痒有不退者乎。

57223 荆防败毒散

【方源】《幼幼集成》卷四。

【组成】荆芥穗 北防风 净连翘 陈枳壳 绿升麻 南薄荷 川羌活 川独活 粉干葛 川木通 金银花 片黄芩 正川芎 黑栀仁 炙甘草各一钱

【用法】上身肿,加葱三茎,下身肿,加灯芯十茎,水煎服。

【主治】小儿疮疥毒气内陷,肚腹作肿。

57224 荆防败毒散

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】荆芥 粉草 连翘 川芎 羌活 独活 五加皮各七分 角刺 穿山甲(炒) 归尾 防风 苍术 酒防已 地骨皮各一钱 白鲜皮 金银花各一钱三分 土茯苓一两

【用法】水煎,加酒,食后服。

【主治】耳后忽然肿痛,兼发寒热表证者,及杨梅疮初发者。

57225 荆防败毒散

【方源】《痘疹会通》卷五。

【组成】荆芥 防风 薄荷 连翘 甘草 桔梗 蝉蜕 前胡 花粉

【用法】加灯心、竹叶,水煎服。

【主治】麻疹初起。

57226 荆防败毒散

【方源】《白喉全生集》。

【组成】防风三钱(去芦) 柴胡(去芦) 僵蚕(姜汁炒) 法夏(姜汁炒) 桔梗 前胡 独活各二钱 荆芥 羌活 银花各一钱五分 枳壳 粉草各一钱 生姜三片

【用法】水煎服。

【主治】白喉初起,白见于关内或关外,色必明润而平,满喉淡红微肿略痛,头痛,恶寒发热,饮食如常,舌苔白,二便和,寒邪尚在表者。

57227 荆防败毒散

【方源】《医方简义》卷四。

【组成】荆芥 防风 薄荷 桔梗各一钱五分 元参 牛蒡子(炒)各三钱 人中黄 象贝母 射干 黄芩(炒)各一钱

【用法】加竹叶二十片,青果两个,水煎服。

【主治】时毒。风邪上干肺胃,致咽喉肿痛,两颐发肿,身有寒热。

【宜忌】忌食生冷等物,恐阻肺气,变幻莫测也。

57228 荆防败毒散

【方源】《青囊全集》卷下。

【组成】荆芥一钱五分 防风二钱 羌活一钱 独活八分 前胡一钱五分 柴胡一钱 桔梗一钱 元参二钱 茯苓一钱 川芎一钱 白芷二钱 草节五分 皂刺一钱五分

【用法】野菊为引。

【主治】疔疮,憎寒壮热者。

57229 荆防败毒散

【方源】《喉科种福》卷四。

【组成】荆芥 防风 柴胡 前胡 皂角刺三个 羌活 独活 川芎 薄荷 生姜一片 桔梗 枳壳 茯苓 甘草 苏叶三分

【主治】喉闭初起。因肝肺火盛,复受风寒,寒气客于会厌,致咽喉肿痛,面赤腮肿,项外

漫肿,甚则喉中有块如拳,汤水难入,猝然如哑,暴发寒热。

【备考】方中荆芥、防风、柴胡、前胡、羌活、独活、川芎、薄荷、桔梗、枳壳、茯苓、甘草用量原缺。

57230　荆防败毒散

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】犀角(锉末)　连翘　净蝉蜕　薄荷　防风　荆芥　当归　紫花地丁　双花　绿豆　赤芍

【制法】上共研为极细末。每服五分至一钱,白开水送下。

【功能】宣表疏风,透疹解毒,解肌清热。

【主治】四时感冒,头痛身热,恶心呕秽,伤风流涕,目赤流泪,干咳喷嚏,瘾疹麻疹,周身疼痛。

57231　荆防泻白汤

《杂病源流犀烛》卷七。为原书同卷"荆防泻白散"之异名。见该条。

57232　荆防泻白散

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】荆芥　防风　桑白皮　地骨皮　甘草

【主治】风热入肺,肺风痰喘,脉浮数者。

57233　荆防泻白散

【方源】《杂病源流犀烛》卷七。

【异名】荆防泻白汤。

【组成】荆芥　防风　连翘　桔梗　金银花　元参　赤芍　甘草　生地　黄芩　桑皮　青黛　葛花

【主治】肺伤风热,鼻流浊涕。

57234　荆防透疹汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】芥穗三钱　防风三钱　当归三钱　白芍三钱　川芎三钱　杏仁三钱　甘草二钱

【主治】温疫斑疹初出,应温散者。

57235　荆防消毒饮

《痘疹仁端录》卷四。为《卫生总微》卷八引《千金》"消毒散"之异名。见该条。

57236　荆防菊花散

《准绳·类方》卷七。为《圣济总录》卷一一一"菊花散"之异名。见该条。

57237　荆防排毒剂

【方源】《霉疠新书》。

【组成】荆芥　防风　茯苓　独活　桔梗　川芎　甘草　枳实　生姜　柴胡

【用法】上以水四合,煮取二合,分三次温服。

【主治】身体发杨梅及砂仁疮。

57238　荆防清表汤

【方源】《顾氏医径》卷五。

【组成】荆芥　羌活　银花　紫草　桔梗　川芎　防风　连翘　酒栀　薄荷　滑石　白芷

【主治】小儿痘证,因风闭、热郁、秽浊,致热逾三日,应见点而不见,无汗恶风者。

57239　荆防渗湿散

【方源】《痘疹会通》卷四。

【组成】人参　荆芥　防风　白芷　云茯苓　漂术　苍术(制过)　甘草

【主治】痘疹溃烂不靥。

57240　荆防葛根汤

【方源】《烂喉丹痧》。

【组成】葛根一钱半或一钱　牛蒡子三钱　桔梗一钱半　炒荆芥一钱半　枳壳一钱　白杏仁(去皮尖)三钱(便溏者勿研)　生甘草四分　土贝三钱(去心,研)　炒防风一钱半　浮萍草二钱

【主治】时令平和时之烂喉丹痧,初起发热者。

【备考】防风、荆芥不炒亦可。

57241　荆防葛根汤

【方源】《喉科家训》卷四。

【组成】荆芥穗　青防风　粉葛根　冬桑叶　鲜菖蒲　薄荷叶　大力子　大贝母　淡竹叶　净蝉衣

【用法】水煎服。

【功用】解肌散表。

【主治】烂喉痧初起，壮热烦渴，斑密肌红，宛如锦纹，咽喉疼痛肿烂。

【加减】恶心呕吐，加藿香。

57242 **荆防解毒汤**

【方源】《片玉痘疹》卷上。

【组成】荆芥穗 防风 黄芩 牛蒡子（炒） 酒柏 小甘草 玄参 升麻 知母 人参 石膏 连翘

【用法】加淡竹叶为引，水煎服。

【功用】解毒，消散斑疹。

【主治】痘已见形，火毒熏灼于内，夹疹而间有碎密若芥子；或夹斑，而皮肤鲜红成块者。

57243 **荆防解毒汤**

【方源】《治痘全书》卷十三。

【组成】荆芥 防风 黄芩（酒炒） 黄柏（酒炒） 元参 牛蒡子 升麻

【主治】①《治痘全书》：痘已见，毒火熏灼于中，使疹挟出于外，其间有碎密若疮一样者。②《会约》：痘夹斑、夹麻或夹丹者。

57244 **荆防解毒汤**

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】荆芥 防风 薄荷 连翘 枳壳 桔梗 木通 甘草 淡竹叶

【主治】湿热痢初起，恶寒头痛，身热，表未解，脉浮数者。

【加减】如有太阳症，加羌活；阳明症，加葛根；少阳症，加柴胡；湿气胜，腹不痛，加川芎、苍术；热气胜，腹大痛，加川连、枳壳。

57245 **荆防解毒汤**

【方源】《金鉴》卷五十六。

【组成】荆芥 防风 赤芍药 生地黄 甘草（生） 金银花 木通 桔梗 地骨皮 连翘（去心）

【用法】加生姜为引，水煎服。

【主治】小儿痘疹，热在肌表，痘痂宜落不落，其痂一半掀起，一半咬紧，身热干燥，肌肤红赤。

57246 **荆防解毒汤**

【方源】《金鉴》卷五十九。

【组成】薄荷叶 连翘（去心） 荆芥穗 防风 黄芩 黄连 牛蒡子（炒，研） 大青叶 犀角 人中黄

【用法】用灯心、芦根为引，水煎服。

【主治】麻疹见形三日之后，因调摄不谨，或为风寒所袭，或为邪秽所触，以致毒反内攻，一二日疹即收没，轻则烦渴谵狂，重则神昏闷乱者。

57247 **荆防解毒散**

【方源】《顾氏医径》卷五。

【组成】荆芥 薄荷 连翘 人中黄 灯芯 防风 桑叶 牛蒡 黄芩 大青 银花 芦根

【用法】内服。外用胡荽酒熏洗。

【主治】痧出突没，风寒外袭，邪秽所触，轻则烦燥谵语，重则神昏狂乱。

57248 **荆芷治崩汤**

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】川芎一钱 当归身四钱 干姜二分（炙黑） 荆芥穗六分（炒黑） 炙草四分 白芷五分

【用法】加大枣，煎服。

【主治】产后血崩，其色鲜红。

57249 **荆花化斑汤**

【方源】《痘疹仁端录》卷十三。

【组成】紫荆花一两 茅草根一两

【用法】上为末。每服一钱，甘草汤送下。

【主治】痧痘发斑。

57250 **荆芥四物汤**

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】荆芥 条芩 当归 川芎 白芍 生地 香附

【用法】上锉。水煎，温服。

【主治】崩漏初起，不问虚实。

【加减】如不止，加防风、升麻、蒲黄（炒）、白术。

【方论选录】《济阳纲目》：血藏于肝，肝气不升则热迫于下，故血不能藏而崩也。荆芥升

肝气，香附理肝气，条芩除内热，四物生地、芍药养血凉血，故皆取效。

57251　**荆芥四物汤**

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】生地五钱　荆芥一钱半(炒黑)　白芍一钱半(炒)　当归三钱(醋炒)　条芩一钱半(炒黑)　川芎一钱　香附一钱半(童便制)　地榆二钱(炒黑)

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】风热伤于冲任经气，洋溢不能摄血，而血不归经，故经漏不止，脉浮数者。

【方论选录】方中生地滋阴凉血，当归养血归经，川芎入血海以升阳，白芍敛营阴以止血，条芩清在里风热，荆芥散血中风邪，香附调气解郁，地榆凉血涩血。水煎温服，使风热外解，则经气清和而血无妄行之患，何经漏之不止哉。

57252　**荆芥地黄汤**

【方源】方出《圣惠》卷三十七，名见《金匮翼》卷二。

【组成】荆芥

【用法】上为细末。每服二钱，以生地黄汁调下，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：呕血。②《金匮翼》：风热入络，血溢络外，吐血，乍寒乍热，咳嗽口干，烦躁者。

57253　**荆芥防风汤**

《症因脉治》卷四。为原书卷三“荆防平胃散”之异名。见该条。

57254　**荆芥豆淋酒**

【方源】《普济方》卷一一六。

【组成】荆芥穗四两　大豆半斤(炒令烟出，好酒一升沃之，去豆不用)

【用法】上用水三升，并酒同煮至一半，去滓温服。

【主治】风痉。其人本虚，风邪客于足太阳之经，忽尔摇头口噤，背强直如发痫之状，脉缓散而迟者；或蕴热搏于诸阳之经，则脉三部俱洪数。

57255　**荆芥连翘汤**

【方源】《回春》卷五。

【组成】荆芥　连翘　防风　当归　川芎　白芍　柴胡　枳壳　黄芩　山栀　白芷　桔梗各等分　甘草减半

【用法】上锉一剂。水煎，食后服。

【主治】肾经风热，两耳肿痛者。

57256　**荆芥连翘汤**

【方源】《回春》卷五。

【组成】荆芥　柴胡　川芎　当归　生地黄　芍药　白芷　防风　薄荷　山栀　黄芩　桔梗　连翘各等分　甘草减半

【用法】上锉散。水煎，食远服。

【主治】胆移热于脑之鼻渊。

57257　**荆芥败毒散**

【方源】《外科医镜》。

【组成】荆芥一钱半　防风一钱半　桔梗一钱半　赤芍一钱半　牛蒡子二钱　金银花二钱　浙贝母二钱　连翘二钱　薄荷一钱　生甘草八分　青果一个

【用法】水煎服。

【主治】时毒喉痛，斑疹腮肿，风痰咳嗽，头痛发热。

【加减】如病势甚者，加羚羊角一钱半，万年青一叶；腮肿，加马屁勃一钱；咳嗽，加杏仁三钱；痰多，加橘红一钱。

57258　**荆芥首乌散**

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】胡麻一两二钱　荆芥　苦参各八钱　何首乌　甘草　威灵仙各六钱

【用法】上共为细末。每服二钱，食后薄荷汤或温酒调下。

【主治】风热疮疥痒疼。

57259　**荆芥祛风汤**

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】荆芥二钱　甘草一钱　半夏五分　麦冬五钱　当归三钱　白芍三钱

【用法】水煎服。数剂愈。

【主治】小儿胃火郁热之赤白游风，往来

不定。

57260 荆芥桔梗汤

【方源】《卫生总微》卷十九。

【组成】荆芥穗 桔梗（去芦） 甘草（生） 牛蒡子（炒）各等分

【用法】上为细末。每用一钱，水一小盏，煎至六分，去滓温服。

【主治】小儿喉中生疮。

57261 荆芥柴胡散

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】鳖甲 柴胡 荆芥穗 人参 白术 绵黄耆 延胡索各一两 赤芍药 当归 熟干地黄 木香 青橘皮 黄橘皮 桑白皮 地骨皮 甘草各半两

【用法】上为细末。每服一钱，水一盏，生姜三片，煎至七分，去滓温服，日午、临卧各一服。

【主治】处女气虚，血海不调，时发寒热，目涩舌干，身体困倦，心忪气短，不思饮食，小便赤涩，大便或秘，遁遝瘦弱，面色萎黄，变为劳疾。

57262 荆芥银花汤

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【异名】竹二（《痧症全书》卷下）、二十六号豫象方（《杂病源流犀烛》卷二十一）。

【组成】荆芥 红花 茜草 丹皮 金银花 赤芍各一钱 香附三分 乌药五分 白蒺藜（去刺，捣末）八分

【用法】上用水二钟，煎至七分，微温服。

【主治】痧有因于血滞者。

【备考】《痧症全书》有刘寄奴。

57263 荆芥解毒汤

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】防风 荆芥 炒芩 炒柏 玄参 升麻 牛蒡

【主治】痘夹疹者。

57264 荆芥解毒汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二。

【组成】荆芥 赤芍 牛蒡 连翘 元参 桔梗 防风 前胡 木通 归尾 甘草稍 天花粉

【主治】婴儿出疹，有夹痘出者因毒气壮盛，击动脏腑，毒趋百窍，血有余而气不足，不能密护脉络，血遂夹毒外浮，乘势而与痘齐出。

57265 荆芥解毒汤

【方源】《续名家方选》。

【组成】土茯苓五钱 当归 黄芩 川芎 地黄各三钱 荆芥二钱 芍药 甘草各五分

【用法】水煎服。

【主治】杨梅疮已发未发，兼筋骨疼痛者。

57266 荆芥蝉蜕汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】荆芥 9 克 蝉蜕 9 克 银花 9～15 克 川柏 9 克 茯苓 9 克 丹皮 9 克 白薇 9 克 赤芍 9 克

【用法】水煎，内服。

【主治】慢性湿疹。

【加减】多量鳞屑，加当归、生地、首乌以养血润燥；皮色鲜红，加龙胆草、山栀、黄芩黄连以清热；便秘者，加大黄泻火。

57267 荆芥薄荷汤

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【异名】革一（《痧症全书》卷下），四十九号坤象方（《杂病源流犀烛》卷二十一）。

【组成】白蒺藜（捣去刺，为末） 荆芥（炒黑） 赤芍 薄荷 青皮 陈皮各等分

【用法】水煎，微冷服。

【主治】痧症气血阻塞。

57268 荆沥涂洗方

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】荆条一把

【用法】上烧，沥汁。涂敷疮上，一日三五次。即愈。

【主治】瘑疮。

57269 荆穗四物汤

【方源】《金鉴》卷四十三。

【组成】当归 川芎 白芍 熟地黄 荆

芥穗

【主治】血虚头晕。

57270 **荆芥甘草防风汤**

【方源】《医方类聚》卷二六五引《疮疹方》。

【异名】荆芥防风甘草汤(《景岳全书》卷六十三)。

【组成】荆芥半两 防风半两 甘草三钱

【用法】上为粗末。每服三钱,水一盏煎,温服。

【功用】解痘毒

【主治】小儿疮疹,邪在太阳,疹出不快,脉浮者。

57271 **荆芥甘草防风汤**

【方源】《医学正传》卷八。

【组成】荆芥 薄荷 牛蒡子 防风 甘草(炙)各六分

【用法】上细切,作一服。水一盏,煎至六分,食前稍温服

【主治】小儿痘疹,邪在太阳,恶寒身热,小便赤涩,出不快。

57272 **荆芥防风甘草汤**

《景岳全书》卷六十三。为《医方类聚》卷二六五引《疮疹方》"荆芥甘草防风汤"之异名。见该条。

南

57273 **南斗散**

【方源】《普济方》卷二〇〇。

【组成】常山 白芷 南星(煨)各等分

【用法】上为粗散。每服三钱,水一盏,酒半盏,生姜三片,煎,去滓,发日五更服。

【主治】①《普济方》:久疟。②《赤水玄珠》:痰疟。

57274 **南朱散**

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【异名】槐花散(《普济方》卷四〇四)。

【组成】赤豆(炒) 槐花(炒)各二钱 麝香(研)少许

【用法】上为散。每服一字匕,温酒调下。

【主治】①《圣济总录》:小儿斑毒不退。②《普济方》:婴孩小儿斑疮余热不退。

【备考】《普济方》:上为细末,每服半钱,用蜜汤调下;三四岁一字以上,用温酒调下。

57275 **南朱膏**

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】大天南星二两

【用法】上为末,用腊月黄牛胆取汁和之,却入胆中,如胆汁少许,量可用之,窨干为细末,入朱砂末一钱,麝香少许,煎甘草膏子和剂,丸如鸡头子大,每一岁半丸,熟水化下,不拘时候;如一胆盛南星末不尽,用二胆亦得。

【主治】急慢惊风,吊眼撮口,搐搦不定,壮热困重。

57276 **南华丹**

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】天南星四两(姜制) 白术(炒) 白茯苓(去皮) 枳实(去瓤,麸炒) 吴茱萸(汤泡七次,炒) 橘红各二两 木香半两(不见火)

【用法】上为细末,以半夏六两汤浸七次,为末,再用姜汁熟煮半夏作糊,丸如梧桐子大。每服三五十丸,食后生姜汤送下。

【主治】痰饮。

57277 **南吕丸**

【方源】《家塾方》。

【组成】黄芩四两 甘遂 青礞石各二钱 大黄八钱

【用法】上为末,糊丸如梧桐子大。每服二十丸,或至三四十丸,温水送下,一日三次。

【主治】诸痰饮咳嗽,大便不利者。

【备考】本方乃滚痰丸,以甘遂代沉香。

57278 **南阳丸**

《小儿药证直诀》卷下。为原书同卷"百祥丸"之异名。见该条。

57279 **南极丸**

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】南星(汤泡透,切片,姜汁浸炒) 半夏(同上制) 软石膏 香附子(童便浸,

炒） 栀子（炒）各等分

【用法】上为细末，水打神曲糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，临卧生姜汤送下。

【主治】胃中有火有痰有郁，作嗳气。

57280 南附汤

【方源】《传信适用方》卷一引叶梦锡方。

【组成】附子一两 南星半两

【用法】一料作四服。水二盏，姜二十片，煎八分，空心服；更少加木香亦妙。

【主治】痰证。

57281 南附汤

【方源】《续易简》卷五。

【组成】天南星 生附子各一钱 全蝎三个或一只（不剪）

【用法】上锉散，作一剂，水一大盏，生姜七片，煎至半盏去滓，逐旋温服，不拘时候。

【主治】①《续易简方论》：慢脾风。小儿泄泻，虚脱生风，及服冷药过多者。②《得效》：小儿阴证惊痫，体冷强直，手足微动，昏睡不醒，口噤涎流，或声或嘿。

57282 南金散

《奇效良方》卷六十五。为《闻人氏痘疹论》卷下“紫背荷叶僵蚕散”之异名。见该条。

57283 南荆散

【方源】《朱氏集验方》卷九引定斋霍喆夫方。

【组成】南星一个（重一两） 荆芥穗半两

【用法】上将南星切片，用生姜自然汁淹一夜，次早捣为饼，新瓦上焙干微黄，同荆芥为末。每服二钱，入修仁茶少许调服，如无修仁，建茶亦得。

【主治】头风。

57284 南荆散

【方源】《普济方》卷四十五引《经效济世方》。

【组成】天南星一个（重一两） 荆芥穗一两

【用法】上为末，生姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后生姜汤送下。

【主治】风痰头痛不可忍者。

【备考】本方名南荆散，据剂型，当作“南荆丸”。

57285 南星丸

【方源】《普济方》卷四十六引《海上方》。

【组成】天南星大者一个 全蝎一对 川芎二两 人参 藁本各半两 龙脑二钱 防风一两

【用法】上为末，以蒸饼一个，水浸一宿，去皮搜和药末为丸，如鸡眼大。每服三丸食前茶清送下。入薄荷尤佳。

【主治】头风。

57286 南星丸

【方源】《普济方》卷三八七引《全婴方》。

【组成】南星（切片，皂角水浸一夕，煮干） 半夏（姜汁浸） 僵蚕（一半醋浸，一半生用） 白矾各等分

【用法】上为末，姜糊丸，如小豆大。三岁三十丸，生姜汤吞下；如惊风涎盛，皂角水化破服。

【主治】小儿咳嗽涎盛，咽膈不利。

57287 南星丸

《普济方》卷三七二。为《圣惠》卷八十五“天南星丸”之异名。见该条。

57288 南星丸

【方源】《普济方》卷三七四。

【组成】南星半钱（泡） 天麻半钱（浸酒一宿） 全蝎半钱（麸炒） 朱砂 麝香各少许

【用法】上为末，面糊为丸。每服七丸，用金钱薄荷汤送下。

【主治】小儿急惊壮热，痰潮，喉中响，咬齿牙，大便多日不便。

57289 南星丸

【方源】《普济方》卷三七五。

【组成】蛇含石一分 石燕（并火煅，酒淬三五次） 代赭石 朱砂 铁粉 雄黄（各一钱） 五灵脂 乳香 川乌（去皮，炮） 天浆子二十七粒（炒） 乌蛇肉（酒浸，炙，去骨）一钱 蛇皮（炙） 蛇头一个（酒浸，炙） 僵蚕（皂角水浸一夕，微炒） 蝉蜕 天麻 蜂房

(炒)　蜈蚣(大赤足者)二钱　全蝎二钱(新薄荷自然汁浸一宿,焙,微炒)　白附子　南星(姜汁浸一夕,牛胆拌炒)　羌活　川芎　麝香各一钱　脑子半钱

【用法】上为末,糊为丸,如鸡头子大,金箔为衣。三岁一丸,薄荷汤入酒少许,磨化服;或作散亦可。灌药一服,得睡即效。

【主治】小儿急慢惊风,经久诸般痫病,累医无效,但是恶候,不问阴阳。

【加减】如吐泻后,加附子(炮,去皮,随轻重入药)。

57290　南星丸

【方源】《普济方》卷三七六。

【组成】南星一个一两(中开一穴,用辰砂半两,以好酒调末入内塞之,掘一地穴,火煨之,令通红,又南星入子好酒内,以盏覆定,不得通风,临冷取出为末)　全蝎四十九个(炒)

【用法】上为末,研匀,以生姜汁调为丸,如绿豆大。每服十丸,麝香酒调下。汗出为度。

【主治】一切痫。

57291　南星末

【方源】《朱氏集验方》卷五引许六五郎方。

【组成】大南星一两(锉成片,用生姜半斤取汁,文火炙干,却入蜜半匙直炒黄色,取出为末)

【用法】上入贝母末半两。每用放掌心,以舌尖点咽下。

【主治】痰疾咳嗽。

57292　南星汤

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】大天南星一枚(重四钱者)

【用法】上为细末,用浆水一碗,冬瓜子四十九粒,同煎至一盏,去滓,取清汁半盏,分三服。病愈,以四君子汤补之。一方每用南星末一钱上下,以水半盏,浆水半盏,或齑汁亦得,入生姜三片,冬瓜子数粒,煎至半盏以下,分二服,尤治慢惊,服之无时。

【主治】小儿急慢惊风,吊眼撮口,搐搦不定,壮热困重。

57293　南星汤

【方源】《百一》卷五引杨梅卿方。

【组成】南星　半夏　枳壳　桔梗　防风(去芦)　甘草(生用)各半两　赤芍药一两

【用法】上为粗末。每服五钱,水二盏,生姜七片,慢火煎至七分,去滓温服。

【主治】痰饮。

57294　南星饮

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】大天南星。

【用法】切成片,用沸汤荡两次,焙干。每服二钱,用枣七个,甘草少许同煎,食后服。三四服后,其硬物自出,脑气流转,髓涕自收,仍以大蒜、荜茇末杵作饼,用纱衬炙热,贴囟前,熨斗火熨透,或香附、荜茇末入鼻。

【主治】风邪入脑,宿冷不消,鼻内结硬物,窒塞,脑气不宣,遂流髓涕。

57295　南星饮

【方源】《医方类聚》卷七十五引《吴氏集验方》。

【组成】半夏七枚(每个作四片)　大皂角一寸(去黑皮)　南星半个　生姜拇指大一块　甘草三寸

【用法】上用水一碗,煎取一茶盏,候冷服。

【主治】痰涎,咽喉不通。

57296　南星饮

【方源】《得效》卷十一。

【组成】天南星三个(炒赤令熟)　冬瓜子仁　白扁豆各一两

【用法】上为末。每服一钱,用生姜二片,防风少许,煎汤调服。

【主治】小儿慢惊,宣利过多,脾困眼慢涎盛,四肢不举,不思饮食。

57297　南星饮

《普济方》卷三七四。即《直指小儿》卷二"南星散"。见该条。

57298　南星散

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【组成】天南星三枚(切,焙)　铅丹半钱

【用法】上为散。干贴。立定。

【主治】刀刃所伤，血出不止。

57299 南星散

【方源】方出《小儿药证直诀》卷下，名见《普济方》卷三九五。

【组成】大天南星一个（重八九钱已上者良）

【用法】上用地坑子一个，深三寸许，用炭火五斤烧通赤，入好酒半盏在内，然后入天南星，却用炭火三两条，盖却坑子，候南星微裂，取出剌碎，再炒匀熟，不可稍生，候冷为细末，每服五分或一字，浓煎生姜、防风汤，食前调下，不拘时候。

【主治】小儿吐泻或误服冷药，脾虚生风，因成慢惊。

57300 南星散

【方源】《直指》卷八。

【组成】生南星一两　枳壳（制）　细辛各半两　木香　甘草（炙）各一分

【用法】上㕮咀。每服三钱，生姜七厚片，慢火煎服。

【主治】风气动痰，发嗽。

57301 南星散

【方源】《直指小儿》卷二。

【异名】南星饮（《普济方》卷三七四）、天南星散（《婴童百问》卷二）。

【组成】南星（重八九钱以上者）一个（就地上作小坑，深七八寸，火炭五斤，烧通红，以好米醋半盏，洒入坑中，即纳南星于内，次以火炭条密盖之，又用盆盖其上，一伏时取出，洗净，切，焙）

【用法】上为末，入琥珀、全蝎末各一钱。每服半钱，煎生姜、防风汤调下。如大便取下恶物，急与和胃之剂。

【功用】驱风豁痰。

【主治】慢惊发痫。

57302 南星散

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】绛矾（煅）　牙硝（飞过）　南星　薄荷

【用法】上各量多少，为细末，水湿手点药，重掺肿处，须用力掺之，至痛无害，然后服药。

【主治】①《朱氏集验方》：咽喉肿。②《普济方》：咽喉生疮。

57303 南星散

【方源】《永乐大典》卷一〇三六引《保婴集验名方》。

【组成】荜茇二钱半　半夏（生）二钱半　南星（生）一钱　白矾（生）二钱　雄黄二钱

【用法】上为细末。捻一捻就痛处擦之，酽醋调贴之。

【主治】蝎虿蜈蚣所伤，痛不可忍。

57304 南星散

【方源】《普济方》卷三六三。

【组成】天南星（大者）一个（开一坑，入朱砂半两，用酒塞坑内，于慢火煨制）　白及半两

【用法】上为末，令匀。淡醋调，涂囟上，以绢片隔，用慢火炙手，频频熨之。得效自升，如此六七次方见效。

【主治】小儿解颅；百日孩儿鼻塞不乳。

57305 南星散

《普济方》卷三七二。为《圣济总录》卷一七二“天南星散”之异名。见该条。

57306 南星散

《袖珍小儿》卷三。为《直指小儿》卷二“星苏散”之异名。见该条。

57307 南星散

【方源】《幼科指南》卷上。

【组成】南星　半夏　川乌　白附子　大豆（去皮）各一两

【用法】上为末。每服三分，生姜汤调下。

【主治】小儿痫症。

57308 南星散

《准绳·女科》卷二。为《圣惠》卷六十九“天南星散”之异名。见该条。

57309 南星散

《准绳·疡医》卷五。为《圣济总录》卷一二五“天南星膏”之异名。见该条。

57310 **南星散**

【方源】《疡科选粹》卷五。

【组成】南星三钱　半夏　天麻各五钱　雄黄二钱五分

【用法】上为细末。每服一钱,温酒调下。

【功用】发表。

【主治】破伤风。

【加减】如欲利,加大黄。

57311 **南星膏**

《医方类聚》卷一八一引《济生》。为《圣济总录》卷一二五"天南星膏"之异名。见该条。

57312 **南星膏**

【方源】《医方类聚》卷二六〇引《吴氏集验方》。

【组成】天南星一两(腊月以黄牛胆制者)　人参半两(去芦)　防风半两(去芦)　茯神三钱(去皮木)　辰砂(别研)　乳香(去砂石,别研)　全蝎(去毒,微炒)　僵蚕(去丝嘴,炒)　酸枣仁(去壳,秤,炒)各三钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如鸡头子大,用金银箔为衣。每粒灯心、枣汤送下;如欲久留,以粽子角丸,以薄荷、灯心汤磨下。

【功用】定志祛风。

【主治】小儿夜卧不宁,心神惊悸。

57313 **南星膏**

【方源】《松崖医径》卷下。

【组成】牛胆南星(腊月以南星为末,填入黄牛胆中,风处阴干,百日取用,宜亲手修制者佳)五钱(炒用)　人参　白术　山药(炒)　白茯苓(去皮)　白茯神(去心)　羌活　甘草(炙)　白僵蚕　全蝎(去毒,以薄荷汁浸,炙)各三钱　辰砂二钱(水飞另研)　麝香一分

【用法】上各为细末,一处和匀,炼蜜丸,如芡实大,金箔为衣。每服一丸,食后用薄荷汤调化服下。

【功用】祛风退热,消痰镇心,除百病。

【主治】小儿精神不定,恍惚不宁,恐畏多哭。

57314 **南星膏**

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】生大南星一枚　草乌、细辛　白芷

【用法】上细研稠粘,滴好醋三七滴为膏,如无生者,以干者为末,醋调作膏。先将小针刺瘤上,令气透贴之。痒则频贴。

【主治】皮肤、手足、头面生疮瘤,大者如拳,小者如粟,或软或坚而不痛。

【备考】方中草乌、细辛、白芷用量原缺。

57315 **南星膏**

【方源】《疡科选粹》卷一。

【组成】五倍子一两(炒)　南星　草乌　黄柏　白及各二两

【用法】上为末,醋调如糊。随肿处渐渐围,逐至不险处。

【主治】疮疽毒发险处。

57316 **南烛煎**

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】南烛树(春夏取枝叶,秋冬取根及皮,拣择细锉)五斤

【用法】以水五斗,慢火煎取二斗,去滓,别于净锅中,慢火煎如稀饧,即以瓷瓶盛。每服以温酒调下一茶匙,一日三次。

【功用】久服轻健,明目黑髭,驻颜。

【主治】一切风疾。

57317 **南粉散**

【方源】《圣济总录》卷九十九。

【组成】南粉二钱(细研)

【用法】上药五更初用生油调下。至食时虫出尽。

【主治】腹中诸虫,令人腹痛,多食泥土及油者。

57318 **南藤酒**

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】石南藤(煎汁)

【用法】同曲米酿酒。饮之。

【功用】治风虚,逐冷气,除痹痛,强腰脚。

57319 **南天竺饮**

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】南天竺草(生瞿麦者是)拇指大一

把（锉） 山栀子三十枚（去皮） 生姜一块（如拇指大） 大枣（去核）五枚 甘草（炙）半两 灯草如小指大一把

【用法】上锉。水一大碗，煮至半碗，去滓，通口服。

【主治】血妄行，九窍皆出。

57320 南木香丸

【方源】《袖珍》卷一引《圣惠》。

【组成】南木香（不见火） 槟榔 麻仁 枳壳各等分

【用法】先将枳壳去瓤，每个切作四片，用不蛀皂角三寸，生姜五片，巴豆三粒（略捶碎，不去壳），用水一盏，将枳壳同煮和滚，滤去生姜、巴豆、皂角不用，只将枳壳锉细，焙干为末，入前木香、槟榔、麻仁同为末，炼蜜为丸。蜜汤送下，不拘时候。

【主治】大便秘结。

57321 南木香膏

【方源】《医统》卷六十二。

【组成】南木香 川当归 川芎 通草 细辛 蕤仁（去壳） 白芷各等分

【用法】上㕮咀，和羊髓熬白芷色黄，去滓为丸，如豆大。每用一粒，塞鼻内。立通。

【主治】鼻塞不利。

57322 南鹏砂散

【方源】《直指》卷二十。

【组成】南鹏砂（黄色） 脑子少许（研细）

【用法】上以灯草蘸点其上；玄参、麦门冬煎汤，调洗心散服。

【主治】①《直指》：目生瘀肉淤突。②《准绳·类方》：痘疮入眼，生翳膜。

【备考】《准绳·类方》用南硼砂一钱、片脑一分，为细末，点眼，用玄参、麦门冬、生地黄煎汤调洗心散末服。

57323 南白胶香散

【方源】《普济方》卷二〇八引《卫生家宝》。

【组成】粟壳（去须蒂）四两（醋炒） 南白胶香 龙骨各三分 甘草（炙）七钱 干姜半两（炮）

【用法】上为粗末。每服五钱，水一盏半，煎一盏，去滓温服。

【主治】①《普济方》引《卫生家宝》：脾虚寒，滑肠久泻，脐胀无休。②《卫生宝鉴》：脐腹疼痛无休止时。

【宜忌】《卫生宝鉴》：忌冷物伤胃。

57324 南极延生汤

《臞仙活人方》卷下。为《御药院方》卷七“牛黄泻心汤”之异名。见该条。

57325 南极寿星汤

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】胆星 防风 白附子 蝉退 薄荷 甘草

【用法】上锉。水煎服。

【主治】小儿急惊搐搦，眼翻口噤，摇头，天吊，痰嗽喘热。

57326 南岳草灵丹

【方源】《魏氏家藏方》卷一引宋谦之方。

【组成】草乌头二两（去皮尖，炒） 全蝎（去毒） 地龙（去土） 白僵蚕（直者，炒，去丝） 穿山甲（炒） 木鳖子（去壳） 乳香（别研） 没药（别研） 天仙子 五灵脂（别研） 斑蝥（去头足翅，炒） 赤脚蜈蚣各半两

【用法】上为细末，米醋糊为丸，如梧桐子大，朱砂、麝香为衣。每服五丸，空心、食前温酒送下；妇人用淡醋汤送下。

【主治】头风。

57327 南星二陈汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】胆星 熟半夏 白茯苓 橘红 甘草 海石 香附

【主治】内伤腰痛，痰涎停注者。

【加减】虚寒者，加姜、桂；内热者，加栀、柏；大便结硬，加枳壳、玄明粉。

57328 南星五生丸

【方源】《幼科类萃》卷十四。

【组成】南星 半夏 川乌 白附子 大豆（去皮）各一两

【用法】上为细末，滴水为丸。每服二丸至

五丸，不过七丸，生姜汤送下。

【主治】小儿风痫。

57329　**南星半夏丸**

【方源】《普济方》卷一六四引《经效济世方》。

【组成】天麻　半夏　天南星(炮，去火毒)各等分　人参　白附子均较前三药倍之

【用法】上各为末，半两，用生面一两，滴水为丸。每服百十丸，于沸汤中煮沸漉出，食前用生姜汤吞下，不拘时候。

【功用】治痰开胃。

57330　**南星半夏散**

【方源】《医学从众录》卷八。

【组成】南星　半夏　皂角(去皮弦子，炒黄)　五倍子(去窠虫，炒黄)各等分

【用法】研极细末。米醋调敷。一宿立效。

【主治】吹奶，乳痈。

57331　**南星防风散**

【方源】《百一》卷十引丘永兴方。

【组成】当归二钱(焙干)　天麻三钱(生用)　白僵蚕(焙干)　南星(汤洗净，捣细，姜汁制，焙干)　防风(生用，不见铁器)各半两　猪牙皂角(去黑皮，焙干)三条

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，姜钱三片，入荆芥少许，同煎至七分，食后温服，一日三次。

【主治】风壅腮颔肿，内生结核，缠喉风等。

【宜忌】忌发风毒物。

【加减】如肿不散者，加透明雄黄三钱，同前药一道为末，煎服。

57332　**南星腹皮汤**

《幼科释谜》卷六。为《活幼心书》卷下"南星腹皮散"之异名。见该条。

57333　**南星腹皮散**

【方源】《活幼心书》卷下。

【异名】南星腹皮汤(《幼科释谜》卷六)。

【组成】南星(制)一两　大腹皮(净洗，焙干)　生姜皮　陈皮(去白)　青皮(去白)　桑白皮(锉，炒)　甘草(炙)　扁豆(制)各半两

【用法】上㕮咀。每服二钱，水一盏，加生姜二片，煎七分，温服，不拘时候。

【主治】肿疾欲愈未愈之间，脾胃虚慢，气促痰喘，腹胀胸满，饮食减，精神困，小便不利，面色痿黄。

57334　**南星醋糊剂**

《中医皮肤病学简编》。为《圣济总录》卷一二五"天南星膏"之异名。见该条。

57335　**南星醒神散**

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】天南星(不去皮，切片)　生姜(切片)

【用法】上用竹串一条，以南星并姜相间插定，次用轻粉些少，掺于南星、生姜片间，风干为末。每服一字，薄荷、紫苏泡汤调下。大人服半钱。或吐、或汗、或下，即病气出也。

【主治】小儿惊风痰热。

57336　**南烛草煎丸**

【方源】《圣惠》卷四十一。

【组成】南烛草　酸石榴叶　旱莲子苗各五斤

【用法】以上三味，于五月上旬收子瓷瓶于中，泥封令密，安日中，至六月中旬取出，皆如黑饧，研之，又以生地黄五斤，绞取汁，及白蜜五合，同煎上件三味或膏，次下后诸药末：地骨皮四两，熟干地黄四两，诃黎勒皮二两，秦椒二两(去目及闭口者，微炒去汗)，白芷二两，旋覆花二两，桂心二两，杏仁三两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄)。上为末，入上件膏中，用缓火煎，可丸即丸，如梧桐子大。每日空腹服三十丸，温酒送下，晚食后再服。

【主治】血气虚惫，须发秃落不生，纵生，色黄不黑。

【宜忌】忌生葱、萝卜、大蒜等。

57337　**南星皂角白梅散**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】南星七片　皂角十四枚(半生半煨)　白梅一个　生姜三片　茶芽一撮　葱

白二寸

【用法】上用木器捣碎。水煎,温服。

【主治】风痰头痛。

57338 南岳魏夫人济阴丹

《局方》卷九(吴直阁增诸家名方)。为《三因》卷十八"济阴丹"之异名。见该条。

57339 南剑州医僧白龙丸

【方源】《普济方》卷一一六引《卫生家宝》

【组成】白芷(生) 川芎(生锉) 大甘草(生) 草乌头(用粗瓦片相拌,水底挞洗,去皮尖白净) 细辛(洗净,生) 白僵蚕(去丝嘴) 薄荷叶(生) 苍术(米泔浸一宿,焙干) 石膏(一半烧通赤,一半生用)各四两

【用法】上生用为末,蒸饼五个,泡糊为丸,如弹子大。每服一丸,食后茶酒嚼下。

【主治】诸风。

57340 南岳紫虚魏元君起死回生散

【方源】方出《圣惠》卷五十六,名见《普济方》卷二五五。

【组成】半夏(捣为末)

【用法】如豆许大,吹其鼻中。

【主治】因一时气闭不通而致卒死者。

【备考】《普济方》本方用法:以竹筒、芦筒、鹅翎管吹入两鼻,死半日,心头尚温,不过三四次,或喷嚏吐痰涎,但元气一通,即回生矣。

茸

57341 茸归丸

【方源】《普济方》卷三二八引《得效》。

【组成】嫩鹿茸(煨去毛,涂酥炙) 川芎 人参 肉苁蓉 乌梅肉 肉桂 柏子仁 牡丹皮 京芍药各一两 当归半两(洗) 黄耆二两(蜜炙) 紫石英一两(蜜炙) 大熟地黄(洗净,再以酒蒸二次,焙干)一两

【用法】上为末,米打薄糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸至六十丸,空心淡醋汤送下。

【功用】补血。

【主治】妇人血虚,胃之水气不足,时渴烦作热,手足掌心热,四肢烦疼,或寒热,夜出盗汗,口干舌燥。

57342 茸朱丹

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《济生续方》。

【组成】鹿茸(去毛,酒蒸)一两 朱砂半两(细研,水飞,蜜炒尤佳)

【用法】上为细末,煮枣圈肉为丸,如梧桐子大。每服四十丸,午前、临卧炒酸枣仁煎汤送下。

【主治】心虚血少,神志不宁,惊悸恍惚,夜多异梦,睡卧不安。

57343 茸朱丹

《准绳·类方》卷四。即《秘传证治要诀·类方》卷四引魏氏方"茸砂丹"。见该条。

57344 茸角丸

【方源】《普济方》卷一五四引《千金》。

【组成】鹿角(去上皮,取白者熬令黄) 鹿茸(新者良,陈者不佳)

【用法】上为末。酒服方寸匕,一日三次。

【主治】腰痛。

【宜忌】特忌生鱼,余不忌。

57345 茸附丸

【方源】《朱氏集验方》卷八。

【组成】黄狗脊一条(去两头,截作五七段,带些肉用) 硇砂一两(研,以浆水二升调匀,方下脊骨在汁中浸三日,炭火炙干,以汁尽令黄色,捣细后入诸药) 肉桂(去皮) 附子(炮) 菟丝子(酒浸二日,蒸,焙干) 杜仲(姜制) 干姜(炮) 鹿角胶(炒) 肉苁蓉(酒浸,焙)各一两 蛇床子(炒) 葫芦巴 阳起石(酒煮一日,研)各半两 鹿茸(蜜炙)一两半 黄狗内外肾一付(酒煮,焙干)

【用法】上为细末,用枣肉五两,酥一两,相和为丸,如绿豆大,晒干。每服二十丸,盐汤送下。

【功用】补下元伤惫,驻颜悦色,壮筋力,去百病。

57346 茸附汤

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】鹿茸一两(酒炙)　肉豆蔻(面裹,煨)一分　附子二只(炮,去皮脐)　当归(去芦,酒浸)　白术各一分(炒)

【用法】上为粗末。每服三钱,水一盏半,生姜七片,大枣一枚,煎至九分,去滓,食前温服。

【主治】脾肾俱虚,脏腑滑泻。

57347　茸附汤

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】鹿茸(去毛,切作片,酒浸,炙)　肉苁蓉(去皱皮,酒浸)　人参(去芦)　远志(去心,炒黄)各一两　当归(去芦,酒浸)　白芍药　熟干地黄各三分(洗)　肉桂(去粗皮,不见火)　附子(炮,去皮脐)各半两

【用法】上焙燥,为粗末。每服五钱,水一盏半,生姜五片,煎至八分,取清汁,食前空心服。

【功用】补肝肾心血。

57348　茸附汤

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《济生续方》

【组成】鹿茸(去毛,酒蒸)一两　附子(炮,去皮脐)一两

【用法】上㕮咀,分作四服。水二盏,生姜十片,煎至八分,去滓,食前温服。

【主治】精血俱虚,荣卫耗损,潮热自汗,怔忡惊悸,肢体倦乏,但是一切虚弱之证。

57349　茸附汤

《准绳·女科》卷一。为《女科百问》卷上"茸附养真汤"之异名。见该条。

57350　茸附汤

【方源】《镐京直指》。

【组成】鹿茸一钱　制附子三钱　桂枝一钱五分　干姜一钱　杜仲三钱(炒)　胡芦巴四钱　狗脊三钱(去毛,蒸)　补骨脂三钱　川牛膝三钱　小茴一钱(炒)

【主治】寒湿久困,伤及督肾之阳,两足痠痛,不能步履。

57351　茸砂丹

【方源】《秘传证治要诀·类方》卷四引魏氏方。

【组成】辰砂　草乌　瞿麦　黄药子各一两

【用法】上为粗末。瓷碗一只,以姜汁涂炙数次,入砂在内,上铺余药,复以盏盖了,掘一小坑,安碗在内,用熟炭火五斤,煅令火尽,吹去草乌药灰,取辰砂研末,或只独用辰砂末,每服一钱半,淡姜汤送下;或加鹿茸,爁去毛,切片,酒浸,为末,三两枣肉,丸如梧桐子大。每服三四十丸,人参汤送下。

【主治】①《秘传证治要诀·类方》:肾厥头痛,因虚而致,服诸药不效,其痛愈甚。②《张氏医通》:肾虚火炎头痛,必先眼黑头旋。

【宜忌】《准绳·类方》:熟砂有毒,更宜斟酌。

【备考】本方方名,《准绳·类方》引作"茸朱丹"。

57352　茸香丸

【方源】《直指》卷十五。

【组成】鹿茸(酥炙)　肉苁蓉(酒浸,焙)　当归各半两　鸡内金七钱半(微炙)　龙骨　牡蛎灰　赤石脂　禹余粮(煅,醋淬,碎为度,各研细)　川白姜　益智仁　巴戟　乳香各二两半

【用法】上为细末,糯米糊为丸,如梧桐子大。每服七十丸,空心盐汤送下。

【主治】下焦虚冷,尿多,或虚劳遗尿,或欲出而不禁。

57353　茸珠丸

《普济方》卷二一九。为《袖珍方》卷二引《澹寮》"茸珠丹"之异名。见该条。

57354　茸珠丹

【方源】《袖珍方》卷二引《澹寮》。

【异名】斑龙丸(原书同卷引澹寮)、茸珠丸(《普济方》卷二一九)。

【组成】鹿角胶(炒珠子)　鹿茸(去皮毛,切片,酥炙;无酥用浊酒炙)　鹿角霜　阳起石(煅,酒淬)各一两　大附子(炮,去皮脐)　当归(去芦尾)　地黄(九蒸九焙)各八钱　辰砂(别研)半钱　肉苁蓉　酸枣仁(去壳,捣

膏） 柏子仁（去壳，同枣仁捣膏） 黄耆（蜜炙）各一两

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒、盐汤任下。用干物压之为妙。

【功用】《普济方》：补精益血。

57355 茸菟丸

【方源】《普济方》卷三十三引《经验方》。

【异名】茸菟丹（《医方类聚》卷一三四引《经验良方》）。

【组成】鹿茸 肉苁蓉 干地黄 萆薢 杜仲 五味子 白茯苓各二两 木瓜一两 巴戟 枸杞子 川牛膝 补骨脂 青盐各二两 菟丝子 金铃子各五两 莲肉八两

【用法】上为末，酒煮山药末糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心、温酒或盐汤送下。

【主治】心肾不交，小便滑数，精神耗散，腰脚无力。

57356 茸菟丹

《医方类聚》卷一三四引《经验良方》。为《普济方》卷三十三引《经验方》“茸菟丸”之异名。见该条。

57357 茸附煎丸

【方源】《朱氏集验方》卷八引吴尚书方。

【组成】鹿茸（火燎去毛，酒浸三宿，蒸熟，焙干） 苁蓉 牛膝（洗） 熟地黄 当归（洗） 巴戟（去心） 川续断各四两（以上六味拌匀，酒浸二宿，日干，一处拌） 菟丝子八两（洗去沙土，酒浸五日，焙干） 大附子（炮） 破故纸（炒） 茯神（去木） 茴香（炒） 川楝子（去核）各四两 五味子 沉香 官桂（去皮）各二两 台椒红（炒） 木香各一两 杜仲（去皮，细锉，生姜汁拌和，干炒） 苍术八两（米泔水浸一宿，洗去沙土，锉片，用葱白八两切片，罨五宿，日干，炒黄色）

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，盐汤温酒吞下，一日二三次。常服甚妙。

【功用】生精补血，益诸虚百损。

57358 茸附养气丹

【方源】《普济方》卷二二六引《济宴》。

【组成】代赭石 紫石英 禹余粮石 赤石脂各二两（上四味，用醋淬煅七八次，以酥为度，共碾为末，入瓦瓶内，盐泥固济，炭火煅养一日一夜后，移埋别地，出火毒三昼夜，入后药） 天雄一个（炮，去皮脐） 附子一个（炮，去皮脐） 干姜（炮） 鹿茸（爁去血毛，盐酒炙） 当归（去芦，酒浸） 沉香 木香 丁香 肉桂（去粗皮） 阳起石 肉苁蓉 磁石 石燕 胡芦巴（炮炒） 破故纸（炒） 肉豆蔻（煨） 舶上茴香（炒） 胡椒 荜澄茄（去蒂） 牡蛎（煅） 乳香（别研） 安息香（别研） 血竭（别研） 朱砂（别研） 没药（别研） 钟乳粉各一两

【用法】上共为细末，糯米糊为丸，如梧桐子大。每服五粒、七粒或九粒，早晨枣汤吞下，或参汤、盐汤送下。

【功用】壮真气，敛元阳。

【主治】诸虚不足。

57359 茸附养真汤

【方源】《女科百问》卷上。

【异名】茸附汤《准绳·女科》卷一。

【组成】干姜四两 肉桂 当归 附子（炮）各二两 鹿茸三两（酒炙） 牡蛎（煅）二两 防风二两 龙骨二两（生）

【用法】上㕮咀。每服半两，水二大盏，煎至八分，去渣温服，不拘时候。

【功用】补冲任，调血气。

【主治】妇人经水，当止而不止者。

【方论选录】《济阳纲目》：止涩之药，不难于涩，而难于温热。本方尤妙于补血中之气，举下陷之用。

57360 茸附益肾丸

【方源】《医方类聚》卷一五三引《经验秘方》。

【组成】鹿茸一两（炙） 沉香二钱半 天雄半两（炮） 鹿角霜半两 家韭子半两（酒

浸）　青盐半两　茴香半两(盐炒)　桑螵蛸一两(炒)　牡蛎粉半两　白石脂一两　鹿角胶一两(炒)

【用法】上为细末，酒糊为丸。每服五十丸，空心温酒送下。

【主治】易泄易衰。

57361　茸桂百补丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】鹿茸　肉桂各三两　党参　首乌　丝子　杜仲各四两　熟地八两　川断　於术　茯苓　萸肉　泽泻　牛膝　归身　白芍　楮实子　戟肉　苁蓉各三两　杞子　淡附子各二两　甘草一两五钱

【用法】蜜丸。

【功用】添精补髓，悦颜多嗣。

【主治】元阳不振，督肾虚损，脾胃虚弱，阳痿精冷，筋骨痿软，血脉不充者。

57362　茸桂百补丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】鹿茸二两　肉桂三两　菟丝子　枸杞子　杜仲　当归　巴戟天　白芍药　肉苁蓉各二两　熟地黄五两　山茱萸肉　冬术(炒焦)　茯神　牛膝各三两　人参四两　甘草(炙)一两

【用法】酒拌晒干，共研细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，盐汤送下。

【功用】壮水培元，添精补髓，延年益寿。

【主治】气血不足，诸虚百损，五劳七伤，脾胃虚弱，神困体倦，腰膝痿软，筋骨不舒，元阳衰败。

茜

57363　茜草丸

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】茜草(锉)　雄黑豆(去皮)　甘草(炙，锉)各等分

【用法】上为细末，井华水和丸，如弹子大。每服一丸，温熟水化下，不拘时候。

【主治】吐血后，虚热躁渴。

57364　茜草汤

【方源】《卫生鸿宝》卷二引《施秋崖录验方》。

【组成】茜草一两　当归　银花各五钱　山甲二片　皂角刺(研末)　甘草节　白蒺藜　小木通各三钱　黄明胶二钱

【用法】水、酒各一碗，煎服。出汗为效。

【主治】横痃便毒。

【备考】原书用本方同时，外以皮皂一二枚(去核)，下醋、银花同煎，捣烂敷患处。

57365　茜草饮

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】茜草一两(生用)

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，食后放冷服。

【主治】吐血不止。

57366　茜草散

【方源】《普济方》卷三〇七。

【组成】茜草(去根擂碎)

【用法】用井华水调服，一日三五次；渣敷伤处。

【主治】土蛇咬伤。

【备考】原书治上证，先用蓼草搽子咬伤处，后用本方。

57367　茜根丸

【方源】《医方类聚》卷一三九引《济生》。

【组成】茜根(洗)　川升麻　犀角(镑)　地榆(洗)　当归(去芦，洗)　黄连(去须)　枳壳(去瓤，麸炒)　白芍药各等分

【用法】上为细末，醋煮米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心、米饮送下。

【主治】一切毒痢及蛊注痢，血下如鸡肝，心烦腹痛。

57368　茜根丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十五。

【组成】茜根　犀角　丹皮　当归　黑地榆　黄连　枳壳　白芍各等分

【用法】上为末，醋糊丸。

【主治】蛊疰痢。

57369 **茜根汁**

【方源】《痘治理辨》。

【组成】茜根汁

【用法】煎汁，入酒，正发预服。

【主治】时行瘟毒痘疮。

57370 **茜根汤**

【方源】方出《肘后方》卷七，名见《圣济总录》卷一四七。

【组成】茜草根　蘘荷根各三两

【用法】上㕮咀。以水四升，煮取二升，去滓，适寒温，顿服。

【主治】中蛊毒，吐血或下血皆如烂肝。

57371 **茜根汤**

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】茜草　黄连（去须）　地榆各一两　山栀子仁十四枚　犀角屑一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，入薤白、香豉各少许，以水一盏半，煎至六分，去滓温服，不拘时候，一日二次。

【主治】痢下鲜血。

57372 **茜根汤**

《圣济总录》卷一四七。为方出《千金》卷二十四，名见《千金》卷十五“八物茜根汤”之异名。见该条。

57373 **茜根汤**

【方源】《幼幼新书》卷二十九引张涣方。

【组成】茜根（锉）　地榆（锉）　黄连（去须）　赤石脂　阿胶（炙熟）各一两　甘草（炙）　黄柏各半两

【用法】上为细末。每服一钱　水八分，煎至五分，去滓，放温服。

【主治】血痢不愈。

57374 **茜根汤**

【方源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】四物汤加童便浸香附一钱五分　茜草根二钱半（忌铁）

【用法】水煎服。

【主治】吐血、咯血、呕血。

57375 **茜根汤**

《笔花医镜》卷二。为《医方类聚》卷八十五引《济生》“茜根散”之异名。见该条。

57376 **茜根汤**

《治痢捷要新书》。为《圣惠》卷五十九“茜根散”之异名。见该条。

57377 **茜根饮**

《圣济总录》卷七十七。为方出《千金》卷二十四，名见《千金》卷十五“八物茜根汤”之异名。见该条。

57378 **茜根饮**

《圣济总录》卷一七八。为《圣惠》卷九十三“茜根散”之异名。见该条。

57379 **茜根散**

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】茜根一两　龙骨一两半　黄连一两（去须，微炒）　犀角屑一两　黄柏半两（微炙，锉）　黄芩三分　赤地利一两　赤鼠尾花一两

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】伤寒热毒下脓血痢，及腹痛壮热。

57380 **茜根散**

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】茜根一两　黄芩三分　栀子仁一分　阿胶半两（捣碎，炒令黄燥）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病，下痢脓血不止。

57381 **茜根散**

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】茜根（锉）　羚羊角屑　柏叶　刺蓟　阿胶（捣碎，炒令黄燥）　白芍药　白术　黄耆（锉）　当归（锉，微炒）　黄芩各一两　生干地黄二两　甘草半两（炙微赤，锉）　伏龙肝二两　乱发灰半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入竹茹一分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳少力，吐血心闷，头旋目晕。

57382 **茜根散**

【方源】《圣惠》卷三十七

【组成】茜根草　黄芩　侧柏叶　阿胶(杵碎,炒令黄燥)　甘草(锉,生用)各一两

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,入生地黄半两,煎至六分,去滓,温服之。

【主治】鼻衄,終日不止,心神烦闷。

57383　茜根散

【方源】《圣惠》卷三十七。

【组成】茜根二两(锉)　白芍药三两　麦门冬三两(去心)　鸡苏叶四两　小蓟根三两　青竹茹四两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,煎至五分,去滓,入生地黄汁一合,搅令匀,温服,不拘时候。

【主治】吐血不止,心胸烦热。

57384　茜根散

【方源】方出《圣惠》卷三十七,名见《普济方》卷一八八。

【异名】茜根煎(《杂病源流犀烛》卷十七)。

【组成】茜根一两

【用法】上以淡浆水一大盏,煎取半盏,去滓温服。

【主治】①《圣惠》:吐血不止。②《杂病源流犀烛》:忽然吐血一二口,或心衄,或内崩者。

【备考】《普济方》本方用法:为细末,大人每服二钱,新汲水调下,食前,一日三次;小儿每服一钱,或极小,每服半钱或一字,亦一日三次。一方以淡浆水煎亦可,一方水一中盏,煎至七分,放冷食后服之。

57385　茜根散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】茜根三分　百合一两　桑根白皮一两(锉)　款冬花三分　贝母半两(煨微黄)　鸡苏茎叶一两　阿胶一两(捣碎,炒令黄燥)　麦门冬一两(去心)　川升麻半两　熟干地黄二两　黄芩一两　甘草半两(炙微赤,锉)　杏仁三分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,入竹茹一分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】久咳嗽不愈,气喘欲绝,肺伤唾脓血。

57386　茜根散

《圣惠》卷五十六。为方出《千金》卷二十四,名见《千金》卷十五"八物茜根汤"之异名。见该条。

57387　茜根散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【异名】茜根汤(《治痢捷要新书》)。

【组成】茜根一两　黄连二两(去须,微炒)　地榆一两(锉)　栀子仁半两　生干地黄一两　当归一两(锉,微炒)　犀角屑一两　黄芩一两

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,入豉五十粒,韭白七寸,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】血痢,心神烦热,腹中痛,不纳饮食。

57388　茜根散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】茜根一两(锉)　川升麻一两　犀角屑一两　地榆一两(锉)　黄芩一两　黄连一两(去须,微炒)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】蛊注下血如鸡肝,体热,心腹中烦闷。

57389　茜根散

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】茜根　当归(锉,微炒)　甘草(炙微赤,锉)　贝母(煨,微黄)　牡丹　瓜蒂　羚羊角屑　柏叶(微炙)各一两　红蓝花二两　生干地黄三两

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,煎至五分,去滓,食前温服。

【主治】妇人小便出血,心神烦闷。

57390　茜根散

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】茜根一两　石韦二两(去毛)　木

通二两（锉） 子芩一两 滑石二两 生干地黄一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】产后小便出血。

57391 茜根散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】茜根半两 犀角屑 川升麻 川大黄（锉，微炒） 黄芩 甘草（炙微赤，锉）各一分

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，入黑豆三十粒，淡竹茹半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿吐血，心躁烦闷。

57392 茜根散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【异名】茜根饮（《圣济总录》卷一七八）。

【组成】茜根一两（锉） 地榆三分（微炙，锉） 马蔺子三分（微炒） 黄连三分（去须，微炒） 黄柏三分（微炙，锉） 黄芩三分 当归三分（锉，微炒）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿血痢不止，肌体黄瘦，腹痛，不能饮食。

【备考】《圣济总录》本方用法：入生姜二片同煎。

57393 茜根散

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】茜根 贯众 槐花（陈者） 椿根（锉） 甘草（炙，锉）各等分

【用法】上为散。每服一钱匕，食前米饮调下，一日二次。

【主治】血痢。

57394 茜根散

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】茜根 升麻 甘松（去土） 牛膝（锉） 细辛（去苗叶） 羌活（去芦头） 硫黄（研） 槐白皮 皂荚 盐花（研） 地骨皮 芎䓖各一分

【用法】上细锉，同入瓶子内烧，勿令烟尽，取出去火毒后，为散。揩齿。

【主治】齿龈宣露，口臭血出。

57395 茜根散

【方源】《医方类聚》卷八十五引《济生》。

【异名】茜根汤（《笔花医镜》卷二）。

【组成】茜根 黄芩 阿胶（蛤粉炒） 侧柏叶 生地黄各一两 甘草（炙）半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】衄血不止，心神烦闷。

①《医方类聚》引《济生》：鼻衄终日不止，心神烦闷。②《玉案》：吐血衄血，错经妄行，并妇人月信不止。③《证因方论集要》：阴虚衄血。

【方论选录】《证因方论集要》：肾阴虚则阳偏胜，故载血上行而致衄。是方也，阿胶能补虚，黄芩能养阴，甘草能缓急，茜根、侧柏、生地则皆去血中之热，能生阴于火亢之时者也。

【备考】《玉案》本方用法：加童便半酒杯，温服。

57396 茜根煎

《杂病源流犀烛》卷十七。为方出《圣惠》卷三十七，名见《普济方》卷一八八"茜根散"之异名。见该条。

57397 茜梅丸

【方源】《本事》卷五。

【组成】茜草根 艾叶各一两 乌梅肉（焙干）半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，乌梅汤送下。

【功用】《古今名方》凉血，行血，止血。

【主治】衄血无时。

【方论选录】《本事方释义》：茜草根气味苦寒平微涩，入手足厥阴；艾叶气味苦微温，入足太阴少阴厥阴；乌梅肉气味酸平，入足厥阴；血热妄行而衄血无时，乃阳胜阴也，厥阳上逆无制，以苦辛酸泄之，则阳气下行，而病

自缓矣。

【临证举例】衄血　鞠运若茂之尝苦此疾，予授此方。令服后愈。

57398　茜蓟汤

【方源】《不居集》(下集)卷十一。

【组成】茜根　小蓟　滑石　甘草　桃仁　贝母　归尾　香附　栀子　枳壳　桑皮

【功用】消瘀行气化痰。

【主治】积瘀胸背作胀，咳嗽吐红，如烂猪肺状。

57399　茜根活血汤

《痘疹仁端录》卷十四。为《外科启玄》卷十二“活血散”之异名。见该条。

57400　茜根黄连汤

【方源】《普济方》卷二一二。

【组成】茜根　黄连　地榆　栀子　薤白　香豉　犀角各等分

【用法】上切。以水八升，煮取二升，分为三服。

【主治】下痢鲜血。

【宜忌】忌猪肉、冷水。

茂

57401　茂芝丸

【方源】方出《准绳·女科》卷四引朱丹溪方，名见《济阴纲目》卷六。

【组成】白术二两　半夏曲　川芎　香附米各一两　神曲(炒)　茯苓各半两　橘红四钱　甘草二钱

【用法】上并为末，粥为丸。每服八十丸。

【主治】①《准绳·女科》：妇人肥盛，脂膜闭塞子宫，以致经事不行，不能孕育。②《济阴纲目》引丹溪方：痰塞不孕。

【加减】热多者，加黄连、枳实各一两。

【备考】原书治上症，先用调理药(“济阴纲目”名“植芝汤”)送服本丸，服此药后，却服螽斯丸。

57402　茂香散

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】蓬莪茂(炮)一两　人参一分　木香一钱

【用法】上为细末。每服方寸匕，醋汤调下。

【主治】气病，痛而游走，上下无常处，脉亦聚散，或促或涩。

57403　茂香散

【方源】《局方》卷九(吴直阁增诸家名方)。

【组成】天台乌药　三棱(煨)　蓬茂(煨)　川当归(去芦)　荆芥穗　天麻　桂心(不见火)　延胡索　厚朴(姜汁制，炒)　附子(炮，去皮脐)各一两

【用法】上为细末。每服一钱，生姜汁少许，和温酒调下。

【主治】妇人血风脏气，头目昏晕，心烦怔忪，手足热疼，经候不调，脐腹时痛，或多便利，饮食减少。

荜

57404　荜芫汤

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】荜茇　芫花各二钱

【用法】水一碗，煎半盏。漱口。

【功用】止痛。

【主治】牙齿痛。

57405　荜良汤

《卫生总微》卷七。为方出《本草图经》(见《证类本草》卷九)，名见《圣济总录》卷二十五“荜澄茄汤”之异名。见该条。

57406　荜茇丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】荜茇一两　胡椒一两　槟榔一两　诃黎勒二两(煨，用皮)　白茯苓一两　肉桂一两(去皱皮)　人参一两(去芦头)　干姜一两(炮裂，锉)　陈橘皮二两(汤浸，去白瓤，焙)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以生姜汤或粥饮送下，不拘时候。

【主治】脾胃气虚弱，腑脏积冷，或时呕吐，不能饮食，心腹胀满，面色萎黄。

【宜忌】忌生冷。

57407 **荜茇丸**

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】荜茇三分 木香半两 桂心半两 白茯苓三分 槟榔一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 胡椒三分 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁炙，令香熟） 当归三分（锉，微炒） 干姜半两（炮裂，锉） 诃黎勒一两（煨，用皮） 人参一两（去芦头）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】脾脏久积冷气，攻心腹疼痛，面色青黄，四肢无力，不思饮食。

57408 **荜茇丸**

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】荜茇一两 人参一两（去芦头） 桂心一两 干姜一两（炮裂，锉） 诃黎勒一两半（煨，用皮） 白茯苓三分 胡椒三分 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以粥饮送下。

【主治】①《圣惠》：虚劳，肠胃大冷，全不思食，或气胀满。②《普济方》：脾胃冷，心腹疠痛，肠鸣泄泻；脐下结痛，及痃痞气块；五劳七伤，肾虚脾弱，上焦烦热，下元虚冷，腹内雷鸣，胸膈气滞，羸瘦无力。

57409 **荜茇丸**

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】荜茇半两 木香半两 诃黎勒一两半（煨，用皮） 肉豆蔻一两（去壳） 槟榔一两 白术半两 阿魏半两（面裹煨，以面熟为度） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 干姜半两（炮裂，锉） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙，令香熟） 人参半两（去芦头） 桂心半两 胡椒半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以暖酒送下。

【主治】冷劳气，四肢羸瘦，面色萎黄，腹内疼痛，不思饮食。

57410 **荜茇丸**

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】荜茇三分 白术三分 肉豆蔻三分（去壳） 丁香半两 诃黎勒二两（煨，用皮） 附子一两（炮裂，去皮脐） 桂心三分 胡椒半两 干姜半两（炮裂，锉） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙，令香熟） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 木香半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】气劳。大肠时泄，不欲饮食，四肢厥冷，面色青黄。

57411 **荜茇丸**

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】荜茇一两 干姜三分（炮裂，锉） 胡椒三分 桂心三分 人参一两（去芦头） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 诃黎勒一两（煨，用皮） 赤茯苓一两 槟榔二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】久痃癖气，或时呕哕，腹痛不能饮食。

57412 **荜茇丸**

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】荜茇一两 诃黎勒三分（煨，用皮） 桂心半两 胡椒一两 厚朴二（一）两半（去粗皮，涂生姜汁炙，令香熟） 白术三分 龙骨一两 干姜三分（烧裂，锉） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 白石脂一两 缩砂三分（去皮） 当归半两（锉，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】久冷痢不止，食不消化。

57413 **荜茇丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】荜茇一两 胡桃仁一两 干姜一两（炮裂，锉） 人参一两（去芦头） 白茯苓一两 诃黎勒一两（煨，用皮） 桂心一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日服二十丸，空心温酒送下，渐加至三十丸。

【主治】五劳七伤，肾虚脾弱，上焦热，下元虚冷，腹内雷鸣，胸膈气滞，羸瘦无力。

57414 **荜茇丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【异名】沉香荜拔丸(《圣济总录》卷五十四)。

【组成】荜茇 沉香 附子(炮裂，去皮脐) 肉豆蔻(去壳) 茴香子 木香 石斛(去根，锉) 诃黎勒皮 山茱萸 桂心 干姜(炮裂，锉) 补骨脂(微炒) 巴戟 荜澄茄 槟榔各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【功用】逐积冷气，暖脾肾脏。

【主治】下元虚惫。

57415 **荜茇丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】荜茇 诃黎勒皮 桂心 胡椒 附子(炮裂，去皮脐) 沉香 木香 人参(去芦头) 草豆蔻(去皮) 槟榔各一两

【用法】上为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【功用】补暖虚冷气，温脾饮食。

57416 **荜茇丸**

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】荜茇(洗，炒)三两 干姜(白者，炮)一两半 胡椒(炒) 甘草(炙)各半两 人参 桂(去粗皮) 木香 白茯苓(去黑皮)各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前盐汤送下。

【功用】补顺三焦，通肝气。

【主治】肝元气虚，四肢劳倦，饮食不消，背痛头旋，或时寒热，肢节疼痛，手足无力。

57417 **荜茇丸**

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】荜茇 木香 附子(炮裂，去皮脐) 胡椒 桂(去粗皮) 干姜(炮) 诃黎勒皮(焙)各半两 厚朴(去粗皮，生姜汁炙)一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心粥饮送下，一日三次。

【主治】脾虚呕逆，心腹常痛，面色青黄，腰胯冷疼。

57418 **荜茇丸**

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】荜茇 高良姜 肉豆蔻(去壳) 桂(去粗皮) 缩沙蜜(去皮) 附子(炮裂，去皮脐) 白术 胡椒 诃黎勒(炮，去核)各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前粟米饮送下。

【主治】脾脏虚冷，大便滑泄，及白痢脐腹多疼。

57419 **荜茇丸**

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】荜茇 木香 干姜(炮) 枳壳(去瓤，麸炒) 大黄(锉，炒) 槟榔(煨，锉)各半两 缩砂仁 诃黎勒(煨，去核) 白茯苓(去黑皮) 人参各三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下。

【主治】胃反，吐酸水，心胸壅闷。

57420 **荜茇丸**

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】荜茇(炒)一两 诃黎勒(煨，去核)三分 干姜(炮)半两

【用法】上为细末，煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】冷痰，饮食不下，膈脘不快。

57421 **荜茇丸**

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】荜茇 昆布(洗，炒干) 吴茱萸(汤洗，焙，微炒) 葶苈(隔纸炒紫色) 杏仁(汤去皮尖双仁，炒，研细)各一两

【用法】上为细末，与杏仁同研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大，空腹粥饮送下五丸，稍加至十丸。

【主治】上气倚息，不得卧。

57422 **荜茇丸**

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】荜茇 附子(炮裂,去皮脐) 干姜(炮) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 肉豆蔻仁各一两 龙骨 诃黎勒皮 缩砂仁各半两

【用法】上为末,面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食前米饮送下,一日二次。

【主治】肠胃久寒,大便鹜溏。

57423 **荜茇丸**

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】荜茇 槟榔(锉)一两一分 干姜(炮) 附子(炮裂,去皮脐)各一两半 诃黎勒皮 芜荑仁各二两 白术 黄连(去须)各三两 阿魏三两(以水四合,煎五六沸,同蜜和药) 枳壳(去瓤,麸炒)一两三分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空腹生姜汤送下,一日二次。渐加至四十丸。

【主治】脾胃虚冷泄泻,变成气痢。

【备考】方中荜茇用量原缺。

57424 **荜茇丸**

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】荜茇 麻黄(去根节煎,去沫,焙) 独活(去芦头) 升麻 吴茱萸(汤浸三度,焙炒)各一两半 木香 陈橘皮(汤浸,去白,焙)各三分 射干 白茯苓(去黑皮) 干姜(炮)各一两 昆布(洗去咸味,暴干)二两 羚羊角(镑)半两 杏仁(去皮尖双仁,炒)一两一分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸,空心米饮送下。以利为度。若利多者,减至七丸。

【主治】脚气毒闷,呕逆吐沫,心烦气急,不下食。

【加减】若食不消化,不能食者,加白术一两一分,陈曲二两半(炒令微黄);若大便涩者,加大黄一两。

57425 **荜茇丸**

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】荜茇 干姜(炮裂) 白茯苓(去黑皮) 胡椒(炒) 桂(去粗皮)各一两 槟榔二两(煨,锉) 人参一两一分 诃黎勒(煨,去核)一两半

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,空腹清粥饮送下。甚者加至二十丸。

【主治】冷劳呕哕,不能下食,心腹胀满,面色萎黄。

57426 **荜茇丸**

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】荜茇 胡椒各等分

【用法】上为末,化蜡为丸,如麻子大。每用一丸,内蚛孔中。

【主治】牙齿疼痛。

57427 **荜茇丸**

【方源】《百一》卷二。

【异名】泼雪丹、缩水丹

【组成】荜茇 人参 白茯苓(去皮) 干姜(炮)各半两 胡椒 大附子(炮,去皮脐) 官桂(去皮) 荜澄茄 诃子(面裹煨,去核)各三分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服四五十粒,食前以盐米饮送下。

【主治】脾胃病。

57428 **荜茇丸**

【方源】《百一》卷六。

【组成】荜茇 川姜(炮) 丁香(不见火)、附子(炮,去皮脐) 吴茱萸 良姜 胡椒各一两 山茱萸 草豆蔻(去皮)各半两

【用法】上为细末,枣肉为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食前陈米饮送下,一日三次。

【主治】滑泄。

【临证举例】滑泻 庐州知录周汝功,嘉禾人,乃尊守永嘉时,每苦滑泄,服此药,果有效。

57429 **荜茇丸**

【方源】《妇人良方》卷一。

【异名】陈氏二神丸(原书卷七)、二神丸(《普济方》卷三三五)。

【组成】萆茇(盐炒,去盐,为末)　蒲黄各一两(炒)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三、四十丸,食后用盐、米饮吞下。

【主治】妇人无时月水来,腹痛。及妇人血气不和,作痛不止。

57430 **萆茇汤**

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】萆茇　萆澄茄　红豆蔻(去皮)　莲花　甘草各等分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,生姜一小块(切),枣一枚(擘),煎至七分,和滓温服。

【主治】水气病,经服轻粉丸,水退后,须此药补之。

57431 **萆茇汤**

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】萆茇　生地黄　当归尾　荆芥穗　白芷　桑白皮(炒)　蜂房(炒)　赤芍药　姜黄　细辛　藁本　甘草各等分

【用法】上为粗末。每用三钱,井水煎,漱。

【主治】齿痛。

57432 **萆茇饮**

【方源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】萆茇　沉香(锉)　草豆蔻(去皮)　青橘皮(去白,焙)　丁香　桃仁(炒,去皮尖)　大腹(锉)　生姜(切,炒)各一两　诃黎勒皮二两　甘草(炙,锉)　枳壳(去瓤,麸炒)各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】膈气。心腹痞满,全不思食。

57433 **萆茇乳**

《袖珍》卷一引《仁存方》。为《千金翼》卷十二引张澹方"悖散汤"之异名。见该条。

57434 **萆茇饼**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】萆茇　香附　大蒜

【用法】上杵作饼,纱衬炙热,贴囟门,上用熨斗火熨透。其涕自止。

【主治】鼻流清涕。

57435 **萆茇散**

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】萆茇三分　肉豆蔻三分(去壳)　赤石脂一两　诃黎勒一两(煨,用皮)　丁香半两　白茯苓半两　阿胶半两(捣碎,炒令黄燥)　白龙骨三分　当归半两　桂心半两　缩砂三分(去皮)　人参三分(去芦头)　厚朴三分(去粗皮,涂生姜炙,令香熟)　陈橘皮三分(半两)(汤浸,去白瓤,焙)　甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为细散。每服二钱,空心及晚食前煎艾粥饮调下。

【主治】虚劳,大肠久冷,泄痢不止。

57436 **萆茇散**

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】萆茇一分　胡椒一分　桂心二(一)分　桃仁半两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)　木香半两　当归三分(锉,微炒)

【用法】上为细散。每服一钱,以热酒调下,不拘时候。

【主治】①《圣惠》:冷气攻心腹,疼痛不可忍。②《普济方》:小儿心疼不可忍。

【备考】《普济方》本方用法:上为细散,一二岁儿,每服半钱,温酒调下。

57437 **萆茇散**

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】萆茇三分　干姜三分(炮裂,锉)　甘草半两(炙微赤,锉)　陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)　厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　附子一两(炮裂,去皮脐)　当归半两(锉,微炒)　赤石脂半两　诃黎勒三分(煨,用皮)　吴茱萸半两(汤浸七遍,焙干微炒)　肉豆蔻一两(去壳)

【用法】上为细散。每服二钱,以粥饮调下,不拘时候。

【主治】冷痢,腹痛不食,四肢羸弱。

57438 **萆茇散**

【方源】《博济》卷二。

【组成】虎头王字骨(即额骨)(酥炙) 荜茇(微焙) 人参 羚角屑各等分。

【用法】上为末。每服二钱,临卧、食后温水调下。

【主治】噎疾。

57439 **荜茇散**

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】荜茇

【用法】上为细散。每用一字,先令病人满口含温水,随病左右,搐入鼻中。

【主治】偏头疼。

57440 **荜茇散**

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】荜茇 木香 芎䓖 桂(去粗皮) 高良姜 青橘皮(汤浸,去白,焙) 丁香各半两 半夏(汤洗七遍去滑,焙干) 芍药 人参各三分 大腹三枚

【用法】上为细散。每服二钱匕,炒生姜盐汤调下。

【主治】心痛不能食,两胁如刺,壅闷。

57441 **荜茇散**

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】荜茇 桂(去粗皮) 麻仁 高良姜各三两 人参 白术各一两 甘草(炙,锉)半分 干地黄(焙) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙)各一两半

【用法】上为散;如要丸,即炼蜜为丸,如小豆大。每服酒调一钱匕,一日二次;或温酒下二十丸。

【主治】胸中冷痰,上焦客热,心下停水,时发醋心,咽喉空唾,或干呕而渴。

57442 **荜茇散**

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】荜茇半两 肉豆蔻(去壳,半生半煨)一两 干姜(炮)半两 诃黎勒(半生半煨,去核)一两 白术三分 甘草(半生半炙,锉)半两 木香(半生半炒)一两

【用法】上为散。每服二钱匕,空心米饮调下,一日二次。

【主治】飧泄气痢,腹胀满,不下食。

57443 **荜茇散**

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】荜茇 苦参 防风(去叉) 升麻各一两 藁本(去苗土)一分

【用法】上为散。每用三钱匕,水一盏,煎六七沸,热漱冷吐。

【主治】诸阳气虚,风攻牙齿疼痛,不任寒热,嚼物隐痛。

57444 **荜茇散**

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】良姜(锉,炒) 草乌头(生用)各一两 荜茇一钱

【用法】上为细末。揩牙上,有涎吐了。

【主治】牙疼。

57445 **荜茇散**

【方源】《普济方》卷六十六引《海上方》。

【组成】木鳖子 荜茇各等分

【用法】上先研木鳖子令细,入荜茇同研。搐鼻。

【功用】去痛。

【主治】牙齿痛。

57446 **荜茇散**

【方源】《普济方》卷六十八引《海上方》。

【异名】当面可。

【组成】良姜 荜茇 白芷 细辛 蜂窠 鹤虱各三钱

【用法】上为细末。以擦之。如牙蛀,用饭一粒药含之。即效。

【主治】风蛀牙疼,不可忍者。

57447 **荜茇散**

【方源】《普济方》卷六十八引《海上方》。

【组成】鹤虱 良姜 荜茇 草乌各等分。

【用法】上为末,用青盐碾细,逐旋拌匀。每用少许,于疼处擦之。候有涎即吐出,用温水灌漱,即愈。药汁不可咽。

【主治】风蛀牙疼。

57448 **荜茇散**

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】荜茇不以多少

【用法】上为细末。每服一大钱，食后茶清调下；仍搐少许鼻中。

【主治】年深头风，痰厥呕吐，恶闻人声，头不能举，目不能开。

57449　**荜茇散**

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】荜茇二钱　蝎梢　良姜各一钱　草乌头尖半钱(生，不去皮)

【用法】上为细末。指蘸擦牙痛处。吐津、误咽不妨。

【主治】牙齿疼痛。

57450　**荜茇散**

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】良姜　胡椒　荜茇　细辛各等分

【用法】上为细末。每用少许，噙温水，随痛处鼻内搐。

【主治】牙齿疼痛。

57451　**荜茇散**

【方源】《卫生宝鉴》卷十一。

【组成】荜茇二钱　良姜一钱　草乌(去皮尖)五分

【用法】上为末。每用半字，先含水一口，应痛处鼻内搐上，吐了水，用指粘药，擦牙疼处。立定。

【主治】治风蚛牙疼，兼治偏正头疼。

57452　**荜茇散**

【方源】《医方类聚》卷七十三引《烟霞圣效方》。

【组成】细辛一钱　荜茇一钱　良姜一钱　草乌头(生)半钱

【用法】上加胡椒一字，同为细末。如牙痛，先刷漱净，次用牙刷蘸药，疼处里外刷。漱毕不语少时。常用。

【主治】风蛀牙疼。

57453　**荜茇散**

【方源】《普济方》卷三〇七。

【组成】荜茇　腻粉　葵仁　木鳖子各等分

【用法】上取五月五日午时，捣为细末。螫着右边，以少许点左眼；螫着左边，点右眼。

【主治】蝎螫卒疼，药未及者。

57454　**荜茇散**

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】荜茇　细辛　白芷　荆芥穗　升麻　郁金　当归各等分

【用法】上为细末，瓦盒贮之，紧闭勿令泄气。每用少许，擦痛处，后以荆芥汤漱之。

【主治】牙疼。

57455　**荜茇散**

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】荜茇　真阿魏各二钱　冰片　麝香各一分

【用法】上为细末。每用半豆许，擦放牙根痛缝中。吐去热涎，温汤漱之，再搽即愈。

【主治】风湿虫牙，作肿疼痛。

【宜忌】如阳明内热作疼，勿用。

57456　**荜拨散**

【方源】《济阳纲目》卷一〇五。

【组成】荜茇一两　厚黄柏一两六钱

【用法】上为末。用米醋煎数沸后调上药，涂患处。涎出吐之，再用白汤漱口。即愈，重者二次。

【主治】满口白烂。

57457　**荜茇散**

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】荜茇三钱　芍药五钱　当归五钱　牛乳半斤

【用法】同煎，一半空腹顿服。

【功用】利气消湿泻热。

【主治】痢疾。湿热更兼气滞，中气不顺，口中作嗳，下痢不止。

【方论选录】方中荜茇最能顺气，且去积滞更神，入之于归、芍之中，更能生长阴血；佐之牛乳者，牛乳属阴，乳乃血类，无形之阴血不能遽长，用有形之阴血以滑其肠中之迫急，则血既无伤，阴又不损，转能佐气以去其结滞，

故奏功甚捷，取效独奇耳。

57458 **荜茇散**

【方源】《金鉴》卷四十三。

【组成】荜茇

【用法】上为末。用猪胆汁拌过，搐鼻。作嚏立愈。

【主治】一切头风兼热者。

57459 **荜茇散**

【方源】《金鉴》卷八十八。

【组成】荜茇 良姜 细辛各一钱

【用法】水三钟，煎一钟，漱口。

【主治】两颧骨打仆损伤，青肿坚硬疼痛，牙车紧急，嚼物艰难，鼻孔出血，两唇掀翻。

【备考】原书治上症，用本方同时，内服正骨紫金丹，外以海桐皮汤熏洗。

【宜忌】坐、卧避冷处。

57460 **荜茇散**

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】荜茇三钱 当归五钱 白芍五钱 车前子三钱

【用法】牛乳半斤，对水煎服。一服痢轻，三服全愈。

【主治】痢疾。气逆不舒，下痢不止，痢无红色。

【加减】腹痛，加广木香一钱五分；饱胀，加槟榔一钱五分；痢有红，加酒炒地榆炭三钱。

57461 **荜茇散**

【方源】《串雅补》卷五。

【组成】荜茇一钱 蟾酥三分 烧盐一钱 川椒二钱

【主治】牙痛。

57462 **荜茇粥**

【方源】《医方类聚》卷九十四引《食医心镜》。

【组成】荜茇 胡椒 桂心各一分（为末） 米三合

【用法】上煮作粥，下荜茇等末，搅和，空心食之。

【主治】心腹冷气刺痛，妨胀不能下食。

57463 **荜茇粥**

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】荜茇一分 胡椒 干姜（炮裂，锉） 槟榔 桂心各一分 粟米三合

【用法】上为末。以水二大盏，水煮粥，候米熟，入药末三钱，搅令匀，每日空腹食之。

【主治】心中冷气，往往刺痛，腹胀气满。

57464 **荜茇粥**

【方源】《养老奉亲》卷一。

【组成】荜茇末二合 胡椒末一分 青粱米四合（淘）

【用法】上以米煮作粥熟，下二味调之，空心食。常服尤效。

【功用】《药粥疗法》：温中、散寒、止痛。

【主治】①《养老奉亲》：老人冷气心痛，发动时遇冷气即痛。②《药粥疗法》：胃寒呕吐，食欲不振，脘腹疼痛，肠鸣泄泻。

【宜忌】《药粥疗法》：凡一切实热症及阴虚有火者忌用。

【方论选录】《药粥疗法》：方中荜茇大辛大热而无毒，专入脾胃经，温胃散寒，下气止痛；胡椒入胃及大肠经，功同荜茇，二者一并煮粥，其温中散寒之力颇强，且与米配合，煮粥食用，还能温中补虚，健脾暖胃，同时也能使荜茇、胡椒的散寒作用缓缓发挥，以提高疗效。

57465 **荜茇煎**

《圣济总录》卷七十七。为《千金翼》卷十二引张澹方"悖散汤"之异名。见该条。

57466 **荜茇煮散**

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】荜茇 丁香 诃黎勒皮 干姜（炮） 甘草（炙） 大腹各半两 草豆蔻（去皮） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 白术各一两 桂（去粗皮）三分

【用法】上为粗散。每服五钱匕，以水一盏半，入生姜五片，煎取八分，去滓温服。

【主治】留饮，食癖。

57467 **荜澄茄丸**

【方源】方出《圣惠》卷七，名见《普济方》卷三十一。

【组成】铜绿三分（研了）　荜澄茄半两　木香三分

【用法】上为末，以醋煮面糊和丸，如绿豆大。每服十丸，以热酒送下，不拘时候。

【主治】肾脏冷气，卒攻脐腹疼痛，不可忍。

57468　**荜澄茄丸**

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】荜澄茄半两　木香半两　桂心一两　茴香子三分　诃黎勒一两（煨，用皮）　沉香半两　干蝎半两（微炒）　槟榔一两　蓬莪茂三分　白术半两　青橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙）　当归半两（锉，微炒）　高良姜三分（锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以热生姜酒送下。

【主治】肾脏虚冷，气攻心腹疼痛，胁肋胀满。

57469　**荜澄茄丸**

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】荜澄茄一两　安息香一两　木香一两　肉桂一两半（去皴皮）　附子一两（炮裂，去皮脐）　当归半两（锉，微炒）　补骨脂一两　茴香子一两　沉香半两　槟榔半两　肉豆蔻半两（去壳）　青橘皮半两（汤浸，去白瓤，微炒）　吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒）　桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温酒送下。

【主治】膀胱虚冷气攻腹胁胀满，腰脚冷疼，面色多黑，体重无力。

57470　**荜澄茄丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】荜澄茄　白豆蔻（去壳）　附子（炮裂，去皮脐）　沉香　缩砂（去壳）　当归（锉，微炒）　诃黎勒皮　吴茱萸（汤浸七遍，焙干微炒）　青橘皮（汤浸，去白瓤，焙）　白术　木香　厚朴（去粗皮，涂生姜汁，炙令香）　桂心　槟榔　芎䓖　人参（去芦头）　枳实（麸炒微黄）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下。

【主治】脾肾脏久积虚冷气攻心腹，宿食不消，四肢无力。

57471　**荜澄茄丸**

《博济》卷二。为原书同卷“丁沉煎丸”之异名。见该条。

57472　**荜澄茄丸**

【方源】《博济》卷二。

【组成】沉香　丁香　木香　舶上茴香各半两　乌药一两　白芷一两一分　胡芦巴三分　荜澄茄一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，姜盐汤嚼下。

【主治】丈夫元阳虚，冷气上冲，心胸满闷，肠胁雷鸣，或多攻刺，呕逆膨胀。

57473　**荜澄茄丸**

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】荜澄茄一两　干姜（炮）三分　陈橘皮（汤浸，去白，焙）一两　厚朴（去粗皮，生姜汁炙）一两　桂（去粗皮）三分　阿魏半两　肉豆蔻（去皮）三枚　缩砂（去皮）半两　草豆蔻（去皮）三枚　甘草（炙）三分　附子（炮裂，去皮脐）一两　荜茇一分　白术半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日空心服十丸至二十丸，酒送下。以知为度。

【主治】伤寒食毒，心胸痞闷，泄痢频并。

57474　**荜澄茄丸**

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】荜澄茄　补骨脂（炒）　附子（炮裂，去皮脐）　羌活（去芦头）　芎䓖　远志（去心）　草薢　肉苁蓉（去皴皮，酒浸一宿，切，焙）　山芋　石斛（去根）　人参各一两

【用法】上为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心温酒送下。

【主治】肝虚生寒，冷气上攻眼目，肢体疼

痛攻注。

57475 **荜澄茄丸**

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】荜澄茄 白豆蔻(去皮) 肉豆蔻(去壳) 木香 草豆蔻(去皮,炒) 丁香 白术 缩砂仁 红豆蔻 桂(去粗皮) 益智(去皮) 诃黎勒(煨,去核) 人参 白茯苓(去黑皮) 附子(炮裂,去皮脐) 茴香子(舶上者,炒) 槟榔(锉) 胡椒 干姜(炮) 阿魏(面裹煨,去面)各一两 青橘皮(汤浸,去白,焙) 陈橘皮(汤浸,去白,焙)各二两 甘草(炙)四两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如樱桃大。每服一丸,细嚼,温酒或盐汤送下,妇人醋汤送下。

【主治】胃心痛。腹胀满,口吐酸水,饮食无味,及一切气疾。

57476 **荜澄茄丸**

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】荜澄茄(炒) 藿香叶 茴香子(炒) 人参 槟榔(锉)各一两 丁香 木香各半两 甘草(炙,锉) 蓬莪茂(煨)各一两

【用法】上为末,入麝香一钱匕,研细,炼蜜为丸,如鸡头子大。每服一丸,细嚼,空心、食前橘皮、生姜汤送下。

【主治】气滞不匀,胁痛烦满,不思饮食。

57477 **荜澄茄子**

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】荜澄茄 白豆蔻 缩砂仁 青橘皮 陈橘皮各三两 莱菔子 肉豆蔻 茴香 桂各一两 丁香 木香各半两

【用法】上为细末,水煮面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,橘皮汤送下,不拘时候。

【功用】助养脾胃,快气消食。

【主治】脾胃不和,饮食迟化,胸膈噎痞,噫气难通,呕逆恶心,脐腹胀痛,大便不调,或泄或秘。

57478 **荜澄茄丸**

《鸡峰》卷二十。为原书卷十二“木香荜澄茄丸”之异名。见该条。

57479 **荜澄茄丸**

【方源】《宣明论》卷十二。

【组成】荜澄茄半两 良姜二两 神曲(炒) 青皮(去白) 官桂(去皮)各一两 阿魏半两(醋面裹,煨熟)

【用法】上为末,醋面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,生姜汤送下,不拘时候。

【主治】中焦痞塞,气逆上攻,心腹疞痛,吐逆不利,不思饮食。

57480 **荜澄茄丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】荜澄茄 藿香叶(去土) 人参(去芦头) 蓬莪茂(煨香,切) 甘草(炙) 丁香各一两 茴香二两(微炒) 木香一两半 肉豆蔻(面裹,煨熟)一分 麝香一钱(别研) 安息香一两(酒煮,研开,滤去沙石)

【用法】上药除安息香外,并为细末,次入炼熟蜜半斤和丸,每一两作十五丸。每服一丸,食前细嚼,橘皮汤或木香汤送下。

【主治】脾虚胃弱,气滞不匀,心腹疼痛,宿冷不消,腹胁虚胀,不思饮食,面色痿黄,脏腑滑泄,气不升降。

57481 **荜澄茄丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】五味子(去枝) 木香(不见火) 官桂(去粗皮,不见火) 丁香(不见火) 阿魏(别研) 全蝎(炒) 茴香(淘去沙,炒) 青皮(去瓤) 良姜各三分(炒) 草果子(取肉炒) 胡芦巴(炒) 白术各一两(炒) 荜澄茄二两半 神曲二两(炒) 甘草一分(炙) 沉香半两(不见火)

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服四十丸,生姜酒送下,不拘时候。

【主治】脾气虚滞,饮食难化,痰涎壅盛。

57482 **荜澄茄丸**

【方源】《济生》卷一。

【组成】荜澄茄不拘多少。

【用法】上为细末,姜汁打神曲末煮糊为

丸，如梧桐子大。每服七十丸，食后淡姜汤送下。

【主治】①《济生》：脾胃虚弱，胸膈不快，不进饮食。②《奇效良方》：翻胃吐黑汁。

57483　荜澄茄丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】京三棱（锉碎）二两　陈皮（去白）一两半　蓬莪茂（锉碎）三两　枳实（生）一两　槟榔一两　黑牵牛（微炒）五两

【用法】上为细末，水面糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，食后煎淡生姜汤送下。

【功用】宽中顺气，消积滞，化痰饮。

【主治】水谷不化，心腹满闷，大便闭涩。

【备考】本方名荜澄茄丸，但方中无荜澄茄，疑脱。

57484　荜澄茄丸

【方源】《普济方》卷五十六引《御药院方》。

【异名】澄茄丸（《医学入门》卷七）。

【组成】荜澄茄半两　薄荷叶三钱　荆芥穗一钱半

【用法】上为细末，糖霜蜜和丸，如樱桃大。每服一丸，时时噙化咽津。

【主治】鼻塞不通。

57485　荜澄茄汤

【方源】《普济方》卷二二二引《博济》。

【组成】荜澄茄　石斛（去根）　附子（炮裂，去皮脐）　桂（去粗皮）　巴戟天（去心）各一两　白术（锉，炒）　五味子　芎䓖各三钱（分）　人参　白茯苓（去黑皮）　木香　槟榔　白豆蔻（去皮）各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱，水一盏，生姜二片，枣二枚（擘破），煎至七分，去滓，空心日午、近晚温服。

【主治】脾元虚冷，饮食减少，面黄腹痛。

57486　荜澄茄汤

【方源】方出《本草图经》（见《证类本草》卷九），名见《圣济总录》卷二十五。

【异名】荜良汤（《卫生总微》卷七）、荜澄茄散（《朱氏集验方》卷三）。

【组成】荜澄茄三分　高良姜三分

【用法】上为散。每服二钱，水六分，煎十余沸，入少许醋搅匀，和滓如茶热呷。

【主治】①《证类本草》引《本草图经》：伤寒咳噫，日夜不定。②《圣济总录》：伤寒呕哕，日夜不定。

57487　荜澄茄汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】荜澄茄　厚朴（去粗皮，生姜汁炙）　桂（去粗皮）　桔梗（炒）　当归（切，焙）　赤芍药　赤茯苓（去黑皮）　陈橘皮（汤浸，去白，焙）　草豆蔻（去皮）　诃黎勒（煨，去核）　槟榔（锉）　白术各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，入生姜半分（切），大枣二枚（擘破），煎取七分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】冷气内攻，胁肋疼痛，不入饮食。

57488　荜澄茄汤

【方源】《普济方》卷二十。

【组成】荜澄茄　沉香（锉）　石斛（去根）各一两　人参　赤茯苓（去黑皮）　五味子（微炒）　巴戟天（去心）　桂（去粗皮）　白术　芎䓖　木香各三分　肉豆蔻（去壳）　附子（炮裂，去皮脐）　没药各半两　陈曲（炒）一两半

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，以水一盏，入生姜三片，大枣二枚（擘破），煎七分，去滓，食前温服。

【主治】脾脏冷气攻心腹疞痛，闷乱烦懊，手足厥冷，呕吐痰逆，不下饮食。

57489　荜澄茄饮

【方源】《普济方》卷二十。

【组成】荜澄茄　附子（生，去皮脐）　楝实（酒浸，取肉）　山茱萸（麸炒）　茴香子（炒）　青橘皮（汤浸，去白，焙）　干姜（炮）　益智（去皮）各三分　天雄（生，去皮脐）一两半　沉香半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，生姜三片，盐半钱匕，艾七叶，同煎六分，

去滓，稍热空心服。

【主治】脾脏久虚，积冷不散，及阴气伤寒，喘闷坚胀，四肢厥逆。

57490 **荜澄茄散**

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】荜澄茄半两 木香半两 白豆蔻半两（去皮） 白术半两 槟榔半两 草豆蔻半两（去皮） 诃黎勒皮半两 肉豆蔻半两（去壳） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 白茯苓半两 干姜半两（炮裂） 桂心三分 丁香半两 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，炒） 甘草半两（炙微赤，锉） 厚朴一两（削去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）

【用法】上为末。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，枣三枚，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【主治】脾胃虚冷，食即欲呕，心腹胀闷，水谷不消，四肢无力。

57491 **荜澄茄散**

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】荜澄茄三分 白豆蔻三分（去皮） 丁香三分 沉香半两 木香半两 高良姜半两（锉） 桂心半两 白术一两 人参二分（去芦头） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 干姜半两（炮裂，锉） 半夏半两（汤洗七遍，去滑） 厚朴三分（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 诃黎勒三分（煨，用皮）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾胃气弱虚，不思饮食，胸中气满，四肢不和，食即呕吐。

57492 **荜澄茄散**

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】荜澄茄一两 木香一两 人参一两（去芦头） 肉桂一两（去皴皮） 肉豆蔻一两（去壳） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 槟榔一两 诃黎勒皮一两 丁香三分 附子一两（半）（炮裂，去皮脐） 缩砂三分（去皮） 干姜三分（炮裂，锉） 京三棱三分（微煨，锉） 赤茯苓三分 白术三分 赤芍药半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服二钱，以热酒调下，不拘时候。

【主治】肾脏虚冷气攻心腹疼痛，或时吐逆，两胁虚胀，不思饮食，四肢乏力。

57493 **荜澄茄散**

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】荜澄茄一两 槟榔一两 木香一两 苦楝子一两 茴香子一两 干蝎半两（微炒） 硇砂一两（细研入） 阿魏一两（面裹煨，面熟为度） 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为细散，每服二钱，以热生姜酒调下。不拘时候。

【主治】盲肠气，小腹疼痛不可忍。

57494 **荜澄茄散**

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】荜澄茄一两 附子半两（炮裂，去皮脐） 木香半两 京三棱半两（炮，锉） 白茯苓半两 肉豆蔻半两（去壳） 沉香半两 人参半两（去芦头） 白术半两 桂心半两 丁香半两 甘草一分（炙微赤，锉） 桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干，微炒） 诃黎勒一两半（煨，用皮） 厚朴半两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 鳖甲一两（涂醋炙微黄，去裙襕）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以粥饮调下。

【主治】冷劳，脏腑虚弱，心腹气胀，不能饮食，四肢无力。

【宜忌】忌苋菜、生冷。

57495 **荜澄茄散**

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】荜澄茄三分 白术一两 黄耆三分（锉） 附子三分（炮裂，去皮脐） 草豆蔻

三分(去皮)　桂心半两　蓬莪茂三分　当归三分　木香半两　芎藭半两　柴胡一两(去苗)　牛膝三分(去苗)　吴茱萸半两(汤浸七遍,焙干,研碎)　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,入生姜半分,枣三枚,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】气劳。心腹冷痛,吃食减少,四肢羸弱。

57496　荜澄茄散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】荜澄茄一两　白术一两　桂心一两　人参一两(去芦头)　黄耆一两　当归一两(锉,微炒)　陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)　甘草半两(炙微赤,锉)　半夏半两(汤浸七遍,去滑)　厚朴一两半(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　川椒半两(去目及闭口者,微炒去汗)　干姜半两(炮裂,锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,入生姜半分,枣三枚,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】心腹冷痛,全不思食,渐加羸瘦。

57497　荜澄茄散

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】荜澄茄一两　人参半两(去芦头)　草豆蔻半两(去皮)　细辛一两　木香半两　白术三分　大腹皮三分(锉)　京三棱半两(微煨,锉)　五味子半两　半夏半两(汤洗七遍,去滑)　高良姜半两(锉)　甘草半两(炙微赤,锉)　诃黎勒皮一两　青橘皮半两(汤浸,去白瓤,焙)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,入生姜半分,枣三枚,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】膈气壅滞,脾胃虚弱,宿食不消,四肢虚乏。

57498　荜澄茄散

【方源】《博济》卷二。

【异名】荜澄茄煮散(《圣济总录》卷四十六)。

【组成】荜澄茄半两(炒)　荆三棱三两(炮,趁热杵)　陈皮二两(去白)　香附子三两(炒)　甘草二两(炮)　丁香二两　舶上茴香二两　厚朴一两(去皮,姜汁炙令黄色)　蛮姜一两一分　官桂二两(去皮)　桔梗一两　白盐十二两(拣择净,炒,研细,后入)　阿魏(皂子大一块,面裹煨,面黄为度,去面,另研细,旋入诸药)

【用法】上同为末,细研和令匀。每服一钱,入生姜二片,水八分盏,煎五七沸,热吃;如作汤,入生姜一钱点之。

【主治】①《博济》:脾元虚冷,气不和,心胸不快,肚腹膨胀,气刺气痛,不思饮食,酒色过度,面黄口淡。②《圣济总录》:中酒。

57499　荜澄茄散

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】荜澄茄　木香　沉香　桂(去粗皮)各半两　茴香子(炒)三分　菟丝子(酒浸一宿,别捣)　白茯苓(去黑皮)各一两

【用法】上为散。每服二钱匕,温酒或盐汤调下。

【主治】膀胱经虚,小便不禁,少腹冷痛。

57500　荜澄茄散

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】荜澄茄　高良姜　肉桂　丁香　厚朴(姜汁炒)　桔梗(去芦)　陈皮　三棱(泡,醋炒)　甘草各一两五钱　香附(制)三两

【用法】上为细末。每服四钱,加生姜三片,用水一盏,煎七分,和渣服。

【主治】脾胃虚满,寒气上攻于心,心腹刺痛,两胁作胀,头昏,四肢困倦,吐逆,发热,泄泻,饱闷。

57501　荜澄茄散

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】荜澄茄　延胡索(炒)　白茯苓(去皮)　人参(去芦)各一两　蓬莪术半两(炮)　附子一只(七钱者,炮,去皮脐)　木香一分

（湿纸包，煨）

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，生姜三片，枣子一枚，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肾痹五聚积气，上冲满闷，气噎不通。

57502 **荜澄茄散**

《朱氏集验方》卷三。为方出《本草图经》（见《证类本草》卷九），名见《圣济总录》卷二十五“荜澄茄汤”之异名。见该条。

57503 **荜澄茄散**

《秘传证治要诀类方》卷三。为《博济》卷二“沉香荜澄茄散”之异名。见该条。

57504 **荜澄茄煮散**

《圣济总录》卷四十六。为《博济》卷二“荜澄茄散”之异名。见该条。

57505 **荜澄茄煮散**

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】荜澄茄　甘草（炙，锉）　人参　芍药各一两　茴香子（炒）　槟榔（锉）各三分　干姜（炮）　诃黎勒皮　桂（去粗皮）各半两

【用法】上为散。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，温服，不拘时候。

【主治】肾脏虚冷，气攻腹胁，疼痛胀满，烦倦。

草

57506 **草膏**

【方源】《烟后方》。

【组成】荔枝草（一名长青草，又名雪里青）

【用法】煎浓汁，去滓，再熬成膏。摊贴患处，不拘已穿未穿，俱效；若未穿，将先起的疮灸一艾，然后贴之；若已穿者，不必灸。

【主治】瘰疬。

57507 **草牛散**

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】蜗牛十枚（捣烂）　生甘草末五钱

【用法】上为末，火焙干。麻油调敷头上。

【主治】癞头胎毒。

57508 **草乌丸**

【方源】《朱氏集验方》卷一引丁仲信方。

【组成】草乌五两（水浸二日，生，去皮，切片，入盐油炒至赤色为度）　全蝎五七枚

【用法】上为细末，煮清糊，候冷，入麝香少许为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心温酒送下。

【主治】脚气。

57509 **草乌散**

【方源】《得效》卷十八。

【异名】麻药草乌散（《医统》卷七十九）。

【组成】猪牙皂角　木鳖子　紫金皮　白芷　半夏　乌药　川芎　杜当归　川乌各五两　舶上茴香　坐拿草（酒煎熟）　草乌各一两　木香三钱

【用法】上并无煅制，为末。诸骨碎、骨折出臼者，每服二钱，好红酒调下，麻倒不识痛处，或用刀割开，或用剪去骨锋者，以手整顿骨节归原，端正，用夹夹定，然后医治；或箭镞入骨不出，亦可用此麻之，或用铁钳拽出，或用凿凿开取出。后用盐汤，或盐水与服立醒。

【功用】麻倒不识痛处。

【主治】损伤骨节不归窠者。

【加减】伤重刺痛，手近不得者，更加坐拿、草乌各五钱，及曼陀罗花五钱入药。

57510 **草乌散**

《普济方》卷六十五。为《圣济总录》卷一二一“草乌头散”之异名。见该条。

57511 **草乌散**

【方源】《普济方》卷六十九。

【组成】草乌四个（紧小如乌啄者，不去皮）　全蝎二个　胡椒三十粒

【用法】上为细末。揩牙出涎，即以荆芥汤灌漱。微觉麻，少顷即定。

【主治】牙疼牙疏，风肿牙疼。

57512 **草乌散**

《奇效良方》卷六十二。为《普济方》卷六十九“草乌头散”之异名。见该条。

57513 **草乌散**

【方源】《跌损妙方》。

【组成】川乌　草乌(生用)　骨碎补　陈皮　乳香　没药各等分　杉木节七个(酒炙)

【用法】上为末。每服一二钱,用酒调服。

【主治】跌损腰痛。

【加减】手上,加穿山甲、细辛、桂枝、威灵仙;左手,加柴胡、木香。

57514　草乌煎

【方源】《医统》卷八十三。

【组成】草乌七个(烧存性)

【用法】用小瓦罐盛,米醋淬,乘热熏,候通手洗之。

【主治】妇人阴中生虫。

57515　草乌膏

【方源】《普济方》卷一五六引《仁存方》。

【组成】草乌　甘遂各等分

【用法】上为细末。临卧用新汲水调敷脚板上下痛处。次早洗去,便可行。

【主治】行路脚板肿疼。

57516　草丹散

【方源】方出《直指》卷二十一,名见《医统》卷六十二。

【组成】黄虢丹二钱半　硇砂半钱　巴豆肉十个(纸压去油)　饼药一盏半

【用法】上同入罐子中,以慢火熬三四沸,取下,续研细石灰三钱和毕。酒渣,鹅毛蘸扫红处,每日一次;粉刺、雀斑,小竹杖挑药点,才见微肿便洗去;鼻上赘肉,敷之,半月取出,脓血自成痂落。

【主治】酒渣鼻并鼻上赘肉,面粉刺、雀斑。

57517　草节丸

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】乌头(炮裂,去皮脐)　黄连(去须)　吴茱萸(汤洗,焙炒)　干姜(焙)各一钱

【用法】上为末,醋煮面糊为丸,如黍米大。每服七丸,草节汤送下。

【主治】小儿冷痢,或下青白,或下瘀黑,或如凝脂。

57518　草节丸

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】无食子　肉豆蔻(去壳)各一枚　吴茱萸(汤洗,焙干,炒)　黄连(去须,炒)　干姜(炮)　诃黎勒(炮,去核)各一钱

【用法】上为末,汤浸蒸饼心为丸,如绿豆大。每服五丸,乳食前草节汤送下。

【主治】小儿洞泄不止。

57519　草节汤

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】胡黄连半两　绵姜一两(炮熟)

【用法】上为细末。每服半钱,食前草节汤调下。

【主治】小儿冷热不调下泻。

57520　草节散

【方源】《普济方》卷二五三。

【组成】赤马粪中草节不拘多少(略沉,晒干)

【用法】上为细末。每服二钱,米饮调下。

【功用】解酒毒。

57521　草仙丸

【方源】《医钞类编》卷十四。

【组成】沙苑蒺藜四两(酒炒)　枣皮　芡实　莲须　枸杞各二两　菟丝　续断　覆盆子　金樱子(去核)各一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸。

【主治】精滑不痛。

57522　草头方

【方源】《外科集腋》卷三。

【组成】牛膝馒头草　夏枯草　蛇梦草　马鞭草　乌鸦眼睛草　婆婆针线草

【用法】上忌铁器,用木臼捣烂取汁,和酒服,饮醉。

【主治】瘰疬。

57523　草圣丸

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】干木瓜　白僵蚕(炒去丝嘴)　荆芥穗　草乌头(炮,去皮尖)各等分

【用法】上为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服十丸,加至十五丸,空心温酒、盐汤任下。

【主治】干湿脚气，及下部一切疮痒。

57524 **草灰散**

【方源】《梅氏验方新编》卷五。

【组成】荔枝壳（微燎存性） 草纸（烧灰存性） 多年陈茅草（晒干）

【用法】上为细末。掺于烂处，即收水结痂。

【主治】痘溃烂。

57525 **草豆汤**

【方源】方出《直指》卷十六，名见《普济方》卷三八八。

【异名】草豆饮（《明医指掌》卷七）。

【组成】黑豆一百二十粒 甘草一寸（生，锉）

【用法】上以新水煎，乘热入滑石末一钱调和，空腹服。

【主治】砂石淋。

57526 **草豆饮**

《明医指掌》卷七。为方出《直指》卷十六，名见《普济方》卷三八八"草豆汤"之异名。见该条。

57527 **草豆饮**

【方源】《医略六书》卷二十五。

【组成】黑豆百粒 生草梢三钱 秋石五钱

【用法】水煎，去滓，入滑石末三钱，温服。

【功用】益肾通淋。

【主治】砂淋涩痛，脉沉涩。

【方论选录】热蕴脬中，气不施化，煎熬津液而成砂石，故溲溺淋沥涩痛异常焉。黑豆解毒润燥，益肾气以通津液；生草泻火，缓中和脾胃以资气化；秋石咸寒，益阴壮水，涤热除烦；更以滑石通窍利水，务使脬中气化，则砂石自消，而小便如常，何淋沥痛急之不痊哉！此益肾通淋之剂，为砂淋痛甚之专方。

57528 **草花汤**

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】甘草二钱 赤石脂二钱 糯米一撮

【用法】水煎服。一剂而腹痛除，二剂而喉痛止，三剂而利亦愈，烦自安。

【主治】冬月伤寒八九日，腹痛下利，便脓血，喉中作痛，心内时烦。

【方论选录】方用甘草以和缓之，则少阴之火不上炎；而后以赤石脂固其滑脱；况有糯米之甘以益中气，补虚则中气不下坠，而滑脱无源而自止。

57529 **草花膏**

【方源】《医级》卷八。

【组成】羊胆一具 蜂蜜二钱

【用法】蜜入胆内 搅匀，点两眼角，或研冰片一分加入。

【主治】目赤肿痛。

57530 **草还丹**

【方源】《博济》卷一。

【组成】仙茅 川羌活 防风（去头） 金毛狗脊（去毛） 紫花白术 茯苓（去皮）各一两 干姜 九节石菖蒲 白丑各一两半 威灵仙二钱 何首乌 苍术各一两

【用法】上各要新好者，洗，择尽焙干，并生用，细杵为末，以白生砂蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，冷水送下，不嚼；妇人月候不通，红花酒送下。

【功用】治风顺气，调利三焦，明耳目，益真元，壮筋骨，驻容颜，保生延寿。

57531 **草还丹**

《苏沈良方》卷二。为原书同卷"四神丹"之异名。见该条。

57532 **草还丹**

【方源】《医方类聚》卷一三九引《神巧万全方》。

【组成】干姜一斤 甘草四两 草豆蔻连皮大腹各五个

【用法】上用水于铛内慢火煮一伏时，水尽添水，煮，切开看姜内无白，即住，候煮干，白姜薄切，焙干，次入大附子二两（炮）、白槟榔二两，次用酒酵子一升，焙干为末，和匀，以稠粟米粥为丸，如梧桐子大。每服二十丸，米饮送下，一日三次。

【主治】泄泻无度，渐成休息痢，脏腑久冷。

57533　**草还丹**

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】乌头(去皮脐)　黑豆各四两　盐一两

【用法】上用瓷瓶盛，坐水中，慢火煮令乌头透，取出细切，与黑豆同焙，为末，煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，空心温酒送下。

【主治】失饥冒暑，及风热忧愁，使耳暴聋，或一耳塞，因咽气而开，咽已复塞，令人烦闷。

57534　**草还丹**

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】菊花(拣去萼)　枸杞子(拣去尘土及蒂)　巴戟天(去心)　肉苁蓉(酒浸，焙干，切)各四两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，以丹砂为衣。每服三十丸，空心温酒或盐汤送下。

【功用】补虚冷，调元气，壮筋骨，明耳目，进饮食，和脾胃，延年。

57535　**草还丹**

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】生干地黄(净洗)　石菖蒲(节密细者)　牛膝(酒浸，切，焙)　菟丝子(入盐少许，炒，乘热捣末)　地骨皮　肉苁蓉(酒浸一宿，细切，焙)各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，以丹砂为衣。空心温酒送下四十丸，日午再服二十丸。一月内百疾俱退，一年白发俱黑，身体有力，颜色如童，睡少欲薄。

【主治】气血虚瘁，髭发变白。

57536　**草还丹**

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】刮皮术一斤(米泔汁浸二日，竹刀切片)　菊花八两　青盐　椒各四两

【用法】上用好头醋一斗，于砂石银器中煮术数沸，人椒、菊、盐，煮去一半醋，取出焙干，与余醋为糊丸，如梧桐子大。每服三四十丸，空心、临卧服。

【功用】明目补肾。

57537　**草还丹**

【方源】《永乐大典》卷一一六二〇引《易简方》。

【组成】补骨脂　熟地黄　远志　地骨皮　牛膝　石菖蒲各等分

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心、日午温酒送下。盐汤、熟水亦可。服之百日，百病除；二百日，精髓满，视听倍常，神聪气爽，瘟疫不侵；服三百日，步骤轻健，鬓须如漆，返老还童。

【功用】延年益寿，耐寒暑。

【主治】虚劳白浊。

57538　**草还丹**

【方源】《瑞竹堂方》卷一引王国宝方。

【组成】苍术四两(酒浸一两，醋浸一两，泔水浸一两，盐水浸一两，各一宿)　胡芦巴一两(酒浸一宿)　破故纸一两(酒浸一宿)　覆盆子二钱(拣净)　茴香一钱(新肥者)　川楝子一两　木香半两(坚实者)　山药(坚白者)　穿山甲(酥炙者)　地龙(去净土)　茯苓(坚圆者)　枸杞子　牛膝各三钱(酒浸一宿)

【用法】上晒干为细末，无灰酒糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，温酒送下，盐汤亦可，干物压之，一日二次。空心服毕，须行百步，使药力行。

【功用】①《瑞竹堂方》：壮脾胃，进饮食，益精髓，补肾经，固元阳，轻腰脚，安五脏，通九窍，令人耳目聪明，悦颜容，乌须发，固牙齿，延年益寿。②《杏苑》：滋补精血，调摄元神。

57539　**草还丹**

【方源】《医学纲目》卷五。

【异名】青蒿丸(《不居集》下集卷四)

【组成】赤蒿一斗五升　童便三斗

【用法】文武火熬，约童便减至二斗，去蒿，再熬至一升，入猪胆七个，再熬数沸，用甘草末收和为丸，如梧桐子大。每服五十丸。

【主治】阴虚骨蒸。

57540 草还丹

【方源】《普济方》卷二二四。

【组成】川椒四两(净) 苍术(泔水浸三日) 小茴香(盐炒)各三两 白茯苓二两 川乌(炮)一两 甘草二两

【用法】上为细末,加附子一两尤佳,却不用川乌,面糊为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,空心酒或盐汤送下。

【功用】上明眼目,中暖水脏,下补丹田,疏风顺气,乌髭发,调顺气血,肥健身体。

【主治】病愈后,气体不得复元。

57541 草还丹

【方源】《扶寿精方》。

【异名】草还益元丹(《便览》卷三)。

【组成】山茱萸(酒浸,取肉)一斤 破故纸(酒浸一日,焙干)半斤 当归四两 麝一钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服八十一丸,临卧酒、盐汤送下。

【功用】益元阳,补元气,固元精,壮元神,延年续嗣。

57542 草还丹

【方源】《良朋汇集》卷二引丁君弼方。

【组成】蒺藜(炒)三斤 黑豆(用小粒,炒,存性)三斤 菟丝饼一斤(酒蒸) 白茯苓(乳浸)八两 当归(酒洗) 黄芩(酒洗)各一斤 萝卜子八两

【用法】上为末,炼蜜为丸,重二三钱。早、晚滚水送下。

【功用】补益。

【主治】诸虚百损。

【加减】春、冬用苍术一斤、赤茯苓八两(牛乳浸),夏、秋用白术一斤。

57543 草灵丹

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】生地黄三十二两(细切,用无灰酒一斗,夜浸昼晒,七日酒尽,焙干) 鹿茸二两(酥炙黄,焙干,为末) 肉苁蓉二两(酒浸七日,研为泥,焙干) 牛膝一两(酒浸七日,焙干) 桂心一两 蛇床子一两 菟丝子一两(酒浸七日,研为末,焙干) 远志一两(去心) 大枣一百个(煮熟,去皮核,焙干)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,或酒、蜜、面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,温酒送下。

【功用】补肾益真,滋荣养卫,填实骨髓,坚固牙齿,聪耳明目,延年不老,悦颜色,黑髭鬓。

57544 草灵丹

【方源】《普济方》卷二一九引《德生堂方》。

【组成】川乌一两 甘草三两 人参 白豆蔻一两 苍术二两 白术一两 破故纸一两 茴香三两(盐炒) 柏子仁一两(另研) 茯苓一两 熟地黄一两 沉香半两 川椒四两(净) 枸杞三两

【用法】上为细末,酒为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心温酒或盐汤送下。

【功用】壮元阳,补真气,和胃,明眼目。

57545 草灵丹

【方源】《医方类聚》卷一九五引《修月鲁般经》。

【组成】川椒四两(净,炒,去目) 白茯苓(去皮)三两 川乌(炮,去皮尖)一两 苍术二两(酒浸作饼,焙干) 粉草二两(去皮,炙黄) 北茴香二两(盐炒,去盐) (一方加破故纸二两,熟地黄二两)

【用法】上为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食前温酒送下,盐白汤亦可。

【功用】滋补下元,头白再黑。

57546 草灵丹

【方源】《医统》卷八。

【组成】紫背浮萍

【用法】摊于竹筛内,下着水盆,晒干,罗细末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,黑豆煎酒送下。取汗。

【主治】风疮及瘾疹,痛风,风痹,脚打扑,浑身麻痹。

57547 草灵丹

【方源】《赤水玄珠》卷四。

【组成】五灵脂(姜汁煮透) 甘草(烧酒煮

透)

【用法】上焙干为末。每服五分,置掌中,用舌舐下。

【主治】膈气、反胃呕吐、梅核气及胃脘疼痛。

57548　草灵丹

【方源】《便览》卷三。

【组成】茴香三两　川椒(去目)四两　甘草二两　熟地二两　山药二两　川乌一两　枸杞子一两半　苍术一两

【用法】上炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心盐汤送下,干物压。

【主治】中年后阴痿,腰膝痿痹,不能运用。

57549　草灵丹

【方源】《遵生八笺》卷十七。

【组成】真川椒四两(去子,炒出汗)　白茯苓一两(去皮,炒)　川乌一两(去皮脐)　茴香二两(盐炒)　苍术四两(酒浸,焙干)　甘草二两(粉者,去皮,炙)　熟地三两(酒浸)　山药三两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸至五十丸,空心温酒送下,以干物压之。服之一月,乃见其效。冬月服之,手足腮面如噀红,行步轻飞,七十老人,健若少年。老年人服之十日,便不夜起。

【功用】①《遵生八笺》:延年益寿,添精补髓,乌须发,固齿牙,强筋骨,壮气血,聪耳明目,返老还童。②《重庆堂医学随笔》:温补下元。

【主治】《重庆堂医学随笔》:老人阳气偏虚,便溺不禁,脾胃两亏,内挟寒湿。

【宜忌】忌黑羊肉、鹁、鸽、桃李果子,恐减药力;服药者,不可赖此频行房事。

57550　草灵丹

【方源】《痘疹仁端录》卷八。

【组成】丝瓜子一合　当归　生地　荆芥　木通　山甲　漏芦　僵蚕　蝉退　红花　灯心

【主治】孕妇出痘,乳后出痘,两乳红硬肿痛。

【备考】方中除丝瓜子外,余药用量原缺。

57551　草灵丹

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】黄牛粪(男用雄,女用雌,四五月取净者,阴干,微火焙黄)

【用法】上为末。每服一两,酒三碗,煎一碗,滤去粪滓,只饮酒。三服痊愈。

【主治】臌胀。

57552　草灵丹

【方源】《集验良方》卷一。

【异名】天然透邪丹(《增广大生要旨》)。

【组成】鹅儿不食草(一名地胡椒。采取阴干,晒燥,研末收贮)

【用法】治鼻渊,鼻窍中时流黄色浊涕,用鲜草塞鼻;治鼻渊久而不愈,鼻中淋沥腥秽血水,头眩虚晕而痛者,用鲜草塞鼻数次,内服补中益气汤;鼻红,用嫩草头阴干,研细末,薄浆为丸,如梧桐子大,黑山栀极细末为衣,塞鼻;眼目生翳,取末搐鼻塞耳;头风疼痛,用鲜草塞鼻;感受风寒暑热,以致头痛胀闷,鼻窍不通,胸膈不舒,用末搐鼻。

【主治】鼻渊,鼻红,眼目生翳,头风疼痛,风寒暑热,头痛胀闷,鼻窍不通,胸膈不舒。

57553　草灵散

【方源】《准绳·疡医》卷三。

【组成】薢叉草(又名薢叉秽)

【用法】上砍烂,酒炒,敷之。

【主治】蟹叉。

57554　草矾膏

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】粉草二两　皂矾五钱

【用法】水煎浓汁,滤净滓,再煎浓,加冰片。以鸡翎蘸膏频扫肿处。

【主治】眼丹。

57555　草果丸

【方源】《普济方》卷三八〇引《傅氏活婴方》。

【组成】草果二钱(去瓤)　三棱(烧)一钱

砂仁二钱　槟榔二钱　黑牵牛(去白)一钱　青皮(去瓤)二钱　巴豆一钱(去油)

【用法】上为末，面糊为丸。每服十五丸，汤饮送下。

【主治】小儿疳浮，脾胃虚弱。

57556 草果汤

《普济方》卷二一一。为《传信适用方》卷二"草果饮"之异名。见该条。

57557 草果饮

【方源】《局方》卷三(绍兴续添方)。

【异名】草果饮子(《丹溪心法》卷二)。

【组成】紫苏叶　草果仁　川芎　白芷　高良姜(炒)　青橘皮(去白，炒)　甘草(炒)各等分

【用法】上为末。每服二大钱，水一盏，煎至七分，去滓热服，二滓并煎，当发日连进三服。

【功用】《丹溪心法附余》：进食理脾。

【主治】疟疾。

①《局方》(绍兴续添方)：脾寒疟疾。②《岭南卫生方》：瘴疟头疼身痛，脉浮弦寒热。③《丹溪心法附余》：寒热疟疾初愈。④《明医指掌》：产后疟疾，寒热往来，或热胜于寒。

【备考】《丹溪心法》有陈皮。

57558 草果饮

【方源】《传信适用方》卷二。

【异名】草果汤(《普济方》卷二一一)。

【组成】草果子　甘草　地榆(炒)　枳壳(去瓤，麸炒)各等分

【用法】上为粗末。每服二钱，用水一盏半，煨姜一块拍碎，同煎七分，去滓服，不拘时候。

【主治】肠胃冷热不和，下痢赤白，及伏热泄泻，脏毒便血。

57559 草果饮

【方源】《医学纲目》卷三十九引汤氏方。

【异名】草果散(《幼科类萃》卷七)。

【组成】厚朴(姜汁制)　青皮　草果　藿香　甘草(炙)　丁皮　神曲　良姜　半夏曲各等分

【用法】上㕮咀。加生姜、大枣，水煎，空心服。

【主治】疟疾，寒多热少，手足厥冷，遍身浮肿，肚腹疼痛。

57560 草果饮

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】常山　柴胡各一两　甘草　槟榔各半两　白姜七钱　乌梅(随意加减)

【用法】上㕮咀。每服四钱，半水半酒，加生姜一块、乌梅一个煎，未发前服，再发再服。

【主治】实疟。

【备考】本方名草果饮，但方中无草果，疑脱。

57561 草果饮

《保命集》卷下。为《妇人良方》卷十五"草果散"之异名。见该条。

57562 草果饮

【方源】《医贯》卷六。

【组成】草果　常山　知母　乌梅　槟榔　草果　穿山甲

【主治】疟疾，脾胃有郁痰伏涎者。

【宜忌】元气强壮者可用，虚者莫用。

【方论选录】知母性寒，入足阳明药，用治阳明独盛之火热，使其退就大阴也；草果性温药，治足太阴独盛之阴寒，使其居于阳明也；二经合和，则无阴阳交错之变，是为君；常山主吐胸中痰结，是为臣；甘草和诸药，乌梅去痰，槟榔去痰癖，破滞气，是佐药；穿山甲者，以其穿山而居，遇水而入，则是出阴入阳，穿其经络于营分，以破暑结之邪，为之使也。

57563 草果饮

【方源】《医学纲目》卷二十三。

【组成】厚朴(姜制)二两　肉豆蔻一个(面裹煨)

【用法】上㕮咀。每服三钱，加姜三片，水煎服。

【主治】妊娠脏气本虚，肝胃少弱，脏腑虚滑，腹脐疼痛，日夜无度。

【备考】本方名草果饮，但方中无草果，疑脱。

57564 草果饮

【方源】《普济方》卷一九八。

【组成】草果 常山 槟榔 甘草少许 黑豆各等分。

【用法】上㕮咀,水二盏,煎一盏,去滓,露一宿,空心未发前温服。

【主治】脾寒疟。

57565 草果饮

【方源】《普济方》卷三八六。

【组成】草果一两 厚朴二两 甘草 枣子各半两 生姜四两(不去皮,同杵,淹一宿,焙)

【用法】上㕮咀。三岁一钱,水半盏,煎至三分,去滓。

【主治】小儿寒热,盗汗,不思饮食,面黄腹急。

57566 草果饮

【方源】《普济方》卷三九〇。

【组成】草果 陈皮 知母 三棱 良姜 乌梅 莪术 苏叶 人参 川芎 白芷 甘草

【用法】上为末,加生姜一钱,水煎服。如脾胃虚弱,用平胃散加草果、乌梅煎服。

【主治】小儿痰疟,寒热往来,脾胃虚疟。

57567 草果饮

【方源】《普济方》卷三九六。

【组成】厚朴(姜制) 青果(煨,去皮) 藿香(洗) 甘草(炙) 丁皮 神曲 半夏各半两

【用法】上为散。每服二钱,加大枣,水煎服。

【主治】小儿痢后浮肿,及疟疾脾虚弱。

【备考】本方名草果饮,但方中无草果,疑脱。

57568 草果饮

《校注妇人良方》卷二十一。即《妇人良方》卷二十一引《经效》"草果饮子"。见该条。

57569 草果饮

【方源】《赤水玄珠》卷八。

【组成】草果 苍术 厚朴 陈皮 半夏 甘草 乌梅(去核)

【用法】加生姜、大枣,水煎服。

【主治】内伤饮食作疟,胸腹饱闷。

【加减】寒多者,加干姜、附子;热多者,只加柴胡;瘴疟,加槟榔。

57570 草果饮

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】草果 青皮 陈皮 厚朴 半夏 白茯苓 苏叶 柴胡 槟榔 乌梅 常山 黄芩 枳实 甘草

【主治】产后脾胃虚,发肿者。

【加减】如妊娠疟疾,去青皮、厚朴、半夏、茯苓、乌梅、槟榔、枳实、常山,加川芎、白芷、良姜。

57571 草果饮

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】草果仁 青皮 白芷 甘草 紫苏 白豆蔻 山楂 莱菔子

【功用】消痰积。

【主治】人胃外邪,但发寒热,不成疟症。若肠胃先有食、痰涎,后又外感风寒,则发似疟。

【加减】若发时恶寒身痛,此后感之表邪,急加羌活、柴胡、升麻,口渴唇焦,先感之积热重,加栀、连。

57572 草果饮

《经验女科方》。为《宁坤秘籍》卷上"草果散"之异名。见该条。

57573 草果散

【方源】《妇人良方》卷十五。

【异名】草果饮(《保命集》卷下)。

【组成】厚朴(去粗皮,姜汁浸,炒黄)二两 肉豆蔻一个(面煨) 草豆蔻一个(煨)

【用法】上㕮咀。每服三钱,水一盏,加生姜三片,煎至七分,去滓热服。

【主治】妊娠脏气本虚,宿夹风冷,脾胃久弱,脏腑虚滑,脐腹疠痛,日夜无度。

57574 草果散

《幼科类萃》卷七。为《医学纲目》卷三十九

引汤氏方"草果饮"之异名。见该条。

57575 草果散

【方源】《宁坤秘籍》卷上。

【异名】草果饮(《经验女科方》)。

【组成】草果二钱 青皮 柴胡 黄芩各八分 甘草三分

【用法】水煎。空心服。

【主治】胎前疟疾，小腹作痛，口燥咽干。

57576 草金丹

《证类本草》卷二十三引《左慈秘诀》。为《千金》卷十二"夏姬杏仁方"之异名。见该条。

57577 草金散

【方源】《幼幼新书》卷二十七引《九籥卫生》。

【组成】烂大栀子三个 草乌头一个

【用法】上同藏于小瓶内，用泥固济烧，烟尽取出，研细。每服一字，生姜汁调下。

【主治】小儿吐逆。

57578 草香散

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】夏枯草四两 香附子四两 甘草八钱

【用法】上为末。每服一钱五分，清汤送下。

【主治】目疾，至夜则甚，或点苦寒反重者，及肝虚冷泪，怕日羞明。

57579 草神丹

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】川附子(制)五两 吴茱萸(泡)二两 肉桂二两 琥珀五钱(用柏子煮过另研) 辰砂五钱(另研) 麝香二钱(另研)

【用法】先将前三味为细末，后入琥珀、辰砂、麝香三味，共研极匀，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，米饮送下。小儿每服十丸。

【功用】大补脾肾。

【主治】阴毒伤寒，阴疽痔漏，水肿臌胀，中风半身不遂，脾泄暴注久痢，黄黑疸，虚劳发热，咳嗽咯血，两胁连心痛，胸膈痞闷，胁中如流水声；童子骨蒸，小儿急慢惊风，痘疹变黑缩陷；气厥卒仆；双目内障；吞酸逆气，痞积血块，大小便不禁；奔豚疝气；附骨疽，两足少力，虚汗不止；男子遗精、梦泄，砂石淋，溺血；妇人血崩血淋；暑月伤食、腹痛，呕吐痰涎。

57580 草粉散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】雄雀粪半两(微炒，细研) 腻粉半两

【用法】上以溲了面一鸡子大相和，捣作饼子，煿熟候干，捣细罗为散。每服一钱，五更初以温酒调服。以利恶物为效。

【主治】妇人久积食癥，腹中结块，面身浮肿。

57581 草蔻丸

【方源】《普济方》卷三九八。

【组成】草豆蔻三枚(去皮) 乌头三枚(盐水浸少时，炒) 益智(去壳) 青橘皮(汤浸，焙，去白)各一分

【用法】上为末，生姜汁煮面糊为丸，如绿豆大。每服七丸，乳食前煎木瓜汤或生姜汤送下。

【主治】小儿洞泄不止。

57582 草蔻丸

《医学入门》卷七。为《脾胃论》卷下"草豆蔻丸"之异名。见该条。

57583 草蔻丸

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】草蔻 益智仁 青皮 神曲 麦芽 陈皮 苍术 厚朴 甘草

【用法】水煎服。

【主治】呕吐酸水，脉弦迟者。

57584 草蔻汤

【方源】《简明医彀》卷五。

【组成】泽泻一钱 木香三分 神曲四分 半夏(制) 枳实(麸炒) 草豆蔻 黄耆 益智仁 甘草(炙)各五分 青皮 陈皮各六分 川归 茯苓各七分

【用法】上㕮咀。加生姜三片，黑枣一个，水煎服。

【主治】脐腹虚寒疼痛。

57585　草罂饮

【方源】《普济方》卷三九六引《仁存方》。

【组成】木瓜草一两(一方用马齿苋)　罂粟壳　甘草各半两

【用法】上㕮咀。三岁每服一钱,水半盏,煎三分,去滓,食前服。

【主治】小儿久新痢疾,不食身热。

57586　草蜜汤

【方源】《直指》卷十五。

【组成】生车前草捣取自然汁半盏　蜜一匙

【用法】调服。

【主治】心肾有热,小便不通。

57587　草精散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】灯草　壁钱

【用法】上同入细青竹筒内,黄泥包固,麦穗火煨之一周时,去泥竹筒,将药研细,每一钱加冰片二分。

【主治】走马牙疳。

57588　草乌头丸

【方源】《千金翼》卷十五。

【组成】乌头十五分(炮,去皮)　大黄　干姜　厚朴(炙)　吴茱萸　芍药　前胡　芎䓖　当归　细辛　桂心各五分　蜀椒三分(去目闭口者,汗)　白薇半两　黄芩　白术　人参　紫菀　甘草(炙)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,酒送下,每日三次。渐渐加之。

【功用】破积聚。

【主治】积结冷聚,阳道弱,大便有血,妇人产后出血不止。

57589　草乌头丸

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】草乌头半两(炮裂)　踯躅花二钱

【用法】上为末,以黄蜡消汁为丸,如绿豆大。绵裹一丸,于痛处咬之。有涎即吐却。

【主治】牙疼。

57590　草乌头方

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】草乌头尖　矾石各等分

【用法】上为末,用醋调灌耳中。立出。

【主治】百虫入耳。

57591　草乌头汤

【方源】《全生指迷方》卷三引《指南方》。

【组成】草乌头(去皮尖,生用)　细辛(去苗)　茶芽各等分

【用法】上为散。每服五钱,水二盏,煎至一盏,去滓,缓缓服尽。

【主治】气晕。但晕而不眩,发则伏地昏昏,食顷乃苏,由荣卫错乱,气血溷浊,阳气逆行,上下相隔,气复通则苏,脉虚大而涩。

【备考】本方方名,《普济方》引作"草乌头散"。

57592　草乌头散

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【组成】草乌头(米泔浸一宿,去皮,切作片,炒)一两　高良姜半两　细辛(去苗叶)半两　荜茇半两　白僵蚕半两　五灵脂半两　乳香一钱

【用法】上为散。每用一字揩牙。合口少时去涎尽,以盐汤漱口。

【主治】①《圣济总录》:牙齿疼痛。②《医统》:风牙疼痛。

57593　草乌头散

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【异名】草乌散(《普济方》卷六十五)。

【组成】草乌头一两(实大者,分作三份,一份烧存性,二份烧黑色为度)　青盐半两　细辛(去苗叶)半两　地龙(去土)一分

【用法】上为散。早、夜如齿药揩牙齿动摇处。

【主治】牙齿动摇疼痛,及骨槽风。

57594　草乌头散

【方源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】草乌头末

【用法】水调,鸡羽扫肿上;有疮者,先以膏药贴定,无令药着入。初涂病人,觉冷如水,疮

乃不痛。

【功用】未溃令内消，已溃令速愈。

【主治】肿毒痈疽。

【临证举例】疮肿 《普济方》：昔有人病疮肿颇甚，以此涂之，坐中便见皮皱，稍稍而消。

57595 草乌头散

《御药院方》卷九。为《圣济总录》卷一二一"细辛散"之异名。见该条。

57596 草乌头散

《普济方》卷四十四。即《全生指迷方》卷三引《指南方》"草乌头汤"。见该条。

57597 草乌头散

【方源】《普济方》卷六十九。

【异名】草乌散（《奇效良方》卷六十二）。

【组成】两头尖七个 草乌头七个 全蝎七个 僵蚕七个（去嘴足）

【用法】上为细末。用指点擦于痛处。涎唾勿咽，然后漱之吐出。

【主治】牙风疼痛。

57598 草乌头膏

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【异名】乌头膏（《圣济总录》卷一四五）。

【组成】草乌头 细辛（去苗叶） 蛇床子 独活（去芦头） 吴茱萸各半两 葱（切，研）二十茎 生姜（切，研）四两

【用法】上除姜、葱别研外，为末，和匀再研。量患处多少，热酒调为膏涂之，以帛裹，日再易。

【主治】伤折恶血，结滞不散，肿痛；诸骨蹉跌，脱臼疼痛。

【备考】本方方名，《普济方》引作"乌头散"。

57599 草乌洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】川乌9克 草乌9克 当归9克 透骨草12克 红花6克

【用法】水煎洗。

【主治】冻疮。

57600 草龙胆散

【方源】《袖珍》卷三引《圣惠》。

【组成】龙胆草（洗，去头） 菊花（去梗） 木贼（洗净，去节） 草决明（微炒） 甘草（炙）各二两 香附子（炒，去毛） 川芎（不见火）各四两

【用法】上为细末。每服二钱，用麦门冬熟水，入砂糖少许同调，食后服；或米泔调下亦得。

【主治】上焦受于风热，气毒攻冲眼目暴赤，碜涩羞明，肿痛多眵，迎风有泪，翳膜攀睛，胬肉隐痛。

57601 草龙胆散

【方源】《局方》卷七（续添诸局经验秘方）。

【组成】蒺藜子（炒，去刺） 草龙胆各六两 赤芍药半斤 甘草（炙） 羌活 防风（去叉枝）各三两 菊花（去枝）半两 茯苓（去皮）四两

【用法】上为末。每服二钱，食后、临卧温酒调下。

【主治】眼暴赤肿痛，风气热上冲，睛疼连眶，睑眦赤烂，瘀肉侵睛，时多热泪；及因叫怒，逆损肝气，久劳瞻视，役损眼力，风砂尘土，入眼涩痛，致成内外障翳，及一切眼疾。

【备考】本方方名，《普济方》引作"龙胆草散"。

57602 草龙胆散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】草龙胆 木贼（去节） 荆芥 菊花 防风（去芦） 草决明（半生半炒） 甘草各半两

【用法】上㕮咀。每服二钱，水一盏，煎七分，不拘时候温服。

【主治】暴赤火眼，昼夜涩痛，作肿泪多。

【加减】痛甚，加羌活、乳香同煎。

57603 草龙胆散

【方源】《普济方》卷三六六。

【组成】草龙胆 钩藤 枳壳 升麻各等分

【用法】水煎，日日灌漱之。

【主治】牙根宣露。

57604　草四神煎

《圣济总录》卷一八五。为《普济方》卷三十三引《博济》"七珍丸"之异名。见该条。

57605　草决明汤

【方源】方出《临证指南医案》卷八，名见《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】草决明　冬桑叶　夏枯草　小胡麻　谷精草　丹皮

【用法】水煎服。

【主治】肝胆气热，目痛偏左，翳膜红丝，脉左弦涩。

57606　草豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】草豆蔻一两(去皮)　白术半两　当归一两(锉，微炒)　陈橘皮半两(汤浸，去白瓤，焙)　黄耆三分(锉)　甘草半两(炙微赤，锉)　吴茱萸一分(汤浸七遍，焙干，微炒)　高良姜半两(锉)　厚朴半两(去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟)

【用法】上为细末，以面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】热病后，脾胃气冷，不思饮食。

57607　草豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】草豆蔻半两(去皮)　桂心半两　丁香三分　高良姜半两(锉)　附子半两(炮裂，去皮脐)　半夏半两(汤洗七遍，去滑)　人参半两(去芦头)　白茯苓三分　诃黎勒三分(煨，用皮)　厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟)　白豆蔻半两(去皮)　陈橘皮二两(汤浸，去白瓤，焙)

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以姜、枣汤送下。

【主治】虚劳，脾胃气弱，痰饮不散，呕逆不下食。

57608　草豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】草豆蔻一两(去皮)　木瓜半两　当归三分　前胡一两(去芦头)　人参一两(去芦头)　赤茯苓一两　桂心一两　陈橘皮一两(汤浸，去白瓤，焙)　白术一两　槟榔一两　诃黎勒一两(煨，用皮)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以生姜汤送下。

【主治】虚劳心腹痞满，胁下妨闷，不思饮食。

57609　草豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】草豆蔻一两(去皮)　附子一两(炮裂，去皮脐)　茴香子一两(微炒)　厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟)　白术一两　桂心一两　干姜一两(炮裂，锉)　青橘皮一两(汤浸，去白瓤，焙)　芎䓖一两　川乌头一两(炮裂，去皮脐)　木香一两　吴茱萸一两(汤浸七遍，焙干，微炒)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以热酒送下。

【主治】七疝，四肢寒冷，脐下妨痛，不欲饮食。

57610　草豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】草豆蔻(去皮)　附子(炮裂，去皮脐)　远志(去心)　桂心　细辛　干姜(炮裂，锉)　川椒(去目及闭口者，微炒，去汗)各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。不拘时候，含一丸咽津。

【主治】五膈气，饮食难下，胸膈噎闷，四肢不利。

57611　草豆蔻丸

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】草豆蔻一两(去皮)　附子一两(炮裂，去皮脐)　缩砂一两(去皮)　陈橘皮一两(汤浸，去白瓤，焙)　干姜半两(炮裂，锉)　枳实半两(麸炒微黄)　吴茱萸半两(汤浸七遍，焙干，微炒)　桂心半分　鸡舌香半两　槟榔半两　木香半两　当归半两(锉，微炒)

【用法】上为末，以水浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以热酒送下，不拘时候。

【主治】五膈气，脾胃久冷，呕吐酸水，脾腹疞痛，不思饮食。

57612 草豆蔻丸

【方源】《圣济总录》（人卫本）卷四十四。

【组成】草豆蔻（去皮） 干姜（炮） 桂（去粗皮）各一两 诃黎勒皮（焙）半两 甘草（炙） 白茯苓（去黑皮） 人参各三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒或生姜汤送下。

【主治】脾久虚，不下食，痰逆恶心；脾胃久冷，气攻心腹，肠鸣胀满。

【备考】本方方名，原书文瑞楼本作"豆蔻丸"。

57613 草豆蔻丸

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】草豆蔻仁 丁香各一两 麝香一分 藿香叶 桂（去粗皮） 零陵香 莎草根（去毛） 木香 白芷 当归（切，焙） 槟榔（锉）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每含化一丸，咽津液，一日三丸。

【主治】心脾蕴热，随气上熏，发为口臭。

57614 草豆蔻丸

【方源】《内外伤辨》卷下。

【组成】草豆蔻（面裹煨，去皮，取仁） 枳实（麸炒黄色） 白术各一两 大麦芽（面炒黄色） 半夏（汤洗七次，晒干） 黄芩（括去皮，生） 神曲（炒黄色）各五钱 干生姜 橘皮 青皮各二钱 炒盐五分

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】秋冬伤寒冷物，胃脘当心而痛，上肢两胁，膈咽不通。

【加减】如冬月用，别作一药，不用黄芩。

【备考】岁火不及，又伤冷物，加以温剂，是其治也。然有热物伤者，从权以寒药治之，随时之宜，不可不知也。

57615 草豆蔻丸

【方源】《脾胃论》卷下。

【异名】草蔻丸（《医学入门》卷七）。

【组成】泽泻一分（小便数，减半） 柴胡二分或四分（须详胁痛多少用） 神曲 姜黄各四分 当归身 生甘草 熟甘草 青皮各六分 桃仁（汤洗，去皮尖）七分 白僵蚕 吴茱萸（汤洗去苦烈味，焙干） 益智仁 黄耆 陈皮 人参各八分 半夏一钱（汤洗七次）草豆蔻仁一钱四分（面裹烧，面熟为度，去皮用仁） 麦蘖面（炒黄）一钱五分。

【用法】上为细末，桃仁另研如泥，再同细末一处研匀，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，熟白汤送下，旋斟酌多少。

【主治】脾胃虚而心火乘之，不能滋荣上焦元气，遇冬，肾与膀胱寒水旺时，子能令母实，致肺金大肠相辅而来克心乘脾胃，此大复其仇也。《经》云：大胜必大复。故皮毛、血脉、分肉之间，元气已绝于外，又大寒大燥二气并乘之，则苦恶风寒，耳鸣，及腰背相引胸中而痛，鼻息不通，不闻香臭，额寒脑痛，目时眩，目不欲开，腹中为寒水反乘，痰唾沃沫，食入反出，常痛，及心胃、胁下缩急，有时而痛，腹不能努，大便多泻而少秘，下气不绝，或腹中鸣，此脾胃虚之至极也；胸中气乱，心烦不安，而为霍乱之渐，咽膈不通，噎塞，极则有声，喘喝闭塞，或日阳中，或暖房室内稍缓，口吸风寒则复作，四肢厥逆，身体沉重，不能转侧，头不可以回顾，小便溲而时躁。

57616 草豆蔻丸

【方源】《丹溪治法心要》卷三。

【组成】白豆蔻三钱 白术 三棱 草豆蔻 半夏各一两 砂仁 片姜黄 枳实 青皮 良姜（一作干姜） 陈皮 桂皮 丁香 蓬术 木香 藿香 小草各五钱

【用法】生姜汁蒸饼为丸。每服六七十丸，白汤送下。

【主治】肥人胃脘当心痛，或痞气在中脘不散。

57617　草豆蔻丸

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】草豆蔻(面包煨去油)一钱　陈皮六钱　泽泻　半夏各一钱　桃仁(去皮尖)七粒　麦芽(炒)二钱半　神曲(炒)　柴胡　姜黄各四钱

【用法】上为末,汤浸蒸饼为丸。白汤送下。

【主治】小儿外感风寒,内伤冷物,胃气当心而痛,啼哭闷绝,手足冷,或吐或不吐,以热手按摩则止者。

57618　草豆蔻汤

【方源】方出《证类本草》卷二十三引《千金》,名见《朱氏集验方》卷三。

【异名】豆蔻散(《仙拈集》卷一)。

【组成】草豆蔻一两(去皮)

【用法】上为末,以木瓜、生姜汤下半钱。

【主治】心腹胀满短气。

57619　草豆蔻汤

【方源】《圣济总录》卷三十九。

【组成】草豆蔻(去皮)一分　黄连(去须)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加乌豆五十粒,生姜三片,煎至七分,去滓温服,一日三次。

【主治】霍乱心烦渴,吐利不下食。

57620　草豆蔻汤

【方源】《圣济总录》(入卫本)卷四十四。

【组成】草豆蔻(去皮,生用)　人参　白茯苓(去黑皮)　陈橘皮(汤浸,去白,焙)　麦蘖(炒)　白术各一两　肉豆蔻三枚(去皮)　附子(炮裂,去皮脐)　甘草(炙)各半两

【用法】上锉,如麻豆大。每服二钱匕,水一盏半,入蜜一匙头,煎取八分,去滓温服,不拘时候。

【主治】脾虚胀闷,喘息不匀,涕唾稠粘,不思饮食。

【备考】本方方名,原书文瑞楼本作"豆蔻汤"。

57621　草豆蔻汤

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】草豆蔻(去皮)　人参　陈橘皮(汤浸,去白,焙)　厚朴(去粗皮,生姜汁炙)各一两　甘草(炙,锉)　桂(去粗皮)各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加生姜二片,同煎至六分,去滓,食前温服。

【功用】进食和气。

【主治】脾胃气冷热不和。

57622　草豆蔻汤

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】草豆蔻(去皮)一两半　厚朴(去粗皮,姜汁炙)二两　桂(去粗皮)　高良姜　当归(锉,焙)各一两

【用法】上为粗末。每服四钱匕,以水一盏,煎取六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】厥逆冷气,上攻心痛,不食。

57623　草豆蔻汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】草豆蔻(去皮)　木香　桂(去粗皮)　芎䓖　赤芍药　白术　槟榔(锉)　陈橘皮(汤浸,去白,焙)各一两　当归三分(锉,炒)

【用法】上为粗末。每服三钱匕,以水一盏,煎取七分,去滓,空腹食前温服。

【主治】腹胀,肠鸣切痛,不入食。

57624　草豆蔻汤

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】草豆蔻(去皮)　藿香(用叶)各半两　丁香一分　白术半两　桂(去粗皮)一分　枳壳(去瓤,麸炒)　陈橘皮(汤浸,去白,焙)　山芋各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加大枣二个(擘破),粟米少许,同煎至六分,去滓,食前温服。

【功用】和胃下气。

【主治】干呕。

57625　草豆蔻汤

【方源】圣济总录》卷一五一。

【组成】草豆蔻(去皮)三枚　当归(切,焙)

厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 甘草(炙) 芍药各一两 枳壳(去瓤,麸炒) 白茯苓(去黑皮) 人参各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一大盏,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】室女月水不利,攻腹刺痛。

57626 **草豆蔻汤**

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】草豆蔻二枚(去皮) 高良姜 人参 甘草 干木瓜(锉)各一分 白茯苓(去黑皮) 桔梗(炒)各半两

【用法】上为粗末。每服一钱半,水七分,加生姜二片,同煎至四分,去滓,分三次温服,乳食前各一次。

【主治】小儿洞泄不止。

57627 **草豆蔻汤**

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】泽泻一分 木香三分 神曲四分 半夏(制) 枳实 草豆蔻仁 黄耆(春、夏去之) 益智仁 甘草各五分 青皮 陈皮各六分 茯苓 当归各七分

【用法】上为粗末,都作一服。水二大盏,加生姜三片,煎至一盏,去滓,食远温服。

【主治】腹中虚寒胀痛。

①《兰室秘藏》:腹中虚胀。②《医统》:脐腹虚寒疼痛。③《杏苑》:腹中寒胀,少食难消,或胃脘疼连小腹。

57628 **草豆蔻汤**

【方源】《医方类聚》卷一六五引《御医撮要》。

【组成】草豆蔻四两 肉豆蔻二两 人参一两 甘草五两 白檀香半两 茯苓二两

【用法】上为细末。每服半钱,如茶点进。

【功用】醒酒和气。

57629 **草豆蔻汤**

【方源】《古今医彻》卷三。

【组成】草豆蔻(煨) 高良姜 广皮 陈神曲(炒) 吴茱萸(汤泡)五分 茯苓 半夏各一钱 炙甘草三分

【用法】加煨姜一片,水煎服。

【主治】客寒犯胃,或过食生冷,中脘疼痛,手足厥逆,脉见弦紧。

【宜忌】非脉实症寒者,勿轻用。

57630 **草豆蔻饮**

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】草豆蔻(去皮) 高良姜 常山 青橘皮(汤浸,去白,焙) 陈橘皮(汤浸,去白,焙)各一分 生姜半分 淡竹叶一握 黑豆五十枚

【用法】上㕮咀。即用水三盏,煎至一盏半,去滓,未发时通口分二次温服。

【主治】寒疟。

57631 **草豆蔻饮**

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】草豆蔻(去皮) 高良姜 甘草(炙)各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,煎作熟水,频饮之。

【功用】令山岚瘴气不着人。

57632 **草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】草豆蔻三分(去皮) 赤茯苓一分 甘草半两(炙微赤,锉) 人参半两(去芦头) 白术半两 陈橘皮半两(汤浸,去白瓤,焙) 桂心三分 枳壳三分(麸炒微黄,去瓤) 半夏二分(汤浸洗七遍去滑) 厚朴三分(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分、大枣三个,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】脾胃冷热气不和,胸中满闷,不能下食,四肢少力。

【宜忌】忌生冷、油腻、饴糖。

57633 **草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】草豆蔻一两(去皮) 陈橘皮二两(汤浸,去白瓤,焙) 桂心一两 附子一两(炮裂,去皮脐) 白术一两 干姜一两(炮

裂,锉)　木香半两　甘草半两(炙微赤,锉)　厚朴二两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分、大枣三个,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】脾气虚,腹胁胀满,四肢不和,面色青黄,不纳饮食。

57634　**草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】草豆蔻二两(去皮)　半夏半两(汤浸七遍去滑)　肉桂三分(去皱皮)　人参三分(去芦头)　木香半两　前胡一两(去芦头)　高良姜一两(锉)　白茯苓一两　附子一两(炮裂,去皮脐)　陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙)　厚朴二两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　白术一两　甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分、大枣三个,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】脾胃气虚弱,脏腑积冷,呕吐宿食,四肢少力,面无颜色。

57635　**草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】草豆蔻半两(去皮)　青橘皮半两(汤浸,去白瓤,焙)　人参一两(去芦头)　桂心半两　附子三分(炮裂,去皮脐)　白茯苓三分　白术半两　当归半两(锉,微炒)　枳实半两(麸炒微黄)　厚朴一两半(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　芎䓖半两　柴胡半两(去苗)　桔梗一两(去芦头)　白芍药半两　黄耆半两(锉)

【用法】上为散。每服二钱,以水一中盏,加生姜半分、大枣三个,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】脾胃气久虚,四肢无力,脏腑虚损,不欲饮食,日加羸瘦,体虚颤掉。

【宜忌】忌生冷、油腻、湿面、猪犬肉。

57636　**草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】草豆蔻一两(去皮)　高良姜三分(锉)　桂心半两　丁香半两　木香半两　白术半两　当归半两(锉,微炒)　白豆蔻半两(去皮)　陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)　肉豆蔻半两(去壳)　甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服一钱,食前以姜、枣汤调下。

【主治】①《圣惠》:大肠虚冷,肠鸣腹痛,下痢,不思饮食。②《圣济总录》:肠虚寒湿内攻,腹痛飧泄。

57637　**草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】草豆蔻一两(去皮)　吴茱萸半两(汤浸七遍,焙干,微炒)　青橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙)　川大黄一两(锉碎,微炒)　槟榔一两　当归一两(锉,微炒)

【用法】上为粗末。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】伤寒后,冷热气不和,心腹疼痛,食不消化。

57638　**草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】草豆蔻三分(去皮)　藿香一两　桂心三分　白术一两　人参一两(去芦头)　半夏半两(汤洗七遍去滑)　黄耆一两(锉)　甘草半两(炙微赤,锉)　陈橘皮半两(汤浸,去白瓤,焙)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】伤寒后,脾胃气弱,痰逆,不思饮食,四肢虚羸。

57639　**草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】草豆蔻一两(去皮)　人参一两(去芦头)　桂心半两　白术一两　半夏半两(汤洗七遍去滑)　甘草一两(炙微赤,锉)　陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)　厚朴一两半(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【主治】虚劳，脾胃虚冷，食不消化。

57640 草豆蔻散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】草豆蔻三分（去皮） 前胡一两半（去芦头） 桔梗三分（去芦头） 木香三分 赤茯苓一两 大腹皮三分（锉） 槟榔一两 紫苏茎叶二两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】虚劳上气，胸中满闷，不下饮食。

【宜忌】忌炙煿、醋物、猪肉。

57641 草豆蔻散

【方源】《圣惠》卷三十九。

【组成】草豆蔻十枚（去皮） 高良姜三分 人参一两半（去芦头） 白茯苓二两 青橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，点少盐搅匀，不拘时候服之。

【主治】饮酒过度，呕逆不止，心腹胀满。

57642 草豆蔻散

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】草豆蔻一两（去皮） 当归一两（锉，微炒） 白术一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 桂心一两半 高良姜一两（锉） 赤茯苓一两 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 桔梗一两（去芦头） 厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】胸痹短气，脏腑久寒，脐腹疼痛，两胁胀满，心膈不利。

57643 草豆蔻散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】草豆蔻一两（去皮） 丁香三分 缩砂三分（去皮） 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 青橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 白术三分 萝卜子三分（微炒） 桂心三分 木瓜三分 木香三分 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 槟榔三分

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心腹气壅滞，卒胀满，不能饮食。

57644 草豆蔻散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】草豆蔻一两（去皮） 吴茱萸一分（汤浸七遍，焙干，微炒） 紫苏茎叶一两 半夏三分（汤洗七遍去滑） 枳实三分（麸炒微黄，去瓤） 赤茯苓一两 前胡一两（去芦头） 木通一两（锉） 槟榔一两

【用法】上为散。每服二钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脚气，发动呕逆，胸中满闷，不下饮食。

57645 草豆蔻散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】草豆蔻半两（去皮） 黄连一两（去须） 丁香半两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加黑豆五十粒，生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】霍乱。水利不止，吐不下食，兼烦渴。

57646 草豆蔻散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】草豆蔻一两（去皮） 木香半两 桂心半两 人参一两（去芦头） 甘草半两（炙微赤，锉） 白术半两 干姜 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为散。每服二钱，以水一中盏，煎至六分，去滓热服，不拘时候。

【主治】霍乱吐泻，脐下气筑，心悸妨闷。

57647　**草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】草豆蔻一两(去皮)　高良姜一两(锉)　丁香一两　白术一两　人参一两(去芦头)　陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)　缩砂一两(去皮)　甘草半两(炙微赤,锉)　木瓜二两(干者)

【用法】上为散。每服二钱,以热生姜汤调下,不拘时候。

【主治】霍乱,吐泻后转筋。

57648　**草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】草豆蔻一两(去皮)　人参三分(去芦头)　陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)　白术半两　桂心半两　木通半两(锉)　槟榔半两　鸡舌香半两　赤茯苓半两　半夏半两(汤洗七遍去滑)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】膈气,心胸不利,食即呕逆。

57649　**草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】草豆蔻三分(去皮)　青橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙)　诃黎勒皮一两　益智子半两(去皮)　人参三分(去芦头)　细辛半两　赤茯苓半两　厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　半夏半两(汤洗七遍去滑)　丁香一分　甘草一分(炙微赤,锉)　槟榔三分

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】膈气壅滞,不下饮食,或宿食不消。

57650　**草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】草豆蔻一两(去皮)　泽泻半两　人参半两(去芦头)　桂心三分　白术三分　赤茯苓半两　半夏三分(汤洗七遍去滑)　陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙)　细辛半两　附子三分(炮裂,去皮脐)　厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　甘草三分(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,加生姜半分,大枣三个,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】心膈冷气痰饮,胸中滞闷,或吐清水,不纳饮食。

57651　**草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】草豆蔻一两(去皮)　白石脂一两　当归一两(锉,微炒)　干姜一两(炮裂,锉)

【用法】上为散。每服二钱,以粥饮调下,不拘时候。

【主治】水谷痢不止,腹内疼痛。

57652　**草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】草豆蔻三分(去皮)　高良姜半两(锉)　人参一两(去芦头)　白茯苓三分　白术半两　枇杷叶三分(拭去毛,炙微黄)　缩砂二两(去皮)　桂心半两　木香半两　半夏三分(汤洗七遍去滑)　青橘皮半两(汤浸,去白瓤,焙)　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妇人血风,冷气攻脾胃,呕逆不纳饮食。

57653　**草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】草豆蔻一两(去壳)　沉香半两　白豆蔻半两(去皮)　诃黎勒皮半两　白术半两　桂心半两　丁香母半两　甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服一钱,以生姜汤调下,不拘时候。

【主治】妇人脾胃虚冷气,胸膈不利,食即呕吐。

57654　**草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】草豆蔻一两（去皮） 桂心三分 芎䓖半两 当归半两（锉，微炒） 厚朴三分（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 干姜半两（炮裂，锉） 桔梗三分（去芦头） 槟榔半两 诃黎勒皮一两（煨，用皮） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食前稍热服。

【主治】妇人脾胃虚，气攻两胁胀痛。

57655 **草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】草豆蔻一两（去皮） 人参一两（去芦头） 柴胡一两（去苗） 白术一两 陈橘皮一两半（汤浸，去白瓤，焙） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】妊娠心腹胀满，脾胃气虚，不下食饮。

57656 **草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】草豆蔻一两（去皮） 当归半两（锉，微炒） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 桂心半两 干姜半两（炮裂，锉） 白术一两 熟干地黄一两 木香半两 芎䓖三分

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加大枣三个，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】妊娠心腹多痛，吃食减少，四肢不和。

57657 **草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】草豆蔻（去壳） 陈橘皮（汤浸，去白瓤，焙） 当归（锉，微炒） 白术 前胡（去芦头）各三分 附子（炮裂，去皮脐） 人参（去芦头） 木香 桂心 半夏（汤浸七遍去滑） 甘草（炙微赤，锉）各半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后脾胃虚寒，或时呕逆，不下饮食。

57658 **草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】草豆蔻三分（去皮） 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁） 桂心半两 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，稍热频服。

【主治】产后气虚，心烦咳癒。

57659 **草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】草豆蔻三枚（去皮） 槟榔一分 诃黎勒半两（煨，用皮） 人参一分（去芦头） 前胡一分（去芦头） 甘草半分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿胸中寒气积滞，气逆，不下乳食。

57660 **草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】草豆蔻三枚（去皮） 甘草一分（炙微赤，锉） 人参半两（去芦头）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿哕，不纳乳食。

57661 **草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】草豆蔻一分（去皮） 木香一分 五味子一分 人参一分（去芦头） 白茯苓一分 诃黎勒皮半两 陈橘皮一分（汤浸，去白瓤，焙） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】小儿吐利，兼胸胁胀满。

57662 **草豆蔻散**

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】草豆蔻三分（去皮） 龙骨一两

酸石榴皮三分(锉,炒微黄)　高良姜一分(锉)　当归半两(锉,微炒)　干姜一分(炮裂,锉)　子芩三分

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,加薤白一茎,煎至五分,去滓,不拘时候,量儿大小,分减温服。

【主治】小儿疳痢腹痛,不下乳食。

57663　**草豆蔻散**

【方源】《博济》卷二。

【组成】厚朴二两(去皮,用生姜三两取汁浸,炙汁尽为度)　草豆蔻(和皮)一两　干姜一两(炮)　白术一两(炮黄色)　诃子一两(炮,去瓤,细切,炒)二两

【用法】上为末。每服二钱,霍乱,冷米饮下,或酒调下;腹痛不可忍者,每服三钱,炒生姜酒下;余即如汤煎服。

【功用】和一切冷气。

【主治】脾胃气不和,霍乱不止,酒食所伤,兼患脾泄。

57664　**草豆蔻散**

【方源】《博济》卷三。

【组成】草豆蔻半两(每个面裹煨,候面焦黄,去面用)　甘草一两(炙)　肉桂(去皮)一两　陈皮(去白)一两　蛮姜一两

【用法】上为细末。每服一钱半,更入陈米末一钱,大枣二个,水一盏,同煎七分,温服,其滓再煎服之。

【主治】胃口冷,吃食无味;脾泄泻不止;酒后数圊如痢,心胸不快,不思饮食。

57665　**草豆蔻散**

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】草豆蔻一两(去皮)　青橘皮半两(汤浸,去瓤,焙干)　高良姜半两　诃黎勒皮半两(炮)　白术三分(微炒)　甘草一分(炙)

【用法】上为散。每服二钱,食前陈米饮调下,一日三次。

【主治】脾虚胃乏,不思饮食。

57666　**草豆蔻散**

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】草豆蔻一两半(去皮)　白术三分　高良姜三分　陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)　厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙香熟)

【用法】上为散。每服二钱,水一中盏,同煎七分,空心、食前和滓温服。

【主治】大肠虚冷,腹痛,不思饮食。

57667　**草豆蔻散**

《局方》卷三。为《博济》卷二"豆蔻汤"之异名。见该条。

57668　**草豆蔻散**

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】草豆蔻(去皮)一两　高良姜三分　桂(去粗皮)　丁香　木香　五味子　白豆蔻(去皮)　陈橘皮(去白,焙)　肉豆蔻(去壳)各半两　白术一两

【用法】上为散,研匀。每服二钱匕,煨生姜、木瓜汤下。

【主治】脾胃寒,腹中虚鸣,泄泻不止。

57669　**草豆蔻散**

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】草豆蔻(去皮,锉)八两　生姜(和皮切作片子用)一斤　甘草四两(炙,锉)　陈橘皮(去白,焙)一两

【用法】上和匀,入银器内,用水过药三指许,慢火熬令水尽,取出焙干为散。每服一钱匕,沸汤点之,夏月煎作冷熟水服。

【主治】胃寒气逆,呕哕不止。

【备考】本方方名,《普济方》引作"豆蔻散"。

57670　**草豆蔻散**

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】草豆蔻(去皮)半两　甘草(炙,锉)一分

【用法】上为细散。每服二钱匕,白汤调下。

【主治】心痛不欲饮食,胁痛如刺壅闷。

57671　**草豆蔻散**

【方源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】草豆蔻(去皮)　高良姜(炮)　陈曲(炒)　麦蘖(炒)　木香各一两　诃黎勒

(炮,去核) 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 桂(去粗皮) 乌梅肉(炒) 甘草(炙)各半两

【用法】上为散。每服二钱匕,空心、食前入盐点服。

【主治】膈气,宿食不消。

57672 草豆蔻散

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】草豆蔻一两一分 附子(炮裂,去皮脐) 五味子 陈橘皮(汤浸,去白,焙)各三分 白术 枳实(去瓤 麸炒) 桂(去粗皮) 干姜(炮) 鳖甲(醋炙,去裙襴) 芍药半两 木香各半两

【用法】上为散,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,木瓜盐汤送下。

【主治】留饮、宿食成癖。

【备考】本方方名,据剂型当作"草豆蔻丸"。

57673 草豆蔻散

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】草豆蔻五枚(和皮用) 人参 白茯苓(去黑皮) 防风(去叉) 藿香各半两 陈橘皮(去白,焙)一分

【用法】上为散。每服一钱匕,生姜米饮调下。

【功用】调中补虚。

【主治】小儿疳,渴不止。

57674 草豆蔻散

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】香薷茎 木瓜各五分 干姜二分 草豆蔻 藿香各四分 陈橘皮

【用法】上为细末。每服三钱,水一盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】内寒霍乱,吐泻不止,脉细而紧者。

【备考】方中陈橘皮用量原缺。

57675 草豆蔻散

《鸡峰》卷十四。为《医学纲目》卷六引《局方》"双解饮子"之异名。见该条。

57676 草豆蔻散

【方源】《鸡峰》卷十四。

【异名】常山饮子。

【组成】知母二斤 常山二斤(用川者) 乌药一斤(捶碎) 草果二斤 甘草二斤(炙) 高良姜二十两

【用法】上为粗末。每服三钱,水一盏,加生姜五片,大枣五个,煎至七分,去滓温服。

【主治】痁疾因外邪客于风府,生冷之物内伤脾胃,或先寒后热、先热后寒,或寒热独作,或连日发,或间日一发,寒则肢体颤掉,热则举身如烧,头疼恶心,烦渴引饮,气息喘急,口苦咽干,脊膂痠疼,肠鸣腹痛,诸药不效,渐成劳疟。

57677 草豆蔻散

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】草豆蔻仁 生姜 甘草 木香 人参各等分

【用法】上为粗末。每服二钱,水一盏,煎至七分,去滓,食后温服。

【功用】和气。

57678 草豆蔻散

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】厚朴(去粗皮,用生姜三两取汁浸,炙候汁尽为度) 陈皮(去白)各二两 草豆蔻(不去皮) 干姜(泡洗) 白术(炒) 诃子(泡,去核)各一两 甘草三两(炙) 五味子三分

【用法】上为细末。每服二钱,霍乱,冷饮下;若伤酒,以酒调下;肝痛不可忍者,炒生姜酒送下三钱。

【功用】和一切冷气。

【主治】肝胃气不和,霍乱不止,酒食所伤,肝泄。

57679 草豆蔻散

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】细辛叶 防风各二分 羊胫骨灰 熟地黄各五分 当归六分 草豆蔻仁 黄连各一钱三分 升麻二钱五分

【用法】上为细末。先用温水漱口,牙痛处擦之。

【主治】寒多热少,牙齿疼痛。

57680　草豆蔻散

【方源】《普济方》卷一九七引《卫生方》。

【组成】草豆蔻　当归　杏仁　厚朴　木香　麻黄　猪苓　半夏　良姜　藿香　甘草　吴茱萸各一两

【用法】上为饮子。分一半面裹炮之。每剂七钱,煨姜三片,同煎,寒时热吃,热时放冷吃。

【主治】一切疟。

57681　草豆蔻散

【方源】《普济方》卷二十一。

【组成】草豆蔻(面裹煨熟,去皮取肉)　茴香子(炒)各一两　木香半两　陈曲(微炒)　麦蘖(炒)各二两　厚朴(去粗皮,生姜汁炙)　干姜(炮)　陈橘皮(汤浸,去白,焙)各一两

【用法】上为散。每服二钱匕,先嚼煨生姜少许,食前沸汤调下。

【主治】脾气虚弱,腹内膨胀,不思饮食。

57682　草豆蔻散

【方源】《赤水玄珠》卷九。

【组成】草豆蔻　槟榔(各炒紫色)　罂粟壳(烧灰)各等分

【用法】上为末。每服二钱,饮下。

【主治】丈夫伤血,妇人血崩,渍入大肠出血。

57683　草豆蔻散

【方源】《济阳纲目》卷十三。

【组成】草豆蔻(去皮)　益智仁各一两　干柿蒂二两

【用法】上㕮咀。每服三钱,加生姜三片,水煎,热服。

【主治】寒气攻胃呃噫。

57684　草灵宝丹

【方源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】川芎　天麻(酒浸,去苗)　当归(洗)　白芍药　细辛(去土叶)　荆芥穗　川楝子肉(炒)　麻黄(去根节)　五加皮　白鲜皮　何首乌(酒浸)　自然铜(火烧七遍,醋浸七遍)　菊花　枳壳(炒,去瓤)　白术(炒)　薄荷叶　石斛(去根,炒)　威灵仙(去土)　枸杞子　木香　川乌头(炮,去皮脐尖)　甘草(炒)　附子(炮,去皮脐)　草乌头(炮,去皮脐尖)　香附子(炒)　车前子(酒浸)　金毛狗脊(去毛)　没药(别研)　人参(去芦头)　地骨皮(去土)　防风(去芦头)　羌活(去芦头)　香白芷　柴胡(去苗)　升麻　白牵牛(炒)　乌药　地龙(去土,炒)　乌梢蛇(酒浸,去皮骨,取肉)　槐角子(炒)　大黄(炒)　风梢蛇(酒浸,去皮骨,取肉)　白花蛇(酒浸,去皮骨,取肉)各四两　麝香一两(别研一半为衣)　乳香二两(别研)　乌鸦二只(腊月者,泥固济,炭火煅令泥红取出)　朱砂二两(研,同麝香为衣)

【用法】上除研者药外,并为细末,再入研者药末和匀,炼蜜为丸,每两作五丸,朱、麝香为衣。每服半丸或一丸,热酒化下,不拘时候。

【主治】中风,及八风五痹,瘫痪亸曳,口眼㖞斜,眉角牵引,项背拘强,牙关紧急,心中悸闷,神情如醉,遍身发热,骨节烦疼,肌肉麻木,腰膝沉重,皮肤瞤动,状若虫行;阳虚头痛,风寒入脑,目旋晕转,似在舟船,耳内蝉鸣,有如风雨之声应;风寒湿痹,脚气缓急,及打扑伤于筋骨,或遇天明,一身尽痛,不得睡卧。

57685　草果子汤

【方源】《卫生总微》卷十六。

【组成】草果子三个　甘草五寸　大枣七个

【用法】上锉。分三服,水一盏,煎至半盏,放温服,更量大小加减。

【主治】脾寒发疟。

57686　草果子散

【方源】《幼幼新书》卷十七引《吉氏家传方》。

【组成】草果子　半夏各半两　柴胡　厚朴　甘草(炙)　乌梅　大枣各一两　常山一

分

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，加生姜二片，煎至七分，温服。

【主治】小儿疟。

【加减】或去柴胡，加鳖甲。

57687 **草果饮子**

【方源】《妇人良方》卷二十一引《经效》。

【组成】半夏（泡） 赤茯苓 甘草（炙） 草果（炮，去皮） 川芎 陈皮 白芷各二钱 青皮（去白） 良姜 紫苏各一钱 干葛四钱

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一大盏，加生姜三片、大枣二个，同煎至七分，去滓，当发日侵早连进三服。

【主治】①《妇人良方》引《经效》：妇人产后疟疾，寒热相半，或多热者。②《证治宝鉴》：感冒后四逆，手足不遂，牙关紧急；霍乱四逆，手足搐搦，欲成风者。

【备考】本方方名，《校注妇人良方》引作“草果饮”。方中干葛，《医学纲目》作干姜。

57688 **草果饮子**

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】草果子仁四枚 人参（去芦头）半钱 半夏十三枚（中样者，沸汤浸洗七次） 甘草（炙）半钱 大枣三枚 乌梅三枚 生姜（三寸）一块

【用法】上㕮咀。用水一大碗，煎至半碗，去滓，食前温服。

【主治】疟疾。寒热往来，烦渴头痛，或但寒但热。

57689 **草果饮子**

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】草果子仁 乌梅肉（焙） 紫苏叶（去土） 赤茯苓（去皮） 厚朴（去粗皮，生姜制，炒干） 陈橘皮（去白） 甘草（炙） 肉桂（去粗皮） 人参（去芦头）各等分

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏，加生姜三片，同煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【功用】温脾养胃，顺气消饮，生津液，美饮食。

57690 **草果饮子**

【方源】《医方类聚》卷一二二引《定斋未病方》。

【组成】草果仁 苍术（泔浸） 厚朴（姜制） 陈皮 半夏曲 甘草 乌梅各等分

【用法】上㕮咀。每服半两，水盏半，加生姜五片，大枣二个，同煎七分，不拘时候。

【功用】快脾。

【主治】疟疾。

【加减】寒多者，加干姜、附子；热甚者，加柴胡；瘴疟，加槟榔。

57691 **草果饮子**

《永类钤方》卷十三。为《易简方》“草果平胃散”之异名。见该条。

57692 **草果饮子**

《丹溪心法》卷二。为《局方》卷三（绍兴续添方）“草果饮”之异名。见该条。

57693 **草果熟水**

【方源】《医方类聚》卷一九九引《吴氏集验方》。

【组成】乌梅三两 草果一两 干葛一两 白茯苓一两 甘草一两（炙） 干姜一两半 缩砂仁半两

【用法】上㕮咀。每服半两，水二碗，煎一碗，去滓，冷、热任意服。

【功用】消暑止渴。

57694 **草钟乳丸**

【方源】《千金翼》卷二十二引曹公方。

【异名】曹公草钟乳丸（《外台》卷三十七）。曹公钟乳丸（《圣济总录》卷八十一）。

【组成】钟乳二两（别研令细） 菟丝子一两（酒浸一宿，别捣） 石斛一两 吴茱萸半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。空腹服七丸，一日二次。服之讫，行数百步，温酒三合饮之。复行二三百步，口胸内热，热如定，即食干饭豆浆。过一日，食如常，须暖将息。服过半剂觉有效，即相续服三剂。

【功用】①《千金翼》：安五脏，补肠胃，下气

消食,长肌和中。②《圣济总录》:潜补。

【主治】①《千金翼》引曹公方:五劳七伤损肺,气急,丈夫衰老阳气绝,手足冷,心中少气,髓虚腰疼,脚痹身烦,口干不能食。②《圣济总录》:脚气久虚,脉来沉细。

【宜忌】不得闻见尸秽等气,亦不用食粗臭陈恶食;初服七日,不可为房事,过七日后任性,然亦不宜伤多。

【加减】多房者,加雄蛾三十枚;若失精者,加苁蓉三两。

57695　草粉丸子

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】飞天白六分(雄雀粪是,冬月者佳,炒令极热,为末)　麝香半分(细研)　巴豆三分(去皮心,纸裹压去油)

【用法】上为末,以糯米饭为丸,如梧桐子大。每服二丸,空心以生姜汤送下。

【主治】妇人积聚气,久不散,心腹疼痛。

57696　草寒食散

【方源】《千金翼》卷十五。

【组成】钟乳(炼)　附子(炮,去皮)　栝楼根　茯苓　牡蛎各一分(熬)　桔梗　干姜　人参　防风各一两　细辛　桂心各五分　白术三两半

【用法】上为末。每服二方寸匕,旦未食时,以淳美酒服,不耐者减之。建日服之,至破日止,周而复始。

【主治】心腹胁下支满,邪气冲上,又心胸喘悸不得息,腹中漉漉雷鸣,吞酸噫生食臭,食不消化,时泄时闭,心腹烦闷,不欲闻人声,好独卧,常欲得热,恍惚喜忘,心中怵惕如恐怖状,短气呕逆,腹中防响,五脏不调。

【加减】有冷,加椒;有热,加黄芩。

57697　草乌揭毒散

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】草乌　贝母　天花粉　南星　芙蓉叶各等分

【用法】上为末。用醋调搽四围,中留头出毒,如干用醋润之。

【主治】痈疽肿毒。

57698　草乌敷贴药

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】草乌　绿豆粉　白胶香各等分

【用法】上为末,煎牛皮胶调药摊纸上,贴痛处。

【主治】折伤。

57699　草决明合剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】草决明根50克　磨盘草(全株)50克　马缨丹根50克　苦参(或丹参)5克　川连5克

【用法】上药加水过药面,煎二次,浓缩为100毫升。内服。

【主治】麻风。

57700　草豆蔻拨刀

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】草豆蔻二枚(去皮)　高良姜半两　生姜汁半合

【用法】上药,前二味锉细,以水一中盏,煮取二合,并生姜汁溲白面四两,为拨刀,以羊肉臛汁内煮令熟,空腹食之。

【主治】脾胃气虚弱,呕逆,不能饮食。

57701　草还益元丹

《便览》卷三。为《扶寿精方》"草还丹"之异名。见该条。

57702　草果七枣汤

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】草果　常山　贝母　鸡心槟榔　大枣　甘草　乌梅各等分　青蒿倍之

【用法】每服四钱,用水一盏半,煎至七分,通口服,滓再煎服。

【主治】瘴疟。

57703　草果平胃散

【方源】《易简方》。

【异名】定斋草果饮子(《医方类聚》卷一二二引《简易》)、草果饮子(《永类钤方》卷十三)。

【组成】厚朴三两半　苍术五两半　橘红

三两半　甘草一两　草果一枚　乌梅一枚

【用法】上㕮咀。每服四钱，加生姜七片，同煎。

【主治】脾寒瘖疾。

57704 草果平胃散

【方源】《医方类聚》卷一〇〇引《医方大成》。

【异名】对金饮子（《医学入门》卷八）。

【组成】苍术（去皮，米汁浸二日）五两　厚朴（去皮，姜制，炒香）　陈皮（去白）各三两二钱　甘草（炒）三十两　草果

【用法】水一盏，生姜三片，大枣一个，煎，或盐汤点服亦可。

【功用】①《医方类聚》引《医方大成》：暖胃消痰，除山岚瘴气。②《医学入门》：调理脾胃。

【主治】①《医方类聚》引《医方大成》：脾胃不和，不进饮食。②《医学入门》：寒热疟疾。

【备考】方中草果用量原缺。

57705 草果平胃散

【方源】《得效》卷二。

【组成】生料平胃散四两　草果　大腹皮　槟榔　青皮各二两

【用法】上为末。每服五钱，水一盏半，加生姜三片，大枣二个，煎七分，空心多服收效。

【主治】脾虚作疟，不问寒热先后，饮食不进。

57706 草果知母汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】草果一钱五分　知母二钱　半夏三钱　厚朴二钱　黄芩一钱五分　乌梅一钱五分　花粉一钱五分　姜汁五匙（冲）

【用法】水五杯，煮取二杯，分二次温服。

【主治】背寒，胸中痞结，疟来日晏，邪渐入阴。

【方论选录】是方以草果温太阴独胜之寒，知母泻阳明独盛之热，厚朴佐草果泻中焦之湿蕴，合姜、半而开痞结，花粉佐知母而生津退热；脾胃兼病，最畏木克，乌梅、黄芩清热而和肝；疟来日晏，邪欲入阴，其所以升之使出者，全赖草果。

57707 草果建中汤

【方源】《普济方》卷三九〇。

【组成】人参　草果　桂各半两　白芍药一两　甘草三分

【用法】上为散。大铫水煎，日进多服。

【主治】小儿诸疟。

57708 草果茵陈汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】草果一钱　茵陈三钱　茯苓皮三钱　厚朴二钱　广皮一钱五分　猪苓二钱　大腹皮二钱　泽泻一钱五分

【用法】水五杯，煮取二杯，分二次服。

【主治】足太阴寒湿，舌灰滑，中焦滞痞。

【方论选录】湿滞痞结，非温通而兼开窍不可，故以草果为君；茵陈推陈生新，生发阳气之机最速，故以之为佐；广皮、大腹、厚朴，共成泻痞之功；猪苓、泽泻以导湿外出也。

57709 草果厚朴丸

【方源】《普济方》卷二十三引《卫生家宝》。

【组成】厚朴一两五钱（削去粗皮，洗，切，水煮数十沸，晒干，杵细，以姜等分研细，拌和罨两宿，焙干，入后药）　陈皮一两（汤浸一日，干，不去白）　干姜五钱（炮）　草果子一两（纸裹水浸，炮令香熟，去皮）　白术五钱（洗，锉，麸炒）　诃黎勒一两（纸裹水湿，煨干取肉）　桂半两（去粗皮，每一两取半两）　缩砂仁一两（去壳，汤泡洗，再去膜）

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心、食前白汤送下。

【功用】去湿，厚肠胃，固元脏，大进饮食，充肌肤，去酒毒。

【主治】脾胃虚弱，全不思饮食，腹痛滑泄，肠胃怯薄，关节不通。

57710 草果养脾汤

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】草果仁　茯苓（白者，去皮）　缩砂仁各半两　桔梗一分　甘草一两半（炙）　生

姜六两(用白面四两同拌和,罨一宿,炒黄)

【用法】上为细末。每服一钱,沸汤点下。

【功用】健脾化痰,开胃进食,久服无痁痢疾。

57711　草果柴平汤

【方源】《医宗金鉴》卷四十二。

【组成】小柴胡合平胃散加草果

【主治】因食而病疟,痞闷,噫气,恶食。

57712　草蔻大顺饮

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】草蔻　炮姜　广皮　半夏　厚朴　甘草

【主治】食积呕吐属寒者。

57713　草蝎经进方

《永类钤方》卷七。为原书同卷"军中一捻金散"之异名。见该条。

57714　草乌复方洗剂

【方源】《中医皮肤病简编》。

【组成】生草乌9克　百部9克　土槿皮9克　白鲜皮9克　猪牙皂9克　威灵仙9克

【用法】醋250毫升,水250毫升,将上药煎一夜,浓煎熏洗。

【主治】手癣。

茧

57715　茧丝汤

【方源】《直指》卷十七。

【异名】蚕茧汤(《朱氏集验方》卷二)、原蚕茧汤(《医学正传》卷五)、缲丝汤(《本草纲目》卷三十九)、缫丝汤(《回春》卷五)、茧丝饮(《卫生鸿宝》卷一)。

【组成】茧播丝

【用法】煎汤,任意饮之。

【主治】①《直指》:消渴。②《卫生鸿宝》:血淋,三消症及妇人血崩。

【方论选录】《医学正传》:盖此物属火,有阴之用,大能泻膀胱中相火,引阴水上潮于口而不渴也。

【临证举例】消渴　《朱氏集验方》:有一人苦渴疾,日饮斗水,诸药不效,遂服煮蚕茧播丝汤一盏,其渴顿除,恐不及时,如无,但以乱绵煎汤服。

57716　茧丝饮

《卫生鸿宝》卷一。为《直指》卷十七"茧丝汤"之异名。见该条。

57717　茧灰散

【方源】《千金珍秘方选》引徐泗溪秘方。

【组成】陈茧子炭一钱　人中白二钱五分　芦荟一分　冰片一分五厘　犀黄二分　生五倍子(将生矾五分装人五倍子内煅枯)五分　青黛三分

【用法】上为极细末。和匀掺之。

【主治】口疳并白腐。

57718　茧黄散

【方源】《本草纲目》卷三十九引《圣惠》。

【组成】茧黄　蚕蜕纸(并烧存性)　晚蚕沙　白僵蚕(并炒)各等分

【用法】上为末,入麝香少许。每服二钱,用米饮送下,一日三次。

【主治】肠风,大小便血,淋沥疼痛。

57719　茧卤点眼煎

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】茧卤一升(青香者)　青梅二十七枚　古文钱二十一文

【用法】上以新瓷瓶盛,密封,于汤中煮一炊久,取出,经三日后,每以铜箸头取少许点目中,一日三五次。

【主治】眼风赤,热泪,虚肿赤涩痛。

茵

57720　茵芋丸

【方源】《千金》卷五。

【组成】茵芋叶　铅丹　秦艽　钩藤皮　石膏　杜蘅　防葵各一两　菖蒲　黄芩各一两半　松萝半两　蜣螂十枚　甘草三两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如小豆大。三岁以下服五丸,三岁以上服七丸,五岁以上服十

丸，十岁以上可至十五丸。

【主治】少小有风痫疾，至长不除，或遇天阴节变，便发动，食饮坚强亦发，百脉挛缩，行步不正，言语不便。

57721 **茵芋丸**

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】茵芋三分 狗脊三分 麻黄三分（去根节） 丹参半两 五加皮一两 杜仲一两（去粗皮，炙微黄） 朱砂三分（细研，水飞过） 甘草半两（炙微赤，锉） 附子一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为末，研入朱砂令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温酒送下。

【主治】历节风疼痛，皮坼及血出者。

【宜忌】忌羊血。

57722 **茵芋丸**

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】茵芋 细辛（去苗叶） 黄芩（去黑心） 甘草（炙） 龙齿（烧灰） 石膏（碎） 松萝各三分 杜蘅半两 铅丹（别研）一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。一二岁儿，每服三丸，三四岁儿服五七丸，米饮送下。

【主治】小儿干疳体热。

57723 **茵芋丸**

【方源】《本事》卷三。

【组成】茵芋（去梗，锉） 朱砂（水飞） 薏苡仁各一分 牵牛子一两半 郁李仁（去皮尖，微炒）半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，轻粉滚为衣。每服十丸至十五丸，至二十丸，五更初，温水送下。到晚未利，再一二服，快利为度，白粥将息。

【主治】历节肿满疼痛。

【方论选录】《本事方释义》：茵芋气味苦温，入手少阴；薏苡仁气味甘平淡渗，入手、足太阴；牵牛子气味苦辛微寒，入手、足阳明；郁李仁气味辛温而润，入手、足太阴、阳明；轻粉气味辛咸微寒，为衣者，取其能引药入下也。历节而致肿满，非下利不能杀其势，故渗湿行经，必使其下利也。

57724 **茵芋丸**

【方源】《本事》卷四。

【组成】茵芋叶（锉，炒） 薏苡仁各半两 郁李仁（去皮尖，微炒）一两 牵牛子三两（生取末一两半）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，五更服，姜枣汤送下。未利，加至三十丸，一日三次，快为度，白粥补。

【主治】风气积滞成脚气，常觉微肿，发则或痛。

【方论选录】《本事方释义》：茵芋气味苦辛温，入手、足阳明；薏苡仁气味甘平淡渗，入手、足太阴；郁李仁气味辛平，入手、足太阴、阳明；牵牛子气味苦寒，入手、足阳明、太阳，最能行水利湿，此因风气积滞既久而成，非行水下走之药，不能中病也。

57725 **茵芋汤**

【方源】《千金》卷十三。

【组成】茵芋一分 人参 甘草 苁蓉 黄耆 茯苓 秦艽 厚朴各一两 防风十两 乌喙二两 松实 山茱萸各三两

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取二升半，分三服，强人令日夜尽；劣人分五服，二日尽。

【主治】风虚眩，眼暗。

57726 **茵芋汤**

【方源】《圣惠》卷九十一。

【组成】茵芋 防风 附子 牡蛎 莽草各半两

【用法】上细锉，和匀。以水一斗，煮取六升，去滓，看冷暖洗浴。

【主治】小儿风瘙瘾疹，心膈烦闷。

【宜忌】宜避风。

57727 **茵芋汤**

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】茵芋一两 甘草（锉） 苦参各三两 细辛（去苗叶） 黄连（去须）各二两 蕤仁二十枚（去皮）

【用法】上为粗末，每以三两，用水五升，煮取三升，去滓浴儿，逐日用。

【主治】小儿恶疮。

57728 **茵芋饮**

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】茵芋　乌头(炮裂，去皮脐)　干姜(炮)　细辛(去苗叶)　黄芩(去黑心)　桂(去粗皮)　天雄(炮裂，去皮脐)　防己　白茯苓(去黑皮)各一两　秦艽(去苗土)　防风(去叉)　当归(焙)　甘草(炙)各二两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，入篁竹沥少许，煎至八分，去滓温服。

【主治】贼风入腹，腹中拘急，烦乱恍惚，妄语迷惑，不知人事，口噤不开，卧则惊怖，口干恶风，时时失精。

57729 **茵芋酒**

【方源】《外台》卷十九引《深师方》。

【组成】茵芋二两　狗脊二两　踯躅花二两(生用)　乌头二两(生用)　附子二两(生用)　天雄一两(生用)

【用法】上切，以酒一斗，绢囊盛药渍之，冬八九日，夏五六日，初服半合，不知增之，以知为度。

【主治】新久风，体不仁，屈曳，或拘急肿，或枯焦。

【宜忌】忌猪肉、冷水。

57730 **茵芋酒**

【方源】《千金》卷七。

【组成】茵芋　乌头　石南　防风　蜀椒　女萎　附子　细辛　独活　卷柏　桂心　天雄　秦艽　防己各一两　踯躅二两

【用法】上㕮咀。少壮人无所熬炼，虚老人薄熬之，清酒二斗渍之，冬七日，夏三日，春、秋五日，初服一合，不知，加至二合，宁从少起，一日二次。以微痹为度。

【主治】①《千金》：大风头眩重，目瞀无所见，或仆地气绝，半日乃苏，口㖞噤不开，半身偏死，拘急痹痛，不能动摇，历节肿痛，骨中痠疼，手不得上头，足不得屈伸，不能蹑履，行欲倾跛，皮中动淫淫如有虫啄，疹痒，搔之生疮，甚者狂走。②《普济方》：蛊风，皮肤尽痛。

57731 **茵芋酒**

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】茵芋一两　乌头一两(炮裂，去皮脐)　天雄一两(炮裂，去皮脐)　附子一两(炮裂，去皮脐)　川椒一两(去目及闭口者，微炒去汗)　踯躅花一两(醋拌，炒令干)　干姜一两(炮裂)　桂心一两　防风一两(去芦头)　石南叶一两　甘草一两(炙微赤，锉)　莽草一两(炙微黄)

【用法】上锉细，以生绢袋盛，以清酒一斗五升，浸三七日满后，每日空心及临卧时暖一小盏服之。

【主治】大风疾。

57732 **茵芋酒**

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】茵芋(去粗茎)　附子(炮裂，去皮脐)　天雄(炮裂，去皮脐)　乌头(炮裂，去皮脐)　秦艽(去苗土)　女萎　防风(去叉)　羊踯躅　防己　石南　细辛(去苗叶)　桂心(去粗皮)各一两

【用法】上㕮咀，如麻豆，夹绢囊盛贮，以清酒五升浸之，冬七日，夏三日，春、秋五日。初服一合，一日三次，渐增之。

【主治】①《圣济总录》：血痹，肌体手足痿弱，四肢拘挛。②《普济方》：贼风，手足枯痹。

57733 **茵芋散**

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】茵芋一两半　枳壳一两(麸炒微黄，去瓤)　当归一两(锉，微炒)　荆芥一两　细辛三分　桂心三分　独活一两半　天麻一两　羚羊角屑一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】偏风，口眼不正，言语謇涩，四肢拘急。

57734 **茵芋散**

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】茵芋一两 川乌头半两（炮裂，去皮脐） 天雄一两（炮裂，去皮脐） 石南一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 桂心一两 秦艽一两（去苗） 防风一两（去芦头） 踯躅花半两（醋拌匀，炒干）

【用法】上为细散。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】风血痹，体虚，风邪入血，肌肤顽痹。

57735 **茵芋散**

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】茵芋半两 川乌头半两（炮裂，去皮脐） 干姜半两（炮裂，锉） 细辛半两 黄芩半两 桂心半两 天雄半两（炮裂，去皮脐） 汉防己三分 秦艽一两（去苗） 赤茯苓三分 防风一两（去芦头） 当归三分（锉，炒） 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，人竹沥一合，更煎一二沸，温服，不拘时候。

【主治】贼风人腹，腹中拘急，烦乱恍惚，迷惑不知人事，口噤不开，手足缓弱，卧即惊恐，口干，身体沉重。

57736 **茵芋散**

【方源】《圣惠》卷二十。

【异名】人参汤（《圣济总录》卷十七）。

【组成】茵芋一两 黄芩一两 附子一两半（炮裂，去皮脐） 人参一两（去芦头） 芎䓖三分 防风三分（去芦头） 麻黄一两半（去根节） 汉防己三分 甘草三分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】风入腹，拘急疠痛。

57737 **茵芋散**

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】茵芋三分 桂心三分 汉防己三分 附子三分（炮裂，去皮脐） 侧子三分（炮裂，去皮脐） 芎䓖三分 人参一分（去芦头） 麻黄三分（去根节） 当归三分（锉，微炒） 赤芍药三分 秦艽一两（去苗） 茯神三分 五加皮三分 防风半两（去芦头） 白术半两 黄耆半两（锉） 细辛半两 甘菊花半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，下竹沥一合，更煎一二沸，温服，不拘时候。

【主治】偏风，积年不愈，脚手枯细，口面㖞斜，精神不守，言语倒错。

【宜忌】忌生冷、油腻、毒鱼、滑物。

57738 **茵芋散**

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】茵芋一两 肉桂一两（去皱皮） 海桐皮一两 芎䓖一两 狗脊一两 防风一两（去芦头） 牛膝一两（去苗） 附子二两（炮裂，去皮脐） 松节一两（锉） 苍耳子一两（微炒） 当归一两 羌活一两 木香一两 麝香一两（分）（研入）

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服二钱，以温酒调下，不拘时候；如不饮酒，荆芥、薄荷汤下亦得。

【主治】风，身体疼痛，肢节不利。

【宜忌】忌生冷、油腻、猪、鸡、犬肉。

57739 **茵芋散**

《圣济总录》卷十八。为《千金》卷二十三“岐伯神圣散”之异名。见该条。

57740 **茵芋散**

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】茵芋（去茎） 杜仲（去粗皮，炙，锉） 石南 石龙芮 羊踯躅（微炒） 麝香（研） 狗脊（去毛） 当归（锉，炒） 干蝎（微炒） 桑螵蛸（微炒） 菖蒲各半两 赤箭 独活（去芦头） 附子（炮裂，去皮脐） 天雄（炮裂，去皮脐） 甘菊花 牛膝（去苗，酒浸，切，焙） 木香 麻黄（去根节，煮，掠去沫，焙） 芎䓖各三分 萆薢（锉）一两

【用法】上为散。每服二钱匕，食前温酒调

下，一日二次。

【主治】肾脏中风湿，腰痛，脚膝偏枯，皮肤痛痹，语声謇涩，两耳虚鸣，举体乏力，面无颜色，志意不乐，骨节痠疼。

57741　茵芋散

《御药院方》卷一。为《圣惠》卷四十四"茵芋浸酒"之异名。见该条。

57742　茵芋散

【方源】《永乐大典》卷九一〇引《风科集验方》。

【组成】茵芋　桂心　天雄(炮，去皮脐)　附子(炮，去皮脐)　菖蒲　茜根　干姜(炮)　细辛(去苗)各一两　桑寄生　白术(去芦)各三两

【用法】上为细末。每服二钱，温酒调下，一日二次，不拘时候。合药时，勿令人见。

【主治】飞尸鬼疰，及男子妇人风邪相搏，忧愁思虑，喜怒无常，或半年，或三四月之内复发。

57743　茵芋散

《普济方》卷一八五。即《圣济总录》卷二十"防己汤"。见该条。

57744　茵陈丸

【方源】《外台》卷二引《延年秘录》。

【组成】茵陈三两　大黄五两　栀子仁二两　黄芩二两　鳖甲二两(炙)　常山二两　芒消二两　巴豆一两(去皮心，熬)　升麻二两　豉三合(熬)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三丸，饮送下。以得吐利则愈。

【主治】天行热病七八日，成黄，面目身体悉黄，心满喘，气粗气急者。

【宜忌】忌苋菜、生葱、生菜、野猪肉、芦笋。

57745　茵陈丸

【方源】《千金》卷十。

【异名】茵陈蒿丸(《圣济总录》卷三十七)、三山丸(《鸡峰》卷五)、茵陈栀子丸(《鸡峰》卷九)、栀子丸(《得效》卷三)。

【组成】茵陈　栀子　芒消　杏仁各三两　巴豆一两　恒山　鳖甲各二两　大黄五两　豉五合

【用法】上为末，以饧为丸，如梧桐子大。每服三丸，饮送下。以吐利为佳。不知，加一丸。初觉体气有异，急服之。

【主治】时行病，急黄，瘴疠疫气，痎疟，赤白痢，伤寒，妇人血气刺痛，小儿惊热欲发痫。

①《千金》：时行病，急黄，瘴疠疫气，痎疟。②《伤寒总病论》：黄病痃癖，时气伤食，小儿惊热欲发痫，赤白痢，春初有宿热。③《鸡峰》：伤寒五七日以后，胸膈痞闷，喘急呕逆；妇人血气刺痛。

【宜忌】《普济方》：忌苋菜，芦笋，野猪肉，生葱，生菜。

【方论选录】《医方集解》：此足太阳、阳明、厥阴药也。栀子、淡豉，栀豉汤也，合常山可以涌吐，合杏仁可以解肌；大黄、芒消，承气汤也，可以荡热去实，合茵陈可以利湿退黄，三药名茵陈汤，治黄正药；加巴豆大热以祛脏腑积寒，加鳖甲滋阴，以退血分寒热。此方备汗吐下三法，故能统治诸病。居平当预合之，以备缓急，虽云劫剂，实佳方也。

57746　茵陈丸

【方源】《千金》卷十。

【组成】茵陈　栀子　天门冬各四两　大黄　桂心各三两　通草　石膏各二两　半夏半升

【用法】上药，蒸大黄、通草、天门冬、半夏、栀子，晒令干，为末，炼蜜为丸，如大豆大。每服三丸，一日三次。不知，加至十丸。

【主治】气淋胪胀腹大，身体面目悉黄，及酒疸短气不得息。

【宜忌】忌生鱼，以豆羹服，不得用酒。

57747　茵陈丸

【方源】《千金翼》卷十八。

【组成】茵陈一两　甘遂一分　当归　蜀椒(汗)各半两(去目闭口)　杏仁(去皮尖双仁，熬)　大黄　半夏(洗)各三分　葶苈(熬)　茯苓　干姜各一两　枳实(炙咀，熬黄)　白

术(熬黄)各五分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三丸,空腹以饮送下,一日三次。

【主治】黑疸,身体暗黑,小便涩,体重。

57748 茵陈丸

【方源】《外台》卷四引《必效方》。

【异名】茵陈蒿丸(《圣济总录》卷六十)。

【组成】茵陈四两　大黄三两　黄芩三两　栀子三两

【用法】上为末,炼蜜为丸。每服二十丸,稍加至二十五丸,饮送下。

【主治】一切黄,小便黄色及身黄者。

57749 茵陈丸

【方源】《外台》卷四引《广济方》。

【组成】茵陈四两　黄芩三两　枳实二两(炙)　大黄三两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,渐加至二十五丸,空腹以米饮送下,一日二次。微利为度。

【主治】黄疸,遍身面悉黄,小便如浓栀子汁。

【宜忌】忌热面、蒜、荞麦、粘食、陈臭物。

57750 茵陈丸

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】茵陈一两　川大黄二两(锉碎,微炒)　豉一合　栀子仁一两　鳖甲一两(涂醋炙令黄,去裙襕)　川芒消二两　杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以竹叶汤送下,以利为度,不拘时候。

【主治】时气热毒不解,心胸躁闷,变为黄。

57751 茵陈丸

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】茵陈半两　恒山一分　栀子仁一两　鳖甲一两(涂醋炙令微黄,去裙襕)　川朴消一两　川大黄一两(锉碎,微炒)　木香一两　犀角屑一两　川升麻半两　巴豆一分(去皮心,研,纸裹压去油)　杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄,别研如膏)

【用法】上为末,入杏仁、巴豆,同研令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三丸,空心煎乌梅汤送下。如人行十里,或利或汗或吐为效,如未应,即再服三丸。

【主治】热病发黄病。

57752 茵陈丸

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】茵陈二两　大麻仁五两(研如膏)　豉五合(炒干)　恒山三两(锉)　栀子仁二两　鳖甲一两(涂醋,炙令黄,去裙襕)　川芒消二两(细研)　杏仁三两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)　巴豆一两(去皮心,熬令黄,纸裹压去油,研)

【用法】上为末,入研了药令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三丸,以粥饮送下。或吐、或利、或汗。如不吐利,不汗,再服之愈。更不吐利,即以热粥饮投之。老人以意加减。

【主治】山瘴疟及时气。

57753 茵陈丸

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】茵陈一两　黄芩一两半　枳壳一两(麸炒微黄,去瓤)　川大黄一两半(锉碎,微炒)　川升麻一两半

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以清粥饮送下,一日三四次。

【主治】黄疸,身面悉黄,小便如浓栀子汁。

57754 茵陈丸

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】茵陈一两　枳壳一两(麸炒微黄,去瓤)　白术一两　半夏三分(汤洗七遍去滑)　赤茯苓一两　甘遂一分(煨微黄)　当归三分　杏仁三分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)　木通一两(锉)　川椒三分(去目及闭口者,炒微黄去汗)　川大黄三分(锉碎,微炒)　甜葶苈一两(隔纸炒令紫色)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,食前以温水送下。

【主治】黑疸,身体间黑,小便赤涩。

57755 **茵陈丸**

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】茵陈一分 栀子仁一分 川大黄一分(锉碎,微炒) 秦艽一分(去苗) 川朴消十两 甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服五丸,以温水送下,不拘时候。

【主治】小儿脾胃热毒,致肌肉变黄,小便赤少,心中烦懊。

57756 **茵陈丸**

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】茵陈蒿一两 大黄(锉) 鳖甲(去裙襕,醋浸炙黄) 常山 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒令黄) 栀子仁各半两 巴豆(去皮心膜,研出油尽) 芒消(研)各一分

【用法】上为末,以豉汁和丸,如梧桐子大。每服五丸,空心茶送下,得快利,以冷粥止之。

【主治】初得温黄瘴气,憎寒壮热。

57757 **茵陈丸**

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】茵陈蒿三分 大黄(锉,炒) 黄连(去须) 黄芩(去黑)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸,食后、临卧温水送下。

【主治】黄疸,身体面目皆黄。

57758 **茵陈丸**

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】茵陈蒿 常山各半两 大黄(锉,炒)三分 朴消(研)一分 豉(炒)一合

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食后温竹叶汤送下。

【主治】黄疸,面目身体皆黄,口干烦躁,发热狂闷。

57759 **茵陈丸**

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】茵陈蒿 柴胡(去苗) 栀子仁各四两 龙胆 枳壳(去瓤,麸炒)各二两 黄芩(去黑心) 升麻 大黄(锉,炒)各三两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,饮送下,一日二次。以利为度。

【主治】①《圣济总录》:身面悉黄,小便如浓栀子汁。②《医方类聚》引《施园端效方》:酒疸,食气,女劳疸,诸种黄疸。

57760 **茵陈丸**

【方源】《遵生八笺》卷六。

【组成】茵陈四两 大黄五两 豉心五合(炒令香) 恒山三两 桃核仁三两(炒) 芒消三两 杏仁三两(去皮尖) 鳖甲二两(酒醋涂炙) 巴豆一两(去皮膜,去油,炒,另研)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。初得时三日内,旦服五丸,或利或吐汗,若否,再加一丸,久不觉,即以热汤饮促之;老小以意酌服。春初一服,一年不病,收瓶以腊封口,置燥处。

【主治】时疫温疟,山峦瘴气,黄病痰癖,时气伤寒,痎疟发痫,赤白痢。

57761 **茵陈汤**

《外台》卷四引《范汪方》。为《伤寒论》"茵陈蒿汤"之异名。见该条。

57762 **茵陈汤**

【方源】崔氏引史脱方(见《外台》卷四)。

【组成】茵陈三两 黄连二两 黄芩三两 栀子十四枚 大黄一两(炙) 甘草一两(炙) 人参一两

【用法】上切。以水一斗,煮取三升,分三服。

【主治】黄疸,身体面目尽黄。

57763 **茵陈汤**

【方源】《千金翼》卷十八。

【组成】茵陈 半夏(洗)各二两 生姜四两(切) 大黄二两半 芍药、白术各一两半 栀子(擘) 前胡各三两 枳实(炙) 厚朴(炙) 黄芩 甘草(炙)各一两

【用法】上㕮咀。以水四斗,煮取九升七合,分十服。

【主治】时行黄疸,结热,面目四肢通黄,干呕,大便不通,小便赤黄似柏汁,腹痛心烦。

57764 **茵陈汤**

【方源】《外台》卷四引《必效方》。

【组成】茵陈四两　大黄三两　黄芩三两　栀子三两

【用法】上切。以水五升，煮取三升，分三服，空腹服之。

【主治】一切黄。小便黄色及身黄者。

【宜忌】忌羊肉、酒、面、热物。

57765 **茵陈汤**

【方源】《外台》卷四引《近效方》。

【组成】茵陈四两　黄芩二两　栀子三两　升麻三两　大黄三两　龙胆草二两　枳实二两（炙）　柴胡四两

【用法】上切。以水八升，煮取二升七合，分温三服。不愈更作，以愈为度，不过三四剂愈，隔三五日一剂。

【主治】①《外台》：发黄，身面眼悉黄如金色，小便浓如煮黄柏汁者。②《圣济总录》：谷疸，食则头眩，心忪，怫郁不安，久久发黄。

【加减】若身绝羸，加生地黄一升，栀子加至七两，去大黄。如气力不羸，依前着大黄。

57766 **茵陈汤**

【方源】《幼幼新书》卷十一引《婴孺方》。

【组成】茵陈　大黄　黄芩各四分　黄连　消石（无，以芒消代之）　甘草（炙）各二分

【用法】以水三升，煮取一升二合，纳消石烊尽，为三服。

【主治】少小发痫，经日不解，诸治不愈，口焦，面赤黑，胸中有热。

57767 **茵陈汤**

【方源】《幼幼新书》卷十五引《婴孺方》。

【组成】茵陈　升麻　黄芩　柴胡　知母　羚羊角屑各八分　大黄　石膏各一钱二分　栀子一钱　芍药六分　瓜蒂七个　蓝叶（切）一升　甘草二分（炙）

【用法】上切。以水五升，煮一升半，一二岁为八服，四五岁为四服，量儿大小与之。

【主治】小儿发黄。

57768 **茵陈汤**

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】茵陈蒿　山栀仁各三分　炙甘草半两　木通（锉）一两　栝楼根　柴胡（去苗）各一两　麦门冬（去心，焙）一两五钱

【用法】上为粗散。每服五钱匕，水二盏，加竹叶三七片，同煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】黄疸，目黄，小便如血，心烦躁闷，口苦头痛。

57769 **茵陈汤**

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】茵陈蒿　栀子仁　黄芩（去黑心）　大黄（锉，炒）　白鲜　黄连（去须）各一两　朴消（研）　贝齿（煅）各半两

【用法】上药除朴消外为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，入朴消末一钱匕，再煎令沸，食后温服。

【主治】急黄，目如栀子色，小便赤，心烦闷。

57770 **茵陈汤**

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】茵陈蒿　赤茯苓（去黑皮）　葛根（锉）各半两　栀子仁半分　栝楼根三分　秦艽（去苗土）　升麻各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】酒疸，心中懊痛，小便黄赤。

57771 **茵陈汤**

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】茵陈蒿　白鲜皮各一两

【用法】上为粗散。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓，食前温服，一日三次。

【主治】病人身黄如金色，不多语言，四肢无力，好眠卧，口吐粘涎。

57772 **茵陈汤**

《医统》卷十八。为《直指》卷十六“山茵陈散”之异名。见该条。

57773 **茵陈汤**

【方源】《普济方》卷一四二引《濟衰方》。

【组成】山茵陈　山栀子各三钱　秦艽　升麻各四钱

【用法】上㕮咀。以三钱为一服，水煎去滓，食后服。五日减三分之一，十日减三分之二，二十日病悉去。

【主治】①《普济方》引《澹寮方》：伤寒发汗有留热，身面皆黄，多热，食不减。②《普济方》：黄疸，小便赤。

57774　茵陈汤

【方源】《普济方》卷一三〇引《鲍氏方》。

【组成】茵陈一两　淡竹叶　大黄三钱半　栀子五大个　通草二钱

【用法】上为散。以水二盏，煎茵陈，次下后药，至一盏，调三味。

【主治】伤寒七八日内，热结，身黄如橙，小便不利，腹胀，并酒伤，瘀热在内，发热，头有汗，身无汗。

57775　茵陈汤

【方源】《医学纲目》卷三十一。

【组成】茵陈　山栀　柴胡　黄柏(蜜炙)　黄芩　升麻　龙胆草各半两　大黄(炒)一两

【用法】上㕮咀。水煎，空心服。以利为度。

【主治】伤寒发黄，目悉黄，小便赤。

57776　茵陈汤

【方源】《普济方》卷四十七。

【组成】茵陈一分　人参　甘草　苁蓉　黄耆　茯苓　秦艽　厚朴　乌喙各二两　防风六两　山茱萸　松实各三两

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取二升半，分五服，强者一日夜尽，羸劣分五服，二日尽。

【主治】风头眩眼暗。

57777　茵陈汤

【方源】《普济方》卷三六九。

【组成】山茵陈　山栀子各一两　川大黄　芒消　寒水石　木通各半两

【用法】上㕮咀。每服一钱，水八分，煎至五分，去滓温服。

【主治】小儿发黄，身如橘色。

57778　茵陈汤

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】茵陈　山栀　滑石　甘草　枳实　黄连

【用法】水、灯心煎服。

【主治】黄，传经热症。

【加减】渴，加天花粉、石膏；大便燥实，加大黄。

57779　茵陈汤

《医学入门》卷四。即《伤寒六书》卷三"茵陈将军汤"。见该条。

57780　茵陈汤

【方源】《医统》卷十八。

【组成】茵陈　栀子仁各二钱　赤茯苓　葶苈各一钱半　枳实　甘草各五分

【用法】水二盏，加生姜三片，煎八分，食前服。

【主治】疸证发热，大小便涩。

57781　茵陈汤

【方源】《幼科发挥·附汤方》。

【组成】茵陈　栀子　黄柏

【用法】煎汤服。

【主治】黄疸。

57782　茵陈汤

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】茵陈　柴胡　薄荷　当归　猪苓　陈皮　车前子　白茯苓　甘草梢

【用法】水煎服。幼孩兼服抱龙丸并六一散。

【主治】黄疸初起者。

57783　茵陈汤

【方源】《医学探骊集》卷五。

【组成】茵陈八钱　栀子四钱　大青叶四钱　炙山甲二钱　延胡索三钱　煅石膏四钱　黄芩三钱　橘红三钱　甘草二钱

【用法】宜于初得二三个月内，先取上脘、中脘、下脘，太乙针之。留五点钟时乃出针，因勉拟茵陈汤服二三剂。水煎，温服。

【主治】中消。食脯饱餐，转瞬又复思食，多食而又羸瘦者。

【方论选录】此方以茵陈为君，专能清散内热；以栀子、石膏、黄芩、大青为臣，俱寒凉之品，资助茵陈清散之力；以橘红、甘草为佐，提升胃腑之正气；以山甲、延胡为使，使之引药达病所，搜其结热之根。胃热既减，自无中消之患矣。

57784 **茵陈饮**

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】六味回阳饮（《证治宝鉴》卷四）。

【组成】茵陈 焦栀子 泽泻 青皮各三钱 甘草一钱 甘菊花二钱

【用法】水三四钟，煎二钟，不时陆续饮之。治热泻者，一服可愈。

【主治】①《景岳全书》：挟热泄泻，热痢，口渴喜冷，小水不利，黄疸湿热闭涩。②《证治宝鉴》：噎膈反胃。

57785 **茵陈饮**

【方源】《幼幼集成》卷二。

【组成】茵陈蒿二钱 黑山栀一钱五分 赤茯苓 甜葶苈各一钱 小枳实 生甘草各五分 灯芯十茎

【用法】水煎，食前服。

【主治】中湿发黄作热，大小便涩。

57786 **茵陈酒**

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】茵陈蒿（炙黄）一斤 秫米一石 曲三斤

【用法】如常酿酒，饮之。

【主治】风疾，筋骨挛急。

57787 **茵陈菜**

《绛囊撮要》。为方出《证类本草》卷七引《食医心镜》，名见《本草纲目》卷十五“茵陈羹”之异名。见该条。

57788 **茵陈散**

【方源】《外台》卷四引《广济方》。

【组成】茵陈四两 白鲜皮三分 栝楼四分 黄芩三分 栀子四分 芍药三分 青木香三分 柴胡三分 枳实三分（炙） 黄连三分 紫雪八分 土豆根三分 大青三分 大黄十分

【用法】上为散。每服五钱匕，平旦空腹煮茅根饮待冷送下。一服少间，当一二行微利，利后煮稀葱豉粥食之，利多以意渐减，常取微泄，利通一二行为度，愈止。

【主治】阴黄，身面眼俱黄，小便如豉汁色。

【宜忌】忌猪肉、冷水、鱼、蒜、粘腻及诸热食。

【备考】方中紫雪，《圣惠》作芒消。

57789 **茵陈散**

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】茵陈一两 柴胡一两（去苗） 甘草半两（炙微赤，锉） 赤芍药二分 防风二分（去芦头） 附子一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒四日，头痛，背膊急闷，骨节烦疼，心燥口干。

57790 **茵陈散**

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】茵陈 茯神 栀子仁 赤芍药 麦门冬（去心） 黄芩各半两 犀角屑一分 生干地黄一两

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后，伏热在心，烦躁恍惚，或多惊恐，及不得眠卧。

57791 **茵陈散**

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】茵陈 栀子仁 川大黄（锉碎，微炒） 滑石 木通（锉）各一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候，如人行十里再服。以小便快利为度。

【主治】伤寒，头项汗出，身体无汗，小便不利，渴欲饮水者，是瘀热在里，身欲发黄。

57792 **茵陈散**

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】茵陈三分　犀角屑半两　麦门冬一两(去心)　栀子仁三分　茯神一两　赤芍三分　生干地黄三分　甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,青竹叶二七片,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒后,余热在心,恍惚多惊,不得眠睡。

57793　**茵陈散**

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】茵陈半两　犀角屑半两　柴胡一两(去苗)　茯神一两　赤芍药半两　麦门冬半两(去心)　黄芩半两　栀子仁半两　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,竹叶二七片,生地黄一分,煎至六分,温服,不拘时候。

【主治】伤寒后,伏热在心中,恍惚多惊,不得睡卧。

57794　**茵陈散**

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】子芩一两半　秦艽二两(去苗)　知母二两　大青一两　赤芍药一两　川芒消二两　土瓜根二两　川大黄三两(锉碎,微炒)　茵陈二两　黄连一两半(去须)　栀子仁二两

【用法】上为细散。每服三钱,新汲水下,不拘时候。须臾便吃白粥饮半大盏,以次吃葱茶一碗。腹中稍觉转动,下利,额上似微润,即以衣盖取汗,汗解便愈。

【主治】时气瘴疫,头痛壮热,心如火煎,面目黄黑,四肢沉重,不得睡卧。

57795　**茵陈散**

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】茵陈二两　栀子仁一两　黄芩一两　柴胡一两(去苗)　木通(锉)一两　川升麻一两　赤芍药二两　栝楼根一两　川大黄二两(锉碎,微炒)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热病五日未解,头痛壮热,眼睛疼,心腹痛。

57796　**茵陈散**

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】茵陈半两　柴胡一两(去苗)　栀子仁三分　猪苓半两(去黑皮)　川大黄三分(锉碎,微炒)　秦艽三分(去苗)　桑根白皮半两(锉)　木通半两(锉)　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热病汗后,余热不解,头项汗出,瘀热在内,渴欲饮水,小便不利。

57797　**茵陈散**

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】茵陈二两　川大黄一两(锉碎,微炒)　玄参一两　栀子仁一分　甘草半两(生用)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热病发斑。

57798　**茵陈散**

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】茵陈三分　木通一两(锉)　栀子仁三分　甘草半两(炙微赤,锉)　栝楼根一两　麦门冬一两半(去心)　柴胡一两(去苗)　秦艽一两(去苗)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,加竹叶三七片,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热病黄疸,目黄如金,小便如血,心烦躁闷,口苦头痛。

57799　**茵陈散**

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】茵陈二两　栝楼根二两　川升麻二两　龙胆二两(去芦头)　寒水石三两　甘草一两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服五钱,以水一大盏,

煎至五分，去滓，入生地黄汁半合，更煎一沸，温服，不拘时候。

【主治】黄疸，通身并黄。

57800 **茵陈散**

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】茵陈二两 黄芩一两 栀子仁一两 川升麻二两 川大黄一两（锉碎，微炒） 龙胆一两（去芦头） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 秦艽一两（去苗）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】内黄。身面眼悉黄，如黄金色，小便浓如柏汁。

57801 **茵陈散**

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】茵陈一两 前胡三分（去芦头） 木通一两（锉） 赤茯苓三分 椒目一分（微炒） 赤芍药三分

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，一日四五次。

【主治】黄病。心下横坚，小便赤黄不利，疼痛。

57802 **茵陈散**

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】茵陈一两 犀角屑半两 川升麻一两 栀子仁三分 甘草三分（炙微赤，锉） 黄芩一两 川朴消一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。以大小便利为度。

【主治】黄疸，心神烦躁，小便赤，大便难，不得安卧。

57803 **茵陈散**

【方源】方出《圣惠》卷五十五，名见《得效》卷三。

【异名】石膏茵陈散（《东医宝鉴·杂病篇》卷六）。

【组成】栀子仁一两 石膏三两 川大黄一两（锉碎，微炒） 栝楼（干者）一枚 甘草一两（炙微赤，锉） 木通一两（锉） 茵陈一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加葱白七寸，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】酒食过度，风湿所搏，热气郁蒸而成黄疸，身目爪甲牙齿及小便皆黄，或身体多赤多青，心下热闷，小便闭涩。

①《圣惠》：黄疸，身目皆黄，皮肤如曲尘色。②《得效》：黄疸，食已即饥，身体面目，爪甲牙齿，及小便悉黄寒热，或身体多赤、多青，皆由酒食过度，为风湿所搏，热气郁蒸而成。③《杏苑》：黄疸，心下热闷，小便闭涩。

57804 **茵陈散**

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】茵陈二两 川大黄二两（锉碎，微炒） 栀子仁三分

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服。

【主治】谷疸与黄疸。

57805 **茵陈散**

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】茵陈半两 麻黄半两（去根节） 赤芍药半两 甘草半两（炙微赤，锉） 黄芩半两 葛根半两（锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿热病，心烦壮热，口干多渴。

57806 **茵陈散**

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】茵陈一两 栀子仁半两 川大黄半两（锉碎，微炒） 黄芩半两 犀角屑半两 木通半两（锉） 寒水石半两 川芒消一两

【用法】上为散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿黄病，身如橘色。

57807 **茵陈散**

【方源】《普济方》卷一三〇引《博济》。

【组成】山茵陈二两 麻黄二两（不去节） 荆芥一两 细辛半两 川芎一两 川大黄一

两　干薄荷一两　官桂二两(去皮)

【用法】上为粗末。每服三钱,以水一大盏,加生姜五片,葱白一茎,煎至六分,去滓热服,轻盖出汗。

【功效】解表发汗。

【主治】伤寒三日内。

【宜忌】新产前,不得服。

57808　茵陈散

【方源】《医方类聚》卷一〇三引《简要济众方》。

【组成】山茵陈一两(去叶)　桔梗三分　枳壳一两(麸炒,去瓤)　川大黄半两(锉,微炒)　甘草半两(炙令黄)

【用法】上为散。每服二钱,水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】中焦热,身重目黄。

57809　茵陈散

《圣济总录》卷六十。为《金匮》卷中"茵陈五苓散"之异名,见该条。

57810　茵陈散

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】茵陈蒿　犀角屑　石斛(去根)　紫参　人参　白术　柴胡(去苗)各三分　桂(去粗皮)　芍药　防风(去叉)各半两　吴茱萸(汤洗焙干,炒)一两　桔梗(炒)半两　白芜荑仁(炒)一分

【用法】上为散。白羊肝一具,细切,分三服,净去筋膜,每服入药末五钱匕,葱白五寸,细切,一处拌和,用湿纸裹,慢火煨熟,空心顿服。

【主治】风劳瘦疾,七种冷气,六极,脾胃虚寒,不思饮食,疳痢休息或大小便涩;兼累年口疮,医治不愈者。

57811　茵陈散

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】茵陈蒿　当归(切,焙)　厚朴(去粗皮,姜汁炙熟)　陈橘皮(去白,焙)　牛膝(去苗,酒浸,切,焙)　紫菀(去苗土)　人参　白茯苓(去黑皮)　附子(炮裂,去皮脐)　枳壳(去瓤,麸炒)　白芷　干姜(炮)　赤芍药　芜荑　藁本(去土)　木香　柴胡(去苗)　桔梗(炒)　桂(去粗皮)　石斛(去根)　青橘皮(汤浸,去白,焙)

【用法】上为散。每用一两,以白面和作饺子,烧熟食之,米饮送下。

【主治】丈夫、妇人虚劳瘦弱,泄痢不止,气虚羸劣。

57812　茵陈散

【方源】《卫生总微》卷七。

【组成】茵陈一两　白术半两　甘草半两

【用法】上为散,每服半钱,沸汤调下。

【主治】伤寒发黄。

【加减】小便不利,加茯苓一两。

57813　茵陈散

【方源】《得效》卷十。

【组成】香薷散加茵陈

【用法】三根葱白五寸,生姜三片,同煎,热服。

【主治】感冒,自汗面垢,脉微头痛。

57814　茵陈散

【方源】《普济方》卷四十六引《经验良方》。

【组成】北细辛三钱　茵陈穗　石膏(火煅红,候冷研入)各一两　川芎一两

【用法】上为细末。每服二钱,茶沸汤点下。

【主治】一切头风,牙关紧急,眉棱骨痛,鼻塞清涕,眼旋屋转,耳作蝉声。

57815　茵陈散

【方源】《普济方》卷六十九。

【组成】麻黄　荆芥穗　升麻　黄芩　羌活　独活　牡丹皮　薄荷　连翘　茵陈　射干　大黄　僵蚕　半夏各一分　细辛半两　牵牛一两

【用法】上为细末。每服三钱,水一盏,先煎汤热,下药末,搅一搅,急泻出,食后临卧和滓热服。

【主治】①《普济方》:牙齿疼痛,外面疼痛不可忍,去骨槽风热。②《药奁启秘》:牙关拘紧不利。

57816 茵陈散

【方源】《普济方》卷三二三。

【组成】茵陈蒿 犀角屑 石斛（去根） 人参 芍药 桔梗（炒） 防风（去叉） 柴胡（去苗） 细辛（去苗） 桂（去粗皮） 吴茱萸（汤洗，焙干，炒） 当归各一两 白术

【用法】上为散。每服五钱，用猪肝一具，切作五段，每服一段，薄切小片子入药末拌令匀，以湿纸裹，慢火煨熟，取出细嚼，以米饮下。

【主治】妇人气血劳，四肢疼痛，心腹胀满，吐逆，面无颜色，经脉不调。

【备考】方中白术用量原缺。

57817 茵陈散

【方源】《袖珍》卷六。

【组成】大田螺十个（连壳研泥） 茵陈四根（同研） 薤头七个（研） 山栀七个（同研）

【用法】上药研之如泥，百沸白酒一大盏，投之搅匀，滤去滓，顿服。

【功用】退黄，开豁心胸，促进饮食。

【主治】男子酒疸。

57818 茵陈散

【方源】《回春》卷三。

【组成】茵陈 栀子 赤苓 猪苓 泽泻 苍术 枳实 黄连 厚朴 滑石各等分

【用法】上锉。加灯草一团，水煎服。

【主治】湿热发黄。

【加减】身热，加柴胡；小便短赤，加黄柏；胸膈饱闷，加莱菔子、茯苓；饮酒人，加瓜蒌仁、干葛、砂仁，去滑石。

57819 茵陈散

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】茵陈 连翘 荆芥 麻黄 升麻 羌活 薄荷 僵蚕各五钱 细辛二钱半 大黄 牵牛（头末）各一两

【用法】上为散。每服三钱，先以水一盏煎沸，入药搅之，急倾出，食后和滓热服。

【主治】齿龈赤肿疼痛，及骨槽风热。

57820 茵陈粥

【方源】《药粥疗法》引《粥谱》。

【组成】绵茵陈30～60克 粳米50～100克 白糖适量

【用法】先将绵茵陈洗净，煎汁去滓，入粳米后加水适量煮粥，煮熟时，加入白糖，稍煮一二沸，即可。疗程以7～10天为宜，每日分二至三次服食。粥宜稀薄，不宜稠厚，米只用粳米，不用糯米。

【功用】利湿热，退黄疸。

【主治】黄疸，小便不利，尿黄如浓茶色。

【宜忌】阴黄或阳黄均可食用，钩虫引起的“黄胖病”不应服用。

57821 茵陈羹

【方源】方出《证类本草》卷七引《食医心镜》，名见《本草纲目》卷十五。

【异名】茵陈菜（《绛囊撮要》）。

【组成】茵陈

【用法】细切，煮羹食之；生食亦宜。

【功用】除大热，利小便。

【主治】黄疸，伤寒头痛，风热，瘴疠。

57822 茵芋浸酒

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】茵芋一两 白及二两 薏苡仁二两 赤芍药二两 桂心二两 牛膝二两（去苗） 酸枣仁二两（微炒） 干姜一两（炮裂） 附子二两（炮裂，去皮脐） 甘草一两（炙微赤）

【用法】上锉细，以生绢袋盛，酒二斗，浸七宿，每温服一小盏，不拘时候。

【主治】肝脏风，筋脉拘挛，不可屈伸。

57823 茵芋浸酒

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】茵芋一两半 细辛半两 天雄一两（炮裂，去皮脐） 汉防己一两 川乌头一两半（炮裂，去皮脐） 石斛一两（去根） 踯躅一两（微炒） 山茱萸 柏子仁 甘草（炙微赤） 木通 桂心 秦艽（去苗） 黄耆 干姜（炮裂） 熟干地黄 莽草（微炙） 附子（炮裂，去皮脐） 杜仲（去粗皮） 芎䓖 王

孙　泽泻　石南　防风(去芦头)　远志(去心)　牛膝(去苗)各三分

【用法】上锉细,用生绢袋盛,以酒三斗,浸十日。空心温服一小盏,晚食前再服。以愈为度。

【主治】八风十二痹,五缓六急,半身不遂,四肢偏枯,筋脉拘挛,肩髀疼痛,腰脊不能俯仰,胸胁膨胀,心烦,目眩耳聋,咽喉不利;或贼风所中,痛如锥刺,行人皮中,无有常处;或四肢肌体偏有冷痹,状如风吹。

【宜忌】忌生冷、油腻、动风物。

57824　茵芋浸酒

【方源】《圣惠》卷四十四。

【异名】茵芋散(《御药院方》卷一)。

【组成】茵芋一两半　萆薢一两半　狗脊一两半　桂心一两　附子一两半(炮裂,去皮脐)　牛膝三两(去苗)　石斛三两(去根)　川椒半两(去目及闭口者,微炒去汗)　生姜三分

【用法】上锉细,生绢袋盛,以酒一斗五升浸,密封七日开,每于食前温服一中盏。

【主治】肾脏风湿腰痛,不得俯仰,皮肤不仁,骨髓疼痛。

57825　茵陈蒿丸

《圣济总录》卷三十七。为《千金》卷十"茵陈丸"之异名。见该条。

57826　茵陈蒿丸

《圣济总录》卷六十。为《外台》卷四引《必效方》"茵陈丸"之异名。见该条。

57827　茵陈蒿丸

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】茵陈蒿五两　蔄茹三两　威灵仙(去土)　太一余粮(煅)　柴胡(去苗)各二两　黄芩(去黑心)　蒲黄　赤茯苓(去黑皮)　枳壳(去瓤,麸炒)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,木香汤送下。以知为度。

【主治】下焦受病,大肠菀热,伏瘕深固。

57828　茵陈蒿丸

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】茵陈蒿　赤茯苓(去黑皮)　葶苈子(微炒)各一两　枳壳(去瓤,麸炒)　白术各一两一分　半夏(汤浸七遍去滑,焙)一钱　大黄(细锉,醋炒)　杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒)各三分　蜀椒(去闭口及目,炒令出汗)当归(切,焙)　干姜(炮)各半两　甘遂(炮)一分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服十丸,空心米饮送下,一日三次。

【主治】黑疸,身体暗黑,小便涩。

57829　茵陈蒿汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】茵陈汤(《外台》卷四引《范汪方》)、涤热汤(《圣济总录》卷六十)、大茵陈汤(《准绳·类方》卷五)、茵陈栀子大黄汤(《济阳纲目》卷三十四)、茵陈大黄汤(《症因脉治》卷三)。

【组成】茵陈六两　栀子十四枚(擘)　大黄二两(去皮)

【用法】上三味,以水一斗二升,先煎茵陈减六升,纳二味,煮取三升,去滓,分三服。小便当利,尿如皂荚汁状,色正赤,一宿腹减,黄从小便去也。

【功用】①《准绳·伤寒》:利小便,退黄逐热。②《伤寒大白》:去热,退渴。

【主治】湿热黄疸,面、目、一身尽黄,黄色鲜明,腹微满,口渴,小便不利,舌苔黄腻,脉沉数者。

①《伤寒论》:阳明病,发热汗出者,此为热越,不能发黄也。但头汗出,身无汗,齐颈而还,小便不利,渴引水浆者,此为瘀热在里,身必发黄。②《金匮》:谷疸之为病,寒热不食,食即头眩,心胸不安,久久发黄,为谷疸也。③《肘后方》:黄汗,身体四肢微肿,胸满,不得汗,汗出如黄柏汁,由大汗出,卒入水所致。④《医方集解》:湿热发黄,脉沉实者。

【方论选录】①《普济方》:小热之气,凉以和之,大热之气,寒以取之。茵陈、栀子之苦

寒，以逐胃燥；大黄之苦寒，以下瘀热。②《金镜内台方议》：阳明者，为胃之土，其色黄，若发热汗出者，为热气得越，不能发黄也；但头上汗出，齐颈而还者，乃热气不能越也；小便不利，渴引水浆者，乃热甚于胃，津液内瘀，结为黄也。故用茵陈为君，能治黄；栀子为臣，栀能治黄，寒以治热也；以大黄为佐、使，以下泄瘀热，而除其黄也。③《医方考》：大热之气，寒以取之，故用茵陈；苦入心而寒胜热，故用栀子；推除邪热，必借将军，故用大黄。又曰，茵陈、栀子能导湿热，由小便而出。④《医方集解》：茵陈发汗利水，以泄太阴、阳明之湿热，故为治黄之主药；茵陈、栀子，能导湿热由小便出，大黄能导湿热由大便出。⑤《金鉴》：茵陈禀北方之气，经冬不凋，傲霜凌雪，偏受大寒之气，故能除热留结，率栀子以通水源，大黄以调胃实，令一身内外瘀热悉从小便而出，腹满自减，肠胃无伤，乃合引而竭之之法。此阳明利水之圣剂也。以推陈致新之茵陈佐以屈曲下行之栀子，不用枳、朴以承气与芒消之峻剂，则大黄但可以润胃中，而大便之不遽行可知，故必一宿而腹始减，黄从小便去而不由大肠去。

【临证举例】①传染性肝炎 《上海中医药杂志》（1957；8：19）：用茵陈蒿汤加减治疗传染性肝炎20例，初步观察，对传染性肝炎的黄疸消失，速度较快。20例中，服药后第一周末即有12例黄疸指数减至50～80%，占60%，此与茵陈蒿汤之清热利湿——利胆、利尿等作用有关。肝功能之恢复，一般较慢，尤以麝香草酚浊度试验与絮状试验之变化较少。服茵陈蒿汤无任何副作用。②皮肤病 《中医争鸣》（1960；12：17）：本方在皮肤科领域中应用的疗效甚佳。茵陈蒿600克，生大黄400克，生山栀400克，水煎成5000毫升，一日二次，每次100毫升，共治413例，其中：过敏性皮肤病痊愈85.7%，显效14.3%；皮肤瘙痒痊愈7.1%，显效64.3%，有效28.6%；原因不明的皮肤病痊愈34.5%，显效4.4%，有效24.1%。③急性病毒性肝炎 《伤寒论方医案选编》引韩德五：近年来应用茵陈蒿汤治疗7184例急性病毒性肝炎，近期治愈率均在95%以上，有效率100%。④胆道蛔虫症及胆系感染 《伤寒论方医案选编》引武汉医学院附二院中医科：用本方为主治疗胆道蛔虫症及胆系感染121例，总有效率97.4%；治疗胆系感染40例，38例有效。

【现代研究】保肝作用 《山西医药杂志》（1975；3：19）：本方用于因四氯化碳致成的大白鼠急性肝损伤的实验中，能不同程度地减轻肝细胞的肿胀、气球样变、脂肪变及坏死，使肝细胞内蓄积的糖原与核糖核酸含量有所恢复或接近正常，血清谷丙转氨酶活力显著下降，由此证明本方具有治疗肝炎和退黄作用。

57830 茵陈蒿汤

【方源】方出《圣惠》卷五十五，名见《圣济总录》卷六十一。

【组成】茵陈蒿 赤芍药 甘草（炙，锉） 木通（锉） 赤茯苓（去黑皮） 黄耆（锉）各一两 大黄（锉，炒）二两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，如人行十里再服。以大小便通利为度。

【主治】黄汗，身体热不退，大小便不利。

57831 茵陈蒿汤

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】茵陈蒿 山栀子（去皮） 柴胡（去苗） 黄芩（去黑心） 桔梗（炒） 牡丹皮 贝母（去心） 荆芥穗（去梗） 升麻 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 半夏（汤洗七遍去滑，切，焙） 羌活（去芦头） 独活（去芦头） 麻黄（去根节，煎去沫，焙）各半两 细辛（去苗叶）一分

【用法】上为粗散。每服三钱匕，水一盏，加生姜二片，煎一沸，急泻出，临发热头痛时，去滓热服，仍须食后。但此疟只发热，并初发时先壮热者，可服。

【方源】《回春》卷三。

【组成】茵陈 大黄 枳实 山栀 厚朴 滑石各等分 甘草减半

【用法】上锉一剂。加灯草一团，水煎服。

【主治】黄疸，大便结实。

57844 **茵陈大黄汤**

【方源】《简明医彀》卷二。

【组成】大黄 茵陈 栀子 黄芩 枳实 厚朴 甘草各等分

【用法】加灯心，水煎服。

【主治】太阴腹满，身目黄，小便不利，大便实，渴，头汗齐颈而还。

57845 **茵陈五苓丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【异名】茵陈五疸丸。

【组成】茵陈八两 黄芩四两 白术（炒）四两 甘草三两 枳实子二两 赤茯苓四两 泽泻四两 猪苓四两 橘皮二两 苍术（炒）四两 厚朴（姜制）四两 山楂四两 六神曲（炒）二两

【用法】上为细末，另用茵陈八两熬水，泛为小丸，滑石为衣，闯亮。每服二钱，温开水送下，一日二次。

【功用】清热祛湿，通利小便。

【主治】阳黄，两眼身面皆黄。

57846 **茵陈五苓汤**

【方源】《嵩崖尊生》卷十一。

【组成】苍术 赤苓 猪苓 泽泻各二钱 官桂一钱 茵陈五钱 车前 木通 柴胡各一钱五分

【用法】连服，以小便清为度。

【主治】食即饥，身黄寒热之黄疸。

【加减】若伤酒，加干葛二钱，灯草一捻。

57847 **茵陈五苓汤**

【方源】《医宗说约》卷三。

【组成】茵陈 泽泻 猪苓 茯苓 山栀 木通 白术 山楂 枳实 甘草 陈皮 滑石 姜 枣 灯心

【用法】河水煎服。

【功用】清湿热，利小便。

【主治】脾虚胃不实，水谷湿热相郁，蒸发为黄疸，肠满溺黄，遍身黄，眼珠指甲俱金色。

【加减】消食积，加厚朴、槟榔；身热，加柴胡、干葛；腹胀，加大腹皮、莱菔子；伤酒，加白蔻、葛根；浮肿，加苍术。

57848 **茵陈五苓汤**

《中国医学大辞典》。为《金匮》卷中“茵陈五苓散”之异名。见该条。

57849 **茵陈五苓散**

【方源】《金匮》卷中。

【异名】茵陈散（《圣济总录》卷六十）、五苓茵陈散（《准绳·伤寒》卷四）、五苓散（《伤寒大白》卷三）、茵陈五苓汤（《中国医学大辞典》）。

【组成】茵陈蒿末十分 五苓散五分

【用法】上药和，先食饮方寸匕，一日三次。

【功用】①《医门法律》：润气分燥热。②《冯氏锦囊秘录》：清热祛湿。

【主治】湿热黄疸，湿重于热，小便不利，烦渴。

①《金匮》：黄疸病。②《医学正传》引《活人书》：伤寒或伏暑发黄，小便不利，烦渴。③《鸡峰》：因病未除，忽然一身面目悉黄，如橘子色，由瘀血在里，或因大热，以冷水洗之，湿热相搏，熏蒸肌肉，谓之黄疸。④《冯氏锦囊秘录》：酒积黄疸，小便不利。⑤《笔花医镜》：阴黄，小便不利。

【方论选录】①《医方考》：茵陈，黄家神良之品也，故诸方多用之；猪苓、泽泻、茯苓、白术味淡，故可以导利小水；官桂之加，取有辛热，能引诸药直达热邪蓄积之处。②《古今名医方论》：罗东逸曰，治酒积黄疸，盖土虚则受湿，湿热乘脾，黄色乃见。茵陈专理湿热，发黄者所必用也；佐以五苓，旺中州，利膀胱；桂为向导，直达热所，无不克矣。

【临证举例】①黄疸 《本事》：有一家病伤寒七八日，身体洞黄，鼻目皆痛，两髀及项颈腰脊强急，大便涩，小便如金。予曰：脉紧且

数,脾元受湿,暑热蕴蓄于太阳之经,宿谷相搏,郁蒸而不得散,故使头面有汗,至颈以下无之;若鼻中气冷,寸口近掌,无脉则不疗。急用茵陈汤调五苓散与之,数服愈。②传染性肝炎 《上海中医药杂志》(1959;2:22)用茵陈五苓散治疗传染性肝炎 3 例,肝功能均转为正常,黄疸指数迅速下降。其中一例肝功能损坏较严重,故恢复时间较长。治疗过程无副作用,肝脏肿大及消化系统症状逐步消失,精神恢复迅速。

【备考】本方方名,《外台》引作"茵陈蒿五苓散"。

57850 茵陈五苓散

【方源】《普济方》卷一三二。

【组成】生料五苓散一两加茵陈半两 车前子一钱 木通一钱 柴胡一钱半

【用法】上㕮咀,分作二服。每服水一碗,加灯草五十茎,同煎八分,去滓,食前服,滓再煎,连进数服。小便清利为愈。

【主治】伤寒、湿温、热病感冒后发为黄疸,小便赤,烦渴发热,不得安宁。此盖汗下太早,服药不对证,因感湿热病,以致偏身发黄。

【加减】酒后得证,加干葛二钱。

57851 茵陈五苓散

【方源】《保婴撮要》卷十。

【异名】茵陈四苓散(《会约》卷十一)。

【组成】赤苓 猪苓 泽泻 白术 茵陈各三分

【用法】水煎服。

【主治】①《保婴撮要》:伏暑发黄,烦渴,小便不利。②《会约》:湿热黄疸。

57852 茵陈五苓散

【方源】《内科摘要》卷下。

【组成】茵陈 白术 猪苓各一钱 桂三分 泽泻一钱五分

【用法】水煎服。

【功用】利湿。

【主治】酒积。

57853 茵陈五苓散

【方源】《医便》卷二。

【组成】茵陈三钱 白术 赤茯苓各一钱半 猪苓一钱 桂二分 泽泻一钱 苍术 山栀 滑石各一钱二分 甘草(炙)五分

【用法】加灯心一握,水煎,食远服。

【主治】湿热黄疸。

57854 茵陈五苓散

【方源】《便览》卷二。

【组成】黄芩 黄连 山栀仁 茵陈 猪苓 泽泻 苍术 青皮 龙胆草各等分

【用法】水二盏煎服。

【主治】黄疸。

【加减】有积,加莪术、三棱、砂仁、陈皮、神曲。

57855 茵陈五苓散

【方源】《杏苑》卷三。

【组成】茵陈一钱五分 泽泻一钱二分 茯苓 猪苓 白术各一钱 官桂三分 枳实六分

【用法】水煎,食前服。

【主治】热蓄发疸。

57856 茵陈五苓散

【方源】《幼科金针》卷下。

【组成】粉猪苓 泽泻 焦白术 茯苓 川连 黑山栀 茵陈 大黄

【用法】水煎,热服。

【主治】湿热黄疸。

57857 茵陈五疸丸

《北京市中药成方选集》。为原书"茵陈五苓丸"之异名。见该条。

57858 茵陈分湿汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】白术二两 茵陈 肉桂 猪苓各三钱 半夏一钱

【用法】水煎服。

【功用】健脾,温命门之气,利水。

【主治】脾疸,身黄如秋葵之色,汗沾衣服,皆成黄色,兼之涕唾亦黄,不欲闻人言,闻人言则惕惊,小便不利,为脾阴之黄。

57859 **茵陈乌梅汤**

【方源】《松峰说疫》卷五。

【组成】茵陈（九九尽日，茵陈连根采，阴干）五分　乌梅二个

【用法】上二味打碎，水二钟，煎八分，热服。汗出即愈。

【主治】瘟疫。

57860 **茵陈平胃散**

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】熟苍术　厚朴　广皮　山栀　茵陈　淡豆豉

【用法】水煎服。

【功用】泄阳明之阳，泄谷气之实。润燥下利。

【主治】谷疸。

【方论选录】《伤寒大白》：食滞发黄，名谷疸。平胃散散湿热，加茵陈则清热散黄。

57861 **茵陈玉露饮**

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】茵陈三钱　玉竹三钱　石斛三钱　花粉二钱　葛根二钱　山栀一钱五分　广皮一钱　半夏一钱　茯苓二钱　萆薢二钱　苡仁一两

【用法】煎汤代水服。

【主治】酒疸。平日嗜酒，湿热熏蒸，面目发黄，黄甚则黑，心中嘈杂，虽食甘芳，如啖酸辣，小便赤涩。

57862 **茵陈术附汤**

【方源】《医学心悟》卷二。

【异名】茵陈姜附汤（《笔花医镜》卷一）。

【组成】茵陈一钱　白术二钱　附子五分　干姜五分　甘草（炙）一钱　肉桂三分（去皮）

【用法】水煎服。

【主治】阴黄。身冷，脉沉细，小便自利。

57863 **茵陈术附汤**

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】茵陈三钱　白术二钱　附子一钱　茯苓二钱　当归二钱　广皮一钱　半夏一钱　砂仁一钱　苡仁八钱　姜皮八分

【主治】阴黄。面目发黄，身冷不渴，小便微黄而利。

57864 **茵陈石膏汤**

【方源】《简明医彀》卷二。

【组成】石膏二钱　茵陈　赤芍药　黄芩　麦冬各一钱　豆豉一撮　甘草（炙）五分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】黄汗。

57865 **茵陈四苓汤**

【方源】《杏苑》卷三。

【组成】茵陈　泽泻　白术各一钱五分　茯苓　枳实　猪苓各一钱　山栀仁五分

【用法】水煎熟，食前温服。

【主治】发黄，渴饮水浆，小便亦少。

57866 **茵陈四苓散**

《会约》卷十一。为《保婴撮要》卷十“茵陈五苓散”之异名。见该条。

57867 **茵陈四逆汤**

【方源】《伤寒微旨论》卷下。

【异名】加味姜附汤（《寿世保元》卷三）、茵陈附子干姜甘草汤（《医门法律》卷六）、茵陈姜附汤（《类证治裁》卷四）。

【组成】甘草　茵陈蒿各二两　干姜一两半　附子一个（破八片）

【用法】上为末。水四升，煮取二升，去滓放温，作四服。

【主治】①《伤寒微旨论》：阴黄。病人脉沉细迟，肢体逆冷，腰以上自汗出。②《卫生宝鉴·补遗》：阴黄。皮肤凉又烦热，欲卧水中，喘呕，脉沉细迟无力；皮肤冷，心下硬，按之痛，身体重，背恶寒，目不欲开，懒言语，自汗，小便利，大便了而不了，脉紧细而发黄。

【方论选录】《医方考》：此阴证发黄也。阴寒盛于下，则戴阳于上，故上体见阳证，下体见阴证；阴盛于下，故见阴脉之沉迟，兼阴证之四逆；阳戴于上，故见阳证之发黄，上体之自汗也。茵陈，治黄之要药，故无分寒热而用之；附子、干姜、炙甘草，回阳之要品也，故有阴寒即用之。然必冷服者，恐姜、

附发于上焦阳盛之区，而下部阴寒之分反不及也。

57868 **茵陈白术汤**

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】白术一钱五分 白茯苓 泽泻 茵陈各一钱 猪苓八分 枳实五分 木通五分 木香四分 官桂二分 缩砂仁七分

【用法】上㕮咀。加生姜三片，水煎，食前温服。

【主治】黄疸，腹胀心胸不宽。

57869 **茵陈白芷汤**

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】绵茵陈 白芷 北秦皮 茯苓皮 黄柏 藿香

【主治】酒客久痢，饮食不减。

【方论选录】久痢无他证，而且能饮食如故，知其病之未伤脏真胃土，而在肠中也。痢久不止者，酒客湿热下注，故以风药之辛，佐以苦味入肠，芳香凉淡也。盖辛能胜湿，而升脾阳，苦能渗湿清热，芳香悦脾而燥湿，凉能清热，淡能渗湿也。俾湿热去而脾阳升，痢自止矣。

57870 **茵陈地黄汤**

【方源】《幼幼集成》卷二。

【组成】怀生地 京赤芍 正川芎 大当归 天花粉 赤茯苓 结猪苓 茵陈蒿 宣泽泻

【用法】诸药随时定分两，水煎，母子同服。

【主治】初诞小儿，面与浑身其黄如金，胎中受湿气也。

57871 **茵陈苏叶汤**

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】紫苏二钱 茵陈二钱

【用法】水煎，加酒半杯，冲服。

【主治】阳黄。表无汗，而身热者。

57872 **茵陈陈皮汤**

《类证治裁》卷四。为《伤寒微旨论》卷下“茵陈橘皮汤”之异名。见该条。

57873 **茵陈附子汤**

【方源】《伤寒微旨论》卷下。

【组成】附子二个(破八片) 干姜 茵陈蒿各一两半

【用法】上为末。水二升，煮取一升半，去滓放温，分作二服。

【主治】病人服茵陈四逆汤身冷汗出不止。

57874 **茵陈附子汤**

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷六引《活人书》

【组成】茵陈 附子(炮) 甘草(炙)各一钱

【主治】阴黄，遍身冷。

57875 **茵陈附子汤**

《玉机微义》卷四十五。为《东医宝鉴·杂病篇》卷六引《活人书》“茵陈姜附汤”之异名。见该条。

57876 **茵陈附子汤**

《杏苑》卷五。为《卫生宝鉴》卷二十三“茵陈附子干姜汤”之异名。见该条。

57877 **茵陈苓术汤**

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】茵陈三钱 茯苓 白术 薏仁各五钱 知母一钱

【用法】水煎服。

【主治】谷疸，胃中虚热，胸中易饥，食则难饱，多用饮食则发烦，头眩，小便艰涩，身如黄金色。

57878 **茵陈泻黄汤**

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷六引节斋方。

【异名】茵陈泻黄散(《类证治裁》卷四)。

【组成】葛根一钱半 茵陈 黄连(姜汁炒) 山栀(炒) 白术 赤茯苓 白芍药 人参 木通 厚朴各一钱 木香七分

【用法】上锉，作一贴。加生姜三片，水煎服。

【主治】疸黄。时气发热，变为黄疸。

57879 **茵陈泻黄散**

《类证治裁》卷四。为《东医宝鉴·杂病篇》

卷六引节斋方“茵陈泻黄汤”之异名。见该条。

57880 **茵陈治疸汤**

【方源】《顾松园医镜》卷十。

【组成】茵陈 黄芩 黑山栀 滑石 茯苓 车前 橘红

【用法】用茅根为引。

【功用】清热除湿，化气利水。

【主治】诸黄疸，因湿得之。

【加减】热甚，加黄连；渴，加麦冬、花粉；因食伤，加山楂、麦芽；因酒伤，加煨葛根、甘蔗浆。

57881 **茵陈枳壳汤**

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】茵陈蒿（取叶） 枳壳（去瓤，麸炒）各一两 桔梗（锉，炒）三分 大黄（锉，微炒） 甘草（炙令黄）各半两

【用法】上为粗散。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】瘅疟，上焦热，身重目黄。

57882 **茵陈栀子丸**

《鸡峰》卷九。为《千金》卷十“茵陈丸”之异名。见该条。

57883 **茵陈栀子汤**

【方源】《医学纲目》卷二十一。

【组成】茵陈一钱 茯苓五分 山栀 苍术（炒） 白术（炒）各三钱 黄芩（生）六分 黄连 枳实（炒） 猪苓（去皮） 泽泻 陈皮 防己各二分 青皮

【用法】上㕮咀，作一服。长流水煎，食前温服，二服可愈。

【主治】谷疸，趺阳脉紧，食谷即眩，风寒相搏，谷气不清，胃中苦浊，浊气不流，小便不通，身体尽黄。

【方论选录】山栀、茵陈能泻湿热而退黄，故以为君；枳实苦寒，泄心下痞满；肺主气，今热伤其气，故身体麻木，以黄芩苦寒泻火补气为臣；二术苦甘温，青皮苦辛温，能除胃中湿热，泄其壅滞，养其正气；防己苦寒，能去十二经滞湿；泽泻咸平，茯苓、猪苓甘平，导膀胱中湿热，利小便而去癃闭。

57884 **茵陈栀子汤**

【方源】《东医宝鉴》卷六引《医学纲目》。

【组成】茵陈三钱 大黄二钱 栀子 枳壳各一钱

【用法】上锉作一贴。水煎服。

【主治】谷疸。

57885 **茵陈栀子汤**

【方源】方出《明医杂著》卷二，名见《医统》卷二十五。

【组成】茵陈 黄连（姜水炒） 栀子 白茯苓 厚朴（姜水炒） 木通 白术 人参各一钱 木香七分 白芍药 干葛各一钱半

【用法】加生姜，水煎，食前服，滓再煎服。

【功用】内泻湿热。

【主治】瘟黄。时气发热变为黄病。

【备考】方中黄连，《医统》作“黄芩”。

57886 **茵陈栀子汤**

【方源】《古今医彻》卷一。

【组成】茵陈二钱 栀子一钱（炒） 黄连一钱 车前子一钱（炒） 泽泻一钱 枳壳一钱 广陈皮一钱 干葛一钱

【用法】加灯心、生姜，水煎服。或加秦艽、豆豉、花粉、知母。

【主治】发黄，小便赤。

57887 **茵陈栀柏汤**

【方源】《医家四要》卷三。

【组成】茵陈 栀子 黄柏

【主治】湿热蒸成黄疸。

57888 **茵陈茱萸汤**

【方源】《伤寒微旨论》卷下。

【组成】吴茱萸 木通各一两 干姜 茵陈各一两半 当归三分 附子二个（作八片）

【用法】上为末。水四升，煮取二升，去滓放温，分作四服。

【主治】阴黄，服茵陈附子汤证未退及脉伏者。

【备考】本方方名，《准绳·伤寒》引作“茵陈吴茱萸汤”。

57889 **茵陈茱萸汤**

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】吴茱萸 当归 附子 木通 干姜 茵陈 人参

【用法】加灯心,水煎服。

【主治】阴黄,腹痛或脉伏不出。

57890 **茵陈茯苓汤**

【方源】《伤寒微旨论》卷下。

【组成】茯苓 桂枝各一两 猪苓三分 滑石一两半 茵陈蒿二两

【用法】上为末。水四升,煮取二升,去滓放温,分作四服。

【主治】阴黄。病人五六日,脉沉细微,身温四肢冷,小便不利,烦躁而渴。

【加减】如脉未出,加当归半两。

【方论选录】《医方考》:实热在内,其热不得泄越,故发黄;小便涩者,热之所注也;烦躁者,热犯上焦,清阳之分也;渴者,邪热蒸灼,不能生津润喉也。是方也,茵陈主黄疸佐以茯苓、猪苓则利水,佐以滑石则和热,佐以桂枝则同气相求,直达热邪之巢穴。内热既去,则津液自生,气自化,小便自利,烦渴自除,身黄自愈。

57891 **茵陈茯苓汤**

【方源】《卫生宝鉴·补遗》。

【组成】茯苓 官桂各一两 猪苓七钱半 滑石一两半 茵陈一两半 当归一两

【用法】上锉。每服五钱,水煎,温服。

【主治】①《卫生宝鉴·补遗》:遍身冷,面如桃李枝色,腹满,小便涩,关尺脉沉迟细而发黄。②《准绳·伤寒》:发黄,小便不利,烦躁而渴。

57892 **茵陈茯苓汤**

【方源】《医林绳墨大全》卷一。

【组成】茵陈 半夏(汤泡) 赤茯苓(去皮) 陈皮各一钱 枳实 桔梗(去芦) 甘草(炙)各五分

【用法】水一大盅,生姜七片,煎服,不拘时候。

【主治】头汗出,发黄。

57893 **茵陈胃苓丸**

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】胃苓丸(末)一两 茵陈(末)五钱

【用法】上为末,神曲糊为丸,灯心煎汤送下。

【主治】小儿湿热食积。

57894 **茵陈胃苓汤**

【方源】《感证辑要》卷四。

【组成】杜苍术一钱 真川朴一钱 炒广皮一钱半 浙苓三钱 生晒术一钱半 川桂枝五分 建泽泻一钱半 猪苓一钱半 炙甘草五分

【用法】先用西茵陈八钱煎汤代水。

【主治】阴黄。黄而晦暗,如熏黄色,而无烦渴热象者。

57895 **茵陈将军汤**

【方源】《伤寒六书》卷三。

【组成】大黄 茵陈 山栀 甘草 厚朴 黄芩 枳实

【用法】水二钟,加生姜一片,灯心一握,煎之,热服。

【主治】足太阴脾经,腹满身目发黄,小水不利,大便实,发渴,或头汗至颈节还,脉来沉重。

【加减】大便自调者,去大黄、厚朴,加大腹皮,利小便清为效。

【备考】本方方名,《医学入门》引作"茵陈汤"。

57896 **茵陈将军汤**

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】茵陈 大黄 栀子 黄连 枳实 甘草梢 滑石末二钱

【用法】滚水煎,热服。

【主治】湿热发黄,太阴腹满身目黄,小便短赤,或不利,燥渴谵语,脉沉有力。

57897 **茵陈姜附汤**

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷六引《活人书》。

【异名】茵陈附子汤（《玉机微义》卷四十五）。

【组成】茵陈 附子（炮） 干姜（炮）各一钱

【主治】阴黄，冷汗不止。

57898 **茵陈姜附汤**

《笔花医镜》卷一。为《医学心悟》卷二“茵陈术附汤”之异名。见该条。

57899 **茵陈姜附汤**

《类证治裁》卷四。为《伤寒微旨论》卷下“茵陈四逆汤”之异名。见该条。

57900 **茵陈退疸汤**

【方源】《点点经》卷三。

【组成】胆草 黄芩 车前 当归 茵陈 生地 栀子 熟地 白茯苓 腹皮 杜仲 怀牛膝 木通

【用法】葱白为引。

【功用】开导降火。

【主治】 酒伤黄肿，气喘发咳，小腹肿满，膨胀。

57901 **茵陈退黄散**

《寿世保元》卷二。为《回春》卷二“退黄散”之异名。见该条。

57902 **茵陈栝楼散**

【方源】《医统》卷十八。

【组成】茵陈二钱 木通 山栀各一钱半 大黄（炮）一钱 石膏二钱 栝楼壳一钱半

【用法】水二盏，加生姜三片，葱一茎，煎八分，食前温服。

【主治】黄疸。

57903 **茵陈柴苓汤**

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】柴胡 黄芩 半夏 甘草 猪苓 泽泻 赤茯苓 茵陈 麦冬 赤芍

【主治】酒疸，小便如栀汁。

【方论选录】湿少热多，固宜分利，使热从小便而去；佐以小柴胡，方有清热之功；湿蒸热郁，必先燥其肺气，所以小水不行，茵陈辛凉清理肺热，肺气一润，其气清肃下行，膀胱之壅热立通，小便利而黄退矣。

57904 **茵陈理中汤**

【方源】《伤寒广要》卷八引《阴证略例》。

【组成】理中汤加茵陈一钱

【主治】阴寒发黄，腹痛自利者。

57905 **茵陈理中汤**

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】茵陈 白术 人参 干姜

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】阴寒发黄，腹痛自利者，及内伤寒、发黄。

【加减】小便不利，加五苓散合而用之；脉沉，寒甚冷者，必加附子半个；内伤生冷之物发黄，去人参，加枳实、青皮、草果、木香、砂仁。

57906 **茵陈黄芩汤**

【方源】《普济方》卷一四二引《护命方》。

【异名】茵陈蒿黄芩汤（《圣济总录》卷二十八）。

【组成】茵陈蒿 黄芩（去心） 栀子仁 升麻 秦艽（去苗土） 牡丹皮 荆芥穗 麻黄（去根节） 细辛（去苗叶） 石膏（碎） 知母（焙）各半两 黄连（去须） 大黄（锉，炒）各一分

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏，煎至七分，食后，临卧去滓温服。

【主治】伤寒热毒炽盛，熏炙三焦，攻击皮肤，通身发黄。

57907 **茵陈黄芩汤**

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】茵陈蒿 大黄（蒸过） 生麦门冬（去心） 栀子仁各四两 青黛 升麻各三分 黄芩（去黑心）二两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，下芒消末半钱匕，更煎一二沸，温服。

【主治】时气面黄，腹坚气急，言语错乱。

57908 **茵陈黄连汤**

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】茵陈蒿　黄连(去须)　黄芩(去黑心)　大黄(锉,炒)各一两　甘草(炙,锉)　人参各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎至一盏,去滓,食后温服。

【主治】天行急黄,身如金色。

57909　茵陈麻黄汤

【方源】《金鉴》卷五十四。

【组成】茵陈蒿　麻黄

【用法】水煎,加黄酒少许服。

【主治】阳黄表实,无汗。

57910　茵陈麻黄散

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】山茵陈四两　麻黄(去根节,煎去沫,焙)五两　石膏(碎)一两　蜀椒(去目并闭口者,炒出汗)　苍术(水浸,去粗皮)各二两

【用法】上为细散。每服二钱匕,点茶调下;如狂言热躁,沙糖冷水调下。

【主治】时气头痛壮热,或暑毒伏心,状如疟疾。

57911　茵陈清湿汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】茯苓(去皮)　茵陈各一钱　麦芽　山栀(炒黑)　苍术(炒)　白术各二钱(土炒)　黄芩(酒炒)　黄连(酒炒)　枳实(炒)　猪苓　陈皮　防己各八分

【用法】加灯心三十茎,水煎,食前服。

【主治】湿热伤脾,四肢困倦,身体麻木,饮食不化,小便不利。

57912　茵陈解酲汤

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】葛花解酲汤加茵陈

【主治】酒疸虚者。

57913　茵陈橘皮汤

【方源】《伤寒微旨论》卷下。

【异名】茵陈陈皮汤(《类证治裁》卷四)。

【组成】橘皮　生姜　茵陈蒿各一两　白术一分　半夏　茯苓各半两

【用法】上为末。水四升,煮取二升,放温,分作四服。

【主治】身黄,脉沉细数,身热手足寒,喘呕烦躁不渴者。

57914　茵陈吴茱萸汤　《准绳·伤寒》卷四。即《伤寒微旨论》卷下"茵陈茱萸汤"。见该条。

57915　茵陈吴茱萸汤

【方源】《医统》卷十四下。

【组成】茵陈汤加吴茱萸

【用法】水煎服。

【主治】阴黄,四肢厥冷。

57916　茵陈蒿大黄汤

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【异名】茵陈大黄汤(《玉机微义》卷四十五)。

【组成】茵陈蒿　栀子仁　柴胡(去苗)　柏皮(蜜炙)各半两　黄芩(去黑心)　升麻　大黄(锉,炒)各一两　龙胆半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,用水一盏半,煎至一盏,去滓,早、晚食后温服。

【主治】伤寒发黄,面目悉黄,小便赤。

57917　茵陈蒿五苓散

《外台》卷四。即《金匮》卷中"茵陈五苓散"。见该条。

57918　茵陈蒿黄芩汤

《圣济总录》卷二十八。为《普济方》卷一四二引《护命方》"茵陈黄芩汤"之异名。见该条。

57919　茵陈附子干姜汤

【方源】《卫生宝鉴》卷二十三。

【异名】附子茵陈汤(《证治宝鉴》卷十二)、茵陈附子汤(《杏苑》卷五)。

【组成】附子(炮,去皮脐)三钱　干姜(炮)二钱　茵陈一钱二分　白术四分　草豆蔻(面裹煨)一钱　白茯苓(去皮)三分　枳实(麸炒)　半夏(汤泡七次)　泽泻各半钱　陈皮三分(去白)

【用法】上㕮咀。为一服,水一盏半,加生姜五片,煎至一盏,去滓凉服,不拘时候。

【主治】①《卫生宝鉴》:因凉药过剂,变为

阴证，身目俱黄，四肢皮肤冷，心下痞硬，眼涩不欲开，自利踡卧。②《医学纲目》：身目俱黄，肢体沉重，背恶寒，皮肤冷，心下痞硬，按之则痛，眼涩不欲开，目睛不了了，懒言语，自汗小便利，大便了而不了，脉紧细，按之空虚，寒湿相合之阴症发黄。

【方论选录】经云：寒淫于内，治以甘热，佐以苦辛；湿淫所胜，平以苦热，以淡渗之，以苦燥之。附子、干姜辛甘大热，散其中寒，故以为主；半夏、草蔻辛热，白术、陈皮苦甘温，健脾燥湿，故以为臣；生姜辛温以散之，泽泻甘平以渗之；枳实苦微寒泄其痞满，茵陈苦微寒，其气轻浮，佐以姜、附，能祛肤腠间寒湿而退其黄，故为佐、使也。

57920 茵陈苓术黄连汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】茵陈三钱 茯苓 白术各五钱 黄连二钱

【用法】水煎服。

【主治】心疸，烦渴引饮，一饮水即停心下，时作水声，胸前时多汗出，皮肤尽黄，两目独白，为心中虚热。

57921 茵陈栀子三物汤

《医统》卷十四下。为《伤寒图歌活人指掌》卷四“茵陈栀子黄连三物汤”之异名。见该条。

57922 茵陈栀子大黄汤

《济阳纲目》卷三十四。为《伤寒论》“茵陈蒿汤”之异名。见该条。

57923 茵陈栀子豆豉汤

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】茵陈 栀子 豆豉

【主治】阳热瘀在内，蒸发黄。

57924 茵陈栀子黄连汤

《明医杂著》卷六。为《伤寒图歌活人指掌》卷四“茵陈栀子黄连三物汤”之异名。见该条。

57925 茵陈附子干姜甘草汤

《医门法律》卷六。为《伤寒微旨论》卷下“茵陈四逆汤”之异名。见该条。

57926 茵陈栀子黄连三物汤

【方源】《伤寒图歌活人指掌》卷四。

【异名】茵陈栀子黄连汤（《明医杂著》卷六）、茵陈栀子三物汤（《医统》卷十四）、茵陈三物汤（《医学入门》卷四）。

【组成】茵陈蒿三钱 栀子 黄连各二钱

【用法】水二盏，煎至八分，去滓服。

【主治】大便自利而黄。

茴

57927 茴香丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】茴香子三分 附子三分（炮裂，去皮脐） 硇砂三分 天麻三分 木香三分 白附子三分（炮裂） 白矾三分（烧令汁尽） 阿魏三分（面裹，煨面熟为度） 自然铜三分（细研） 干蝎一两（微炒） 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为末，以酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以生姜、葱白煎酒送下，不拘时候。

【主治】肾脏风冷气，脐腹虚胀疼痛。

57928 茴香丸

【方源】《圣惠》卷七。

【异名】茴香子丸（《圣济总录》卷五十二）。

【组成】茴香子三分 木香一分 萝卜子半两（微炒） 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，别研如膏） 厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 桂心三分 蓬莪茂三分 青橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 槟榔三分

【用法】上为末，以醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以热酒送下，不拘时候。

【主治】肾脏虚冷气攻两胁胀满，腹内疼痛，四肢不和。

【备考】《圣济总录》有“附子”。

57929 茴香丸

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】茴香子（微炒） 附子（炮裂，去皮脐） 天南星（炮裂） 硫黄（细研） 丁香 木香 吴茱萸（汤浸七遍，焙干，微炒） 预知

子　桂心各一两

【用法】上为末，入研了药令匀，以醋煮面糊为丸，如弹子大。每服一丸，研碎，以炒生姜热酒调下，良久煎葱白艾汤投之，不拘时候频服之。

【主治】阴毒伤寒，四肢逆冷，心下痛硬，气欲绝者。

57930　茴香丸

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】茴香一两(微炒)　附子一两(炮，去皮脐)　补骨脂一两(微炒)　胡桃仁一两

【用法】上为末，入胡桃同捣烂，煮糯米粥为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心、食前盐汤送下。

【主治】膀胱气痛，及虚冷气下注。

57931　茴香丸

【方源】《普济方》卷二十九引《指南方》。

【组成】茴香一两　香附半两　菟丝子二两　桑螵蛸半两　盐(炒过)二钱

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下。

【主治】肾虚寒，小便数。

57932　茴香丸

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】茴香(炒)　荜澄茄　槟榔　木香　苦楝子　硇砂(细研)各一两　吴茱萸半两(汤浸七遍，焙，炒)　桃仁三分(汤浸去皮，麸炒黄，研)　阿魏一两半

【用法】上为末，次以酒化阿魏，同硇砂、桃仁膏入少面熬令得所，同上件药末和匀为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煨葱酒送下，温服。

【主治】盲肠风气，小肠疼痛，不可忍。

57933　茴香丸

【方源】《脚气治法总要》卷下。

【组成】舶上茴香(炒)　地龙(去土，炒)　赤小豆(炒)　川苦楝(去皮，炒)　川乌头(炮，去皮尖)　乌药(锉)　牵牛(炒，取末)各一两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大，每服十五丸，空心盐汤送下，一日二次。

【主治】风毒湿气，攻疰成疮，皮肉焮热，紫破脓坏，行步无力。

57934　茴香丸

【方源】《局方》卷五。

【异名】茴香煎(《鸡峰》卷七)。

【组成】威灵仙(洗去土)　川乌头(炮，去皮脐)　陈皮(去白)　防风(去苗)　川楝子(麸炒)　萆薢各三两　乌药(去土)五两　川椒(去目及闭口者，炒出汗)二两　赤小豆　茴香(炒)各八两　地龙(去土，炒)七两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心及晚食前温酒送下，盐汤亦得；小肠气痛，炒生姜、茴香酒送下；脚转筋，木瓜汤送下；妇人血脏虚冷，温醋汤送下；脐腹绞痛，滑泄冷痢，浓煎艾汤送下。

【功用】久服补虚损，除风冷，壮筋骨，明耳目。

【主治】①《局方》：丈夫元脏久虚，冷气攻冲，脐腹绞痛，腰背拘急，面色萎黄，饮食减少，及膀胱、小肠气痛，并肾脏风毒，头面虚浮，目暗耳鸣，脚膝无力，肿痛生疮；妇人血脏虚冷，食减力少，肢体疼痛。②《证治宝鉴》：消渴，虫食津液面渴者。

57935　茴香丸

【方源】方出《证类本草》卷九引《经验后方》，名见《普济方》卷二十二。

【组成】茴香二两　生姜四两

【用法】同捣令匀，净器内湿纸盖一宿，次以银石器中，文武火炒令黄焦，为末，酒为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸，茶酒送下。

【功用】助脾胃，进食。

57936　茴香丸

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】茴香子(炒)　吴茱萸(汤洗，焙干，炒)　桂(去粗皮)　胡椒　楝实(锉碎，麸炒)　延胡索各半两　木香　虻虫(去翅足，炒)　海蛤　芫花(醋炒焦)　硇砂(研)　木通各一分

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前盐酒送下。

【主治】厥疝上攻，腹痛无时

57937 **茴香丸**

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【异名】茴香子丸（《普济方》卷二二〇）

【组成】茴香二两（炒） 川乌头二两（炮裂，去皮脐） 川楝子二两 陈橘皮二两（去白瓤） 萆薢二两 地龙二两（去土，微炒） 旋覆花 蜀椒（去闭口及目，炒出汗）各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、临卧酒送下。

【功效】补虚损，除风冷，壮筋骨，明耳目。

【主治】虚损。

57938 **茴香丸** 《本事》卷三。为原书同卷“金锁丹”之异名。见该条。

57939 **茴香丸**

【方源】《宣明论》卷十三。

【组成】茴香（炒） 良姜 官桂各半两 苍术一两（汁浸）

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心、食后生姜汤送下；止痛，温酒送下。

【功用】止痛。

【主治】①《宣明论》：男子、妇人脐腹疼痛刺胸膈不止者。②《普济方》：男子、妇人脐腹疼痛，下元久冷。

57940 **茴香丸**

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】茴香八两（炒） 川楝子（炒） 川乌（炮，去皮） 威灵仙（洗去土） 防风（去芦） 陈皮各三两 地龙一两（去土，微炒） 乌药五两 赤小豆八两

【用法】上为末，酒糊为丸。每服三五丸，茶酒送下。

【主治】湿气下行，流入脬囊，大肿，痛不可忍。

57941 **茴香丸**

【方源】《朱氏集验方》卷八。

【组成】苍术（水浸三日，去皮，锉，焙） 杜仲（制） 破故纸 川椒各二两 茴香一两一钱 厚朴一两

【用法】上药以青盐三分之一，入在瓶内，酌量入水，文武火煮，水尽为度，焙干为末，酒糊为丸。每服五十丸，空心酒送下。

【功用】补气血。久服明眼。

【主治】腰疼。

57942 **茴香丸**

【方源】《普济方》卷二一九引《经效济世方》。

【组成】茴香一斤（去枝梗） 生姜二斤

【用法】以生姜细搽，淹茴香一宿，晒，焙干为末。另研青盐末一两半拌匀，温水泡蒸饼，微炙干，研，入药末再捣千余下，为丸如梧桐子大。每服五十丸，空心盐汤送下。

【功用】壮下元。

57943 **茴香丸**

【方源】《普济方》卷一一三。

【组成】八角茴香半两 川楝子五个 川独活半两 甘草（以上酒炙） 谷精草半两 末茶一两（半两为衣） 苍术一两（酒炙）

【用法】上为末，酒糊为丸。每服十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】破伤风。

57944 **茴香丸**

【方源】《普济方》卷三九九。

【组成】陈皮 茱萸 三棱 莪术 丁香 枳壳（炒） 茴香（炒） 槟榔（炒，去巴） 神曲 麦芽各等分 使君子一百个

【用法】上为末，醋糊为丸，如绿豆大。空心饭饮送下；或姜汤送下亦可。

【主治】虫积气痛。

57945 **茴香丸**

《便览》卷三。为《摄生众妙方》卷七“同春丸”之异名。见该条。

57946 **茴香丸**

【方源】《疡医大全》卷二十四。

【组成】白术 白茯苓 八角（炒） 吴茱

萸　荔枝核　山楂核各一两　橘核三两　枳实八钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,重一钱五分。每服一丸,空心细嚼,姜汤送下。

【主治】疝气偏坠。

57947　茴香丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十四。

【组成】胡芦巴八钱　茴香六钱　巴戟　川乌各二钱　川楝肉四钱　吴萸五钱

【用法】酒糊为丸。每服十五丸,小儿五丸,盐酒送下。

【主治】小腹冷癖,有形如卵,上下走痛不可忍。

57948　茴香丸

【方源】《名家方选》。

【组成】鹿角霜五两　茴香二两　胡椒一两

【用法】上为末,面糊为丸服。

【主治】疝瘕,腰腹痛或引囊及囊大者。

57949　茴香汤

【方源】《局方》卷十。

【组成】茴香(去土,炒)六斤　川楝子(洗,炒)　陈皮(炒)各二斤　甘草(炒)七斤　盐(炒)一斤

【用法】上为末。每服一钱,如茶点吃。

【功用】温中益气,利胸膈,进饮食。

【主治】元脏气虚冷,脐腹胀满,疠刺疼痛,不思饮食及一切冷气。

57950　茴香汤

【方源】《局方》卷十(宝庆新增方)。

【组成】白芷(不见火)　肉桂(不见火)各二两　桔梗(焙)三十两　茴香　甘草(并炒)各六两

【用法】上为末,每服一钱,盐少许,食前沸汤点下。

【功用】宽中,益气,温胃。

【主治】元脏气虚冷,脐腹胀满,疠刺疼痛,不思饮食及一切冷气。

57951　茴香汤

《洁古家珍》。为《保命集》卷下"茴香散"之异名。见该条。

57952　茴香汤

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】茴香(炒)　良姜(锉,用东壁土炒)各一两半　苍术(如前制)二两　甘草(炙)一两

【用法】上为末。每服一钱,烧盐汤,空心调服。

【功用】和脾胃,进饮食,理腹痛,散邪气。

57953　茴香饮

【方源】《朱氏集验方》卷三。

【组成】八角茴香　白牵牛(炒)各等分

【用法】上为细末。空心酒调下。

【主治】膀胱偏坠,疝气。

57954　茴香酒

【方源】《普济方》卷一五五引《圣惠》。

【异名】茴香散(《普济方》卷三一〇。

【组成】破故纸(炒香)　茴香(炒)　辣桂各等分。

【用法】上为末。每服二钱,食前热酒调下。

【主治】打坠凝瘀,腰痛。

57955　茴香酒

【方源】《朱氏集验方》卷三。

【组成】茴香(炒,研)

【用法】灯笼草根浑酒调下。

【主治】膀胱偏坠,久不愈者。

57956　茴香酒

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】茴香(舶茴尤佳)

【用法】浸酒,煮饮之。

【主治】卒肾气痛,偏坠牵引,及心腹痛。

57957　茴香酒

【方源】《接骨图说》。

【组成】茴香　樟脑　红花

【用法】上药浸火酒,纳瓷器封固三十日。

【功用】接骨。

【主治】折伤。

57958　茴香酒

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】茴香　丁香　樟脑　红花　白酒

【用法】酒剂。用棉花蘸涂伤处。

【功用】温通活血。

【主治】扭伤，挫伤肿痛。

57959 茴香散

【方源】《普济方》卷三〇一引《千金》。

【组成】白蒺藜　附子　茴香子等分

【用法】上为细散。每服二钱，食前温酒调下。

【主治】阴疮，风冷所伤，疼痛。

57960 茴香散

【方源】《颅囟经》卷下。

【组成】茴香　冬青胆（阴干）　生甘草各等分

【用法】上为细末。每洗眼时，取药一分，水一盏，煎十沸后，温洗之。

【主治】孩儿赤眼，并治胎热及瘠障多泪。

57961 茴香散

【方源】《幼幼新书》卷十引《形证论》。

【组成】茴香（炒）　芸苔子各半钱　田螺壳二钱　甘草三寸（炙）　川楝子一分（用肉）

【用法】上为末。每服半钱，煎沉香汤调下；木香汤亦得。

【主治】瘕气。小儿生下五个月以上至七岁，有结癖在腹成块，如梅核大，来去，或似卵大，常叫疼痛不住，在脐下痛者。

57962 茴香散

【方源】《圣惠》卷七。

【异名】茴香子散（《普济方》卷二五〇。）

【组成】茴香子一两　苦楝子一两（炒微黄）　木香半两　槟榔一两　青橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为散。每服二钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓热服，不拘时候。

【主治】盲肠气，小腹连阴疼痛。

57963 茴香散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】舶上茴香一两（炒）　金毛狗脊一两（刮去皮毛）　黑牵牛二两（微炒）

【用法】上为细散。每服三钱，入腻粉少许拌匀，以猪肾炒，临卧盐酒调下；盐汤亦得。

【主治】膀胱气肿硬，上下不定，腰膝气滞疼痛，行履艰难。

57964 茴香散

【方源】《医方类聚》卷一三三引《神巧万全方》。

【组成】茴香　紫苏　槟榔各一两　木通　巴戟（去心）　人参　赤茯苓各二分　当归　桃仁（去皮，麸炒黄）各半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】气淋，小肠疼痛。

57965 茴香散

【方源】《本事》卷三。

【组成】茴香（炒）　蓬莪术　京三棱各一两（二味炮熟，锉）　金铃子肉一两　甘草半两（炙）

【用法】上为细末。每服二钱，热酒调下。每发痛甚连日，只二三服立定。

【主治】膀胱气痛。

【方论选录】《本事方释义》：茴香气味辛温，入足厥阴；金铃子肉气味苦微寒，入手、足厥阴；蓬莪术气味苦辛温，入足厥阴；京三棱气味苦平，入足厥阴；甘草气味甘平，入足太阴，能缓诸药之性；热酒调送，欲药性之入厥阴也。此治膀胱气痛不可忍者。刚剂屡投而效，故治以攻坚破积之药，虽有缓中之品，而苦辛泄肝之药居多，气既得泄，病自缓矣。

57966 茴香散

【方源】《医方大成》卷十引《幼幼方》。

【组成】茴香（炒）　木香　黑附子（炮）　金铃子（去核，用皮）　萝卜子（炒）　槟榔　破故纸（炒）　白豆蔻（煨）各等分

【用法】上㕮咀。每服二钱，水半盏，入盐煎服。

【主治】小儿盘肠气痛。

57967 茴香散

【方源】《普济方》卷三九九引《全婴方》。

【组成】茴香(炒)　川楝子(去核)　牵牛　巴戟各等分

【用法】上为末。三岁半钱，灯心汤调下。

【主治】小儿癀疝气攻，阴核肿大。

57968　**茴香散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】京三棱(炮，切)　蓬莪术(炮，切)　金铃子(去核，麸炒赤)各一两　茴香(炒)　青橘皮(去白)　甘草(炙)各半两　木香　当归(洗，焙)各一两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜二片，煎至七分，温服；如小肠撮痛，空心食前炒生姜，酒调下，如人行五七里，再服一服。

【主治】一切气疾，脐腹满，膀胱疝气，小肠气痛。

57969　**茴香散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】香附子(用去壳巴豆二七粒同炒焦，去巴豆不用)　茴香(炒)各一两

【用法】上为细末。每服半钱，乳食空煎紫苏叶汤调下。如是三岁以上服一钱。

【主治】小儿外肾肿大，胀闭作痛。

57970　**茴香散**

【方源】《保命集》卷下。

【异名】茴香汤(《洁古家珍》)。

【组成】茴香(炒)　苦楝(炒)

【用法】上为末。每服二钱，食前酒下。

【主治】肾消病，下焦初证，小便如膏油。

57971　**茴香散**

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】芸苔子(炒)　蓬莪术　茴香(炒)　青皮　甘草各一分　辣桂　木香各半分

【用法】上为末。每服半钱，盐汤调下。

【主治】小儿脐下气块痾痛。

57972　**茴香散**

【方源】《朱氏集验方》卷十一。

【组成】京三棱(炮)　茴香(炒)　甘草　没药各等分

【用法】上为末。煎吊藤汤调下；葱汤亦可。

【主治】小儿吊疝，大人膀胱疝气痛。

57973　**茴香散**

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】茴香　苦楝(炒)　五味

【用法】上为末。每服二钱，食前酒送下。

【主治】肾消，小便如油。

57974　**茴香散**

【方源】《医方类聚》卷九十引《经验良方》。

【组成】茴香一两　川楝肉(炒)　破故纸(炒)　香附子　猴楂子各半两(去核)

【用法】上为末。每服二钱，空心温酒、盐汤任下，一日三次。初生小儿女皆可服。如药冷，将盏盛药，于热汤内坐热，涂母乳与吃。

【主治】男子小肠气，女子盘肠气，寒湿气入少腹疼痛，或外肾肿痛。

57975　**茴香散**

《普济方》卷三一〇。为《普济方》卷一五五引《圣惠》“茴香酒”之异名。见该条。

57976　**茴香散**

【方源】《医方类聚》卷七十三引《经验秘方》。

【组成】广木香　茶各一两　八角茴香　乳香　人参各半两　川楝子二两半(去皮子)　甘草　知母　小茴香　贝母各一两半　沉香二钱　安息香二钱半

【用法】上为细末。好酒和聚，阴干为末。每服三钱，空心酒下。

【主治】牙痛。

57977　**茴香粥**

【方源】《寿世青编》卷下。

【组成】小茴香(炒)

【用法】煎汤，去滓，入米煮粥食之。

【功用】①《寿世青编》：和胃。②《药粥疗法》：行气止痛，健脾开胃。

【主治】①《寿世青编》：疝气。②《药粥疗法》：小肠疝气，脘腹胀气，睾丸肿胀偏坠，胃寒呕吐，食欲减退以及鞘膜积液，阴囊象皮肿。乳汁缺乏。

【宜忌】《药粥疗法》：茴香粥属散寒止痛性药粥，对一切实热病症及阴虚火旺的患者，不可选食。

57978 **茴香煎**

《鸡峰》卷七。为《局方》卷五"茴香丸"之异名。见该条。

57979 **茴姜汤**

【方源】《得效》卷四。

【组成】茴香二两半 青皮一两 良姜一两（酒浸，炒） 天台乌药（泔浸一日夜，炒黄为度）

【用法】上为散。每服三钱，水一盏，加生姜五片，大枣一枚，煎，空心服。

【主治】男子、妇人一切心腹胀满，气滞走痛。

【宜忌】忌茶。

57980 **茴消散**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】朴消五钱 茴香（炒）二钱

【用法】上为末。每服二钱，热酒下。

【主治】膀胱热而不通者。

57981 **茴香子丸**

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】茴香子一两 木香一两 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 附子一两（炮制，去皮脐） 桂心一两 安息香一两 胡芦巴半两 青橘皮半两（汤浸，去白瓤，微炒）

【用法】上为末，以酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，热生姜酒送下，不拘时候。

【主治】膀胱虚冷气攻腹胁，胀满疼痛。

57982 **茴香子丸**

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】茴香子一两（微炒，捣为末） 古文钱青一分（细研） 硇砂一分（细研） 桃仁四十九枚（酒浸，去皮尖双仁，生研）

【用法】上为末，以汤浸蒸饼为丸，如麻子大。二三岁儿每服一丸，以橘皮汤送下。

【主治】小儿偏坠，或气攻小腹疼痛。

57983 **茴香子丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】茴香子一两 桂心一两 巴戟一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 补骨脂一两（微炒） 干姜一两（炮裂，锉）

【用法】上为末，用羊肾二对，切去筋膜，以酒二升，煮令酒尽，烂研，和诸药末，捣为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、晚食前生姜酒送下。

【主治】下元虚冷，腰膝疼痛，肌肉消瘦，渐加无力。

57984 **茴香子丸**

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】茴香子（炒） 桂（去粗皮）各一两 附子（炮裂，去皮脐） 当归（切，焙） 荜澄茄 木香 赤石脂各三分 蜀椒（去目及闭口者，微炒出汗）半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前温酒送下。

【主治】小肠虚冷，小腹疼。

57985 **茴香子丸**

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】茴香子（炒） 木香各三分 莱菔子（炒）半两 厚朴（去粗皮，半生锉，半用姜汁炙）一两 桂（去粗皮） 干姜（炮） 蓬莪茂（煨，锉）各三分 青橘皮（汤浸，去白，焙）半两 桃仁（去皮尖双仁）三分（研膏）

【用法】上为末，入桃仁膏研匀，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下。

【主治】肾脏虚弱中寒，攻腰腹满痛，手足微冷。

57986 **茴香子丸**

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】茴香子（炒） 肉苁蓉（酒浸，切，焙） 附子（炮裂，去皮脐）各二两 五味子一两

【用法】上为细末，用好酒一升，并猪肾一对细切，和药都一处浸一宿，取出焙干，捣罗为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十

丸至三十丸，好茶或豆淋酒送下。

【主治】肾脏风气冲注，脚膝生疮。

57987　**茴香子丸**　《圣济总录》卷五十二。为《圣惠》卷七"茴香丸"之异名。见该条。

57988　**茴香子丸**

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】茴香子(炒)　蓬莪茂(煨，锉)　楝实(煨，去核)　白术　诃黎勒皮各一两　丁香一分　吴茱萸(汤洗，焙干，炒)半两　桃仁三分(去皮尖双仁，研如膏)

【用法】上为末，入桃仁膏研匀，炼蜜为丸，如银杏大。每服一丸，温酒或盐汤嚼下，不拘时候。

【主治】肾脏冷气攻腹胁，疼痛胀满。

57989　**茴香子丸**

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【组成】茴香子三两(微炒，为末，以米醋二升熬如饧)　附子(炮裂，去皮脐)一两　青橘皮(汤浸，去白，焙)　木香　狼毒(炒)　当归(切，焙)各三分　阿魏一两(研，以酒一升，煎取半)　硇砂一两半(沸汤化，澄熬取霜，入阿魏煎中同熬如饧，入茴香煎，搅匀)　自然铜(煅，醋淬，研)各一两半

【用法】上药除煎研外，为末，同入煎内和捣为丸，如梧桐子大，如硬入炼蜜少许。每服十五丸至二十丸，空心温酒送下。

【主治】肾脏久积气在膀胱，虚胀上攻，膨满疞痛。

57990　**茴香子丸**

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】茴香子(舶上者妙)　附子(炮裂，去皮脐)　巴戟天(去心)　蜀椒(去目及闭口，炒出汗)　牛膝(酒浸一宿，焙)　肉苁蓉(酒浸令软，细切，焙)　青盐(研)各二两

【用法】上药除青盐外，为末，研拌令匀，烂煮羊肾或猪肾三二对，去筋膜细切，烂研和药，入杵臼捣令匀熟为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心盐汤或酒送下。

【主治】脾劳。肌肤瘦瘁，面色黄黑，四肢无力，脚膝疼痛，大便不调；或风虚上攻，头眩目暗，肢体沉重，昏愦嗜卧。

57991　**茴香子丸**

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】茴香子(炒)　胡椒　附子(炮裂，去皮脐)　阿魏(面和作饼子，炙熟)　青橘皮(汤浸，去白，焙)　硫黄(研)　菖蒲　牛膝(酒浸，切，焙)　五味子各等分

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心温酒送下。

【主治】虚劳，元脏气冷，心腹疞痛。

57992　**茴香子丸**

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】茴香子(炒)　蜀椒(去目并闭口，炒取红)　附子(炮裂，去皮脐)　巴戟天(去心)　木香　青橘皮(汤浸，去白，焙)　青盐(别研)　肉苁蓉(酒浸，切，焙)　阿魏(醋化，面和作饼，炙)　楝实(锉，炒)　干蝎(去土，炒)　荜澄茄　补骨脂(炒)　葫芦巴　大戟各一两　肉豆蔻(去壳)三枚　硫黄(舶上者，研)二两

【用法】上为末，用白羊肾四对，去筋膜，沙盆内研如面糊，将药一处入木臼中，更入炼蜜杵为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前温酒送下；元气痛，煨葱白热酒送下三十丸。

【主治】小肠虚寒撮痛。

57993　**茴香子丸**

《普济方》卷二二〇。为《圣济总录》卷一八六"茴香丸"之异名。见该条。

57994　**茴香子丸**

《普济方》卷二四九。即《圣济总录》卷九十四"茴香子散"改为丸剂。见该条。

57995　**茴香子汤**

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】茴香子(炒)三两　草乌头(蛤粉同炒裂，去皮脐，锉)一两

【用法】上为末。每服三钱匕，水一盏，加盐少许，煎至八分，去滓，露至五更冷服。

【主治】结阴下血腹痛。

57996 茴香子散

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】茴香子(炒) 木香 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 人参各半两 菖蒲(切,米泔浸一日,炒)一两 甘草(炙,锉)一分

【用法】上为散。每服三钱匕,以冷米饮调下,如人行三里再服。

【主治】霍乱吐泻,转筋烦闷。

57997 茴香子散

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】茴香子(炒) 桃仁(炒去皮尖双仁) 干姜(炮) 甘草(炙,锉) 桂(去粗皮) 熟干地黄(焙) 石斛(去根,锉) 杜仲(去粗皮,切,焙)各等分

【用法】上为散。每服二钱匕,空心、食前温酒调下。

【主治】肾胀,气攻腰腹痛。

57998 茴香子散

《圣济总录》卷九十。为《博济》卷二“烧石子茴香散”之异名。见该条。

57999 茴香子散

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】茴香子(炒) 京三棱(煨,锉)各一两 姜黄 马蔺花(醋炒)各半两 没药(研) 干姜(炮)各一分

【用法】上为散。每服二钱匕,空心、食前热酒调下。

【主治】小肠、膀胱疝气疼痛。

58000 茴香子散

《圣济总录》卷九十四。为原书卷七十一“茴香槟榔散”之异名。见该条。

58001 茴香子散

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】茴香子(炒) 荜澄茄 楝实(锉) 木香各一两半 葫芦巴 青橘皮(汤浸,去白,焙)各一两 槟榔(锉)半两

【用法】上为散。每服一钱匕,空心、食前温酒调下,一日二次。

【主治】小肠受邪,控睾痛引少腹。

【备考】本方改为丸剂,名“茴香子丸”(见《普济方》)。

58002 茴香子散

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】茴香子(炒) 马蔺花(炒) 葶苈(纸上炒)各等分

【用法】上为散。每服二钱匕,食前温酒调下。以通为度。

【主治】小便不通。

58003 茴香子散

《普济方》卷二五〇。为《圣惠》卷七“茴香散”之异名。见该条。

58004 茴香角子

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】茴香子 木香 巴戟 附子(炮裂,去皮脐) 汉椒(去目及闭口者,微炒,去汗) 山茱萸各一两 豮猪肾一对(去脂膜,细切)

【用法】上为末。每对猪肾,用药末二钱,入盐溲面,像肝角子样修制,灰火内煨令熟,空腹薄茶送下。

【主治】五劳七伤,阴萎气乏。

58005 茴香草饮

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】生茴香草不拘多少

【用法】捣绞取汁。每服一合,用酒三合,同煎令沸,空心、晚食前温服。

【功用】解恶毒风肿。

【主治】风毒或着人阴,或偏着一边,疼痛挛急,牵引小腹,闷乱难忍。

58006 茴香草散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】茴香草 高良姜(晒干)各等分

【用法】上为末。先吹鼻痔上二次,片时许,随后方行取法,其痔自然易脱。取鼻痔秘法:先用茴香草散,连吹二次,次用细铜箸二根,箸头钻一小孔,用丝线穿孔内,二箸相离五分许,以二箸头直入鼻痔根上,将箸线绞紧,向下一拔,其痔自然拔落,置水中观其大小。预

用胎发烧灰同象牙末等分，吹鼻内，其血自止。戒口不发。

【主治】鼻痔。

58007　茴香雀酒

【方源】《直指》卷十八。

【组成】舶上茴香三钱　胡椒一钱　砂仁　辣桂各二钱

【用法】上为末，以生雀燎毛去肠拭净，用三个入药，于其腹中麻绳系定，湿纸数重裹，煨香熟，空心嚼食，温酒送下。

【主治】肾冷疝气，偏坠急痛。

【备考】本方方名，《普济方》引作"茴香小雀酒"。

58008　茴香煮散

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】茴香子（炒）　木香　芍药　陈曲　厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉）　枳壳（去瓤，麸炒）　桂（去粗皮）　青橘皮（汤浸，去白，焙）　干姜（炮裂）　人参　白茯苓（去黑皮）　京三棱（煨）各半两　生干地黄（焙）各三分

【用法】上为细散。每服三钱匕，水一盏，加葱白二寸，盐少许，煎至七分，热服。

【主治】卒疝，攻少腹疼痛。

58009　茴香煎丸

【方源】《百一》卷二。

【组成】川椒半两（去子及合口者）　老生姜二两（细研）　厚朴（去粗皮）　茴香　青盐（海盐亦得，以上五味入瓷罐，汤浸得所，慢火煮干）各一两　大川乌　附子（二味去皮脐尖，锉骰子大，炒黄）　益智仁　川楝子肉　桂（去皮）　破故纸（炒）　陈皮（去白）　苍术（米泔浸一宿）各一两

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前温酒盐汤送下。

【功用】益脾胃。

【主治】脾胃弱，肾气虚，饮食不美，噫醋吞酸，脐腹筑刺，小肠气痛及中酒恶心。大病之后，气体瘦弱。

58010　茴香小雀酒

《普济方》卷二四八。即《直指》卷十八"茴香雀酒"。见该条。

58011　茴香化气散

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】小茴三两（炒）　白术一两半（炒）　枳壳一两半（炒）　青皮一两半（炒）　大茴三两（炒）　香附三两（酒炒）　乌药一两半　吴茱萸八钱（醋炒）　白蔻一两半（去壳，炒）　丁母香八钱

【用法】上为末。每服三钱，广橘核汤下。

【主治】六聚，脉弦沉涩者。

【方论选录】产后任劳多郁，夹寒邪而肝脾受病，气化不调，故聚成六腑，或痛或不痛，或胀或不胀，以其聚散无常也。小茴温经以化其气；大茴散气以温其经；吴茱萸降逆气以调肝；丁香散滞气以缓胃；白术健脾气，运化乎中；枳壳泻滞气，消散其聚；青皮破气平肝；白蔻宽胸快膈；乌药顺清气，疏逆气，以散浊气也。为散，橘核汤下，以疏其结，使寒散结消，则六腑之聚自平，而脾气健运有常，肝气亦为调适，安有聚散无定，或痛或胀之患乎。

58012　茴香乌药丸

《圣济总录》卷一八五。为《局方》卷五"金钗石斛丸"之异名。见该条。

58013　茴香乌药汤

【方源】《顾松园医镜》卷十三。

【组成】茴香（炒，研）钱许　乌药二钱　吴茱萸（汤泡）三五七分　破故纸（炒，研）钱许　川萆薢五钱　木瓜二钱　木香　砂仁各钱许　荔枝核（炒，研）五钱

【用法】亦可浸酒服。

【主治】疝气病初感寒邪或寒湿兼感，未郁为热者。

【宜忌】郁久成热者，不宜服之。

【加减】或加猪胞（炙，研）钱许；痛引腰脊，加牛膝、杜仲；寒甚，可加肉桂五分至一钱；虚甚，可加人参。

【方论选录】茴香、乌药、吴茱萸、破故纸均为治寒湿疝气之病，川萆薢除下部湿邪，木瓜

治筋病缓急，木香、砂仁止冷气腹痛，猪胞用为引导。

58014 **茴香四逆汤**

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】小茴香二钱　附子三钱　干姜一钱　破故纸二钱　杜仲五钱　茯苓二钱　甘草五分　大枣三个

【用法】水二钟，煎一钟，温服。

【主治】直中少阴，肾气厥逆，腹痛下利，手足厥冷，小便清利。

58015 **茴香四神散**

【方源】《医统》卷六十引《医学发明》。

【组成】小茴香　南木香　川山甲（炮）全蝎（微炒）各等分

【用法】上为粗末。每服半两，酒、水各半盏煎服。

【主治】诸疝痛。

58016 **茴香安肾汤**

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】人参一钱　白术一钱　白茯苓（去皮）一钱　泽泻七分　茴香一钱（炒）　破故纸一钱　黄柏八分　木香五分　槟榔一钱　乌药一钱　香附一钱（童便浸经宿）　砂仁一钱　玄胡索五分　升麻三分　甘草（炙）五分　荔枝核一钱

【用法】上锉。饥时服。

【主治】左边偏坠，丸如鸡鸭子。

58017 **茴香苍术丸**

【方源】《普济方》卷二四七引《德生堂方》。

【组成】苍术一斤（泔水浸，春、夏三日，秋、冬五日）　破故纸（盐炒）　八角茴香（盐炒）巴戟（去心）　黑牵牛各二两

【用法】苍术分作四分，与四药同炒外，杜仲四两，炒去丝，只去黑牵牛不用，余为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心盐、酒、水任下。

【主治】疝气肾核偏坠，痛不能忍者。

58018 **茴香附子丸**

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】附子（炮裂，去皮脐）　桂（去粗皮）葫芦巴　马蔺花（炒）　青橘皮（汤浸，去白，焙）　茴香子（炒）　楝实（取肉，炒）　干姜（炮）　巴戟天（去心）　补骨脂（炒）各半两

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，空心盐酒送下。

【主治】积年伤惫，小肠久冷，及痃气急急。

58019 **茴香金铃丸**

【方源】《百一》卷十五。

【组成】金铃子（每个锉作四片，用僵蚕半两去丝嘴，同煎令香熟，去僵蚕不用）　茴香（微炒）　马蔺花　吴茱萸（汤洗七次，炒令香熟）　石茱萸（酒浸，炒令香熟）　山茱萸　青皮　陈皮各一两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十至五十丸，食前温酒、盐汤送下。

【主治】奔豚气。

58020 **茴香枳壳丸**

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】枳壳（麸炒，去白）　茴香（微炒香）各等分

【用法】上为细末，酒面糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心、食前温酒送下；或米饮汤送下亦得。

【主治】中满下虚，腹胁胀满，气不宣通。

58021 **茴香益元散**

【方源】《医统》卷七十一。

【组成】茴香二钱（微炒黄色）　益元散三钱

【用法】上为末。水一盏半，煎八分，食前服。

【主治】气滞尿淋疼痛。

58022 **茴香益智丸**

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】川乌一两　小茴香（盐炒）一两　破故纸一两（炒）　益智仁一两（炒）　乌药一两

【用法】上为末，用山药四两，打糊为丸，如梧桐子大。每服八十丸，盐汤送下。

【主治】老人阳虚失禁，及房劳伤气，遗沥。

58023　**茴香理中丸**

【方源】《普济方》卷二十三。

【组成】白术　人参（去芦）　干姜（炮）　甘草各二两半　茴香一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每二分作十丸。每服一丸，食前用白汤化下，嚼服亦得；或丸如梧桐子大服亦得。

【功用】温脾胃，消痞满，顺三焦，进饮食，辟风寒邪气。

【主治】中焦不和，脾胃虚冷，心下虚痞，肠中疼痛，呕吐冷痰，饮食不下，噫气吞酸，怠惰嗜卧；霍乱吐利，肠鸣不渴，手足不和，米谷迟化；大病、新产吐唾不止，及新产内虚。

58024　**茴香楝子丸**

【方源】《普济方》卷二四七。

【异名】茴香楝实丸（《医统》卷六十）。

【组成】川楝子一两三钱　小茴香一两半　吴茱萸二两　海藻一两　木香半两　泽泻半两　青盐三钱　蓬莪术七钱半（醋炙）　三棱七钱半（煨）　青皮一两　黑牵牛七钱（一半生用，一半炒用）

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前、空心酒送下。

【主治】诸疝证。

58025　**茴香楝实丸**

【方源】《宣明论》卷二。

【组成】茴香（炒）　楝实（麸炒，去核）　石茱萸　马蔺花（醋炒）各一两　陈皮一两　芫花半两（醋炒）

【用法】上为末，醋炒面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至二十丸，空心、食前温酒送下。

【主治】①《宣明论》：小肠病结上而不下，痛冲心肺。②《普济方》小肠控睾证。

58026　**茴香楝实丸**

《医学发明》卷五。为《圣济总录》卷九十四“楝实丸”之异名。见该条。

58027　**茴香楝实丸**

《医统》卷六十。为《普济方》卷二四七“茴香楝子丸”之异名。见该条。

58028　**茴香槟榔散**

【方源】《圣济总录》卷七十一。

【异名】茴香子散（原书卷九十四）。

【组成】茴香子（炒）　槟榔（锉）　京三棱（煨，锉）　青橘皮（汤浸，去白，切，盐炒）各半两　木香一分

【用法】上为散。每服二钱匕，热汤调下，不拘时候。

【主治】奔豚气成块，上冲腹胁满痛；寒疝积聚，脐腹疼痛，两胁胀满。

58029　**茴香橘皮酒**

【方源】《医统》卷八十三引《秘方》。

【组成】八角茴香一两　红橘皮二两　白豆蔻半两

【用法】上为粗末。每服三钱，酒一盏，煎数十沸，滤去滓服。

【主治】血气凝寒，小腹痛；妇人室女小腹痛不可忍，内外着寒；兼治心腹痛。

58030　**茴香橘核丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】小茴香（炒）四十两　香附（炙）四十两　昆布四十两　荔枝核八十两　穿山甲（炒）二十两　肉桂（去粗皮）十六两　橘核（炒）四十两　青皮（炒）四十两　大茴香四十两　补骨脂（炒）二十两　木香二十两　桃仁（去皮）十六两　槟榔四十两　玄胡索（炙）四十两　川楝子八十两　莪术（炙）二十两　乳香（炙）二十两

【用法】上为细粉，用冷开水泛为小丸。每服三钱，生姜淡盐汤或温开水送下，每日二次。

【功用】散寒软坚，行气止痛。

【主治】各种疝气，睾丸偏坠，坚硬肿痛。

【宜忌】忌食生冷。

58031　**茴香橘核丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（杭州方）。

【组成】橘核（盐炒）二两　厚朴（姜炙）五钱　桃仁二两　昆布二两　木通五钱　肉桂

五钱 川楝子(炒)二两 玄胡索(醋炙)五钱 海藻二两 木香五钱 枳实(麸炒)五钱 小茴香(酒炒)八钱 海带二两

【用法】桃仁单放，余药共为细末，另取精白面一两，黄酒二两，加适量清水，打成稀糊，取上药粉，泛为小丸。每服二至三钱，空腹时温酒或淡盐汤送下，一日二次。

【功用】理气散寒软坚。

【主治】因寒湿下注引起小肠疝气，睾丸肿大，坚硬疼痛。

58032 **茴香鳖甲丸**

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】茴香子(舶上者，炒) 鳖甲(去裙襕，醋炙)各一两 附子(大者)一枚(炮裂，去皮脐) 胡芦巴一分 柴胡(去苗) 黄连(去须)各半两 楝实十枚(炮)

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸至二十丸，食前温酒送下。

【主治】虚劳腰膝痛。

58033 **茴楝五苓散**

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】五苓散加茴香 川楝 葱 盐

【主治】膀胱水疝，尿不利。

茱

58034 **茱芍丸**

《本草纲目》卷三十二引《卫生杂兴》。为原书同卷“二色丸”内容之一。见该条。

58035 **茱连丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【异名】固肠丸(《百一》卷六)。

【组成】黄连(去须) 吴茱萸(汤泡七遍) 罂粟壳(蜜炙，去顶)各等分

【用法】上为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每食前服三十丸至五十丸，泄泻，米饮送下；赤痢，甘草汤送下；白痢，干姜汤送下；赤白痢，甘草、干姜汤送下。

【主治】泄泻及赤白痢。

58036 **茱连丸**

【方源】《直指》卷十四。

【组成】吴茱萸(拣净) 黄连(去须，半寸一截，同炒熟，分为二处)

【用法】上为末，醋面糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，陈米饮送下。赤痢专服黄连；白痢专服茱萸；赤白痢并服。或多或少，以意增减。

【主治】①《直指》：赤白痢。②《医统》：痞满。

【备考】《医统》本方用法：为细末，米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后白汤送下。

58037 **茱连丸**

【方源】《活幼口议》卷二十。

【组成】土黄连(去须) 吴茱萸各一两 陈皮半两(去白)

【用法】上为末，水煮面糊为丸，如麻子大。每服二十丸，饮送下。

【主治】小儿夏月暴泻注下。

58038 **茱连丸**

【方源】《会约》卷十引丹溪方。

【组成】黄连(土炒)一两半 吴茱萸(泡，焙)一两 陈皮 苍术(米泔浸) 黄芩(土炒) 桔梗 茯苓各一两二钱

【用法】上为末，神曲糊丸，如绿豆大。每服二三十丸，少用开水送下。

【主治】呕酸，吞酸。

58039 **茱连丸**

《医学正传》卷三。为方出《丹溪心法》卷三，名见《医方类聚》卷一九七引《新效方》“茱萸丸”之异名。见该条。

58040 **茱连丸**

《万氏家抄方》卷一。为《圣惠》卷五十九“茱萸丸”之异名。见该条。

58041 **茱连丸**

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】苍术(米泔水浸，炒) 陈皮 白茯苓(去皮) 半夏(汤泡透，切片，姜汁炒)各一两 黄连(姜炒)一两半(夏月倍用) 吴茱萸(炒，冬月倍用)

【用法】上为细末，蒸饼水打稀糊为丸，如绿豆大。每服三十丸，食后姜汤送下。

【主治】郁积，吞酸吐酸。

【备考】方中吴茱萸用量原缺。《寿世保元》用一两。

58042 **茱连丸**

《医方集解》卷上。为《丹溪心法》卷一"左金丸"之异名。见该条。

58043 **茱连汤**

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】橘红一钱五分 半夏一钱 神曲一钱 苍术一钱 黄连六分 萝卜子(炒)五分 茯苓一钱二分 香附子八分 山楂子八分 生姜七片 吴茱萸四分(和黄连炒)

【用法】上㕮咀，水煎熟，食前服。

【主治】吞酸，胸中无奈或嗳腐臭者。

58044 **茱连汤**

《治痘全书》卷十三。为《痘疹世医心法》卷十一"茱连散"之异名。见该条。

58045 **茱连散**

【方源】《痘疹世医心法》卷十一。

【异名】茱连汤(《治痘全书》卷十三)。

【组成】黄连半两 吴茱萸二钱

【用法】上二味同炒，为细末。每服半钱，生姜汤调服。

【主治】①《痘疹世医心法》：痘疹吐者。②《准绳·幼科》：初发热，暴吐不止，此火气上逆也。

58046 **茱连散**

【方源】《痘疹心法》卷二十二。

【组成】黄连半两 吴茱萸二钱(二味同炒) 青竹茹一团

【用法】上为细末。每服二钱，生姜汤调下。

【主治】干呕。

58047 **茱苓丸**

《得效》卷四。为《百一》卷五"吴仙丹"之异名。见该条。

58048 **茱枳丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】茯苓(粉红者)四两(去皮) 枳实(去瓤，麸炒) 吴茱萸(汤泡七次，炒)各二两

【用法】上为细末，姜汁煮神曲糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，生姜汤送下，食后稍空服。

【功用】降气消饮，利小便。

【主治】中焦停饮癖，胸膈不快，恶心呕逆，痰气隘盛，头目旋晕，不美饮食。

58049 **茱萸丸**

【方源】《医心方》卷九引《深师方》。

【组成】吴茱萸二两 椒一两半 黄芩一两 前胡一两 细辛六分 皂角二枚 人参三分 茯苓一两半 附子一两 干姜六分 半夏一两

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，一日三次，不知稍增之。

【主治】膈上冷，膈下热，宿食癖饮积聚，食不消，塞在胸中，或反胃害食消瘦。

58050 **茱萸丸**

【方源】《外台》卷三十三引《经心录》。

【组成】吴茱萸一升 蜀椒一升(去目汗，末)

【用法】炼蜜为丸，如弹子丸。绵裹，导子肠中，日再易。无所下，但开子脏，令阴温，即有子也。

【主治】妇人阴寒，十年无子。

58051 **茱萸丸**

【方源】《外台》卷七引《延年秘录》。

【组成】吴茱萸一两半 干姜一两半 桂心一两 白术二两 人参一两 橘皮一两 附子一两半(炮) 蜀椒一两(出汗) 甘草一两(炙) 黄芩一两 当归一两

【用法】上为散，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，一日三次，稍加至十五丸，药尽更合，酒、饮无拘，食前后任意。

【主治】心痛。

【宜忌】忌猪肉、生葱、海藻、菘菜、桃、李、雀肉等。

58052 **茱萸丸**

【方源】《外台》卷七引《必效方》。

【组成】吴茱萸一斤　桂心二两　当归二两

【用法】上药治下筛,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,酒送下,一日二次。渐加至四十丸,以知为度。

【主治】①《外台》引《必效方》:蛔心痛。②《圣济总录》:心中寒,心背彻痛。

58053　茱萸丸

【方源】《元和纪用经》。

【组成】白附子一两　吴茱萸(炒香)三两　草乌头(去皮尖,称二两,入好净白盐中拌炒,令裂,去盐,取)一两

【用法】上为末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服七丸至十五丸,温酒或盐汤送下。

【功用】散寒湿及肠中风冷阴邪之气。

58054　茱萸丸

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】食茱萸三分　干姜二分(炮裂,锉)　川椒三分(去目及闭口者,微炒去汗)　桂心三分　人参三分(去芦头)　细辛三分　赤茯苓半两　白术半两　附子半两(炮裂,去皮脐)　陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以温酒送下,不拘时候。

【主治】五噎。胸中寒,呕逆气隔,饮食不下。

58055　茱萸丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【异名】变通丸(《医方类聚》卷一三九引《澹寮》)、茱连丸(《万氏家抄方》卷一)。

【组成】吴茱萸二两(汤浸七遍,焙干,微炒)　黄连二两(去须,微炒)

【用法】上为末,用软饭为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以粥饮送下,不拘时候。

【主治】①《圣惠》:水泻不止。②《普济方》:赤白痢,腹脐痛,日夜无度,脓血相杂,里急及肠风下血。

【备考】本方改为汤剂,名"茱萸汤"(见《圣济总录》);改为散剂,名"二宜散"(见《普济方》)。

58056　茱萸丸

【方源】《苏沈良方》卷十。

【组成】茱萸三分(瓦上出油)　胡椒　人参　当归各五钱　甘草半两(一半生,一半纸裹五七重,醋浸令透,火内慢煨干,又浸,如此七遍)　半夏一两(用姜四两研汁,入砂罐子内用姜汁、井水煮候破,看存二分白心,取半夏研为膏子)　白矾半两(炒干存性,一分)

【用法】上为末,半夏膏为丸,如稍硬,添姜汁,如梧桐子大。每服七丸,一日三次,桑柳条各□□,最上等银器内煎汤送下。

【主治】年深膈气翻胃,饮食之物至晚皆吐出,悉皆生存不化,膈上常有痰涎,时时呕血,胸中多酸水,吐清水,无时,夜吐则至晚,日渐羸瘦,腹中痛楚,时腹冷滑,或即闭结。

【宜忌】忌诸毒物。惟可食油、猪胰脾、软饭。

58057　茱萸丸　《圣济总录》(文瑞楼本)卷四十六。即原书人卫本"吴茱萸丸"。见该条。

58058　茱萸丸

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】吴茱萸(汤洗,焙干,炒)　诃梨勒皮　丁香　草豆蔻(去皮)　芎䓖　防风(去叉)各一分　石硫黄(研)一钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心陈米汤送下。

【主治】大肠虚冷,饮食减少,非时飧泄。

58059　茱萸丸

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】茱萸(汤浸七遍,焙干,微炒)　麝香(研)各一两　当归(切,焙)半两

【用法】上为末,入麝香同研匀,炼蜜为丸,如小豆大。每服二十丸,热酒送下,不拘时候。

【主治】胁胸气妨闷疼痛。

58060　茱萸丸

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】吴茱萸(汤浸,焙,炒)　干姜(炮)

赤石脂　陈曲(炒)　当归(切，焙)各三分　厚朴(去粗皮，生姜汁炙，锉)一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心、食前米饮送下，一日三次。

【主治】脾气不足，鹜溏青黑。

58061　**茱萸丸**

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】吴茱萸(汤浸，焙干，炒)　干姜(炮)　诃梨勒皮各半两　胡粉　白矾灰各一分

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前米饮送下。

【主治】下痢脓血不止。

58062　**茱萸丸**

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】食茱萸(微炒)三分　干姜(炮裂)　大黄(锉，炒)　甘草(炙)　附子(炮裂，去皮脐)　麦曲(炒)各半两　厚朴(去粗皮，生姜汁炙，锉)　人参　枳实(去瓤，麸炒)各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、日午、夜卧温酒送下。

【功用】温脾进食。

【主治】虚劳不思饮食，胸背支满，脏气逆，羸瘦，食不消化。

58063　**茱萸丸**

【方源】《圣济总录》(人卫本)卷一六五。

【组成】吴茱萸一两(黑豆汁浸，炒干)　黄连(去须)一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前煎芍药汤送下。

【主治】产后赤白痢日久，脐腹冷疼。

【备考】本方方名，原书文瑞楼本作“吴茱萸丸”。

58064　**茱萸丸**

【方源】《圣济总录》卷一八七。

【组成】吴茱萸(汤洗七遍，焙)一两半　硇砂半两(用醋浆水淹搅五七百度，用纸滤过，瓷器内慢火逼令干)　木香一两　京三棱三两(炮熟，捣)　青橘皮(汤浸，去白)一两半　干姜(炮裂)一两半　附子(炮裂，去皮脐)一两半　半夏(汤洗十遍，微炒)一两半　巴戟天(去心，酒浸一宿)一两　茴香子一两(微炒)　硫黄一两(甘草水洒研七日)

【用法】上为末，先用硫黄末，以精羊肉十五两细切，拌和令匀，淹一宿，便用好醋一升半，煎汁尽，醋刮在臼内，后将药末并硇砂同入皿内，杵一千下，为丸如梧桐子大。每服十丸，空心盐汤送下。

【功用】补虚，下气去痰。

58065　**茱萸丸**

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】苁蓉(洗切，酒浸，焙)　五味子(炒)　山茱萸　干山药各等分

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心饮送下。

【主治】消中，肾气败。其人素渴饮水，一旦不饮不渴，小便日夜数十行，气乏肉消脱。

58066　**茱萸丸**

《三因》卷三。即《千金》卷七引苏长史方“茱萸汤”改为丸剂。见该条。

58067　**茱萸丸**。

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】猪脏头一个　吴茱萸三两(汤泡七次，炒)

【用法】上将吴茱萸纳在猪脏内，两头紧紧系定，用好酒三升煮令极烂，入沙盆内研细，为丸，如绿豆大。每服三二十丸，米饮送下。

【主治】小儿脾脏虚，泄泻不止。

58068　**茱萸丸**

【方源】方出《丹溪心法》卷三，名见《医方类聚》卷一九七引《新效方》。

【异名】咽醋丸(《医学纲目》卷二十二)、茱连丸(《医学正传》卷三)。

【组成】吴茱萸(去枝梗，汤煮少时，浸半日，晒干)　陈皮　黄芩各半两(陈壁土炒，去土用)　黄连一两(陈壁土炒)　苍术七钱半(米泔浸)

【用法】上为末，神曲糊丸，如绿豆大。每服

三五十丸，白术汤送下。

【主治】①《医方类聚》引《新效方》：吞酸。②《东医宝鉴·杂病篇》：郁积，吞酸吐酸。

【方论选录】《医方考》：胃中湿热，抑遏肝火，令人吞酸者，此方主之。湿郁则热，热郁则酸，故夏月饮食之类，以物覆盲之，其味必酸。曰肝火者，《洪范》曰：木曰曲直，曲直作酸，故责之肝也。是方也，连、芩治热，热去则不吐酸；苍术燥湿，湿除则不生热；陈皮理气，气行则热不郁；吴茱萸辛热而气臊，辛热可使就燥，气臊可使就肝，故能引连、芩入肝而泻肝火，此从治之义也。他如火门左金丸亦良。

58069 茱萸丸

【方源】《丹溪手镜》卷四。

【组成】六一散一料加吴茱萸一两（煮过）

【主治】湿热滞气，吞酸，自利。

【备考】本方改为散剂，名"茱萸六一散"（见《医方考》）。

58070 茱萸丸

【方源】《普济方》卷六十七。

【组成】吴茱萸（汤洗，焙干，炒） 夜明沙（炒）各一分

【用法】上为末，以蟾酥为丸，如麻子大。绵裹一丸，于痛处咬，勿咽津。

【主治】牙齿风䘌。

58071 茱萸丸

《普济方》卷二〇八。即《杨氏家藏方》卷七"茱萸汤"改为丸剂。见该条。

58072 茱萸丸

【方源】《普济方》卷三九七。

【组成】吴茱萸 黄连一两（去须）

【用法】上药同炒香熟，各分为二，加甘草同为末，各以酸醋为丸。赤白痢二药俱用，赤痢多用茱萸，并米汤送下。

【主治】冷热不调，赤白五色，诸般痢，腹痛后重。

58073 茱萸丸

【方源】《医方类聚》卷二一二引《仙传济阴方》。

【组成】吴茱萸一两（盐汤洗） 苍术一两 陈皮（去白） 麦芽 肉桂 神曲各半两

【用法】上药水煮面糊为丸，米饮送下。

【主治】妇人有积饮痰证，在脾胃间，时时酸心或吐水。

58074 茱萸汤

《金匮》卷中。为《伤寒论》"吴茱萸汤"之异名。见该条。

58075 茱萸汤

【方源】《外台》卷七引《小品方》。

【异名】当归汤（《千金》卷十三）。

【组成】吴茱萸二两 甘草（炙） 人参 桂心各一两 生姜五两 半夏一升 小麦一升 当归二两

【用法】上切。以水一斗五升，煮取三升。每次温服一升，一日三次。

【主治】①《外台》引《小品方》：寒冷腹痛。②《千金》：产后虚冷。

【宜忌】忌海藻、菘菜、羊肉饧、生葱。

【备考】本方方名，《千金》（注文）引作"吴茱萸汤"。

58076 茱萸汤

【方源】《医心方》卷九引《小品方》。

【异名】吴茱萸汤（《千金》卷十八）。

【组成】生姜三两 半夏三两 桂心三两 吴茱萸三两 人参一两 大枣三十个 甘草一两（炙）

【用法】以水九升，煮取三升，纳白蜜五合，分三服。

【主治】胸中积冷，心下淡水，烦满汪汪，不下饮食，心胸应背欲痛。

58077 茱萸汤

【方源】《医心方》卷十一引《深师方》。

【组成】茱萸一升 黄连二两 附子一两 甘草一两 生姜三两

【用法】以水七升，煮取三升，分三服。

【主治】霍乱呕吐，水药不下。

58078 茱萸汤

【方源】《千金》卷七引苏长史方。

【异名】木瓜茱萸汤(《普济方》卷二四四)、木茱汤(《奇正方》)。

【组成】吴茱萸六升　木瓜二颗(切)

【用法】以水一斗三升,煮取三升。分三服,相去如人行十里久进一服。或吐、或汗、或利、或大热闷。

【功用】《金匮翼》引苏长史方:下气除湿泄毒。

【主治】①《千金》引苏长史方:脚气人腹,困闷欲死,腹胀。②《普济方》:脚气毒气上攻心,手足脉绝;脚气人腹,困闷欲死,腹胀喘急,风湿胳膊,腰脚不能举动。

【备考】本方方名,《医心方》引作"木瓜汤"。改为丸剂,名"茱萸丸"(见《三因》卷三)。

58079　茱萸丸

【方源】方出《千金》卷十五,名见《圣济总录》卷九十五。

【组成】吴茱萸一升　干姜　大黄　当归　桂心　芍药　甘草　芎䓖各二两　人参　细辛各一两　桃白皮一把　真朱半两　雄黄十八铢

【用法】上㕮咀。以水一斗,煮取三升,去滓,纳雄黄、真朱末,酒一升,微火煮三沸,服一升。得下即止。

【主治】①《千金》:胀满,闭不下。②《圣济总录》:腹胁胀满,关格,大小便不通。

58080　茱萸汤

【方源】《千金翼》卷十九。

【组成】吴茱萸二升　小麦　半夏(洗)各一升　生姜十五两　大枣五十枚(擘)　桂心三两　人参　黄芩　甘草(炙)各二两

【用法】上㕮咀。以水一斗二升,煮取四升,分四服,每服一升,一日二次。

【主治】风冷气,腹中虚冷,急痛,饮食不消,心满,少腹里急引痛,手足逆冷,胃中响响,干噫欲吐,吐逆短气。

58081　茱萸汤

【方源】《千金翼》卷十九。

【组成】吴茱萸二升　半夏一升(洗)　生姜一斤(切)　芍药　桂心各三两　大枣二十个(擘)　人参　黄芩　甘草(炙)各二两

【用法】上㕮咀。以水一斗二升,先煮枣极沸,乃纳诸药,煮取四升,每服八合,一日三次。

【主治】男子虚热寒冷,妇人寒劳气逆,及胸腹苦满而急绕脐腹,寒心吞酸,手足逆冷,脐四边坚,悸气踊起,胃中虚冷,口中多唾,或自口干,手足烦,苦渴湿痹,风气动作,顽痹不仁,骨节尽痛,腰背如折,恶寒,大呼即惊,多梦。

58082　茱萸汤

【方源】《外台》卷六引《广济方》。

【组成】吴茱萸一升　甘草二两(炙)　干姜二两(炮)　蓼子一把　乱发一两(烧)　桂心二两

【用法】上切。以水七升,煮取二升三合,绞去滓,分三次温服。服别相去如人行六七里。

【主治】①《外台》引《广济方》:霍乱转筋不止。②《普济方》:霍乱转筋不止,乃疼痛欲入腹者。

【宜忌】忌生葱、海藻、菘菜、生冷粘腻。

58083　茱萸汤

【方源】《普济方》卷十四引《护命方》。

【组成】山茱萸　当归(切,焙)　五味子　山芋　黄耆(锉,焙)　芎䓖各半两　生干地黄(焙)　白术各一两　独活(去芦头)　酸枣仁(微炒)各二钱　木瓜(去皮子,焙)半两

【用法】上为粗末。每服五钱,水一盏半,大枣二个,煎至八分,去滓,空心、食前温服,一日二次。

【主治】肝脏邪气,两胁胀满,筋脉拘急,痛连小腹。

58084　茱萸汤

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】吴茱萸(汤浸,焙干,炒)　桂(去粗皮)　厚朴(去粗皮,生姜汁炙)　白术　芍药(炒)　陈橘皮(汤洗,去白,焙)各半两　五味子三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加大枣二个，生姜三片，同煎至八分，去滓，空心、午时温服。

【主治】心痛，胸胁气满烦闷。

58085 **茱萸汤**

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】食茱萸(炒) 白术 干姜(炮)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，空心、午间、临卧各一次。

【主治】脾心痛兼吐水。

58086 **茱萸汤** 《圣济总录》卷七十四。即《圣惠》卷五十九"茱萸丸"改为汤剂。见该条。

58087 **茱萸汤**

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】诃梨勒皮 当归(炒，切) 黄连(去须)各二两 干姜(炮)半两 吴茱萸(汤浸，焙，炒)一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，食前温服。

【主治】脓血痢。

58088 **茱萸汤**

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】吴茱萸(汤浸，焙，炒)三分 生姜(切，焙，微炒) 豉(微炒) 桂(去粗皮)各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，酒少许，同煎七分，去滓温服。

【主治】寒疝，来去腰腹攻痛。

58089 **茱萸汤**

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】吴茱萸(汤浸，焙干，炒)半两 细辛(去苗叶) 附子(炮裂，去皮脐) 人参 白茯苓(去黑皮) 桂(去粗皮) 半夏(生姜汁制，晒干) 当归(切，焙)各一两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，加生姜一枣大(切)，大枣二个(擘破)，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】卒疝攻脐腹痛，汗出闷绝。

58090 **茱萸汤**

【方源】《圣济总录》卷一三三。

【组成】茱萸根 地榆根 蔷薇根各一两

【用法】上锉细。以水五升，煎至二升半，去滓，温洗疮，冷即止，一日洗二三次，敷以他药。

【主治】月蚀疮。

58091 **茱萸汤**

【方源】《圣济总录》卷一四九。

【组成】吴茱萸(汤洗，焙干)五两 乌梅半两 犀角屑 升麻 陈橘皮(汤浸，去白，焙)各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，加生姜二枣大(拍破)，水一盏半，煎至八分，去滓，空腹温服。日三次，夜一次。

【主治】中水毒，手足指至肘膝下冷。

58092 **茱萸汤**

【方源】《圣济总录》卷一四九。

【组成】生茱萸茎叶一握

【用法】上为细末。以水二盏，煎至一盏，去滓顿服。

【主治】射工伤人。

58093 **茱萸汤**

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】当归(洗，焙)三钱 干姜(泡)三钱 肉桂(去粗皮)二两 附子(炮，去皮脐)二两 吴茱萸一两(汤洗七次)

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盏，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】肠胃虚寒，泄泻不止。

【备考】本方改为丸剂，名"茱萸丸"(见《普济方》)。

58094 **茱萸汤**

【方源】《易简方》。

【组成】槟榔二两 橘红 茱萸 木瓜 紫苏各一两半

【用法】上㕮咀。每服四钱，加生姜十片，水煎服。

【主治】脚气上攻，中满气急，更有下元虚

冷,并尊年气虚之人,素有上壅之患,服补药不得者。

58095 **茱萸汤**

【方源】《得效》卷五。

【组成】吴茱萸(洗净)不拘多少

【用法】上用白水煮,去滓,入盐少许,通口服。

【主治】脾泄。老人肾虚,水土同化。

58096 **茱萸汤** 《普济方》卷一七一。为方出《肘后方》卷三,名见《千金》卷十七"奔气汤"之异名。见该条。

58097 **茱萸汤**

【方源】《普济方》卷三五五。

【组成】吴茱萸(汤浸,焙)三分　桂一两　细辛一两一分　当归二分　杏仁(去皮尖双仁,炒)半两

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一盏,煎七分,去滓,不拘时候服。

【主治】产后肺寒及咳嗽不已。

58098 **茱萸汤**

【方源】《普济方》卷三五六。

【组成】椒叶　橙叶　茱萸叶

【用法】浓煎汤,可下手,则和脐腹人门处皆淋洗。即刻气温,血行遂产。

【主治】妇人数日不产,下体已冷,无药甚窘。

58099 **茱萸汤**

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】吴茱萸　川椒　甘草　苍术　橘核　大茴香

【用法】河水煎数沸,入罐内熏洗。出汗。连浴四五次即愈。内以五苓散加防风、丹皮治之,外以本方煎汤熏,汗出即安。

【主治】疝气有卵翼偏坠者。

58100 **茱萸汤**

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】熟地黄　当归　白芍　川芎　吴茱萸(滚水泡)　人参各一钱

【用法】加生姜三片,大枣二个,水煎服。

【主治】妇人五旬以后,而月经血去过多,热随血去,冲任伤损,为漏为崩,腹痛寒热者。

58101 **茱萸饮**

【方源】《养老奉亲》。

【异名】茱萸粥(《医学人门》卷三)。

【组成】茱萸末二分　青粱米二合(研细)

【用法】以水二升,煎茱萸末,取一升,便下米煮作饮,空心食之,一二服尤佳。

【主治】老人冷气,心痛不止,腹胁胀满,坐卧不得。

58102 **茱萸饮**

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】吴茱萸(醋炒)二两　人参　赤茯苓(去黑皮)各三分　桑根白皮(锉)　陈橘皮(汤浸,去白,焙)　大腹(连皮锉)　大黄(锉,炒)　细辛(去苗叶)　槟榔(锉)　羌活(去头芦)　杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒)二两　蜀椒(去目并闭口者,炒出汗)三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,加生姜五片,同煎八分,去滓,空心、食前温服,一日二次,微利为度。

【主治】脚气。腿膝肿急,腰髀痛痹,心烦气喘。

58103 **茱萸饮**

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】半楂叶(即山茱萸叶)

【用法】水洗净,捣烂,滤汁一碗,同白酒各半,温服。以小便白为度。

【主治】黄疸痧。

58104 **茱萸酒** 《普济方》卷三五一。为《千金翼》卷六"单行茱萸酒"之异名。见该条。

58105 **茱萸散**

【方源】《千金》卷七。

【组成】吴茱萸　干姜　白蔹　牡荆　附子　天雄　狗脊　干漆　薯蓣　秦艽　防风各半两

【用法】上药治下筛。每服方寸匕,一日三次,先食服,药入肌肤中淫淫然,三日知,一月愈。

【主治】冷风脚跛偏枯，半身不遂，昼夜呻吟，医所不治。

58106 **茱萸散**

【方源】《医方类聚》卷九十六引《千金月令》。

【组成】炼成朴消一斤　茱萸末八两

【用法】上为散，以不津瓷器贮之。凡患服一匙匕。

【主治】脚气，心闷不通及干霍乱。

58107 **茱萸散**

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】吴茱萸（汤洗七遍，炒干）　干姜（炮裂）各等分

【用法】上为散。每服三钱匕，空心热酒调下。

【主治】胃气虚冷，不能饮食，食已即吐酸水。

58108 **茱萸散**

【方源】《圣济总录》卷一五二。

【组成】吴茱萸（汤洗，焙，炒）半两　乌贼鱼骨（去甲，炙）　芍药（锉，炒）　桑寄生（炙黄）　柏叶（炙）各一两　禹余粮（煅、醋淬七遍）　桑耳（炙）各一两半　生干地黄二两

【用法】上为散。每服二钱匕，空心清米饮调下。

【主治】妇人白带下。

58109 **茱萸散**

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】吴茱萸（拣净）半两（用盐二钱，水一盏煮之，如此换水煮十四次，各至水尽，遍数足，晒干，炒令紫黑色）　甘草一两半（炙）　陈皮（去白）二两（炒令香熟）

【用法】上为细末。每服一钱或半钱，沸汤点下，不拘时候。

【主治】脾胃弱，食不消，泄泻无度。

58110 **茱萸散**

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】茱萸（去浮者）　地龙（去土，炙）各等分（炒）

【用法】上为末。米醋入生曲调涂足心。

【主治】口疮及咽痛。

58111 **茱萸散**

【方源】方出《得效》卷十一，名见《普济方》卷三六一。

【组成】硫黄　茱萸各半两

【用法】上为末。研大蒜薄涂其腹，仍以蛇床子熏子。

【主治】儿生七日肾缩，乃初生受寒气。

58112 **茱萸散**

【方源】《玉机微义》卷十。

【组成】吴茱萸二钱半　川芎半两　木通四钱　半夏一钱

【用法】上㕮咀。每服三四钱，入葱煎服。

【主治】小肠虚热或酒后频吃冷水等物，其病脐下结块，连外肾俱肿者。

58113 **茱萸散**

【方源】《普济方》卷九十七。

【组成】山茱萸一两半　天雄（炮裂，去皮脐）一两半　麻黄（去根节）　川椒（去目及闭口者，微炒去汗）　萆薢（锉）　桂心　川乌头（炮裂，去皮脐）　防风（去芦头）　甘草（炙微赤，锉）　牛膝（去苗）　狗脊　莽草（微炙）　踯躅花（酒拌，炒令干）　石南各一两

【用法】上为散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】中风。偏枯不遂，筋脉拘急，肢节疼痛。

58114 **茱萸散**

【方源】《普济方》卷二八四。

【组成】茱萸（微炒）

【用法】上为细末。鸡子清调，涂病处。轻者宜用此方。若受重者，既消而再来。

【主治】痈疽结未成，并气凝滞，肿结成块者。

58115 **茱萸散**

《婴童百问》卷四。为原书同卷“吴茱萸散”之异名。见该条。

58116 **茱萸粥**

《医学入门》卷三。为《养老奉亲》"茱萸饮"之异名。见该条。

58117　**茱萸煎**

【方源】《外台》卷七引《范汪方》。

【组成】吴茱萸一升　蜀椒五升　甘草二两(炙)　干地黄一斤

【用法】上药以清酒三升渍三宿,绞取汁,铜器中煎令沸;麦门冬五升(去心),干漆一斤,纳煎中,色黄绞去之;纳石斛五两,阿胶一斤,白蜜六升,凡九味以汤煎令可丸。取如枣大含,稍稍咽之,一日三次,甚者五六次。服药五日愈,当下癥。

【主治】心下切痛引背,胸下蓄气,胃中有宿食。

【宜忌】忌海藻、菘菜、芜荑。

【加减】膝胫重痛者,加石斛;少气,加麦门冬。

58118　**茱萸煎**

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】吴茱萸　干姜各半两　桂一两　白术二两　人参　陈皮　川椒　甘草　当归　桔梗各一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸至十五丸,米饮送下。

【主治】心痛。

58119　**茱萸膏**

【方源】《圣济总录》卷一四九。

【组成】茱萸东行根(洗,锉)

【用法】上为末。醋调敷之。

【功用】《赤水玄珠》:引热下行。

【主治】①《圣济总录》:蠼螋尿疮,汁出疼痛。②《赤水玄珠》:心脾热,唇口生疮,重舌、木舌。

58120　**茱萸膏**

【方源】《三因》卷八。

【组成】吴茱萸(汤洗)一两三分　白术五两一分　猪膏五两　宿姜汁八两

【用法】捣茱萸、白术二味为末,纳姜汁、猪膏中,煎成胶饴。每服一大匙,食前温酒调下。

【主治】脾劳虚寒,气胀咽满,食不下通,噫宿食臭。

58121　**茱萸膏**

《普济方》卷二十一。为《千金》卷十五"消食膏酒"之异名。见该条。

58122　**茱萸膏**

《普济方》卷二九九。为《圣济总录》卷一一七"神圣膏"之异名。见该条。

58123　**茱萸子丸**

【方源】《元和纪用经》。

【异名】细辛茱萸丸。

【组成】细辛　吴茱萸　干姜各半两　当归　防风各一两　芍药二两　桂心半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十五丸,空腹熟水送下。

【主治】风入腹,切痛烦冤。

58124　**茱萸根丸**

【方源】《圣济总录》卷九十九。

【组成】东行吴茱萸根(去土,锉)三两　蜡三两　鸡子五枚(去壳取黄用)　粳米一盏

【用法】上味除蜡并鸡子外,各为末,先以铜锅内煎蜡熔,即下茱萸根末、米粉、鸡子黄,煎令可丸,即丸如小豆大。每服五十丸,早晨煎粟米饮送下;小儿服二十丸。虫出即愈。

【主治】肝劳,生长虫为病,恐畏不安,眼中赤。

58125　**茱萸根汤**

《圣济总录》卷八十六。为《千金》卷十八"茱萸根下虫方"之异名。见该条。

58126　**茱萸根散**

【方源】《医心方》卷十七引《令李方》。

【组成】茱萸根　蔷薇根各二两

【用法】上药治下筛。生盐作汤洗创,以散粉,一日三次。

【主治】月蚀疮。

58127　**茱萸浴汤**

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【异名】吴茱浴汤(《医略六书》卷二十六)。

【组成】杜仲(炒去丝)　吴茱萸(汤洗七

次） 蛇床子 丁香皮 五味子各一两 木香半两 丁香半两

【用法】上锉，如麻豆大。每用半两，以生绢袋盛之，水三大碗，煎数沸，乘热熏下部，通手淋洗，早、晚两次熏洗。

【主治】下焦虚冷，脐腹疼痛，带下五色，月水崩漏，淋沥不断。

【方论选录】《济阴纲目》：夫医者，意也。凡风寒由外而袭内，以至下焦生寒证者，以此方熏而散之，所谓摩之、浴之、开之、发之也。此外治法，于上热下寒，难服温补之药者宜之。

58128 茱萸煎丸

《医方类聚》卷一三八。即《圣惠》卷五十九"吴茱萸煎丸"。见该条。

58129 茱萸人参丸

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】吴茱萸（炒） 人参 芎䓖 桔梗（炒） 枳实（炒） 甘草（炙，锉）各一两 干姜（炮） 陈曲（炒）各四两 附子（炮裂，去皮脐）二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前米饮送下。

【主治】冷痢久不愈，脐腹疠痛，时下白脓，食物不消。

58130 茱萸人参汤

《三因》卷十一。为《伤寒论》"吴茱萸汤"之异名。见该条。

58131 茱萸已寒丸

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】青橘皮（去白）二两 陈橘皮（去白）二两 附子（炮，去皮脐） 川乌头（炮，去皮脐尖） 干姜（炮） 高良姜 吴茱萸（炒黄） 肉桂（去粗皮）各一两

【用法】上为细末，醋煮曲糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，食前温米饮送下。

【主治】脏腑久弱，肠胃宿寒，泄泻频并。

58132 茱萸木瓜丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】大宣木瓜一个（去瓤，留顶盖，入吴茱萸填满，用竹签札定顶盖，入瓷瓯内，上甑蒸，候木瓜熟烂）

【用法】将茱萸研为末，却将木瓜搜和为丸，如绿豆大，焙干。每服四五十丸，木瓜汤送下，不拘时候。

【主治】脚气，腿膝疼痛，或肿或不肿，及脚气上冲，步履艰辛者。

58133 茱萸木瓜汤

【方源】《准绳·类方》卷四。

【组成】吴茱萸半两 干木瓜一两 槟榔二两

【用法】上㕮咀。每服八钱，以水一中盏半，加生姜五片，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】脚气冲心，闷乱不识人，手足脉欲绝。

58134 茱萸内消丸

【方源】《局方》卷五。

【组成】吴茱萸（汤洗七次，焙） 陈皮（去白） 山药（焙） 川楝（蒸，去皮核） 山茱萸（去核） 青皮（去白） 茴香（炒） 马蔺花（醋炙） 肉桂（去粗皮，不见火）各二两 木香（不见火）一两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，空心温酒、盐汤任下。

【功用】补虚消疝，温养肾经。

【主治】肾与膀胱经虚，为邪气所搏，结成寒疝，伏留不去，脐腹疠刺，小肠气痛，奔豚痃癖，疼不可忍，阴核偏大，肤囊痈肿，结硬牵急，重大滋长，瘙痒疼痛，时出黄水，疮疡，腿沉重，足胫肿满，行步艰难。

【备考】《保命歌括》有破故纸，无山药。

58135 茱萸内消丸

【方源】《局方》卷八（续添诸局经验秘方）。

【组成】山茱萸（捣，去核，取肉，微炒） 桔梗（水浸一伏时滤出，慢火炒干为度） 白蒺藜（炒去刺） 川乌（炮，去皮脐） 肉桂（去粗皮） 茴香（舶上者，淘去沙后，焙炒） 食茱萸 吴茱萸（微炒） 青皮（去白）各二两 海

藻(洗,焙)　五味子(净拣)　大腹皮(酒洗,焙)　玄胡索各二两半　桃仁(去皮尖及双仁,麸炒,别研)　枳实(去瓤,麸炒)　陈皮(去白)各一两　川楝子(锉,炒)三两　木香一两半

【用法】上为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前温酒送下。

【主治】肾经虚弱,膀胱为邪气所搏,结成寒疝阴癞,偏大上攻,脐腹疼痛,肤囊肿胀或生疮疡,时出黄水,腰脚沉重,足胫肿满,行步艰辛,服之内消,不动脏腑。

58136　茱萸内消丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】川楝子八两(每个破作四块,二两用巴豆三十粒,去壳,同炒焦,候巴豆黑,去巴豆不用;二两用斑蝥五十个,去头足翅,同炒,候斑蝥焦,去斑蝥不用;二两用海金沙半两同炒,候海金沙紫色,去海金沙不用;二两用黑牵牛一两同炒,连黑牵牛用)　山茱萸(去核)　吴茱萸(汤泡七次,炒)　石茱萸　胡芦巴(炒)　破故纸(炒)　舶上茴香(炒)　乌药各一两

【用法】上为细末,水煮面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心、食前温酒或盐汤送下。

【主治】膀胱小肠疝气,木肾偏坠。

58137　茱萸内消丸

【方源】《得效》卷九。

【组成】川楝三两(锉,炒)　大腹皮　五味子　海藻(洗)　玄胡索各二两半　茴香(炒)　桂心　川乌(炮,去皮脐)　吴茱萸　食茱萸　桃仁(麸炒,别研)各一两　木香一两半　桔梗　青皮　山茱萸各二两

【用法】上为末,酒糊为丸,如梧桐子大,每服三十丸,温酒送下。

【主治】小儿阴癞偏大,上攻脐腹,肤囊肿胀或生疮疡,时出黄水,腰腿沉重,足胫肿满,行步艰辛。

58138　茱萸内消丸

【方源】《医方类聚》卷九十引《居家必用》。

【组成】山茱萸　食茱萸　吴茱萸　茴香(炒)　川楝子(去核)　青皮(去瓤)　马蔺花各一两　黑牵牛(头末)七两

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服三五十丸,盐汤送下。久年不愈者,五七服可除根。

【主治】一切小肠疝气。

58139　茱萸内消丸

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】山茱萸(去核)　食茱萸　吴茱萸　橘红　马蔺花　山药　肉桂　川楝肉　青皮(去白)各一两　木香五钱　茴香　橘核各一两

【用法】上为末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,用温酒或盐汤送下。

【主治】寒疝疼痛,阴囊冷湿或痒。

58140　茱萸内消丸

【方源】《幼幼集成》卷四。

【组成】吴茱萸(醋浸一宿,焙干,炒过)　青化桂(去皮)　净枣皮(蒸,去核,捣)　玄胡索(醋炒)　大茴香(盐炒)　化橘红(炒)　杭青皮(醋炒)各一两　桃仁(炒)　白蒺藜(炒)　南木香屑各五钱

【用法】上为细末,酒煮面糊为丸,如龙眼核大。每服一丸,淡盐汤送下。

【主治】寒湿所袭,留伏作痛,癞疝偏坠。

58141　茱萸内消散　《杂病源流犀烛》卷二十八。为原书同卷"吴萸内消散"之异名。见该条。

58142　茱萸内消丸

【方源】《幼科指南》卷上。

【组成】山茱萸肉五钱　川乌(捣去皮,炒)　桔梗各五钱　小茴(炒)　白蒺藜(炒去刺)　陈皮各五钱　青皮三钱　川楝(去皮)五钱　木香二钱　枳实(炒)一钱　桃仁三钱　吴茱萸(炒)　玄胡索(炒)各五钱　五味子一钱

【用法】上为细末,酒糊为丸,如粟米大。茴香汤送下;久不愈,淡盐汤送下。

【主治】小儿偏坠，膀胱疝气内吊，啼哭不止。

58143 **茱萸乌头汤**

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】吴茱萸　川乌　细辛　当归　良姜各五分　官桂四分　干姜五分

【用法】上㕮咀。水煎服，空心服。

【主治】厥疝。腹中冷痛，积气上逆，致令阴冷于肢膜。

58144 **茱萸六一散**

《医方考》卷四。即《丹溪手镜》卷四"茱萸丸"改为散剂。见该条。

58145 **茱萸六一散**

【方源】《医方集解》。

【异名】吴萸六一散(《成方切用》卷七)。

【组成】六一散去甘草，加吴茱萸一两。

【主治】湿热吞酸。

58146 **茱萸六一散**

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】辰砂一钱　桂府滑石(水飞过)六两　甘草四钱　吴茱萸一两

【用法】上为细末。清水调下。

【主治】湿热吞酸，白痢。

58147 **茱萸四物汤**

【方源】《医统》卷八十三。

【组成】吴茱萸(泡)　当归　川芎　芍药　生地黄(姜炒)各等分

【用法】上㕮咀。每服半两，水一盏半，煎七分，温服。

【主治】血嘈吞酸，吐酸水。

58148 **茱萸四逆汤**

【方源】《医心方》卷十一引《小品方》。

【组成】吴茱萸二升　当归三两　芍药二两　桂心四两　细辛二两　生姜半斤　通草二两　甘草二两

【用法】以水四升，清酒四升，合煮取三升，分四服。

【主治】霍乱多寒，手足寒厥，脉绝者。

58149 **茱萸四逆汤**

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【异名】四逆加吴茱萸汤(《中国医学大辞典》)。

【组成】茱萸(汤泡)　附子(泡)　干姜各二钱　炙甘草一钱半

【用法】水煎，入姜汁温服。

【主治】①《伤寒全生集》：厥阴伤寒，呕吐涎沫及吐利逆冷，烦躁脉沉。②《医统》：厥阴中寒，小腹痛甚。

【加减】胃虚寒，加丁香、人参、白术、陈皮。

58150 **茱萸生姜汤**

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】吴茱萸(汤洗，焙干，微炒)　生姜(切，焙)　各一两　人参三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，大枣二个(擘破)，煎至一盏，去滓热服。

【主治】九种心痛。

58151 **茱萸半夏丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】天南星(炮)　白术(炒)　白茯苓(去皮)　吴茱萸(汤泡七次，炒)　五味子(去枝)　诃子肉各一两　木香一分(不见火)

【用法】上为细末，用半夏末以生姜自然汁打糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【主治】痰饮。

58152 **茱萸半夏汤**

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】吴茱萸(汤泡七次，炒)　半夏(汤泡七次)　附子(生，去皮脐)　橘红各三两　木香三钱(不见火)　五味子半两　甘草一分(炙)

【用法】上为末。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，煎至七分，去滓热服，不拘时候。

【主治】痰饮。

58153 **茱萸当归汤**

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】当归　吴茱萸　人参　川芎　茯苓　桔梗各三钱　芍药　厚朴各二钱

【用法】每服五钱，以水二合，煎取一合，温服。气下即安。

【主治】冷气忽中，心腹痛如刀刺。

58154 **茱萸如圣丸**

【方源】《普济方》卷二一〇引《卫生宝鉴》。

【组成】吴茱萸一两(去梗)　黄连七钱半(微炒)　罂粟壳(去蒂瓤，净用)一两(火炙)　诃子(去核)半两　川厚朴(去皮)半两(姜制，微炒)　白芍药半两　肉豆蔻半两(用湿纸裹，火煨熟)

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，米饮送下；如白痢，干姜汤送下；赤痢，甘草汤送下；赤白痢，甘草干姜汤送下，俱食前服。

【主治】脾寒脏寒，腹疼，肠滑下痢。

58155 **茱萸陈皮丸**

【方源】《济阳纲目》卷十八。

【组成】苍术(炒)七钱半　吴茱萸(煮少时，晒)　陈皮　黄连　黄芩(二味俱用陈壁土炒)

【用法】上为末，神曲煮糊为丸，如绿豆大。每服三十五丸，生姜汤送下。

【主治】呕吐。

58156 **茱萸附桂汤**

【方源】《医醇賸义》卷一。

【组成】吴萸七分　附子二钱　肉桂八分　当归三钱　白芍一钱五分　白术一钱　木香六分　乌药一钱　大枣二个　生姜三片

【主治】中寒，肝气厥逆，胁下及腹中绞痛，下利，手足厥冷，指爪皆青。

58157 **茱萸矾石丸**

《普济方》卷三十六引《卫生家宝》。为《圣济总录》卷四十七“吴茱萸丸”之异名。见该条。

58158 **茱萸虻虫汤**

【方源】《千金》卷四。

【异名】吴茱萸汤(《圣济总录》卷一五一)。

【组成】吴茱萸三升　虻虫　水蛭　䗪虫　牡丹各一两　生姜一斤　小麦　半夏各一升　大枣二十个　桃仁五十枚　人参　牛膝各三两　桂心六两　甘草一两半　芍药二两

【用法】上㕮咀。以酒一斗，水二斗，煮取一斗，去滓，适寒温，每服一升，一日三次。不能饮酒人，以水代之，汤欲成乃纳诸虫，不耐药者，饮七合。

【主治】久寒，月经不利，或多或少。

58159 **茱萸食盐汤**

《杏苑》卷四。为《救急选方》引《卫生家宝》“四片金”之异名。见该条。

58160 **茱萸根浸酒**

《圣惠》卷二十六。为《外台》卷十六引《删繁方》“茱萸根下虫酒”之异名。见该条。

58161 **茱萸健脾丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】吴茱萸(汤泡七次，炒)　川厚朴(去粗皮，锉，姜汁制炒)各二两　神曲(炒)　白术各一两半(炒)　干姜二两半(泡洗)　麦蘖(炒)　附子(炮，去皮脐)各一两　肉豆蔻一两半(面裹煨)

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，食前米饮送下。

【主治】脾气不和，脏腑或泄或秘，饮食入胃，频欲便利。

58162 **茱萸消石汤**

【方源】方出《肘后方》卷四，名见《千金》卷十六。

【组成】吴茱萸八升　消石一升　生姜一斤

【用法】以酒五升，合煮取四升。每服一升，不痛者止，勿再服。下后好将养之。

【主治】腹中冷癖，水谷阴结，心下停痰，两胁痞满，按之鸣转，逆害饮食。

58163 **茱萸黄耆丸**

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】黄耆　山茱萸　人参　五味子各三分　熟干地黄　鸡膍胵　肉苁蓉　牛膝　补骨脂　鹿茸各一两　麦门冬二两　地骨皮　白茯苓　玄参各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】消肾。心神虚烦，小便无度，四肢羸瘦，不思饮食，唇舌干燥，脚膝乏力。

58164 **茱萸猪肚丸**

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】吴茱萸（汤洗，焙，炒）一两半　食茱萸一两　山茱萸一两　附子（炮裂，去皮脐）　干姜（炮）　硫黄（研）　陈橘皮（汤浸，去白，焙）各半两　青橘皮（汤浸，去白，焙）　禹余粮（炭火煅赤）各一两

【用法】上为末，以生猪肚一枚，先将药末用醋拌和令匀，入猪肚内缝合，用水一斗，以文武火煮烂，沙盆内一处研令得所，为丸如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前盐汤送下；温酒亦得。

【主治】虚劳心腹撮痛，肌体羸瘦。

58165 **茱萸鹿茸丸**

【方源】《百一》卷十八。

【组成】吴茱萸（汤洗三次）　附子（炮裂，去皮脐）　干姜　肉豆蔻（面裹煨）　白茯苓　黑龙骨（炭火三斤，烧通赤经宿，研细末，水飞）各半两　杜仲（锉碎，酒浸，炒断丝）　五味子　苁蓉（酒浸一宿）　鹿茸（削去皮毛，劈开，涂酥炙）　赤石脂（粘舌者）各一两　熟干地黄一两半

【用法】上为细末，煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸至七十丸，空心、食前热米饮送下。一二月血气已安，去龙骨加沉香半两，可以常服。

【功用】补气固血。

【主治】本脏因虚生寒，月经行多，或来不及期，腹痛怯风，脏腑不和。

58166 **茱萸断下丸**

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】吴茱萸二两半（汤洗，炒）　诃子一分（去核）　赤石脂一分　缩砂仁　肉豆蔻　干姜（炮）　龙骨　人参各一分

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心米饮送下，一日三次。

【主治】脾胃气虚弱，脏腑不调，下泻不止，日夜无度，全不饮食，内积久虚，腹中疼痛，羸瘦气弱。

58167 **茱萸断下丸**

【方源】《百一》卷六。

【组成】艾叶半两（炒）　缩砂仁　附子（炮，去皮脐）　肉豆蔻各一分　吴茱萸二两半（炒）　赤石脂　川姜各半两

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，食前米饮送下。

【主治】脏寒腹痛，泄泻不止。

【临证举例】①久泻　《百一》：赵从简通判，甲辰年丁母忧，食素之久，苦泻不止，日七八行，首尾几年，每服它药不过一二日复作，得此方而愈，后数年间遇泻服之又效。②久泻　《产科发蒙》：新石街里正某妻，年三十许，日溏泄六七行，既五阅月尚不愈。医与参苓白术散、附子理中汤、四逆汤等并不效。形肉羸脱，不能起床，既在死法中。友人橘尚贤劝余诊之，气口脉沉细稍有神，乃以茱萸断下丸料作汤，每服四神丸五十粒，用之六七日，泻利减其半，十余日而大便始见粪。调理五十余日而平复。

58168 **茱萸根下虫方**

【方源】《千金》卷十八。

【异名】吴萸根汤（《慎柔五书》卷四）、茱萸根汤（《圣济总录》卷八十六）。

【组成】东引吴茱萸根（大者）一尺　大麻子八升　橘皮二两

【用法】上㕮咀。以水煎服，临时量之。

【主治】脾劳热，有白虫在脾中为病，令人好呕。

58169 **茱萸根下虫酒**

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【异名】茱萸根浸酒（《圣惠》卷二十六）、吴茱萸酒（《圣惠》卷五十七）。

【组成】东行茱萸根（大者）一尺　大麻子八升　橘皮二两（切）

【用法】上锉茱萸根，捣麻子，并和以酒一斗，渍一宿，微火上薄暖之，三上三下，绞去滓，平旦空腹为一服取尽，虫便下出，或死或半烂，或下黄汁。

【主治】脾劳热，有白虫在脾中为病，令人好呕。

58170 **茱萸泽泻乌头桂枝汤**

【方源】《医学金针》卷四。

【异名】乌头桂枝加味汤(《医学摘粹》卷二)。

【组成】吴茱萸(泡)　泽泻　乌头(泡)　桂枝　白芍　生姜各三钱　甘草二钱　大枣四个

【用法】水煎，温服。其壅肿偏坠者，用此药汤热洗之，或用药末盛带中热熨之，日作数次，令其囊消而止。

【主治】①《医学金针》：癀疝。②《医学摘粹》：寒疝腹中痛，逆冷，手足不仁者。

荞

58171 **荞麦粉**

【方源】《痘疹心法》卷二十三。

【异名】荞麦散(《景岳全书》卷六十三)。

【组成】荞麦

【用法】磨取细面。痘疮破者以此敷之，溃烂者以此遍扑之，绢袋盛扑，以此衬卧尤佳。

【主治】痘疹溃烂，脓汁淋漓痛疼者。

58172 **荞麦散**

《景岳全书》卷六十三。为《痘疹心法》卷二十三“荞麦粉”之异名。见该条。

58173 **荞脂丸**

【方源】《经验各种秘方辑要》。

【组成】荞麦五升(海去灰，晒，磨，筛去粗皮，只取净面)　画边胭脂二两(此系苏木、茜草、红花、乌梅煎染绵茧而成)

【用法】宜将画边胭脂煎脓汁，捣荞麦为丸，如梧桐子大。每服五钱，早晨用开水送下。

【主治】逆经痛。凡闺女在室，行经并无疼痛，及出嫁后忽患经痛，服药罔效。此乃新婚不知禁忌，或经将来，或行经未净，遂再交媾，震动血海，损及冲任，以致瘀滞凝结，月逢行经，断难流畅，是以作痛。

【宜忌】忌食猪肝、羊血、糟醋等物。

【方论选录】荞麦能逐脏腑之瘀滞，兼补冲任脉络；画边胭脂，取其湿润之气，威而不猛，恐防行血逐瘀过峻，加以酸味制之。

茯

58174 **茯归煎**

【方源】《玉案》卷五。

【组成】茯苓　当归　麦门冬　黄芩各二钱　淡竹叶二十片

【用法】加灯心三十茎。水煎，不拘时候服。

【主治】妊娠心惊胆怯，终日烦闷。

58175 **茯苓丸**

【方源】《千金》卷二引《肘后方》。

【组成】茯苓　人参　桂心(熬)　甘草　枳实各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，一日三次。先服半夏茯苓汤二剂，后可将服此方。

【主治】妊娠阻病，患心中烦闷，头眩重，憎闻饮食气，便呕逆吐闷颠倒，四肢垂弱，不自胜持。

58176 **茯苓丸**

【方源】《医心方》卷二十二引《小品方》。

【异名】茯苓煎(《鸡峰》卷十五)。

【组成】茯苓一两　人参二两　桂肉二两　干姜二两　半夏二两　橘皮一两　白术二两　枳实二两　葛根屑一两　甘草二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，一日三次。先服半夏茯苓汤二剂，后服本方。

【功用】《局方》：消痰水，令能食，强力养胎。

【主治】妊身阻病，患心中烦闷，头重眩目，憎闻饭气，便呕逆吐闷颠倒，四肢委热，不能胜持。

【宜忌】《妇人良方》：忌海藻、菘菜、羊肉、饧糖、桃、李、雀肉、酢。

【方论选录】《千金方衍义》：此方合理中、六君、枳术、桂苓等汤，统以健脾运痰为务，妙用尤在葛根一味，鼓舞胃中清阳之气，生津止呕，不致潴积汪洋，七味白术散之发源本此，又须先服半夏茯苓汤者，仗赖细辛以搜邪散结，地黄、芎、芍以保护胎息也。

58177 **茯苓丸**

【方源】《外台》卷六引《删繁方》。

【组成】茯苓八分 甘草七分（炙） 杏仁五十枚 人参七分 厚朴五分（炙） 干姜七分 黄耆六分 桂心四分 当归八分 芎䓖五分 干地黄八分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。初服二十丸，加至三十丸，清白饮送下，一日二次。

【主治】下焦虚寒损，腹中瘀血，令人喜忘，不欲闻人声，胸中气塞而短气。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱、酢物、芜荑。

【方论选录】《千金方衍义》：下焦真阳亏损，则胸中大气不布，而致血涩不调，瘀滞腹内，故需辛温攻补兼施，方克有济。盖参、耆、甘草不得厚朴、杏仁之宣散则滞而不行；芎、归、地黄不得姜、桂之破结，则瘀而不化；茯苓一味，不独治蓄血喜忘，并守五脏正气也。

58178 **茯苓丸**

【方源】《千金》卷二十一引《古今录验》。

【异名】茯苓煎（《鸡峰》卷十九）。

【组成】茯苓 白术 椒目各四分 木防己 葶苈 泽泻各五分 甘遂十一分 赤小豆 前胡 芫花 桂心各二分 芒消七分（别研）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。一日五丸，稍加，以知为度，蜜汤送下。

【主治】①《千金》引《古今录验》：水肿。②《鸡峰》：支饮上气，黄疸及脚气、消渴后成石水，腹胁坚胀，足胫浮肿，上气不得卧，口干，颈脉动，腹胀间冷，大小便不利。

【方论选录】《千金方衍义》：丸中芫花、甘遂、葶苈、芒消、椒目、防己兼走二便；佐以茯苓、白术、桂心、泽泻、前胡、赤小豆利水下气之味，深得峻药缓攻之妙。

58179 **茯苓丸**

【方源】《千金》卷十。

【组成】茯苓 茵陈 干姜各一两 白术（熬） 枳实各三十铢 半夏 杏仁各十八铢 甘遂六铢 蜀椒 当归各十二铢

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，空腹服，一日三次。稍稍加，以小便利为度。

【主治】酒疸，心下纵横坚而小便赤。

【方论选录】《千金方衍义》：前凝水石散治内疸，此茯苓丸治酒疸，乃酒积渍于心下，按之纵横格指，故用蜀椒、干姜温散坚痞；枳、术、苓、半健运痰湿；杏仁、当归下气和血；甘遂、茵陈破结利水，为酒疸开辟去路也。

58180 **茯苓丸**

【方源】方出《千金》卷二十一，名见《普济方》卷一八〇。

【组成】贝母六分（一作知母） 栝楼根 茯苓各四分 铅丹一分 鸡膍胵中黄皮十四枚

【用法】上为末，每服方寸匕，一日三次。愈后常服甚佳，去铅丹，以蜜为丸，长服勿绝，以麦饮服。

【主治】渴，小便数。

58181 **茯苓丸**

【方源】《医方类聚》卷一四五引《千金月令》。

【组成】茯苓二分 菖蒲一分 远志 肉苁蓉 蛇床子 车前子各三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空腹酒送下。

【功用】补精有子，强志安心。

【宜忌】忌醋。

58182 **茯苓丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十一引《婴孺方》。

【组成】茯苓　黄连各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如大豆大。饮送下。量加。

【主治】小儿腹痛夭纠，不能哺乳。

58183　**茯苓丸**

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】白茯苓一两　牡荆子半两　天雄一两(炮裂，去皮脐)　黄耆一两(锉)　肉苁蓉一两(酒浸一宿，刮去皱皮，炙干)　薯蓣一两　巴戟一两　石长生三分　桂心一两　菟丝子一两(酒浸三日，晒干，别捣为末)　杜仲一两(去粗皮，炙微黄，锉)　牡蛎一两(烧为粉)　山茱萸一两　熟干地黄一两　泽泻三分　石斛一两半(去根，锉)　附子一两(炮裂，去皮脐)　天门冬一两半(去心，焙)　人参一两(去芦头)　防风半两(去芦头)　羌活三分　当归三分　甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【功用】丰盛体骨，光泽肌肤。

【主治】虚劳痿痹，手足厥冷，精气虚乏，骨节疼痛，头眩吐逆，腰脊强直。

58184　**茯苓丸**

【方源】《普济方》卷一一九引《指南方》。

【组成】赤茯苓四两　黄芩二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下。

【主治】四肢发热，逢风如炙如焚，此由阴阳气不调，阴气虚，阳气盛，以水少不能灭盛火，阳独活于外。

58185　**茯苓丸**

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】白茯苓(去黑皮)一两半　赤芍药　柴胡(去苗)　百合　诃黎勒皮　羚羊角(镑)　陈橘皮(汤浸，去白，焙)　防风(去叉)　菊花各一两　郁李仁(去皮，炒)一两半　大麻仁(研)四两　生干地黄(焙)三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎麦门冬汤送下。

【主治】风热攻头面虚浮，心下满闷，烦躁热渴，腰胯疼疼，咳逆咽干，小便赤涩。

58186　**茯苓丸**

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】白茯苓(去黑皮)　石斛各一两半　人参　蒺藜子(炒去角)　羚羊角(镑屑)　枳壳(去瓤，麸炒)　五加皮各一两　酸枣仁　五味子各一两半　菟丝子(酒浸一宿　别捣，焙)三两　云母粉二两　黄耆(细锉)　防风(去叉)　细辛(去苗叶)　独活(去芦头)　杜仲(去粗皮，炙，锉)一两　鹿角胶(炙燥)二两　槟榔(煨，锉)二两　天雄(炮裂，去皮脐)一枚　续断(锉，焙)二两　泽泻　当归(锉，焙)一两半　熟干地黄(焙)三两　甘草(炙)一两　肉苁蓉(酒浸，去皱皮)一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹煎枣汤送下，一日二次。

【主治】诸癞脓溃，体虚气热，荣卫不清，风鼓于脉。

58187　**茯苓丸**

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　防风(去叉)　细辛(去苗叶)　白术　附子(炮裂，去皮脐)　桂(去粗皮)各半两　紫菀(去苗土)　栝楼根各三分　泽泻半两　山茱萸　生干地黄(焙)各一分　芍药　牛膝(去苗，酒浸，切，焙)各三分　山芋一分　黄耆(锉)三两　甘草(炙)三分　半夏(汤洗去滑，炒)　独活(去芦头)各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心温酒送下。日未愈，稍加丸数。

【主治】①《圣济总录》：胞痹，少腹内痛。②《何氏济生论》：臂痛。

58188　**茯苓丸**

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】白茯苓(去黑皮)　肉豆蔻仁(炮)　人参　白术各一两　干姜(炮)一两半　桂(去粗皮)　诃黎勒(炮，去核)各半两　甘草(炙)二钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前生姜汤送下。

【主治】上气腹胀，脾胃不和，心胸满闷。

58189 **茯苓丸**

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】赤茯苓（去粗皮） 当归 黄连（去须，炒） 黄柏（去粗皮）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心米饮送下。

【主治】赤痢及赤白痢。

【加减】赤白痢，加阿胶末一两。

58190 **茯苓丸**

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】白茯苓（去黑皮）三分 陈曲（炒）一两 赤石脂三分 黄连（去须）一两 附子（炮裂，去皮脐）半两 黄柏（去粗皮） 干姜（炮） 当归（切，焙） 龙骨各三分 甘草（炙）半两 人参半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】久痢不止，脾胃虚弱，食饮不消化，腹鸣㽲痛。

58191 **茯苓丸**

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】赤茯苓（去黑皮）三分 木瓜一枚半（切） 桂（去粗皮） 木香 诃黎勒皮 吴茱萸（汤洗，焙干，炒黄） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 白术 干姜（炮） 高良姜各半两 人参 枳壳（去瓤，麸炒）各三分

【用法】上药除木瓜外，为末，先将木瓜饭上蒸熟，研如膏，次入诸药末和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心煎人参、茯苓汤送下。

【主治】脚气，心腹胀急，不思饮食，干湿霍乱，泄泻转筋。

58192 **茯苓丸**

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】白茯苓（去黑皮） 远志（去心） 防风（去叉） 人参 柏子仁（微炒，研） 牡蛎（烧令赤） 甘草（炙，锉）各半两 龙骨三分

【用法】上为末，炼蜜并同枣肉同为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹温酒送下。夜卧再服。

【主治】肝劳热，恐畏不安，精神闷怒，不能独卧，志气错越。

58193 **茯苓丸**

《圣济总录》卷八十六。为《外台》卷十六引《删繁方》“茯苓安肝定精神丸”之异名。见该条。

58194 **茯苓丸**

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】白茯苓（去黑皮）二两（食不消，多饮者加一倍） 附子（炮裂，去皮脐）二两（有风者三分加一倍） 山茱萸二两（腹痛者三分加一倍） 杜仲（去粗皮，酥炙，锉）二两（腹中游气者三分加一倍） 泽泻二两（有水气者三分加一倍） 山芋三两（头风者加一倍） 桂（去粗皮）六两（颜色不足者三分加一倍） 细辛（去苗叶）三两（目视䀮䀮者三分加一倍） 石斛二两（阴湿痒者三分加一倍） 肉苁蓉（酒浸，去皱皮，炙）三两（身痿加一倍） 黄耆（锉）四两（体疼者加一倍） 熟干地黄二两（焙，色萎黄者三分加一倍）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空腹、温酒或米饮送下，日晚再服。

【主治】虚劳不足，小便淋沥，少腹㽲痛，脐腹胀满。

58195 **茯苓丸**

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】赤茯苓（去黑皮） 芍药 当归（切，焙） 枳壳（去瓤，麸炒） 白术 人参各五两 大麻仁 大黄（锉）各三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，空心煎茅根汤送下。

【主治】大小便不通。

58196 **茯苓丸**

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】白茯苓(去黑皮)三两　半夏(汤洗去滑)　生姜(切,焙)二两　昆布(洗去咸,焙)　海藻(洗去咸,焙)各五两　桂(去粗皮)　陈橘皮(去白,焙)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如杏仁大,常含化一粒,细细咽津,令药气不绝。

【主治】气结喉中,蓄聚不散成瘿。

58197　**茯苓丸**

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】白茯苓(去黑皮)　当归(切,焙)　防风(去芦头)　山芋　黄耆(锉)　复盆子各一两半　牛膝(酒浸,切,焙)　人参　独活(去芦头)　山茱萸　芎䓖　蜀椒(去目并闭口,炒出汗)　芜荑(熬)　厚朴(去粗皮,生姜汁炙)　藁本(去苗土)　桂(去粗皮)各一两　泽兰一两三分　熟干地黄(焙)三两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,温酒送下,不拘时候。

【主治】妇人血风劳气,四肢少力,月候不调,脐腹疼痛。

58198　**茯苓丸**　《圣济总录》卷一五七。为《圣惠》卷七十五"槟榔丸"之异名。见该条。

58199　**茯苓丸**

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】白茯苓(去黑皮)一两半　泽泻　人参各一两　桂(去粗皮)　菖蒲各一两半　麦门冬(去心,焙)半两　当归(切,焙)　熟干地黄(焙)各一两　远志(去心)一两一分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,煎人参汤送下,不拘时候。

【主治】产后血气虚,精神不安,言语错谬。

58200　**茯苓丸**

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】白茯苓(去黑皮)　肉苁蓉(酒浸,切,焙)　熟干地黄(焙)各一两半　羚羊角(屑)　当归(切,炒)　枳壳(去瓤,麸炒)　桑上寄生(锉,炒)　延胡索(粳米炒,米熟用)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,温酒或米饮下,不拘时候。

【主治】产后蓐劳,寒热羸瘦,骨节疼痛。

58201　**茯苓丸**

【方源】《全生指迷方》卷四。

【组成】茯苓　黄芩各一两　五味子半两　半夏(汤洗七遍;切,姜汁浸,焙)三分　橘皮(洗)一两　桔梗半两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后米饮送下。

【主治】脾咳,大便坚,从腹上至头发热,脉疾。

58202　**茯苓丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十八引《孔氏家传》。

【组成】白茯苓五分　黄连一两　阿胶(炒)三分

【用法】上为末,以烧粟饭为丸,如绿豆大。每服二十丸,粟米饮送下。

【功用】分利水道。

【主治】小儿久新泻利,不问冷热。

58203　**茯苓丸**

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】茯苓一两　吴茱萸三两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,米饮送下,不拘时候。

【主治】饮湿。

58204　**茯苓丸**

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】远志　甘草　茯苓　麦门冬　人参　当归　白术　泽泻　独活　菖蒲各三两　薯蓣　阿胶各一两　干姜四两　干地黄五两　桂三两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如大豆大。每服二十丸,不知稍增至五十丸,未食温酒送下。

【功用】安定心神。

【主治】虚损。

【加减】大虚,身体冷,少津液,加钟乳三

两。

58205 **茯苓丸**

【方源】《本事》卷二。

【组成】辰砂(水飞) 石菖蒲(去须,洗) 人参(去芦) 远志(去心,洗,锉,炒令黄色) 茯神(去木) 白茯苓(去木) 真铁粉 半夏曲 南星(羊胆制)各等分

【用法】上为细末,生姜四两,取汁,和水煮糊为丸,如梧桐子大。别用朱砂为衣,干之。每服十丸,加至三十丸,夜卧生姜汤送下。

【功用】安神镇心,消风痰,止头眩。

【主治】①《本事》:惊悸。②《普济方》:风历年岁,或歌或笑或哭,言语无所不及。

【方论选录】《本事方释义》:辰砂气味苦温,入手少阴;石菖蒲气味辛温,入手少阴、足厥阴;人参气味甘温,入脾胃;远志气味辛微温,入心肾;茯神气味甘平,入心,茯苓气味同而淡渗,入脾胃;真铁粉气味咸平,入肝;半夏曲气味辛微温,入胃;陈胆星气味苦寒,入手少阴、足厥阴;生姜为引。即同治上心疾不用辛温峻利之品者,欲其专行手少阴、足厥阴二经,使得安神定心,不使药性之胜脾胃也。

58206 **茯苓丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】白茯苓(去皮)三两 菟丝子五两(酒浸一宿,别捣,焙干) 龙齿 益智(去壳) 破故纸(炒) 远志(去心) 人参(去芦头) 石菖蒲各二两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服一百丸,空心、食前煎灯心汤送下。

【功用】滋养血气,蠲除风冷。

【主治】真元气弱,荣卫俱虚,精滑不固,神气消耗。

58207 **茯苓丸**

【方源】《普济方》卷三十三引《卫生家宝》。

【组成】猪苓二两 茯苓半两 半夏半两

【用法】上药,半夏汤浸八九次,锉作二片,同木猪苓一处炒令黄色,去猪苓不用,只取半夏研细,同茯苓、粟米糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食前、空心热水送下。

【主治】男子小便白浊,渐成淋沥,或痛或不痛,日久觉瘠瘦,四肢乏力,不思饮食。

58208 **茯苓丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】白茯苓二两 木猪苓四两(锉)

【用法】水二升,同煮干,去猪苓,只用茯苓为末,以黄蜡二两熔化为丸,如弹子大。每服一丸,空心细嚼,盐汤送下。

【主治】小便白浊。

【宜忌】忌米醋。

58209 **茯苓丸**

《妇人良方》卷三。为《百一》卷五引《全生指迷方》"治痰茯苓丸"之异名。见该条。

58210 **茯苓丸**

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】京三棱六两半 蓬莪术六两半 青皮(去白) 陈皮(去白) 白术各三两 槟榔二两半 木香一两半 枳壳(麸炒,去瓤)二两 白茯苓(去皮)一两 半夏(汤洗七次,去滑)一两半 牵牛(头末)四两

【用法】上为细末,生姜汁面糊为丸,不以多少,食后生姜汤送下。

【功用】升降阴阳,消化滞气,祛痰逐饮,美进饮食。

【主治】中焦气涩,胸膈痞闷,饮食迟化,四肢困倦,呕逆恶心。

58211 **茯苓丸**

【方源】《直指》卷十。

【组成】白茯苓

【用法】上为末,山药作糊为丸。每服四钱,空心米汤或酒送下,临卧又服。或只为末散,熟水调下四钱亦可。

【主治】心虚梦泄。

58212 **茯苓丸**

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】赤茯苓(去皮) 川黄连(去须) 枳壳(炒)各等分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每

服一丸，乳汁调灌下。

【主治】婴儿初生，恶秽入腹，腹满气短，不能饮乳。

58213　**茯苓丸**

《此事难知》。为《圣济总录》卷三十一"茯神丸"之异名。见该条。

58214　**茯苓丸**

【方源】《医方大成》。

【组成】五倍子(去瓤)四两　莲肉一两　龙骨(煅)一两半　左顾牡蛎(煅)二两　茯苓二两

【用法】上为末，煮糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心盐汤送下。仍兼服灵砂黑锡。

【主治】三消渴疾。

58215　**茯苓丸**

【方源】《观聚方要补》卷九引《经验良方》。

【组成】牛膝　当归　白术　黄耆　肉桂　独活各等分

【用法】加生姜五片，薤白七寸，水煎服。

【主治】产后发喘，四肢浮肿；妇人产后遍体疼痛，腰背不得转侧，手脚不得动摇，身热头痛。

58216　**茯苓丸**

《医学纲目》卷二十九。为《局方》卷五(续添诸局经验秘方)"茯菟丸"之异名。见该条。

58217　**茯苓丸**

《普济方》卷三十三。即《三因》卷十二"张真君茯苓丸"。见该条。

58218　**茯苓丸**

【方源】《普济方》卷二二九。

【组成】白茯苓(去黑皮)　地骨皮　铁精(亦名轻铁)六两　天灵盖(浸童便二升，煮)三两

【用法】上为末，饭为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后煎汤送下，一日二次。

【主治】热劳咳嗽。

58219　**茯苓丸**

【方源】《普济方》卷三八二。

【组成】青黛　茯苓　芦荟　琥珀　川大黄(净)　赤茯苓二分(炒)　钩藤皮　远志肉(姜制，炮干)　虾蟆灰三铢　九节菖蒲　麝香少许

【用法】上为细末，粟米糊为丸，如麻子大。每服十丸，薄荷汤送下。

【主治】小儿疳，四肢瘦弱，腹胀壮热，头发干燥，时时烦渴，脊骨如锯。

58220　**茯苓丸**

【方源】《普济方》卷三八六。

【组成】赤茯苓　杏仁(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄)　陈橘皮(汤浸，去白瓤，焙)　汉防己　紫苏子(微炒)　甜葶苈(隔纸炒令紫色)各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服十丸，煎桑根白皮汤送下，一日三次。五岁以下，减丸服之。

【主治】小儿水气面目肿，小便涩，腹胀满。

58221　**茯苓丸**

【方源】《保婴撮要》卷八。

【组成】茯神　芦荟　琥珀　川黄连(净)　赤茯苓各三钱　钩藤皮　远志肉　虾蟆灰各三钱　石菖蒲一钱　麝香少许

【用法】上为末，粟米为丸，如麻子大。薄荷汤送下。

【主治】心疳惊疳。

58222　**茯苓丸**

【方源】《遵生八笺》卷六。

【组成】茯苓　山药　肉桂　山茱萸　巴戟　白术　牛膝　菟丝子各一两　干姜　细辛　防风　柏子仁　泽泻　牡丹皮各三钱　附子(童便煮三次，一两一个)

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸，空心盐汤送下，一日二次。

【主治】男子五劳七伤，两目迎风泪出，头风项强，回转不得，心腹胀满，上连胸胁，下引腰背，表里彻痛，喘息不得，饮食咳逆，面黄痿瘦，小便淋沥，阴痿不起，临炉不举，足肿腹痛，五心烦热，身背浮肿，盗汗不绝，四肢拘挛，或缓或急，梦寐惊悸，呼吸气短，口干舌

燥，状如消渴，急于喜怒，呜咽悲愁。

58223 **茯苓丸**

【方源】《景岳全书》卷六十一。

【组成】赤茯苓 人参 桂心 干姜（炮） 半夏（泡，洗，炒黄） 橘红各一两 白术（炒） 甘草（炒） 枳壳（麸炒）各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，米饮送下，一日三次。

【主治】妊娠烦闷，头晕，闻食吐逆，或胸腹痞闷。

58224 **茯苓丸**

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】赤茯苓一两 细辛五钱 泽泻五钱 肉桂五钱 紫菀茸一两 附子（炮）三钱 生地黄一两 牛膝（酒浸）一两 山茱萸肉五钱 干山药一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，食前米饮、临卧温酒送下。

【主治】胞痹，小腹、膀胱按之内痛。

【方论选录】此方虽以茯苓通利为名，全赖牛膝、地黄、山茱、山药调补津液为主，更需桂、附之辛，以行牛膝、地黄之滞，深得若沃以汤，涩于小便之旨。其用紫菀者，上滋化源，下利膀胱也。妙用更在细辛一味，开发上窍，专主上为清涕而设。

58225 **茯苓丸**

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】茯苓 黄连 花粉 熟地 覆盆子 萆薢 人参 玄参 石斛 蛇床子 鸡肫皮

【用法】磁石汤送下。

【主治】消中后，腿渐细，将成肾消者。

58226 **茯苓丸**

【方源】《宁坤秘籍》卷上。

【异名】茯神丸（《女科秘要》卷三）。

【组成】茯神 远志（去骨） 茯苓各八钱 朱砂三钱

【用法】猪心一个，用旱米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，用金银汤送下。先用麝香散宁心定志，后用本方。

【主治】经来狂言，触怒，逆血攻心，不知人事。

58227 **茯苓丹**

【方源】《医方类聚》卷一五三引《瑞竹堂方》。

【组成】白茯苓（去粗皮，为细末，淘净，阴干）四两 头面十三两 人参（末）三钱 青盐少许

【用法】上用滚水成剂，如大指，以文武火烧熟，验数分，作十日服食，一日服三料。夏加干莲子肉一两，余月加干山药一两。

【功用】延年益寿，黑髭发。

58228 **茯苓汤**

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《圣济总录》卷十四。

【组成】茯苓 干地黄各四两 人参 桂各三两 甘草二两 麦门冬一升（去心） 半夏六两（洗去滑） 生姜一斤

【用法】以水一斗，又杀乌鸡取血及肝心，煮三升，分四服，日三次，夜一次。其间少食无爽，作三剂愈。

【主治】惊忧怖迫逐，或惊恐失财，或激愤惆怅，致志气错越，心行违僻，不得安定者。

58229 **茯苓汤**

【方源】《外台》卷十四引《深师方》。

【组成】茯苓二两 芎䓖 干姜 芍药 白术 当归 人参各一两 枳实三分（炙） 甘草（炙）一两

【用法】上细切。以水九升，煮取三升，一日服三次。若病剧者，可相去如人行五里顷一服。服一剂不愈，不过二剂。

【主治】中风入腹，心下如刺，不得卧，或在胁下，转动无常，腹满短气，惙惙欲死。

【宜忌】忌海藻、菘菜、桃、李、雀肉，大酢。

【加减】胸中有气，加人参二两。

58230 **茯苓汤**

【方源】《医心方》卷六引《深师方》。

【组成】饴胶八两 白术四两 茯苓四两

干姜二两 甘草二两

【用法】以水一斗，煮取三升，去滓，纳饴令烊，分四服。

【主治】肾着之为病，从腰以下冷痛而重如五千钱，腹肿。

58231 **茯苓汤**

【方源】《医心方》卷二十一引《深师方》。

【组成】茯苓三两 甘草二两 芍药二两 桂二两

【用法】上切。以水七升，煮取二升半，分三服。

【主治】月经至，绞痛欲死。

58232 **茯苓汤** 《医心方》卷九引《经心录》。为《外台》卷八引《集验方》"**茯苓小泽泻汤**"之异名。见该条。

58233 **茯苓汤**

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【组成】茯苓 黄芩 栀子仁 芒消各五两 赤石脂 升麻 紫菀各二两 生麦门冬五两（去心） 竹叶（切）一升 香豉一升（熬） 石膏八两（碎，绵裹） 生地黄（切）一升

【用法】上切。以水九升，煮取二升，去滓，下芒消，分三服。

【功用】消热，止血气，调脉理中。

【主治】脉实热极，血气伤心，使心好生赫怒，口为色变赤，言语不快。

【宜忌】忌酢物，芜荑。

58234 **茯苓汤**

【方源】《外台》卷八引《延年秘录》。

【组成】茯苓三两 人参 生姜 橘皮 白术各二两

【用法】上切。以水五升，煮取一升五合，去滓，分三次温服，中间任食。

【主治】风痰气发，即呕吐欠呿，烦闷不安，或吐痰水者。

58235 **茯苓汤**

【方源】《千金》卷三。

【组成】茯苓五两 甘草 芍药 桂心各二两 生姜六两 当归二两 麦门冬一升 大枣三十个

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取三升，去滓，分三服，一日三次。无当归可用芎䓖。

【主治】产后心虚，暴苦心悸不定，言语谬错，恍恍惚惚，心中愦愦。

【加减】若苦心志不定，加人参二两，亦可入远志二两；若苦烦闷短气，加生竹叶一升，先以水一斗三升，煮竹叶取一斗，纳药；若有微风，加独活三两、麻黄二两、桂心二两，用水一斗五升；若颈项苦急，背膊强者，加独活、葛根各三两，麻黄、桂心各二两、生姜八两，用水一斗半。

58236 **茯苓汤**

《千金》卷十三。为《金匮》卷上"茯苓杏仁甘草汤"之异名。见该条。

58237 **茯苓汤**

【方源】《千金》卷十五。

【组成】茯苓 黄柏 黄连 龙骨 人参 干姜 黄芩 桂心 芍药 当归 栀子仁 甘草各半两 赤石脂一两 大枣十二个

【用法】上㕮咀。以水五升，煮取二升，分二次服。不愈，满三剂。

【主治】风虚冷痢及因下空竭欲死，滞下脓血，日数十行，羸笃垂死。

【方论选录】《千金方衍义》：痢久困竭而至本虚极亢，虽用连、柏、芩、栀苦折之味，不得参、苓、归、芍护持之力，徒伤正气，虚阳愈炽。所以专赖姜、桂之热因热用，不独实脾固脱，兼取发越甘草、大枣之甘缓，宣通龙骨、石脂之涩滞，而风虚冷痢，亦藉姜、桂、参、苓可以挽回造化也。

58238 **茯苓汤**

【方源】《千金》卷十八。

【组成】茯苓四两 半夏一升 生姜一斤 桂心八两

【用法】上㕮咀。以水八升，煮取二升半，分四服。

【主治】胸膈痰满。

【宜忌】《普济方》：忌酢物、羊肉、生葱、

猪肠。

【加减】冷极者，加大附子四两；气满者，加槟榔三七个。

【方论选录】《千金方衍义》：痰气聚于胸中，使用小半夏加茯苓汤，不得桂心之辛散，难以逞破的之功。冷极加附子，是指真阳虚者而言，气满加槟榔，是指痰气盛者而言，非谓二味可以并入一方也。

58239 茯苓汤

《千金》卷十九。为原书同卷"凝唾汤"之异名。见该条。

58240 茯苓汤

《千金翼》卷十九。为《金匮》卷中"茯苓泽泻汤"之异名。见该条。

58241 茯苓汤

【方源】《外台》卷六引《广济方》。

【组成】茯苓十二分 橘皮十二分 白术八分 人参六分 桂心六分 甘草八分（炙） 紫苏十分 生姜十二分 槟榔七枚

【用法】上切。以水九升，煮取二升半，绞去滓，分三次温服。每服如人行七八里，未好愈，三二日更服一剂。老小取微利。

【主治】常吐酸水，脾胃中冷。

【宜忌】忌生葱、酢物、桃、李、雀肉、海藻、菘菜。

58242 茯苓汤

【方源】《外台》卷六引《广济方》。

【组成】茯苓四两 厚朴四两（炙） 橘皮二两 白术二两 生姜十两

【用法】上切。以水九升，煮取二升七合，绞去滓，分三次温服，每服相去如人行七八里。须利，加槟榔末一两半，汤欲熟时纳之，甚安稳，三日服一剂，频服五六剂，可则停。

【主治】心头结气，连胸背痛，及吐酸水，日夜不止。

【宜忌】忌酢物、桃、李、雀肉。

58243 茯苓汤

【方源】《外台》卷七引《广济方》。

【组成】茯苓二两 防己一两半 橘皮一两 玄参一两 黄芩一两半 泽泻一两半 杏仁二两半（去尖皮） 白术一两半 大豆一升半 郁李仁二两半 桑白皮二两半 泽漆叶（切）一升 猪苓一两半

【用法】上切。以水一斗，先煮桑白皮、大豆、泽漆叶，取五升，去滓，澄去下淀，纳诸药，煎取二升，绞去滓，分三服。

【主治】鼓胀上下肿，心腹坚强，喘息气急，连阴肿，坐不得，仍下赤黑血汁，日夜不停者。

【宜忌】忌酢物、桃、李、雀肉、热面、蒜、炙肉、粘食、油腻。

【加减】咳者，加五味子二两。停二日服一剂。

58244 茯苓汤

【方源】《外台》卷十一。

【组成】茯苓五两 栝楼五两 知母四两 小麦二升 麦门冬五两（去心） 大枣二十个（去核） 生地黄六两 萎蕤四两 淡竹叶三升

【用法】上切。以水三升，先煮小麦、竹叶，取九升，去滓，入诸药，煮取四升，分四服。不问早晚，随渴即进。

【功用】泄热止渴。

【主治】胃腑实热，引饮常渴。

【宜忌】忌芜荑、酢物。

58245 茯苓汤

【方源】《医心方》卷二十二引《产经》。

【组成】茯苓一两 当归三两 甘草二两（炙） 黄芩一两 术三两 石膏如鸡子一枚 杏仁三十枚 芍药二两 芒消一两

【用法】上切。以水八升，煮取三升，纳芒消，上火令烊之，服一升，当下水或吐，便解。

【主治】妊身卒心腹拘急痛，胀满，气从小腹起上冲，心烦起欲死，是水、饮、食、冷气所为。

58246 茯苓汤

【方源】方出《圣惠》卷五十三，名见《普济方》卷一七九。

【组成】赤茯苓一两 芦根一两（锉） 黄

芩一两　知母一两　栝楼根一两　瞿麦穗一两　麦门冬一两(去心)　甘草一两(炙微赤,锉)　木通一两(锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】心脾热,渴不止,小便难。

58247　**茯苓汤**

【方源】《医方类聚》卷五十四引《通真子伤寒括要》。

【组成】赤茯苓一两　桂枝一两　甘草一两

【用法】上为散,如桂枝汤煎服。

【主治】太阳病,若小便少者,津液当还入胃中故也;凡发汗太过,大小便难者;太阴病,无大热,其人烦燥,此为阳去入阴。

58248　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　防风(去叉)　当归(焙)　白前　干姜(炮裂)　甘草(炙,锉)各二两　独活(去芦头)三两　远志(去心)　附子(炮裂,去皮脐)　人参各一两

【用法】上锉,如麻豆大。每服先用水三盏,黑豆半匙,大枣二个(擘破),生姜半分,煎至一盏半,去滓;入药末五钱匕,煎至一盏,去滓温服,空心、日午、夜卧各一次。

【主治】历节风,手足曲戾,言语错乱。

58249　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】白茯苓(去黑皮)　熟干地黄(焙)　人参　桂(去粗皮)各二两　半夏(汤洗七遍,切,焙)一两半　甘草(炙)　麦门冬(去心,焙)各半两

【用法】上锉细,如麻豆大。每服五钱匕,水一盏半,加生姜半分(切),煎至八分,去滓温服,一日二次,不拘时候。

【主治】风厥,惊骇背痛,善噫善欠。

58250　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】赤茯苓(去黑皮)一两　沉香半两　甘菊花三分　诃黎勒皮二两　藿香(去梗)一两　木香半两　槟榔(锉)一两　白术一两　枇杷叶(拭去毛,炙)十片　枳壳(去瓤,麸炒)　甘草(炙)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,加生姜、盐各少许,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】首风,头目昏痛,痰涎不利。

58251　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　桑根白皮各二两　防己　桂(去粗皮)　芎䓖　芍药　麻黄(去根节)各一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,加大枣一个(去核),煎取一盏,去滓温服,连三服后,以热姜粥投之,汗出为度。

【主治】风湿痹,四肢疼痹,拘挛浮肿。

58252　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　桑根白皮各二两　防己　桂(去粗皮)　芎䓖各一两半　甘草(炙)三两　芍药　当归(切,焙)　麻黄(去根节,先煮,掠去沫,焙干)各一两半

【用法】上为粗末。每服六钱匕,以水二盏,加大枣三个(劈破)同煎,去滓,取一盏,空心温服。临卧时,如欲出汗,服药了,以生姜热粥投之。

【主治】风湿痹留著不去,四肢痹麻,拘挛浮肿。

【宜忌】汗出慎外风。

58253　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　石膏各一两半　芍药三分　半夏一两(汤浸七遍,炒令干)　细辛(去苗叶)　桂(去粗皮)　五味子各半两　麻黄(去根节,沸汤掠去沫,焙)　桑根白皮(锉)各一两

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水一盏半,加生姜一分(拍碎),同煎至八分,去滓温服。

【主治】伤寒，心下有水气，肺气虚胀，喘急咽燥。

58254 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】白茯苓(去黑皮)一两　人参一两　半夏(汤洗七遍，切，炒干)　麦门冬(去心，焙)各二两　粳米二合　甘草半两(炙，锉)

【用法】上为粗末。每服五钱匕，用水一盏半，加生姜一分(拍碎)，大枣三个(劈破)，竹叶三七片，同煎至八分，去滓温服，一日二次。

【主治】伤寒，脾胃有热，干呕烦满。

58255 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】白茯苓(去黑皮)一两　陈橘皮(汤浸，去白，炒)　枳实(去瓤，麸炒)各半两　人参　白术　五味子各三分　半夏(汤洗七遍)一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜半分(拍碎)，大枣三个(擘破)，煎至一盏，去滓温服。

【主治】伤寒后胸膈气满，呕哕不纳饮食。

58256 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】茯苓(去黑皮)　白芍药　瞿麦穗各一两　白术半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，入葱白五寸，加生姜一分(拍碎)，同煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】伤寒，心下痞满，小便不利；疟病发热身黄，小便不利。

58257 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　枳实(细锉，麸炒)　桂(去粗皮)　桑根白皮(锉)　人参　大腹皮(并子)各三分　陈橘皮(汤浸，去白，焙)　甘草(炙，锉)　木香各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜半分(拍碎)，煎至七分，去滓温服。

【主治】伤寒痞满，滞气不散，似物噎塞。

58258 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　桔梗(炒)　陈橘皮(汤浸，去白，焙干)各一两　人参半两　高良姜一两　槟榔(煨，锉)三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜半分(拍碎)，同煎至半盏，去滓，食前温服。

【主治】伤寒后中冷，心腹胀满，不下食。

58259 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】赤茯苓(去黑皮)一两　木香　桂(去粗皮)　木通(锉)各半两　甘草(炙，锉)一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至半盏，去滓，食前温服。

【主治】伤寒汗后，心腹及脐下满胀。

58260 **茯苓汤**

《圣济总录》卷二十六。为《伤寒论》“茯苓桂枝甘草大枣汤”之异名。见该条。

58261 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　陈橘皮(去白，炒)　人参　白术　厚朴(去粗皮，生姜汁炙，锉)　木香(炮)　五味子各一两　干姜(炮)半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，煎至六分，去滓，空心温服。

【主治】伤寒食毒，腹胀虚鸣，不能食。

58262 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　五味子(炒)麦门冬(去心，焙)各二两　柴胡(去苗)一两半　桂(去粗皮)一两　槟榔(锉)　细辛(去苗叶)各半两

【用法】上为粗末。每服四钱匕，水一大盏，煎至六分，去滓温服。

【主治】伤寒柔痓，病经三日不愈，恐阴气攻五脏致损。

58263　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷三十。

【组成】赤茯苓(去黑皮)半两　木通(锉)三分　升麻　羚羊角(镑)　前胡(去芦头)各半两　桑根白皮(锉)三分　大黄(锉,炒)半两　马蔺根　朴消各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至六分,去滓,食后温服。

【主治】伤寒毒气上冲,喉中痛,闷塞不通。

58264　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】白茯苓(去黑皮)　柴胡(去苗)　桔梗(炒)　细辛(去苗叶)　芍药　大腹皮各半两　枳壳(去瓤,麸炒)　陈橘皮(汤浸,去白,焙)各一两　杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒)三分　甘草(炙)一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,加生姜半分(拍碎),同煎至八分,去滓,食后温服,一日二次。

【主治】伤寒后,骨节烦疼,乍起眼暗,气冲胸背,上气满急。

58265　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】赤茯苓(去黑皮)一两半。人参一分　甘草(炙,锉)半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,用水一盏,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒汗后,余热不退,心神烦躁。

58266　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　柴胡(去苗)　枳壳(去瓤,麸炒)　桑根白皮(锉)　麦门冬(去心,焙)各半两　葛根(锉)三分　甘草(炙,锉)半两　桂(去粗皮)　人参各一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,用水一盏,加生姜三片,大枣二个(擘),煎至七分,去滓温服。

【主治】伤寒汗后,余热不除,及四肢拘急痛,胸膈不利,呕逆不思饮食。

58267　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】白茯苓(去黑皮,锉)　人参　白术　麻黄根(锉)　肉苁蓉(切,焙)　五味子(炒)　甘草(炙,锉)　牡蛎(烧)各一两　芍药三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎至八分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒后汗出不止,渐觉虚劣。

58268　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷三十三。

【组成】赤茯苓(去黑皮)一两　鳖甲(醋炙,去裙襕)　木通(锉)　郁李仁(微炒,去皮)各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓,食前温服。

【主治】伤寒后,脚气攻心闷乱,腹满如石,小便赤涩。

58269　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　桂(去粗皮)　黄芩(去黑心)各一两　升麻　常山　蜀漆　甘草(炙,锉)各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】疟病发热,烦躁,身面皆黄,小便不利。

58270　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】白茯苓(去黑皮)　人参各三两　甘草(炙)　白术各二两　干姜(炮)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服,一日三次。

【主治】霍乱,心下筑悸,肾气动。

58271　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　厚朴(去粗皮生姜汁炙)　吴茱萸(汤浸,焙,炒)各一两　人参　陈橘皮(汤浸,去白,焙)各二两　白术三

两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜三片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】霍乱，心下结气连胸背痛，及吐酸水，日夜不止。

58272 **茯苓汤**

《圣济总录》卷四十二。为《圣惠》卷三“白茯苓散”之异名。见该条。

58273 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】赤茯苓（去黑皮） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉）各四两 甘草（炙，锉） 人参 黄芩（去黑心）各二两 桂（去粗皮）五两 半夏（汤洗七遍）五两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜三片，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾瘅。口甘，咽干，烦渴。

58274 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】白茯苓（去黑皮）一两 半夏（汤洗七遍，焙干）一两 人参一两 陈橘皮（汤浸，去白，焙）一两半 丁香半两 木香半两 白术一两 草豆蔻（去皮）二两 槟榔（锉）半两 桂（去粗皮）三钱 厚朴（去粗皮，生姜汁炙）一两半 枳壳（去瓤，麸炒）半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】胃冷不思食，痰逆多吐。

58275 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】赤茯苓（去黑皮） 当归（切，焙） 牛膝（酒浸，切，焙） 羌活（去芦头） 枳壳（去瓤，麸炒） 荆芥穗 槟榔（锉）各一分 木香三铢

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至八分，去滓，空心温服。

【主治】肾脏实热，腰胯强急，面色焦黑，小便赤涩，心胸满闷，两胁胀满。

58276 **茯苓汤**

《圣济总录》卷五十四。为《伤寒论》“茯苓桂枝白术甘草汤”之异名。见该条。

58277 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】白茯苓（去黑皮）一两 人参一分 麦门冬（去心，焙）一两一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一分（拍碎），同煎至八分，去滓温服。良久，煮淡浆粥补之。服枳壳汤吐后，服本方。

【主治】停饮心痛。

58278 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】赤茯苓（去黑皮）三两 桔梗（锉，炒）二两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙透） 白术 人参各二两 陈橘皮（去白，焙）一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜一小块（拍破），煎至六分，去滓温服，一日三次。

【主治】厥逆满急，食饮妨闷。

58279 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【异名】小茯苓汤（《宣明论》卷二）。

【组成】赤茯苓（去黑皮）三两 人参 陈橘皮（去白，焙） 桔梗（锉，炒）各二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜一小块，煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】厥逆冷气冲注，刺痛胀满。

58280 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】白茯苓（去黑皮） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 人参 白术 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 五味子 黄耆各一两 桂（去粗皮）二两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水二盏，加生姜三片，煎至一盏，去滓温服，一日三次。

【主治】腹冷䐜胀，及虚气不能食。

58281 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　木通(锉)各二两　芍药一两半　吴茱萸(汤洗,焙干,炒)郁李仁(汤浸,去皮尖)各一两　槟榔三枚(锉)　紫菀(去苗土)一两

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水一盏半,煎至八分,去滓,空心温服,一日二次。

【主治】鼓胀不食。

58282　茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】白茯苓(去黑皮)　麦门冬(去心,焙)各四两　石膏五两　茅根(锉)一升

【用法】上为粗末。每服四钱匕,水一盏半,加冬瓜一片,同煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】消渴。口干唇焦,心脾脏热,唯欲饮水。

58283　茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　泽泻　白术　黄连(去须)　桂(去粗皮)　甘草(炙,锉)各一两　大黄(生)半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏半,加小麦半匙,煎至一盏,去滓温服,不拘时候。

【主治】心脾壅滞,暴渴引饮。

58284　茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　泽泻　麦门冬(去心,焙)　杜仲　(去粗皮,炙)各二两　桑白皮(锉)三两　桂(去粗皮)一两　磁石(捣如麻粒大,淘去赤水)四两

【用法】上为粗末。每服六钱匕,水二盏,加大枣三个(擘破),薤白五茎(细切),煎至一盏,去滓,分二服,空腹温服,如人行十里,再服,至晚亦然。此药内消,不吐利,服一剂讫,津液未通,血脉未行,肌肤未润,更服一剂。

【主治】三焦气不宣通,膈壅停水,不下至肾,肾消肌肉化为小便。

58285　茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷六十。

【异名】茯苓加减汤(《宣明论》卷一)。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　陈橘皮(去白,焙)　泽泻　桑根白皮(锉)各三两　芍药　白术各四两　人参　桂(去粗皮)各二两　石膏八两　半夏六两(汤洗七遍)

【用法】上为粗末。每服四钱匕,水一盏半,加生姜少许,同煎至一盏,去滓温服,不拘时候。

【主治】胃中积热,食己辄饥,面黄肌瘦,胸满胁胀。

58286　茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　人参　麦蘖(炒)　陈橘皮(汤浸,去白,炒)　陈曲(炒)　半夏(姜汁浸二宿,切,焙干)各一两　草豆蔻(去皮)三个　青橘皮(汤浸,去白)半两(炒)

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加生姜三片,同煎至六分,去滓,食前温服。

【功用】去积冷,止腹痛,通中消饮。

【主治】膈气痰结。

58287　茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【异名】茯苓散(《普济方》卷二〇六)。

【组成】茯苓(去粗皮)　知母　白术　枳壳(麸炒,去瓤)　人参(去芦头)　芦根(切)　甘草(微炙赤,锉)　半夏(汤洗,去滑)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏半,加生姜七片,薤白二寸(切),同煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】脾胃虚弱,不思饮食,呕吐。

58288　茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】赤茯苓(去黑皮)一两　人参三两

【用法】上为粗末。以水三盏,煎取一盏半,去滓,分三次温服。

【主治】胸胁逆满胀渴,口疮。

58289　茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　黄连(去须)

生干地黄（焙） 栀子仁 桂（去粗皮） 栝楼根各三分 大黄（锉，炒）一两 黄芩（去黑心） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】吐血后，身体虚热，胸中痞隔，口舌干燥。

58290 茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】赤茯苓（去黑皮） 厚朴（去粗皮，姜汁炙） 黄连（去须，炒）各一两 干姜（炮）半两

【用法】上为粗末。每服四钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓，空心、日午温服。

【主治】飧泄，米谷完出。

58291 茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】赤茯苓（去黑皮） 白术（锉，微炒）各一两 防己 黄芩（去黑心） 射干 泽泻各三两 桑根白皮（炙黄色，锉）三两 泽漆叶（切，微炒）一两

【用法】上为粗末。每用五钱匕，先以水三盏，煮大豆一合，取二盏，去滓入药，煎取一盏，分为二服。未愈，频服两料。

【主治】痢后遍身浮肿。

58292 茯苓汤

《圣济总录》卷八十。为方出《外台》卷二十引《古今录验》，名见《鸡峰》卷十七“茯苓饮子”之异名。见该条。

58293 茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】赤茯苓（去黑皮，锉） 桑根白皮（炙，锉） 白术各二两半 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 防己各一两半 旋覆花三分 槟榔（锉） 大黄（锉，微炒） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒黄）八十枚

【用法】上为粗末。每服三钱匕，先别用麻黄一分，水一盏半，煎五七沸，掠去沫，下药并生姜一分（拍破），同煎至六分，去滓，空腹服，日晚再服。

【主治】脚气上喘，心下妨闷，不能食。

58294 茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】赤茯苓（去黑皮） 桑根白皮（锉） 防己 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各一两半 旋覆花半两 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 麻黄（去根节） 白术 紫苏茎叶各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，先以水煮黑豆，取汁一盏半，加生姜半分（拍碎），同煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脚气上攻，身体肿满，小便赤涩。

58295 茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】赤茯苓（去黑皮） 干姜（炮） 泽泻各二两 桂（去粗皮）三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓，空心、日午、近晚温服。

【主治】脚气，腰脊膝浮肿。

58296 茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】赤茯苓（去黑皮）三两 木香 半夏（汤洗七遍去滑） 独活（去芦头）各一两半 犀角（镑） 羚羊角 吴茱萸（汤浸，炒）各二两 人参 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各一两 龙齿（捣碎）二两半 贝母（去心，炮）七枚

【用法】上㕮咀。每服三钱匕，水一盏，加生姜一枣大（拍破），同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脚气。风毒上冲，心忪惊悸，心下坚满。

58297 茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】白茯苓（去黑皮） 紫苏叶 杏仁（去皮尖双仁，炒） 升麻 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 柴胡（去苗）各三两 槟榔（锉）十二枚 犀角（镑） 栀子仁各三两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜一枣大（拍碎），同煎至六分，去滓，空心

温服,晚食前再服。

【主治】脚气肿满,气急上气,心闷烦热,呕逆不下食。

58298　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】赤茯苓(去皮)　桑根白皮(锉)　防己　木香　黄芩(去黑心)各三两　郁李仁(汤浸,去皮,研)二两半　木通(细锉)二两　大腹七颗(连皮子锉)

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,加生姜一分(拍碎),煎取七分,去滓,早、晚食前服。

【主治】脚气盛发,两脚浮肿,小便赤涩,心腹妨满,气急,坐卧不得。

58299　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】白茯苓(去黑皮)三两　薏苡仁(炒)四两　丹参　独活(去芦头)　防风(去叉)各二两半　牛膝(酒浸,切,焙)　防己　五加皮　黄耆　枳壳(去瓤,麸炒)　升麻各三两　麻黄(去根节)四两　羚羊角(镑)二两　桂(去粗皮)一两半　石膏(研如粉)十两

【用法】上药,除石膏外,锉如小豆大。每服五钱匕,以水一盏半,浸一宿,来晨煎取八分,去滓,空腹温服,一日二次。

【主治】江东春夏暑湿郁蒸,毒气攻击,脚气发动,两脚痠疼,或浮热肿满,或皮毛焦干,或脚疼不能久立,筋急抽痛,时冲心闷,胸膈痰积,恶心欲吐,四肢痛痹,十指不仁,腹胀气妨,头旋目眩眼暗。

【加减】心腹气胀,加连皮大腹一颗;心胸虚热,加麦门冬(去心)一分;小腹痛,加芍药、黄芩各一两;心胸有痰,加旋覆花一分;肺气咳嗽,加杏仁(去皮尖)十四枚、桑根白皮一分;小便数,加杜仲末一分;言语謇涩,加附子一钱;小便涩,加木通一分;肾虚耳聋,加磁石末一钱匕;不睡,加酸枣仁末一钱;烦渴不止,加栝楼一分。

58300　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　大腹皮(锉)　枳壳(去瓤,麸炒)　陈橘皮(汤浸,去白,焙)　半夏(汤洗七遍,晒干)　杏干(汤浸,去皮尖双仁,麸炒令黄)　槟榔(锉)　诃黎勒皮　桑根白皮(锉)　甘草(炙,锉)各半两　人参一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加生姜三片,同煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】肺劳咳嗽,喘满气逆,痰唾不利,不思饮食。

58301　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　前胡(去芦头)　人参　附子(炮裂,去皮脐)各半两　黄耆(锉)　鳖甲(去裙襕,醋浸,炙黄)　半夏(汤洗七遍去滑,炒干)各一两　陈橘皮(汤浸,去白,焙)　木香各一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加生姜半分(拍碎),大枣二个(去核),煎至六分,去滓,空腹温服,日午、临卧再服。

【主治】五劳七伤,脾胃气弱,痰饮不消,胸满气逆,呕吐减食。

58302　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】白茯苓(去黑皮)　人参各二两　麦门冬(去心,焙)　陈橘皮(去白,焙)　杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒)　紫苏(微炒)各一两　酸枣仁(炒)五两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,加生姜半分(拍碎),煎至一盏,去滓,空腹温服,分二服相次服之。

【主治】虚劳烦躁不得眠。

58303　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】白茯苓(去黑皮)　桂(去粗皮)　干姜(炮)　甘草(炙,锉)　芍药　食茱萸各半两　熟干地黄(洗,焙)三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕,以水一盏

半,加大枣二个(去核),煎至一盏,去滓,空腹温服,一日二次。

【主治】虚劳气满不得眠,手足疼痛。

58304 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】赤茯苓(去黑皮) 黄芩(去黑心) 栀子仁各一两半 赤石脂 升麻 紫菀(去苗土)各一两 麦门冬(去心,焙)一两半 豉(炒)一合 石膏一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,加竹叶五片,煎至一盏,去滓,下芒消一钱匕,分二次温服,早食后、日午各一次。

【功用】消热气,调血脉,理中。

【主治】脉极实热,血气伤心,好生嗔怒,口唇色变,言语不快。

58305 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】白茯苓(去黑皮) 麦门冬(去心,焙) 款冬花 独活(去芦头) 槟榔(锉)各六两 桂(去粗皮) 防风(去叉) 防己各五两 甘草(炙) 枳壳(去瓤,麸炒)各四两 地骨皮(去土)十两

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,以水二盏,先煎山泽根,取水一盏半,入药并生姜半分(切),大枣三个(擘破),同煎取一盏,去滓温服,每早晨、日晚各一次。

【主治】心蒸。苦心惊悚栗,男子因读书损心气,伤思虑,过损心,吐血,心烦多忘,失精神,或身体痒瘙,风癣,或胸中气满。

58306 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】白茯苓(去黑皮) 人参 麦门冬(去心,焙) 独活(去芦头) 槟榔各三分 桂(去粗皮) 防风(去叉) 防己各一两一分 桔梗(锉,炒) 甘草(炙) 防葵 枳壳(去瓤,麸炒)各四两 地骨皮十两

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,以水一盏半,加生姜半分(切碎),大枣二个(擘破),煎取八分,去滓顿服,早晚、食后各一次。用银器煎尤妙。

【主治】骨蒸肺萎,心忪战栗,烦热善忘,精神不宁,梦寐飞飏,吐血,身体疼重或痒,多生疮癣,脚气。

58307 **茯苓汤**

《圣济总录》卷九十八。为《圣惠》卷五十八“赤茯苓散”之异名。见该条。

58308 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇〇。

【组成】赤茯苓(去黑皮) 桂(去粗皮)各三分 芍药 当归(切,焙) 生干地黄(焙) 木香 芎䓖各半两 鬼箭羽 桃仁(去皮尖双仁,炒)各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】尸注。发作无时,腹胀喘急,上冲心胸,傍攻两胁。

58309 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】白茯苓(去黑皮) 大黄(锉,炒) 升麻 麦门冬(去心,焙) 远志(去心) 人参 葛根(锉) 甘草(炙,锉)各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】心热,舌干烦躁。

58310 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】赤茯苓(去黑皮) 前胡(去芦头)二两 生干地黄 人参 桂(去粗皮) 芍药 甘草(炙,锉)各一两 麦门冬(去心,焙)三两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加大枣二个(擘),煎至六分,去滓温服,一日三次,不拘时候。

【主治】①《圣济总录》:喉咽闭塞不利。②《普济方》:虚劳少气,咽喉不利,唾如稠胶。

58311 **茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】白茯苓(去黑皮) 人参各一两 海藻(洗去咸,焙)二两 海蛤 半夏(为末,

生姜汁和作饼,晒干)　甘草(炙,锉)　藿蔄子各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服。

【主治】瘿气,咽喉肿塞。

58312　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷一二八。

【组成】白茯苓(去黑皮)三分　黄耆(锉)一两半　芎䓖一两　桂(去粗皮)三分　麦门冬(去心,焙)　五味子各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,加生姜半分(拍碎),大枣二个(擘破),同煎至八分,去滓,空心温服,晚再服。

【主治】痈溃脓太多,里虚热。

58313　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　芎䓖　当归(切,焙)　甘草(炙,锉)各一两　桂(去粗皮)二两　栀子仁十四枚　吴茱萸(汤洗,焙,炒)　细辛(去苗叶)　干姜(炮)　生干地黄(焙)各一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎取一盏,去滓温服,不拘时候。

【主治】妇人中风,角弓反张,口噤。

58314　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】白茯苓(去黑皮)　旋覆花　生干地黄(微炒)各二两　陈橘皮(汤浸,去白,焙)　细辛(去苗叶)　芎䓖　人参　芍药　桔梗(去芦头,炒)　甘草(炙令赤色)各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕,以水一盏,加生姜一片(拍碎),同煎至六分,去滓温服,一日二次。

【功用】安胎,调匀血脉。

【主治】妊娠恶阻,呕逆恶心,四肢疼,头痛,恶闻食气,心忪烦闷,多损坠。

58315　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　防风(去叉)　人参　白术(锉,炒)　枳壳(去瓤,麸炒)　甘草(炙)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加生姜三片,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妊娠虚烦懊热,心中闷乱,头运重,呕逆,四肢倦怠。

58316　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】白茯苓(去黑皮)一两半　甘草(炙,锉)一两　远志(去心)半两　白薇　龙齿(研)各一两　熟干地黄(焙)一两半　人参　防风(去叉)各一两　独活(去芦头)半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后心气不足,血邪狂言,眠卧不安。

58317　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】白茯苓(去黑皮)　羌活(去芦头)　当归(切,焙)　人参　附子(炮裂,去皮脐)　芎䓖　石膏(火煅)　黄耆(锉)各一两

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】①《圣济总录》:产后气血虚,头痛不定。②《普济方》:目眩呕逆。

58318　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】白茯苓(去黑皮)一两半　甘草(炙黄)一两　芍药(锉,炒)一两　桂(去粗皮)一两　当归(切,炒)一两　麦门冬(去心,焙)一两　黄耆一两半(锉)

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,加生姜半分(切),大枣二个(擘),煎至八分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后虚汗不止,心悸恍惚,怵惕多惊。

58319　**茯苓汤**

【方源】《圣济总录》卷一七四。

【异名】茯苓散(《魏氏家藏方》卷十)。

【组成】白茯苓一两　乌梅肉半两(微炒)　干木瓜一两

【用法】上为粗末。每服一钱匕,以水一小盏,加生姜钱子一片,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿伤寒,咳嗽喘粗,肌热烦躁作渴。

58320　茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　人参　黄芩(去黑心)　大黄(锉,炒)各半两

【用法】上为粗末。八九岁儿,每服二钱匕,水一盏,煎至半盏,去滓温服,一日二次。

【主治】小儿痰实壮热。

58321　茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　冬葵子　木通(锉)　车前子各半两

【用法】上为粗末。五六岁儿,每服一钱匕,以水一中盏,煎至五分,去滓温服,如人行十里以来再服。

【主治】小儿小便不通。

58322　茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】白茯苓(去黑皮)四两　泽泻二两　白术　干姜(炮)　桂(去粗皮)　甘草(炙,锉)各一两半　小麦二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】乳石发,热甚口干。

58323　茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　淡竹叶一握(切碎)　白术　甘草(炙)　枳实(去瓤,麸炒)　人参　栀子仁各一两　大黄(锉,炒)二两　黄芩(去黑心)三两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服。

【主治】乳石热肿。

58324　茯苓汤

《圣济总录》卷一八四。为方出《圣惠》卷三十八,名见《普济方》卷二六一"前胡散"之异名。见该条。

58325　茯苓汤

【方源】《全生指迷方》卷四。

【组成】茯苓　麦门冬(去心)　黄芩各一两　秦艽(去土)　柴胡(去苗)各半两　杏仁(去皮尖)一分

【用法】上为散。每服五钱,水二盏,煎至一盏,去滓温服。

【主治】心咳。恶热脉疾,小便赤涩。

58326　茯苓汤

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】赤茯苓　沉香各一两　(一方用琥珀代沉香)

【用法】上为细末。每服二钱,白汤点,食后、临卧服。

【主治】小便白浊,不利,时有作痛。

58327　茯苓汤

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】茯苓　麦门冬　黄芩各一两　秦艽　柴胡各半两　五味子一两　杏仁一分

【用法】上为粗末。每服五钱,水二盏,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】心咳,恶热脉疾,小便赤涩。

58328　茯苓汤　《鸡峰》卷十六。为《金匮》卷下"葵子茯苓散"之异名。见该条。

58329　茯苓汤　《鸡峰》卷十九。为《金匮》卷中"防己茯苓汤"之异名。见该条。

58330　茯苓汤

【方源】《宣明论》卷二。

【组成】赤茯苓(去皮)　桑白皮(各二两)　防风　官桂　川芎　芍药　麻黄(去节)各一两半

【用法】上为末。每服五钱,水一盏,加大枣一个,煎至八分,去滓温服,以姜粥投之,汗泄为度。

【主治】痛痹,四肢疼痛,拘倦浮肿。

58331 **茯苓汤**

【方源】《三因》卷十一。

【组成】半夏三两(汤洗十次)　茯苓　熟地黄各一两八钱　橘皮　细辛　人参　芍药　川芎　旋覆花　桔梗　甘草(炙)各一两二钱

【用法】上锉散。每服四大钱,水二盏,加生姜七片,煎七分,去滓空腹服。

【主治】忧怒兼并,气攻血溢,停留胃管,嗳闻血腥,呕吐食饮,及妊娠恶阻,中脘宿冷,冷血侵脾,恶闻食气。

【加减】客热烦渴口疮者,去橘皮、细辛,加前胡、知母;肠冷下利者,去地黄,入桂心(炒);胃中虚热,大便秘,小便涩,去地黄,加大黄一两八钱,黄芩六钱。

58332 **茯苓汤**

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】白茯苓(去皮)　泽泻　香附子　橘红　大腹皮　干生姜　桑白皮(细锉,炒)各等分

【用法】上㕮咀。每服五钱,水一盏半,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】脾气不实,手足浮肿,小便秘涩,气急喘满。

58333 **茯苓汤**

【方源】《保命集》卷中。

【组成】白术一两　茯苓(去皮)七钱半

【用法】上㕮咀,水煎一两,食前服。

【主治】①《保命集》:湿泻。②《准绳·类方》:饮食伤泻。

【加减】食入而泻,谓胃中有宿谷也,加枳实五钱;酒入而泻,湿热泻也,加黄芩五钱。

58334 **茯苓汤**

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】生黄芩三分　当归身四分　肉桂　炙甘草各五分　猪苓　茯苓各六分　泽泻一钱　芍药一钱五分　苍术　生姜　升麻　柴胡各二钱。

【用法】上㕮咀,如麻豆大,分作二服。每服水二盏,煎至一盏,去滓,食前稍热服。

【主治】因伤冷饭水泄,一夜走十行,变作白痢,次日其痢赤白,腹中㽲痛,减食,热躁,四肢沉困无力。

58335 **茯苓汤**

【方源】《济生》卷三。

【异名】六味茯苓汤(《景岳全书》卷五十四)。

【组成】半夏(汤泡七次)　赤茯苓(去皮)　橘红各一两　枳实(去瓤,麸炒)　桔梗(去芦)　甘草(炙)各半两

【用法】上㕮咀。每服四钱,水一盏半,加生姜七片,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】支饮,手足麻痹,多睡眩冒。

58336 **茯苓汤**

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】白茯苓

【用法】上为细末。每服二钱,煎乌梅、陈艾汤调下。

【主治】虚汗,盗汗。

58337 **茯苓汤**

【方源】《得效》卷四。

【组成】半夏一两(汤洗七次)　茯苓　熟地黄各二两　橘皮　细辛　人参　芍药　川芎各一两二钱

【用法】上锉散。每服四大钱,水二盏,加生姜七分,煎七分,去滓空腹服。

【主治】忧怒并气攻,血溢停留胃管,嗳闻血腥,呕吐饮食及妊娠恶阻,中脘宿冷,冷血侵脾,恶闻食气。

58338 **茯苓汤**

【方源】《普济方》卷三十五。

【组成】茯苓　厚朴各四两　槟榔　白术各二两　生姜十两　(一方有吴茱萸　人参各二两)

【用法】上㕮咀,水九升,煮二升七合,绞去滓,分温三服,每服约去如人行七八里。须利,加槟榔末一两五钱,汤欲热时入之,三日服一剂,屡服五六剂,可则停。

【主治】心头气结,连胸脐皆痛,及吐酸水,

日夜不止。

【宜忌】忌酢物、桃、李、雀肉。

58339 **茯苓汤**

《普济方》卷一三一。为《圣惠》卷九“赤茯苓汤”之异名。见该条。

58340 **茯苓汤**

【方源】《普济方》卷三四一。

【组成】赤茯苓 白术 郁李仁 杏仁 旋覆花各一两 槟榔五枚（锉）

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎至七分，去滓空心服。

【主治】妊娠小便不通。

58341 **茯苓汤**

【方源】《普济方》卷三七八。

【组成】茯苓二分 蚱蝉三个（炙） 雀瓮二个（炙） 蛇蜕皮半分 铁精 芍药 麻黄（去节） 黄耆 柴胡 当归 人参各一分

【用法】上切。以水三升，先煮麻黄十沸，去沫，纳诸药，煮一升五合，分为四服，百日儿一日服尽。

【主治】少小滞实不去，内有热，摇头弄舌，欲作痫。

58342 **茯苓汤**

【方源】《普济方》卷三七八。

【组成】茯苓 黄芩 钩藤 大黄各一分

【用法】上切。以水一升，煮三合，为三服或五服。多者加黄芩一分；生三七以后者，加大黄一分。

【主治】儿生七日后，有热欲作痫。

58343 **茯苓汤**

《普济方》卷三九三。即《圣济总录》卷一七五“理中茯苓汤”。见该条。

58344 **茯苓汤**

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】白茯苓（去皮） 桔梗（去芦） 天花粉（净） 半夏（汤泡） 甘草

【用法】上锉。生姜、麦门冬煎服。

【主治】痘疮痰盛。

58345 **茯苓汤**

【方源】《痈疽验方》。

【组成】赤茯苓 桃仁（去皮尖）各一钱 甜瓜子（研） 芒消 大黄（炒）各二钱 牡丹皮二钱半

【用法】作一剂。水二钟，煎一钟，食前服。

【主治】肠痈。

58346 **茯苓汤**

《校注妇人良方》卷六。为《外台》卷八引《延年秘录》“茯苓饮”之异名。见该条。

58347 **茯苓汤**

【方源】《万氏女科》卷二。

【组成】白茯苓 白术 陈皮 香附 乌药各一钱 炙草五分 紫苏茎叶五分 木瓜三片

【用法】生姜为引，水煎，空心服。

【主治】子气。孕妇自六七个月以来，两足肿大，行步艰难，脚指间有黄水出。

58348 **茯苓汤**

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】当归 川芎 白芍药（炒） 熟地黄 白术（土炒） 茯苓 泽泻 黄芩 栀子（酒炒） 甘草（炙） 厚朴（姜汁炒） 麦门冬（去心）

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】妊娠七八个月前后，面目四肢浮肿。

58349 **茯苓汤**

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】薏苡仁 皂角刺 木瓜 白芷 当归尾 生地黄 川牛膝 白芍药 黄柏 防风各一两 大皂角 川椒 红花各五钱 甘草节 羌活各七钱 金银花二两

【用法】上锉作十剂。每一剂和土茯苓四两同煎，空心服。

【主治】远年久日一切杨梅天泡疮毒，甚至腐烂肌肉，流脓出汁，臭不可闻，痛不可忍。

【宜忌】忌茶。

58350 **茯苓汤**

【方源】《回春》卷八。

【组成】土茯苓四两(捣汁)　桔梗　防风各一两　乳香　没药各五分

【用法】上锉,水五碗,煎至三碗,温服,一日服尽。

【主治】杨梅疮。

【宜忌】忌茶水、铁器。

58351　**茯苓汤**

【方源】《医学正印》。

【组成】茯苓　阿胶　吴茱萸　麦冬　人参　芍药　白术各一钱　甘草五分　生姜三片

【用法】上锉。每用水二钟,煎一钟,入胶再煎二沸,看胶烊,放温,空心服,滓再煎,饥时服。

【主治】妊娠卒惊与举重腰痛,腹满与胞急,卒有所下。

58352　**茯苓汤**

《嵩崖尊生》卷七。为《伤寒论》"茯苓甘草汤"之异名。见该条。

58353　**茯苓汤**

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】麦冬　茯苓　半夏　陈皮　白术各一钱半　人参　甘草各一钱　乌梅半个

【用法】加生姜,水煎服。

【主治】霍乱烦渴,兼小便不利。

58354　**茯苓汤**

【方源】《冯氏锦囊秘录》卷四。

【组成】柴胡　麦门冬(去心)　人参　赤茯苓　甘草　黄芩

【用法】加小麦二十粒,竹叶三片,水煎服。

【主治】婴孩温壮,伏热来去。

58355　**茯苓汤**

【方源】《不居集》上集卷十九。

【组成】茯苓　白术(炒)各五钱

【用法】水煎服。

【主治】欲火甚梦遗。

58356　**茯苓汤**

【方源】方出《临证指南医案》卷八,名见《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】冬桑叶　谷精草　望月砂　苡仁　通草　绿豆皮　茯苓

【用法】水煎服。

【主治】热蒸湿郁,暑入气阻,目病。

58357　**茯苓汤**

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】土茯苓二分(用石打碎)　猪胰子一个(去油)

【用法】水四升,入药熬成二升,去滓用汁,再对入好酒二斤。再入金银花、生地、桔梗、当归各五钱,熬成二升,渣再煎减半,服之。

【主治】杨梅疮。

58358　**茯苓汤**

【方源】《医部全录》卷四四二。

【组成】茯苓　川芎　鳖甲(炙)　枳壳(炙)　芍药各二分　柴胡四分

【用法】上锉。以水一大升三合,煎至三合,空心为二服,去如人行五六里再服。

【主治】小儿闪癖,身体壮热,频服冷药,冷气漫心成癖,下焦又冷,肠结,大便难。

【宜忌】忌苋子。

58359　**茯苓汤**

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】半夏　陈皮　茯苓　甘草　香附　益智仁　人参各一钱　乌梅一个　竹沥二匙　生姜汁二匙

【用法】水煎服。

【主治】素多痰饮,心肾不交,健忘。

58360　**茯苓汤**

《治疫全书》卷三。为《瘟疫论》卷下"四苓汤"之异名。见该条。

58361　**茯苓汤**

【方源】《疝癥积聚》。

【组成】茯苓五分　陈皮　附子　白术各二分　半夏　吴茱萸各一分

【用法】水煎,临服加姜汁一匙,温服。

【主治】诸疝,呕吐不止,饮不纳。

58362　**茯苓汤**

【方源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】人参　甘草　山药　当归　茯苓　桂心　麦冬　远志　大枣　生姜

【主治】产后心虚。

58363　**茯苓汤**

【方源】《竹林女科》卷二。

【组成】赤茯苓　熟地黄各一铢　半夏(制，炒黄)一钱半　旋覆花　人参　白芍(炒)　川芎　桔梗　甘草(炙)　橘红各七分

【用法】加生姜七片，水煎服。

【主治】妊娠禀受怯弱，受胎一月，便有阻病，颜色如故，脉息和顺，但觉肢体沉重，头目昏眩，择食，或作寒热，呕吐痰水，恍惚不能支持。

58364　**茯苓汤**

【方源】《易简方便》卷六。

【组成】茯苓　川芎　苏叶　前胡　半夏(制)　桔梗　枳壳　干姜　陈皮各八分　当归　生地　白芍各一钱　台党五分　桑白皮六分　甘草三分

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】经来咳嗽，喉中出血，及肺经枯燥。

58365　**茯苓汤**

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】白术(净)二钱　茯苓三钱　郁李仁(杵)一钱五分

【用法】加生姜汁，水煎服。

【主治】水肿。

58366　**茯苓汤**

【方源】《顾氏医镜》卷五。

【组成】茯苓　远志　菖蒲　竹黄　姜汁　竹沥

【主治】小儿喜惊易悸，痰热内盛。

58367　**茯苓苏**

【方源】《千金》卷二十七引彭祖方。

【组成】茯苓五斤(灰汁煮十遍，浆水煮十遍，清水煮十遍)　松脂五斤(煮如茯苓法，每次煮四十遍)　生天门冬五斤(去心皮，晒干作末)　牛酥三斤(炼三十遍)　白蜜三斤(煎令沫尽)　蜡三斤(炼三十遍)

【用法】上六味，各捣筛，以铜器重汤上，先纳酥，次蜡，次蜜，消讫，纳药，急搅之勿住，务令大均，纳瓷器中，蜜封之，勿泄气，先一日不食，欲不食先须吃好美食，令极饱，然后绝食，即服二两，二十日后服四两，又二十日后八两；细丸之，以咽中下为度。第二度以四两为初，二十日后八两，又二十日二两。第三度服以八两为初，二十日二两，又二十日四两，合一百八十日，药成自后服三丸将补，不服亦得，恒以酥蜜消息之，美酒服一升为佳。

【功用】养性。

58368　**茯苓饮**

【方源】《外台》卷八引《延年秘录》。

【异名】外台茯苓饮(《金匮》卷中附方)、茯苓饮子(《鸡峰》卷十八)、茯苓汤(《校注妇人良方》卷六)。

【组成】茯苓三两　人参二两　白术三两　生姜四两　枳实二两(炙)　橘皮一两半(切)

【用法】上切，以水六升，煮取一升八合，去滓，分三次温服，如人行八九里进之。

【功用】消痰气，令能食。

【主治】心胸中有停痰宿水，自吐水出后，心胸间虚气满，不能食。

【宜忌】忌酢物、桃、李、雀肉。

【方论选录】《金鉴》：上、中二焦气弱，水饮入胃，脾不能输归于肺，肺不能通调水道，以致停积为痰，为宿水。吐之则下气因而上逆，虚与气结，满不能食，当补益中气，以人参、白术为君；茯苓逐宿水，枳实破诸气为臣；开脾胃，宣扬上焦，发散凝滞，则陈皮，生姜为使也。其积饮既去，而虚气塞满其中，不能进食，此证最多。

58369　**茯苓饮**

【方源】《外台》卷十八引《延年秘录》。

【异名】茯苓饮子(《鸡峰》卷四)。

【组成】茯苓三两　紫苏叶三两　杏仁三两　橘皮三两　升麻三两　柴胡三两　生姜四两　犀角二两(屑)　槟榔十二枚(并皮子，碎)

【用法】上切。以水八升,煮取二升五合,去滓,分三次温服,如人行八里久。

【主治】脚气肿,气急上气,心闷热烦,呕逆不下食。

【宜忌】忌醋物。

58370　**茯苓饮**

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】白茯苓(去黑皮)　远志(去心)各二两半　芍药　防风(去叉)各一两半　桂(去粗皮)二两　甘草(炙)一两一分

【用法】上为粗末。每服六钱匕,水二盏,加大枣一个,生姜一枣大,拍碎,煎至一盏,去滓,入铁粉一字,搅匀,食后服,日二夜一。

【主治】风痫,因虚羸气弱,惊悸多梦心神不定。

58371　**茯苓饮**

【方源】《圣济总录》卷三十三。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　鳖甲(去裙襕,醋炙)　地骨皮各二两　柴胡(去苗)　知母(焙)各一两半　枳壳(去瓤,麸炒)一两

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,以水一盏半,煎取七分,去滓,入生地黄汁一合,食后良久温服,如人行五六里再服。

【主治】伤寒后,寒热不退,成疟时作。

58372　**茯苓饮**

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】赤茯苓(去黑皮)二两　泽泻　干姜(炮)各一两　白术　桂(去粗皮)　甘草(炙)各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎至一盏,去滓空腹频呷,一日三次。

【主治】胃反吐逆,发渴饮水。

58373　**茯苓饮**

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　桑根白皮(炙,锉)　防己　羚羊角(镑)　郁李仁(汤浸,去皮尖)　木香各二两　槟榔(碎)五枚　红雪二两半(旋入)

【用法】上药,除红雪外,为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎取七分,绞去滓,纳红雪二钱匕,空腹温服。当快利三二行,须隔日服。

【主治】脚气。两脚肿至膝,小腹引痛,膀胱急,宿水不宣,时复心闷,夜卧恍惚,昏热惊悸。

58374　**茯苓饮**

《圣济总录》(文瑞楼本)卷一三六。即原书同卷(人卫本)"茯苓散"。见该条

58375　**茯苓饮**

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】白茯苓(去黑皮)　当归(微炙)　芍药　甘草(炙)各一两　桂(去粗皮)一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎七分,去滓,空心温服。

【主治】妇人月水不调,腰腹疼痛。

58376　**茯苓饮**

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】白茯苓(去黑皮)　防风(去叉)　人参　白术　枳壳(去瓤,麸炒)　生姜各半两　甘草一分(炙)

【用法】上锉,如麻豆大。分为二剂。每剂以水四盏,煎取一盏半,去滓,分二次食前温服,如人行三五里再服。

【主治】妊娠阻病,心中烦闷,头眩重,憎闻食气,闻便呕逆,四肢重不自持。

58377　**茯苓饮**

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　白术各二两　杏仁(去皮尖双仁,炒黄)　旋覆花各一两　黄芩(去黑心)一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎七分,去滓,空心、食前温服,一日二次。

【主治】妊娠胎间水气,子满体肿。

58378　**茯苓饮**

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】白茯苓(去黑皮)一两一分　人参一两半　厚朴(去粗皮,生姜汁炙,锉)一两半　桔梗(炒)一两　榉皮(炙)一两

【用法】上为粗末。每服一钱匕,水半盏,煎

至三分，分二服，去滓，食前温服，一日二次。

【主治】小儿冷痢白脓。

58379 **茯苓饮**

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】赤茯苓（去黑皮）二两 白术（炒令香） 甘草（炙令赤） 栝楼根（锉碎） 人参 桂（去粗皮）各一两 黄芩（去黑心）二两 枳壳（去瓤，麸炒令黄）一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水三盏，煎至一盏半，去滓，空心、晚食前温服。

【主治】乳石发动，烦热，身体微肿，不能食饮，小便不利。

58380 **茯苓面**

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】白茯苓五斤（去黑皮，细锉） 甘草五两（细锉）

【用法】上药以水六斗，先煎甘草至三斗，去渣澄清，却入釜中，纳白蜜三升，好牛乳九升，相和，以慢火煎茯苓，令乳蜜汁尽，出之，及热，按令散，拣择去赤筋，又熟挼令如面，阴令极干。初服三钱，以水调下，稍稍任性加之，每日四五次。

【功用】养性。

【宜忌】忌食米醋物。

58381 **茯苓饼**

【方源】《回春》卷八。

【组成】防风 人参 五加皮 白鲜皮 当归 川芎 丁皮 木瓜 皂角刺 海桐皮 乳香 没药 金银花 甘草各一钱 土茯苓半斤

【用法】上为细末，将药末四两对麦面四两，水和一处作饼，焙干熟用，不拘时候，外将细粗末煎作汤饮。以疮好为度。

【主治】远近顽疮，烂不敛口。

58382 **茯苓酒**

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】茯苓粉

【用法】同曲、米酿酒饮之。

【功用】暖腰膝。

【主治】头风虚眩，五劳七伤。

58383 **茯苓粉**

【方源】《遵生八笺》卷十一。

【组成】茯苓（切片）

【用法】上药，以水浸去赤汁，又换水浸一日，如上法取粉，拌水煮粥。

【功用】补益。

58384 **茯苓酥**

【方源】《千金翼》卷十二。

【组成】茯苓（取山之阳茯苓，其味甘美，山之阴茯苓，其味苦恶，拣得之，勿去皮，刀薄切，晒干，蒸令气溜，以汤淋之，其色赤味苦，淋之不已，候汁味甜便止，晒干捣筛）三斗

【用法】取好酒大斗一石，蜜一斗，和茯苓末令相得，纳一石五斗瓮中，熟搅之百遍，蜜封之，勿令泄气。冬月五十日，夏月二十一日，酥浮于酒上，接取酥，其味甘美如天甘露，可作饼，如手掌大，空屋中阴干，其色赤如枣。饮食一饼，终日不饥。

【功用】除万病，久服延年。

【宜忌】《圣惠》：忌食米醋。

58385 **茯苓散**

【方源】《外台》卷十七引《素女经》。

【组成】茯苓 钟乳（研） 云母粉 石斛 菖蒲 柏子仁 菟丝子 续断 杜仲 天门冬（去心） 牛膝 五味子 泽泻 远志（去心） 甘菊花 蛇床子 薯蓣 山茱萸 天雄（炮） 石韦（去毛） 干地黄 苁蓉各等分

【用法】上为散。每服方寸匕，以酒下，一日二次。二十日知，三十日病悉愈，百日以上体气康强。

【功用】长生延年，老而更壮。

【宜忌】忌酢物、羊肉、饧、鲤鱼、猪肉、芜荑。

58386 **茯苓散**

【方源】《圣惠》卷十一。

【异名】赤茯苓汤（《活人书》卷十八）。

【组成】赤茯苓一两 半夏半两（汤洗七遍

去滑) 陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙) 芎䓖半两 白术半两 人参一两(去芦头)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒后呕哕,心下痞满,胸膈间宿有停水,头眩心悸。

58387 **茯苓散**

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】白茯苓一两 人参一两(去芦头) 白芍药一两半 甘草一两(炙微赤,锉) 羚羊角屑一两 防风一两(去芦头) 黄耆一两(锉) 桂心半两 芎䓖一两 麦门冬一两(去心) 地骨皮三分 磁石一两半(捣碎,水淘,去赤汁) 当归一两 牛膝一两(去苗) 五味子一两

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,空腹及晚食前温服。

【主治】肾劳。虚损羸乏,咳逆短气,四肢烦疼,耳鸣,骨间热,小便赤色,腰脊疼痛无力。

58388 **茯苓散**

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】白茯苓二两 黄耆二两(锉) 牛膝一两(去苗) 附子二两(炮裂,去皮脐) 人参一两(去芦头) 白芍药一两 白术一两 石斛一两(去根) 当归一两 沉香一两 桂心一两 芎䓖一两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】肉极。坐卧不安,寒气所加,体重怠堕,四肢不举,关节疼痛,饮食无味。

58389 **茯苓散**

【方源】方出《圣惠》卷二十七,名见《普济方》卷二三三。

【组成】酸枣仁(微炒) 白茯苓 麦门冬(去心,焙) 白芍药 紫苏茎叶 黄耆各(锉)三两 人参(去芦头) 陈橘皮(汤浸,去白瓤,焙) 甘草(炙微赤,锉)各三分

【用法】上为散。每服三钱,以木一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】虚劳烦热,四肢疼痛,不得睡卧。

58390 **茯苓散**

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】赤茯苓一两 麦门冬一两(去心) 生干地黄一两 人参一两(去芦头) 前胡二两(去芦头) 枳实一两(麸炒微黄) 赤芍药一两 甘草半两(炙微赤,锉) 射干一两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】虚劳,每唾稠粘,咽喉不利。

58391 **茯苓散**

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】赤茯苓一两 半夏三分(洗七遍去滑) 枳壳三分(麸炒微黄,去瓤) 前胡一两(去芦头) 羚羊角屑三分 人参三分(去芦头) 槟榔一两 木香半两 桂心半两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】脚气。心胸痰壅,呕逆,不欲饮食。

58392 **茯苓散**

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】赤茯苓一两 枳壳一两(麸炒微黄,去瓤) 木香半两 木通三分(锉) 大黄二两(锉碎,微炒) 诃黎勒皮一两 槟榔一两 桔梗三分(去芦头) 茎叶一两 鳖甲二两(涂醋,炙令微黄,去裙襕) 桂心半两

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】脚气。心腹胀满,两胁妨闷,不能饮食。

58393 **茯苓散**

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】赤茯苓三两 白术一两 葵子一合 赤芍药一两 木通二两(锉) 榆皮三两(锉) 白茅根一握(锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,人葱白三茎,煎至六分,去滓,食前温服。以利为度。

【主治】气淋。小腹胀闷,脐下时时切痛。

58394 **茯苓散**

【方源】《圣惠》卷七十七。

【组成】白茯苓 桔梗(去芦头) 生干地黄 人参(去芦头) 桂心 当归(锉,微炒) 钩藤 独活 桑寄生 赤芍药(炙微赤,锉) 石膏各一两

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】惊胎。妊娠因用力执作,觉胎动,心腹急痛,面青,汗水,头仰,气喘欲绝。

58395 **茯苓散**

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】白茯苓一两 栀子仁一两 黄芩一两 人参一两(去芦头) 甘草半两(炙)

【用法】上为散。每服二钱,水一中盏,加青竹茹一分,煎至八分,去滓,食后、临卧温服。

【主治】心脏实热,惊悸喜笑,神识不安。

58396 **茯苓散**

【方源】《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》。

【组成】赤苓一两 桂心一两 甘草半两(炙)

【用法】上为末。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至五分,去滓热服,不拘时候。

【主治】伤寒太阳汗出不渴者,凡发汗太过,故令大小便难。

58397 **茯苓散**

【方源】《苏沈良方》卷六。

【组成】坚白茯苓

【用法】上为末。每服五钱,空心、食前、临卧温水调下,一日四五次。

【功用】《普济方》:大补益,缩小便。

【主治】①《苏沈良方》:梦中遗泄。②《普济方》:肾气不能摄精,心不能摄念,或梦而泄者,或不梦而泄者。

58398 **茯苓散**

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】赤茯苓(去黑皮) 茯神(去木)各一两 人参 远志(去心) 海金沙各半两

【用法】上为细散。每服二钱匕,食后、临卧煎瞿麦汤调下。

【主治】上焦风热壅盛,头目眩运,烦躁饮水,小肠结涩。

58399 **茯苓散**

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】赤茯苓(去黑皮)三两 桂(去粗皮) 麻黄(去节) 甘草(炙,锉)各一两

【用法】上为散。每服三钱匕,新汲水调服,不拘时候。

【主治】疟病但热不寒,遍身发黄,小便涩滞。

58400 **茯苓散**

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】白茯苓(去黑皮)三分 远志(去心) 人参 麦门冬(去心,焙) 白僵蚕(炒) 羚羊角(镑) 菊花各半两 甘草(炙,锉) 牛黄(研) 铁粉(研)各一分

【用法】上为散。每服二钱匕,食后煮竹沥汤调下,或薄荷熟水下。

【主治】心虚惊悸。

58401 **茯苓散**

《圣济总录》卷五十九。为《圣惠》卷五十三"升麻散"之异名。见该条。

58402 **茯苓散**

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】赤茯苓(去黑皮)三两 葶苈(纸上炒)半两 人参 防风(去叉) 泽泻 甘草(炙,锉) 桂(去粗皮) 白术 狼毒(锉,醋炒) 蜀椒(去目并闭口者,炒出汗) 干姜(炮) 赤小豆(炒)各一两 大戟半两 肉苁蓉(酒浸,切,焙) 猪苓(去黑皮) 女萎各三分

【用法】上为散。每服一钱匕,温酒调下,日二次,夜一次。小便利为度。

【主治】脚气肿满。

58403 **茯苓散**

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【组成】赤茯苓(去黑皮)三两

【用法】上为散。每服二钱匕,冷水调下。如男子小便中有余沥、漏精、梦泄,用温酒调下,空心服妙。

【主治】饮水过多,心闷着热,小便不通,男子小便中有余沥,漏精,梦泄。

58404　**茯苓散**

【方源】《圣济总录》卷一二三。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　贯众　缩砂仁　甘草(炙)各一两

【用法】上为细散。每用一钱匕,掺喉中,以水送下。

【主治】喉中生谷贼,结肿疼痛,饮食妨闷。

58405　**茯苓散**

【方源】《圣济总录》(人卫本)卷一三六。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　郁李仁(去皮)　赤芍药各一两半　大腹二个(并子)　百合　柴胡(去苗)　桑根白皮(锉)　陈橘皮(汤浸,去白,焙)　枳壳(去瓤,麸炒)　知母(锉,焙)各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水二盏,煎至一盏,去滓,入芒消末一钱匕,更煎沸,分二次温服,空心、夜卧各一次。

【主治】风气攻头面浮肿,烦渴,心中躁闷,肚腹胀满,小便秘涩。

【备考】本方方名,原书文瑞楼本作"茯苓饮"。

58406　**茯苓散**

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】白茯苓(去黑皮)　木香　杜仲(切,炒)　菖蒲　熟干地黄(焙)　柏子仁(研)秦艽(去苗土)　菟丝子(酒浸,别捣,焙干)　青橘皮(汤浸,去白,焙)　诃黎勒皮(炮)　赤石脂　当归(切,焙)　五加皮(锉)　牛角䚡(烧灰)　乌贼鱼骨(去甲)　艾叶灰(烧存性)各一两

【用法】上为散。每服二钱匕,糯米饮调下,温酒亦得,空心、食前服,一日三次。

【主治】①《圣济总录》:妇人血海不调,因虚冷成积,月水不绝,及赤白带下,面色萎黄。②《妇人良方》引《博济》:腰脚沉重,胎气多损。

58407　**茯苓散**

《圣济总录》卷一五七。为《金匮》卷下"葵子茯苓散"之异名。见该条。

58408　**茯苓散**

【方源】《圣济总录》卷一五七。

【组成】白茯苓(去黑皮)　人参　黄耆(薄切)　酸石榴皮(切,炒)　陈橘皮(去白,炒)　甘草(炙)各一两

【用法】上为细散。每服二钱匕,热酒调,温服,米饮亦得,不拘时候。

【主治】妊娠胎月未足,气血未充,辄堕胎者,其血伤动,下而不止,虚烦困倦。

58409　**茯苓散**

【方源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】赤茯苓(先用水煮三十沸,晒干)四两　菊花二两　钟乳(取如鹅管、蝉翼光明者,先入银器中放在五六斗釜中,乃添水于釜内九分,釜底燃火令如鱼目沸三复时,每一复时,换水净洗刷后添水,慢火煎令鱼目沸,日足取出,入乳钵内,研极细,人水少许,更研如稀糊,乃取澄晒干,更研如粉)一两　云母(取黄白光明者,簇于大方砖上,以炭火七斤,煅通赤,从旦至暮取出,去灰,为末,入绢袋于大盆中摆之按揉,令水内澄取出晒干,更研如粉)一两　菖蒲(九节者,米泔浸三复时,逐日换泔,日足,切,晒干)　栝楼根　赤石脂(研如粉,水飞过,晒干,更研)　山茱萸(微炒)　防风(去叉)　牛膝　菟丝子(酒浸三日,控干捣末)　熟干地黄(焙)　续断　杜仲(去粗皮,炙)　山芋　蛇床子(微炒)　柏子仁　天雄(炮裂,去皮脐)　桂(去粗皮)　肉苁蓉(酒浸,去皴皮,切,焙)　牡丹皮　人参　天门冬(去心,焙)　石斛(去根节)　白术　石长生(去根节,微炙)　牡蒙　附子(炮裂,去皮脐)　苦参　玄参(水洗,麸炒焦)　独活(去芦头)牡荆子　狗脊(去毛)　紫菀(水洗,去土,

晒干） 干姜（炮裂） 黄耆（炙，锉） 泽泻 甘草（水蘸，炙） 芍药 巴戟天（去心） 沙参 远志（去心，焙） 石南叶（暖水流控干，炙）牡蛎（捣末，水和作团，转飞取晒干）各半两

【用法】上为散。每服一钱匕，温酒调下，一日三次，空心、日午、近晚各一次。二十日见效，四十五日诸疾并愈，一年可还童。

【功用】还精补脑，长生驻颜，却老延年。

58410 茯苓散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】五味子 阿胶 茯苓各半两 黄耆一两

【用法】上为细末，米饮调下，不拘时候。

【主治】①《鸡峰》：血淋。②《普济方》引《十便良方》：血淋不可进凉药者。

【备考】《普济方》引《十便良方》本方用法：每服二钱。

58411 茯苓散

【方源】《本事》卷四。

【组成】郁李仁（去皮尖，微炒）四钱 槟榔二个 赤茯苓（去皮） 白术 甘遂（切片，炒）各一钱 橘皮一钱半（去白）

【用法】上为细末。每服一钱，姜、枣汤调下。

【主治】肿满，小便不利。

【方论选录】《本事方释义》：郁李仁气味辛平而润，入手、足太阴、阳明；槟榔气味苦辛温，入足太阴、太阳，能消积气；赤茯苓气味甘平，淡渗，入阳明；白术气味甘温微苦，入足太阴；甘遂气味苦寒，入足太阳，泄水之圣药；橘皮气味苦辛微温，入手太阴。此因湿邪肿满，小溲不利，故用分消群剂，使水气下泄，惟恐土衰，水不能去，以术培土，姜、枣和营卫，则溺得通利，岂有不奏绩耶。

58412 茯苓散

【方源】《宣明论》卷八。

【异名】槟榔散（《普济方》卷一九二引《医方集成》）。

【组成】芫花（醋拌，炒） 泽泻 郁李仁 甜葶苈 汉防己 藁本各三钱半 陈皮（去白） 白茯苓 白槟榔 瞿麦各半两 滑石 大戟各七钱半

【用法】上为末。每服三钱，桑白皮煎汤，空心调下，取下碧绿水如烂羊脂为度。

【主治】诸般气肿。

【宜忌】忌盐食百日。

【备考】方中茯苓原脱，据《袖珍》补。

58413 茯苓散

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】白茯苓（去皮）二两 缩砂仁一两

【用法】上为细末，入盐二钱，用精羊肉批作大片，掺药在上，炙熟。空心食之，然后饮酒一二盏。

【主治】梦中虚滑遗精。

58414 茯苓散

【方源】《卫生总微》卷七。

【组成】赤茯苓一两 陈皮三分 桔梗（去芦）一两 甘草（炙）半两

【用法】上为末。每服一钱，水六分，加生姜二片，煎至四分，温服，不拘时候。

【功用】调中养胃。

【主治】伤寒数日，胸膈不利。

58415 茯苓散

《魏氏家藏方》卷十。为《圣济总录》卷一七四“茯苓汤”之异名。见该条。

58416 茯苓散

【方源】《妇人良方》卷十九。

【组成】茯苓（一方使茯神） 生地黄十二分 远志 白薇 龙齿各十分 防风 人参 独活各八分（同为末）

【用法】上以银一大斤，水一斗五升，煎取七升，下诸药，煎取三升，分三次温服。

【主治】产后狂语，志意不定，精神昏乱，心气虚，风邪所致。

【宜忌】忌菘菜、猪肉、生冷。

58417 茯苓散

【方源】方出《妇人良方》卷十九，名见《校

注妇人良方》卷十九。

【组成】人参　甘草　芍药　当归　生姜各八分　远志　茯苓各十分　桂心六分　麦门冬　大枣各十二分

【用法】上为散。以水八升，煮取三升，去滓，分三次温服。

【主治】①《妇人良方》：产后心虚，忪悸不定，乱语错误，精神恍惚不主。②《校注妇人良方》：产后健忘少睡，或自汗盗汗。

58418　茯苓散

【方源】《直指小儿》卷四。

【组成】京三棱　蓬莪术(煨)　缩砂仁　赤茯苓各半两　青皮　陈皮　滑石　甘草(微炙)各二钱半

【用法】上为末。每服一钱，麦门冬、灯心煎汤调下。

【主治】小儿尿如白米泔状，由乳哺失节，有伤于脾，致使清浊不分而色白也，久则成疳，亦心膈伏热兼而得之。

58419　茯苓散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】白茯苓一两(去皮)　细辛(去苗)　香白芷各一两　寒水石(生用，研)四两

【用法】上为细末。每用少许擦牙痛处，含口良久，吐去津，然后用温水漱之，不拘时候。

【主治】牙齿疼及牙龈肿痛。

58420　茯苓散

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】赤茯苓一两　槟榔三钱　桂心　大腹皮　川茴香(炮，炒)　良姜各五钱

【用法】上为细末。每服五钱，沸汤点服。

【主治】伤寒汗下后，脐下有动气者。

58421　茯苓散

【方源】《急救仙方》卷三。

【组成】茯苓　人参　芍药　山栀子　甘草　紫苏　麦门冬　瞿麦各一两　连翘二两

【用法】上㕮咀。水煎服。

【主治】老人赤眼不退。

58422　茯苓散

【方源】《眼科龙木论》卷七。

【组成】白附子　玄参各五钱　白茯苓七钱五分　川续断　白僵蚕

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一钟半，煎至半钟，去滓温服。

【主治】小眦赤。

58423　茯苓散

【方源】《普济方》卷三七四引《傅氏活婴方》。

【组成】茯苓　牙消　雄黄　朱砂各半两

【用法】上为末。金银薄荷汤调下。

【主治】惊风偏搐。

58424　茯苓散

【方源】《永乐大典》卷八〇二〇引《普济经验加减方》。

【组成】茯苓(去皮)　茯神　人参(去芦头)　远志(去心)　甘草各七钱半　龙骨　防风各半两　麦门冬(去心)　生地黄　犀角各一两(末)

【用法】上为末，分作三服，水一升半，煎至一升，三次服。

【主治】骨蒸热劳，多嗽喘。

58425　茯苓散

《普济方》卷三十三。为《普济方》卷二一六引《十便良方》"白茯苓散"之异名。见该条。

58426　茯苓散

【方源】《普济方》卷三十三。

【异名】锁阳丹。

【组成】茯苓　猪苓　木馒头(去皮子)各等分　(一方不用猪苓)

【用法】上为末。每服二钱，用米饮调下。

【主治】泄精，膀胱疾。

58427　茯苓散

《普济方》卷四十三。为《伤寒论》"茯苓桂枝白术甘草汤"之异名。见该条。

58428　茯苓散

《普济方》卷六十五。为《圣济总录》卷一一九"茯神散"之异名。见该条。

58429　茯苓散

《普济方》卷一六六。为《金匮》卷中"小半夏加茯苓汤"之异名。见该条。

58430 **茯苓散**

《普济方》卷二〇六。为《圣济总录》卷六十三"茯苓汤"之异名。见该条。

58431 **茯苓散**

【方源】《普济方》卷二一二。

【组成】茯苓 干姜 黄连各等分

【用法】上为细散，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，渐增之，一日渐增至百丸，米饮送下。以愈为度。

【主治】下痢三十年者。

【加减】若痢剧者，加龙骨、附子（炮），还令等分。

【备考】本方方名，据剂型，当作"茯苓丸"。

58432 **茯苓散**

《普济方》卷二四四。即《圣惠》卷四十五"赤茯苓散"。见该条。

58433 **茯苓散**

【方源】《普济方》卷三五一。

【组成】茯苓 人参 当归 甘草各六分 生姜 陈皮各四分 厚朴八分

【用法】上㕮咀。以水二升，煎取八合，去滓温服。

【主治】产后腹痛气胀，胁下闷，不食兼微利。

58434 **茯苓散**

【方源】《普济方》卷三五三。

【组成】茯苓 远志 人参 麦门冬 桂心 生地黄 当归 龙齿 白芍药 羚羊角各等分

《用法》 上为粗末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，大枣一个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后脏虚，心中惊悸，志意不定，言语错乱，不自觉知。

58435 **茯苓散**

【方源】《普济方》卷三九四。

【组成】藿香 甘草 人参 半夏 白茯苓 丁香 陈皮各等分

【用法】上为末。每服一钱，藿香叶三寸，葱白一寸，同煎服。

【主治】胃寒呕吐。

58436 **茯苓散**

【方源】《医统》卷二十。

【组成】茯苓 麦门冬 通草 升麻各八分 紫菀 知母各一钱 桂心四分 赤石脂 淡竹叶十片，大枣二个

【用法】水二盏，煎八分，温服。

【主治】心经实热，口干烦渴，眠卧不安。

58437 **茯苓散**

【方源】《明医指掌》卷九。

【组成】人参一钱（去芦） 甘草（炙）一钱 山药一钱 当归一钱（炒） 白茯苓八分 桂心五分 麦冬一钱 远志二钱（去心） 大枣二枚 生姜五钱

【用法】上锉，水二盏，煎一盏服。

【主治】产后心虚，忪忡不定，恍惚多惊。

58438 **茯苓散**

【方源】《冯氏锦囊秘录》卷十八。

【组成】茯苓一两 当归 川芎 桂心 白芍 黄耆 人参 熟地各五钱

【用法】水二钟，加猪肾一双，去脂膜细研，加生姜三片，大枣二个，同煎一钟，去肾、生姜、大枣，加没药五分，煮取七分，去滓，食前分二次温服。

【主治】产后蓐劳。生产日浅，运动用力，四肢寒痛，寒热如疟。

58439 **茯苓粥**

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】赤茯苓一两 麦门冬一两（去心） 粟米二合

【用法】上锉细，先以水二大盏半，煎至一盏半，去滓，下米煮作粥，温食。

【主治】心胸结气，烦闷恐悸，风热惊邪口干。

58440 **茯苓粥**

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【异名】白茯苓粥（《长寿药粥谱》引《直

指》)。

【组成】白茯苓(去黑皮,取末)半两　粳米二合

【用法】上药,以米淘净煮粥,米熟即下茯苓末。任意食之,必得睡也。

【功用】《长寿药粥谱》引《直指》:健脾益胃,利水消肿。

【主治】①《圣济总录》:产后无所苦,欲睡而不得睡。②《长寿药粥谱》引《直指》:老年性浮肿,肥胖症,脾虚泄泻,小便不利,水肿。

【宜忌】《长寿药粥谱》引《直指》:老年人脱肛和小便多者不宜服食。

58441　**茯苓煎**

【方源】《千金翼》卷十九。

【组成】茯苓二斤　白蜜四升

【用法】上药于铜器中重釜煎,以二茎薤白为候,黄即煎熟。先食服如鸡子大,一日三次。

【主治】消渴。

58442　**茯苓煎**

《鸡峰》卷十五。为《医心方》卷二十二引《小品方》"茯苓丸"之异名。见该条。

58443　**茯苓煎**

《鸡峰》卷十九。为《千金》卷二十一引《古今录验》"茯苓丸"之异名。见该条。

58444　**茯苓煎**

【方源】《寿亲养老》卷四。

【组成】白茯苓五斤(去黑皮)

【用法】上药治下筛,以熟绢囊盛,于三斗米下蒸之,米熟即止,晒干,又蒸,如此三过,乃取牛乳二斗和合,着铜器中,微火煮如膏,收之。每食以竹刀割取,随性任饱服之,则不饥。如欲食,先煮葵菜汁饮之,任食无碍。

【功用】养老延年。

58445　**茯苓膏**

【方源】方出《千金》卷六,名见《普济方》卷五十一。

【组成】猪蹄二具(治如食法)　白粱米一斗(洗令净。二味以水五斗,合煮猪蹄烂,取清汁三斗,用煮后药)　白茯苓　商陆各五两　萎蕤一两　白芷　藁本各二两

【用法】上㕮咀,以前药汁三斗,并研桃人一升,合煮,取一斗五升,去滓。瓷瓶贮之,纳甘松、零陵香末各一两入膏中,搅令匀,绵幂之。每夜用涂手面。

【功用】令皮肤悦泽白润。

【主治】面多皯黯及手皴。

58446　**茯苓膏**

【方源】《千金》卷二十七。

【异名】仙方凝灵膏(《千金翼》卷十三)、凝灵膏(《圣济总录》卷一九八)、神仙茯苓膏(《圣惠》卷九十四)、辟谷凝灵膏(《普济方》卷二六四)。

【组成】茯苓(净,去皮)　松脂二十四斤　松子仁　柏子仁各十二斤

【用法】上药皆依法炼之,松、柏仁不炼,捣筛,白蜜二斗四升,纳铜器中汤上,微火煎一日一夕,次第下药,搅令相得,微火煎七日七夜止,为丸如小枣大。每服七丸,一日三次。

【功用】①《千金》:轻身明目,不老。②《圣惠》:发白更黑,齿落重生,延年益寿。

58447　**茯苓膏**

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】大白茯苓不拘多少

【用法】上为细末,用水漂去浮者,漂时先令少用水,如和面之状,全药湿方入水漂澄,取下沉者,以净布扭去水,晒干,再为末,再漂再晒,凡三次,复为细末。每末一斤,拌好白蜜二斤令匀,贮长瓷瓶内,箬皮封口置锅内,桑柴火悬胎煮尽一日,抵晚连瓶坐埋五谷内,次早倒出,以旧在上者装瓶下,旧在下者装瓶上,再煮再入五谷内,凡三日夜,次早取出,埋净土中七日,出火毒。每早、晚用三四匙噙嚼,少时以白汤下。

【主治】痰火。

58448　**茯苓膏**

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】当归　白蒺藜　羌活　生地　熟地　甘草(去皮)　连翘　木通各三钱　土茯

苓半斤

【用法】上为粗末，用水五六碗，熬将半，用绢滤去滓，再熬成膏，晾冷。每服一大酒钟，一日三次。轻者五六料，重者十料痊愈。

【主治】杨梅疮，疯毒。

【宜忌】熬药须用砂锅，忌房事、鸡、鱼、牛肉、椒醋发物。

58449 **茯苓糕**

【方源】《回春》卷八。

【组成】土茯苓（去粗皮，为细末）一斤 白蜜一斤 糯米粉一斤

【用法】上药和匀，蒸糕食之。常用茯苓煎服，当茶吃。

【主治】杨梅疮毒。

【宜忌】不可饮茶水。

58450 **茯神丸**

【方源】《古今录验》引陈明进方，见《外台》卷十五。

【异名】定志小丸。

【组成】菖蒲 远志（去心） 茯苓各二分 人参三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服六七丸，一日五次。

【主治】心气不定，五脏不足，甚者忧愁悲伤不乐，忽忽喜忘，朝愈暮剧，暮愈朝发，发则狂眩。

【宜忌】忌酢物、羊肉、饧。

58451 **茯神丸**

【方源】方出《古今录验》引陈明方（见《外台》卷十五），名见《圣济总录》卷十四。

【组成】茯神一两半 牛黄五铢 菖蒲 远志（去心） 茯苓各二分 人参三两

【用法】先将五味为细末，然后入牛黄同研，再罗，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒送下，食后良久及夜卧时服。

【主治】心惊恐，志意不定，五脏不足，甚者忧愁恐惧，悲伤不乐，忽忽喜忘，朝愈暮发，甚则狂眩。

【宜忌】忌醋物、羊肉、饧。

58452 **茯神丸**

【方源】方出《千金》卷十九，名见《鸡峰》卷十二。

【组成】人参 麦门冬 赤石脂 远志 续断 鹿茸各一两半 茯苓 龙齿 磁石 苁蓉各二两 丹参 韭子 柏子仁各一两六铢 干地黄三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，酒送下，一日二次。稍加至三十丸。

【主治】梦中泄精，尿后余沥及尿精。

【备考】《鸡峰》有茯神，无丹参、茯苓。

58453 **茯神丸**

《千金》卷二十一。为《千金》卷二十一（注文）引《集验方》"宣补丸"之异名。见该条。

58454 **茯神丸**

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】茯神一两 人参一两（去芦头） 麦门冬一两（去心，焙） 熟干地黄一两 龙齿一两半（细研如粉） 黄芩一两 防风三分（去芦头） 黄耆三分（锉） 云母粉一两 犀角屑一两 薏苡仁一两 柏子仁一两

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温粥饮调下，不拘时候。

【主治】心脏风虚，惊悸心忪，常多健忘。

58455 **茯神丸**

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】茯神一两 麦门冬一两（去心，焙） 羚羊角屑 栀子仁 白鲜皮 川升麻 玄参各二分 车前子半两 铁粉半两（细研） 朱砂半两（细研）

【用法】上为末，与铁粉、朱砂，同研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后煎桑根白皮汤送下。

【主治】伤寒汗后，热不除，心神不安。

58456 **茯神丸**

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】茯神一两 牛黄一两（细研） 虎肢一对（酒浸一宿微黄） 石膏二两（细研）

川升麻一两　麦门冬一两半(去心,焙)　玄参一两　铁粉二两(细研)　生干地黄一两　龙齿二两　金箔五十片(细研)　银箔五十片(细研)

【用法】上为末,入研了药令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,人参汤送下,不拘时候。

【主治】风惊恍惚,心神不安。

【备考】《普济方》有虎睛、樟脑,无虎肢、龙齿。

58457 **茯神丸**

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】茯神一两　白龙骨一两　龙角一两　龙胆一两(去芦头)　铁粉二两(细研)　蔓菁子一两　人参二两(去芦头)　远志一两(去心)　黄连二两(去须)　川大黄一两(锉碎,微炒)　芎䓖三分　当归一两　黄芩三分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,以温酒送下,不拘时候。

【主治】风癫,发作吐沫,引胁肋疼痛。

58458 **茯神丸**

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】茯神一两　地骨皮半两　黄耆半两(锉)　知母半两　牡蛎一两(烧为粉)　栝楼根三分　黄连三分(去须)　麦门冬二两(去心,焙)　熟干地黄一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以清粥饮送下,不拘时候。

【主治】消中烦热,小便数。

58459 **茯神丸**

【方源】方出《圣惠》卷五十三,名见《普济方》卷一七九。

【组成】知母一两　栝楼根一两　麦门冬一两(去心,焙)　黄连一两(去须)　茯神一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以粥饮送下,不拘时候。

【主治】心脾壅热,烦渴口干。

58460 **茯神丸**

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】茯神半两　麦门冬半两(去心,焙)　犀角屑一分　栀子仁一分　白鲜皮一分　川升麻一分　玄参一分　车前子一分　铁粉半两(细研)　朱砂半两(细研)

【用法】上为末,与铁粉、朱砂同研令匀,炼蜜为丸,如绿豆大。每服五丸,以温水送下,不拘时候。

【功用】《普济方》:安镇心神。

【主治】①《圣惠》:小儿伤寒后,余热不除,心神不安。②《普济方》:小儿风热潮作,肌体烦倦,不思饮食。

58461 **茯神丸**

【方源】《博济》卷二。

【组成】茯神二两(去皮木)　柴胡一两半(去苗)　黄耆一两半　生干地黄二两　桔梗　鳖甲二两(醋炙黄色)　人参　白前各一两　枳壳一两半(炙,去白)　赤芍药一两半

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,食后生姜汤送下。临时更加减服。

【主治】心肺壅热,口苦舌干,涕唾稠粘,胸膈烦闷,不思饮食,肢体倦怠,或发烦热,状似骨蒸。

58462 **茯神丸**

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】茯神一两　远志三分(去心)　人参三分(去芦头)　白僵蚕三分(微炒)　白附子一两(微炮)　当归半两(锉,微炒)　乳香一两(研)

【用法】上为末,与乳香拌和令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,温酒送下,不拘时候。

【主治】肝脏中风,筋脉拘挛,不得屈伸,恍惚,或多喜忘,或时恐怖。

58463 **茯神丸**

【方源】《医方类聚》卷一一一引《神巧万全方》。

【组成】茯神　鳖甲(醋炙黄色,去裙襕)　茂香　川大黄(锉碎,醋和炒)各一两　川乌

头(炮裂,去皮脐) 芫花(醋拌,炒令干) 京三棱(锉,拌醋微炒) 桂心 远志(去心) 干漆(杵碎,炒令烟出)各一两 硇砂一两半(不夹石者,细研) 蓬莪术三分

【用法】上为细末,先以米醋三升,熬令稍稠,入少面作糊为丸,如绿豆大。每服七丸,渐加至十丸,空心酒送下。以取下积滞物为度,隔二日再服。

【主治】伏梁气结,固在心下,横大如臂,饮食渐少,肢体消瘦。

58464 茯神丸

《圣济总录》卷五。为原书同卷“羚羊角丸”之异名。见该条。

58465 茯神丸

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】茯神(去木) 五加皮(锉) 防风(去叉) 桂(去粗皮) 五味子 蛇床子(炒)各一两 羌活(去芦头) 鹿茸(去毛,酒炙) 牛膝(酒浸,切,焙) 菟丝子(酒浸,别捣) 酸枣仁(炒) 山茱萸 巴戟天(去心)各一两半 熟干地黄(切,焙)三两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸至三十丸,温酒送下,早、晚食前各一次。

【主治】风,腰脚不随,行履不得,丈夫五劳七伤六极,诸风痹。

58466 茯神丸

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】茯神(去木) 人参 远志(去心) 麦门冬(去心,焙) 熟干地黄(焙) 青橘皮(汤浸,去白,焙) 甘草(炙,锉) 五味子 山芋 桔梗(去芦头,切,炒) 枳壳(去瓤,麸炒) 槟榔(生,锉)各一两 白术 桂(去粗皮) 芍药各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如鸡头子大。每服一丸,含化。

【功用】化痰润肌,清神快气。

【主治】风惊邪,心中恍惚,惊悸恐怖,精神不乐。

58467 茯神丸

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】茯神(去木) 龙骨 龙齿 龙角(三味去土,一处研) 龙胆(去苗土) 铁精(捣研,入前三味同研) 蔓荆实(揉去白皮)各一两 干姜(炮) 人参 远志(去心) 黄连(去须,炒)各三分 大黄(锉,醋炒)一两半 芎䓖 白芷 当归(切,焙) 黄芩(去黑心) 桂(去粗皮)各半两

【用法】先将十三味为末,入别研者四味,和令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸,渐加至二十丸,空心、日午食前蜜汤送下。

【主治】风癫瘛疭,神魂不定。

58468 茯神丸

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【异名】茯苓丸(《此事难知》卷九)。

【组成】茯神(去木) 麦门冬(去心,焙) 熟干地黄(焙)各一两 牡丹皮 人参 黄耆(锉)各三分 桂(去粗皮) 甘草(炙) 牛膝(去苗) 泽泻各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食前温酒送下。

【功用】补虚。

【主治】伤寒后,或用心力劳倦,四肢羸弱,心忪惊悸,吸吸短气。

58469 茯神丸

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】茯神(去木)二两 人参 麦门冬(去心,焙) 龙齿 防风(去叉) 云母粉各一两半 犀角(镑) 黄芩(去黑心) 薏苡仁各二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服十五丸至二十丸,食后米饮送下。

【主治】心脏虚热,惊悸心忪,虚乏气短,睡卧不安。

58470 茯神丸

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】茯神(去木) 生干地黄(洗,切,焙)各二两 鳖甲(九肋者,醋炙,去裙襕)

桔梗(去芦头,切,炒) 人参 升麻 大腹(炮) 防风(去叉) 黄芩(去黑心) 白前各一两 枳壳(去瓤,麸炒) 赤芍药 柴胡(去苗) 黄耆(薄切)各一两半

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,食后生姜汤送下。

【主治】心实壅热,口苦舌干,涕唾稠粘,胸膈烦闷,不思饮食,肢体倦怠,或发烦热,状似骨蒸。

58471 **茯神丸**

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【组成】茯神(去木)一两 白术一两 旋覆花半两 缩砂蜜(去皮)三分 大黄(微锉)半两 芍药半两 桂(去粗皮)三分 郁李仁(汤浸,去皮)一两 大麻仁(别研)二两 人参半两 枳壳(去瓤,麸炒)三分 诃黎勒(去核)一两 厚朴(去粗皮,生姜汁炙)一两 白槟榔(锉)三分 陈橘皮(汤浸,去白,焙)一两 白鲜皮(锉)半两 地骨白皮(锉)半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,渐加至三十丸,空心粥饮送下。

【主治】积年口舌疮,诸方不愈。

58472 **茯神丸**

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】茯神(去木) 当归(切,焙) 白芷 桑耳(炙) 芎䓖 赤石脂 卷柏(去土) 干姜(炮)各一两 牡蛎粉 白龙骨 地榆各一两半

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,温酒或米饮送下,空心、日午临卧各一次。

【主治】妇人血伤兼带下,日久不止,头旋目眩,心烦身热,腰脚疼重,肢体瘦瘁。

58473 **茯神丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】人参(去芦头) 茯神(去木) 黄耆(蜜炙) 熟干地黄(洗,焙) 当归(洗,焙) 酸枣仁(去皮,炒) 朱砂(别研,一半入药,一半为衣)各等分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,煎人参汤送下,不拘时候。

【主治】心虚血少,神不守舍,多惊恍惚,睡卧不宁。

58474 **茯神丸**

《卫生总微》卷十七。为《普济方》卷四〇一引《医方妙选》"茯神丹"之异名。见该条。

58475 **茯神丸**

【方源】《直指》卷十七。

【组成】茯神 人参 枳壳(制) 麦冬(去心,焙) 生干地黄 牡蛎粉 黄连(净)各一两 黄耆(炙) 石莲肉 知母各半两 瓜蒌根七钱五分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,清粥饮送下。

【主治】消中,烦热,消谷,小便数。

58476 **茯神丸**

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】南星 胡黄连 天麻 茯神各三钱 青黛 牙消 朱砂各二钱 麝香一字

【用法】上为末,粟米糊为丸,如梧桐子大。每服一丸,石菖蒲、荆芥煎汤调下。

【主治】壮热发惊,痰壅直视。

58477 **茯神丸**

【方源】《直指小儿》卷三。

【组成】茯神 芦荟 琥珀 川黄连(净) 赤茯苓各三钱 钩藤皮 远志肉(姜制,焙干)虾蟆灰各二钱 细节石菖蒲一钱 麝香少许

【用法】上为末,粟米糊为丸,如麻子大。每服十丸,薄荷汤送下。

【主治】心疳,惊疳。

58478 **茯神丸**

【方源】《得效》卷八。

【组成】附子(大者)一个(作罂,入块粒朱砂半两,依旧用原物塞之,以茯神和面作剂,通裹,煨)

【用法】上为末,豮猪心血为丸,参汤送下。

【主治】心虚,或癫或痉。

58479 **茯神丸**

【方源】《得效》卷十三。

【异名】豮肝丸(《普济方》卷九十七)。

【组成】茯神(去木) 白茯苓(去皮) 姜黄 白术(炒) 黄耆 羌活 五加皮 川乌(炮,去皮脐) 薏苡仁 木瓜(去皮瓤) 半夏曲 神曲(炒) 天雄(炮,去皮) 白芍药 乳香(别研) 没药(研) 防风 独活 当归 玄胡索 桑寄生 海桐皮(去粗皮) 木香 陈皮(去白) 枳壳(炮,去瓤) 南星(炮) 地龙(捶,去土) 荆芥穗各五钱 麝香一钱

【用法】上用豮肝一具,洗净,煮存性,研烂,同酒面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,温酒吞下,不饮,木瓜汤送下。

【主治】四肢挛缩不伸。

【备考】本方方名,《普济方》引作:"豮猪肝丸。"

58480 **茯神丸**

【方源】《普济方》卷三七七。

【组成】茯神 铁粉 人参各六分 龙齿 栀子仁 子芩 升麻各六分 门冬子三分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如麻子大。每服二三十丸,食前浆水送下。

【主治】热风痫。

58481 **茯神丸**

《女科秘要》卷三。为《宁坤秘籍》卷上"茯苓丸"之异名。见该条。

58482 **茯神丸**

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】茯神 茯苓 远志各八钱 砂仁三钱

【用法】粳米糊为丸,如绿豆大。每服五十丸,金银汤送下。先服麝香散,后服茯神丸。

【主治】经来怒气触阻,逆血攻心,不知人事,狂言谵语,如见鬼神。

58483 **茯神丹**

【方源】《普济方》卷四〇一引《医方妙选》。

【异名】茯神丸(《卫生总微》卷十七)。

【组成】茯神 当归 麦门冬(去心)各一两 人参 黄芩 草龙胆 桃仁(汤浸,去皮,炒)各半两

【用法】上为细末,拌匀,炼蜜为丸,如黍米大。每服十丸,生地黄汁少许同酒送下。

【主治】小儿打扑或落床堕地,至损血气,羸瘦痿黄,或时刺痛,游走不定。

58484 **茯神丹**

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】朱砂半两(光明成颗块者) 豮猪心一枚

【用法】上将朱砂入在猪心内,却用麻皮缚定,汤煮一伏时取出,将朱砂细研,不用猪心,别研茯神末,糊为丸,如梧桐子大。每服五丸,空心、食前煎人参酸枣仁汤送下。

【主治】小便白浊,梦遗漏精,日久不愈。

58485 **茯神汤**

【方源】《外台》卷十五引《古今录验》。

【组成】茯神 人参 菖蒲 茯苓各三两 赤小豆四十枚

【用法】上㕮咀。以水一斗,煮取二升半,分三服。

【主治】①《外台》引《古今录验》:五邪气入人体中,见鬼妄语,有所见闻,心悸跳动,恍惚不定。②《张氏医通》:心虚神气不宁,烦热惊悸。

【宜忌】忌羊肉,饧。

58486 **茯神汤**

【方源】《外台》卷十五引《古今录验》。

【组成】龙骨一两 干姜一两半 细辛一两半 白术一两 茯神三两 人参 远志(去心) 甘草(炙) 桂心 独活各二两 酸枣仁一两 防风二两

【用法】上切。以水九升,煮取三升,分为三服。

【功用】安神定志。

【主治】风经五脏虚,惊悸。

【宜忌】忌海藻,菘菜,桃,李,雀肉,生葱,生菜,醋物。

58487 **茯神汤**

【方源】《千金》卷二。

【异名】茯神饮子(《圣惠》卷七十六)。

【组成】茯神　丹参　龙骨各一两　阿胶　当归　甘草　人参各二两　赤小豆二十一粒　大枣二十一个

【用法】上㕮咀。以酢浆一斗,煮取三升,分四服,先食服。七日后服一剂。

【主治】曾伤三月胎者。

【宜忌】《外台》:忌海藻、菘菜。

【加减】腰痛者,加桑寄生二两。

58488　**茯神汤**

【方源】《千金》卷三。

【组成】茯神四两　人参　茯苓各三两　芍药　甘草　当归　桂心各一两　生姜八两　大枣三十个

【用法】上㕮咀。以水一斗,煮取三升,去滓,分三服,一日三次。

【主治】产后忽苦,心中冲悸,或志意不定,恍恍惚惚,言语错谬,心虚。

58489　**茯神汤**

【方源】《千金》卷十三。

【组成】茯神　独活各四两　黄耆　远志　防风五两　生姜各三两　甘草　人参　当归　牡蛎　白术　苁蓉　附子各二两

【用法】上㕮咀。以劳水一斗二升,煮取三升,服五合,昼夜尽。

【主治】风眩倒,屋转,吐逆,恶闻人声。

58490　**茯神汤**

【方源】《千金》卷十四。

【组成】茯神　麦门冬各四两　人参　羌活　远志　当归　甘草　紫石　五味子各一两　半夏　防风　黄耆各三两　生姜五两　酸枣三升

【用法】上㕮咀。以水一斗三升煮酸枣,取一斗,去枣,纳余药,煎取三升半,一服七合,日三次,夜二次。

【主治】风虚满,颈项强,心气不定,不能食。

58491　**茯神汤**

【方源】《千金》卷二十一。

【异名】茯神饮(《圣济总录》卷四十七)。

【组成】茯神二两　栝楼根　生麦门冬各五两　生地黄六两　葳蕤四两　小麦二升　淡竹叶(切)三升　大枣二十个　知母四两

【用法】上㕮咀。以水三斗,煮小麦、竹叶,取九升,去滓下药,煮取四升,分四服,服不问早晚,但渴即进。

【功用】泄热止渴。

【主治】胃腑实热,引饮常渴。

58492　**茯神汤**

【方源】方出《千金》卷二十一,名见《外台》卷十一。

【组成】竹叶(切)二升　地骨皮　生地黄(切)各一升　石膏八两　茯神　葳蕤　知母　生姜各四两　生麦门冬一升半　栝楼根八两

【用法】上㕮咀。以水一斗二升,下大枣三十个,并药煮取四升,分四服。

【功用】消热止渴。

【主治】渴利虚热,引饮不止。

58493　**茯神汤**

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】茯神(去木)三两　防风(去叉)　牛膝(去苗)　枳壳(去瓤,麸炒)　防己(锉)　秦艽(去土)　玄参(坚者)　芍药　黄耆(细锉)　白鲜皮(锉)　泽泻　独活(去芦头)各二两　桂(去粗皮)一两半　五味子半升　人参半两　薏苡仁(炒)半升　麦门冬(去心,焙)半两　羚羊角(镑屑)二两　石膏(碎)半斤　甘草(炙,锉)一两半　磁石十二两(烈火烧赤,醋淬十遍,淘用,别捣碎)

【用法】上药除磁石外,为粗末。每用药一两,磁石末半两,别入杏仁七枚(去皮尖,碎),以水四盏,同煎至二盏,去滓分二服,微热服之,空心并午时各一服。每自中春宜服,至季夏即住。

【主治】中风,手足一边不收,精神健忘。

58494　**茯神汤**

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】茯神（去木） 人参各一两 白鲜一分 麦门冬（去心，焙）三分 枳实（麸炒） 羚羊角屑 甘草（炙，锉） 龙齿各半两 防风（去叉）三分 黄芩（去黑心）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加竹叶十片，煎至七分，去滓，食后、临卧温服。

【功用】调心气，安神志，化痰，止烦渴。

【主治】风惊。

58495 **茯神汤**

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】茯神（去木） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁）各三两 龙齿六两 凝水石（碎）一斤 升麻二两 石膏（碎）二十两 沙参 白鲜皮各二两 生麦门冬（去心）四两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓温服，一日三次。如病甚，煎成入竹沥半合，再煎至一盏服。

【主治】风狂失神，少卧不饥，笑乐无节，弃衣登高。

58496 **茯神汤**

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】茯神（去木） 龙齿（研） 防风（去叉） 杏仁（去皮尖双仁，炒） 羌活（去芦头） 芎䓖 人参 麦门冬（去心，焙） 大黄（锉，炒） 钩藤 甘草（炙，锉）各一两

【用法】将十味为粗末，与龙齿拌匀。每服六钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓，空心温服。得利二三行，即止之。

【主治】风痫发动，惊掣无时。

58497 **茯神汤**

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】茯神（去木） 羌活（去芦头） 木通（锉） 防风（去叉） 细辛（去苗叶） 蔓荆实（去白皮） 生干地黄（焙） 白术 当归（切，焙） 芍药 陈橘皮（汤浸，去瓤，焙） 芎䓖各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】首风头痛，当先风则甚。

58498 **茯神汤**

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】茯神（去木） 羌活（去芦头） 龙齿 麦门冬（去心，焙） 麻黄（去根节）各一两 蔓荆实 人参 薏苡仁 防风（去叉） 远志（去心） 犀角屑各三分 赤芍药 甘草（微炙）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜五片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心痹。神思昏塞，四肢不利，胸中烦闷，时复恐悸。

58499 **茯神汤**

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】茯神（去木）三分 犀角屑 龙齿一两 升麻半两 麦门冬（去心，焙）一两 玄参（坚者）半两 竹茹一两 芍药三分 马牙消一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至五分，去滓，下地黄汁一合，搅匀，食后温服。

【主治】伤寒后，心热烦闷，睡多惊悸。

58500 **茯神汤**

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】茯神（去木） 黄耆（锉） 麦门冬（去心） 栝楼根各一两 生干地黄（洗，切，焙）三两 酸枣仁（炒） 羌活（去芦头） 葛根（锉） 羚羊角（镑屑）各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，食后温服。

【主治】肝脏实热，风气上攻烦渴。

58501 **茯神汤**

《圣济总录》卷四十一。为《圣惠》卷三“羚羊角散”之异名。见该条。

58502 **茯神汤**

《圣济总录》卷四十三。为《千金》卷十三“茯神煮散”之异名。见该条。

58503 **茯神汤**

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】茯神（去木） 酸枣仁（炒） 人参

各一两　附子(炮裂,去皮脐)半两　干姜(炮)一分

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，去滓，食前温服。先烙手心，次烙第三指间，又灸一七壮，次烙气海、上脘、人中、神庭穴，不愈，灸背心，下廉穴百壮。

【主治】奸黄。病人向明卧多,爱索鞋拟起,身体全冷,肉色苍黑,睡中啼泣,或狂言妄语。

【宜忌】无心肿脚肿，蓦回窥人者宜服本方。

58504　茯神汤

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【异名】茯神散(原书卷九十)。

【组成】茯神(去木)　麦门冬(去心,焙)　柴胡(去苗)　黄连(去须)　贝母(去心,焙)各一两半　秦艽(去苗土)一两　槟榔(锉)二两　甘草(炙,锉)一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎至一盏,去滓,食后温服,一日三次。

【主治】①《圣济总录》:风劳咳嗽,心躁烦热,惊悸,鼻塞咽干,唇肿口疮,胸满少睡,手臂及腰脚疼。②《普济方》:虚劳惊悸。

58505　茯神汤

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】茯神(去木)　人参各一两　酸枣仁(炒,去皮,别研)五两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,以水一盏,加生姜半分(拍碎),煎至七分,去滓,空腹温服,日二次,夜一次。

【主治】虚劳烦躁,不得睡。

58506　茯神汤

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】茯神(去木)　人参　远志(去心)　甘草(炙,锉)　当归(切,焙)　陈橘皮(去白,焙)　龙齿　熟干地黄(焙)各一两　五味子　麦门冬(去心,焙)　桂(去粗皮)各一两半　黄耆(锉)二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水二盏,加大枣七个(擘破),生姜五片,煎至一盏,去滓,空心温服,一日三次。先服麝香散,取虫后服本方。

【功用】补五脏。

【主治】传尸骨蒸。

58507　茯神汤

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】茯神(去木)　赤芍药　葛根(锉)各一两　升麻　地骨皮(锉)　黄芩(去黑心)各一两半　大黄(锉,炒)一两

【用法】上为粗末。每服四钱匕,水一盏半,煎至四分,去滓温服,食后、临卧各一次。

【主治】斑疮入眼。

58508　茯神汤

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】茯神(去木)　山芋　远志(去心)　肉苁蓉(酒浸,去皴皮,切,焙)　地骨皮　蔓荆实　青葙子　羚羊角(镑)　甘草(炙)各半两　人参　甘菊花各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓,食后、临卧服,一日二次。

【主治】眼昏暗,将成青盲。

58509　茯神汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】茯神(去木)　蔓荆实(去白皮)　赤茯苓(去黑皮)　枳壳(去瓤,麸炒)各二两　麻黄(去根节)一两半　防风(去叉)　黄芩(去黑心)　芎䓖　石膏(碎)　羌活(去芦头)　独活(去芦头)　甘草(炙)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜五片，薄荷五叶，同煎至七分，去滓热服。

【主治】妇人血风,头目昏眩,身体疼痛,心忪烦躁,手足心热,伤寒。

58510　茯神汤

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】茯神(去木)　麦门冬(去心,焙)　人参　龙齿(去土)　升麻　石膏(捶碎)　枳壳(去瓤,麸炒)　沙参　赤芍药　甘草(炙,

锉） 羌活（去芦头） 防己各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，一日二次。

【主治】妇人心气怯弱，感于风邪，惊悸不安。

58511 **茯神汤**

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】茯神（去木） 赤芍药 地榆 熟干地黄（焙）各一两半 地骨皮 白术 甘菊花 柴胡（去苗）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓温服。

【主治】妇人月水不调，头目昏眩，心腹气痛，四肢麻痹，脐下胀闷。

58512 **茯神汤**

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】茯神（去木）一两 熟干地黄（焙）一两 甘草（炙）半两 钩藤一两 桔梗（炒） 人参 当归（切，焙） 芍药（锉，炒）各一两半

【用法】上为粗散。每服三钱匕，以水一盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】妊娠八九月或临月，因用力劳乏，便即动胎，忽然下血，心腹急痛，面目青黑，冷汗出，气息欲绝。

58513 **茯神汤**

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】茯神（去木） 黄耆（炙，锉） 人参 白术各半两 藿香叶 甘草（炙）各二钱

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，加生姜三片，同煎至六分，去滓，食前温服。

【功用】升降阴阳，和调胃气。

【主治】妊娠呕逆不下食。

58514 **茯神汤**

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】茯神（去木）二两 人参 芍药（锉）各一两半 甘草（炙，锉） 当归（切，焙） 桂（去粗皮）各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，加生姜三片，大枣二个（擘破），同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后血虚乱语，心志不宁。

58515 **茯神汤**

【方源】《圣济总录》卷一六〇。

【组成】茯神（去木）一两 人参 龙齿 琥珀 赤芍药 黄耆（锉） 牛膝（酒浸，切，焙）各三分 生干地黄一两半 桂（去粗皮）半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎取七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后血虚受邪，语言失度，精神恍惚。

58516 **茯神汤**

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】茯神（去木）二两 人参 白茯苓（去黑皮）各一两半 芍药（锉） 甘草（炙，锉） 当归（锉，焙） 桂（去粗皮）各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后虚惊，心气不安。

58517 **茯神汤**

【方源】《圣济总录》卷一七〇。

【组成】茯神（去木）一分 龙齿半两 寒水石（研）一分 升麻三分 石膏（研）一两 麦门冬（去心，焙）三分

【用法】上为粗末。一二岁儿，每服一钱匕，水七分，加竹沥少许，煎至四分，去滓温服，日三次，夜一次。

【主治】小儿风热，惊掣，心忪，恐悸。

58518 **茯神汤**

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】茯神（去木） 栝楼根 麦门冬（去心）各一两 黄耆（锉）一两半 生干地黄（洗，焙）三两 酸枣仁（炒）半两 羌活（去芦头） 葛根（锉） 羚羊角（镑）各一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水七分，浸药良久，煎至四分，去滓温服，一日三次，食后良久。

【主治】小儿脑热，鼻干无涕。

58519 **茯神汤**

《鸡峰》卷十一。为方出《肘后》卷三,名见《圣济总录》卷十四"龙骨汤"之异名。见该条。

58520 **茯神汤**

【方源】《济生》卷一。

【组成】茯神(去木) 酸枣仁(炒,去壳) 黄耆(去芦) 白芍药半两 五味子 柏子仁(炒)各一两 桂心(不见火) 熟地黄(洗) 人参一两 甘草(炙)各半两

【用法】上㕮咀。每服四钱,水一盏半,加生姜五片,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】①《济生》:胆气虚冷,头痛目眩,心神恐畏,不能独处,胸中满闷。②《景岳全书》:惊痫。

58521 **茯神汤**

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《济生》。

【组成】茯神(去木) 人参 远志(去心,甘草煮) 通草 麦门冬(去心) 黄耆(去芦) 桔梗(去芦,锉,炒) 甘草(炙)各等分

【用法】上㕮咀。每服四钱,水一盏半,加生姜一片,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】脉虚极,咳则心痛,喉中介介如梗状,甚则咽肿,惊悸不安。

58522 **茯神汤**

【方源】《女科万金方》。

【组成】人参 白茯神 石菖蒲 当归 川芎 辰砂 远志 黄连 丹皮

【用法】姜汁同煎,食前服。

【主治】产后不语。

58523 **茯神汤**

【方源】《得效》卷三。

【组成】人参 麦门冬(去心) 山药各二两 前胡 熟地黄(洗,酒拌炒)各一两 枳壳(去瓤,麸炒)三分 远志(甘草水煮,去心,姜汁拌炒)三分 白茯苓 茯神各一两半 半夏(汤洗七次) 黄耆(炙)各一两 甘草半两

【用法】上为散。每服四钱,流水盏半,生姜五片,秫米一撮煎,食前服。

【主治】喜怒忧思悲恐惊所感,脏气不行,郁而生涎,结为饮,随气上逆,伏留阳经,心中忪悸,四肢缓弱,翕然面热,头目眩冒,如欲摇动。

58524 **茯神汤**

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】茯神(去皮木根)一两 人参(去芦)半两 甘草(炙)二钱 当归(去芦尾,酒洗)半两

【用法】上㕮咀。每服二钱,水一盏,煎至七分,温服,不拘时候,子母同服。

【主治】①《活幼心书》:心气不足,虚而惊悸,日常烦哭及婴孩生下,羸瘦多惊。②《幼科折衷》:惊汗,时时冷汗微出,发根如贯珠,而额上濈濈然。

【加减】微热烦躁,加麦门冬(去心)同煎。

58525 **茯神汤**

【方源】《普济方》卷一〇二。

【组成】茯神五两 甘草(炙) 桂心各一两 龙骨 麦门冬(去心) 防风 牡蛎(熬) 远志(去心)各三两 大枣二十个(擘)

【用法】上切。以水八升,煮取二升,分为三服,一日二次。

【主治】惊劳失志。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱、酢物。

58526 **茯神汤**

【方源】《普济方》卷三七七。

【组成】茯神 绵黄耆 独活 羚羊角(屑)各一两 防风一两 肉桂 桔梗 甘草(微炙) 麻黄(去根节)半两

【用法】上为细末。每服半钱,用水一小盏,加荆芥、乳香各少许,煎五分,去滓温服。

【主治】风痫,身体壮热不除,精神恍惚。

58527 **茯神汤**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】茯神一钱半 白术 当归各一钱 酸枣仁八分 人参 黄耆 黄柏各五分 甘草二分

【用法】加灯心,水煎,先用朱砂末两分点

舌上，后以此汤送下。

【主治】神不守舍。

58528 **茯神汤**

【方源】《医统》卷二十三。

【组成】茯神（去心） 酸枣仁（炒，研） 人参 当归各一钱 麦门冬（去心）八分 五味子十五粒 芍药 生地黄 川芎 陈皮 山栀仁（炒） 甘草各六分

【用法】上药以水一钟半，加生姜三片，煎八分，温服。

【主治】劳心思虑，伤损精神，头眩目昏，心虚气短，惊悸烦热。

58529 **茯神汤**

【方源】《准绳·类方》卷六。

【组成】茯神（去皮）一钱半 远志（去心） 酸枣仁（炒）各一钱二分 石菖蒲 人参 白茯苓各一钱 黄连 生地黄各八分 当归一钱（酒洗） 甘草四分

【用法】水二钟，加莲子七枚，捶碎，煎八分，食前服。

【主治】欲心太炽，思想太过，梦泄不禁，夜卧不安，心惊。

58530 **茯神汤**

【方源】《准绳·幼科》卷四。

【组成】生地 当归 甘草 白芍药 茯神 远志 桔梗

【用法】加灯草、生姜，水煎服。

【主治】霜桥印迹。小儿未痘之前，火烙脸赤，眼睛直竖，手足搐搦，口燥谵语，惊厥屡次，不数日而痘随形焉。

【宜忌】禁用朱砂、金石。

58531 **茯神汤**

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】茯神 当归 炙甘草 人参

【用法】龙眼肉为引，水煎服。

【主治】心疳面赤脉络赤，壮热有汗时烦惊，咬牙弄舌口燥渴，口舌生疮小便红，胸膈满闷喜伏卧，懒食干瘦吐利频。

58532 **茯神汤**

【方源】《会约》卷十三。

【组成】石菖蒲（炒）八分 山药一钱二分 茯神一钱五分 远志（去心）八分 枣仁一钱 茯苓一钱 生地一钱 当归一钱二分 甘草四分 莲子七粒（捶碎，去心） 黄连八分

【用法】水煎，食前服。

【主治】欲火太炽，相火甚而梦遗心悸。

58533 **茯神汤**

【方源】《证因方论集要》卷一。

【组成】茯神（去木） 羚羊角（镑片） 北沙参 枣仁（炒） 玉竹 五味子 远志（去心） 龙骨

【主治】煎厥。

【方论选录】目盲不可以视，肝精不交于阳也，以玉竹、羚羊角、北沙参、枣仁凉肝热，救阴精；耳闭不可以听，肾精不承于阳也，以远志通调肾经不足之气，五味子收摄肾经耗散之精，茯神、龙骨收肝肾散漫之阳，补救阴阳。

58534 **茯神汤**

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】党参（去芦）一钱五分 茯神二钱 生地 当归 菖蒲各一钱 远志（去心）五分 黄连三分 炙草四分

【用法】加去心莲子七粒，水煎服。

【主治】欲心太炽而梦遗者。

58535 **茯神汤**

【方源】《证治宝鉴》卷七。

【组成】茯神 远志 枣仁 石菖蒲 人参 茯苓 黄连 生地 当归 甘草 莲子

【主治】遗精。

58536 **茯神汤**

【方源】《温氏经验良方》。

【组成】茯神一钱半 丹参一钱 龙骨一钱（煅） 阿胶一钱 当归二钱 甘草一钱 党参一钱半 大枣三个 赤小豆一钱

【用法】上为细末。每服一钱，早、晚用黄芩五分，艾叶三分，煎水冲泡，去滓服。

【主治】曾伤三月胎者。

58537 **茯神汤**

【方源】《顾氏医径》卷五。

【组成】茯神　枣仁　芍药　绵耆　人参　半夏　广皮　生姜

【主治】小儿善惊易悸，触事易惊，胆虚涎冷者。

58538 **茯神饮**

【方源】《外台》卷十七引《延年》。

【组成】茯神四两　人参三两　橘皮二两　甘草一两半(炙)　生姜二两　酸枣仁一升

【用法】上切。以水一斗，煮取二升，去滓，分三服。

【主治】心虚不得睡，多不食。

【宜忌】忌海藻，菘菜，酢物。

58539 **茯神饮**

《圣济总录》卷十四。为《圣惠》卷二十"茯神散"之异名。见该条。

58540 **茯神饮**

《圣济总录》卷四十七。为《千金》卷二十一"茯神汤"之异名。见该条。

58541 **茯神散**

【方源】《经效产宝·续编》。

【组成】茯神(去木)一钱　人参　黄耆　赤芍药　牛膝　琥珀(研)　龙齿(研)各七钱半　生地黄一两半　桂心半两

【用法】上为末，每服三钱，水煎服。

【主治】①《经效产宝·续编》产后血邪，心神恍惚，言语失度。②《永类钤方》：睡卧不安。

58542 **茯神散**

【方源】方出《幼幼新书》卷十一引《婴孺方》，名见《普济方》卷三七六。

【组成】钩藤　独活　黄芩　麻黄(去节)　桂心　石膏　甘草(炙)　防风　茯神　大黄(汤洗)各二分　蚱蝉三枚(炙)　蛇蜕皮三分(炙)

【用法】以水三升，煮取一升二合，去滓，一岁服一合，一日三次。

【主治】小儿痫痴呕吐。

58543 **茯神散**

【方源】《圣惠》卷三。

【异名】远志汤(《圣济总录》卷四十二)、补胆茯神散(《本事方释义》卷一)。

【组成】茯神一两　远志三分(去心)　防风三分(去芦头)　细辛三分　白术三分　前胡三分(去芦头)　人参一两(去芦头)　熟干地黄一两　桂心三分　甘菊花三分　枳壳半两(麸炒微黄，去瓤)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】胆虚冷，目眩头疼，心神恐畏，不能独处，胸中满闷。

【方论选录】《本事方释义》：茯神气味甘平，入心；远志气味辛温，入心、肾；防风气味苦辛甘，入手、足太阳；细辛气味辛温，入肾；白术气味甘温，入脾；前胡气味辛微寒，入手、足太阴、阳明；人参气味甘温，入胃；桂心气味辛甘大热，入肝、肾；熟地黄气味甘寒微苦，入肾；甘菊花气味辛凉，入肝胆；枳壳气味苦寒，入脾。此因胆虚神怯致病，有不安诸恙，以补心、脾、肝、肾之药守正，佐以辛温、辛凉之品，正气既旺，外侮焉能入哉。

58544 **茯神散**

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】茯神一两　柏子仁半两　酸枣仁一两(微炒)　黄耆一两(锉)　人参一两(去芦头)　熟干地黄半两　远志半两(去心)　五味子半两

【用法】上为散。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：胆虚不得睡，神思不宁。②《家庭治病新书》：心神恍惚，健忘或怔忡者。

58545 **茯神散**

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】茯神一两　麦门冬一两(去心)　白鲜皮半两　地骨皮一两　黄芩一两　酸枣仁半两(生用)　沙参半两(去芦头)　羚羊角屑半两　甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】胆热，神思不爽，昏闷如睡，多睡少起。

58546 **茯神散**

【方源】《圣惠》卷四。

【异名】羚羊角汤（《圣济总录》卷四十三）。

【组成】茯神一两　木通一两（锉）　黄连一两（去须）　麦门冬一两（去心）　川升麻一两　知母一两　子芩一两　川芒消一两　羚羊角屑三分

【用法】上为粗末。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】心实热，口干烦渴，眠卧不安。

58547 **茯神散**

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】茯神一两　羌活一两　蔓荆子三分　龙齿一两　人参三分（去芦头）　薏苡仁三分　防风三分（去芦头）　赤芍药半两　麦门冬一两（去心）　远志三分（去心）　犀角屑三分　麻黄一两（去根节）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心脏中风，语涩昏闷，四肢沉重，精神不守。

58548 **茯神散**

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】茯神三分　独活三分　当归三分（锉，微炒）　桂心三分　杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　沙参三分（去芦头）　羚羊角屑一分　甘草一分（炙微赤，锉）　黄芩三分　防风三分（去芦头）　赤芍药三分　秦艽三分（去苗）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎一两沸，温服，不拘时候。

【主治】心脏中风，冒昧不知，胸背拘急，心烦语涩，翕翕发热，时自汗出，四肢不利。

【备考】《普济方》有麝香、天南星。

58549 **茯神散**

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】茯神一两　人参三分（去芦头）　菖蒲三分　羚羊角屑三分　赤小豆四十五粒（炒熟）　远志半两（去心）　黄连半两（去须）　沙参半两（去芦头）　甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心脏风邪，见鬼妄语，有所见闻，心悸恍惚。

58550 **茯神散**

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】茯神　杏仁（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　川升麻　白鲜皮　沙参（去芦头）各半两　龙齿一两　石膏二两　远志一两（去心）　犀角屑一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】心风狂言，恍惚恐惧。

58551 **茯神散**

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】茯神一两　人参一两（去芦头）　赤小豆半两　菖蒲三分　龙骨一两　犀角屑一两　铁粉半两（研）　金箔三十片（研）

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一钱，以金银汤放温调下，不拘时候。

【主治】心风，恍惚妄语，有所见闻，心悸，志意不定。

58552 **茯神散**

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】茯神一两　龙齿二两　川升麻一两　人参三分（去芦头）　白鲜皮三分　麦门冬一两（去心）　杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）　防风三分（去芦头）　黄芩三分　羚羊角屑半两　甘草半两（炙微赤，锉）　铁粉一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，

不拘时候。

【主治】心脏风虚，四肢惊掣，心忪恐悸，或狂呼急走，如见鬼神，状似癫痫，时时发动。

58553　**茯神散**

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】茯神三分　熟干地黄一两　人参三分(去芦头)　龙骨三分　菖蒲三分　远志半两(去心)　天门冬一两(去心)

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一中盏，加大枣三个，煎至六分，去滓，食前温服。

【功用】补心虚，聪明益智。

【主治】健忘。

58554　**茯神散**

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】茯神一两　半夏三分(汤洗七遍去滑)　黄芩一两　人参一两(去芦头)　麦门冬一两(去心，焙)　黄连一两(去须)　甘草三分(炙微赤，锉)　知母三分

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，大枣三个，青竹茹半斤，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒狐惑，病脉数者，不可灸，或因火为邪，即加烦热，故血妄行于脉中，火气内盛，即心神烦闷，干呕。

58555　**茯神散**

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】茯神一两　白芍药半两　黄耆一两(锉)　人参半两(去芦头)　远志三分(去心)　菖蒲一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后虚羸，心气乏弱，惊悸，多忘。

58556　**茯神散**

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】茯神三分　犀角屑半两　龙齿一两　川升麻半两　麦门冬一两(去心)　玄参半两　甜甘根一两(锉)　黄芩三分　黄连一两(去须)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，下朴消一钱，地黄汁一合，搅令匀，不拘时候温服。

【主治】热病发狂，心热烦闷，多惊，不得卧睡。

58557　**茯神散**

【方源】《圣惠》卷二十。

【异名】茯神饮(《圣济总录》卷十四)。

【组成】茯神一两　生干地黄一两　人参一两(去芦头)　石菖蒲一两　沙参一两(去芦头)　天门冬一两半(去心，焙)　犀角屑半两　远志半两(去心)　甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加赤小豆二七粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风惊，心神不安，恒多恐怖。

58558　**茯神散**

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】茯神一两　人参一两(去芦头)　防风半两(去芦头)　远志半两(去心)　天麻一两　羚羊角屑三分　白鲜皮半两　龙骨一两　酸枣仁一两(微炒)　桂心一两　独活一两　甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风经五脏，恍惚惊悸，神思不安。

58559　**茯神散**

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】茯神一两　麦门冬一两半(去心，焙)　龙齿二两　黄耆一两(锉)　甘草半两(炙微赤，锉)　石菖蒲一两　人参一两(去芦头)　防风三分(去芦头)　远志半两(去心)　熟干地黄一两　石膏二两　羚羊角屑一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风恍惚，心神烦乱，志意不安，或卧

惊恐。

58560 茯神散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】茯神一两 甘菊花一两 蔓荆子一两 白蒺藜一两（微炒，去刺） 地骨皮一两 石膏二两 防风三分（去芦头） 甘草三分（炙微赤，锉） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为细散。每服二钱，以熟水调下，不拘时候。

【主治】头风目眩。

58561 茯神散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】茯神一两 防风一两（去芦头） 当归一两 天雄一两（炮裂，去皮脐） 麻黄一两（去根节） 甘草一两（炙微赤，锉） 芎䓖一两 独活一两 远志一两（去心） 丹参一两 桂心一两 酸枣仁一两（微炒）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】历节风，手脚曲戾，疼痛，心神闷乱。

58562 茯神散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】茯神一两 防风一两（去芦头） 黄芩一两 葳蕤一两 人参一两（去芦头） 羚羊角屑一两 酸枣仁一两（微炒） 白鲜皮一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加葱白二茎，豉五十粒，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风热，恍惚烦躁，及筋脉拘急。

58563 茯神散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】茯神一两 木通一两（锉） 川升麻一两 犀角屑半两 赤石脂一两 远志一两（去心） 麦门冬一两半（去心，焙） 桂心半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加竹茹一分，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】心劳实热，皮毛干焦，色无润泽，心神不安。

58564 茯神散

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】茯神二两 柴胡二两（去苗） 黄耆二两（锉） 远志一两（去心） 天门冬一两（去心） 人参一两（去芦头） 泽泻二两 生干地黄二两 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加淡竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】精极。实热勇悍，多惊壮热。

58565 茯神散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】茯神 石斛（去根，锉） 栝楼根 肉苁蓉（酒浸一宿，刮去皱皮，炙令黄） 知母 人参（去芦头） 白茯苓各一两 五味子半两 黄连三分（去须） 丹参半两 当归半两 麦蘖三分（微炒） 葳蕤半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳多渴，四肢羸乏。

58566 茯神散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】茯神 人参（去芦头） 熟干地黄 牡蛎（烧为粉） 麦门冬（去心，焙） 黄耆（锉） 酸枣仁（微炒） 龙骨各一两 五味子 苍术 甘草（炙微赤，锉）各半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳，起动汗出，稍热多惊恚，不得睡卧。

58567 茯神散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】茯神一两 黄耆一两（锉） 人参一两（去芦头） 桂心三分 牡蛎三分（为粉） 龙骨三分 甘草三分（炙微赤，锉） 麝香一

钱(研)

【用法】上为粗散,入麝香令匀。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓温服,一日三四次。

【主治】虚劳无力,梦与鬼交,神心虚烦。

58568　茯神散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】茯神一两　羌活半两　蔓荆子半两　薏苡仁半两　黄耆半两(锉)　防风半两(去芦头)　菖蒲半两　麦门冬一两(去心,焙)　五味子半两　甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至五分,去滓,食后温服。

【主治】上焦风热,耳忽聋鸣,四肢满急,昏闷不利。

58569　茯神散

【方源】《圣惠》卷五十六。

【组成】茯神一两　黄耆一两(锉)　甘草一两(炙微赤,锉)　白芍药一两　干姜一两(炮裂,锉)　远志一两(去心)　人参一两(去芦头)　桂心一两

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】虚羸,心气乏弱,多魇。

58570　茯神散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】茯神一两　防风三分(去芦头)　人参一两(去芦头)　远志三分(去心)　甘草半两(炙微赤,锉)　龙骨一两　桂心一分　独活三分　细辛三分　干姜半两(炮裂,锉)　白术三分　酸枣仁一两(微炒)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【功用】安神定志。

【主治】妇人血风,五脏大虚,惊悸。

58571　茯神散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】茯神一两　黄耆三分(锉)　赤芍药三分　麦门冬三分(去心)　石膏一两半　蔓荆子三分　人参一两(去芦头)　防风半两(去芦头)　酸枣仁三分(微炒)　羚羊角屑三分　柴胡一两(去苗)　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妇人风眩头疼,心神烦热,恍惚不得睡卧,少思饮食。

58572　茯神散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】茯神一两　羚羊角屑一两　石膏二两　防风一两(去芦头)　赤芍药一两　人参一两(去芦头)　柴胡一两半(去苗)　天门冬一两(去心)　桃仁一两半(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)　独活一两　郁李仁一两(汤浸,去皮,微炒)　生干地黄一两　枳壳一两(麸炒微黄,去瓤)　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妇人血风劳气,头疼目赤,胸背气壅,四肢疼痛,心烦惊悸,少欲饮食。

58573　茯神散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】茯神一两半　茯苓一两　人参一两(去芦头)　菖蒲一两　赤小豆半两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】妇人风虚,与鬼交通,妄有所见闻,言语杂乱。

58574　茯神散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】茯神一两　麦门冬一两(去心)　人参三分(去芦头)　独活半两　防风三两(去芦头)　龙齿一两　生干地黄三两　桑寄生七分　犀角屑半两　钩藤半两　白鲜皮半两　远志半两(去心)　石膏一两　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以金银水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妊娠中风，心神恍惚，惊悸，胎动不安，言语失次，四肢抽掣。

58575 **茯神散**

【方源】《圣惠》卷七十六。

【组成】茯神一两 黄芩一两 麦门冬一两（去心） 栀子仁半两 石膏一两 甘草半两（炙微赤，锉） 秦艽半两（去苗）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，入竹沥半合，更煎三两沸，温服，不拘时候。

【主治】妊娠六七月，忽觉四肢烦疼，心闷口干，头痛。

58576 **茯神散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】茯神 远志 人参（去芦头） 麦门冬（去心，焙） 甘草（炙微赤，锉） 当归（锉，炒） 桂心 羚羊角屑 龙齿 熟干地黄 白芍药各一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后脏虚，心中惊悸，志意不安，言语错乱，不自觉知。

58577 **茯神散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】茯神一两 远志三分（去心） 白薇三分 人参三分（去芦头） 龙头一两 防风三分（去芦头） 独活三分 熟干地黄一两 荆芥三分 甘草半两（炙微赤，锉） 银一斤（以水五升，煮取三升）

【用法】上为粗散。每服四钱，以银水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后风邪所干，心神恍惚，志意不定。

58578 **茯神散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】茯神 甘菊 羌活 当归（锉，微炒） 生干地黄 白芍药 前胡（去芦头） 桂心 甘草（炙微赤，锉）各半两 葛根三分（锉） 石膏二两 蔓荆子一两 麦门冬一两半（去心，焙）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后风虚头痛，四肢烦疼，口干微渴。

58579 **茯神散**

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】茯神三分 龙齿半两 寒水石一两 川升麻三分 石膏一两 麦门冬一两（去心，焙） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎一两沸。

【主治】小儿心热，惊悸烦乱。

58580 **茯神散**

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】茯神半两 龙胆（去芦头） 犀角屑 子芩 麦门冬（去心，焙） 人参（去芦头） 甘草（炙微赤，锉）各一分

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，不拘时候，量儿大小，分减温服。

【主治】小儿落床，体热惊悸。

58581 **茯神散**

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】茯神一分 木通三分（锉） 人参一分（去芦头） 川升麻一分 子芩一分 龙齿三分 犀角屑一分 铁粉三分 蜣螂三枚（微炒，去翅足）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，量儿大小，分减温服，不拘时候。

【主治】小儿风痫，精神昏闷，遍身壮热，不得睡卧。

58582 **茯神散**

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】茯神三分 白鲜皮半两 羚羊角屑半两 钩藤三分 甘草三分（炙微赤，锉） 川升麻三分 石膏二两 龙齿一两 犀角屑

三分　蚱蝉三枚(微炒,去翅足)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓温服。

【主治】小儿热痫,皮肉壮热,烦躁头痛。

58583　**茯神散**

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】茯神半两　龙齿半两(细研)　寒水石一两　川升麻半两　石膏一两(细研,水飞过)　犀角屑半两　牛黄半分(细研)

【用法】上为细散。每服半钱,以竹沥调下,不拘时候。

【主治】小儿惊热烦躁,手足抽掣,心悸。

58584　**茯神散**

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】茯神一两半　川升麻一两　玄参一两半　秦艽一两(去苗)　寒水石二两　龙胆一两(去芦头)　川芒消二两　川大黄三两(锉碎,微炒)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓,分二次温服,早晨、午后各一服。

【主治】小儿心腹结实,身体壮热,四肢不利,心神多惊,欲发痫者。

58585　**茯神散**

【方源】《传家秘宝》。

【组成】茯神　牡丹皮　地骨皮　官桂　山茵陈　人参　芍药　甘草　丹参　玄胡　黄连　石斛　柴胡　麦冬　犀角末　羚羊角末各等分

【用法】上为细末。每服二钱,水一盏,生姜三片,同煎五七沸,和滓温服。

【主治】积热劳瘦,产后血虚,潮热蓐劳,五心有热。

58586　**茯神散**

【方源】《圣济总录》卷十九。

【组成】茯神(去木)　酸枣仁(微炒)　黄耆(锉)　人参各一两　熟干地黄(焙)　远志(去心)　五味子各半两　白茯苓(去黑皮)一两　丹砂(别研)半两

【用法】上药除丹砂外,为散,入丹砂末再研匀。每服一钱匕,以温酒调下,不拘时候。

【主治】肝痹,多惊悸,神思不安。

58587　**茯神散**

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】茯神(去木)　柴胡(去苗)　陈橘皮(去白,炒)　甘草(炙)各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎取八分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒后虚烦,心腹不快。

58588　**茯神散**

《圣济总录》卷九十。为原书卷八十七“茯神汤”之异名。见该条。

58589　**茯神散**

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】茯神(去木)一两半　山芋　人参各二两　赤茯苓(去黑皮)　防风(去叉)　防己各一两半　蜀椒(去目并合口者,炒出汗)一两　山茱萸一两半　甘菊花　桂(去粗皮)　细辛(去苗叶)　芎䓖　贯众　白术(米泔浸一宿,锉碎,炒)各一两一分　干姜(炮)一两　甘草(炙)一两半

【用法】上为散。每服二钱匕,空心温酒调下,一日二次。

【主治】肺气壅塞,鼻齆不闻香臭。

58590　**茯神散**

【方源】《圣济总录》卷一一九。

【异名】茯苓散(《普济方》卷六十五)。

【组成】茯神(去木)一分　白茯苓(去黑皮)一分　松脂一分(熬)　青葙子半两(炒令焦)　白矾一两(熬令汁枯)　丹砂一分(研)　麝香半两(研)　乳香一分(研)

【用法】上为散。贴于牙齿疼痛处。

【主治】牙齿疼痛。

58591　**茯神散**

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】茯神(去木)　芍药(锉,炒)　桑根白皮(锉,炒)　当归(切,焙)　芎䓖各一两　人参二两

【用法】上为散。每服三钱匕，以米饮调下，不拘时候。

【功用】镇心安胎。

【主治】妊娠胎不稳。

58592 **茯神散**

【方源】《幼幼新书》卷十九引《万全方》。

【组成】茯神 人参 天竺黄（研） 钩藤各一分 牛黄半分（研入） 郁金 甘草（炙）各半两

【用法】上为末。每服半钱，煎竹叶汤调下。

【主治】小儿烦热多惊。

58593 **茯神散**

【方源】《本事》卷二。

【组成】茯神（去木） 熟干地黄（酒洒，九蒸九晒，焙干） 白芍药 川芎 当归（洗，去芦，薄切，焙干） 白茯苓（去皮） 桔梗（炒） 远志（去心，洗，锉，炒令黄色） 人参（去芦）各一两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，加灯心、大枣，同煎至七分，不拘时候服。

【主治】因惊语言颠错，不能服温药。

【方论选录】《本事方释义》：茯神气味甘平，入手少阴；茯苓气味同而淡渗，入足阳明；桔梗气味苦辛平，入手太阴；远志气味辛温，入手、足少阴；人参气味甘温，入脾胃；芎、归、芍、地，乃四物汤，养血药也。此因惊致病，心主血，肝藏血，血既得养，神魂安入而惊自定，再佐以灯心之微苦以清心，枣之和缓以和荣，则高年戎马之惊，自然精神复而病却矣。

58594 **茯神散**

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】茯神（去心内木） 龙齿（研细） 牛黄（别研） 犀角屑各半两 寒水石一两 石膏（研，飞）一两 川大黄一钱

【用法】上为粗末。每服一钱，水一盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，更煎一两沸，量大小与服，不拘时候。

【主治】小儿烦热心悸，手足摇动，欲发惊痫。

58595 **茯神散**

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】茯神（去皮） 麦门冬 地骨皮 茯苓各一两 白鲜皮 酸枣仁 沙参 甘草（炙）半两

【用法】上为末。每服三钱，水一盏，煎至六分，去滓，食后服。

【主治】胆热多睡，神思不安，昏闷。

58596 **茯神散**

《卫生宝鉴》卷八。为《袖珍》卷一引《圣惠》“正舌散”之异名。见该条。

58597 **茯神散**

【方源】《普济方》卷三五三。

【组成】茯神 当归 黄芩 麦门冬 甘草 人参 芍药 酸枣仁 白鲜皮各三两 大枣七个

【用法】上为粗末。以水二升，煮取七合，去滓温服。

【主治】产后心虚，惊悸，志意不定，烦躁恍惚。

58598 **茯神散**

【方源】《普济方》卷三八三。

【组成】茯神半两 川升麻半两 犀角屑半两 代赭（细研） 钩藤 川大黄（锉碎，微炒）各一分

【用法】上为散。每服一钱，以水一小盏，煎至四分，去滓放温，渐渐服之。

【功用】小儿瘠积针后，宣腹压惊。

58599 **茯神散**

【方源】《普济方》卷三八五。

【组成】茯神 山药 全蝎 远志 甘草 白附子 荆芥 蝉蜕 朱砂 金箔 麝香

【用法】上为末，灯心汤调下。

【主治】风热惊悸，心虚盗汗。

58600 **茯神散**

《医方类聚》卷一二四。即《千金》卷二十一“茯神煮散”。见该条。

58601 **茯神散**

【方源】《万氏女科》卷三。

【组成】茯神　柏子仁　远志　人参　当归　生地　炙草各一钱　桂心五分　豮猪心一个

【用法】水煎，调辰砂一钱，食后服。

【主治】产后血去太多，心神恍惚，睡卧不安，言语失度，如见鬼神。

58602　茯神散

【方源】《医统》卷四十六引《青囊方》。

【组成】茯神　茯苓　人参　远志　龙骨　肉桂　甘草各一两　陈皮　当归　五味子各一两半　黄耆二两　大枣五十二个

【用法】上㕮咀，分八服。每服水一盏半，加生姜二钱，煎一盏，趁下虫药后空心服。

【主治】痨虫。

58603　茯神散

【方源】《何氏济生论》卷八。

【组成】茯神一两(去木)　人参　龙脑　琥珀　赤芍　黄耆　牛膝七钱五分　生地一两五钱　桂心五钱

【用法】上为末。每服三钱，水煎服。

【主治】产后心神恍惚，狂言乱语，睡卧不安。

58604　茯神散

《千金方衍义》卷十三。即《千金》卷十三"茯神煮散"。见该条。

58605　茯神散

【方源】《金鉴》卷四十八。

【组成】茯神(去木)一两　人参　黄耆(炙)　赤芍　牛膝　琥珀　龙齿(研)各一钱五分　生地一两五钱　桂心五钱　当归二两

【用法】上为末。每服三钱，水煎服。

【主治】产后血虚，心气弱，惊悸，恍惚不安宁。

58606　茯神散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】茯神

【用法】上为末。每服或酒或白汤任下，数服愈。

【主治】头风连筋极痛者。

58607　茯神散

【方源】《女科切要》卷六。

【组成】人参一钱　茯神八分　甘草一钱　山药一钱　当归一钱　肉桂五分　远志肉一钱　生姜五钱　大枣二个

【用法】水煎服。

【主治】产后心虚，怔忡不定，神思不清。

58608　茯神粥

【方源】《圣惠》卷九十六。

【组成】茯神一两　羚羊角半两　粳米三合

【用法】上为末，与米同煮为粥食。

【主治】心胸结气，烦热，或渴，狂言惊悸。

58609　茯神膏

【方源】《幼幼新书》卷十引郑愈方。

【组成】蝎梢　茯神各半两　白僵蚕一两　朱砂一钱

【用法】上为末，炼蜜为膏。每服一皂子大，煎金银薄荷汤化下。

【主治】小儿惊风。

58610　茯莲散

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】白茯苓(去皮，切碎，用面裹，蒸熟去面，晒干为细末)一斤　莲肉(去皮心，为末)四两　干山药(为末)四两　糯米一升半(炒熟为末)

【用法】和匀，每服半合，空心或食前取滚水调入白砂糖二三茶匙服。

【主治】脾胃病。

58611　茯莲煎

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】莲肉　白茯苓各等分

【用法】上为末，白汤调服。

【主治】白浊，遗精。

58612　茯菟丸

【方源】《局方》卷五(续添诸局经验秘方)。

【异名】茯苓丸(《医学纲目》卷二十九)。

【组成】菟丝子五两　白茯苓三两　石莲子(去壳)二两

【用法】上为细末，酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤送下。

【功用】镇益心神，补虚养血，清小便。

【主治】心气不足，思虑太过，肾经虚损，真阳不固，溺有余沥，小便白浊，梦寐频泄。

58613 **茯菟丸**

《丹溪心法》卷三。为《三因》卷十“玄菟丹”之异名。见该条。

58614 **茯菟丹**

《直指》卷十七。为《三因》卷十“玄菟丹”之异名。见该条。

58615 **茯菟散**

【方源】《元和纪用经》。

【组成】茯菟一两半　桂四两　藷草半两

【用法】上为末。每服方寸匕，新水调下。

【功用】利小水，分阴阳清浊。

【主治】中暍，伤冷。

58616 **茯苓术散**

【方源】《外台》卷三十二引《深师方》。

【组成】白术一斤　茯苓　泽泻　猪苓各四两　桂心半斤

【用法】上为散。每服一刀圭，食后服，一日三次，三十日发黑。

【主治】发白及秃落。

58617 **茯苓皮汤**

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】茯苓皮五钱　生薏仁五钱　猪苓三钱　大腹皮三钱　白通草三钱　淡竹叶二钱

【用法】水八杯，煮取三杯，分三次服。先服安宫牛黄丸，继用茯苓皮汤。

【主治】吸受秽湿，三焦分布，热蒸头胀，身痛呕逆，小便不通，神识昏迷，舌白，渴不多饮。

58618 **茯苓饮子**

【方源】方出《外台》卷二十引《古今录验》，名见《鸡峰》卷十七。

【异名】茯苓汤（《圣济总录》卷八十）　茯苓杏仁煎（《普济方》卷一九四）。

【组成】茯苓四两　杏仁四两　橘皮二两

【用法】上切。以水六升，煮取二升，分作三服，每日三次。随小便下愈，饮尽更作。

【主治】气忽发，满胸急者。

【宜忌】忌酢物。

58619 **茯苓饮子**

《鸡峰》卷四。为《外台》卷十八引《近年秘录》“茯苓饮”之异名。见该条。

58620 **茯苓饮子**

《鸡峰》卷十八。为《外台》卷八引《延年秘录》“茯苓饮”之异名。见该条。

58621 **茯苓饮子**

【方源】《医方类聚》卷一五八引《济生》。

【组成】赤茯苓（去皮）　半夏（汤泡七次）　茯神（去木）　橘皮（去白）　麦门冬（去心）各一两　沉香（不见火）　甘草（炙）　槟榔各半两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】痰饮蓄于心胃，怔忡不已。

58622 **茯苓饮子**

【方源】《陈素庵妇科补解》卷二。

【组成】艾叶　参　苓　术　草　芎　归　陈皮　香附　黄芩　杜仲　大枣

【功用】清心。

【主治】妊娠三月，胎动不安。

58623 **茯苓饼子**

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】白茯苓四两（为末）　头白面一二两

【用法】上同调水煎饼。面稀调，以黄蜡代油，煿成煎饼，蜡可用三两。饱食一顿，便绝食。至三日觉难受，三日后，气力渐生，熟蕉芝麻汤、米饮、凉水微用些，小润肠胃，无令涸竭。开食时，用葵菜汤并米饮稀粥，少少服之。

【功用】辟谷绝食。

58624 **茯苓浸酒**

《圣济总录》卷九。为《圣惠》卷二十五“茯苓菊花浸酒”之异名。见该条。

58625　茯苓煮散

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】白茯苓(去黑皮)　柴胡(去苗)　陈橘皮(汤浸,去白,焙)　诃黎勒(去核,炮)　桔梗(炒)　人参各一两　甘草(炙)　半夏(汤洗去滑七遍,焙)各半两　枇杷叶(去毛,姜汁炙)二两　枳壳(去瓤,麸炒)三分

【用法】上为散。每服五钱匕,水一盏半,加生姜一分(拍碎),同煎至七分,去滓,食前温服。

【主治】伤寒后脾胃气虚,四肢乏力,骨节烦疼,口苦舌干,不思饮食。

58626　茯苓煮散

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　厚朴(去粗皮,生姜汁炙)　麦蘖(炒)　芎䓖　甘草(炙,锉)　人参各一两　干姜(炮)半两

【用法】上为散。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,和滓温服,不拘时候。

【主治】心掣,胸中气少,水谷不化,泄利气逆。

58627　茯神饮子

《圣惠》卷七十六。为《千金》卷二"茯神汤"之异名。见该条。

58628　茯神煮散

【方源】《千金》卷十三。

【异名】茯神汤(《圣济总录》卷四十三)。

【组成】茯神　麦门冬各三十六铢　通草　升麻各三十铢　紫菀　桂心各十八铢　知母一两　赤石脂四十二铢　大枣二十个　淡竹茹(鸡子大)一枚

【用法】上为粗散。以帛裹方寸匕,井花水二升半,煮取九合,时动裹子,为一服,每日二次。

【主治】心实热,口干烦渴,眠卧不安。

【宜忌】《外台》:忌生葱、酢物。

【方论选录】《千金方衍义》:以肺燥不能胜热,故用麦门冬、桂心蒸发津气于上,又以升麻、通草上升下泄,辅佐清热导火之力。

【备考】本方方名,《千金方衍义》引作"茯神散"。

58629　茯神煮散

【方源】《千金》卷二十一。

【组成】茯神　苁蓉　葳蕤各四两　生石斛　黄连各八两　栝楼根　丹参各五两　甘草　五味子　知母　人参　当归各三两　麦蘖三升

【用法】上药治下筛。每服三方寸匕,以绢袋盛,水三升,煮取一升服,一日二次。

【功用】补虚。

【主治】消渴,虚热四肢羸乏,渴热不止。

【宜忌】《外台》:忌猪肉、醋物、海藻、菘菜。

【方论选录】《千金方衍义》:三焦之治与肾脏之治截然两途,肾脏阴虚,而用壮水之剂,不得杂以补气之味,恐其留恋阴药于上,泥膈夺食,转增弥漫,非若益火消阴,宜兼补气,以资阳生阴长之功也。三焦本属相火,所以用苁蓉、五味、知母滋培下焦,黄连、麦蘖、石斛清理中焦,茯神、葳蕤、栝楼滋养上焦,又须人参、甘草,匡扶胃气,当归、丹参调和营血,则三焦之火,得以涵养,而无焱起之患矣。

【备考】本方方名,《医方类聚》引作"茯神散"。

58630　茯苓二陈汤

【方源】《婴童百问》卷二。

【组成】半夏五钱　陈皮二钱五分　白茯苓四钱　生甘草一钱半

【用法】上挫。每服三钱,加生姜三片,水煎服。

【功用】和胃气,化痰涎。

58631　茯苓人参散

【方源】《外台》卷十引《救急方》。

【组成】茯苓二斤(去黑皮,擘破如枣大,清水渍,经一日一夜再易水,出于日中,晒干,为末)　人参七两(捣)　甘草一两(炙,切)　牛乳七升　白沙蜜一升五合

【用法】上药以水五升,纳甘草,煮取二升,除甘草,澄滤;纳茯苓,缓火煎,令汁欲尽;次

纳白蜜、牛乳；次纳人参，缓火煎，令汁尽，仍搅药令调，勿许焦成，日中晒干，捣筛为散，以纸盛之。温乳及蜜汤和吃并得，亦不限多少。夏月水和当麨。

【功用】益心力，除谬忘，能饮食，延年益寿。

【主治】上气，胸胁满闷，霍乱，积痢。

【宜忌】忌海藻、菘菜、大醋。

【临症举例】有人年四十时，因患积痢，羸惫不能起止，形状如七十老人，服此药两剂，平复如旧。

58632 **茯苓大黄汤**

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】赤茯苓（去黑皮） 大黄（锉，微炒） 羚羊角（镑） 黄芩（去黑心） 甘草（微炙，锉） 枳壳（去瓤，麸炒）各一两 前胡（去芦头）三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加淡竹叶十片，同煎至八分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】阳厥多怒，气逆发狂，胸膈躁闷。

58633 **茯苓川芎汤**

【方源】《宣明论》卷二。

【异名】川芎茯苓汤（《医学入门》卷七）。

【组成】赤茯苓 桑白皮 防风 官桂 川芎 麻黄 芍药 当归 甘草（炙）各等分

【用法】上为末。每服二钱，水二盏，大枣三个，同煎至一盏，去滓，空心温服。如欲出汗，以粥投之。

【主治】着痹。留注不去，四肢麻，拘挛浮肿。

58634 **茯苓川芎汤**

【方源】《准绳·类方》卷四。

【组成】赤茯苓一钱半 桑白皮 防风 苍术（米泔浸一宿，炒） 麻黄 芍药（煨） 当归（酒洗）各一钱 官桂五分 川芎一钱二分 甘草四分

【用法】水二钟，加大枣二个，煎八分，食前温服。

【主治】痹。

58635 **茯苓天麻汤**

【方源】《眼科菁华录》卷下。

【组成】白术 苍术 人参 黄耆 明天麻 泽泻 茯苓 生姜 半夏 橘皮 焦山楂 神曲 炮干姜 黄柏（酒制） 麦芽（炒）

【用法】水煎服。

【主治】口眼㖞斜，仪容不正，厥阴头痛，颠倒眼黑，目不敢开，如在风云中，或头痛、或身重，四肢冷；或恶心，气短语促。

58636 **茯苓开胃散**

【方源】《外科精要》卷下。

【组成】茯苓一两 粉草（炙）五钱 枳壳（去瓤，麸炒黄）三钱

【用法】上为末。每服一钱，盐汤调下。

【主治】胃气不开，饮食不进。

58637 **茯苓木通汤**

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】赤茯苓（去黑皮） 木通（锉） 车前子叶 滑石各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓，空心温服。

【主治】伤寒后下焦热，小便不通。

58638 **茯苓五皮散**

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】赤苓 猪苓 泽泻 腹皮 陈皮 桑皮 姜皮

【用法】水煎服。

【主治】水肿，脾虚泻痢。

58639 **茯苓五味丸**

【方源】《外台》卷六引许仁则方。

【组成】茯苓五两 人参三两 麦门冬一升（去心） 生姜（屑）六两 青竹茹一升

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。初服十五丸，稍稍加至三十丸，煎芦根饮送下，一日二次。

【主治】呕逆经久，积热在胃，呕逆不下食。

【宜忌】忌醋物。

58640 **茯苓内托散**

【方源】《医部全录》卷一二七。

【组成】归身　黄耆(制)　川芎　白芍药　陈皮　白术　山药　熟地　白茯苓　人参各一钱　熟附子　甘草　肉桂　牡丹皮　地骨皮各五分

【用法】加生姜三片，大枣二个，水二钟，煎八分，食远服。

【主治】鬓疽已成，坚而不溃，溃而不敛，气血俱虚，身凉脉细，饮食少思，口淡无味，及形体消瘦者。

58641　**茯苓贝母汤**

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】白茯苓(去黑皮)一两　泽泻(锉)　贝母(焙)　桑根白皮(炙，锉)各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺经虚气，肿满喘痞，气促咳嗽。

58642　**茯苓分气饮**

【方源】《三因》卷十四。

【组成】五味子　桔梗　茯苓　甘草(炙)　陈皮　桑白皮　草果　大腹皮各二两半　紫苏叶

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盏，生姜三片，盐少许，煎七分，去滓，食前服。

【主治】脾胃不和，胸膈噎塞，腹胁疼痛，气促喘急，心下胀满，饮食不进，呕吐不止，兼脾气横泄，四肢浮肿。

58643　**茯苓升麻汤**

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】茯苓(赤、白)各五钱　升麻一钱五分　当归二钱　川芎一钱　苎根三钱

【用法】急流水煎服；或调琥珀末二钱服，更佳。

【主治】孕妇转脬，小便不通。

【方论选录】用升麻以举其胎气，用茯苓以利小便，用归、芎以活其胎，用苎根理胞系之缭乱。此以升剂为通之法也。

58644　**茯苓六合汤**

【方源】《元戎》。

【组成】四物汤四两　茯苓　泽泻各五分

【主治】妊娠伤寒，小便不利。

58645　**茯苓正气散**

【方源】《医方类聚》卷七十引《经验秘方》。

【组成】茯苓(白者)三两　苍术五两(米泔水浸三日，去皮)　枸杞子二两(盐炒)　川椒二两(去子)　干熟地黄二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，盐汤送下，不拘时候。

【功用】明目，暖水脏，退云翳。

【主治】头风。

58646　**茯苓甘草汤**

【方源】《伤寒论》。

【异名】茯苓桂甘汤(《医学入门》卷四)、茯苓汤(《嵩崖尊生》卷七)。

【组成】茯苓二两　桂枝二两(去皮)　甘草一两(炙)　生姜三两(切)

【用法】上药以水四升，煮取二升，去滓，分三次温服。

【功用】《伤寒论讲义》：温中化饮，通阳利水。

【主治】心下停饮，心悸，汗出不渴，小便不利；咳而遗溺；奔豚。

①《伤寒论》：伤寒汗出不渴者；伤寒厥而心下悸者。②《圣济总录》：伤寒发汗后，腹下气满，小便不利。③《普济方》引《直指》：心下停水，忪悸。④《内科摘要》：膀胱腑发咳，咳而遗溺。⑤《疝瘕积聚编》：疝作奔豚。

【方论选录】①《普济方》：茯苓、甘草之甘，益津液而和卫，桂枝、生姜之辛，助阳气而解表。②《内台方议》：今此汗出而渴者，为邪不传里，但在表而表虚也。故与茯苓为君而益津和中；甘草为臣辅之；以桂枝为佐，生姜为使，二者之辛而固卫气者也。③《伤寒附翼》：此厥阴伤寒发散内邪之汗剂，凡伤寒厥而心下悸者，宜先治水，后治其厥，不尔，水渍入胃，必作利也。此方本欲利水，反取表药为里症用，故虽重用姜、桂，而以里药名方耳。厥阴伤寒，先热者后必厥，先热时必消渴。今厥而心下

悸，是下利之源，斯时不热不渴可知矣。因消渴时饮水多，心下之水气不能入心为汗，蓄而不消，故四肢逆冷而心下悸也。肺为水母，肺气不化，则水气不行。茯苓为化气之品，故能清水之源；桂枝、生姜，则从辛入肺，使水气通于肺，以行营卫阴阳，则外走肌表而为汗矣；佐甘草以缓之，汗出周身，而厥自止，水精四布，而悸自安。以之治水者，即所以治厥也。伤寒心悸无汗而不渴者，津液未亏，故也用此方大发其汗。用姜、桂与茯苓等分，而不用芍药、大枣，是大发其汗。佐甘草者，一以协辛发汗，且恐水渍入胃也。

【临证举例】心下停水 《伤寒论临床实验录》：程某，男，年 48 岁。平素脾气衰弱，常患噫气胃满，消化滞呆之证。后在溽暑季节，贪食瓜果，而患腹泻。服健脾利水之剂，腹泻止，而胸脘满闷异常，逆气上冲，烦躁不宁，头眩欲呕，心下漉漉作水声，四肢逆冷，舌质淡，而苔白腻，脉象沉弦。此为脾不健运，水湿停潴之证。故以扶阳温胃行水之茯苓甘草汤治之。处方：桂枝 15 克，茯苓 24 克，生姜 15 克，甘草 3 克。连服两剂，而躁烦不作，脘闷消失，冲逆平息，脉象虚软。后以健脾行水之剂，调理而愈。

58647 茯苓甘草汤

【方源】《会约》卷四。

【组成】半夏二钱 生姜三钱 茯苓三钱 甘草一钱 陈皮一钱 白术一钱半

【用法】水煎服。

【主治】水停心下，眩悸呕吐。

【加减】如渴而小水不利，加泽泻八分，肉桂五分。

58648 茯苓甘露饮

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】白术 茯苓 猪苓 泽泻 滑石各二钱 寒水石 炙草各一钱 肉桂五分

【主治】霍乱，夏月引饮过多。

58649 茯苓石脂汤

【方源】《四圣心源》卷十。

【组成】茯苓三钱 丹皮三钱 桂枝三钱 芍药四钱 干姜二钱（炒） 甘草二钱 赤石脂三钱 升麻一钱

【用法】煎大半杯，温服。

【主治】痔漏肿痛下血。

【加减】肛热，加黄连；木燥，加阿胶。

58650 茯苓四逆汤

【方源】《伤寒论》。

【组成】茯苓四两 人参一两 附子一枚（生用，去皮，破八片） 甘草二两（炙） 干姜一两半

【用法】上药以水五升，煮取三升，去滓，温服七合，一日二次。

【功用】回阳益阴。

【主治】发汗，若下之，病仍不解，烦躁者。

【方论选录】①《内台方议》：发汗之，病当解，若不解，发汗外虚阳气；后若下之，内虚阴气，阴阳俱虚，邪独不解，故生烦躁也。与四逆汤以复阳气，加人参、茯苓以复阴气也。②《伤寒附翼》：先汗后下，于法为顺，而表仍不解，是妄下亡阴，阴阳俱虚而烦躁也。故制茯苓四逆，固阴以收阳。茯苓感天地太和之气化，不假根而成，能补先天无形之气，安虚阳外脱之烦，故以为君。人参配茯苓，补下焦之元气；干姜配生附，回下焦之元阳。调以甘草之甘，比四逆为缓，固里宜缓也。

【临证举例】①烦躁 《中医杂志》（1965；1：28）：段某某，素体衰弱，形体消瘦，患病年余，久治不愈，证见两目欲脱，烦躁欲死，以头冲墙，高声呼烦。家属诉：初起微烦头痛，屡经诊治，因其烦躁，均用寒凉清热之剂，多剂无效，病反增剧。面色青黑，精神极惫，气喘不足以息，急汗如油而凉，四肢厥逆，脉沉细欲绝。拟方如下：茯苓一两，高丽参一两，炮附子一两，炮干姜一两，甘草一两。急煎服之，服后烦躁自止，后减其量，继服十余剂而愈。②发热 《中医杂志》（1965；1：28）：患者李某某，女，35 岁，农民，于 1955 年诊治。患者素阳不足，外感寒邪，发热恶寒，寒多热少，入夜尤

甚，常增被而不暖。初用辛凉解表，继用苦寒泄下，以致病重，卧床不起已三月矣。现证：面色皖白无华，精神恍惚，形体消瘦，凉汗大出，面颊沟汗满下流，语声低微、气息奄奄，四肢厥逆，六脉欲绝。拟方：茯苓一两，炮附子五钱，潞党参五钱，干姜五钱，甘草五钱，二日内连服七剂，汗止足温，六脉来复，继服20余剂而愈。③疟疾　《中医杂志》(1965，1，29)：患者马某某，82岁，住城关旭光社，于1965年诊治，久患疟疾，触邪而发，六脉沉弦，寒热往来，发作有时。发则高热谵语，胸满闷而疼，曾用大柴胡治疗，服后下利虚脱，急请抢救。证见：虚脱，倒卧于地，面色脱落，下利黑屎满身，牙关紧急，不能言语，仅有微息，六脉沉微欲绝，四肢厥逆。拟方：茯苓一两，炮附子八钱，炮干姜五钱，人参五钱，甘草五钱，急煎服之。一剂泻止足温，能言气壮，六脉来复，继服三剂，其疟亦随之而愈。④肺心病　《浙江中医杂志》(1981；10：422)：陶某某，男，60岁，1980年3月3日初诊，素有"慢支"、"肺气肿"、"肺心"等病，已历10余年，每遇天气变化即发。刻诊面色黯滞，唇及四肢紫绀，咳嗽气急，心悸，坐卧不宁，肢冷，脉伏，舌色紫暗、苔白而灰糙。证属阴虚于里，阳脱于外。急予回阳救逆：茯苓、西党参各9克，淡附子、炙甘草各6克，干姜、黑锡丹(吞)各3克。3剂后，面唇紫绀已瘥，咳嗽气急亦减，肢端仍紫绀，便溏，尿少，脉沉细，舌质黯红，苔黄灰而腻。脾肾阳虚未复，仍予前方，淡附子加至9克，西党参加至15克。3剂后，面容转红润，气平，肢缓，二便正常。

58651　茯苓生化汤

【方源】《梅氏验方新编》卷四。

【组成】川芎一钱　当归二钱(土炒)　姜炭　炙甘草各五分　茯苓一钱　陈皮一钱　白术一钱半　人参二钱　肉果(煨)　诃子各一钱　莲子八分　糯米一撮

【用法】水煎服。

【主治】产后泄泻。

【加减】寒痛泻，加砂仁五分；热泄，加炒连三分；泻久，加升麻三分；泻水，加苍术一钱；泻出食肉如败卵及噫气，加神曲、砂仁各八分，山楂、麦芽各五分，或加豆蔻、丁香各一钱；渴，加麦冬一钱、五味六分。

58652　茯苓白术汤

《伤寒总病论》卷三。为《伤寒论》"茯苓桂枝白术甘草汤"之异名。见该条。

58653　茯苓白术汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】赤茯苓(去黑皮)一两　白术三分　桂(去粗皮)三分　甘草(炙、锉)半两　芎䓖一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓温服。

【主治】伤寒吐后，心下逆满，松悸不定，起即头眩。

58654　茯苓白术汤

【方源】《三因》卷五。

【组成】茯苓　干姜(炮)　甘草(炙)　白术　桂心各一两

【用法】上为末，每服四钱，水一盏，煎七分，去滓，食前服。

【主治】①《三因》：冒暑毒，加以着湿，或汗未干即浴，皆成暑湿。②《医学入门》：湿温寒热，头目疼痛，胸满妄言，多汗，两胫逆冷者。

58655　茯苓白术汤

【方源】《易简方》。

【组成】白术　附子各一两　甘草半两　茯苓半两　官桂半两

【主治】①《易简方》：冒雨湿着于肌肤，或因汗出浸渍，或因澡浴得病，腰重脚弱，身体烦痛，头眩。

【备考】《普济方》本方用法"上㕮咀，每服四钱，水二盏，生姜七片，煎至六分，去滓，食前服。"

58656　茯苓白术汤

《普济方》卷一四七引《十便良方》。为《伤寒论》"桂枝去桂加茯苓白术汤"之异名。见该

条。

58657 **茯苓白术汤**

【方源】《直指》卷三。

【组成】茯苓 干姜（炮） 甘草（炙） 白术 辣桂 苍术（炒）各等分

【用法】上锉。每服三钱，水煎服。

【主治】中湿，身体痛重。

58658 **茯苓白术汤**

【方源】《医方集解》。

【组成】茯苓 白术各等分。

【主治】心下支饮，常苦眩冒。

58659 **茯苓白术散**

【方源】《袖珍小儿》卷六。

【组成】茯苓三钱 白术 人参 木通各一钱 肉豆蔻（炮） 肉桂各一钱半（去皮） 诃肉二钱（煨） 枳壳（炒） 甘草各一钱

【用法】上锉散。每服三钱，灯心煎服，或加陈米一撮煎。

【主治】痢或白或清。

58660 **茯苓白术散**

【方源】《杂病源流犀烛》卷三。

【组成】滑石一两 寒水石 石膏 泽泻 甘草各五钱 白术 茯苓 人参 桂枝各二钱半

【用法】上为末。每服三钱，开水送下，姜汤亦可。

【主治】霍乱。吐泻既多，津液暴亡，烦渴引饮不止。

58661 **茯苓半夏丸**

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】牵牛子四两 青橘皮 紫苏子 半夏 五灵脂各一两 木香 槟榔各半两 川芎 郁李仁各一两

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，橘皮汤送下，不拘时候。

【功用】搜风行气。

【备考】本方名茯苓半夏丸，但方中无茯苓，疑脱。

58662 **茯苓半夏汤**

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】赤茯苓（去黑皮）二两 半夏（汤洗七遍，炒干）三两 陈橘皮（汤浸，去白，焙）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一分（拍碎），同煎至七分，去滓温服，晚再服。

【主治】伤寒呕哕，心下悸动，胸膈有滞水，往往头眩。

58663 **茯苓半夏汤**

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】茯苓四两 半夏二钱半（汤洗七遍） 旋覆花三钱 甘遂（锉末，炒）一钱

【用法】上㕮咀。水二盏，煎至一盏，去滓，将甘遂末分二服，用药汁半盏调服。以利为度。

【主治】酒疸。心下懊痛，足膝胫满，小便黄，面发赤斑，由大醉当风入水，湿加于热，内蒸脾气。

58664 **茯苓半夏汤**

《宣明论》卷六。为《金匮》卷中“小半夏加茯苓汤”之异名。见该条。

58665 **茯苓半夏汤**

【方源】《宣明论》卷六。

【组成】茯苓一分（去皮） 半夏一钱 生姜一分（取汁） 黄芩一分（去腐） 甘草一分 红皮一分（去瓤）

【用法】上锉，如麻豆大。水一盏，煎至四分，空心冲生姜汁下，温服，不拘时候。

【主治】①《宣明论》：风痰。②《卫生宝鉴》：风热痰逆呕吐或眩运头痛。

58666 **茯苓半夏汤**

《东垣试效方》卷三。为《兰室秘藏》卷中“白术汤”之异名。见该条。

58667 **茯苓半夏汤**

《玉机微义》卷四十九。即《千金》卷二“半夏茯苓汤”。见该条。

58668 **茯苓半夏汤**

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】茯苓　半夏　枳实　桔梗　厚朴　大腹皮　木通　苍术　陈皮

【主治】水结胸，但头汗出，心下满，揉之汩汩有声者。

58669　**茯苓半夏汤**

【方源】《伤寒全生集》卷三。

【组成】茯苓　半夏　生姜　陈皮　厚朴

【用法】水煎服。

【主治】心下有水，呕吐哕者。

58670　**茯苓半夏汤**

《赤水玄珠》卷二十一。为《妇人良方》卷十二引张氏方"半夏茯苓汤"之异名。见该条。

58671　**茯苓半夏汤**

【方源】《回春》卷三。

【组成】茯苓　半夏(姜汁炒)　厚朴(姜汁炒)各一钱　干姜(炒)　丁香　官桂　砂仁各五分　陈皮一钱　藿香八分　柿蒂一钱　茴香七分　沉香　木香　甘草各三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，磨沉香、木香同服。

【主治】水寒停胃发呃。

58672　**茯苓半夏汤**

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】茯苓(去皮)　半夏(姜炒)　陈皮　苍术(米泔浸)　厚朴(姜炒)各一钱　砂仁五分　藿香八分　乌梅一个　干姜(炒)三分　甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，水煎，徐徐服。

【主治】水寒停胃作呕吐者。

58673　**茯苓半夏汤**

【方源】《同寿录》卷三。

【组成】半夏一钱五分　白术　白茯苓各一钱　甘草五分　陈皮六分　缩砂仁八分

【用法】研，水煎服。

【主治】恶阻，呕吐不止者。

58674　**茯苓半夏汤**

【方源】《杂病源流犀烛》卷四。

【组成】赤苓　半夏　陈皮　苍术　厚朴

【主治】痰饮呕吐。

58675　**茯苓半夏汤**

【方源】《不知医必要》卷一。

【组成】制半夏(醋炒)四钱　茯苓二钱　甘草二钱

【用法】上为末。每服二钱，白汤调下。

【主治】中暑忽然昏倒。

58676　**茯苓加减汤**

《宣明论》卷一。为《圣济总录》卷六十"茯苓汤"之异名。见该条。

58677　**茯苓戎盐汤**

【方源】《金匮》卷中。

【组成】茯苓半斤　白术二两　戎盐(弹丸大)一枚

【用法】先将茯苓、白术煎成，入戎盐再煎，分三次温服。

【功用】《金匮心释》：益肾健脾利湿。

【主治】小便不利。

【方论选录】《沈注金匮要略》：夫湿热壅于膀胱则为淋，然伤腑未有不伤于脏者。故用白术健脾，茯苓渗湿，不使下流入肾为病；以戎盐养水软坚，而除阴火。

【备考】本方方名，《本草纲目》引作"戎盐汤"。

58678　**茯苓地黄汤**

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　生干地黄(焙)　栝楼根各一两　知母(焙)半两　麦门冬(去心，焙)一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加小麦一百粒，淡竹叶三五片，大枣三个(擘)，同煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后胃热引饮，烦渴不止。

58679　**茯苓安心汤**

【方源】《外台》卷六引《删繁方》。

【组成】茯苓三两　人参三两　干姜三两　桂心一两　远志皮三两　甘草二两(炙)

【用法】上切。以水九升，煮取三升，去滓，分三服。

【主治】上焦虚寒，精神不守，泄下便利，语声不出。

【宜忌】忌生葱、醋物、海藻、菘菜。

58680 **茯苓导水汤**

【方源】《金鉴》卷四十六。

【组成】茯苓 槟榔 猪苓 缩砂 木香 陈皮 泽泻 白术 木瓜 大腹皮 桑白皮 苏梗各等分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】妊娠肿满与子气，喘而难卧，胀满难堪；产后浮肿，喘嗽，小便不利者。

【加减】胀，加枳壳；喘，加苦葶苈子；腿脚肿，加防己。

【临证举例】子满 《新中医》(1979；3：30)：李某某，女，29 岁。26 岁结婚，婚后 6 个多月早产一次。现第二胎怀孕七个多月。从第四个月起，周身出现肿胀，腹部尤甚，先后延医数人，内服四十余剂中药，未见好转。现腹胀异常，四肢均有浮肿，自觉气短心悸，饮食少进，腰痛腿沉，白带甚多，行走困难来诊。处方：茯苓 15 克，白术 15 克，猪苓 15 克，泽泻 5 克，榔片 5 克，砂仁 7.5 克，木香 3.5 克，陈皮 10 克，腹皮 15 克，苏梗 10 克，当归 10 克，白芍 7.5 克。服药后胸脘略适，饮食稍增，尿量略多，守原方稍加减继服，十余剂后诸症基本痊愈，肿消痛减，惟体质较弱，改用当归散以善其后。

58681 **茯苓导水汤**

《金鉴》卷五十四。为《普济方》卷一九一引《德生堂方》“导水茯苓汤”之异名。见该条。

58682 **茯苓苏子丸**

【方源】《三因》卷十四。

【组成】茯苓 苏子 杏仁(去皮尖)各二两 橘皮 防己 葶苈(纸炒)各一两一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服三十丸，食后桑白皮汤送下。

【主治】面肿，小便涩，心腹胀满。

58683 **茯苓杏仁汤**

《杏苑》卷三。为《金匮》卷上“茯苓杏仁甘草汤”之异名。见该条。

58684 **茯苓杏仁煎**

【方源】《外台》卷二十引《古今录验》。

【组成】茯苓四两 杏仁四两 橘皮三两 苏子一升(碎) 甘草三两(炙) 芍药四两 白前三两 五味子三两 生姜汁五合、蜜六合 竹沥二升

【用法】上切。以水九升，先煮诸药，取三升，去滓，纳竹沥、生姜汁、蜜等和搅，微火煎取四升，每服四合，日二次，夜一次。

【主治】气满胸急。

【宜忌】忌海藻、菘菜、酢物。

58685 **茯苓杏仁煎**

《普济方》卷一九四。为方出《外台》卷二十引《古今录验》，名见《鸡峰》卷十七“茯苓饮子”之异名。见该条。

58686 **茯苓利膈汤**

【方源】《普济方》卷一四七引《保生回车论》。

【组成】茯苓一两 牛蒡子二两(炒香) 荆芥穗一两 桔梗一两(微炒) 甘草半两(炙紫色)

【用法】上为粗散。每服三钱，水一盏，加生姜三片，同煎六分，去滓温服，一日二三服，不拘时候。

【主治】伤寒。

58687 **茯苓佐经汤**

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】茯苓 陈皮 半夏 白术 苍术各一钱 藿香 泽泻 甘草 葛根 柴胡 厚朴 木瓜各五分

【用法】水二钟，加生姜二片，煎八分，食前服。

【主治】足少阳经为四气所乘，以致腰腿发热疼痛，头目昏眩，呕吐不食，胸膈不利，心烦热闷。

58688 **茯苓补心汤**

【方源】《千金》卷十三。

【组成】茯苓四两 桂心二两 大枣二十

燥湿汤"之异名。见该条。

58697 茯苓泽泻汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】茯苓汤(《千金翼》卷十九)。

【组成】茯苓半斤　泽泻四两　甘草二两　桂枝二两　白术二两　生姜四两

【用法】以水一斗,煮取三升,纳泽泻,再煮取二升半,温服八合,一日三次。

【主治】①《金匮》:胃反,吐而渴欲饮水者。②《三因》:霍乱,吐利后,烦渴欲饮水。

【方论选录】①《金匮玉函经二注》:胃反吐,津液竭而渴矣,斯欲饮水以润之,更无小便不利,而用此汤何哉?盖阳绝者,水虽入而不散于脉,何以滋润表里,解其燥郁乎?惟茯苓之淡行其上,泽泻之咸行其下,白术、甘草之甘和其中,桂枝、生姜之辛通其气,用布水精于诸经,开阳存阴,而洽荣卫也。②《沈注金匮要略》:此外风乘胃,脾虚成饮之方也。风气通肝,木盛制土,脾胃气郁而反上逆,则为胃反,然吐则痰饮去而风火炽盛,胃津枯燥,以故吐而渴欲饮水,但木旺土衰,则水寡于畏,肾水反溢为饮,治当健脾,以除伏邪宿饮。故以姜、桂、术、草健脾和营卫,而驱邪外出,茯苓、泽泻导胃肾之余饮也。

【临证举例】胃反　《金匮今释》:成绩录云,安部候臣菊池大夫,从候在浪华,久患胃反,请治于先生曰:不佞曩在江户得此病,其初颇吐水,间交以食,吐已乃渴,诸医交疗,百端不愈,一医叫我断食,诸证果已。七日始饮,复吐如初,至今五年,未尝有宁居之日,愿先生救之。先生乃诊其腹,自胸下至脐旁硬满,乃与茯苓泽泻汤,数日而痊愈。

58698 茯苓建中汤

【方源】《产科发蒙》卷四。

【组成】小建中汤加茯苓

【用法】烧黑鱼狗末五分点服。

【主治】产后下利不止。

58699 茯苓栀子散

【方源】《医方类聚》卷一三三引《施圆端效方》。

【组成】白茯苓　山栀子　甘草(炙)　当归(焙)　白芍药各半两

【用法】上㕮咀。每服三四钱,水一盏半,煎至七分,去滓,食前温服。

【主治】五淋,便血疼痛。

58700 茯苓茱萸丸

【方源】《普济方》卷一四七引《保生回车论》。

【组成】茯苓　吴茱萸(汤浸五次,焙干)　芍药(不问赤白皆可用)　黄连(去须)各等分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸、二十丸,温熟水送下。如无蜜,即用饮丸。

【主治】伤寒。

58701 茯苓厚朴汤

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】白茯苓(去皮)　半夏(汤煮透,滤,锉,焙干)各七钱半　甘草三钱(炙)　厚朴五钱(去粗皮,锉碎,每一斤用生姜一斤,切薄片,烂杵拌匀,酿一宿,慢火炒干)

【用法】上㕮咀。每服二钱,水一盏半,加生姜三片,煎七分,不拘时候温服。或加大枣一个,去核同煎。

【主治】①《活幼心书》:伤寒伤风夹痰,呕逆并吐泻后,喉涎牵响,饮食减少,脾胃气虚。②《赤水玄珠》:伤乳食停痰,咳嗽,或吐白沫,气喘。

58702 茯苓厚朴汤

【方源】《产科发蒙》卷二。

【组成】当归　川芎　茯苓　厚朴(制)各等分

【用法】每服五钱,以水三合,煮取一合,以延胡索末一钱,和调顿服。

【主治】妊娠卒心痛,气欲绝。

58703 茯苓厚朴汤

【方源】《医钞类编》卷六。

【组成】茯苓三钱　厚朴一钱五分　白术二钱　半夏　枳壳　陈皮　甘草各一钱

【用法】水一钟，加生姜三片，大枣三个，煎八分，食远服。

【主治】虚闭。浊阴之气上升，裹其痰饮，饮食不进，大便为气闭不通，小便清利。

58704　**茯苓指迷丸**

《不居集》上集卷十七。为《百一》卷五引《指迷方》"治痰茯苓丸"之异名。见该条。

58705　**茯苓钟乳丸**

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】白茯苓(去黑皮)　黄耆(锉)　枳壳(去瓤，麸炒)　蛇床子各二两　炼成钟乳粉六两　牛膝(酒浸，切，焙)　肉苁蓉(酒浸，切，焙)　人参　石斛(去根)　五味子各一两半　熟干地黄(焙)　菟丝子(酒浸，别捣)各三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心酒送下。

【功用】通百节，利九窍，补下焦。

【主治】瘛病筋脉相引，下焦伤竭不足。

58706　**茯苓钩藤汤**

【方源】《普济方》卷三七六。

【组成】钩藤　茯苓各二分　甘草(炙)　大黄(煨)各一分

【用法】水一升，煮去三合，分为五服。

【主治】少小七日以后患痫。

58707　**茯苓前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】赤茯苓(去黑心)一两　前胡(去芦头)三分　枳实(锉，麸炒)　木香　杏仁(汤浸，去皮尖双仁，炒)各半两　甘草(炙)一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜半分(拍碎)。同煎至六分，去滓温服。

【主治】伤寒心中痞满，结气不散。

58708　**茯苓前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】白茯苓(去黑皮)　前胡(去芦头)　菊花　白术　附子(炮裂，去皮脐)　细辛(去苗叶)　芎劳　麻黄(去根节)各一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服二钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后伤风头痛，眩闷倒旋。

58709　**茯苓除湿汤**

《医学纲目》卷二十一。为《卫生宝鉴》卷十四"茯苓渗湿汤"之异名。见该条。

58710　**茯苓桂甘汤**

《直指》卷十八。为《伤寒论》"茯苓桂枝甘草大枣汤"之异名。见该条。

58711　**茯苓桂甘汤**

《医学入门》卷四。为《伤寒论》"茯苓甘草汤"之异名。见该条。

58712　**茯苓桂枝汤**

《伤寒总病论》卷三。为《伤寒论》"茯苓桂枝甘草大枣汤"之异名。见该条。

58713　**茯苓桂枝汤**

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】赤茯苓(去黑皮)　桂(去粗皮)　半夏(汤洗七遍，炒干)各一两　甘草(炙，锉)半两

【用法】上为粗末，每服三钱匕，水一盏，加生姜半分(拍碎)，同煎至七分，去滓温服。

【主治】伤寒发汗后，引饮过多，心下悸动。

58714　**茯苓造化糕**

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷四引《医方集略》。

【组成】白茯苓　莲肉　山药　芡仁各四两　白晚粳米二升(为粉)　砂糖一斤(刮为屑)

【用法】上为末，拌匀，入甑中，以竹刀划为片界，以篾蓬覆甑上，蒸熟取出，晒干。任意食之，若覆木盖则不熟矣。

【功用】补养元气。

【主治】内伤，脾胃虚弱，饮食不进。

58715　**茯苓消气丸**

【方源】《普济方》卷三八〇。

【组成】汉防己　茯神　茯苓　胡连各一钱　麝香一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服五丸，米饮送下。

【主治】小儿脾疳，手足浮肿。

58716 **茯苓调中散**

【方源】《嵩崖尊生》卷十一。

【组成】前胡　细辛　人参　桂心　陈皮　当归　白芍　茯苓　麦冬　炙草各一钱　半夏七分半

【主治】虚弱，潮热，自汗。

58717 **茯苓调血汤**

【方源】《直指》卷十六。

【组成】半赤茯苓一两　赤芍药　川芎　半夏曲各半两　前胡　柴胡　青皮　枳壳　北梗　桑白皮（炒）　白茅根　灯心　甘草（炙）各二钱半

【用法】上锉细。每服三钱，加生姜五片，蜜二匙，新水煎服。

【主治】酒面过度，房劳后，小便下血。

58718 **茯苓陷胸汤**

【方源】《伤寒微旨论》卷下。

【组成】茯苓　黄连各一两　冬葵子　续随子各一分　大黄　杏仁各半两　半夏三分

【用法】上锉，如麻豆大，合一处。每服半两，水二盏，煎至一盏，净纽，去滓温服。如半日许未快利，更投一服，以胸中快及下利为度。

【主治】伤寒小便色黄赤及涩。

58719 **茯苓理中汤**

【方源】《外台》卷六引《范汪方》。

【组成】茯苓二两　甘草三两（炙）　干姜一两（炮）　人参三两　木瓜三两

【用法】上㕮咀。以水六升，煮取三升，去滓，适寒温，分为四服。

【主治】霍乱，脐上筑而悸。

【宜忌】忌海藻、菜、酢物。

58720 **茯苓菖蒲丸**

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】茯苓（去黑皮）　菖蒲　远志（去心）各一两　茯神（去木）二两　赤小豆半两

【用法】上为细末，用炊饼浸稀为丸，如绿豆大。每服三十丸至五十丸，食后熟水送下。

【主治】心气不足。

58721 **茯苓菟丝丸**

【方源】《风痨臌膈》。

【组成】白茯苓　白术（米泔浸）　莲肉各四两　五味子（酒煎）二两　山药二两　杜仲（酒煎）三两　炙草七钱　菟丝子十一两（用洁水淘净，入陈酒浸一日，文火煮烂极，打为饼，焙干为末）

【用法】用山药末以陈酒煮，面糊为丸，如梧桐子大。每服一百余丸，空心滚白汤送下。

【主治】脾肾虚损，不能收摄，以致梦遗精滑、困倦。

58722 **茯苓黄连丸**

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】黄连末八分　茯苓六分　木香二分　诃子皮一分

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心服。泻止勿服。

【主治】渴人引饮既久，夏秋之交，湿气过多，脾胃又弱，时或泄泻。

58723 **茯苓黄耆汤**

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】白茯苓（去黑皮）　黄耆（锉）　菊花　独活（去芦头）　枳壳（去瓤，麸炒）　当归（切，焙）　生干地黄（焙）　人参　乌头（炮裂，去皮脐）各一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后伤风，头痛，目昏眩。

58724 **茯苓猪肾汤**

【方源】《圣惠》卷七十六。

【组成】白茯苓一两　桑寄生一两　干姜半两（炮裂）　熟干地黄一两　白术一两　芎䓖一两　人参一两（去芦头）　麦门冬一两（去心）

【用法】上锉细，和匀。每服用豮猪肾一对（切，去脂膜），先以水一大盏半，加黑豆半合，煎至一盏，去肾及豆，入药一两，煎至七分，去滓，分二次，食前温服。

【主治】妊娠曾伤九月胎。

58725 **茯苓麻黄汤**

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】白茯苓(去黑皮)　麻黄(去根节)各一两半　黄耆(锉)　大青(锉)　桂(去粗皮)各三分　细辛(去苗叶)　杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒)各一两一分　石膏二两(碎)　丹参半两　五味子　甘草(炙,锉)　贝母　陈橘皮(去白,焙干)　芎䓖各一两　枳实(麸炒)三枚

【用法】上为粗末。帛裹三钱匕,井花水一盏半,煎至八分,去滓温服,一日二次。

【主治】大肠实热,令人气凭满。

58726 **茯苓渗湿汤**

【方源】《景岳全书》卷五十七引《活人书》。

【组成】白茯苓　泽泻　茵陈　青皮　陈皮　防已各五分　栀子　黄芩各八分　黄连　枳实各七分　苍术　白术各一钱

【用法】水煎服。

【主治】黄疸湿热,呕吐而渴,身目俱黄,小便不利,食少面热。

58727 **茯苓渗湿汤**

《兰室秘藏》卷下。为原书同卷"塌气退黄汤"之异名。见该条。

58728 **茯苓渗湿汤**

【方源】《医学正传》卷二引东垣方。

【组成】黄芩　黄连　栀子　防已　白术　苍术　陈皮　青皮　枳实各四分　赤茯苓　泽泻各五分　茵陈六分　猪苓(去黑皮)一钱

【用法】上细切,作一服。水二盏,煎至一盏,去滓温服。

【主治】湿郁成黄疸,寒热呕吐而渴,身体面目俱黄,小便不利,不思饮食,莫能安卧。

58729 **茯苓渗湿汤**

【方源】《卫生宝鉴》卷十四。

【异名】茯苓除湿汤(《医学纲目》卷二十一)、渗湿汤(《痘疹传心录》卷十八)。

【组成】茵陈六分　白茯苓五分　木猪苓　泽泻各三分　黄连　黄芩(生)　栀子　汉防已　白术　苍术　陈皮　青皮各二分

【用法】上㕮咀,作一服。水二盏,煎至一盏,去滓,空心、食前温服。

【主治】黄疸。寒热呕吐,渴欲饮冷,身体面目俱黄,小便不利,全不食,不得卧。

58730 **茯苓渗湿汤**

【方源】《万氏家抄方》卷二。

【组成】白茯苓五分　泽泻五分　茵陈六分　猪苓二钱　陈皮　黄连　栀子　防已　白术　苍术　枳实各二分

【用法】上㕮咀,作一服,水二盏,煎至一盏,去滓,空心、食前温服。

【主治】黄疸。寒热呕吐,渴欲饮冷,身体面目俱黄,小便不利,全不食,不得卧。

58731 **茯苓渗湿汤**

【方源】《慈幼心传》卷下。

【组成】四苓散　平胃散加黄连　山栀仁　茵陈　山楂　麦芽　枳壳

【用法】水煎服。

【主治】小儿食疸。

58732 **茯苓渗湿汤**

【方源】《杏苑》卷三。

【组成】黄芩二分　黄连一钱五分　栀子二钱　陈皮二分　枳实八分　青皮一分半　猪苓一钱　赤茯苓八分　泽泻一钱　茵陈二钱

【用法】上㕮咀,水二钟,煎一钟,温服。

【主治】湿热内郁,致成黄疸。

【方论选录】上证治宜清热胜湿。是以黄芩、黄连、栀子以清热,陈皮、青皮、枳实以散郁,猪苓、泽泻、赤苓利小便以渗湿,茵陈驱湿热以退黄疸。

58733 **茯苓渗湿汤**

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】猪苓　泽泻　苍术(米泔浸)　白茯苓　陈皮　枳实(麸炒)　黄连(炒)　黄芩　栀子　防已　茵陈　木通

【用法】上锉。加生姜三片,水煎服。

【主治】湿热发黄,汗黄尿赤,及寒热呕吐,

而渴欲饮冷水，身目俱黄，小便不利，不思饮食。

【加减】如饮食不思乃伤食，加砂仁、神曲、麦芽(炒)各三分。

58734 **茯苓渗湿汤**

【方源】《证治宝鉴》卷十二。

【组成】茵陈七分　白茯苓六分　木猪苓　泽泻　白术　陈皮　苍术(米泔浸一宿，炒)　黄连各五分　山栀(炒)　秦艽　防己　葛根各四分

【用法】水二钟，煎七分，食前服。

【主治】黄疸。呕吐，寒热，尿涩。

58735 **茯苓渗湿汤**

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】茯苓　泽泻　木通　防风　猪苓　银花　连翘　苍术　黄柏　川芎

【用法】水煎服。

【主治】疹后因冷水沐浴，湿留皮肤，愈后发生痛痒毒疮，常流湿水成片者。

58736 **茯苓琥珀丸**

【方源】《袖珍》卷三引《圣惠》。

【组成】赤茯苓(去皮)　防己各一两半　苦葶苈三两半(隔纸炒)　紫苏子(拣净)一两　琥珀一两(别研)　郁李仁一两七钱半(汤浸，去皮)　陈皮一两三钱　杏仁(汤浸，去皮尖及两仁者，麸炒)一两三钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，人参汤送下。

【主治】水气乘肺，遍身浮肿，中焦痞隔，气不升降，咳嗽喘促，小便不利。

58737 **茯苓琥珀汤**

【方源】《卫生宝鉴》卷十七。

【异名】茯苓琥珀散(《东医宝鉴·内景篇》卷四)。

【组成】茯苓(去皮)　琥珀　白术各半两　泽泻一两　滑石七钱　木猪苓半两(去皮)　甘草(炙)　桂(去皮)各三钱

【用法】上为末。每服五钱，用长流甘澜水煎一盏，空心食前调下。待少时，以美膳压之。

【主治】小便数而欠，日夜约去二十余行，脐腹胀满，腰脚沉重，不得安卧，脉沉缓，时时带数。

【方论选录】《内经》曰：甘缓而淡渗。热搏津液内蓄，脐胀腹满，当须缓之泄之，必以甘淡为主，是用茯苓为君；滑石甘寒，滑以利窍，猪苓、琥珀之淡以渗泄而利水道，故用三味为臣；脾恶湿，湿气内蓄，则脾气不治，益脾胜湿，必用甘为助，故以甘草、白术为佐；咸入肾，咸味下泄为阴，泽泻之咸以泻伏水，肾恶燥，急食辛以润之，津液不行，以辛散之，桂枝味辛，散湿润燥，此为因用，做以二物为使；煎用长流甘澜水，使不助其肾气，大作汤剂，令直达于下而急速也。

【临证举例】小便不利，中书右丞合剌合孙，病小便数而欠，日夜约去二十余行，脐腹胀满，腰脚沉重，不得安卧，脉沉缓，时时带数。遂处茯苓琥珀汤，两服减半，旬日良愈。

58738 **茯苓琥珀汤**

【方源】《赤水玄珠》卷十五。

【组成】川楝子(去核，炒)　甘草(生)各一钱　人参五分　茯苓四分　琥珀　当归梢　泽泻　柴胡各三分　元胡索七分

【用法】水煎服。数服效。

【主治】小便涩，茎中痛不可忍，相引胁下痛。

58739 **茯苓琥珀散**

《东医宝鉴·内景篇》卷四。为《卫生宝鉴》卷十七"茯苓琥珀汤"之异名。见该条。

58740 **茯苓琥珀散**

【方源】《医略六书》卷二十五。

【组成】人参一两半　琥珀三两　川楝三两(酒炒)　泽泻一两半　延胡一两半(醋炒黑)　丹皮一两半　归梢三两　茯苓三两　甘草一两半

【用法】上为散。长流水煎，去滓热服。

【主治】血淋。茎中涩痛，牵引胁下，脉弦涩者。

【方论选录】血滞膀胱，气不施化，故茎中

痛引胁下，小便淋血不止焉。人参扶元化气以通血脉，茯苓渗湿利水以通水道，琥珀屑散瘀血通淋，延胡索活血滞止血，川楝子泻湿热除涩痛，牡丹皮凉血热退相火，归梢破宿血，泽泻利膀胱，草梢泻火缓中以除茎中之痛也。为散，长流水煎，是急方通剂，速其瘀化水行，俾膀胱之气化，则津液四布而水润木荣，小便淋血无不自止，何茎中痛引胁下之不痊哉。此扶元活血之剂，为血淋茎痛引胁之专方。

58741　**茯苓椒目丸**

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】葶苈子七两　椒目　茯苓各三两　吴茱萸二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，米饮送下，一日三次。

【主治】身面浮肿，或是虚气，或是风冷气，或是水饮气，或肿入腹，苦满急，害饮食。

58742　**茯苓燥湿汤**

《东垣试效方》卷九。为《脾胃论》卷下"清燥汤"之异名。见该条。

58743　**茯苓燥湿汤**

【方源】《保婴撮要》卷四。

【异名】茯苓泻湿汤(《审视瑶函》卷二)、茯苓泄湿汤(《眼科阐微》卷四)。

【组成】白术　人参　甘草(炒)　枳壳(麸炒)　茯苓　蔓荆子　薄荷各二分　苍术　前胡　独活各三分　川芎　羌活各三分半　柴胡四分　泽泻一分半

【用法】每服二钱，水煎服。

【主治】疳毒眼。小儿易饥而渴，腹胀生疮，目痛生翳不开，眵泪如脓。

【方论选录】《审视瑶函》：小儿寒暑饮食不调，酿成此证。夫寒暑饮食不节，皆能伤动脾胃，脾胃者，阴阳之会元也，故清阳下而不升，浊阴上面不降。今以白术、人参，先补脾胃为君；柴胡、甘草、枳壳，辅上药补脾胃为臣；苍术燥湿，茯苓、泽泻，导浊阴下降为佐；然后以羌活、独活、防风、蔓荆子、前胡、川芎、薄荷诸主风药以胜湿，引清阳上升为使。此正治神效之法也。

58744　**茯苓竭暑饮**

【方源】《秋疟指南》卷一。

【组成】茯苓二钱　川连一钱　生甘草五分　青蒿五分　条芩二钱　麦冬一钱半　钗斛一钱半　竹茹一团　滑石一钱　泽泻一钱半　半夏一钱半　大黄二钱　陈皮一钱

【用法】生姜、大枣引，水一碗半，煎至八分服。

【主治】少阴经气疟疾。

58745　**茯泽石膏汤**

【方源】《医学摘粹》卷三。

【组成】茯苓三钱　泽泻三钱　栀子三钱　甘草二钱　半夏三钱　石膏三钱

【用法】水煎大半杯，热服。

【主治】湿热熏蒸，目珠黄赤者。

58746　**茯神四逆汤**

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】茯神二钱　附子三钱　干姜一钱　人参二钱　甘草五分　木香六分　砂仁一钱

【用法】水三钟，煎至一钟，微温服。

【主治】真心痛，水来克火，寒邪直犯君主，脘痛，呕吐，身冷，手足青至节，甚则旦发夕死。

58747　**茯神麦冬汤**

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】茯神　麦门冬各一钱五分　地骨皮　茯苓各一钱　黄芩　酸枣仁各六分　沙参　白鲜皮　羚羊角各五分　甘草三分

【用法】上㕮咀。水煎熟，食远温服。

【主治】胆热多睡，神思昏闷。

58748　**茯神远志丸**

【方源】《杂病源流犀烛》卷九。

【组成】人参　龙齿　茯神　远志　菖蒲　知母　黄柏

【主治】阴阳俱虚之遗泄。

58749　**茯神补心汤**

【方源】《济阳纲目》卷五十四。

【组成】茯神四两 桂心 甘草（炒）各三两 紫石英（煅） 人参各一两 大枣二十枚 麦门冬（去心）三两 赤小豆二十四粒

【用法】上锉碎。用水七升，煎至二升半，分三服。或每服一两，水煎服。

【主治】心血不足，善悲愁怒，衄血，面黄，五心烦热，或咽喉痛，舌本作强。

58750 茯神黄耆汤

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷十引《医学入门》。

【组成】茯神 羌活 蔓荆子 防风 薏苡仁 黄耆 五味子 麦门冬 石菖蒲 黄芩各一钱 甘草五分

【用法】上锉，作一贴。水煎服。

【主治】寡妇师尼郁抑成病，或时独笑，成泣，脉迟伏，或如雀啄，颜色不变者。

58751 茯神镇惊汤

【方源】《痰疹一得》卷下。

【组成】人参一钱 黄耆一钱半（炙） 当归二钱 茯神三钱 远志一钱半 龙齿二钱（煅） 白芍一钱 麦冬二钱 琥珀一钱（研，冲服） 炙甘草八分 龙眼三枚 灯芯三十寸

【主治】惊悸。

58752 茯苓小泽泻汤

【方源】《外台》卷八引《集验方》。

【异名】茯苓汤（《医心方》卷九引《经心录》）。

【组成】茯苓 泽泻 半夏各四两 桂心 甘草（炙）各二两

【用法】上药以水一斗，煮取二升半。去滓，服八合，一日三次。

【主治】胃反，吐而渴者。

【宜忌】忌海藻、菘菜、羊肉、饧、生葱、酢物。

58753 茯苓五味子汤

《三因》卷十三。为《金匮》卷中“桂苓五味甘草汤”之异名。见该条。

58754 茯苓车前子饮

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】茯苓 车前子各等分

【用法】煎汤，时时代饮。

【功用】利水导热。

【主治】小便甚少，下利不止。

58755 茯苓菊花浸酒

【方源】《圣惠》卷二十五。

【异名】茯苓浸酒（《圣济总录》卷九）。

【组成】白茯苓五两 甘菊花二两 山茱萸二两 菟丝子三两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮） 栝楼根二两 防风二两（去芦头） 熟干地黄二两 天雄二两（炮裂，去皮脐） 牡丹二两 人参一两（去芦头） 白术一两 牡蛎一两（为粉） 黄耆二两 紫菀一两（洗，去苗） 菖蒲二两 石斛一两（去根） 柏子仁一升 杜仲二两（去粗皮，炙微黄） 蛇床仁一两 远志二两（去心） 附子二两（炮裂，去皮脐） 干姜二两（炮裂） 赤芍药二两 牛膝二两（去苗） 萆薢二两 狗脊二两 苍耳子二两 虎胫骨一两（涂酥，炙微黄） 鼠粘子一两（微炒） 桔梗一两（去芦头） 羌活二两 牛蒡根二两 枸杞子半两 晚蚕沙三两（微炒） 续断二两

【用法】上锉细，和匀，每斤药以生绢袋盛，用酒二斗，于瓷瓮中浸，密封二七日，开封。每日平旦、午时、近晚，各温饮一盏，常令有酒容，不可过度。每取却一盏，即添一盏，如觉酒淡药力稍减，即取滓阴干，捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下。

【主治】骨节疼痛，行步艰难，肩背伛偻，言语謇涩，口㖞面斜，中风失音，半身不遂。

【宜忌】忌生冷、油腻、猪鸡肉、粘滑物。

【备考】《普济方》有当归、细辛。

58756 茯神酸枣仁汤

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】酸枣仁（炒） 茯神（去木） 人参（去芦） 白术（炒） 黄耆（蜜炙） 山药各一

两 朱砂(别研) 木香(不见火) 远志(去心)各半两

【用法】上为细末。每服二钱,白汤点下,不拘时候。

【功用】补心气不足。

【主治】小便涩浊。

58757 茯苓甘桂大枣汤

《医统》卷十四。为《伤寒论》“茯苓桂枝甘草大枣汤”之异名。见该条。

58758 茯苓苍术难名丹

《得效》卷七。为《直指》卷十“苍术难名丹”之异名。见该条。

58759 茯苓杏仁甘草汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】茯苓汤(《千金》卷十三)、茯苓杏仁汤(《杏苑》卷三)。

【组成】茯苓三两 杏仁五十个 甘草一两

【用法】以水一斗,煮取五升,温服一升,一日三次。不愈,更服。

【主治】①《金匮》:胸痹,胸中气塞,短气。②《杏苑》:湿温,两胫逆冷,胸满头眩重疼,妄言多汗,其脉阳濡而弱,阴小而急。

【方论选录】《沈注金匮要略》:此痹胸中之气也,邪气阻塞胸膈,肺气不得往来流利,则胸中气塞短气。方用杏仁通调肺气,以茯苓渗导饮湿下行,甘草和中,俾邪去则痹开而气不短矣。

58760 茯苓参甘厚朴汤

【方源】《四圣悬枢》卷三。

【异名】苓桂参甘厚朴汤(《医学摘粹》卷一)。

【组成】人参一钱 甘草一钱 干姜一钱 茯苓三钱 桂枝一钱 厚朴一钱

【用法】流水煎半杯,温服。

【主治】伤寒太阴腹满者。

58761 茯苓栀子茵陈汤

【方源】《卫生宝鉴》卷十四。

【异名】茯苓茵陈栀子汤(《准绳·类方》卷五)。

【组成】茵陈叶一钱 茯苓(去皮)五分 栀子仁 苍术(去皮,炒) 白术各三钱 黄芩(生)六分 黄连(去须) 枳实(麸炒) 猪苓(去皮) 泽泻 陈皮 汉防己各二分 青皮(去白)一分

【用法】上㕮咀,作一服。用长流水三盏,煎至一盏,去滓,食前温服。

【主治】谷疸。

【方论选录】《内经》云:热淫于内,治以咸寒,佐以苦甘。又:湿化于火,热反胜之,治以苦寒,以苦泄之,以淡渗之。以栀子、茵陈苦寒,能泻湿热而退其黄,故以为君;《难经》云:并主心下满。以黄连、枳实苦寒,泄心下痞满,肺主气,今热伤其气,故身体麻木,以黄芩苦寒,泻火补气,故以为臣;二术苦甘温,能除胃中湿热,泄其壅滞,养其正气,汉防己苦寒,能去十二经留湿,泽泻咸平,茯苓、猪苓甘平,导膀胱中湿热,利小便而去癃闭也。

【临证举例】谷疸 《卫生宝鉴》:元颜正卿丙寅二月间,因官事劳役,饮食不节,心火乘脾,脾气虚弱。又以恚怒,气逆伤肝,心下痞满,四肢困倦,身体麻木,次传身目俱黄,微见青色颜黑,心神烦乱,怔忡不安,兀兀欲吐,口生恶味,饮食迟化,时下完谷,小便癃闭而赤黑,辰巳间发热,日暮则止,至四月尤盛,脉浮而缓。治以本方,一服减半,二服良愈。

58762 茯苓茵陈栀子汤

《准绳·类方》卷五。为《卫生宝鉴》卷十四“茯苓栀子茵陈汤”之异名。见该条。

58763 茯苓桂术甘草汤

《医学入门》卷四。为《伤寒论》“茯苓桂枝白术甘草汤”之异名。见该条。

58764 茯苓桂甘大枣汤

《伤寒图歌活人指掌》卷四。为《伤寒论》“茯苓桂枝甘草大枣汤”之异名。见该条。

58765 茯苓桂甘白术汤

《医统》卷十四。为《伤寒论》"茯苓桂枝白术甘草汤"之异名。见该条。

58766 茯苓桂枝甘枣汤

《内台方议》卷六。为《伤寒论》"茯苓桂枝甘草大枣汤"之异名。见该条。

58767 茯苓橘皮杏仁汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】茯苓三钱 半夏三钱 杏仁三钱 百合三钱 橘皮三钱 生姜三钱

【用法】水煎半杯，热服。

【主治】湿旺气郁，声音不亮者。

58768 茯苓四逆加石脂汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】人参三钱 甘草二钱 干姜三钱 茯苓三钱 附子三钱 石脂三钱(生研)

【用法】流水煎大半杯，温服。

【主治】寒疫太阴泄利者。

58769 茯苓四逆加半夏汤

【方源】《医学摘粹》。

【组成】人参三钱 茯苓五钱 甘草二钱 干姜三钱 附子三钱 半夏三钱

【用法】流水煎大半杯，温服。

【主治】寒疫，少阴厥逆吐泄者。

58770 茯苓安肝定精神丸

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【异名】茯苓丸(《圣济总录》卷八十六)。

【组成】茯苓 远志(去心) 防风 人参 柏子仁(熬)各五分 龙骨七分 牡蛎(熬) 大枣肉各八分 甘草四分(炙)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。初服二十丸，加至三十丸为度，暖清白饮送下，一日两次。

【主治】肝劳热，恐畏不安，精神不守，闷怒不能独卧，感激惆怅，志气错越，不得安宁。

【宜忌】忌海藻、菘菜、大酢。

58771 茯甘姜味辛夏仁黄汤

《医门法律》卷五。为《金匮》卷中"苓甘五味加姜辛半杏大黄汤"之异名。见该条。

58772 茯苓干姜白术甘草汤

《奇正方》。为《金匮》卷中"甘草干姜茯苓白术汤"之异名。见该条。

58773 茯苓甘草五味姜辛汤

《医门法律》卷五。为《金匮》卷中"苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤"之异名。见该条。

58774 茯苓白术桂枝甘草汤

《伤寒全生集》卷四。为《伤寒论》"茯苓桂枝白术甘草汤"之异名。见该条。

58775 茯苓桂枝五味甘草汤

《金匮》卷中。为原书同卷"桂苓五味甘草汤"之异名。见该条。

58776 茯苓桂枝甘草大枣汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】甘草大枣汤(《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》)、茯苓桂枝汤(《伤寒总病论》卷三)、茯苓汤(《圣济总录》卷二十六)、茯苓桂甘汤(《直指》卷十八)、茯苓桂甘大枣汤(《伤寒图歌活人指掌》卷四)、茯苓桂枝甘枣汤(《内台方议》卷六)、茯苓甘桂大枣汤(《医统》卷十四)、苓桂甘枣汤(《类聚方》)、桂苓甘枣汤(《医级》卷七)。

【组成】茯苓半斤 桂枝四两(去皮) 甘草二两(炙) 大枣十五枚(擘)

【用法】以甘澜水一斗，先煮茯苓减二升，纳诸药，煮取三升，每服一升，去滓温服，一日三次。

【功用】《注解伤寒论》：降肾气。

【主治】①《伤寒论》：发汗后，其人脐下悸，欲作奔豚。②《圣济总录》：伤寒发汗后，腹下气满，小便不利。

【方论选录】①《注解伤寒论》：本方用茯苓以伐肾邪，桂枝能泄奔豚，甘草、大枣之甘滋助脾土以平肾水气。煎用甘澜水者，扬之无力，取不助肾气也。②《金鉴》：此方即苓桂术甘汤去白术加大枣倍茯苓也。彼治心下逆满，气上冲胸，此治脐下悸，欲作奔豚。盖以水停中焦，故用白术，水停下焦，故倍茯苓。脐下悸，是邪上干心也，其病由汗后而起，自不外乎桂枝之法。仍以桂枝、甘草补阳气，生心液；

倍加茯苓以君之，专伐肾邪；用大枣以佐之，益培中土；以甘澜水煎，取其不助水邪也。土强自可制水，阳建则能御阴，欲作奔豚之病，自潜消而默化矣。

【临证举例】胃神经官能症　(《辽宁中医杂志》1982；12：27)：顾某，男，63岁，1971年7月8日来诊。脐下动悸，其势下趋，时轻时剧，日夜不休，甚则影响入睡，如此已2月。精神疲惫，颇为叫苦。脉弦虚滑，舌苔淡黄边有齿印，此为气血流行失畅，郁而求伸，因而脐下悸动。加味苓桂甘草汤：茯苓15克，桂枝6克，炒白术10克，炙甘草5克，大枣15枚，夜交藤30克，紫丹参15克，合欢皮12克，龙牡各30克，服药3剂，病愈十分之二。改方：茯苓18克，桂枝9克，炒白术10克，炙甘草6克，大枣20枚，龙牡各30克，淮小麦30克，百合12克，生地12克，3剂脐下动悸完全消失，安然入睡已三夜矣。谁知停药后，又见小有发作，遂于7月18日再次就诊。自诉药后病情大有好转，但未见巩固。询之口不干，足见本方对证，效不变方，5剂而愈，一年后随访未复发。

58777　茯苓桂枝白术甘草汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】苓桂术甘汤(《金匮》卷中)、甘草汤(《千金》卷十八)、茯苓白术汤(《伤寒总病论》卷三)、茯苓汤(《圣济总录》卷五十四)、茯苓散(《普济方》卷四十三)、茯苓白术桂枝甘草汤(《伤寒全生集》卷四)、茯苓桂甘白术汤(《医统》卷十四)、茯苓桂术甘草汤(《医学入门》卷四)、苓桂汤(《杏苑》卷四)、苓桂术甘草汤(《景岳全书》卷五十四)、桂苓甘术汤(《医方集解》)。

【组成】茯苓四两　桂枝三两(去皮)　白术　甘草(炙)各二两

【用法】以水六升，煮取三升，去滓，分三次温服。

【功用】温阳健脾，利水降冲。

①《注解伤寒论》：和经益阳。②《医方集解》：升阳化气。③《中医方剂学》：健脾渗湿，温化痰饮。

【主治】①《伤寒论》：伤寒，若吐若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经，身为振振摇者。②《金匮》：心下有痰饮，胸胁支满，目眩；短气有微饮。

【方论选录】①《注解伤寒论》：阳气不足者，补之以甘，茯苓、白术生津液而益阳也；里气逆者，散之以辛，桂枝、甘草，行阳散气。②《内台方议》：此阳气外内皆虚也，故用茯苓为君，白术为臣，以益其不足之阳，经曰：阳不足者，补之以甘，是也；以桂枝为佐，以散里之逆气；以甘草为使，而行阳气，且缓中也。③《金鉴》：此汤救麻黄之误汗，其邪尚在太阳，故主以桂枝，佐以甘草、苓、术，是扶表阳以涤饮也。

【临证举例】①饮证　《伤寒论诠解》：陈某某，女，52岁。大便秘结，五、六日一行，坚如羊屎，伴有口渴，但又不能饮，自觉有气上冲，头晕，心悸，胸满。每到夜晚上冲之势加甚，而头目昏眩则更甚。周身轻度浮肿，小便短少不利，面部虚浮，目下色青，舌胖质淡，苔则水滑。处方：茯苓30克　桂枝10克　白术10克　炙甘草6克。服两剂，头晕、心悸与气冲等证均减。二诊仍于上方加肉桂3克　泽泻12克，服两剂，口干止，大便自下，精神转佳，冲气又有进一步的减轻。三诊用苓桂术甘与真武汤合方，服三剂，诸证皆除。②咳嗽　《湖北中医医案选集》：胡某某，男，34岁，少年体弱，常患咳嗽，吐痰沫，轻则用生姜擦背即愈，重则延医治疗，至成年后，每发则背心怕冷，需热手按摩觉舒，屡发屡治，难获远效。近因伤风，旧病又发，咳唾清痰，头晕目眩，胸胁胀满，口淡食少，心下如有物跳动，背部怕冷如掌大之处尤甚。脉沉细而弦，舌嫩，苔白滑，无发热身疼证，呼吸短浅难续，尿清量少，大便自调。宜用温阳化饮之苓桂术甘汤。茯苓四钱　桂枝二钱　焦术二钱　炙草二钱　外用药饼熨其背部冷处。五剂药尽，诸证悉平，现

已观察二年，竟未复发。③咳而遗尿 《伤寒论方医案选编》：姜某某，女，35岁，农民。患者于1962年6月生产一孩（第4胎），产后匝月，感受寒邪，引起咳嗽。咳嗽一月余即发现咳嗽时小便滴滴而出，夜间咳嗽尤甚，小便淋漓尤多，曾经中西医治疗，未见显效。胸部X线透视正常，听诊两肺底部有稀疏湿性罗音，未见其他异常病变。就诊时病已逾16个月，咯痰不多而色白，纳食正常，舌苔薄白，脉象弦细。处方：茯苓15克，桂枝6克，白术9克，甘草3克，服药3剂症大减，服6剂咳止，尿遗亦愈。

【备考】本方方名，《准绳·类方》引作"桂苓术甘汤"。

58778 茯苓甘草五味辛夏仁汤

《方剂辞典》。为《金匮》卷中"苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤"之异名。见该条。

58779 茯苓桂心甘草五味子汤

《千金》卷十八。为《金匮》卷中"桂苓五味甘草汤"之异名。见该条。

58780 茯苓桂枝五味子甘草汤

《医学纲目》卷二十七。为《金匮》卷中"桂苓五味甘草汤"之异名。见该条。

58781 茯苓桂枝甘草生姜浮萍汤

【方源】《医学摘粹》卷一。

【组成】茯苓三钱 桂枝三钱 甘草二钱 生姜三钱 浮萍三钱

【用法】上药煮取大半杯，温服。取微汗。

【主治】中风，只口眼㖞斜。

58782 茯苓桂枝参甘耆附麻黄汤

【方源】《医学金针》卷八。

【组成】人参 茯苓 黄耆 紫苏各三钱 桂枝 附子各二钱 甘草 升麻各一钱

【用法】流水煎，温服。

【主治】痘疹痒塌黑陷者。

58783 茯苓五味甘草去桂加姜辛夏汤

《医门法律》卷五。为《金匮》卷中"桂苓五味甘草去桂加干姜细辛半夏汤"之异名。见该条。

58784 茯桂五味去桂加干姜细辛半夏汤

《金匮》目录。为原书卷中"桂苓五味甘草去桂加干姜细辛半夏汤"之异名。见该条。

荏

58785 荏子桔梗丸

【方源】《千金》卷二十三。

【组成】荏子 龙骨各半两 附子一两 蜀椒一百粒 桂心 干姜 桔梗 矾石 独活 芎䓖各一分

【用法】上为末，以大枣二十个合捣，醋浆为丸，如大豆大。每服五丸至十丸，温浆送下。

【主治】蝼蛄漏，始发于颈项，状如肿。

【方论选录】《千金方衍义》：荏子芳香遍达肺气，佐以桔梗升提胸膈，更兼椒、姜、桂、附辛温破结；独活、芎䓖祛风活血；矾石涤垢，龙骨收津，使不随辛温耗散，深得散中寓敛之义。

荟

58786 荟黄二仁丸

【方源】《药奁启秘》。

【组成】老色芦荟三十粒 真净轻粉三钱 关西牛黄二钱 桃仁（去皮）三十粒 杏仁（去皮）三十粒 明净腰雄黄四钱

【用法】上为末，为丸如绿豆大。壮者每服一钱至二钱，弱者减之，以鲜生地、仙遗粮、银花三味煎汤送下。即以此三味常服代茶。

【主治】梅毒下疳，淋浊阴𧏾诸证，真阴已虚，不任攻伐者。

茶

58787 茶糕

《青囊秘传》。为原书"肥儿糕"之异名。见该条。

58788 茶牙汤

【方源】《洪氏集验方》卷四。

【组成】细茶牙一两 生草乌半两（去皮尖） 细辛半两

【用法】上为粗末。每服五钱,水二盏,慢火煎至六分,去滓温服。

【主治】偏正头疼,恶心呕吐不止者。

58789　**茶叶方**

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】茶叶(多,拣去粗梗)

【用法】上药入滚水一渫,即捞起,再拣去梗,湿铺床上,用草纸隔一层,令儿睡上一夜,则脓皆干。

【主治】痘烂,遍身无皮,脓水流出,粘拈衣被。

58790　**茶叶顶**

【方源】《串雅补》卷一。

【组成】茶叶五钱　青盐一钱　洋糖三钱　三棱三钱　雷丸三钱

【用法】上为末,将盐、糖煎好后,入三味调匀。每服三钱,白汤送下。

【主治】虫积,哮喘,虫胀。

58791　**茶实丸**

【方源】《续名家方选》。

【组成】茶实(生熟者佳)　百合根　矾石各等分

【用法】上为丸,如梧桐子大。每服一钱,空心白汤送下。

【主治】喘急塞迫欲死者。

58792　**茶柏散**

【方源】《万氏家抄方》卷三。

【组成】细茶(清明前者佳)　黄柏　薄荷叶各三钱(苏州者)　硼砂(煅)二钱

【用法】上为极细末,取净末和匀,加冰片三分。吹入。

【主治】诸般喉症。

58793　**茶积丸**

【方源】《赤水玄珠》卷十三。

【组成】陈仓米半升(巴豆七粒,去壳,同炒赤色,去巴豆)　青皮　陈皮各二两

【用法】上为末,醋为丸,如绿豆大。每服二十丸,食后淡姜汤送下。

【主治】茶积,饮食减少,面黄腹痛。

58794　**茶调汤**

《医方类聚》卷八十二引《经验良方》。为《局方》卷二(吴直阁增诸家名方)"川芎茶调散"之异名。见该条。

58795　**茶调散**

【方源】《圣济总录》卷十五。

【异名】茶酒调散(《医统》卷五十三引《医林》)。

【组成】菊花　细辛(去苗叶)　石膏(研)　莎草根(炒去毛)各等分

【用法】上为细散。每服一钱匕,食后茶清调下。

【功用】①《圣济总录》:定偏正头痛。②《普济方》:清爽神志,通和关窍,消恶汗。

【主治】①《圣济总录》:首风。②《普济方》:诸风,痰壅目涩,昏眩头疼,心愦烦热,皮肤痛痒,风毒壅滞。

【备考】《医统》本方用法:为细末,茶、酒任调服。

58796　**茶调散**

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】石膏(碎,研)二两　羌活(去芦头,生用)　苍术(去皮)　甘草(半生半炙)　芎䓖　茵陈蒿　荆芥穗各一两　桂(去粗皮)半两

【用法】上为散。每服一钱匕,用腊茶末一钱匕,同葱白煎汤,点热服。

【主治】伤寒头痛不止。

58797　**茶调散**

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【异名】二仙散。

【组成】瓜蒂不拘多少　好茶中停

【用法】上为细末。每服二钱,齑汁调下,空腹用之。

【功用】催吐,发汗。

【主治】伏梁起于脐,大如臂,上至心下,久不已,令人病烦心,先以本方吐之兼汗,以禹功导水等夺之;一切沉积水气,两胁刺痛,中满不能食,头目眩者。

58798 **茶调散**

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】川芎一两二钱 甘草（炙） 香白芷 香附子 防风（去芦） 细辛 砂仁各一两 薄荷叶二两

【用法】上为细末。每服一二钱，食后茶调下。

【功用】清神。

【主治】头风头痛。

58799 **茶调散**

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】藿香 香附子各半两 甘草二钱半

【用法】上为细末。食后葱茶调下。

【主治】男女头风攻注，头目昏暗，睛疼。

58800 **茶调散**

【方源】《普济方》卷四十五引《余居士选奇方》。

【组成】香白芷二两半（炒） 川芎一两（锉，炒） 甘草一两（锉，炒） 川乌头半两（炮，锉）

【用法】上为末。每服二钱，好茶少许，薄荷三叶，沸汤调下。

【主治】偏正头风，诸药不愈者。

【加减】暴伤风头疼，加葱白二寸（细切），和茶调下。

58801 **茶调散**

《得效》卷十。为《局方》卷二（吴直阁增诸家名方）“川芎茶调散”之异名。见该条。

58802 **茶调散**

【方源】《急救仙方》卷三。

【组成】川芎 防风 羌活各一两 甘草半两 木贼 石膏（炒） 石决明（煅） 荆芥 薄荷叶 甘菊花各一两

【用法】上为细末。每服二钱，清茶调下。

【主治】男子、妇人一切风肿痒痛，翳，烂弦，风气眼泪。

58803 **茶调散** 《仙拈集》卷二。

为《冯氏锦囊·秘录》卷六引《简要济众》“夏枯草散”之异名。见该条。

58804 **茶调散**

【方源】《活人方》卷三。

【组成】滑石二两 石膏二两 黄芩二两 桔梗二两 甘草二两 薄荷一两 荆芥一两 防风一两 川芎一两 当归一两 麻黄一两 连翘一两 白芍一两 大黄一两 朴消一两 白术五钱 黑山栀五钱

【用法】上为细末。每服三钱，午后、临睡用浓茶或白汤调下。

【功用】疏风解表，清热消痰。

【主治】冒风初起，鼻塞喷嚏，头痛声重，外寒内热，痰嗽咽干，二便结涩，内火有余。

58805 **茶调散**

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】川芎 白芷 荆芥 黄芩 石膏 薄荷 茶叶 生姜

【主治】内热头痛。

【加减】便闭，加大黄。

58806 **茶调散**

【方源】《异授眼科》。

【组成】防风 羌活 柴胡 甘草 当归 黄芩 生地 川芎 天花粉各等分

【用法】上为末。砂糖水、茶调下。

【主治】胬肉攀睛，红障壅上者。

58807 **茶梅丸**

【方源】《准绳·类方》卷六。

【组成】蜡茶不以多少

【用法】上为细末，用白梅肉为丸。每服二十丸，赤痢，甘草汤下；白痢，乌梅汤下；泄泻不止，陈米饮下。

【主治】赤痢，白痢，泄泻。

58808 **茶黄丸**

【方源】《济阳纲目》卷三十四。

【组成】白术 苍术各三两 石膏 白芍药 黄芩 南星 陈皮各一两 薄荷七分

【用法】上为末，砂糖水煮神曲为丸，砂糖水送下。

【主治】黄病爱吃茶。

58809 **茶清散**

【方源】《卫生总微》卷十六。

【组成】人言一两　黑豆一升　河水四升

【用法】上药同煮至水尽,炒干为末。每服一字或半字,热多者,腊茶清调下;寒多者,草茶清调下;间日者,于发夜临卧服;频日者,但临卧服。

【主治】疟疾。

【宜忌】忌热物一时辰。

58810 **茶蘼散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】黄牛角腮二两(捶碎)　蛇蜕　猪牙皂角(锉)　刺猬皮(锉)　棕榈皮(锉)　黄鼠狼皮　茶蘼叶(剪碎)各半两　穿山甲七十片　贯众一两(锉)　乱发一分

【用法】上拌匀,入瓷瓶内,以盐泥固济,晒干,同炭火煅,通红为度,候冷取出,研为细末。每服二钱,先嚼胡桃肉半枚,次以温酒调药同下,临卧至五更初又服一服,至辰时更服一服。如此服三日。

【主治】诸般痔漏下血,疼痛。

58811 **茶煎汤**

【方源】《方症会要》卷二。

【组成】细茶　生姜

【用法】治赤痢,细茶四钱,生姜二钱;治白痢,细茶二钱,生姜四钱。

【主治】赤痢,白痢。

58812 **茶煎散**

【方源】《方症会要》卷三。

【组成】川芎一钱　甘草三分　薄荷　白芷　防风　细辛　羌活　荆芥　藁本　辛夷各五分

【用法】加茶叶一撮,水煎服。

【主治】头痛。

58813 **茶蜡丸**

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】蜡　好茶

【用法】以熔蜡和好茶捏尖丸,塞孔中。又以牛角内粉屑,夹天花粉、真蚌粉干掺。

【功用】消毒生肌。

【主治】诸疮溃后。

58814 **茶蘼散**

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】石膏　黄芩　升麻

【用法】上为末。砂糖水调服。

【主治】积聚。

58815 **茶末敷方**

【方源】方出《证类本草》卷十三引《胜金方》,名见《圣济总录》卷一四九。

【组成】草茶或蜡茶

【用法】以生油调敷。

【主治】蠼螋尿人成疮,初如糁粟,渐大如豆,更大如火烙浆疱,疼痛至甚。

58816 **茶酒调散**

《医统》卷五十三引《医林》。为《圣济总录》卷十五"茶调散"之异名。见该条。

58817 **茶调香附散**

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】香附子不拘多少

【用法】上药于木石臼内捣去皮毛,用清水或米泔浸一宿,取出控干,人无油锅内炒香熟,紫黑色为度,取出去火毒,碾为细末。每服三钱,空心浓腊茶调下。

【主治】肠风脏毒。

58818 **茶箬胭脂散**

【方源】《普济方》卷三十八。

【组成】茶箬一握　绵胭脂十个　白梅四十九个

【用法】上药并烧灰和匀。每服二钱,空心米饮调下。

【主治】肠风下血。

荅

58819 **荅葱丸**

【方源】《普济方》卷一一八引《卫生家宝》。

【组成】川乌头(去皮尖,生用)三钱　盐豉三钱　黑牵牛(头末)三钱　乳香一钱　没药一钱(别研)

【用法】上为细末，用肥葱一握洗去土，用淡醋一升，不犯铜铁，文武火煮葱醋一半，漉去滓，慢火再熬成膏，滴水中不散为度，将前次末和成剂，如梧桐子大。每服十丸，或加至二十丸，温酒送下。大便微利则愈。

【主治】寒湿筋骨冷痛，不能举动。

荠

58820 荠龙汤

《证治要诀类方》卷一。即《千金》卷二十一“猪肾荠苨汤”。见该条。

58821 荠苨丸

【方源】《济生》卷四。

【组成】荠苨 大豆（去皮） 茯神（去木） 磁石（煅，研极细） 玄参 栝楼根 石斛（去根） 地骨皮（去木） 熟地黄（酒蒸） 鹿角各一两 沉香（不见火） 人参各半两

【用法】上为细末，用猪肾一具，煮如食法，令烂，杵和为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。如不可丸，人少酒糊亦可。

【主治】强中为病，茎长兴盛，不交精液自出，消渴之后，多作痈疽，多由过服丹石所致。

58822 荠苨丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】荠苨 大豆（去皮） 茯神 磁石（煅，研细） 玄参 钗斛 沉香（磨） 人参各五钱

【用法】上为末，用猪肾一具，如食法煮，杵烂，和蜜为丸。每服六七十丸，空心淡盐汤送下。

【主治】强中为病，茎长兴盛，不交精溢，此由劳欲过甚，多为消渴、痈疽，或由服食丹砂之故。

58823 荠苨汁

《圣济总录》卷一八四。为原书卷一四六“荠苨饮”之异名。见该条。

58824 荠苨汤

【方源】《千金翼》卷二十二引华佗方。

【组成】荠苨四两 茯苓一两 蔓菁子一升 芍药 人参 蓝子 黄芩 甘草（炙）各一两

【用法】上㕮咀，以水一升，煮蔓菁子，取八升，去滓，纳诸药，煮取二升五合，分三服。

【主治】石毒或年二十年三十年而发者，或慄慄如寒，或饮食，或不饮食。若服紫石英发毒者，热闷惛惛喜卧，起止无气力，或寒，皆腑气所主，藏气不和；矾石发热者，燥而战；石硫黄发热者，郁郁；如热极者，身并破裂。

【加减】虚弱者，倍人参，减黄芩；若气上，倍茯苓，加荠苨一两。

【备考】本方方名，《圣济总录》引作“芍药汤”。

58825 荠苨汤

【方源】《医心方》卷十一引《小品方》。

【组成】荠苨二两 人参二两 厚朴二两 知母二两 栝楼二两 葛根二两 枳实二两 犀屑二两 蓝子二合 桔梗二两 橘皮二两 茯苓二两 黄芩二两 甘草二两

【用法】以水八升，煮取三升，分五服。

【主治】先有石热，因霍乱吐下，服诸热药，吐下得止，因空虚仍变烦，手足热，口燥，欲得水，呕逆迷闷，脉急数者；及时行病后，毒未尽，因霍乱吐下，仍发热烦闷，胸心欲破裂者。

58826 荠苨汤

【方源】《千金翼》卷十五。

【组成】荠苨 麦门冬各三两（去心） 干姜三两半 麻黄（去节） 人参 黄芩 桔梗 甘草（炙）各二两

【用法】上㕮咀。以水九升，煮取三升，分三服，从旦至晡乃尽。日日合服，以愈为度。

【主治】矾石发，亦作疮状如疖子；紫石多发于腹背，或着四肢；诸乳石发。

58827 荠苨汤

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】荠苨二两 防风（去叉） 人参各一两半 独活（去芦头） 细辛（去苗叶） 赤箭 芎䓖 羚羊角（镑）各半两 麻黄（去根节）二两 桔梗（锉，炒）三分 前胡（去芦头） 甘草（炙，锉） 石膏（碎）各一两 蔓荆子

白鲜皮各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，食后、临卧温服。

【主治】肺中风。项强鼻塞，语声不出，喘鸣肩息，胸满短气。

58828　**荠苨汤**

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】荠苨　大豆　人参　白茯苓(去黑皮)　磁石(捣如米粒)　葛根(锉)　石膏(碎)　黄芩(去黑心)　栝楼根　甘草(炙，锉)　知母(焙)各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水二盏，煎至一盏，去滓温服，日三次，夜一次。

【主治】内消。所食物皆作小便，强中。

58829　**荠苨汤**

【方源】《得效》卷十。

【组成】大豆　甘草

【用法】水煎，加荠苨汁服。

【主治】诸药毒，蛊毒。

58830　**荠苨饮**

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】荠苨　厚朴(去粗皮，涂生姜汁炙，锉)　知母(焙)　栝楼实　枳壳(去瓤，麸炒)　葛根(锉)　犀角(镑)　桔梗(炒)　陈橘皮(去白，切，焙)　白茯苓(去黑皮)　甘草(炙)　人参　蓝实(炒)　黄芩(去黑心)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】霍乱，心腹痛。

58831　**荠苨饮**

【方源】《圣济总录》卷一四六。

【异名】荠苨汁(原书卷一八四)。

【组成】荠苨二两(锉碎)

【用法】以水三盏，煎至一盏半，停冷，细细饮之。

【主治】一切药毒，乳石发。

58832　**荠苨散**

【方源】方出《千金》卷二十四，名见《普济方》卷二五一。

【组成】荠苨一分　蓝(并花)三分

【用法】上药，七月七日取蓝。阴干捣筛，每服方寸匕，水调下，一日三次。

【功用】解毒药。

58833　**荠苨散**

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】荠苨二两　甘草三分(生，锉)　蓝子半两　赤茯苓一两　赤芍药一两　黄芩一两　蔓菁子二合(微炒)　石膏二两　玄参一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏半，加黑豆半合，生姜半分，青竹叶三七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】乳石发动，热气上攻头面，眼昏，心神躁热，四肢烦疼，口干不食。

58834　**荠苨散**

【方源】方出《圣惠》卷三十八，名见《普济方》卷二六一。

【组成】荠苨一两　犀角屑三分　茯神一两　地骨皮三两　子芩三分　木通三分(锉)　玄参三分　石膏一两半　麦门冬一两半(去心，焙)　川芒消三两　枳壳一两(麸炒，微黄，去瓤)　甘草半两(生用)

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，入蜜半合，更煎一二沸，温服，不拘时候。

【主治】乳石发动，上冲头目，烦热昏闷，口干心躁，大小便不利，心神恍惚。

58835　**荠苨散**

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】荠苨一两　人参一两(去芦头)　茯神一两　葛根一两(锉)　石膏二两　黄芩一两　栝楼根一两　知母一两　甘草一两(炙微赤，锉)

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加大豆一百粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】消中烦热，吃食旋消，四肢羸弱。

58836　**荠苨散**

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】荠苨一两半 白花蛇（酒浸，去骨皮，炙）二两 天麻 槐子（炒） 独活（去苗） 防风（去叉） 晚蚕沙（炒） 蔓荆子（去萼） 人参 威灵仙 枳壳（去瓤，麸炒） 甘草（炙） 赤箭各一两 牡荆子半两 白鲜皮二两沙参三分

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒或浆水调下，不拘时候。

【主治】肺脏风毒，遍身生疮，皮肤瘙痒。

58837 荠苨散

【方源】《圣济总录》卷一四七。

【组成】荠苨二两

【用法】上为散。每服三钱匕，粥饮调下。

【主治】蛊毒。

58838 荠苨煎

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】荠苨三十枚

【用法】上药以薄绵裹，酒煮二十沸许，取出。每含一枚，良久嚼咽之，一日三五次。

【主治】口疮。

58839 荠菜粥

【方源】《本草纲目》卷二十五。

【组成】鲜荠菜 粳米

【用法】煮粥服。

【功用】①《本草纲目》：明目利肝。②《长寿药粥谱》：补虚健脾，明目止血。

【主治】《长寿药粥谱》：水肿，吐血，便血，尿血，目赤目暗。现用于乳糜尿，视网膜出血，老年性浮肿，慢性肾炎。

58840 荠叶涂方

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】干荠叶（末） 香薷（末） 赤小豆（末）各半两 生蘩蓄叶茎一握（细锉）

【用法】上药细研蘩蓄，入诸药末，和调如糊，涂丹，干即易之。以愈为度。

【主治】小儿野灶丹，从膝起。

茺

58841 茺蔚丸

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【异名】茺蔚子丸（《普济方》卷七十九）。

【组成】茺蔚子 人参 干山药各二两 茯苓 石决明 大黄 黑参 黄芩各一两 干地黄一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心茶送下。

【主治】鸡冠蚬内外障。

58842 茺蔚汤

【方源】《卫生鸿宝》卷一。

【组成】益母草

【用法】水浓煎，少投生蜜，放温，恣服取效。

【主治】番沙，干霍乱，腹痛骤发，深赤斑毒。

58843 茺蔚散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】茺蔚子 防风 羌活 蔓荆子 甘菊花 玄参 细辛 车前子 黄芩 川大黄（锉碎，微炒）各一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】眼睑风毒所攻，下垂覆盖瞳仁。

58844 茺蔚散

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】茺蔚子 防风（去芦头） 羚羊角屑 川大黄（锉碎，微炒） 黄芩 杏仁（去皮尖双仁，麸炒微黄） 车前子 赤茯苓各一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，入川芒消半分，搅匀，食后温服。

【主治】眼生风粟疼痛，时有泪出。

58845 茺蔚散

【方源】《秘传眼科龙木论》卷三。

【组成】茺蔚子 防风各二两 黑参 细辛 大黄 枳壳 知母 芒消各一两 芍药一两半

【用法】上为末。每服一钱，以水一盏，煎至

五分，去滓，食后温服。

【主治】冰瑕翳深外障。

58846 **茺蔚散**

【方源】《医方类聚》卷一七九引《新效方》。

【组成】益母草(烧存性，为末)

【用法】先以小刀十字划破疔根至痛处，令血出，次绕疔根开破，令血出，用刀尽捻去血，拭干，以稻草心蘸药，捻入疮孔中，遍敷到底，良久，当有紫血出，捻令血尽，拭干，再捻入药，见红血则止，一日夜捻药二五度，重者二日根烂出，轻者一日半日出，看疮根盘胀起，即是根将出，以针挑之即出。虽根已出，仍敷药生肌，易愈，或根消烂挑不出，亦自愈，勿忧之。内服救生夺命丹，如无丹，则服《精要》忍冬酒，昼夜连并服三二剂，急治之，不可缓也。若得证，便发寒热，半身麻木，呕吐不食，痛应心者，最急，三五日便死，须急用小刀尽去疔根，见血是根尽，未见血，再去令尽。若已有疔三四处，只去首先生者根，其余根不须去，但如前治之。若是阳证，形气壮实者，以锋针刺疮四畔，多出血以泄毒气，以针刺所属经络而泻之。

【主治】急慢疔疮。

【宜忌】忌风寒、房室、酒肉、鱼腥、五辛、油腻、粘滑、生冷、狐臭、麝香。

58847 **茺蔚散**

【方源】《普济方》卷三〇六。

【组成】益母草

【用法】上药细切，和醋炒，封之。效。

【主治】马咬。

58848 **茺蔚粥**

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】茺蔚叶

【用法】煮粥食之；或取汁饮亦妙。

【主治】疳气瘦弱，下利白脓，久而不愈。

58849 **茺蔚子丸**

【方源】《医方类聚》卷六十五引《龙树菩萨眼论》。

【组成】茺蔚子 泽泻各六分 枸杞子 石决明 青葙子 枳壳 地黄各四分 细辛三分 宣莲十二分 吴麦门冬十分

【用法】上为散，炼蜜为丸。每服四十丸，食上浆水送下。

【主治】热疾后，眼翳及疼痛。

58850 **茺蔚子丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】茺蔚子 泽泻各一两半 枸杞 青葙子 生干地黄(焙) 枳壳(去瓤，麸炒)各一两 石决明 细辛 麦门冬(去心，焙) 车前子各二两 黄连(去须)三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后浆水送下。

【主治】时气后，眼暗及有翳膜。

58851 **茺蔚子丸**

【方源】《永乐大典》卷一一四一二引《卫生家宝》。

【组成】茺蔚子一两 荜澄茄一两 石决明一两(煅) 青葙子一两 人参半两 白术半两 茯苓一两 甘草半两(炙) 枸杞子一两 羌活一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，用茶清送下。

【功用】退翳。

【主治】气眼。

58852 **茺蔚子丸**

《普济方》卷七十九。为《秘传眼科龙木论》卷四“茺蔚丸”之异名。见该条。

58853 **茺蔚子散**

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【异名】退热茺蔚子散(《秘传眼科龙木论》卷五)。

【组成】茺蔚子二两 防风(去叉) 芎藭 桔梗(锉，炒) 知母(焙)各一两 藁本(去苗土)一两一分 白芷三分 人参一两

【用法】上为散。每服一钱匕，空心、食前米饮调下。

【主治】目撞刺生翳。

58854 **茺蔚浴汤**

【方源】《外台》卷十五引《延年秘录》。

【组成】茺蔚 蒺藜 羊桃 蒴藋根(苗亦得) 漏芦蒿各一斤 盐三斤

【用法】上切。以水三石,煮取二石五斗,去滓,纳盐令消,适寒温,先饱食,即入浴,能良久浸最好。每至夜即浴,浴讫即卧。

【主治】身痒风瘙,或生瘾疹。

【宜忌】慎风。

58855 茺蔚老姜汤

【方源】《蒲辅周医疗经验》。

【组成】茺蔚子(益母草代亦可)一两 煨老生姜一两 红糖二两

【用法】煎取三碗,分三次热服。每月行经时服之。

【功用】《古今名方》:活血调经,温经止痛。

【主治】经行腹痛。

荡

58856 荡风散

《千金》卷六。为原书同卷引《删繁方》"真珠散"之异名。见该条。

58857 荡皮丸

【方源】《普济方》卷三八七。

【组成】参苏饮合秘传降气汤加五味子 乌梅 桑白皮 红枣

【用法】水煎服。

【主治】肺壅咳嗽,痰实久嗽。

【宜忌】不宜卒止。

58858 荡邪丹

《辨证录》卷十一。为《傅青主女科》卷上"荡邪散"之异名。见该条。

58859 荡邪散

【方源】《傅青主女科》卷上。

【异名】荡邪丹(《辨证录》卷十一)。

【组成】雷丸六钱 桃仁六十粒 当归一两 丹皮一两 甘草四钱

【用法】水煎服。一剂必下恶物半桶,再服调正汤治之。

【主治】女子有在家未嫁,月经忽断,腹大如妊,面色乍赤乍白,六脉乍大乍小。人以为血结经闭,或精神恍惚而梦里求亲,或眼目昏花而对面相狎,或假托亲属而暗处食欢。

【备考】《辨证录》有大黄。

58860 荡疝丸

《普济方》卷二四九。为《儒门事亲》卷十五"荡疝丹"之异名。见该条。

58861 荡疝丹

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【异名】荡疝丸(《普济方》卷二四九)。

【组成】黑牵牛(取头末) 破故纸(炒) 小茴香(炒) 川楝子(去核,炒)各一两 青皮三钱 陈皮三钱 莪术四钱 木香四钱

【用法】上为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心温酒送下。

【主治】小肠疝气。

58862 荡疝汤

【方源】《家庭治病新书》引《神效名方》。

【组成】川楝子三钱 小茴香 木香各一钱 破故纸一钱五分 莪术一钱 黑丑 青皮各八分

【用法】水煎服。

【主治】寒疝腰痛,牵引睾丸,屈而不伸,脉沉滞者。

58863 荡鬼汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】人参一两 当归一两 大黄一两 雷丸三钱 川牛膝三钱 红花三钱 丹皮三钱 枳壳一钱 厚朴一钱 小桃仁三十粒

【用法】水煎服。

【主治】妇人有腹似怀妊,终年不产,甚至二三年不生者。其人面色黄瘦,肌肤消削,腹大如斗。

【方论选录】此方用雷丸以祛秽,又得大黄之扫除,且佐以厚朴、红花、桃仁等味,皆善行善攻之品,何邪之尚能留腹中而不尽逐下也哉。尤妙在用参归以补气血,则邪去而正不伤。若单用雷丸、大黄以迅下之,必有气脱血崩之患矣。

58864　荡胞丸

【方源】《重庆堂随笔》卷上。

【异名】荡瘀丸(《中国医学大辞典》)。

【组成】丹皮　桂枝　赤芍　茯苓　桃仁(去皮尖)各等分

【用法】上为末,醋曲糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,晨用紫花益母草三钱煎汤送下。堕胎后即以此丸服七日。

【功用】堕胎。

58865　荡胞汤

【方源】《千金翼》卷五。

【组成】朴消　桃仁(去皮尖双仁,熬)　茯苓　牡丹皮　大黄各三两　人参　桂心　芍药　厚朴(炙)　细辛　牛膝　当归　橘皮各二两　附子一两半(炮,去皮)　虻虫(去翅足,熬)　水蛭各六十枚(熬)

【用法】上㕮咀。以酒五升,水六合,渍一宿,煮取三升,分四服,日三次,夜一次。每服相去三时辰。少时更服如常,覆被少取汗,汗不出,冬月着火笼,必下积血及冷赤脓如赤小豆汁。本为妇人子宫内有此恶物令然,或天阴脐下痛,或月水不调,为有冷血不受胎,若斟酌下尽,气力弱,大困不堪更服,亦一日二三服即止。如大闷不堪,可食酢饭冷浆一口即止。然恐恶物不尽,不大得药力,若然,忍服尽大好,一日后仍着导药。

【主治】妇人断续二三十年及生来无子并数数失子。

58866　荡胞散

《圣惠》卷七十。为《千金》卷二"朴消荡胞汤"之异名。见该条。

58867　荡胞煎

【方源】《医略六书》卷二十七。

【组成】大黄一两　附子一两(炮)　厚朴一两(制)　桂心一两　朴消一两　当归二两　赤芍一两　人参一两　桃仁二个

【用法】上为末。每服六钱,水、酒各半煎,去滓温服。

【主治】久年断产,脉实者。

【方论选录】瘀热内结,天癸不通,故年久断产,不能孕子焉。消、黄荡涤热结;桃、赤破瘀通经;附子、厚朴补火散结,力能暖子宫以调气化;当归、肉桂鼓运营血,兼能养经脉以开血闭;复用人参扶助元气,且以防诸药之悍也。水、酒合煎,务使瘀化结开,则天癸自通而血室清和,即年久断产当可冀其怀孕耳。

58868　荡涎散

【方源】《伤寒总病论》卷五。

【组成】粉霜一钱　腻粉二匣　芫花一分

【用法】上为细末。一岁服半钱,暖浆水调下。病热大者,再服。白色着底者,粉霜也,宜尽灌之。良久得睡,取下黑黄涎,裹包丹砂之类,皆成颗块,啼声便出,立安。

【主治】小儿伤寒,始因壮热不除,被汤丸下后,其项强眼翻,弄舌搐弱,如发痫状,久则哽气,啼声不出,医以为惊风,屡服朱砂、水银、牛黄、汞粉、巴豆、竹沥之类,药皆无验,此由误下后,毒气结在心胸,内热生涎,涎裹诸药,不能宣行所致。

58869　荡胸汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】蒌仁二两(新炒者,捣)　生赭石二两(研细)　苏子六钱(炒,捣)　芒消四钱(冲服)

【用法】上药,以水四钟,煎取清汁二钟,先温服一钟,结开,大便通行,停后服。若其胸中结犹未开,过二点钟,再温服一钟。若胸中之结已开,而大便犹未通下,且不觉转矢气者,仍可温服半钟。

【主治】寒温结胸,其证胸膈痰饮与外感之邪互相凝结,上塞咽喉,下滞胃口,呼吸不利,满闷短气,饮水不能下行,或转吐出。

58870　荡涤水

【方源】《喉科家训》卷一。

【组成】香白芷二钱三分　三奈片二钱　广藿香三钱　地骨皮三钱　二宝花四钱　北细辛三钱　荆芥穗二钱　川柏片三钱　青防风三钱　生甘草二钱　苦参片三钱

【用法】上药放吊锅内蒸水用之。

【功用】辟秽解毒。

【主治】一切咽喉腐烂，臭秽不堪。

58871 **荡涤饮**

【方源】《喉科种福》卷三。

【组成】生地五钱 麦冬三钱 知母一钱 僵蚕一钱（酒炒） 黄芩一钱 浙贝二钱 花粉二钱 天冬二钱 黄柏一钱 甘草一钱 玉竹六钱 云苓三钱

【主治】瘟疫白喉初起。

58872 **荡秽散**

【方源】《串雅内编》卷四。

【组成】没药（末）一两

【用法】先将绵塞阴户，即顿没药末，白滚汤调下。

【主治】妇人月事退出，作禽兽之形，欲来伤人。

58873 **荡脾汤**

【方源】《得效》卷十一。

【组成】杏仁一两（去皮尖，用蚌粉炒令黄色） 半夏一两（生姜自然汁浸一宿，次日焙） 巴豆五粒（去壳并心膜，以皮纸出油）

【用法】上为末，用大好北枣七个，入灯心水蒸，去皮核，取肉为丸。每服五丸，常服灯心、枣子煎汤送下；注颜，槟榔煎汤送下；消宿食，陈米汤送下，空心、临睡服；化痰，乌梅汤送下；治疟，蒜汤或蘸水送下。

【功用】注颜，消宿食，化痰，消痞癖。

【主治】气喘，痞积，疟疾。

58874 **荡滞散**

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】斑蝥（炒，去翅足）半两 大黄（锉，炒）三分 水蛭（糯米内炒熟，去米） 虻虫（炒）各一分

【用法】上为细散。每服半钱匕，狗胆酒调下。

【主治】妇人经脉不通。

58875 **荡寒汤**

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】白术三两 肉桂三钱 丁香一钱 吴茱萸一钱

【用法】水煎服。一剂而阴消阳回。

【主治】伤寒直中少阴肾经，畏寒，腹痛作呕，手足厥逆，有手足俱青，甚则筋青囊缩。

【方论选录】此方妙在独用白术三两，则腰脐之气大利；又得肉桂，以温热其命门之火；丁香、吴茱萸止呕逆而反厥逆，则阴寒之邪，何处潜藏，故一剂而回春也。

58876 **荡寒汤**

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】焦术二两 人参五钱 附子四钱 良姜三钱

【主治】寒中少阴，手足青黑。

58877 **荡瘀丸**

《中国医学大辞典》。为《重庆堂随笔》卷上"荡胞丸"之异名。见该条。

58878 **荡痰汤**

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生赭石二两（轧细） 大黄一两 朴消六钱 清半夏三钱 郁金三钱

【主治】癫狂失心，脉滑实者。

58879 **荡阴救命汤**

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】人参一两 白术三两 熟地三两 肉桂一钱 附子三钱 山茱萸三钱 茯神三钱

【用法】水煎服。

【主治】阴寒中脏。严寒之时，忽感阴寒，唇青身冷，手足筋脉挛急，上吐下泻，心痛腹疼，囊缩甲青，腰不能俯仰。

【方论选录】方中以参、术为君，似乎止救心、脾二经；虽附子、肉桂与熟地、山茱同用，肾也在所救之中，而肝、肺竟置之度外。何以能斩关直入，回阳于顷刻耶？不知五脏为寒邪所犯，大约犯肾之后，即便犯脾，而后犯心也，犯肝、肺者无多也。故专顾心肾与脾经，而肝肺之药，无非收敛之剂，欲祛邪而使之出，不可留邪而使之入，倘用收敛之味以补肝肺，反

掣人参、附子之手，不能迅于于荡阴矣。此用药之不杂，实有秘义也。且肾中水火原不相离，用桂、附火热之药以回阳，未免肾中干燥，与其回阳之后，又补肾水以济阳，何如于用补火之时，而先为防微之为得哉。吾所以少用熟地、山茱于桂、附之中，以制火之横，且火得水而归源，水招火而入宅，故能奏既济之勋，而无亢炎之失也。

58880　荡寇解痰汤

【方源】《点点经》卷二。

【组成】羊藿　当归　胆星　熟地各一钱半　志肉　柏仁　白术　陈皮　茯神各一钱　干葛二钱　姜炭　甘草各八分

【用法】以生姜、大枣为引。

【主治】酒伤发痫后，人事恍惚，饮食如痴，肢体厥冷。

58881　荡痰加甘遂汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生赭石二两　大黄一两　朴消六钱　清半夏三钱　郁金三钱　甘遂末二钱

【用法】甘遂末，调药汤中服。

【主治】癫狂失心，脉滑实，顽痰凝结之甚者。

荨

58882　荨麻疹汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】生地15克　丹皮9克　白茅根30克　赤芍9克　金银花15克　连翘15克　当归尾3克　山栀9克　苍耳子9克　薏苡仁15克　谷芽15克　麦芽15克　白鲜皮9克

【功用】凉血清热，活血祛风。

【主治】荨麻疹，属血燥感风者，疹块突发，疹红，热痒。

【方论选录】方中用生地、丹皮、茅根、赤芍凉血；金银花、连翘清热解毒；当归尾活血止痒；苍耳子祛风止痒；白鲜皮能清热解毒，祛风止痒；谷芽、麦芽助消化；山栀、薏苡仁引热下行。

茹

58883　茹连散

【方源】《痘疹仁端录》卷八。

【组成】黄连五钱　吴茱萸六钱　竹茹二钱

【用法】上药同炒，为末。每服五分，生姜、竹茹煎汤下。

【主治】干呕。

58884　茹橘饮

【方源】《金鉴》卷四十七。

【组成】竹茹　橘红各三钱　干柿一枚

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】产后呃逆，发热面红，小便赤色。

荔

58885　荔奴丹

【方源】《灵药秘方》卷下。

【组成】人言三分　水银三钱　火消　皂矾　明矾各六钱　雄黄一钱　铜绿五分　食盐一两二钱

【用法】上为细末，不见星，用银罐七八个，将药分贮罐内，约有三四分深，放风炉上，文火熔化结胎。先要将各罐口磨平俱覆于铜盆上，外用水一大盆座铜盆于上，加炭火勿露罐；先文后武，一炷香即退火取药，当时饭研为丸，如黍米大。每服一丸或二丸，龙眼肉包住，外加豆腐皮裹之，盐汤送下。饿一日，药行遍身，方可饮食。

【主治】杨梅结毒，大麻风。

【宜忌】服药后，大便要在空地深坑之处，以厚土掩之，勿令毒气传人。

58886　荔奴散

【方源】《经目屡验良方》。

【组成】龙眼核不拘多少(烧存性)

【用法】上为细末，收贮。敷伤处。立愈。

【主治】一切金疮跌磕。

58887　荔壳汤

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】荔壳 木香 丁香 甘草 白芍 人参 当归 陈皮 茯苓 厚朴

【主治】痘疮六七日尚不灌脓。

58888 **荔枝汤**

【方源】《元戎》。

【组成】乌梅肉 甘草各二两 百药煎一两 白芷半两 白檀二钱

【用法】上为细末。汤点服。

【功用】生津止渴。

58889 **荔枝散**

《保命歌括》卷十六。为《普济方》卷二四七引《德生堂方》“荔核散”之异名。见该条。

58890 **荔枝散**

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】荔枝七个(连皮烧存性)

【用法】上为末。白滚汤下。

【主治】呃逆不止。

58891 **荔枝粥**

【方源】方出《泉州本草》四集，名见《长寿药粥谱》。

【组成】干荔枝 5 枚(去壳) 粳米或糯米二两

【用法】煮粥食。连服三次愈。酌加山药或莲子同煮更佳。

【功用】《长寿药粥谱》：温阳益气，生津养血。

【主治】①《泉州本草》：老人五更泻。②《长寿药粥谱》：口臭。

【宜忌】《长寿药粥谱》：素体阴虚火旺者忌服。

58892 **荔枝膏**

【方源】《御药院方》卷二。

【组成】乌梅八两 桂十两 乳糖二十六两 生姜五两(取汁) 麝香半钱 熟蜜十四两

【用法】上用水一斗五升，熬至一半，滤去滓，下乳糖再熬，候糖熔化开，入姜汁再熬，滤去滓，俟少时，入麝香，用如常法服。

【功用】《饮膳正要》：生津止渴，去烦。

【主治】①《御药院方》：伤寒。②《普济方》：疟疾。

58893 **荔枝膏**

【方源】《普济方》卷二九一。

【组成】荔枝肉一两 轻粉 麝香 川芎 白豆蔻 砂仁各半钱 朱砂 龙骨 血竭 乳香各一钱 全蝎五个

【用法】上将荔枝肉擂碎，以软米饮和为膏。看疮大小摊贴。如有三五个者，止去贴为头者，妙。

【主治】瘰疬。

58894 **荔香散**

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】神香散(《医钞类编》卷五)。

【组成】荔枝核(炮微焦) 大茴香(炒)各等分

【用法】上为末。每服二三钱，用好酒调下。

【主治】疝气痛极，在气分者，小腹气痛。

58895 **荔核散**

【方源】《得效》卷九。

【组成】舶上茴香 青皮(全者) 荔枝核各等分

【用法】上锉散，去火毒，为末。每服二钱，酒下，一日三次。不过二剂，除根。

【主治】肾大如斗。

58896 **荔核散**

【方源】《普济方》卷二四七引《德生堂方》。

【异名】荔枝散(《保命歌括》卷十六)。

【组成】荔枝核十四个(新者，烧存性) 沉香 木香 青盐 食盐 八角茴(炒)各一钱 小茴香 川楝子肉各二钱

【用法】上为细末。每服三钱，空心热酒调下。

【主治】疝气。阴核肿大，痛不可忍。

【备考】本方原名荔核丸，据《准绳·类方》改。

58897 **荔枝橘核汤**

【方源】《杂病源流犀烛》卷十一。

【组成】荔枝　橘核　桃仁　甘草　茯苓　白术　枳壳　山楂　延胡索

【用法】清水煎服。

【主治】㿗疝。

药

58898　药针

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】官桂　干姜　丁香各一钱　虾蟆一只(去筋骨,用腿肉)

【用法】上为末,用腿肉捣烂合药,作撚如针。插管孔内,一日一次。

【主治】漏疮。

58899　药肝

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【异名】药饼(《普济方》卷二五八)。

【组成】羊子肝一片(分为四块)　腻粉一钱　麝香(末)二钱

【用法】上药和面裹,烧熟,空腹食。时以冷水更换浸两手,良久即住,来日早晨转下恶物,有虫如头发相似为验。

【主治】多年肺气咳嗽。

58900　药纸

【方源】《灵药秘方》卷上。

【组成】杭州高白油纸一百张　生甘草八两

【用法】先以净水十五碗,入甘草煎至六七碗,去滓,再煎至三四碗浓,将纸分作四块入锅,块块见汁,煮干为度,取起晾干,收好听用。外贴。

【主治】一切肿毒出脓泡自破,出水者。

58901　药枕

【方源】《医部全录》卷三三一引《保生要录》。

【组成】蔓荆子　甘菊花　通草　防风　羚羊角(屑)　犀角　石菖蒲各八分　细辛　白芷　芎䓖　藁本各六钱　白术四分　黑豆五合(拣择净)

【用法】上为细末,相拌令匀,以生绢囊盛之;欲其气全,次用碧罗袋盛之如枕样,纳药直令紧实,置于盒子中,其盒形亦如此,纳药囊,令出盒子唇一寸半,晚来欲枕时,揭去盒盖,不枕即盖之,使药气不散。枕之日久,渐低,更入药以实之,或添黑豆,令如初,三五月后,药气散则换之。

【主治】头风目眩。

58902　药枣

【方源】方出《外台》卷九引《必效方》,名见《圣济总录》卷一八九。

【组成】莨菪二分(以水掏去浮者,水煮,令牙出,焙干,炒令黄黑色)　酥一鸡子许　大枣七个

【用法】上药,铛中煎令酥尽,取大枣,去皮食之,一日二次。

【主治】咳嗽积年不愈者,胸膈干痛不利。

58903　药肺

【方源】《串雅外编》卷三。

【组成】猪肺一个　萝卜子五钱(研碎)　白芥子一两(研碎)

【用法】五味调和,饭锅蒸熟。饭食顿食之。一个即愈。

【主治】患痰病久不愈者。

58904　药油

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】黄连　黄柏　连翘　当归　芍药　生地各五分

【用法】用香油一杯,文火煎枯,绢滤滓听用。

【主治】金腮、廉毒、痄腮久不合口而成漏者。

58905　药油

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】松香　枯矾　槐树皮

【用法】上为末,纸卷为筒,藏药在内,蘸油燃火,有油滴下收之,入轻粉少许搽。

【主治】黄水疮。

58906　药线

【方源】《医统》卷七十四引复斋方。

【组成】芫花入土根不拘多少

【用法】捣自然汁于铜铫内,慢火熬成膏,以生丝线入膏再熬良久,膏浓为度,线阴干,膏留后用。外痔有头者,以药线系之。候痔焦黑落下,再用绵裹猪鬃蘸药,当纳于窍中,永不发。

【主治】外痔漏,囊痈,悬痈,臀痈。

58907 **药线**

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】鲜芫花根一钱 雷丸 蟾酥各一钱 草乌三钱

【用法】水一钟,煎一钟,去滓取汁,用生丝一钱,入药汁内,以文火煮,汁将干,存汁一小酒钟,取起晒干,复浸汁内,又晒又浸,以汁尽为度,晒干,包收听用,至六七月,取露天蜘蛛丝,做成药线。缚痔穿漏。

【主治】痔漏。

58908 **药线**

【方源】《金鉴》卷六十九。

【组成】芫花五钱 壁钱二钱

【用法】用白色细衣线三钱,同上药用水一碗盛贮小瓷罐内,慢火煮至汤干为度,取线阴干,凡遇痔疮瘿瘤,顶大蒂小之证,用线一根,患大者二根,双扣系扎患处,两头留线,日渐紧之,其患自然紫黑,冰冷不热为度。轻者七日,重者十五日后必枯落,以月白珍珠散收口,甚效。

【主治】诸痔,瘿瘤。

58909 **药线**

【方源】《外科十三方考》。

【组成】白砒三钱 明矾七钱

【用法】上为细末,先于锅中滴麻油几滴,次将砒末放入,再将明矾末盖于上面,将锅在武火上烧之,俟砒、矾干结成饼,烟将尽未尽时,取出研末,以面糊做成细条(如粗线丝)备用。

【主治】瘰疬成茧,及痈疽已久不干脓。

58910 **药茶**

【方源】《同寿录》卷尾。

【组成】乌药 枳壳 干葛 紫苏 神曲 前胡 雄黄 香附 槟榔 苍术 厚朴 桔梗 菖蒲 甘草 麦芽 山楂 陈皮 藿香 砂仁各五钱

【用法】用麦酒二斤,拌一宿,于五月五日午时,用红茶二斤,同炒透,收贮。每服一二三四钱,开水冲服;煎服亦可。

【主治】风寒时感,头痛腹胀发热,以及小儿停积。

58911 **药茶**

【方源】《良方续录》卷上。

【组成】新会皮五钱(炒) 青皮五钱(炒) 柴胡五钱 槟榔五钱 厚朴五钱(面炒) 麦芽五钱(炒) 葛根五钱 秦艽五钱 白芷五钱 甘草五钱 甘葛五钱 枳壳五钱 薄荷五钱 神曲四钱(炒) 苍术四钱(炒) 半夏曲八钱 山楂一两 莱菔子七钱(炒) 紫苏七钱 独活七钱 羌活七钱 升麻二钱五分 麻黄三钱 川芎二钱

【用法】先用湘潭茶二斤,和入姜汁一碗,拌透,晒干,再入前药和炒,收贮。每用二钱,小儿减半,煎汤服;或加砂糖冰糖,以开水化服亦可。

【主治】四时感冒,风寒头疼,肚痛,胸膈不宽,咳嗽吐痰,痢泻。

58912 **药茶**

【方源】《良方合壁》卷上引叶天士方。

【组成】羌活 独活 荆芥 防风 柴胡 前胡 藿香 香茹 紫苏 葛根 苍术 白术(炒焦) 枳实 槟榔 藁本 滁菊 青皮 桔梗 甘草 半夏(制) 白芥子 大腹皮 木通 莱菔子(研) 杜苏子 车前子 泽泻 猪苓 薄荷 生姜各二两 川芎 白芷 秦艽 草果各一两 陈建曲 南楂炭 茯苓皮 麦芽各四两 杏仁 厚朴 广陈皮各三两

【用法】上药共煎浓汁,以陈松萝茶叶六斤,收之晒干。每服二三钱,小儿减半,煎服。

【主治】伤风伤寒,头痛发热,停食,肚腹膨胀,霍乱吐泻,伏暑赤白痢疾。

58913　药饼

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】附子一两(炮裂,去皮脐)　神曲三两(微炒)　干姜一两(炮裂,锉)　肉苁蓉一两半(酒浸一宿,刮去皱皮,炙干)　桂心一两　五味子一两　菟丝子一两(酒浸三日,晒干捣末)　羊髓三两　大枣二十个(煮去皮核)　汉椒半两(去目及闭口者,微炒去汗)　酥二两　蜜四两　白面一升　黄牛乳一升半

【用法】上为细散,入面与酥蜜髓乳相和,入枣瓤熟溲于盆中,盖覆勿令通气风,半日久,即将出,更溲令熟,擀作糊饼大,面上以筋子琢之,即入铲镦中,上下以煿令熟。每日空腹食一次。入酵和面更佳。

【功用】暖腰肾,壮阳道。

【主治】五劳七伤,下焦虚冷,小便遗精。

58914　药饼

《普济方》卷二五八。为《圣济总录》卷一八九"药肝"之异名。见该条。

58915　药酒

【方源】《扶寿精方》。

【组成】冷饭团二斤　五加皮五两　当归　生地黄　赤芍药　白茯苓　白术　牛膝　杜仲　木瓜　地骨皮　荆芥　防风　大风藤　白鲜皮　金银花　威灵仙　川芎　白芷　甘草各五钱

【用法】上锉片,生绢袋盛,无灰酒一坛,煮沸,入袋浸七日。每日进三四五杯。

【主治】远年杨梅风,筋骨痛疼。

58916　药酒

【方源】《解围元薮》卷四。

【组成】石六轴子四两　乌蛇一条　当归四两　甘草八两

【用法】先以水六碗,煮甘草汁三碗,方入烧酒一斤,并三味药,隔汤煮三炷香,埋地七日。每早饮一杯。

【主治】三十六种危恶大风。

58917　药酒

【方源】《墨宝斋集验方》卷上引茅鹿门方。

【组成】淫羊藿一斤(去根梗,用叶,将麻布揩去背上毛,用酥油涂炙黄透,斤半取八两)　当归八两(酒洗,去须头)　仙茅四两(米泔水浸,去赤汁,用黑豆拌,蒸烂,去豆不用)　鹿茸二两(酥炙三两五钱,取二两)

【用法】上药各咀片,共入绢袋盛,悬坛内,用陈煮老酒五六十斤,打面封头并口,煮三炷香取起,埋地下七日夜,将药晒干为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二三十丸,清晨将原酒送下。半月以后见效。或加人参一两。

【功用】固精壮阳,面筋健骨,补精髓,广嗣延年。

【主治】气血不足。

【宜忌】忌房事一个月。

58918　药酒

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】松节二两　青风藤　虎胫骨　草乌(姜汁浸,炒)　威灵仙　薏苡仁　杜仲　五加皮(黄连洗)　当归　牛膝　川芎　金银花　红花各一两　木瓜八钱　白芷　川山甲　独活　没药　乳香各五钱　肥皂子仁四两　核桃仁四两(杵如泥)

【用法】烧酒二十斤,黄蜡四两,入坛内,封口,重汤煮三炷香,取出埋土内三日,空心、食前任服,核桃肉过口。

【主治】鹤膝风。

58919　药酒

【方源】《良朋汇集》卷三。

【组成】桑椹子(晒干)　龙眼肉各四两

【用法】烧酒十斤,昼晒夜露,十日开坛饮之。

【功用】补益。

58920　药酒

【方源】《奇方类编》卷上。

【组成】生地　熟地　枸杞　木通　牛膝　川芎　薏苡仁　当归　金银花各二两　五加皮　苍术各一两　川乌　草乌各五钱　甘草　黄柏各五钱　松节四两

【用法】上药以好酒十六斤,煮三炷香,埋

土内，退火气，早、中、晚三服之。

【主治】半身不遂，日夜骨痛。

58921 药酒

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】紫荆皮 丹皮 五加皮 郁金 乌药各一两 官桂五钱 川芎一两 胡索一两 木香五钱 羊踯躅(去油)五钱 乳香(去油)五钱 羌活五钱

【用法】火酒十斤，绢袋盛药，入酒煮三炷香，分作十小瓶，常饮。

【主治】跌打损伤，青肿。

58922 药酒

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】生地十两 海桐皮二两 米仁二两 川芎 骨皮 五加皮 羌活 牛膝各一两 甘草五钱

【用法】浸酒服。

【主治】风湿腰痛，血热。

58923 药酒

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】白梅花肉(泡淡)五钱 红花二两 苍术二两 生地一两五钱 当归二两 核桃白肉一斤

【用法】入老酒一斗，浸七日，早、晚送服斑龙灵龟化痔丸，亦可独饮。

【主治】痔漏脓血淋漓。

58924 药酒

【方源】《疡医大全》卷十八。

【组成】摩罗藤

【用法】夏月用鲜者二斤，陈木瓜酒五斤，烧酒五斤；冬月用枯者四斤，陈木瓜酒八斤，烧酒二斤。入小口瓦坛，用湿面糊坛口，重汤煮一炷香为度。每食后随量饮之，常服除根。

【主治】瘰疬。

58925 药酒

【方源】《何氏济生论》卷一。

【组成】虎胫骨五钱 苍术 薏仁各三钱 黄芩 茯苓 威灵仙 当归 牛膝 川断各二钱 萆薢一钱五分 川芎 知母 秦艽 天麻 黄柏各一钱二分

【用法】无灰酒二十五斤，绢袋盛药，浸酒内，坛口用箬叶扎紧，上放淘过黑米一撮，以水浸坛大半截，煮待米成饭为度，取出埋土中七日。

【功用】除湿气，壮筋骨。

【主治】浑身疼痛。

58926 药酒

【方源】《医方易简》卷六。

【组成】虎骨一两 附块二两 牛膝八钱 五加皮 杜仲(酒炒)各一两 黄耆二两 潞党二两(酒炒) 枸杞一两 炙草五钱

【用法】米酒浸服。

【主治】鹤膝风。

58927 药酒

【方源】《伤科方书》。

【组成】当归 生地 乌药 三七 肉桂 乳香 没药 牛膝 丹皮 红花 胡索 防风 独活 杜仲 加皮 落得草 川芎 虎骨 干姜 姜黄 紫荆皮 海桐皮各五钱

【用法】米酒浸煮，早、晚服。

【主治】跌打损伤。

58928 药粉

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】党参 山药 百合 茯苓 白术 生耆 玉竹 当归 莲子

【用法】将药晒脆，加炒熟粳米数斗，和药为末。每早加洋糖调食。

【主治】注痰，溃后不敛。

58929 药梅

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】青梅一斗 砂仁四两 甘草四两 川木通八两 紫苏四两 黄芩八两 防风八两

【用法】好烧酒一斗，将药与青梅拌匀，浸酒一月。每用青梅二三枚。

【主治】痢疾。

58930 药梅

【方源】《串雅外编》卷三。

【组成】木香 木通 黄芩 紫苏 砂仁 薄荷各一斤 青梅十斤 火酒十斤

【用法】端午日入瓶内封固,一月可用,只吃两个即愈。

【主治】痢疾。

58931 **药绵**

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】麝香一钱 砒霜少许 莽草末半钱 蛤粉一两 蟾酥一字 螺字青黛一字

【用法】上为末。别用故绵半分,剪长一寸,碎擘,以药掺在绵内,时入水少许相和,揉令匀,阴干。有患者,用盐浆水揩漱三五度,用少许药绵,塞在牙根,以针按绵子,入齿缝中。三二度即愈。

【主治】走马疳,蚀落牙齿,龈肿有脓水。

58932 **药乌鱼**

【方源】《仙拈集》卷一引孙伟方。

【用法】活乌鱼一条(重七八两者)

【用法】去鳞甲,将肚剖开,去肠净,入好黑矾五分,松萝茶三钱,男子用蒜八瓣,女用七瓣,共入鱼腹内,放瓷器中蒸熟,令病人吃鱼,连茶蒜俱食甚妙。此药从头吃,即从头上消起;从尾吃,即从尾上消起。

【主治】水鼓。

58933 **药艾丸**

《医学心悟》卷六。即原书同卷"陈艾丸"加麝香末,木香末。见该条。

58934 **药艾条**

【方源】《中国药典》一部。

【组成】艾叶 2.4 千克 桂枝 125 克 高良姜 125 克 广藿香 50 克 降香 175 克 香附 50 克 白芷 100 克 陈皮 50 克 丹参 50 克 生川乌 75 克 雄黄 12.5 克

【用法】上药,将艾叶碾至成艾绒,雄黄水飞,或粉碎成极细粉,其余九味粉碎成细粉,与雄黄粉末配研,过筛,混匀。先取艾绒 20 克,均匀平铺在一张长 28 厘米,宽 15 厘米白棉纸上,再均匀散布上述粉末 88 克,将棉纸两端折叠约 6 厘米,卷紧成条,粘合封闭;晒干即得。直射灸法,一次适量,红晕为度,一日一至二次,或遵医嘱。

【功用】行气血,逐寒湿。

【主治】风寒湿痹,肌肉酸麻,关节四肢疼痛,脘腹冷痛。

58935 **药丝线**

【方源】《外科传薪集》。

【组成】芫花五钱 壁钱二钱 草乌五钱 白扣线三钱

【用法】水一碗,瓷罐内慢火煮干,不晒,阴干。遇症将丝线扎系。每日收紧,其患自然枯黑。

【主治】瘿瘤,痔菌。

58936 **药母鸡**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】母鸡一只

【用法】去毛肠,入当归三钱,白芷、羌活各二钱,细辛一钱,同好酒煮食。不可入盐醋,二三服痊愈。

【主治】年久头风,妇人多有之。

58937 **药肉粥**

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】羊肉二斤 当归(锉,微炒) 白芍药 熟干地黄 黄耆各半两 生姜一分(切) 粳米三合

【用法】上以精肉留四两细切,余一斤十二两,先以水五升,并药煎取汁三升,去滓,下米煮粥,欲熟,入生肉更煮令熟,用五味调和,空心食之。

【功用】驻颜色。

【主治】虚损羸瘦,女人产后虚羸。

58938 **药赤豆**

【方源】《梅氏验方新编》卷二。

【组成】赤小豆半斤 大蒜头三个 生姜五钱 商陆根一两

【用法】用水三大碗,同煎,俟豆熟透,去姜蒜、商陆根,以汁拌豆,空心食之。食完肿自消。

【主治】水气肿胀。

58939 药肝汤

【方源】《外科证治全书》卷一。

【组成】黑羊肝七尖四两(如无羊肝,即用公猪肝亦可) 兔粪八枚 木贼(去节) 当归身各二钱 蝉蜕二十四个(去头足)

【用法】上先将兔粪、木贼、当归、蝉蜕四味,用清水二大碗,入瓷罐内,漫火熬滚,令其性味俱出后,将羊肝七尖切薄片,入于汤内,一刻即熟。先饮汤,后食肝。每日清晨用之,晚服拨翳汤。两月之久,翳膜可消一半,百日可痊愈。

【主治】外障,眼生翳膜。

58940 药鸡蛋

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】鸡蛋一个 熟大黄末三钱

【用法】将鸡蛋顶开一孔,以熟大黄末三钱入蛋内,银簪搅匀,蒸熟,黄酒下。

【主治】血淋。

58941 药鸡蛋

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】鸡蛋一枚 硫黄末五六分

【用法】将鸡蛋头打一小孔,放硫黄末,用纸封好,外用湿纸重重包裹,火内煨熟,空心烧酒送下。三枚即愈。

【主治】赤白带下,虚寒诸症。

58942 药鸡蛋

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】鸡蛋一个 白矾末一钱五分 辰砂末五分

【用法】将蛋戳一孔,入白矾末、辰砂末,用纸重重包裹,醋湿浸,火内煨透,略带微烟存性,去纸,将蛋并壳为末,分作二服。每早热黄酒送下,重者两蛋即愈。

【主治】赤白带下,虚寒诸症。

58943 药鸡蛋

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】破故纸(炒,为末)八分 鸡子一枚

【用法】将鸡子开一孔,入药末八分,搅匀,用纸封固,饭上蒸熟,空心酒下。重者不过五六次愈。

【主治】赤白带下,虚寒诸症。

58944 药核桃

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】核桃一个 芝麻一把 马齿苋一撮

【用法】共捣烂,滚酒服。

【主治】血淋,沙淋。

58945 药荸荠

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】桑椹三两(干者) 雄黄一两五钱 赤糖 白糖 砂仁各三两

【用法】上为细末,用大荸荠三斤,烧酒三斤,浸透,砂锅内煮熟。每服一枚。

【主治】赤白痢疾。

58946 药盐煎

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】木香 厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 苍术(米泔浸,洗,切,焙) 大腹皮 枳壳(去瓤,麸炒) 芍药 诃黎勒皮 白槟榔 陈橘皮(去白,焙)各一两

【用法】上细锉,共用水一斗,煎取三升,滤去滓,入盐花二斤,文武火煎汁尽,如红雪法收之。每用半钱、一钱匕,水一盏,加生姜三片,同煎七分,温服。

【主治】冷气呼吸短乏,胁肋刺痛,皮急寒战,心腹胀满疼痛,食饮不消。

58947 药烧饼

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】羊肉一斤(去脂膜,切) 肉苁蓉四两(酒浸一宿,刮去皱皮) 附子一两(炮裂,去皮脐) 干姜半两(炮裂,锉) 胡椒一分 时萝一分 荜茇一分 诃黎勒半两(煨,用皮) 羌荑半两 白面五升

【用法】上为末,将肉并苁蓉细切,入诸药末调和,分作四剂馅,逐剂以溲了面裹着馅、后撮合,微拍合匀,以湿纸裹,塘火烧之令熟。每日空腹食一个。

【功用】暖腰肾,缩小便。

【主治】五劳七伤，大肠泄痢。

58948　**药烧酒**

【方源】《万氏家抄方》卷四。

【组成】胡桃肉　小红枣(去核)　白蜜各半斤　酥油四两　苍术(炒)　陈皮　厚朴(姜炒)　白术(炒)　香附(炒)　当归　砂仁　生地　乌药　赤白何首乌(竹刀去皮)各二两　白茯苓　苏子　破故纸(炒)　白芍(炒)　牛膝(去芦)　枳壳(炒)　半夏(姜制)　川芎　五加皮　杏仁(去皮)　川椒(去目)　虎骨(酥炙)各一两　甘草　小茴香　独活　羌活　防风　荆芥　木香　白芷　沉香各五钱

【用法】上锉，生绢袋盛，堆花烧酒一大坛，入药固封，浸百日。随证上下，饥饱随量服。

【主治】风气湿痹，胃脘肚腹疼痛，疝气，腰膝疼痛，膈噎泻痢，气逆积滞，痞块，感寒冒风头痛，胸腹胀闷，呃逆，疮癞风疾，妇女经闭，赤白癥瘕。

58949　**药兜肚**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】干姜八分　官桂一钱　白芥子一钱五分　枳实一钱　阿魏四分　半夏一钱　水仙子一钱五分　麝香五分

【用法】上为粗末，用艾绒，大红纱布作夹兜肚一个，将药置于中。

【功用】暖肚消癥。

58950　**药猪肚**

【方源】方出《奇方类编》卷上，名见《仙拈集》卷一。

【组成】雄猪肚一具(洗净)

【用法】入虾蟆一个，胡椒一岁一粒，加砂仁少许，以酒煮熟，去蟆、椒，只将肚酒徐徐服尽。其肿自消。

【主治】水肿。

58951　**药猪肠**

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】土茯苓四两　花椒三钱

【用法】入猪肠内，线扎两头，煮熟去药，食肠。二三次愈。

【主治】杨梅疮。

58952　**药猪胞**

【方源】《种福堂方》卷二。

【组成】麝香一钱　阿魏三钱　水红花子　大黄　归尾　甘遂　急性子　甘草各五钱

【用法】上为细末，用猪水胞一个，量痞块大小，用尿胞大小，装入干烧酒半胞，将前药末放入胞内，紧扎住口，用白布将胞兜扎于患处。俟块化尽即去之，不可迟也。

【主治】痞块。

58953　**药馄饨**

【方源】《普济方》卷一九八引《卫生方》。

【组成】良姜　吴茱萸　胡椒各一分

【用法】上为细末，猪脾一条，锉作臛，加五味炒之，一半滚药，一半不滚，并作馄饨，有药者墨点之，余者吞下，无药者嚼下。一服效。

【主治】疟发作无时。

58954　**药棋子**

【方源】《本事》卷四。

【异名】通经丸(《金鉴》卷四十三)。

【组成】牵牛不拘多少(用新瓦入火煿得通赤，便以牵牛顿在瓦上，自然一半生，一半熟，不得拨动，取末一两)　硫黄一分(细研)

【用法】上研匀，分三份，每用白面一匙，水和捍开，切作棋子，五更初以水一盏煮熟，连汤温送下，住即已，未住，隔日再作。

【主治】腰腿痛，气滞。

58955　**药磨汤**

【方源】《外科百效》卷二。

【组成】川厚朴　白茯苓　大半夏　紫苏叶各四钱

【用法】加生姜七片，大枣三个，水一盏，煎至六分，将热药水倾少许入粗碗内，磨后五味，麝香一块，槟榔一个，乌药一块，沉香一块，枳壳半个，依次入药碗内，用力各顺磨五十下，仍入前药和匀，食远服之。先用逐痰丸，后用药磨汤，重者六七剂而愈。后十日，再服舌恬散。

【主治】梅核气。

58956 **药灵砂丹**

【方源】《普济方》卷三十六引《如宜方》。

【组成】灵砂一两 丁香 木香 胡椒各半钱

【用法】上为末，枣肉杵丸，如绿豆大。每服六十丸，姜汤送下。

【主治】翻胃，脏寒停饮后吐。

58957 **药制肺露**

【方源】《中药成方配本》（苏州方）。

【组成】鲜猪肺一只 南沙参一两 麦冬一两 玉竹一两 桑皮一两 桑叶一两 款冬花一两 枇杷叶一两 前胡一两 桔梗一两 象贝一两 甘草五钱 广皮五钱 枳壳五钱 姜半夏五钱 青蒿子一两 百部一两

【用法】将猪肺洗净去膜，枇杷叶去毛，同诸药打和，放淡水十斤，用蒸气蒸馏法，每料吊成露六斤。每次温服四两，一日二次。

【功用】润肺止咳。

【主治】肺热痰多，咳嗽音哑。

58958 **药酒奇方**

【方源】《寿世新编》卷下。

【组成】十大功劳三两 八棱麻根五钱 淫羊藿 千年健 红花 当归 五加皮 陈皮各三钱

【用法】上为粗末，夏布袋装入缝好，用陈烧酒四斤，伏酒十斤浸之，封固坛口。一月后随量饮之。三四十日自见其功。

【主治】积受潮湿，四肢不仁；兼酒病腿疼不能行步并转筋。

58959 **药髓饼子**

【方源】《圣惠》卷九十七。

【组成】干姜一分（炮裂，锉） 汉椒半两（去目及闭口者，微炒去汗） 桂心一分 附子一两（炮裂，去皮脐） 诃黎勒一分（煨，用皮） 缩砂半两（去皮，各为末） 蜜一合 大枣一百个（去核，细切） 羊筒骨髓三两 白面二斤 黄牛酥三两

【用法】上为细末，入诸药同和作馅，分为八分，以溲面包裹，如常作髓饼，入炉上，下着火爆，则须彻里过熟。每日空腹食一次。觉腰肾及膀胱暖则止。

【主治】五劳七伤，肾气虚冷，腰膝疼痛，小便遗沥。

58960 **药制柑橘饼**

【方源】《本草纲目拾遗》卷七引《北砚食规》。

【组成】玄明粉 半夏 青盐 百药草 天花粉 白茯苓各五钱 诃子 甘草 乌梅（去核）各二钱 硼砂 桔梗各三钱

【用法】上药俱用雪水煎半干，去滓，澄清取汤，煮柑橘，炭墼微火烘，日翻二次，每次轻轻细捻，使药味尽入皮内，如捻破则不妙。

【功用】清火化痰，宽中降气。

58961 **药制苍耳子虫**

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】苍耳子虫

【用法】先将苍耳子虫浸在生油中，须浸没，约七天取虫出，再加入蓖麻油内，加朱砂少许，以色红为度。用苍耳子虫一条，放在膏药或药膏上贴患处。

【功用】提疔拔脓。

【主治】一切疔疮。

荤

58962 **荤素羹**

【方源】《饮膳正要》卷一。

【组成】羊肉一脚子（卸成事件） 草果五个 回回豆子半斤（捣碎，去皮）

【用法】上药同熬成汤，滤净，豆粉三斤，作片粉，精羊肉切条道乞马，山药一斤，糟姜二块，瓜齑一块，乳饼一个，胡萝卜十个，蘑菇半斤，生姜四两，各切，鸡子十个，打煎饼，切，用麻泥一斤，杏泥半斤，同炒，葱、盐、醋调和。

【功用】补中益气。

荣

58963　荣芝丸

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】鹿角霜五两　鹿茸(去毛,酥炙)三两　麝香(研)二两　沉香　白术　当归(去芦头)　熟干地黄　苁蓉(酒浸二宿)　牛膝(酒浸二宿)　菟丝子(酒浸,别研)　萆薢(蜜炒)　川芎　五味子各一两

【用法】上为细末,用面二两,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心粥水送下;或温酒盐汤亦得。渐加至五十丸。

【功用】起阴发阳,安神定魄,补五脏,和六腑,活血脉,填骨髓,强骨生力,驻颜色,久服轻身,延年不老。

【主治】诸虚不足。

58964　荣顺散

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】枳壳(去瓤,麸炒)　荆芥穗各一两　槐鹅半两(炒黄)

【用法】上为细散。每服二钱匕,温米饮调下,不拘时候。如未效,再服。

【主治】肠风下血,疼痛不可忍。

58965　荣润汤

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】四物汤加桃仁　红花　麻仁　枳壳

【主治】膈噎,便秘。

【加减】结甚,加熟大黄;中年人,加童便、韭汁、牛乳、羊乳、竹沥、姜汁。

58966　荣筋汤

【方源】《杏苑》卷五。

【组成】人参　白茯苓　当归各七分　甘草　官桂各四分　黑附子　厚朴各五分　龙骨八分　黄耆　麦门冬　白芍药　生地黄各一钱　饴糖少许　生姜三片

【用法】上㕮咀。水煎,空心服。

【主治】筋病,筋脉相引而急;及五劳七伤,小便频数,腹痛难立。

58967　荣卫饮子

【方源】《活幼口议》卷十七。

【组成】川当归　熟干地黄(净洗)　人参　白茯苓　川芎　白术　甘草(炙)　白芍药　枳壳(炒,别研)　黄耆(蜜炙)　陈皮各等分

【用法】上㕮咀。每服二钱匕,水一小盏,煎至半,去滓,通口服,不拘时候。

【主治】婴孩气血俱虚,荣卫不顺,四肢头面手足俱浮肿,以至喘急者。

58968　荣卫返魂汤

【方源】《仙传外科集验方》。

【异名】通顺散、何首乌散(原书)、通气散(《外科启玄》卷十一)。

【组成】何首乌(不犯铁)　当归　木通(去皮节)　赤芍药(炒)　白芷　茴香(炒)　土乌药(炒)　陈枳壳(麸炒,若恶心,姜汁炒)　甘草各等分

【用法】上药,水、酒、汤使,随证用之,水、酒相拌亦可,唯流注加独活。每服四钱,病在上,食后服;病在下,食前服。

【功用】和气匀血,扶植胃本,荡涤邪秽。

【主治】流注,痈疽,发背,伤折。

58969　荣筋拈痛洗腿方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】宣木瓜四钱　赤芍三钱　橘络三钱　乳香三钱　全当归四钱　没药二钱　红花二钱　防风三钱　透骨草三钱

【用法】水煎,兑烧酒四两,随时洗之。

【主治】腿痛。

【方论选录】病在腿而不在手,虽荣筋拈痛之法与洗手荣筋方同,而用药则异。于洗手荣筋方去桂枝等扬上横行之药,而加重消瘀之品,使药力专一下行。洗时兑入烧酒,更促血行,则化瘀活血、荣筋定痛之力更著。

58970　荣筋活络洗药方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】宣木瓜三钱　松节三钱　赤芍四钱　透骨草三钱　清风藤三钱　乳香各二钱　红花二钱　全当归四钱　天仙藤三钱

【用法】水煎，兑烧酒二两洗之。

【功用】荣筋活络。

【主治】筋骨病。

【方论选录】全方以养血柔肝，活血通络为治，于光绪帝病情颇适合。青风藤为治风湿痹痛常用之品，天仙藤即青木香，可行气止痛，实验表明有阻断交感神经节的作用，临床上可用以降压，并治子痫，古方有用其茎藤缓解风湿痹痛的记载，本方用此，似亦取其行气、活血、止痛的功效。

革

58971 革一

《痧症全书》卷下。为《痧胀玉衡》卷下"荆芥薄荷汤"之异名。见该条。

58972 革二

【方源】方出《痧胀玉衡》卷中，名见《痧症全书》卷下。

【异名】五十号复象方（《杂病源流犀烛》卷二十一）。

【组成】金银花 茜草 连翘 黑山栀 枳壳 丹皮 赤芍 牛膝 石斛 草决明 童便

【用法】微冷饮之。

【主治】眼目痧。

【临证举例】眼目痧 江道诚患心中烦热头眩，忽两目红肿大痛，饮热茶热酒，眼珠挂出，左目尤甚，至晚即昏沉发晕，左脉微细无根。服上药，眼珠始收，调理而愈。

58973 革七

【方源】方出《痧胀玉衡》卷中，名见《痧症全书》卷下。

【异名】五十五号需象方（《杂病源流犀烛》卷二十一）。

【组成】独活 细辛 柴胡 金银花 丹参 益母草 牛膝 石斛 乌药 山楂 陈皮

【用法】水煎，微温服。

【主治】产后痧痛。

【临证举例】产后痧痛 蒋南轩内室，产后八日恶露去血过多，忽恶寒发热，胸中胀闷垂危，脉洪大无伦。放痧毒，刺指臂出紫黑毒血，三十余针，用上药四剂，寒热胀闷俱除，调补而愈。

58974 革八

【方源】《痧症全书》卷下。

【异名】五十六号比象方（《杂病源流犀烛》卷二十一）。

【组成】山楂 银花 丹参 益母 独活 柴胡 牛膝 桃仁 艾叶 苏木 姜黄 香附

【用法】水煎服。

【主治】产后痧。

58975 革三

《痧症全书》卷下。为《救偏琐言·备用良方》"拨云散"之异名。见该条。

58976 革五

【方源】方出《痧胀玉衡》卷中，名见《痧症全书》卷下。

【异名】五十三号大壮方（《杂病源流犀烛》卷二十一）。

【组成】桃仁 红花 独活 细辛 山楂 香附 青皮

【用法】水煎，加童便饮之。

【主治】倒经痧。

【临证举例】倒经痧 沈弘先内人，经期发热，鼻血如注，昏迷沉重，肚腹作胀，脉伏。先放痧，刺腿弯二针，出紫黑毒血不愈，服上药，经行调理而愈。

58977 革六

【方源】方出《《痧胀玉衡》卷中，名见《痧症全书》卷下。

【异名】五十四号夬象方（《杂病源流犀烛》卷二十一）。

【组成】桑寄生 红花 香附 益母草 荆芥 细辛 卜子 神曲

【用法】水煎，冲砂仁末，微冷服。

【主治】胎前痧。

【临证举例】胎前痧 道方亭内室,怀娠六月,寒热交作,烦闷不安,左手脉伏,面目微黑,刺腿弯青筋六针,出毒血少愈,服上药而安。后用小柴胡汤退热,又用参、苓、归、地健脾养血乃痊。

58978 革四

《痧症全书》卷下。为《救偏琐言》"消疳解毒散"之异名。见该条。

带

58979 带下丸

【方源】《摄生秘剖》卷三。

【组成】马毛二两(伏火一宿,白马毛治白带,赤马毛治赤带) 龟甲四两(醋炙) 鳖甲二两(醋炙) 牡蛎二两(火炙)

【用法】上为末,醋水为丸,如梧桐子大。每服三钱,温酒送下,一日三次。

【主治】妇人赤白带下。

【方论选录】气陷于下焦则白带,血陷于下焦则赤带。以涩药止之,则未尽之,带留而不出;以利药下之,则既损其中,又伤其下,皆非治也。马得干之刚,毛得血之余,血余可以固血,干刚可以利气,固血则赤止,利气则白愈,此用马毛之意也。龟、鳖、牡蛎,外刚而内柔,离之象也。去其柔而用其刚,故可以化癥,可以固气,化癥则赤白之成带者,无复中留,固气则营卫之行不复陷下。营不陷则无赤,卫不陷则无白矣。

58980 带下汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】黄耆一钱 白术一钱 当归八分 升麻三分 柴胡四分 苍术一钱 半夏一钱 熟地一钱

【主治】带下。

査

58981 査术膏

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】白术 查肉 陈皮 甘草

【用法】煎膏服。

【主治】脾虚多食,停积成痢。

58982 査苏汤

【方源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】山查一两 苏木三钱

【主治】产后儿枕腹痛。

58983 査糖散

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】山査(炒黑)

【用法】上为细末。每服三钱,调沙糖五钱,滚汤调匀食之。

【主治】水泻不止,红白痢疾,霍乱吐泻。

58984 査糖散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】山査五钱(炒)

【用法】水煎浓,加黑沙糖三钱,和匀服之。

【主治】产后恶血攻心,儿枕作痛。

58985 査朴二陈汤

【方源】《医林绳墨大全》卷一。

【组成】山査 厚朴 陈皮 白茯苓 半夏 甘草

【用法】加生姜三片,水煎服。

【主治】伤寒温疫初起三四日之间者。

赴

58986 赴晏散

【方源】《医方类聚》卷七十引《烟霞圣效方》。

【组成】麸仁不以多少(去心,芽儿是心也)

【用法】上药于湿乳钵内研极细,烂摊在碗底,艾烟熏之,干为度,为极细末。用头首儿孩乳汁,就和如膏子,绵子滤过,点眼。

【主治】病眼。

【加减】如赤瞎眼,麸仁艾烟熏干,末半两同炉甘石一两,童便烧蘸七遍,二味同为极细末,临卧贴之。

58987 赴晏散

【方源】《回春》卷五。

【异名】赴筵散(《外科正宗》卷四)。

【组成】黄连　黄柏　黄芩　栀子　细辛　干姜各等分

【用法】上为细末。先用米泔水漱口，后搽药于患处，或吐或咽不拘。

【功用】《北京市中药成方选集》：清胃去火，消肿止痛。

【主治】三焦实热，口舌生疮糜烂，痛不可忍者。

58988　赴晏散

【方源】《喉科秘诀》卷下。

【组成】黄连一钱　川黄柏一钱　生硼砂一钱　寒水石一钱（生用）　北细辛五分　青黛五分　胆矾五分（生用）　人中白五分（煅）　生栀子五分　五倍子五分（炒）

【用法】上为末，收贮听用。遇口热吹入含化，吞下无妨。如十分热，含有涎出再含。

【主治】舌痛，口烂，鼻烂。

58989　赴筵散

【方源】《旅舍备要方》。

【组成】广土（即赤土）　荆芥　朴消各一两

【用法】上为细末。每服一钱，新汲水调下，小儿少与。

【主治】心脾劳热，口舌生疮，或赤或白，不下饮食。

58990　赴筵散

【方源】《鸡峰》卷二十五。

【组成】五倍子八分　黄柏二钱　蜜陀僧四分　铜青一分

【用法】上为细末，干掺之。

【主治】口疮。

58991　赴筵散

【方源】《普济方》卷六十六引《海上方》。

【异名】晋矾散。

【组成】老生姜、白矾

【用法】用老生姜切片，安瓦上，用炭火，却将白矾渗姜上候焦，为末。擦疼处。

【主治】牙疼。

58992　赴筵散

【方源】《宣明论》卷二。

【组成】密陀僧　黄柏　青黛各等分

【用法】上为细末。每用干掺于疮上。不经三二日愈。

【主治】口疮不已者。

58993　赴筵散

【方源】《三因》卷十六。

【组成】五倍子一两（洗）　黄柏（蜜涂，炙紫色）　滑石各半两

【用法】上为细末。每用半钱许，掺患处。嚥津不妨，便可饮食。

【主治】口疮疼痛。

58994　赴筵散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】细辛　黄柏（炒）各等分（去粗皮，蜜炙）

【用法】上为细末，掺患处。涎出即愈。

【主治】口疮。

58995　赴筵散

【方源】《局方》卷七（吴直阁增诸家名方）。

【组成】良姜（去芦）　草乌（去皮）　细辛（去土叶）　荆芥（去梗）各二两

【用法】上为末。每用少许，于痛处擦之。有涎吐出，不得吞咽，良久用温盐汤灌漱，其痛即止。常使揩牙，用腐炭末一半相和。

【功用】止牙宣，辟口气。

【主治】风牙、虫牙攻注疼痛，昼夜不止，痛不可忍，睡卧不安，牙龈宣露，动摇欲脱，或腮颔浮肿，龈烂血出。

58996　赴筵散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】五倍子　蜜陀僧各等分

【用法】上为细末。先以浆水漱过，干贴。

【主治】口疮。

58997　赴筵散

【方源】《医方类聚》卷七十三引《吴氏集验方》。

【组成】北细辛半两　荜茇二钱　良姜　草乌　红椒（去目）　硼砂各二钱半　猪牙皂角　白芷各一两

【用法】上为细末。揩牙痛处。涎出便吐，盐汤漱之。

【主治】牙痛不可忍。

58998　**赴筵散**

【方源】《杂类名方》卷十九。

【组成】铜绿半两(研)　香白芷一两(末)

【用法】上拌匀，掺舌上，温醋嗽。立愈。

【主治】舌上生疮，不能食。

58999　**赴筵散**

【方源】《医方类聚》卷七十七引《居家必用》。

【组成】铜绿　枯白矾　白芷末　姜黄　芒消各等分

【用法】上为细末。于患处敷上。涎出即愈。

【主治】口疮。

59000　**赴筵散**

【方源】《普济方》卷三六五引《保婴方》。

【组成】芝麻花不以多少

【用法】上为末。干掺口内。用五七遍，立愈。

【主治】小儿赤白口疮。

59001　**赴筵散**

【方源】《普济方》卷二九九引《德生堂方》。

【组成】黄柏半斤　青黛四两　白矾二两　朴消二两

【用法】上为细末。掺上。吐去涎，三上即愈。

【主治】口疮。

59002　**赴筵散**

【方源】《普济方》卷七十四。

【组成】朴消一钱　沙糖一弹子大　腻粉一钱　杏仁七个(去皮)

【用法】上研如膏。水半盏，调滤过，洗三五次。

【主治】暴赤眼。

59003　**赴筵散**

【方源】《普济方》卷二九九。

【组成】黄连　黄柏　细辛各等分

【用法】上为细末。搽之。涎出吐去。

【主治】口疮。

59004　**赴筵散**

【方源】《医方类聚》卷二一二引《仙传济阴方》。

【组成】细辛　荜茇　附子皮　川乌皮

【用法】上煎汤噙漱，口满吐之。

【主治】妇人牙疼颊肿，脾虚血弱，气不升降，受暴风热。

59005　**赴筵散**

《医统》卷六十三。为《痘疹全书》卷下"阴阳散"之异名。见该条。

59006　**赴筵散**

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】薄荷　黄柏各等分

【用法】上为末，入青黛少许。掺之。

【主治】口疮。

59007　**赴筵散**

《外科正宗》卷四。为《回春》卷五"赴晏散"之异名。见该条。

59008　**赴筵散**

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】薄荷　黄柏　黄连各等分

【用法】加青黛，为细末。咽痛吹入，口疮敷之。

【主治】口疮。咽痛。

59009　**赴筵散**

【方源】《同寿录》卷末。

【组成】五倍子　青黛　枯矾　黄柏　硼砂　人中白　褐子灰各等分

【用法】上为细末。先用清米泔漱口，敷药。立效。

【主治】口疮及小儿走马牙疳。

59010　**赴筵散**

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】铜绿　白矾各一钱

【用法】上为末。掺舌上，温醋漱之。

【主治】口疮，臭腐多脓。

赵

59011 赵府膏

【方源】《景岳全书》卷六十四。

【组成】干虾蟆三个　全蝎　僵蚕各一两　蜈蚣四条　斑蝥四十个　商陆根一两六钱　花椒一钱　童子发六分　鸡内金二个　槐枝(三寸长者)四十根。

【主治】疼痛肿毒。

59012 赵娆方

【方源】《千金》卷二十二。

【组成】姜石二十五两　牡蛎十两　枸杞根皮四两　茯苓三两

【用法】上药各为末，合和。先取新枸杞根(合皮切)六升，水一斗半，煎取五升，去滓；纳狗屎二升，搅令调，澄取清，和前药熟捣，捻作饼子，阴干。病者以两刃针，当头直刺疮，痛彻拔出针，刮取药末塞疮孔中，拔针出即纳药，勿令歇气，并遍封疮，头上即胀起，针挑根出，重者半日以上即出；或已消烂，桃根不出亦自愈，勿忧之。其病在内者，外当有肿相应，并皆恶寒发热；疑有疮者，以水半盏，刮取药，如梧桐子大五枚，和服之，日夜三度服，即自消也。若须根出，服药经一日，以鸡羽剔吐，即随吐根出，若不出根，亦自消烂。在外者亦日夜三次敷药，根出后常敷勿住，即生肉易愈。若犯诸忌而发动者，取枸杞根(合皮骨切)三升，以水五升，煎取二升，去滓，研药末一钱匕，和枸杞汁一盏服之，一日二三服，并单饮枸杞汁二盏弥佳。又以枸杞汁搅白狗屎，取汁服之更良。合讫即用，不必待干。所言白狗屎，是狗食骨，其屎色如石灰，直言狗白屎也。如预造，取五月五日、七月七日、九月九日、腊月腊日造者尤良。或有人忽患喉中痛，乍寒乍热者，即是其病，当急以此药疗之。无故而痛，恶寒发热者，亦是此病，但依前服之立愈。

【主治】疔肿，痈疽。

59013 赵泉黄膏

【方源】《肘后方》卷二。

【组成】大黄　附子　细辛　干姜　椒　桂各一两　巴豆八十枚(去心皮，捣细，苦酒渍之，宿腊月)　猪膏二斤

【用法】煎三上三下，绞去滓，密器贮之。初觉勃色便热，如梧桐子大一丸，不愈又服。亦可火炙以摩身体数百遍。

【主治】瘴气疫疠温毒，贼风走游皮肤。

59014 赵候须散

【方源】《卫济宝书》卷下。

【组成】赵候须(即败酱草，干者)四两　苦辣回根七寸　甘草节三寸　乳香一钱　穿山荷根(即蒲桃藤根)七寸

【用法】上药生为粗末，干者为细末，共为一剂，分三服。每服用好酒三升半，煎至七分，去滓服。敷用酒调。

【主治】痈疽。

59015 赵府小灵丹

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】乳香　没药　轻粉　血竭　朱砂　川乌尖　草乌尖　巴豆霜　细辛　蟾酥各等分　麝香减半

【用法】上为末，糯糊为丸，如黄米大，雄黄为衣。每服十五丸，小儿五七丸，用葱白三根劈开，入丸在内，细嚼，好酒下。被盖汗出。

【主治】一切恶毒疔疮，无名肿毒及四时伤风、伤寒，憎寒壮热，无汗初觉者。

59016 赵氏加味六子丸

【方源】《准绳·女科》卷四。

【组成】菟丝子(淘洗，酒蒸)　川牛膝(去芦，酒蒸)　麦门冬(去心，酒蒸)　山茱萸(取肉)　原蚕蛾　五味子各一两三钱　蛇床子(酒蒸)一两六钱　车前子(淘洗)一两七钱　大甘草(炙)一两　沙苑蒺藜(马乳浸，蒸)　覆盆子各二两二钱　破故纸二两三钱(淘洗，炒)　肉苁蓉二两五钱(酒浸，去鳞)

【用法】上药俱焙干，锉碎为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸或四十丸，清盐汤送下，早、晚皆服。二三月后必孕成矣。

【功用】种子。

59017　赵府神应比天膏

【方源】《惠直堂方》卷四。

【异名】比天膏(《膏药方集》)。

【组成】当归　红花　生地　川芎　芍药　苏木各二两　羌活　独活　蓬术(煨)　防风　荆芥　野菊花　骨碎补(去皮毛)　牙皂　苦参　牛膝　三棱(煨)　白蔹　山甲(炙)　续断　蝉蜕　全蝎(汤泡三次)　山豆根　地龙(去泥)　甘松　三奈　槐枝　柳枝　桃枝　榆枝　夏枯草　露蜂房各一两　白果三个(去壳)　南星　半夏各一两五钱　男血余(皂角水洗)三两　胎发二十丸　白花蛇一条(去头尾)　桑白皮　连翘　金银花　川贝　山茨菇　木别仁　甘草　大黄　桃仁　杏仁　川连(去须)　首乌　五味　黄耆　合欢花　象皮　昆布(洗去盐味)　凤凰退各二两　川附子一个　黄芩　射干(洗)　黄柏　乌药　玄参　五加皮　天麻　人参　大力子　肉桂　豨莶草各四两(以上为粗药)　雄黄二两　银朱六钱　朱砂二两　花蕊石二两(为粗末,用硫黄末二两搅匀,入阳城罐内封固,炼一日取出)　石膏(煅)二两　赤石脂二两　自然铜二两(二味各入倾银罐内煅红,醋淬七次,埋土中一宿,去火气)　云母石一两　乳香三两(同龙骨研)　龙骨二两(照自然铜制)　阿魏一两(同自然铜研)　没药三两(炙,同赤石脂研)　血竭二两五钱(同石膏研)　儿茶二两(同云母石研)　安息香五钱　珍珠五钱(同安息香研)　丹珠一两(即人血,或用山羊血代)　牛黄三两(同雄黄研)　麝香四钱(同银朱六钱研)　冰片二钱(同朱砂研)　蚺蛇胆五钱(同雄黄研)　沉香一两五钱　檀香一两五钱　丁香五钱　木香一两五钱　降香五钱(以上不用火)　三七一两　苏合香二两五钱(以上为细末)　黄蜡三两　白蜡三两　苏合油四两　淘鹅油四两

【用法】真麻油十五斤,将粗药浸,春五、夏三、秋七、冬十日,入锅,文武火煎枯,绢滤去滓,又煎油至滴水成珠,下淘鹅油、黄白蜡、苏合油,再下炒过黄丹七斤,柳枝搅匀,试其软硬得所,离火,下细药,冷定,沉水中三日,取起摊用。五劳七伤,遍身筋骨疼痛,腰脚软弱,贴两膏肓穴,两肾俞穴,两三里穴;腰痛,贴命门穴;痰喘气急,咳嗽,贴两肺俞穴,华盖穴,膻中穴;小肠气疝气,贴膀胱穴;左瘫右痪,手足麻木,贴两肩井穴,两曲池穴;疟疾,男贴左臂,女贴右臂即止;男子遗精白浊,女人赤白带下,月经不调,血山崩漏,贴阴交穴,关元穴;心气痛,贴中脘穴;偏正头痛,贴风门穴;走气,贴章门穴;寒湿脚气,贴两三里穴;一切无名肿毒,痈疽发背,对口及瘰疬臁疮,杨梅风毒,跌打损伤,指断臂折,痞块癥瘕,皆贴本病患处。

【功用】接骨,化大毒。

【主治】五劳七伤,遍身筋骨疼痛,腰脚软弱,腰痛,痰喘气急,咳嗽,小肠气,疝气,左瘫右痪,手足麻木、疟疾,男子遗精白浊,女人赤白带下,月经不调,血山崩漏,心气痛,偏正头痛,走气,寒湿脚气,无名肿毒,痈疽发背,对口及瘰疬臁疮,杨梅风毒,跌打损伤,指断臂折,痞块癥瘕。

59018　赵氏苁蓉菟丝子丸

【方源】《准绳·女科》卷四。

【组成】肉苁蓉一两三钱　覆盆子　蛇床子　川芎　当归　菟丝子各一两二钱　白芍药一两　牡蛎(盐泥固济,煅)　乌贼鱼骨各八钱　五味子　防风各六钱　条芩五钱　艾叶三钱

【用法】上药俱焙干为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三四十丸,清盐汤送下,早、晚皆可服。

【功用】助阴生子。

甚

59019　甚应膏

【方源】《回生集》卷上。

【组成】广胶三两　葱　姜各半斤(捣汁留用)

【用法】另将好陈酒糟,取糟油二盏,或用米醋一碗,和陈糟,装细绢,滤取汁二盏,同胶、葱、姜汁熬成膏。布摊贴之。

【功用】止痛消肿。

【主治】寒湿脚气。

残

59020 残霞膏

【方源】《博济》卷四。

【组成】乌蛇四两　五倍子一两半　蛇皮半两(生,锉碎)　巴豆二十个(去壳)　雄黄　牙消各一两(研碎)　麝香一钱

【用法】于铫子内入油二斤半煎,闻油香,入前药熬,候药并巴豆黑焦色,漉出诸药不用,却入黄蜡一两半,慢火熬成膏,以瓷器内盛。但有风毒疮,以小纸摊贴。

【功用】生肌化毒。

【主治】风毒流注,恶疮热疼。

砒

59021 砒石膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】红砒石 3 克　水银 3 克　生明矾 15 克　硫黄 15 克　花椒 15 克　蛇床子 15 克　大风子油肉 15 克　升药底 15 克　老烟膏 9 克　樟脑 9 克

【用法】上药各为极细末,用生猪油或麻油调成油剂或膏剂。外用。

【主治】银屑病。

59022 砒枣散

【方源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】红枣三个(去核,入红砒黄豆大一粒,扎好,炭火上煅尽白烟为度,出火气,共为细末)　人中白(煅)五分　冰片五厘　芦荟三分

【用法】上为细末。擦之。

【主治】走马牙疳。

59023 砒油方

【方源】《外科证治全书》卷三。

【组成】红砒一钱(敲细如粞)

【用法】上药用麻油一两,煎至砒枯烟尽为度,去砒留油听用。凡患风之处,先以火烘皮热,以油擦之,一日三次,至愈乃止。

【主治】鹅掌风,手足掌心,燥痒起皮,坚厚枯裂。

59024 砒黄丸

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】砒黄半两　芫花一两(醋拌,炒令黄)　硇砂半两(细研)　香墨一两　釜煤半两　当归半两(锉,微炒)　干漆半两(捣碎,炒令烟出)

【用法】上为末,以醋煮黑豆一两,取汁煮面糊为丸,如梧桐子大。每服七丸,空心醋汤送下。有恶血下,愈即住服

【主治】产后血瘕,结块攻刺,心腹疼痛。

59025 砒黄丸

【方源】《圣济总录》卷九十九。

【组成】砒黄(细研)一两

【用法】上药用水浸炊饼心为丸,如小豆大。每服二丸,空心、食前用煮肉汤送下。

【主治】诸虫痛。

59026 砒霜丸

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】砒霜半钱　干地龙三钱　巴豆六枚(去壳)

【用法】上为末,以猪胆汁为丸,如麻豆大。绵裹一丸,于病处咬之。有涎即吐。

【主治】牙疼。

59027 砒霜丸

【方源】方出《圣惠》卷五十二,名见《普济方》卷二〇〇。

【组成】砒霜(生,研)一两　天灵盖一两(生用,为末)　猢狲头骨一枚(烧灰)　朱砂半两(细研)　东南桃柳枝各七茎(长三寸)

【用法】上为末,取粽子角为丸,如梧桐子大,男左女右手把一丸,预先嗅之。一丸可医五七人。

【主治】疟。往来寒热,发歇无时。

59028　砒霜丸

【方源】方出《圣惠》卷五十二，名见《普济方》卷一九八。

【组成】砒霜一两　阿魏一分　雄黄三分　朱砂一分(细研)

【用法】上药于端午日用糯米饭为丸，如绿豆大。去发一时辰，绵裹三丸，男左女右塞耳中。如恶发，茶清送下三丸。当吐。

【主治】疟。发作无时，不定寒热。

59029　砒霜丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】砒霜半两　硇砂一分　腻粉半两　巴豆三七枚(去皮心，麸炒出油)　斑蝥二七枚(糯米拌，炒令黄，去翅足)　芫花一分(醋拌，炒令干，别杵为末)狗胆一枚

【用法】上为末，以醋一大盏，熬芫花、狗胆为膏，为丸如黄米大。每服五丸，空心以温当归酒送下。

【主治】妇人月水不通，结为癥块，腹内疞痛，面色萎黄。

59030　砒霜丸

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】砒霜一分(醋熬五遍，细研)　朱砂一分(细研)　巴豆七枚(去皮心，研，纸裹压去油)　母丁香四枚　相思子七枚　阿魏半钱(面裹煨，面熟为度)　恒山一钱

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如黍米大。每于未发前服二丸，以冷水送下。每一岁加一丸。

【主治】小儿疟，累发不定。

59031　砒霜丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】砒霜一分(细研)　白矾灰半两　干蟾(烧灰)半两　夜明砂半两(微炒)　黄丹半两(微炒)　朱砂一分(细研)

【用法】上为末，以软饭为丸，如绿豆大。每服三丸，以冷水送下。服药后，以桃、柳汤洗，衣服裹之，虫子当出。白黄即易愈，黑者难愈。

【主治】小儿疳痢。

【宜忌】忌食热物。

59032　砒霜丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】砒霜一分　雄黄一分　朱砂一分　麝香一分　干蟾灰一分

【用法】上为末，汤浸蒸饼为丸，如粟米大。每服一丸，以冷粥饮送下，一日二次。

【主治】小儿久疳痢不愈。

【宜忌】忌热物。

59033　砒霜丸

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】砒霜半两　雄黄　丹砂(三味一处同研)　玳瑁(镑)　藜芦(炒)　椿叶(阴干者)各一两　阿魏一两半(别研)

【用法】上为末，和匀，用安息香一两，酒浸，重汤煮为糊，为丸如赤小豆大。每用三丸，男左女右，以绯绢袋盛，系于臂或衣带上。如疟不已，即用醋汤面东咽下三丸；如要吐，空心浆水下五丸。如吐甚，以冷水调绿豆末一二钱匕，服即止。

【主治】山岚瘴疟，或入山早吸毒气，令人寒热如疟，终日不已，头痛痰逆，呕吐不下食，日渐羸瘦。

【宜忌】忌热物。

59034　砒霜丸

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】砒霜一分　淀花二两　铁砧上末四两(淘净)

【用法】上为细末，用麝香少许，金银箔四十片，以糯米粽子为丸，如鸡头大。每服一丸，用酒磨下。或吐或泻为愈。

【功用】解邪毒。

【主治】岚瘴寒疟。

59035　砒霜丸

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】砒霜(研)一钱　凝水石(烧)　附子(炮裂，去皮脐)各一分　定粉(炒)半两

【用法】上为末，用粟米饮为丸，如麻子大。每服三丸五丸，米饮送下。

【主治】小儿五疳下痢。

59036 **砒霜丸**

【方源】《普济方》卷一九七。

【组成】砒霜一分（细研） 桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁） 豉半两（炒干）

【用法】上为末，入砒霜，以软饭为丸，如梧桐子大。每服三丸，临发前以冷生姜汤送下。

【主治】一切疟疾。

【宜忌】忌食热物。

59037 **砒霜顶**

【方源】《串雅内编》卷三。

【组成】精猪肉三十两（切作骰子块） 白信一两（研细末）

【用法】将白信末拌在肉上，令匀，用纸筋黄泥包之，令干。白炭火于无人处煅，俟青烟出尽，研细，以汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服大人二十粒，小儿四五粒，食前茶汤送下，量虚实服之。

【主治】哮。

【宜忌】药宜制三年后方可用。

59038 **砒霜线**

【方源】《外科十三方考》引《红蓼山馆经效方》。

【组成】黄芩三钱 黄连五钱 黄柏三钱 红花三钱 银花三钱 连翘三钱 肉桂一钱半 广皮三钱 川芎二钱 薄荷二钱 法夏三钱 白芷三钱 木香三钱 龟版三钱 甘草一钱 藤黄三钱 香墨一两

【用法】上药共煎浓汁，将生丝线投入片时，取出阴干，再研白砒、藤黄入浓汁，将线浸透，再阴干，再浸透，末后投入预研之好香墨汁中浸透，阴干即成。

【主治】痔瘘。

59039 **砒霜散**

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】砒霜一钱 麝香 川升麻末 诃黎勒皮末 干虾蟆灰各半钱

【用法】上为细末。以皂荚五挺，水浸，掐取汁，熬成膏，调散子，涂于纸上，剪作片子，贴之。吐下恶涎。

【主治】牙齿风疳，骨槽风及口气。

59040 **砒霜散**

【方源】方出《圣惠》卷三十四，名见《普济方》卷六十七。

【组成】干胆一枚（烧灰） 胡桃十枚（烧灰） 砒霜一分 荞麦面三合（烧灰）

【用法】上为细末。每用一字，于患处掺。

【主治】牙齿风疳，脓血出，根有虫。

59041 **砒霜散**

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】砒霜一分 硫黄三分 密陀僧三分 腻粉二分

【用法】上为细末。癣干，即以生油调涂；若癣湿，即用药末掺之。

【主治】癣。不问干湿，积年不愈。

59042 **砒霜膏**

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】砒霜一分（细研） 附子一分（末） 苦参一分（末） 硫黄一分（细研） 黄蜡一分

【用法】用麻油二两煎，油熟下蜡，次下药末，和令匀成膏。每用先以蒴藋、柳枝煎汤洗疮，拭干涂之，一日二次。

【主治】久恶疮。

59043 **砒黄熏方**

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】砒黄（研） 雄黄（研） 石硫黄（研）各半两 熟艾五两

【用法】上为细末，将药铺在纸上令匀，紧卷如饼饺样，用面糊粘却，切为四段，患人早食，及大小便了，当仰卧，安药于四口瓦内，两腋下两腿下，以火烧烟出，先用旧布单盖上，以厚衣复，不令通风，候汗出，至晚药烟尽，即去药瓦，以愈为度。

【主治】诸疥。

59044 **砒黄敷方**

【方源】《普济方》卷二九七。

【组成】砒黄（研） 蛴虫（阴干，为末）各半两

【用法】上为末。敷疮口中，以帛裹定，一日二次。

【主治】下部漏疮。

59045 **砒砂雄黄散**

【方源】《青囊全集》卷下。

【组成】白砒(炼成霜) 朱砂 明雄黄 生白矾 鲜蟾酥各五分 上梅片二分 白公丁(麻雀屎竖起者，用二粒) 巴豆仁三粒 硇砂(盐硇不可用)

【用法】上为细末，用黄蜡成条，收存听用。无论诸疔，用铍针刺开疔头，用此药条纳入疔内，用膏药盖之，一日一换。

【功用】拔除疔根。

【主治】疔疮。

砂

59046 **砂贝散**

【方源】《经验广集》卷二。

【组成】朱砂 贝母各三钱

【用法】酒服，一日二次。

【主治】痫。

59047 **砂仁汤**

【方源】《赤水玄珠》卷十五。

【组成】砂仁 黄连 木贼各等分

【用法】上为末。每服二钱，米饮送下。

【主治】大肠虚，脱肛，挟热红肿者。

59048 **砂仁散**

【方源】《普济方》卷三九四。

【组成】砂仁一分 白豆蔻 橘红一钱 木香一分(炮) 神曲一分(炒) 麦蘖一钱(炒) 甘草一钱(炙)

【用法】上为末。每服半钱，紫苏汤泡饭饮调下。

【主治】小儿乳哺过饱，呕吐。

59049 **砂仁散**

【方源】《仙拈集》卷一。

【异名】萝卜砂仁散(《医学从众录》卷六)。

【组成】砂仁一两

【用法】捣萝卜子滤汁，浸一夜，炒干，浸晒七次，为末。每服一钱，米饮下。

【主治】气鼓。

59050 **砂仁粥**

【方源】《老老恒言》卷五。

【组成】粳米 砂仁(炒，为末)

【用法】先以粳米煮粥，待粥成后，调入砂仁细末服。

【功用】醒脾胃，通滞气，散寒饮，温肝肾。

【主治】①《老老恒言》：呕吐，腹中虚痛，上气咳逆，胀痞。②《长寿药粥谱》：脾胃虚寒性腹痛泻痢，消化不良，脘腹肿满，食欲不振，气逆呕吐。

【备考】《长寿药粥谱》本方用粳米二两，砂仁末一至二钱，煮粥成，调入砂仁末，早、晚温食。

59051 **砂草油**

【方源】《瑞竹堂方》卷五。

【组成】硇砂四两 甘草四两

【用法】用真香油一斤，于瓷瓶内浸药。遇患，急令患人服油一小盏。浸久尤佳。

【主治】入食毒物，及患一切恶疮。

59052 **砂香饮**

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】砂仁 木香 桑寄生各二钱 香附 白芍 当归 槟榔各八分

【用法】水煎服。

【主治】妊娠七八个月，心腹疼痛异常者。

59053 **砂香散**

【方源】《胎产指南》卷七。

【组成】人参 木香 砂仁 黄耆 山药 柏子仁 茯神 远志 枣仁

【用法】上为细末，蜜调服。

【主治】产后身热感风，痰结胸膈，心经蓄热，遍身麻痹，手足牵搐，口㖞痰盛，言语无伦。

59054 **砂雪丸**

【方源】方出《外科全生集》卷二，名见《仙拈集》卷三。

【异名】仙传砂雪丸(《沈氏经验方》卷下)。

【组成】辰砂 轻粉各一钱 僵蚕七条 全蝎三个

【用法】上为细末,用青蒿节内虫,捣和为丸,如绿豆大。每服一丸,研细,人乳调服。

【主治】急慢惊风。

59055 砂淋丸

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】黄色生鸡内金一两 生黄耆八钱 知母八钱 生杭芍六钱 硼砂六钱 朴消五钱 消石五钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三钱,食前开水送服,一日二次。

【主治】砂淋,亦名石淋。

【方论选录】鸡内金为鸡之脾胃,原能消化砂石;硼砂可为金银铜焊药,其性原能柔五金,治骨鲠,故亦善消硬物;朴消《本经》谓能化七十二种石,消石《本经》不载,而《别录》载之,亦谓其能化七十二种石,想此二味,性味相近,古原不分,即包括于朴消条中,至陶隐居始别之,而化石之能则同。然诸药皆取消破之品,恐于元气有伤,故加黄耆以补气分,气分壮旺,益能运化药力。犹恐黄耆性热,与淋证不宜,故又加知母、芍药以解热滋阴,而芍药之性,又善引诸药之力以至膀胱也。

59056 砂雄丸

【方源】《盘珠集》卷下。

【组成】朱砂一钱 雄黄一钱 白茯苓三两

【用法】上为末,水为丸。姜汤送下。

【主治】崩下如牛膜,昏迷倒地,乃受惊而然。

59057 砂锅丸

【方源】《全国中药成药处方集》(西安方)。

【组成】野党参四两 全当归四两 川芎二两 核桃仁二两 大枣四两(去核) 皂矾四两 苦杏仁四两 桃仁二两 红花四两

【用法】取砂锅一个,黄酒二斤,同药入锅内熬干,连砂锅底研为细末,细罗筛过,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服一钱,白开水送下,每日一次。服药后有欲呕情形时,即将药量酌为减少。

【主治】妇女青春期萎黄病,肚腹积聚,月水不调,消化不良,带下腹痛,精神萎靡。

【宜忌】忌饮茶。

59058 砂糖丸

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】矿石灰(未化者)

【用法】上为细末,砂糖为丸,如黄米大,塞入蛀孔。

【主治】牙痛,蛀牙。

59059 砂糖丸

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷四。

【组成】砂糖一两

【用法】作屑,入缩砂末一钱,炼蜜为丸,每两作三十丸。细嚼咽下,加五味子肉末半钱尤好。

【功用】调理脾胃。

59060 砂糖丸

【方源】《回春》卷七。

【组成】腻粉一钱

【用法】上药和砂糖为丸,如麻子大。米饮送下。泻出其土立愈。

【主治】小儿爱吃泥土。

59061 砂糖丸

【方源】《疡科选粹》卷七。

【组成】砂糖 白炭灰 紫苏叶 滑石各等分

【用法】上为末,为丸如芡实大。含口中,以唾津咽下。骨即下。

【主治】鱼骨鲠。

59062 砂糖方

【方源】《准绳·疡医》卷四。

【组成】琥珀糖(即砂糖熬成小毬儿者,烧存性)

【用法】上药入轻粉、麝香、麻油,敷。指甲嵌入肉者,不过一二日自烂。

【主治】嵌甲。

59063 砂糖水

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】小青叶(洗净泥)

【用法】上药入砂糖擂汁，急灌之。如无青叶，井花水调砂糖灌之。

【主治】中暑发昏。

59064 砂糖散

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】砂糖　面各五钱

【用法】上药同炒熟，加槟榔末一两，无时吞吃。

【主治】诸般疳。

59065 砂仁葱汤

《大生要旨》卷二。为《医方考》卷六“砂仁葱白汤”之异名。见该条。

59066 砂仁熟水

【方源】《遵生八笺》卷十一。

【组成】砂仁三五颗　甘草一二钱

【用法】碾碎入壶中，加滚汤泡服。

【功用】消壅隔，去胸膈郁滞。

59067 砂仁益黄散

【方源】《医方考》卷六。

【组成】陈皮　青皮各二钱　诃子一钱　丁香　木香　砂仁各五分

【主治】①《医方考》：食伤胃寒，呕吐而泻者。②《治痘全书》：痘疮。

【方论选录】仲景云，邪在中焦，则既吐而泻。故用陈皮、青皮理其脾，丁香、木香温其胃，诃子所以止泻，砂仁所以消食。

59068 砂仁葱白汤

【方源】《医方考》卷六。

【异名】砂仁葱汤(《大生要旨》卷二)。

【组成】砂仁一钱(捶碎)　葱白十枚

【用法】水煎服。

【主治】妊娠腹痛。

【方论选录】痛者，气血滞涩不通使然。故用砂仁顺气于下，葱白顺气于中，气行血利，而痛自止。

59069 砂枳二陈汤

【方源】《医方集解》。

【组成】二陈汤加砂仁　枳壳

【功用】行痰利气。

【主治】①《医方集解》：嘈杂。②《类证治裁》：痰痞，中脘痰气不利。

牵

59070 牵马丸

【方源】《外台》卷三引《古今录验》。

【组成】附子一枚(炮)　藜芦一两(炙)　桂心一两　巴豆一两(去心皮，熬)

【用法】上捣筛，研巴豆如膏，和散，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二丸，空腹服。热在膈上不下，饮半升热饮，吐之后下，下部疮自愈。

【主治】天行病四五日，下部生疮，医所不能疗者。

【宜忌】忌野猪肉、生葱、狸肉、芦笋。

59071 牵牛丸

【方源】《医心方》卷十引《小品方》。

【异名】牵牛子丸(原书卷八引《经心录》)。

【组成】大黄二两　朴消三两(炼)　牵牛子七两(熬)　桃仁二两(去心，熬)　干姜二两半　人参二两　橘皮一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸。以微利为度，肿愈即止，不必尽剂。

【主治】脚肿满，步行不能，众恶毒水肿。

【宜忌】忌冷水、猪肉。

59072 牵牛丸

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】牵牛子二两(一半生，一半炒)　半夏(汤洗七遍，炒干)　木通(锉)各一两　桑根白皮(锉)三分　青橘皮(去白，锉，炒)半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心生姜汤送下，临卧再服。

【主治】伤寒后风气壅滞，胸膈聚痰，大便不通。

59073 牵牛丸

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】白牵牛(末)二钱　粉霜一钱　腻粉三钱　硇砂(研)一钱半　黄鹰屎(末)一钱

白丁香(为末)一钱 延胡索大者七枚(为末) 石燕子(捣研)一枚 白滑石(末)一钱 没药(研)一钱 白面五钱

【用法】上为细末,拌和匀,滴水和作饼子,先于火上炙干,次入灰火煨熟为度,放冷细研,更入硫黄一钱,同研匀,滴水和为丸,如绿豆大。看儿大小,每服三丸至五丸,临睡煎柳枝、干柿汤送下。

【主治】小儿奶癖,腹胁紧硬,时作寒热。

59074 **牵牛丸**

【方源】《幼幼新书》卷十六引丁时发方。

【组成】牵牛(末)半两 螺青 白矾(飞)各一分 硼砂一钱 巴豆(灯上烧) 杏仁各七粒

【用法】上为末,糊为丸,如绿豆大。每服七丸,淡姜汤送下。

【功用】定喘。

【主治】痰鸣,咳嗽气粗,不食,涎潮。

59075 **牵牛丸**

【方源】《宣明论》卷八。

【组成】黑牵牛 黄芩 大黄 大椒 滑石各等分

【用法】上为细末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服五丸至七丸,食后生姜汤送下。

【主治】一切湿热肿满。

59076 **牵牛丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】延胡索二两 破故纸(炒)二两 黑牵牛子三两(炒)

【用法】上为细末,煨大蒜研,为丸如梧桐子大。每服三十丸,食前煎葱须盐汤送下。

【主治】冷气流注,腰疼不能俯仰。

59077 **牵牛丸**

《妇人良方》卷八。为《圣惠》卷七十二"牵牛子丸"之异名。见该条。

59078 **牵牛丸**

【方源】《养老奉亲》

【组成】牵牛一两(饭甑蒸过) 木通一两 青橘皮一两(去瓤) 桑白皮一两 木香半两 赤芍药一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸至二十丸,男人酒送下,妇人血气,醋汤送下。

【功用】搜风顺气。

【主治】老人有热,壅滞不快,大肠时秘结,诸热毒生疮。

59079 **牵牛丸**

【方源】《永类钤方》卷二十一。

【组成】黑牵牛 白牵牛(各半生半炒,取末) 青皮 陈皮各等分

【用法】上为末,糊为丸。三岁每服三十丸,米汤送下。小肿常服自消。

【主治】疳气,头面浮,四肢肿。

59080 **牵牛丸**

【方源】《得效》卷九。

【组成】黑牵牛三钱 大黄二钱 白矾二钱

【用法】上用巴豆(去皮)三十粒,先人铫,炒焦干,去巴豆,入众药,炒香为末,煨大蒜研细为丸,茴香汤送下。

【主治】膀胱有热,服暖药,致成壅滞作痛。

【备考】《普济方》本方用法:每服七丸。

59081 **牵牛丸**

【方源】《得效》卷十九。

【组成】荆芥穗 僵蚕各五钱 斑蝥二十八个(去头翅足,用糯米炒) 黑牵牛五钱

【用法】上为末,皂角末熬膏为丸,如绿豆大。临睡时先用米饮调滑石末一钱服,半夜时再一服,五更初却用温酒吞二十丸。服讫,如小便无恶物行,次日再进一服,又不行,第三日五更初先进白糯米稀粥汤,却再进前药一服,更以灯心汤调琥珀末一钱服之,以小便内利去恶毒,是其应也。

【主治】瘰疬。

59082 **牵牛丸**

【方源】《普济方》卷二九七。

【组成】黑牵牛(生熟各半) 猪牙皂角(去皮) 何首乌 香附子 草乌头(切破,冷水

浸,秋、冬七日,夏三日)各等分

【用法】上为末,醋打面糊为丸,如梧桐子大。令患人勿食晚饭,次日五更饱食熟猪肉一顿,少时以酒送下五七丸。药行息时用冷水饭频频压之。后用熟热乌头,于疮上时时换灸之。

【主治】肠风痔漏。

【宜忌】忌热物。

59083 **牵牛丸**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】木香　白茯苓　厚朴各一两　大黄　泽泻各一两半　滑石　黑牵牛各六两

【用法】上为细末,水煮稀糊为丸,如梧桐子大。每服三五十丸,淡姜汤送下。

【主治】肚实热,二便不通。

59084 **牵牛丸**

【方源】《杂病源流犀烛》卷四。

【组成】牵牛　大黄　槟榔　雄黄

【主治】虫聚,噎塞,反胃。

59085 **牵牛汤**

【方源】《袖珍》卷三引《圣惠》。

【组成】牵牛头末一两　厚朴五钱(姜汁制)

【用法】上药每服二钱,姜、枣汤下。水丸亦可,姜、枣汤送下亦得。

【主治】腹中有湿热气,足胫微肿,中满气急,咳嗽喘息,小便不利。

59086 **牵牛汤**

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【异名】牵牛五灵煮散(原书卷八十)。

【组成】牵牛子　槟榔(煨,锉)　木香　赤茯苓(去黑皮)　陈橘皮(去白,焙)各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕,水一盏,煎三二沸,去滓温服。

【主治】水肿,肺气、脚气、奔豚气上筑心胸不可忍。

【备考】本方方名,《方剂辞典》引作"牵牛子汤"。

59087 **牵牛汤**

【方源】《得效》卷九。

【组成】巴豆　甘遂各三钱　槟榔　大戟　当归各五钱　青皮　黑牵牛(取头末)各一两

【用法】上为末。用一大钱葶苈子煎汤调下,五更初吃。

【功用】下水。

59088 **牵牛汤**

【方源】《医方类聚》卷一二九引《御医撮要》。

【组成】牵牛子(微炒)一两半　白槟榔(微煨)一两半

【用法】上为细散。每服三钱,用水一盏半,煎至七分,温服,一日二次。

【主治】水气肿满。

【宜忌】忌牛、羊、猪肉,湿面,酱。

59089 **牵牛串**

【方源】方出《本草纲目》卷十八引《经验方》,名见《串雅内编》卷三。

【组成】黑牵牛一斤(生)

【用法】上药为末八两,余滓以新瓦炒香,再捣取四两,炼蜜为丸,和梧桐子大。至重者,每服三五十丸,陈橘皮、生姜煎汤,临卧服。半夜未动,再服三十丸,当下积聚之物。寻常行气,每服十丸。

【主治】五积成聚。

【宜忌】《串雅内编》:虚者慎用。

59090 **牵牛酒**

《本草纲目》卷四十八引《积善堂经验方》。为《素问》卷十一"鸡矢醴"之异名。见该条。

59091 **牵牛酒**

《医学入门》卷八。为《直指》卷二十二"猪肾酒"之异名。见该条。

59092 **牵牛散**

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】牵牛子二两(微炒)　甜葶苈一两(隔纸炒令紫色)　桑根白皮二两(锉)　槟榔一两　郁李仁二两(汤浸,去皮,微炒)　汉防己一两　猪苓一两(去黑皮)　木通一两(锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,空腹温服。如人行十里,当利三二行,如未利即再服。

【主治】水气遍身浮肿,气息喘急,小便赤涩。

59093 牵牛散

【方源】方出《圣惠》卷五十四,名见《普济方》卷一九三。

【组成】牵牛子二两(微炒)

【用法】上为末,以乌牛尿一升,浸一宿,平旦人葱白一握,煎十余沸,分二服,去滓空腹服。水从小便利下大效。

【主治】水气,遍身浮肿,气促,坐卧不得。

59094 牵牛散

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】牵牛子四两(微炒) 陈橘皮半两(汤浸,去白瓤,焙) 白术半两 木香一两 桑根白皮半两(锉) 木通半两(锉) 肉桂半两(去皴皮)

【用法】上为细散。每服二钱,五更初以生姜茶调下。至平明,更吃生姜茶粥,投转三二行自定。临时相度虚实增减服。

【主治】气水。身体浮肿,腹胁妨闷,大小便涩,上气喘息。

59095 牵牛散

【方源】《伤寒总病论》卷六。

【组成】大黄 郁金 青橘皮各一两 甘草三分 牵牛子(取末)二两

【用法】上为细末。每服二钱,生姜汤调下,不拘时候。利为度。

【主治】妊娠伤寒,腹胀,大便不通,喘急。

59096 牵牛散

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】牵牛子(半生半炒) 槟榔(生,锉)各半两

【用法】上为散。每服三钱匕,生姜汤调下。未利,良久以热茶投,疏利为度。

【主治】大便涩秘。

59097 牵牛散

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】牵牛子(炒半生半熟)二两 杏仁(去皮尖双仁,炒) 甘草(炙) 吴茱萸(汤洗,焙干,炒) 陈橘皮(去白,焙)各一分

【用法】上为细散。每服半钱匕,空腹以沸汤调下。微利出恶物即愈。

【主治】小儿咽喉中鸣,咳嗽痰壅。

59098 牵牛散

【方源】《朱氏集验方》卷三。

【组成】黑牵牛不拘多少(烧热,瓦上匀铺,不可拨动,盖欲半生半熟)

【用法】上为末。酒调服。加茴香尤好。

【主治】腰痛。

59099 牵牛散

【方源】《永类钤方》卷二十一。

【组成】牵牛(生,为末)

【用法】三岁每服一钱,空心青皮汤下;结胸伤寒,白糖调下;耳聋阴肿,用猪腰子半个,薄批,糁药一大钱,重令遍,仍以少盐擦之,湿纸煨熟,空心服。风疹遍身,薄荷蜜汤下,大便利立效;阴疝核肿,糊为丸,如小豆大。每服三十丸,茴香汤送下。

【主治】小儿膀胱实热,腹胀,小便赤涩,水气流肿,结胸伤寒,心腹硬痛,疳气攻肾耳聋,风疹,阴疝核肿。

59100 牵牛散

【方源】《回春》卷七。

【组成】黑牵牛(半生半炒)

【用法】取头细末。每服一二匙,桑白皮煎汤,磨木香汁调服。

【主治】小儿诸般肿胀。

59101 牵牛散

【方源】《证治汇补》卷三。

【组成】黑牵牛 白牵牛各一两(半生半炒) 大豆一合 白术五钱 甘遂二钱五分

【用法】上为末。每服三钱,米饮调下。以利为度。

【主治】脾湿太过,遍身浮肿,喘不得卧,腹胀如鼓,大便不溏,小便涩滞。

59102　牵牛散

【方源】《卫生鸿宝》卷一。

【组成】木通　滑石各一两　黑丑五钱

【用法】上为末。每服二钱，食前灯心、葱白汤下。

【主治】小便出血，痛不可忍。

59103　牵牛粥

《圣济总录》卷一九〇。为《圣惠》卷九十六“牵牛子粥”之异名。见该条。

59104　牵正丸

《慈禧光绪医方选议》。即《杨氏家藏方》卷一“牵正散”改为丸剂。见该条。

59105　牵正汤

【方源】《证治宝鉴》卷一。

【组成】白附　羌　防　芥　麻黄　薄　蝎　星　芩　翘　连　桔　草　乌　芍　术　归　芎

【主治】中风，口眼㖞斜。

59106　牵正散

【方源】《杨氏家藏方》卷一。

【异名】祛风散（《鲁府禁方》卷一）、三神散（《仙拈集》卷一）。

【组成】白附子　白僵蚕　全蝎（去毒）各等分，并生用）

【用法】上为细末。每服一钱，热酒调下，不拘时候。

【主治】中风，口眼㖞斜，半身不遂。

【方论选录】①《医方考》：艽、防之属，可以驱外来之风，而内生之风，非其治也；星、夏之辈，足以治湿土之痰，而虚风之痰，非其治也。斯三物者，疗内生之风，治虚热之痰，得酒引之，能入经而正口眼。白附之辛，可使驱风；蚕、蝎之咸，可使软痰；辛中有热，可使从风；蚕、蝎有毒，可使破结。医之用药，有用其热以攻热，用其毒以攻毒者，《大易》所谓同气相求，《内经》所谓衰之以属也。②《成方便读》：全蝎色青善走者，独入肝经，风气通于肝，为搜风之主药；白附之辛散，能治头面之风；僵蚕之清虚，能解络中之风；三者皆治风之专药，用酒调服，以行其经。

【备考】本方改为丸剂，名“牵正丸”（见《慈禧光绪医方选议》）。

59107　牵正散

【方源】《全国中药成药处方集》（吉林方）。

【组成】白附子（制）四钱　天麻四钱　全蝎二钱七分　僵蚕（麸炒）二钱七分

【用法】上为细末。每服一钱五分，温开水送下，小儿酌减。

【功用】疏风镇惊。

【主治】中风初起，口眼㖞斜，半身麻木，惊痫抽掣。

【宜忌】孕妇忌服。

59108　牵正膏

《何氏济生论》卷一。为《医方考》卷一“改容膏”之异名。见该条。

59109　牵白饮

【方源】方出《本草纲目》卷十八引《郑氏家传方》，名见《治疫全书》卷五。

【组成】牵牛（头末）一钱

【用法】白糖化汤调下。

【主治】①《本草纲目》引《郑氏家传方》：伤寒结胸，心腹硬痛。②《治疫全书》：瘟疫心腹硬痛。

59110　牵牛子丸

《医心方》卷八引《经心录》。为原书卷十引《小品方》“牵牛丸”之异名。见该条。

59111　牵牛子丸

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】牵牛子一分（生用）　马牙消一两（炼令汁尽）　鸡膍胵半两（生用，阴干）　甜葶苈半两（隔纸炒令黄色）　杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】肺脏气实，胸膈壅滞，大肠不利。

59112　牵牛子丸

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】牵牛子八两（四两生四两微炒，捣

罗为末）四两 木通一两（锉） 青橘皮半两（汤浸，去白瓤） 桑根白皮三分（锉）

【用法】上为末，入牵牛子末，研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温水送下，不拘时候。以得通为度。

【主治】热病后，风气壅滞，胸膈聚痰，大便不通。

59113 牵牛子丸

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】牵牛子一两半（微炒） 甘遂一两（锉碎，微炒） 诃黎勒皮三分 木香三分 京三棱三分（锉碎，醋拌，炒令干） 青橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为末，以生姜汁二两，蜜四两，煎令稠熟为丸，如梧桐子大。每服三十丸，卧时生姜汤送下。以利为度。

【功用】《普济方》：消除痞气。

【主治】①《圣惠》：痞气结聚在胃管，心腹胀硬，脏腑壅滞。②《普济方》：脾积痞气，大便不通，身肿少力，肢节疼痛。

59114 牵牛子丸

【方源】《圣惠》卷五十四。

【组成】牵牛子三分（微炒） 汉防己一分 椒目一分（微炒） 滑石半两 瞿麦半两 槟榔半两 甘遂一分（煨令微黄） 泽漆一分（微炒） 桑根白皮半两（锉） 甜葶苈半两（隔纸炒令紫色） 郁李仁二分（汤浸，去皮，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空腹以木通、灯心汤送下。以利为度。未得快利，即再服之。

【主治】十种水气，遍身浮肿，大小便涩，喘促不止。

【备考】方中泽漆，《普济方》作"泽泻"。

59115 牵牛子丸

【方源】方出《圣惠》卷五十四，名见《普济方》卷一九二。

【组成】牵牛子一两 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 京三棱一两（炮，锉） 诃黎勒皮一两 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 川大黄二两（锉碎，微炒） 鳖甲二两（涂醋炙令黄，去裙襕） 甘遂一两（煨令微黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前以生姜、橘皮汤送下。以利为度。

【主治】石水。腹胀坐卧不得，小便涩少。

59116 牵牛子丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】牵牛子二两（微炒） 川朴消一两 大麻仁一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 甘遂半两（煨令黄） 木香一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以生姜汤送下。如人行十里当通，如未通，即再服。强羸人加减服之。

【主治】大便卒不通，心神烦闷，坐卧不安。

59117 牵牛子丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【异名】牵牛丸（《妇人良方》卷八）。

【组成】牵牛子四两（生用） 青橘皮二两（汤浸，去白瓤，焙） 木香一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以温水送下。

【主治】妇人大便不通，心腹虚胀。

59118 牵牛子丸

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】牵牛子一两（捣碎，微炒） 大麻仁一分 当归一两（锉，微炒） 川大黄一两（锉碎，微炒） 木通一两（锉） 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，粥饮送下，不拘时候。以利为度。

【主治】产后大小便秘涩，腹胀疼痛。

59119 牵牛子丸

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】牵牛子（微炒） 川大黄（锉，微炒） 川升麻 郁李仁（汤浸，去皮，微炒，研入） 川朴消各半两 滑石一两（细研） 海蛤一两（细研）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服

七丸，温水送下，一日三四次。

【主治】小儿诸淋涩，脐下连膀胱妨闷，大肠气壅。

59120 **牵牛子丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】牵牛子一斤(一半生用，一半微炒)　桂心一两　枳壳一两(麸炒微黄，去瓤)　芎䓖一两　郁李仁二两(汤浸，去皮，微炒)　木香一两　青橘皮一两(汤浸，去白瓤，焙)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温酒送下。

【功用】搜风化气。

【主治】①《圣惠》：脏腑壅滞。②《普济方》：心腹气闷，宿食不消，腰胁疼痛，大肠秘涩。

59121 **牵牛子丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】牵牛子十两(捣为末)六两　木香半两　槟榔半两　青橘皮半两(汤浸，去白瓤，焙)

【用法】上药木香以下为末，与牵牛子末搅和令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温酒送下。

【主治】脏腑壅滞，心腹气闷，宿食不消，腰胁疼痛，大肠秘涩。

59122 **牵牛子丸**

【方源】《普济方》卷一〇三引《博济》。

【异名】大通丸。

【组成】牵牛子不拘多少(净洗，饭上炊气才透，便出摊令微冷，捣为末)　青橘皮(去白，焙)　木通(锉)　陈橘皮(去白，焙)　桑根白皮(锉)　芍药(焙)各一两　瓜蒌根(洗，焙)二两

【用法】上六味为末，每牵牛子一斤，入余药末四两，拌和令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，随其汤使，瘰疬，茶汤送下；产前安胎补损，芎酒送下；产后血竭肚痛，苏木酒送下；妇人血气，芍药酒送下；血风瘙痒，枳壳酒送下；五淋，榆白皮酒送下；瘫痪风，豆淋酒送下；肠风泻血，萎蕤酒送下；肺气，诃黎勒酒送下；伤寒，葱白酒送下；风秘，葱姜茶送下。

【功用】疏风顺气。

【主治】①《普济方》引《博济》：风热气秘，瘰疬，产后血竭肚痛，妇人血气，血风瘙痒，五淋，瘫痪风，肠风泻血，肺气，伤寒，风秘。②《圣济总录》：脚气，大小便秘涩不通。

59123 **牵牛子丸**

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】牵牛子(微炒)二两　乌桕木根皮五两　木香三两　蜚蠊　大黄(锉，炒)各二两　防己　枳实(去瓤，麸炒)　陈橘皮(汤浸，去白，焙)　羌活(去芦头)各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服十丸，稍增至二十丸，日中及鸡鸣后各用温甘草汤送下。以知为度。

【主治】三焦病，胀满为水，小便不利。

59124 **牵牛子丸**

【方源】《圣济总录》卷七十三。

【组成】牵牛子(生，捣罗为末，以生姜汁一升，慢火熬如饧)二两　硇砂(汤中慢火熬，取霜)一两　槟榔(煨，锉)　木香各三分　桃仁(汤退，去皮尖双仁，炒黄，别研)一两半　附子(炮裂，去皮脐)　干姜(炮)　人参　丁香各三分

【用法】上药除煎研外，为末，入硇砂、桃仁研令匀，同入牵牛子煎中和为丸，如梧桐子大。每服十丸，渐加至二十丸，空心、食后煎生姜汤送下。以利下积滞物为度。

【主治】痃气，口吐酸水，醋心，常似有物在胸膈间。

59125 **牵牛子丸**

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】牵牛子(炒)一两半　葶苈(炒熟)二两　杏仁(去皮尖双仁，麸炒)一百枚(别研)　大枣(煮，去皮核)十个(研)　芒消半两(研)　牛酥半合

【用法】上药先将前二味为末，入杏仁等研匀，次入牛酥，为丸如绿豆大。每服八丸至十丸，空心粥饮送下。

【主治】水肿，上气，大便涩。

59126 **牵牛子丸**

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】牵牛子（半生半炒）三两 槟榔（生，锉）二两 木香一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒、米饮任下。

【主治】气胀满，大便秘涩，腹肋刺痛。

59127 **牵牛子丸**

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】牵牛子一两（一半瓦上炒，一半生用） 茴香子一两（微炒） 陈橘皮二两（水浸，去白，子瓦上焙干）

【用法】上为细末，用生姜汁煮面糊为丸，如绿豆大。每服十丸，空心、临卧用炒盐汤送下。

【主治】一切风热疥疮攻注。

59128 **牵牛子丸**

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】牵牛子（半生半熟） 枳壳（去瓤，麸炒）各一两 当归（切，焙） 生干地黄（焙） 芎䓖 桑根白皮（锉） 木香（炮） 防己 诃黎勒（炮，去核）各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎桑根白皮汤送下，不拘时候。

【主治】产后偏身肿满。

59129 **牵牛子丸**

《圣济总录》卷一七六。为《圣惠》卷八十八“枳壳丸”之异名。见该条。

59130 **牵牛子汤**

《圣济总录》卷六十六。为《圣惠》卷四十六“牵牛子散”之异名。见该条。

59131 **牵牛子汤**

《方剂辞典》。即《圣济总录》卷七十九“牵牛汤”。见该条。

59132 **牵牛子散**

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】牵牛子一两 木通三分（锉） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 桑根白皮三分（锉） 槟榔一两 赤茯苓半两

【用法】上为细散。每服二钱，食前煎生姜、葱白汤调下。

【主治】心腹卒胀痛，肩背壅闷，大小肠气滞。

59133 **牵牛子散**

【方源】《圣惠》卷四十六。

【异名】牵牛子汤（《圣济总录》卷六十六）。

【组成】牵牛子半两（微炒） 甜葶苈半两（隔纸炒令紫色） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 甘草半两（炙微赤，锉） 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】喘嗽，肺气不顺，面目浮肿。

59134 **牵牛子散**

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】牵牛子一两（微炒） 青橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 槟榔一两 汉防己半两 赤茯苓半两 木通三分（锉） 桑根白皮三分（锉）

【用法】上为细散。每服三钱，空心煎生姜、葱白汤调下，以利为效，未利再服。

【主治】妇人水气，腹胁妨闷，四肢浮肿，喘气微利，小便不利。

59135 **牵牛子散**

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】牵牛子五两（半生半炒熟） 桂心一两 枳壳（麸炒微黄，去瓤） 木香半两 郁李仁一两（汤浸，去皮，微炒） 木通一两（锉） 青橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为散。每服二钱，空心以热水调下。如茶煎一沸，放温，搅起服之亦佳。

【主治】妇人大便不通。

59136 **牵牛子散**

【方源】《普济方》卷二九二引《圣惠》。

【组成】牵牛子 麝香半钱（细研）

【用法】上为细末。以津唾调贴之。

【主治】瘰疬头多，经久不愈，脓血不止，极其疼痛者。

59137　**牵牛子散**

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】牵牛子(半生半炒)三两　白术　枳壳(去瓤，麸炒)　桑根白皮(炙，锉)　陈橘皮(汤浸，去白，焙)　木通(锉，炒)　独活(去芦头)各一两　人参半两　赤茯苓(去黑皮)一两

【用法】上为细散。每服三钱匕，空腹温酒调下，一日三次。

【主治】风劳冷气，骨热羸瘦；及妇人产后诸疾，血气冲心，脚手麻痹。

59138　**牵牛子散**

【方源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】牵牛子二两(一半生一半炒)　木香　青橘皮(汤浸，去白，焙)　陈曲(炒)各半两

【用法】上为细散。每服三钱匕，五更初以生姜茶调下。至天明通转三二行，自止。后以薤白粥补之。

【功用】疏通脏腑。

【主治】一切痈疽疮疖，焮肿未穴。

59139　**牵牛子散**

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】牵牛子(生，取末)　当归(切，焙)各一两　槟榔(锉)　桂(去粗皮)　木香(炮)各半两　郁李仁(汤浸，去皮，细研)　青橘皮(汤浸，去白，焙)各一两

【用法】上为散。每服一钱匕，空心温酒调下。取下瘀血为效。外以败龟膏贴。

【主治】从高坠下，伤折有瘀血不散，胁肋疼痛。

59140　**牵牛子散**

【方源】《普济方》卷一九二。

【组成】牵牛子三两(炒)　桂心半两　羌活半两　当归半两(炒)　陈橘皮半两(浸，去白瓤，焙，炒)

【用法】上为末。每服二钱，生姜汤下，不拘时候。

【主治】水气肿满，喘急，小便涩。

59141　**牵牛子散**

【方源】《普济方》卷二四〇。

【组成】甘遂　川芎(切片，炒)　黑牵牛(青盐炒)各等分

【用法】上为末，以猪腰子去膜，竹刀批开，纳药于内，瓦瓶中煎熟。每服药末二钱匕，白酒调下，再食腰子，酒醒痛止。

【主治】脚气。

59142　**牵牛子粥**

【方源】《圣惠》卷九十六。

【异名】牵牛粥(《圣济总录》卷一九〇)。

【组成】牵牛子一两(一半生，一半炒，并为细末)　粳米二合　生姜一分(细切)

【用法】上将米煮粥，候熟，抄牵牛子末三钱，散于粥上，并入生姜搅转，空腹食之。须臾通转，即效。

【功用】《药粥疗法》：泻水，消肿，通便，下气，驱虫。

【主治】①《圣惠》：水气，面目及四肢虚肿，大便不通。②《药粥疗法》：小儿蛔虫病。

59143　**牵牛炒酒**

《摄生众妙方》卷六。为《素问》卷十一“鸡矢醴”之异名。见该条。

59144　**牵牛煎丸**

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】牵牛子末三两(以生姜汁半升，酒一升慢火熬如膏)　木香一两　附子一两(炮裂，去皮脐)　鳖甲一两半(涂醋炙令黄，去裙襴)　槟榔一两　桃仁一两半(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，研入)　吴茱萸半两(汤浸七遍，焙干，微炒)　硼砂一两(不夹石者，细研入)

【用法】上为末，入牵牛子煎中和溶为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前生姜汤送下。

【主治】肥气，结聚不散，腹胁胀满，呕逆酸水，饮食减少。

59145　**牵牛大黄丸**

【方源】《奇效医述》卷一。

【组成】黑牵牛四两(半炒半生,取头末一两二钱) 马蹄大黄(酒炒)一两五钱 坚槟榔六钱 陈枳实(炒)六钱 姜汁炒厚朴六钱 醋炒三棱 醋炒莪术各六钱

【用法】上为末,米饮为丸,如梧桐子大。每服三钱,饥服。未利再服。

【主治】内热腹痛,热气上冲而呕。

59146 牵牛五灵煮散

《圣济总录》卷八十。为原书卷七十九"牵牛汤"之异名。见该条。

厚

59147 厚朴丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】厚朴三两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟) 陈橘皮二两(汤浸,去白瓤,焙) 草豆蔻一两(去皮) 白术一两 缩砂一两(去皮) 诃黎勒二两(煨,用皮) 桂心一两 干姜一两(炮裂,锉)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前以粥饮送下。

【主治】脾胃气虚冷,水谷不化,食即腹胀,胸膈不利。

59148 厚朴丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】厚朴一两半(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟) 白术半两 干姜半两(炮裂,锉) 桔梗一两(去芦头) 当归一两(锉,微炒) 槟榔半两 陈橘皮半两(汤浸,去白瓤,焙) 甘草半两(炙微赤,锉) 诃黎勒一两(煨,用皮) 白茯苓半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前以粥饮送下。

【主治】脾脏冷气,腹内虚鸣,内寒外热,宿食不消,大便乍秘乍泄,腑脏不调,少思饮食。

【宜忌】忌生冷油腻。

59149 厚朴丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】厚朴二两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟) 苍术一两 诃黎勒一分(煨,用皮) 当归三分(锉,微炒) 干姜(炮裂,锉) 木香半两 缩砂一两(去皮) 赤石脂一两 附子一两(炮裂,去皮脐)

【用法】上为细散。每服二钱,食前以姜枣粥饮调下。

【主治】脾脏虚冷,大肠泄痢,腹内疼痛,四肢羸瘦,少力,或渴,不思饮食。

59150 厚朴丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】厚朴四两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟) 干姜一两(炮裂,锉) 人参一两半(去芦头) 吴茱萸一两(汤浸七遍,焙干,微炒) 陈橘皮二两(汤浸,去白瓤,焙) 白术二两 半夏二两半(汤浸七遍去滑) 当归一两半(锉,微炒) 桔梗一两(去芦头) 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为末,以酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以姜、枣汤送下,不拘时候。

【主治】脾脏虚冷,食即呕逆,谷食不化,或多泄痢。

59151 厚朴丸

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟) 丁香三分 肉豆蔻三分(去壳) 人参三分(去芦头) 干姜三分(炮裂,锉) 诃黎勒一两(煨,用皮) 木香三分 陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙) 神曲三分(炒令微黄) 白术三分 枳壳半两(麸炒微黄,去瓤) 麦蘖半两(炒令微黄)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前以粥饮送下。

【主治】伤寒后,脾胃气冷,宿食不消,腹中疞痛,肠滑,日渐羸瘦。

59152 厚朴丸

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令

香熟)　干姜一两半(炮裂,锉)　白术一两半　人参一两(去芦头)　甘草半两(炙微赤,锉)　枳壳一两(麸炒微黄,去瓤)　食茱萸三分　桂心三分　神曲一两(炒微黄)　大麦蘖一两(炒微黄)　杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)

【用法】上为散,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前以枣汤送下。

【主治】时气后,肠胃虚冷,食不消化。

59153　厚朴丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】厚朴二两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　白茯苓三分　人参三分(去芦头)　鳖甲二两(涂醋炙令黄,去裙襴)　诃黎勒二两(煨微黄)　木香半两　陈橘皮半两(汤浸,去白瓤,焙)　附子半两(炮裂,去皮脐)　吴茱萸半两(汤浸七遍,焙干,微炒)　苍术三分　干姜一分(炙裂,锉)　麦蘖三分(微炒令黄)　京三棱半两(炮裂)　益智子半两　当归三分　黄耆一两(锉)　槟榔半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心以粥饮送下,晚食前再服。

【主治】脾劳。脏腑虚冷,不思饮食,呕逆,四肢少力,腹胁胀痛。

【宜忌】忌苋菜。

59154　厚朴丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】厚朴三两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　神曲一两(微炒)　当归一两　枳壳一两(麸炒微黄,去瓤)　白矾一两半(烧灰)　五味子一两　缩砂一两(去皮)　黄连一两(去须,微炒)　白龙骨一两　白石脂一两　干姜一两(炮裂,锉)　诃黎勒二两(煨,用皮)　白茯苓一两　人参一两(去芦头)　附子一两(炮裂,去皮脐)

【用法】上为末,以酒煮曲糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心及晚食前以粥饮送下。

【主治】脾劳。心腹气冷痛,时时下痢。

59155　厚朴丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　五味子一两　桔梗一两(去芦头)　白术一两半　枳壳一两(麸炒微黄,去瓤)　诃黎勒一两(煨,用皮)　桂心三分　干姜半两(炮裂,锉)　人参一两(去芦头)　黄柏三分(炒微黄)　益智子三分(去皮)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食前以温酒送下。

【主治】虚劳。脾胃不调,腹胁胀满,不思饮食。

59156　厚朴丸

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　木香半两　桂心三分　附子三分(炮裂,去皮脐)　人参半两(去芦头)　陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)　诃黎勒一两(煨,用皮)　黄耆三分(锉)　白术一两　干姜半两(炮裂,锉)　草豆蔻一两(去皮)　当归半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前以温酒送下。

【主治】虚劳冷气,心腹痞满,四肢少力,不欲饮食。

59157　厚朴丸

【方源】《圣惠》卷四十八。

【组成】厚朴一两半(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　木香一两　青橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)　川大黄一两半(锉碎,醋拌微黄)　硫黄一两(细研,水飞过)　槟榔一两半

【用法】上为细末,入硫黄令匀,以酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服十丸,食前以生姜汤送下。

【主治】痞气。积年不愈,结聚在胃管,大如覆杯,心腹胀痛,食少无力。

59158　厚朴丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】厚朴一两半(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　黄连一两(去须,微炒)　干姜半两

（炮裂，锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 龙骨半两 赤石脂半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】冷热不调，下痢不止。

59159 厚朴丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】厚朴三两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 黄连二两（去须，微炒） 木香一两 干姜一两（炮裂，锉）

【用法】上为末，用醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】水泻。

59160 厚朴丸

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】厚朴三两（去粗皮，锉如豆大） 附子三两（去皮脐，锉如豆大） 生姜汁一升（合水五合）

【用法】以生姜汁煮前二味令汁尽，焙干，为细末，以酒煮神曲末和溲为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】妇人脾胃虚冷，呕吐不下食。

59161 厚朴丸

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 白术一两 麦门冬三分（去心） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 赤茯苓一两半 半夏三分（汤洗七遍去滑） 人参三分（去芦头） 前胡一两（去芦头）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以生姜粥饮送下，不拘时候。

【主治】妊娠阻病，头疼，肩背烦闷，往往气胀，不思饮食。

59162 厚朴丸

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 诃黎勒一两（煨，用皮） 赤茯苓三分 干姜三分（炮裂，锉） 桂心一两半 木香一两 赤芍药三分 当归三分（锉，微炒） 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 吴茱萸三分（汤浸七遍，焙干，微炒） 京三棱二两（微煨，锉） 白术三分

【用法】上为末，以醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以生姜汤送下。

【主治】产后两肋下及心腹胀满，宿有冷气，攻注膀胱，致使胀痛。

59163 厚朴丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】厚朴五两（去粗皮，锉） 附子半两（生，去皮脐） 川椒红二两（生用）

【用法】上以浆水六升，青盐三两，生姜三两（切），同于银锅中煮令水尽，晒干，为末，以水浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下。

【主治】①《圣惠》：脾肾虚冷，羸瘦无力，不思饮食。②《圣济总录》：下焦虚冷，便利频并。

59164 厚朴丸

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【异名】厚朴干姜丸（《圣济总录》卷七十四）。

【组成】厚朴三两（去皴皮，生姜汁炙香熟） 干姜二两（炮裂） 附子一两（炮裂，去皮脐） 诃黎勒皮三分 白术一两

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心、食前米饮送下，一日二三次。

【主治】脾脏虚冷，脐腹疼痛，或滑泄下利，不思饮食。

59165 厚朴丸

【方源】《传家秘宝》。

【组成】厚朴（去粗皮）半斤（细锉，用生姜一斤洗刷净，和皮细切，与厚朴同捣如泥，摊熟令三分干，以长火炒令干为度） 肉桂五两（去皮） 干姜四两（炒黑色） 川椒二两半（拣择于铛内慢火炒，瓷碗盖，时时揭起，拭去碗内汁，候紫色为度）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，煎水送下。治脾胃，米饮送下；中酒吐

逆，生姜汤送下；膀胱、小肠、肾余气，茴香酒送下；血气，当归酒送下。

【功用】暖胃消痰，利胸膈，解酒食毒。

59166 厚朴丸

【方源】《伤寒微旨论》卷下。

【组成】当归　厚朴　甘草　丁香枝　干姜各半两　细辛一分　人参三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，水一盏，煎至七分，和滓热服。如三五服后，脉尚细及寸脉未有力，加葱白三寸同煎。

【主治】伤寒阴气盛，两手脉沉细无力，或胃膈痛，身体拘急疼痛，手足逆冷，发病在立春以后至清明以前。

【备考】本方原名厚朴汤，与剂型不符，据《阴证略例》改。

59167 厚朴丸

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】厚朴(去粗皮，生姜汁炙)三分　白术　人参　枳壳(去瓤，麸炒)　桂(去粗皮)　干木瓜各半两　干姜(炮)　甘草(炙)　胡椒各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，煎兰香汤送下。

【主治】霍乱。脾气冷，腹胀不能食，胸膈气痞。

59168 厚朴丸

【方源】《圣济总录》卷三十九。

【组成】厚朴(去粗皮，生姜汁炙)　赤石脂各一两半　白术　干姜(炮)　麦糵(炒)　人参　白茯苓(去黑皮)　当归(切，焙)　橘皮(汤浸，去白，焙)　甘草(炙，锉)　诃黎勒(煨，取皮)各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心米饮送下。

【主治】腑脏不调，内寒外热，脾胃虚冷，宿食不消，乍秘乍利不常，霍乱逆满。

59169 厚朴丸

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】厚朴(去粗皮，生姜汁炙)　肉豆蔻(去壳)　附子(炮裂，去皮脐)各三分　胡椒　高良姜　桂(去粗皮)　干姜(炮)　丁香　槟榔(锉)各半两　硇砂(通明者，研)一分　巴豆(去皮心膜，出油取霜，研)一分　大枣三十个(草乌头二两，实白者，杵碎，生姜自然汁慢火同煮令透软，拣出枣，剥去皮核，研，乌头不用)

【用法】上为末，合研匀，以枣肉膏和剂，如硬，量加蒸枣肉为丸，如梧桐子大。每服五丸至七丸，空心、食前煎陈橘皮、木香、生姜汤送下。如饮食消化迟，停滞胸膈，即不拘时候服。

【主治】脾脏冷气攻心腹多疼，胁肋虚胀，胸膈痞闷，痰逆恶心，呕吐酸水，肠鸣泄泻，不思饮食，虽食迟化，留滞脏腑，面色萎黄，四肢少力，气出多寒，手足逆冷，肌体羸瘦。

59170 厚朴丸

《圣济总录》卷四十七。为原书卷四十五“八味厚朴丸”之异名。见该条。

59171 厚朴丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】厚朴(去粗皮，姜汁炙)一两半　龙骨　诃黎勒(去核)　干姜(炮)　附子(炮裂，去皮脐)　黄连(去须)　白石脂　吴茱萸(汤洗，焙干，炒)各一两

【用法】上为末，醋浸炊饼为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心煎茱萸汤送下，一日三次。

【主治】胃寒肠热，腹胀泄利。

59172 厚朴丸

【方源】《圣济总录》卷五十。

【异名】麻仁丸(原书卷九十七)。

【组成】厚朴(去粗皮，涂生姜汁炙透)　大麻仁(研)　大黄(锉，炒)　枳壳(去瓤，炒)各二两

【用法】上除麻仁外，为末，再与麻仁同研匀，炼蜜和于臼内，涂酥杵令匀熟为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下。溏利为度。

【主治】大肠虚瘦，秘涩不通，及一切热壅。

59173 **厚朴丸**

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 当归(切,焙) 附子(炮裂,去皮脐) 陈橘皮(汤浸,去白,焙)各三分 干姜(炮) 半夏(汤浸七遍,炒)各半两 草豆蔻(去皮)一两 甘草(炙,锉)一分

【用法】上为末,用陈曲煮糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸至三十丸,炒生姜盐汤送下。

【主治】心痛如刺,不能饮食。

59174 **厚朴丸**

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】厚朴(去粗皮,涂生姜汁炙熟) 丁香皮 桑根白皮(锉,炒) 白术 桔梗(炒) 沉香(锉) 人参 槟榔(锉)各一两

【用法】上为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心橘皮汤送下。

【主治】久腹胀,烦闷,食不消。

59175 **厚朴丸**

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】厚朴(去粗皮,姜汁炙)一斤 半夏(洗去滑,焙,切)半斤 大枣(生绢袋盛)三斤 生姜三斤(研取汁尽,更入水二碗,绞取汁)

【用法】上药于银器内用文武火煮尽姜汁,取厚朴、半夏焙干,为末,大枣去皮核,入前药于臼中,再捣为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心、临卧温酒送下。

【主治】脾胃虚寒,痰盛呕吐。

59176 **厚朴丸**

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】厚朴(去粗皮) 瓦砾(并砂姜) 粪堆土瓜苗心各等分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如鸡头子大。每服三丸,葱一握细切,面一匙,盐半钱同炒黄,沸汤点下。

【主治】鼻衄不止。

59177 **厚朴丸**

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙令紫) 干姜(炮) 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 诃黎勒(炮,去核) 白茯苓(去黑皮) 芜荑(微炒香) 阿胶(炙令燥) 熟艾(微炒,别捣) 胡粉(炒黄) 黄石脂(赤石脂亦可) 乌梅(去核,炒干) 当归(切,焙) 蜀椒(去目并闭口,炒出汗)各一两

【用法】上除胶、艾二味外,为末,先以米醋一升半,于无风处煮艾水减约八分,绞去艾,次下阿胶,候消尽,乘热入药末和匀为丸,如梧桐子大,晒干。每服五十丸,空心用温浆水送下,日午再服。

【主治】积年冷痢,日三五行,胀闷肠鸣,食不消化,面黄渐瘦。

59178 **厚朴丸**

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙黄)二两 诃黎勒皮一两 附子(炮裂,去皮脐)半两 吴茱萸(汤浸洗七遍,焙干)半两 鳖甲(涂醋炙黄,去裙襕)一两 京三棱(炮,锉)半两

【用法】上为末,醋煮面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食前温粥饮送下。

【主治】脾劳虚冷,不思饮食,四肢无力,呕逆腹痛。

59179 **厚朴丸**

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】厚朴(去粗皮,姜汁炙熟) 陈橘皮(汤浸,去白,炒) 白茯苓(去黑皮) 人参 干姜(炮) 白术 薏苡仁各一两半 桂(去粗皮) 牛膝(酒浸,焙)各一两一分 枳壳(去瓤,麸炒) 细辛(去苗叶) 食茱萸 大麦蘖(炒)各三分 石斛(去根) 甘草(炙)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,加至三十丸,一日二次,温酒送下。

【主治】虚劳。脾胃气弱,呕吐,口干烦渴,不能饮食,四肢疼痛。

59180 **厚朴丸**

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】厚朴(去粗皮,姜汁炙)　胡黄连　补骨脂(微炒)　秦艽(去苗土)　防风(去叉)　桂(去粗皮)　附子(炮裂,去皮脐)　干姜(炮)　柴胡(去苗)各一两

【用法】上为末,无灰酒一升半相和,银石器内文武火煎成膏可丸,以少酥和匀为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空腹盐汤送下,夜卧再服。

【主治】虚劳伤惫,举体无力,四肢烦疼,腰膝冷痛,夜多小便,面色青黑,寝卧盗汗。

59181　厚朴丸

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙)　附子(炮裂,去皮脐)　茴香子(炒)　白术(锉,炒)　桂(去粗皮)　干姜(炮)　枳壳(去瓤,麸炒)　青橘皮(汤浸,去白,焙)　芎䓖　乌头(炮裂,去皮脐)　木香(炮)　当归(切,焙)各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,温酒送下,生姜汤亦得,不拘时候。

【主治】七疝,肢体寒,脐腹坚痛满闷。

59182　厚朴丸

【方源】《圣济总录》卷一〇〇。

【组成】厚朴(去粗皮,姜汁炙)三两　桂(去粗皮)　大黄(锉碎,醋炒)各二两　桃仁(汤浸,去皮尖双仁,炒)三两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如小豆大。每服三十丸,食后、临卧米饮送下。微利即效。

【主治】一切气注,大肠结涩,背膊刺痛,气注四肢,及食物不消,奔豚气逆。

59183　厚朴丸

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙透)　人参　陈橘皮(去白,焙)　大黄(锉)　郁李仁(去皮,别研如膏)各一两　当归(切,焙)一两半

【用法】上为末,入郁李仁膏,同研令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,温水送下,不拘时候。

【主治】产后大肠虚结,秘涩不通。

59184　厚朴丸

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙)三分　龙骨半两　白茯苓(去黑皮)　人参各三分　白石脂半两　陈橘皮(去白,切,焙)一分　当归(切,焙)三分　肉豆蔻(去壳)一枚　乌梅肉(炒)　干木瓜各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如麻子大。每服五丸七丸,食前煎生姜、枣汤送下。

【主治】小儿疳痢呕逆。

59185　厚朴丸

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【异名】厚肠丸(《普济方》卷三八〇)。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙)半两　陈橘皮(去白,切,焙)一分　使君子(去壳,面裹煨)　甘草(炙,锉)　诃黎勒皮(半生半炮)各半两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如小鸡头大。小儿三岁以上,每服一丸,米饮化下;百日儿每服作四服,乳汁或清米饮化下。

【功用】《普济方》:进食,生胃气。

【主治】①《圣济总录》:小儿疳痢,下痢腹胀,不思饮食。②《普济方》:小儿疳瘦,泄泻下痢脓。

59186　厚朴丸

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙黄色)一两　肉豆蔻(面裹炮裂)一两　诃黎勒三枚(面裹炮,用皮)　龙骨半两　木香一两

【用法】上为细末,水浸炊饼心为丸,如麻子大。一二岁儿每服十丸,温米饮送下,一日三次。

【主治】小儿脾胃虚弱,清浊不分,因成冷痢,其色青白,甚则色黑。

59187　厚朴丸

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙)　枳壳(去瓤,麸炒)　茴香子(炒香)　肉豆蔻(去壳)　桂(去粗皮)　白术各一两　丁香　荜澄茄　诃黎勒皮　没药(研)　细辛(去苗叶,

洗，焙） 当归（切，焙）各半两 赤石脂 独活（去芦头） 天麻 防风（去叉）各三分 芎䓖半两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心、食前温酒送下；米饮送下亦得。如呼吸风冷气，心腹疼痛，里急后重，亦宜温酒送下，并二服。

【功用】调顺阴阳，安和脏腑，散风冷外邪，补丹田正气谷神。

【主治】真元虚弱，风寒冷气乘虚入于肠间，使心腹暴痛，背脊瘦痛，肠鸣泄泻，心虚嗜卧。

59188 厚朴丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】厚朴十两 白龙骨 诃子皮 附子 干姜 黄连 当归 石榴皮 艾叶各五两 青橘皮一两

【用法】上为细末，用蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心茱萸汤送下。

【主治】脾胃气寒，经年不愈，瘦弱，下痢频并。

59189 厚朴丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】厚朴四两 陈橘皮二两 干姜二两 附子一两

【用法】上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下。

【主治】脾胃虚积冷，腹胁刺痛，饮食进退，大便秘泄。

59190 厚朴丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜制）一斤 生姜半斤（净洗，切片） 大枣一百枚 附子（七钱者）四枚（炮，去皮脐，每枚切作四片） 人参（去芦头） 诃子（煨，去核） 白术 白茯苓（去皮） 肉豆蔻（面裹煨香） 木香各二两

【用法】上将前四味于银、石器中，以水一斗，慢火熬干，取大枣去皮核，四物一处捣如泥；将人参等六味为细末，和匀，入少面糊同为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前米饮送下。

【主治】脾虚受湿，胜则濡泻，故肠鸣夜起，四肢浮肿，多困少力。

59191 厚朴丸

《保命集》卷中。为《外台》卷十二引《崔氏方》"温白丸"之异名。见该条。

59192 厚朴丸

【方源】《百一》卷十四引王嗣康方。

【组成】厚朴五两（用生姜五两同捣烂，于银石器内炒令紫色） 白术一两 大麦糵 神曲各一两（同炒紫色）

【用法】上为细末，白水面糊为丸，如梧桐子大。疾作每服一百丸，空心米饮送下。平时每服三五十丸。

【主治】积年下血。

【方论选录】肠胃本无血，缘气虚肠薄，自荣卫渗入。今用厚朴厚肠胃，神曲、麦糵消酒食，白术导水，血自不作也。

【备考】本方原名厚朴煎，与剂型不符，据《朱氏集验方》改。

59193 厚朴丸

【方源】《卫生总微》卷十一。

【组成】厚朴（姜制）半两 诃子半两（炮，去核） 白龙骨半两 白矾半两

【用法】上用一器盛之，盐泥固济，留一窍子，木炭火煅，烟息为度，取出为末，面糊为丸，如黍米大。每服十丸，食前米饮送下。

【主治】小儿脏寒泄泻，下痢纯白，腹中绞痛，虚气胀满，手足逆冷。

59194 厚朴丸

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】厚朴（去粗皮，姜制）一两 丁香一两 木香一两 白术一两 青皮（去瓤）半两 牵牛子一钱（炒）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如黍米大。每服十丸，煎陈皮汤送下，不拘时候。

【主治】小儿风冷，寒邪客于脏腑，腹胀满闷，气不宣通。

59195　厚朴丸

【方源】《妇人良方》卷十五。

【组成】干姜　厚朴(去粗皮,细锉)各等分

【用法】上药先杵令烂,水拌,同炒令干,再为末,水煮面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食前米饮送下。

【主治】妊娠洞泄寒中。

59196　厚朴丸

【方源】《朱氏集验方》卷四引鲁太丞方。

【组成】厚朴四两(去浮皮,蘸生姜自然汁炙焦黄)　苍术二两(米泔水浸洗,晒干,切片略炒)　莪术二两(湿纸裹煨,去皮切片)　青皮二两(洗,去瓤,晒干,锉细,略炒)　陈皮二两(洗,去瓤,晒干,锉细,略炒)　当归二两(去芦,净洗晒干)　荆三棱二两(去芦,切片)　白芷二两(切片)

上用老醋浸七日,春夏浸五日,取出焙干,研细末,入后药中:

禹余粮(火煅醋淬凡十次,为细末,用水飞过,再入干锅内火煅通红,净称二两再研)　针砂二两(净洗,用醋浸一宿,煮干,研极细,净秤)

【用法】醋煮面糊为丸,如梧桐子大,候干。每服七八十丸至百丸,食前陈米饮送下。

【功用】宽中进食,推化积聚。

59197　厚朴丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】厚朴(姜制)　百草霜各二两　干姜(炮)　京三棱(炮)　蓬莪术(炮)　半夏　槟榔各一两　甘松半两　陈皮(去白)　青皮(去白)各五两　黑牵牛(炒)八两　黑附子(不炮,去皮脐)

【用法】上为细末,面糊为丸,如豌豆大。每服二十丸,食后生姜汤送下。

【功用】宽中利膈,行导滞气,消化饮食。

【主治】胸膈噎塞,腹胁胀满,心下坚痞,肠中水声,呕哕痰逆,不思饮食。

59198　厚朴丸

【方源】《明医指掌》卷六引《元戎》。

【组成】厚朴三两(姜炒)　黄连二两半(炒)　吴茱萸(汤泡七次)二两　干姜(炮)二两　巴豆一两(另研)　人参一两(去芦)　川乌(炮)一两

【用法】上为末,入豆霜匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三丸。以利为度。

【主治】寒厥心痛,大便秘结不通者。

59199　厚朴丸

【方源】《普济方》卷二十二引《治风经验方》。

【组成】厚朴(去粗皮,涂姜汁炙香焦)一两　木香一两　陈橘皮(去瓤,焙)一两　槟榔四个　肉豆蔻仁四个

【用法】上为末,别用神曲一两,杵碎炒熟,为细末,以生姜自然汁调煎作糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸至三十丸,稍空服,生姜汤送下。

【主治】脾胃气弱,胸中滞闷,痰饮不思食,或大便不调。

59200　厚朴丸

【方源】《医学纲目》卷三十三。

【组成】人参　白术　厚朴　陈皮　藿香　当归　细辛

【功用】温中消阴气。

【主治】伤寒,三部脉沉,寸脉小于关尺。

59201　厚朴丸

《普济方》卷二十。为《圣济总录》卷四十四"补暖厚朴丸"之异名。见该条。

59202　厚朴丸

《普济方》卷三九三。为《兰室秘藏》卷下"厚肠丸"之异名。见该条。

59203　厚朴丸

《奇效良方》卷十四。为《百一》卷六"厚肠丸"之异名。见该条。

59204　厚朴汤

【方源】《肘后方》卷二。

【异名】厚朴散(《普济方》卷二〇一)。

【组成】厚朴四两(炙)　桂二两　枳实五枚(炙)　生姜三两

【用法】以水六升，煮取二升，分为三服。

【主治】①《肘后方》：霍乱烦呕腹胀。②《外台》引《深师方》：脾冷实，下痢。

【宜忌】《外台》引《深师方》：忌生葱。

59205　厚朴汤

【方源】《外台》卷七引《深师方》。

【组成】厚朴（炙）　桂心　芍药　半夏（洗）各三两　枳实三枚（炙）　甘草二两（炙）　麦门冬四两（去心）　黄芩一两　干姜二两

【用法】上切。以水一斗，煮取二升半，绞去滓，服八合，每日三次。

【主治】腹胀满膨膨，逆害饮食，热不得卧，流汗。

【宜忌】忌生葱、海藻、菘菜、羊肉、饧。

【加减】小便难，加术三两。

59206　厚朴汤

【方源】《外台》卷十引《深师方》。

【组成】厚朴一两（炙）　人参一两　半夏四两（洗）　生姜八两　茯苓　甘草（炙）　橘皮　桂心各二两　枳实二两（炙）

【用法】上切。以水八升，煮取三升，分三服。

【主治】上气，烦闷呕逆，不得饮食。

【宜忌】忌海藻、菘菜、羊肉、饧、生葱、醋物。

59207　厚朴汤

【方源】方出《证类本草》卷十三引《梅师方》，名见《医方类聚》卷一四一引《王氏集验方》。

【组成】厚朴三两　黄连三两

【用法】上锉。水三升，煎取一升，空心服。

【主治】水谷痢久不愈。

59208　厚朴汤

【方源】《外台》卷六引《删繁方》。

【组成】厚朴四两（炙）　干扁豆叶二两　茯苓三两　白术五两　人参三两

【用法】上切。以水七升，煮取二升，分三服。

【主治】霍乱后不欲食，胃弱呕吐不止。

【宜忌】忌桃、李、大醋、雀肉等。

59209　厚朴汤

【方源】《外台》卷六引《删繁方》。

【组成】厚朴四两（炙）　吴茱萸五合　人参三两　茯苓四两　桔梗三两　生姜八两　玄参三两　芎䓖四两　白术四两　附子三两　橘皮三两（去赤脉）

【用法】上切。以水九升，煮取三升，绞去滓，分三服。

【主治】上焦闭塞，干呕，呕而不出，热少冷多，好吐白沫清涎，吞酸。

【宜忌】忌猪肉、桃、李、雀肉、大醋。

【方论选录】《千金方衍义》：干呕不出，热少冷多，肝气阻逆之验，虽用厚朴、橘皮、川芎、桔梗破滞之剂，不得生姜、茱萸不能开运闭塞，不得参、苓、白术不能运行药力，玄参一味专通膈上氤氲旺气。

59210　厚朴汤

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【组成】厚朴四两（炙）　枳实（炙）　桂心　橘皮　大黄各三两　甘草二两（炙）　五加皮　生姜各五两　大枣二十个（擘）

【用法】上切。以水一斗二升，煮取三升，去滓，分三次温服。

【主治】肺虚劳寒，腹胀膨膨，气急，小便数少。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生菜。

59211　厚朴汤

【方源】《外台》卷六引《经心录》。

【组成】厚朴二两（炙）　生姜三两　枳实三两（炙）

【用法】上切。以水六升，煮取二升，分三服。

【主治】①《外台》引《经心录》：霍乱后烦呕。②《圣济总录》：霍乱吐利腹胀。

59212　厚朴汤

【方源】《延年秘录》引蒋孝瑜方（见《外台》卷八）。

【组成】厚朴三两（炙）　白术　人参各一

两　茯苓三两　生姜五两　橘皮二两

【用法】上切。以水四升，煮取一升二合，分为三服。

【主治】脾胃弱，不能食，腹内冷气。

【宜忌】忌桃、李、雀肉、酢物。

59213　厚朴汤

【方源】《千金》卷三。

【组成】厚朴如手大长四寸(去皮，炙，削)

【用法】以酒五升煮两沸，去滓，取桂一尺为末，纳汁中调和。一宿勿食，旦顿服之。

【主治】妇人下焦劳冷，膀胱肾气损弱，白汁与小便俱出者。

59214　厚朴汤

《千金》卷九。为《伤寒论》"厚朴生姜半夏甘草人参汤"之异名。见该条。

59215　厚朴汤

【方源】《千金》卷十五。

【组成】厚朴　干姜　阿胶各二两　黄连五两　石榴皮　艾叶各三两

【用法】上㕮咀。以水七升，煮取二升，分二次服。

【主治】久痢。

【方论选录】《千金方衍义》：痢久滑脱不止，必有冷热宿滞纠结于中，所以发歇不常。故用专治休息痢之驻车丸退归进艾，并入厚朴、榴皮，通宿滞，止滑脱也。

59216　厚朴汤

【方源】《千金》卷十七。

【组成】厚朴　麻黄　桂心　黄芩　石膏　大戟　橘皮各二两　枳实　甘草　秦艽　杏仁　茯苓各三两　细辛一两　半夏一升　生姜十两　大枣十五枚

【用法】上㕮咀。以水一斗三升，煮取四升，分为五服。

【主治】肺劳。风虚冷，痰澼水气，昼夜不得卧，头不得近枕，上气胸满，喘息气绝。

【方论选录】《千金方衍义》：痰澼水气积于胸中，不能眠卧，故汇采《金匮》射干麻黄汤、泽漆汤中泄肺诸味，参入大戟与射干、泽漆，味虽变而功用不殊。其余枳、橘、茯苓、秦艽不过为麻、朴、姜、半之佐辅。苟不知《金匮》之渊源，无以推《千金》之发派。

59217　厚朴汤

【方源】《千金翼》卷六。

【组成】厚朴(炙)　干姜(炮)　桂心各四两　黄芩　芍药　干地黄　茯苓　大黄各三两　桃仁(去尖皮)　虻虫(熬，去翅足)　甘草(炙)各二两　芒消一两　枳实(炙)　白术各五两　(一方有栀子十四枚)

【用法】上㕮咀。以水一斗，清酒三升，合煮取三升，绞去滓，下芒消令烊，适寒温服一升，一日三次。

【主治】产后腹中满痛，恶露不尽。

59218　厚朴汤

【方源】《千金翼》卷六。

【组成】厚朴(炙)　枳实(炙)　生姜各三两　芍药　五味子　茯苓　前胡各一两　人参半两　大枣二十枚(擘)

【用法】上㕮咀。以水六升，煮取二升五合，分为三服，适寒温服。

【主治】产后四日之中血气，口干嘘吸。

【宜忌】禁冷物。

59219　厚朴汤

【方源】《千金翼》卷十八。

【组成】厚朴(炙)　高良姜　桂心各三两

【用法】上㕮咀。以水六升，煮取二升，分二次服。

【主治】霍乱面烦。

59220　厚朴汤

《千金翼》卷十八。为《金匮》卷上"厚朴三物汤"之异名。见该条。

59221　厚朴汤

【方源】《千金翼》卷十八。

【组成】厚朴(炙)　半夏(洗)　茯苓　白术各四两　枳实四枚(炙)　芍药　黄耆各二两　生姜八两(切)　麦门冬一升(去心)　桂心五合　人参　甘草(炙)各二两

【用法】上㕮咀。以水一斗五升，煮取五升，

分四服。

【主治】久积痰冷，胸胁痞满，不受食饮，浑浑欲吐，血室空虚，客阳通之，令脉紧数，重热水蒸，汗漏如珠，四肢烦痛，唇口干燥，渴引水浆。

59222 厚朴汤

【方源】方出《医心方》卷二十三引《博济安众方》，名见《圣济总录》卷一六四。

【组成】厚朴二两（炙） 白术一两（炒）

【用法】以水二升，煎取一升，分四五次服。

【主治】①《医心方》引《博济安众方》：产后呕逆，不能食。②《圣济总录》：产后泄泻腹痛。

59223 厚朴汤

【方源】《医心方》卷二十二引《极要方》。

【组成】当归四两 人参三两 厚朴三两 芎䓖二两 干姜二两

【用法】以水九升，煮取二升半，分三次服，羸人分四次服。

【主治】妊娠饮食不消，成霍乱，心腹痛，大吐，胸心淡。

59224 厚朴汤

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】厚朴四两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 人参四两（去芦头） 陈橘皮二两（汤浸，去白瓤） 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，用煎成小麦汁一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，下白豆蔻丸。

【主治】脾胃虚弱，胸膈气滞，吐逆不下食。

59225 厚朴汤

【方源】《医方类聚》卷五十四引《通真子伤寒括要》。

【异名】厚朴散（《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》）。

【组成】厚朴二两（去皮，涂姜汁，炙数遍令香） 半夏二两 人参一两 甘草一两（炙）

【用法】上为粗末。每服四钱，水一盏，加生姜五片，煎六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】太阳病，发汗后，腹胀满。

59226 厚朴汤

【组成】《局方》卷十。

【组成】厚朴（去粗皮）十斤（用生姜二斤制） 枣一斗六升 丁香皮八两 甘草（炒）十一斤 丁香枝杖十二两 盐（炒）十五斤

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，加生姜三片、大枣二个（擘破），同煎至七分，热服。常服每服一钱，食前沸汤点服。

【功用】温中顺气，进饮食。

【主治】脾胃虚冷，腹痛泄泻，胸膈痞闷，胁肋胀满，呕逆恶心，不思饮食。

59227 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 人参各一两 枇杷叶（炙，拭去毛） 肉豆蔻（去壳）各半两 白茯苓（去黑皮）一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，煎至七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】伤寒，呕哕不止，饮食不下。

59228 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙令紫）三分 桂（去粗皮） 诃黎勒（炮，去核） 人参 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 赤茯苓（去黑皮） 丁香各半两 甘草（炙，锉）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜半分（拍碎），大枣二个（擘破），同煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】伤寒汗后，腹胁胀满，食少呕逆。

59229 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙）一两 当归（切，焙） 木香 枳壳（去瓤，麸炒） 大腹皮（炒）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜半分（拍碎），同煎至半盏，去滓，食前温服。

【主治】伤寒后腹痛，兼两胁胀满。

59230 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙,锉) 干木瓜各一两 高良姜(炒) 香薷叶 陈橘皮(去白,炒) 紫苏茎各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加生姜三片,盐少许,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒霍乱转筋,风寒客于胃腑,吐利不止,心腹气胀,不思饮食;霍乱转筋,脉微而细,风寒客于胃,吐泻不止。

59231 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】厚朴(去粗皮,姜汁炙)一两 柴胡(去苗) 大黄(锉,炒)各一两半 朴消二两 枳实(去瓤,麸炒)三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏,加生姜一枣大(拍碎),煎至七分,去滓,空心温服,良久再服,以通为度,未通再服。

【主治】伤寒五六日,大便不通,壮热头疼,谵语,肠中有结燥。

59232 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷三十六。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙)三两 半夏(为末,姜汁作饼,焙干)一两 陈橘皮(汤浸,去白,焙)二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加生姜三片,大枣一个(擘破),煎至七分,去滓,空心、日午、临卧各一服。

【主治】脾疟不思食。

59233 厚朴汤

《圣济总录》卷三十六。为《医方类聚》卷十引《简要济众方》"厚朴散"之异名。见该条。

59234 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】厚朴(去粗皮,姜汁炙)二两 人参 白术各一两半 半夏(为末,生姜汁调作饼,晒干) 陈橘皮(汤浸,去白,焙)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,生姜三片,大枣一个(去核),煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】霍乱呕吐,不思饮食。

59235 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙,锉) 桂(去粗皮) 枳壳(去瓤,麸炒)各二两 芍药 槟榔(锉)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加生姜五片,煎取七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】霍乱。心腹痛烦不止,或呕。

59236 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【组成】厚朴(去粗皮,涂生姜汁三度炙干)四两 枳壳(去瓤,麸炒微黄)一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕,加生姜一分(拍碎),水一盏,煎至七分,去滓温服,一日三次。

【主治】霍乱。吐利腹胀。

59237 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷三十九。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜炙)三分 大黄(锉,炒)二两 槟榔(锉) 枳壳(去瓤,麸炒) 朴消 高良姜各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎至一盏,去滓温服。

【主治】霍乱,胀满,咳嗽。

①《圣济总录》:干霍乱。②《医学入门》:胀满。③《不居集》:寒痰咳嗽。

59238 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】厚朴(去粗皮,涂生姜汁炙熟)三两 人参 陈橘皮(去白,焙)各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,同煎至八分,去滓温服。

【主治】脾胃虚冷,气逆呕吐,不能下食。

59239 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙) 白茯苓(去黑皮) 人参 草豆蔻(去皮) 陈橘皮

（汤浸，去瓤，焙，炒）各三分 半夏（汤洗去滑，生姜汁制） 桂（去粗皮） 木香 白术（炒） 枳壳（去瓤，麸炒）各半两

【用法】上为粗末。每服四钱匕，水一盏半，加生姜三片，大枣一个（擘），煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】脾脏虚冷，腹胀肠鸣，疠痛泄泻，饮食不化。

59240 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】厚朴（去粗皮）四两（生姜二两同杵，阴一二日，晒干） 白术四两 陈橘皮（汤浸，去白，焙）三两 乌药（汤浸，锉，炒） 甘草（炙，锉）各二两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，加生姜三片，大枣二个（擘破），同煎至七分，去滓温服。

【功用】化癖气，调中脏。

【主治】脾胃不和，及心下急懊。

59241 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】厚朴（去粗皮，涂生姜汁炙）一两 白术 桂（去粗皮）各三分 桃仁（去皮尖双仁，麸炒） 丁香各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，入醋数滴，去滓热呷。

【主治】胃冷呕逆。

59242 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙）一两 人参 草豆蔻（去皮）各半两 干姜（炮）一钱半 甘草（炙，锉）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至八分，去滓，空心温服。

【功用】益脾补肺。

【主治】脾气亏乏，不能生肺，而肺气不足，多感风邪。

59243 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】厚朴（去粗皮，姜汁涂炙） 吴茱萸（汤洗，焙干，炒） 人参各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一分（拍碎）、大枣二个（擘破），同煎至七分去滓温服，空心、日午、临卧各一次。

【主治】脾心痛。

59244 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】厚朴（去粗皮，用生姜汁涂炙） 槟榔（锉） 食茱萸 芍药 柴胡（去苗） 当归（切，焙）各一两 郁李仁（汤浸，去皮，炒）三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓温服，空心、日午、夜卧各一服。

【主治】九种心痛。

59245 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙）三分 人参 当归（切，焙） 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各半两 麦蘖（微炒）一分 白槟榔（微煨，锉）一枚

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一枣大（拍破），同煎至八分，去滓温服。

【主治】冷气冲心痛。

59246 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙）二两 吴茱萸（水浸一分，炒干一两半）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】心腹卒痛。

59247 厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 当归（切，焙） 桂（去粗皮） 高良姜 芎䓖各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎

至七分,去滓温服,一日三次。

【主治】心腹卒疞痛如刺,胸胁胀满。

59248　**厚朴汤**

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】厚朴(去粗皮,姜汁炙)二两　槟榔三枚　肉豆蔻(去壳)一两　吴茱萸(汤浸,焙干,炒)三分　陈橘皮(汤浸,去白)一两

【用法】上锉,如麻豆。每服五钱匕,水一盏半,加生姜三片,煎取八分,去滓,空腹温服,良久再服。

【主治】虚冷䐜胀,或反胃两胁妨满,食不化。

59249　**厚朴汤**

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】厚朴(去粗皮,姜汁炙)三两　牡蛎(煅)三两　人参一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎至八分,去滓温服,不拘时候。

【主治】三消渴疾,饮水无度,小便随之,肌肉消瘦。

59250　**厚朴汤**

【方源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】厚朴(去粗皮,锉)一两半(生姜汁浸一宿,炒令紫)　草豆蔻(去皮)　桂(去粗皮)　高良姜　五味子各半两　青橘皮(汤浸,去白,焙)　陈橘皮(汤浸,去白,焙)　甘草(炙)　麦蘖(炒)　柴胡(去苗)　人参　麻黄(去根节,煮,掠去沫,焙)　陈曲(炒)　诃黎勒(炮,去核)各一两　益智(炒,去皮)　乌头(炮裂,去皮脐)各二两　干姜(炮)一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,生姜三片,大枣二个(擘破),同煎至七分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】膈气,宿食不消。

59251　**厚朴汤**

《圣济总录》卷六十六。为《圣惠》卷四十六"厚朴散"之异名。见该条。

59252　**厚朴汤**

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙)一两半　黄连(去须,炒)一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,大枣二个(擘破),煎至一盏,去滓,空心温服,一日二次。

【主治】伤湿,濡泻不定。

【加减】如腹痛,加当归三分。

59253　**厚朴汤**

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】厚朴四两(去皮,涂姜汁炙令紫)　干姜(炮)二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,浆水一盏,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】脾胃气虚,滑泄下痢白脓。

59254　**厚朴汤**

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙)　木香　槟榔各一两

【用法】上各为粗末。先以水三盏,加生姜一分,厚朴末三钱匕,煎取浓汁二盏,下槟榔末、木香末各二钱,再煎一两沸,去滓温服,不拘早、晚。当快利一两行为效。

【主治】岭南脚气攻心痛闷乱。

59255　**厚朴汤**

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【异名】厚朴散(《普济方》卷二二九)。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙,锉)　白术　鳖甲(去裙襕,醋炙)　柴胡(去苗)　石斛(去根)　肉豆蔻(去壳)　地骨皮　犀角(镑)　白茯苓(去黑皮)　人参　甘草(炙,锉)各一两　青木香半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,大枣二个(擘破),生姜一枣大(拍碎),煎至七分,去滓,食前温服,一日二次。

【主治】气劳。心腹胀满,吃食不得,胸膈烦闷,面色萎黄,身体无力,不能行履。

59256　**厚朴汤**

【方源】《圣济总录》卷九十六。

【组成】厚朴(去粗皮,姜汁炙)一两半　附

子（炮裂，去皮脐） 芎藭各三分 白龙骨 当归（切，焙）各一两

【用法】上㕮咀，如麻豆。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，大枣二个（擘破），煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】小肠虚冷，脐下急痛，小便滑数。

59257 **厚朴汤**

《圣济总录》卷一二四。为《金匮》卷下"半夏厚朴汤"之异名。见该条。

59258 **厚朴汤**

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 赤茯苓（去黑皮）各一两半 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 人参各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜半分（拍破），煎至一盏，去滓，分二次温服。

【主治】咽喉干痛，心腹满闷，不能饮食。

59259 **厚朴汤**

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】厚朴（去粗皮，锉，生姜汁浸一宿，炒熟） 白术各四两 白芷二两 干姜（炮）一两 甘草（炙） 益智（炒，去皮） 陈橘皮（去白，切，炒） 缩砂（炒，去皮）各二两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠心脾痛，呕逆不下食。

59260 **厚朴汤**

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 人参 白茯苓（去黑皮） 陈橘皮（汤浸，去白，焙） 白术（炒） 竹茹 半夏（为末，生姜汁制作饼，晒干）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，生姜三片，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】妊娠呕逆不下食。

59261 **厚朴汤**

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 陈橘皮（去白，切，焙） 当归（锉，炒） 桂（去粗皮）各二两 甘草（炙） 人参 附子（炮裂，去皮脐）各一两 白术（锉，炒）三两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓，食前温服。

【主治】产后霍乱吐利，肢体逆冷。

59262 **厚朴汤**

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙）一两 陈橘皮（去白，焙）半两 藿香（去枝梗） 高良姜（锉，炒） 当归（切，焙）各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后霍乱吐利。

59263 **厚朴汤**

《圣济总录》卷一六二。为《圣惠》卷四十七"厚朴散"之异名。见该条。

59264 **厚朴汤**

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 干姜（炮） 当归（锉，炒） 甘草（炙）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后霍乱，吐利不止。

59265 **厚朴汤**

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 高良姜（锉，炒） 人参 白术（锉，炒）各二两 麦门冬（去心，炒） 赤茯苓（去黑皮） 桂（去粗皮） 甘草各一两半 紫苏茎叶（全用，细锉） 陈橘皮（去白，炒）各一两一分 吴茱萸一两（洗去滑，略炒）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】产后霍乱吐利，四肢逆冷，虚烦。

59266 **厚朴汤**

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 人参 白术 白茯苓（去黑皮） 沉香（锉） 乌药

(锉)　甘草(炙,锉)　藿香叶各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后呕逆,不进饮食。

59267　厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙)二两　生干地黄(焙)　苍术(切,焙)各一两　当归(切,炒)三分　酸石榴皮半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓,食前温服。

【主治】产后泄泻久不止,不思饮食。

59268　厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙,锉)　干姜(炮)　白术(锉,炒)各一两　甘草(炙)半两　陈橘皮(去白,炒)三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎七分,去滓,食前温服。

【主治】产后泄泻不止。

59269　厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷一六五。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙)　白茯苓(去黑皮)　黄连(去须)各半两　当归(锉,焙)一分　枳壳(去瓤,麸炒)一分半

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓,空腹温服。

【主治】产后水泻不止。

59270　厚朴汤

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙)　人参各一分　粟米(炒)一合

【用法】上为粗末。每服一钱匕,水七分,加生姜二片,同煎至四分,去滓,分二次温服,早晨、日、晚各一服。

【主治】小儿呕吐不止。

59271　厚朴汤

《圣济总录》卷一七八。为《博济》卷四"厚朴散"之异名。见该条。

59272　厚朴汤

《鸡峰》卷十二。为《圣惠》卷五"厚朴散"之异名。见该条。

59273　厚朴汤

【方源】《保命集》卷中。

【异名】厚朴散(《普济方》卷三十九)。

【组成】厚朴(姜制)　白术各五两　半夏二两　枳实一两(炒)　陈皮(去白)二两　甘草二两(炙)

【用法】上为粗末。每服三五钱,水一盏半,生姜五片,大枣三个,煎至一盏,去滓,空心温服。

【主治】胃虚而便秘,不能饮食,小便清利。

59274　厚朴汤

【方源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】生姜　厚朴　枣肉各一两(以上用水一碗煎干,入粟米粥半盏,同杵为饼子,贴壁上候干,取下焙干,并后药同研服)　缩砂仁(炒)　良姜　草果仁(炒)　甘草(炙)　白术　诃子(炮)各半两　肉桂二钱半

【用法】上为细末。每服三钱,入烧盐少许,空心沸汤点下。

【主治】脾胃不和,冷泻腹痛。

【加减】气实,加青皮半两;虚,加陈皮半两。

59275　厚朴汤

【方源】《普济方》卷一八二。

【组成】厚朴　陈皮　半夏　茯苓　苍术　白术　草果　藿香　南星　芍药　黄耆　粉草　砂仁各等分　人参少　木香少　官桂少

【用法】每服加生姜五片,水二盏,枣子二个,煎至一盏,食前服。

【主治】气患发热,头疼气急,全不思饮食。

59276　厚朴汤

【方源】《普济方》卷一九九。

【组成】厚朴四两(制)　甘草六两　干姜二两　陈皮二两

【用法】上粗锉,以井花水洗二十一度,以水五升煮干,加桂末三两、炒盐五两,为末。每

服一钱，以沸汤点下，不拘时候。

【功用】健脾胃，散风湿，止恶心腹痛，辟山岚瘴气。

59277 **厚朴汤**

【方源】《普济方》卷二〇一。

【组成】厚朴四两（炙） 桂心五枚 生姜三四两

【用法】以水六升，煎取二升，分三次服。

【主治】霍乱。

59278 **厚朴汤**

《普济方》卷二四三。即《千金》卷七"兼补厚朴汤"。见该条。

59279 **厚朴汤**

《普济方》卷三五五。为《圣惠》卷七十九"厚朴散"之异名。见该条。

59280 **厚朴汤**

【方源】方出《校注妇人良方》卷七，名见《赤水玄珠》卷二十。

【组成】厚朴（姜汁炒）

【用法】每服五钱，加生姜七片，水煎温服，不拘时候。间服沉香降气汤。

【主治】①《校注妇人良方》：妇人心腹胀满。②《赤水玄珠》：月水不通，气滞痞呕，结痰在上，寒热。

59281 **厚朴汤**

【方源】《医方类聚》卷一〇二引《御医撮要》。

【组成】厚朴（去粗皮，涂生姜汁炙微烟出）二两 人参一两 陈橘皮（汤浸，去白，炒）二两 白术二两

【用法】上为散。每服二钱，水一盏，加生姜一分（拍碎），同煎至六分，去滓，温温服之，不拘时候。

【主治】脾胃气，不能食，腹内冷气胀闷。

【宜忌】忌桃、李、雀肉、大蒜。

59282 **厚朴汤**

《医方类聚》卷一〇〇。即《内外伤辨》卷中"厚朴温中汤"。见该条。

59283 **厚朴汤**

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】苍术 大腹皮 厚朴（姜制） 陈皮 猪苓 木香 茯苓皮

【用法】水煎服。

【主治】痘疹脾虚，湿热内蓄，腹膨如鼓，目胞微肿者。

【加减】因于水者，加泽泻、滑石、车前、葶苈；因于食者，加神曲、山楂、枳实；喘，加葶苈、杏仁。

59284 **厚朴汤**

【方源】《片玉痘疹》卷十二。

【组成】苍术 陈皮 厚朴（姜汁炒） 猪苓 甘草 大腹皮 茯苓皮

【用法】水煎服。

【主治】脾胃素虚，饮水太多，蓄积于内，所食过度，积热于中，痘后腹膨如鼓，眼胞微肿者。

【加减】因于食者，加神曲、山楂肉、三棱、莪术、枳实；喘者，加葶苈子、杏仁。

59285 **厚朴汤**

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】平胃散去苍术，加茯苓、干姜。

【主治】脾胃虚寒作胀，腹中时痛时止。

59286 **厚朴汤**

【方源】《医彻》卷一。

【组成】厚朴（姜制） 枳壳（麸炒） 广皮各一钱 山楂二钱 卜子一钱（焙，研） 甘草三分（炙） 柴胡七分 葛根一钱

【用法】加熟砂仁末七分，生姜一片，水煎服。

【主治】伤寒夹食。

59287 **厚朴汤**

【方源】《医彻》卷二。

【组成】厚朴一钱（姜制） 枳实一钱（麸炒） 莱菔子一钱（焙，研） 木香五分 黄芩一钱 广皮一钱 山楂一钱半 豆豉一钱 炙甘草三分 柴胡七分 槟榔一钱

【用法】加砂仁末七分，生姜一片，水煎服。

【主治】痢疾，饮食停滞下积者。

59288　**厚朴汤**

【方源】《医宗己任编》卷三。

【组成】厚朴　槟榔　枳实　泽泻　青皮　黄芩　甘草

【主治】痢疾，若初起但觉腹痛，水泻无度。

59289　**厚朴饮**

《圣济总录》卷十三。为《圣惠》卷六"厚朴散"之异名。见该条。

59290　**厚朴饮**

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】厚朴(去粗皮，生姜汁炙令透)　人参芍药　枳壳(去瓤，麸炒)各一两　甘草(炙，锉)半两　槟榔(煨，锉)三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜半分(拍碎)，同煎至半盏，去滓，食前温服。

【主治】伤寒脾气未顺，腹胁胀满。

59291　**厚朴饮**

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】厚朴二两(去粗皮，姜汁炙)　甘草(炙)　半夏(姜汁炙)　人参　陈橘皮(去白，焙)各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，用水一盏半，加生姜五片，同煎至七分，去滓，空心服。

【主治】伤寒发汗后，气虚心烦，腹满痰逆，不思饮食。

59292　**厚朴饮**

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】厚朴(去粗皮，生姜汁炙)　生姜(切，焙)各一两半　槟榔(锉)三枚　肉豆蔻(去壳，炮)一两　吴茱萸(洗，焙，微炒)三分　陈橘皮(汤浸，去白，焙)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，空腹温服，如人行五里再服。

【主治】反胃。两胁妨胀，食不消化。

59293　**厚朴饮**

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【异名】厚朴豆蔻汤(原书卷九十六)。

【组成】厚朴(去粗皮，姜汁炙)一两　肉豆蔻(去壳)半两　龙骨　白术各三分

【用法】上锉，如麻豆大。每服四钱匕，水一大盏，加生姜三片，同煎至七分，去滓，空心、食前温服，一日三次。

【主治】冷痢，大便不禁。

59294　**厚朴散**

【方源】方出《经效产宝》卷上，名见《妇人良方》卷十五。

【组成】厚朴三两(炙)　黄连二两　豆蔻五枚(连皮)

【用法】水二升，煮取一升，顿服。

【主治】妊娠痢，黄水不绝。

【宜忌】忌生冷肥腻。

59295　**厚朴散**

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟)　高良姜一两(锉)　当归三分(锉，微炒)　桂心一两　芎䓖三分　白芍药三分

【用法】上为散。每服三钱，用水一中盏，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】小肠虚冷气，小腹卒痛如刺，胸胁气满，闷乱不忍。

59296　**厚朴散**

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟)　肉桂一两(去粗皮)　当归半两(锉，微炒)　人参半两(去芦头)　丁香半两　白术半两　白豆蔻半两(去皮)　吴茱萸一分(汤浸七遍，炒令微黄)　诃黎勒一两(煨，用皮)　高良姜半两　陈橘皮半两(汤浸，去白瓤，微炒)

【用法】上为散。每服三钱，水一中盏，加生姜半分、大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾气不足，心腹胀痛，喜噫吞酸，食则欲呕，四肢少力。

【宜忌】忌生冷、油腻、湿面、黏食。

59297　**厚朴散**

【方源】《圣惠》卷五。

【异名】厚朴汤（《鸡峰》卷十二）。

【组成】厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 丁香半两 木香半两 附子一两（炮裂，去皮脐） 白术一两 当归一两（锉，微炒） 人参一两（去芦头） 诃黎勒一两（煨，用皮） 干姜三分（炮裂，锉） 白茯苓一两 桂心一两 甘草半两（炙微赤，锉） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分、大枣三个，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【主治】脾气虚，腹胁胀满，吃食难消，面色萎黄，四肢少力。

【宜忌】忌生冷、油腻、湿面、黏滑。

【备考】本方原名厚朴丸，与剂型不符，据《医方类聚》改。

59298 厚朴散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 人参一两（去芦头） 桂心一两 白术一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 甘草半两（炙微赤，锉） 半夏三分（汤浸七遍去滑） 丁香半两 红豆蔻半两（去皮）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】脾胃气虚弱，不能吃食，或时痰逆，四肢不和。

【宜忌】忌生冷、油腻、饴糖。

59299 厚朴散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 人参半两（去芦头） 当归三分（锉，微炒） 干姜半两（炮裂，锉） 白术半两 干木瓜三分 高良姜半两（锉） 诃黎勒三分（煨，用皮） 桂心三分 木香半两 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 附子一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加大枣三个，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】脾脏虚冷，不思饮食，腹内疠痛，大肠泄痢，水谷不化。

【宜忌】忌生冷、油腻。

59300 厚朴散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 苍术一两 诃黎勒一分 （煨，用皮） 当归三分（锉，微炒） 干姜半两（炮裂，锉） 木香半两 缩砂一两（去皮） 赤石脂一两 附子一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为细散。每服二钱，食前以姜枣粥饮调下。

【主治】脾脏虚冷，大肠泄痢，腹内疼痛，四肢羸瘦少力，或渴，不思饮食。

【备考】本方原名厚朴丸，与剂型不符，据《普济方》改。

59301 厚朴散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 肉豆蔻三分（去壳） 木香三分 诃黎勒一两（煨，用皮） 槟榔三分 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分、大枣三个，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【主治】胃中虚冷气攻腹胁妨闷，食久不消。

59302 厚朴散

【方源】《圣惠》卷六。

【异名】厚朴饮（《圣济总录》卷十三）。

【组成】厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 前胡一两（去芦头） 桂心一两 石膏一两 赤芍药一两 贝母一两（煨令微黄） 甘草一两（炙微赤，锉） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓，稍热

服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：肺脏伤风冷，咳嗽，头痛不可忍，及多涕。②《圣济总录》：寒中之病，日泣自出。

59303　厚朴散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟)　吴茱萸半两(汤浸七遍，焙干，微炒)　甘草一两(炙微赤，锉)　附子一两(炮裂，去皮脐)　陈橘皮一两(汤浸，去白瓤，焙)　麻黄一两(去根节)　干姜半两(炮裂，锉)　前胡(去芦头)　川大黄一两　(锉碎，微炒)

【用法】上为细散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去生姜，和滓稍热服，不拘时候。以衣覆取汗，未汗再服。

【主治】伤寒壮热头痛，烦躁无汗。

59304　厚朴散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟)　当归半两(锉，微炒)　枳壳半两(麸炒微黄，去瓤)　木香半两　诃黎勒一两(煨，用皮)　大腹皮半两(锉)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】伤寒因有热服冷药过度，心腹胀痛。

59305　厚朴散

【方源】《圣惠》卷十二 。

【组成】川大黄一两(锉碎，微炒)　芎䓖三分　人参一两　(去芦头)　赤芍药三分　陈橘皮三分(汤浸，去白瓤，焙)　厚朴二两(去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】伤寒汗后，腹胀疼痛。

59306　厚朴散

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟)　半夏一两(汤洗七遍去滑)　藿香三分　人参一两(去芦头)　陈橘皮半两(汤浸，去白瓤，焙)　甘草半两(炙微赤，锉)　诃黎勒皮三分

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病伤冷太过，腹胀呕逆，不纳饮食。

59307　厚朴散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟)　人参一两(去芦头)　白豆蔻三分(去皮)　甘草半两(炙微赤，锉)　高良姜半两(锉)　丁香半两　诃黎勒一两(煨，用皮)　桂心三分　前胡三分(去芦头)　半夏半两(汤洗七遍去滑)　陈橘皮一两(汤浸，去白瓤，焙)

【用法】上为粗散。每服二钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【主治】虚劳。脾胃虚冷，吃食即吐，胸中妨闷，宿食不消。

59308　厚朴散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟)　人参一两(去芦头)　吴茱萸半两(汤浸七遍，焙干，微炒)　青橘皮半两(汤浸，去白瓤，焙)　白术一两　白茯苓一两　草豆蔻一两(去皮)　桂心半两　高良姜半两(锉)　附子半两(炮裂，去皮脐)　甘草二两(炙微赤，锉)

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分、大枣三个，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】虚劳。脾胃气不和，心腹冷气，不思饮食。

59309　厚朴散

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】厚朴五两（去粗皮，细锉，用生姜五两研取汁，和浸厚朴一宿，以生姜捏，焙干后微火炒令香熟紫色烟尽为度） 人参一两（去芦头） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 白术一两 诃黎勒二两（煨，用皮） 草豆蔻一两（去皮） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服一钱，食前以生姜枣汤调下。

【主治】虚劳，脾胃不和，少思饮食，或时自泻。

59310 厚朴散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 人参一两（去芦头） 附子一两（炮裂，去皮脐） 白术一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 黄耆三分（锉） 白茯苓一两 桂心一两 石斛一两（去根，锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 白芍药三分

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓，稍热服，一日三四次。

【主治】虚劳。四肢逆冷，乏力少气，不能饮食。

59311 厚朴散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【异名】厚朴煮散（《圣济总录》卷十七）。

【组成】厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 诃黎勒一两半（煨，用皮） 木香一两 苍术一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 当归一两（锉，微炒） 桔梗一两（去芦头） 陈橘皮二两（汤浸）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加大枣三个，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】冷气攻心腹，胀满疼痛，饮食不消，四肢羸瘦。

59312 厚朴散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁，炙香熟） 赤茯苓一两 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 白术一两 人参一两（去芦头） 高良姜一两（锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】冷热气不和，心痛腹满，不能饮食。

59313 厚朴散

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 桂心三分 赤芍药三分 半夏三分（汤洗七遍去滑） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 甘草半两（炙微赤，锉） 麦门冬三分（去心） 紫苏子三分（微炒） 桔梗半两（去芦头） 人参三两（去芦头） 大腹皮半两（锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】腹虚胀满膨膨，饮食不下，烦热不得眠卧。

59314 厚朴散

【方源】《圣惠》卷四十六。

【异名】厚朴汤（《圣济总录》卷六十六）。

【组成】厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 白术三分 贝母三分（煨微黄） 紫菀一两（去苗） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 人参一两（去芦头） 杏仁三两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 甘草半两（炙微赤，锉） 半夏一两（汤洗七遍去滑）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咳嗽，呕吐，寒热，不下饮食。

59315 厚朴散

【方源】《圣惠》卷四十七。

【异名】厚朴汤（《圣济总录》卷一六二）。

【组成】厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 甘草半两（炙微赤，锉） 肉豆蔻三

分(去壳)　黄连三分(去须)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,煎至五分,去滓,温温频服。

【主治】霍乱吐泻不止。

59316　**厚朴散**

【方源】方出《圣惠》卷四十七,名见《普济方》卷二〇一。

【组成】厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　桂心半两　枳实半两(麸炒微黄)　半夏半两(汤洗七遍去滑)　人参半两(去芦头)　白术一两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓,温温频服。

【主治】霍乱呕吐,脾胃虚冷,气膈,不思饮食。

59317　**厚朴散**

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　桂心半两　枇杷叶一分(去毛,炙微黄)　枳实半两(麸炒微黄)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】霍乱,呕吐腹胀。

59318　**厚朴散**

【方源】《圣惠》卷四十七。

【组成】厚朴二两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　吴茱萸一两(汤浸七遍,微炒)　白茯苓一两　桔梗一两(去芦头)　芎䓖一两　白术二两　附子一两(炮裂,去皮脐)　陈橘皮二两(汤浸,去白瓤,焙)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至五分,去滓,稍热服。

【主治】中焦虚寒,好吐白沫清涎,吞酸。

59319　**厚朴散**

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】厚朴一两半(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　人参一两(去芦头)　白术一两　吴茱萸半两(汤浸七遍,焙干,微炒)　木通三分(锉)　桂心三分　赤茯苓三分　陈橘皮二两(汤浸,去白瓤,焙)　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】膈气。不能食,腹内冷气,或吐逆。

59320　**厚朴散**

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】厚朴一两半(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　吴茱萸半两(汤浸七遍,焙干,微炒)　人参一两(去芦头)　陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)　白术一两　甘草半两(炙微赤,锉)　高良姜半两(锉)　桂心半两

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】五膈气。心胸久冷结滞,时多呕吐酸水,不思饮食。

59321　**厚朴散**

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　沉香三分　青橘皮半两(汤浸,去白瓤,焙)　槟榔半两　丁香半两　诃黎勒皮一两半　桂心半两　白术三分　高良姜三分(锉)　草豆蔻一两(去皮)　木香三分　人参三分(去芦头)　甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】膈气。脾胃久冷,宿食不消,心腹虚胀,四肢瘦弱。

59322　**厚朴散**

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】厚朴二两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　吴茱萸半两(汤浸七遍,焙干,微炒)　桂心一两　白术一两　陈橘皮一两半(汤浸,去白瓤,焙)

【用法】上为细散。每服二钱,以热酒调下,

不拘时候。

【主治】膈气。心胸中虚寒疼痛。

59323 **厚朴散**

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 紫苏茎叶三分 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 赤茯苓三分 前胡三分（去芦头） 半夏三分（汤洗七遍去滑） 槟榔三分

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心腹胀满，痰饮不下食。

59324 **厚朴散**

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 川大黄一两（锉碎，微炒） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 木香半两 桂心半两 槟榔三分

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，一日三四次。

【主治】悬饮。心腹气滞，两胁多疼。

59325 **厚朴散**

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】厚朴三分（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 高良姜半两（锉） 桂心半两 神曲一两（微炒） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 诃黎勒皮三分 赤茯苓一两 干姜半两（炮裂，锉） 白术半两 大腹皮半两（锉） 人参三分（去芦头） 草豆蔻三分（去皮） 甘草一分（炙微赤，锉） 半夏半两（汤洗七遍去滑）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，加生姜半分，煎至五分，去滓热服，不拘时候。

【主治】痰冷癖饮，腹膈虚胀，常吐酸水，时复呕逆，不下饮食。

59326 **厚朴散**

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】厚朴半两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 木香半两 人参半两（去芦头） 诃黎勒三分（煨，用皮） 干姜半两（炮裂，锉） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 当归半两（锉，微炒） 地榆三分（锉） 附子一两（炮裂，去皮脐）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至五分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】水谷痢。腹内疼痛，两胁虚胀，不思饮食。

59327 **厚朴散**

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 地榆一两（锉） 当归一两（锉，微炒） 黄连一两（去须，微炒） 赤芍药半两 赤石脂二两 干姜一两（炮裂，锉） 禹余粮二两（烧醋淬三遍） 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒）

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】白痢。四肢不和，腹内疞痛。

59328 **厚朴散**

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 木香三分 黄连一两（去须，微炒） 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 干姜半两（炮裂，锉） 当归三分（锉，微炒）

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】久赤白痢，腹内冷痛，白多赤少。

59329 **厚朴散**

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 肉豆蔻一两（去壳） 当归三分（锉，微炒） 龙骨一两 木香半两 阿胶三分（捣碎，炒令黄燥）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分、大枣三个，煎至五分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】久冷痢，食不消化，心腹疞痛，四肢少力。

59330 **厚朴散**

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　木香半两　当归三分(锉碎,微炒)　熟干地黄一两　半夏半两(汤洗七遍去滑)　人参三两(去芦头)　白茯苓三分　白芍药半两　干姜半两(炮裂,锉)　桂心半两　牛膝三分(去苗)　陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙)　白术三分　附子三分(炮裂,去皮脐)　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分、大枣三个,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妇人冷劳气,面色萎黄,四肢羸瘦,多卧少起,不欲饮食,身体虚困。

59331　厚朴散

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　白茯苓一两　桂心一分　白术一两　诃黎勒皮二分　陈橘皮二分(汤浸,去白瓤,焙)　人参一两(去芦头)　细辛半两　甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三个,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妇人体虚,感于寒气,时有咳嗽。

59332　厚朴散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　皂荚一两(去皮,涂酥炙令焦黄,去子)　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为细散。每服一钱,点好茶调下,不拘时候。

【主治】妊娠伤寒,头痛,身体烦热。

59333　厚朴散

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　白茯苓一两　黄连半两(去须)　干姜半两(炮裂,锉)　木香半两　诃黎勒一两(煨,用皮)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加大枣三枚,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】妊娠水谷痢。

59334　厚朴散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】厚朴一两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　白术一两　芎䓖一两　白芍药一两　干姜半两(炮裂,锉)　当归一两(锉,微炒)　人参半两(去芦头)　甘草一分(炙微赤,锉)　熟干地黄一两　诃黎勒三分(煨,用皮)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加大枣三个,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】妊娠胎动,时时腹痛,频频下利,渐觉羸瘦,面色萎黄,不欲饮食。

59335　厚朴散

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】厚朴二两(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)　草豆蔻一两(去皮)　人参三分(去芦头)　芎䓖三分　白术三分　阿胶三分(捣碎,炒令黄燥)　当归三分(锉,微炒)　干姜半两(炮裂,锉)　诃黎勒一两(煨,用皮)　吴茱萸一分(汤浸七遍,晒干,微炒)　甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加大枣三个,煎至六分,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】妊娠冷气攻心腹痛,或不纳饮食。

59336　厚朴散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】厚朴(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　陈橘皮(汤浸,去白瓤,焙)　人参(去芦头)各三分　肉豆蔻(去壳)　红豆蔻　桂心　白术　干姜(炮裂,锉)　甘草(炙微赤,锉)各半两

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后霍乱,吐泻不止。

59337 **厚朴散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】厚朴三分（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 丁香半两 白术三分 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 草豆蔻一两（去皮） 芎䓖半两

【用法】上为细散。每服一钱，以醋汤调下，不拘时候。

【主治】产后脾胃伤冷，心胸气滞，咳噫不止。

59338 **厚朴散**

【方源】《圣惠》卷七十九。

【异名】厚朴汤（《普济方》卷三五五）。

【组成】厚朴一两半（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 干姜三分（炮裂，锉） 黄连一两半（去须，微炒） 当归一两（锉，微炒）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，一日三四次。

【主治】产后痢，下部冷疼。

59339 **厚朴散**

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 赤茯苓三分 人参三分（去芦头） 当归三分（锉，微炒） 甘草一分（炙微赤，锉） 诃黎勒皮三分 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣二个，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后两胁胀满，胸腹妨闷，不下饮食。

59340 **厚朴散**

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】厚朴半两（刮去皱皮，涂生姜汁，炙令香熟） 川大黄一分（锉碎，微炒） 人参一分（去芦头） 陈橘皮一分（汤浸，去白瓤，焙） 甘草一分（炙微赤，锉） 朴消一分

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿伤寒挟实，心腹胀满，不欲乳食。

59341 **厚朴散**

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】厚朴一分（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 人参一分（去芦头） 诃黎勒一分（煨，用皮） 肉豆蔻一枚（去壳） 白术一分 干姜半分（炮裂，锉） 黄连一分（去须，微炒） 地榆一分（微炙，锉） 甘草半分（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服半钱，以粥饮调下，一日三四次。

【主治】小儿脾胃气不和，洞泄下痢不止，羸瘦食少。

59342 **厚朴散**

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】厚朴半两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 黄连半两（去须，微炒） 丁香一分 肉豆蔻一分（去壳） 当归一分（锉，微炒） 木香一分 龙骨半两 白术一分

【用法】上为细散。每服半钱，以粥饮调下，一日三四次。

【主治】①《圣惠》：小儿水谷痢，羸瘦面黄，不欲饮食。②《圣济总录》：小儿肠胃风冷，泄痢水谷，腹胁胀满，不欲饮。

59343 **厚朴散**

【方源】《圣惠》卷九十三。

【异名】诃黎勒散（《圣济总录》卷一七九）。

【组成】厚朴一分（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 枳壳一分（麸炒微黄，去瓤） 诃黎勒一分（煨，用皮） 当归一分（锉，微炒） 赤芍药一分

【用法】上为细散。每服半钱，以米饮调下，一日三四次。

【主治】①《圣惠》：小儿曩痢，两胁虚胀，腹痛，不欲饮食。②《圣济总录》：小儿胃风泄泻。

59344 **厚朴散**

【方源】《博济》卷四。

【异名】厚朴汤（《圣济总录》卷一七八）。

【组成】厚朴(去皮,以姜汁涂炙令香)　苍术　陈皮(去白)各一两　干姜三分　甘草半两

【用法】上为细末。每服一钱,水一盏,加生姜三片、大枣一个,同煎至六分,热服。

【功用】解肌。

【主治】①《博济》:小儿外伤风冷。②《圣济总录》:小儿冷痢,便下青白,或如凝脂,或下瘀黑。

59345　厚朴散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】厚朴一两半(去皴皮,涂生姜汁,炙香熟)　附子三分(炮裂,去皮脐)　白龙骨一两　芎䓖三分　当归一两(切碎,炒)

【用法】上为散。每服二钱,水一中盏,加生姜三片、大枣二个,同煎六分,去滓,食前温服。

【主治】小肠虚冷,脐下急痛,小便滑数。

59346　厚朴散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【异名】厚朴汤(《圣济总录》卷三十六)。

【组成】厚朴(去粗皮,用生姜自然汁炙香熟)二两　白术一两　陈橘皮(汤浸,去白瓤,焙干)一两　甘草半两(炙)　桂心半两(去粗皮)

【用法】上为散。每服三钱,水一中盏,加生姜三片,大枣二个,同煎至六分,去滓,食前温服。

【功用】温中顺气进食。

【主治】①《医方类聚》引《简要济众方》:胃气不和。②《圣济总录》:足阳明胃疟,寒热汗出,食则支满腹大。

59347　厚朴散

【方源】《医方类聚》卷十引《神巧万全方》。

【组成】厚朴一两半(姜汁炙)　陈橘皮(去瓤)　附子(炮)　诃黎勒皮各一两　当归(炒)　肉豆蔻各三两　吴茱萸一分(汤浸七遍,炒)　木香　桔梗各半两　甘草一分(炙)

【用法】上为末。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分、大枣三个,煎至六分,去滓,食前热服。

【主治】大肠虚冷,肠鸣泄痢,腹胁气痛,饮食不化。

59348　厚朴散

《医方类聚》卷五十三引《神巧万全方》。为《医方类聚》卷五十四引《通真子伤寒括要》"厚朴汤"之异名。见该条。

59349　厚朴散

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙,锉)　黄连(去须,微炒)　干姜(炮)　当归(切,焙)各一两　白茯苓(去黑皮)　无食子各半两

【用法】上为细散。每服二钱匕,食前粥饮调下。

【主治】小肠受寒,腹痛下重,便利脓血。

59350　厚朴散

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】厚朴(去粗皮)　附子(炮裂,去皮脐)各四两　干姜(炮)三两(上三味,同艾滓三两杵,研为粗末,用老生姜四两擦碎,拌前四味同炒令紫色,入后药)　肉豆蔻仁　诃黎勒皮各一两半　吴茱萸(汤浸七遍去涎,焙干,炒)　草豆蔻仁　缩砂仁　陈橘皮(汤浸,去白,焙)各一两

【用法】上为散。每服二钱匕,食前粟米饮调下。

【主治】脾虚,大便滑泄,肌体羸瘦,不能饮食。

59351　厚朴散

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁浸一宿,炙,锉)二两　草豆蔻(和皮)　干姜(炮)　白术　诃黎勒(炮,去核)各一两　五味子　甘草(炙,锉)各三分　陈橘皮(汤浸,去白,焙)一两

【用法】上为散。每服三钱匕,陈米饮调下。如酒食伤,温酒调下;霍乱,用冷米饮下。

【主治】脾脏虚冷,泄痢不止,及酒食所伤。

59352 **厚朴散**

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】厚朴（去粗皮，锉，姜汁浸一宿，炒）四两　生姜二斤（净洗，切片，焙干，炒令紫色）　甘草（锉，炒）二两　陈橘皮（汤浸，去白，炒）六两　草豆蔻（去皮，锉细，炒）二两

【用法】上为散。每服二钱匕，沸汤入盐点下。脾气等疾，每服三钱匕，水一盏，加生姜二片，大枣二枚（擘破），煎至六分，温服。

【功用】消痰下气。

【主治】呕吐不食。

59353 **厚朴散**

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】厚朴（去粗皮）一斤　生姜半斤（去粗皮，切，焙）　大枣一升（去核，焙）　甘草四两

【用法】用水三斗，煮尽水为度，烂捣，拍作饼子，焙干，再捣为散。每服一钱，沸汤点下。

【功用】和胃顺气。

【主治】干呕。

59354 **厚朴散**

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙令紫，锉）一两　干姜（半生半炮裂）一两　陈橘皮（汤浸，去白，焙）三分　白术一两　甘草（半生半炙）半两

【用法】上为散。每服三钱匕，空心米饮调下。如霍乱吐泻，新汲水调下，日晚再服。

【主治】一切水泻及冷痢。

59355 **厚朴散**

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉）　诃黎勒皮各一两　甘草（炙，锉）　黄连（去须，微炒）　肉豆蔻（去壳）　白术（锉，炒）　干姜（炮）　赤茯苓（去黑皮）各三分

【用法】上为散。每服二钱匕，温米饮调下。

【主治】暴水泻不止。

59356 **厚朴散**

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙令紫）三两　甘草（炮）　白芷　干姜（炮）　茴香子（略炒）各半两　陈橘皮（去白，焙干）一两　吴茱萸（汤洗，焙干，炒）三分

【用法】上为散。每服二钱匕，凡气不和，盐汤调下；霍乱吐泻，煎木瓜、紫苏汤调下；泄泻，米饮调下；赤白痢，甘豆汤调下，并食前服。

【主治】气滞泻痢，霍乱。

59357 **厚朴散**

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】厚朴（去粗皮，以生姜汁浸一日，炙令干）一两半　诃黎勒（麸裹煨黄，去核）三分　黄连（去须，炒令紫色）一两　木香三分　地榆　干姜（炮裂）　甘草（炙令赤色）　肉豆蔻（去壳）各半两

【用法】上为散。每服三钱匕，空心陈粟米煎饮调下，日午、夜卧再服之。

【主治】脾劳，泄泻日久，后成毒痢，或下黄脓，或赤白相杂，腹内疞痛，里急后重，所注频数。

59358 **厚朴散**

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙熟）三两　吴茱萸（水浸半日，炒）三分　茴香子（微炒）　干姜（锉，炒）　甘草（炙）　陈橘皮（去白，焙）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，食前煎紫苏、木瓜汤调下。

【主治】妊娠下痢，日夜频并，脐腹撮痛。

59359 **厚朴散**

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙）三分　人参　赤石脂　龙骨各一两　地榆　干姜（炮）　当归（切，焙）各半两　黄连（去须）一两

【用法】上为散。每服半钱匕，空心米饮调下，午后再服。

【主治】小儿赤白痢腹痛，日夜频数。

59360 **厚朴散**

【方源】《幼幼新书》卷二十八引张涣方。

【组成】厚朴(生姜汁制) 诃黎勒(炮,取皮) 肉豆蔻各一两 白术 干姜(炮)各半两

【用法】上为细末。每服一钱,水八分一盏,加生姜、粟米各少许,煎五分,去滓温服。

【主治】小儿洞泄注下。

59361 **厚朴散**

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】厚朴 牡蛎 白术各半两

【用法】上为细末。每服二钱,空心米饮调下,一日二三次。

【主治】白浊。

59362 **厚朴散**

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】厚朴半两 天南星三分 白术 人参 干蝎各半钱

【用法】上为细末。每服一钱,水一盏,加生姜二片,大枣一个,同煎至半盏,食前温服。

【主治】胃虚呕吐,腹胀坚硬,饮食减少,因生虚风者。

59363 **厚朴散**

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】厚朴二两 肉豆蔻一个 草豆蔻四个

【用法】上为细末。每服二钱,水一盏,盐一捻,煎至八分,去滓热呷。如不愈,再服。妇人不用盐,加生姜二片同煎。

【主治】霍乱吐泻。

59364 **厚朴散**

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】白茯苓一两半 肉豆蔻(面裹煨)半两 厚朴(去皮,生姜制)一两 枇杷叶(炙,去毛)一钱

【用法】上为细末。每服一钱,水一小盏,加生姜二片,煎至六分,去滓,空心温服,不拘时候。

【主治】小儿胃冷气逆,吐不思食。

59365 **厚朴散**

【方源】《宣明论》卷十四。

【组成】厚朴 诃子皮半两 使君子一个 拣丁香十个 茯苓 吴白术 青皮各二钱 甘草一钱(炒)

【用法】上为末。每服一字,一岁加减,用清米汤下。

【主治】小儿虚滑,泻痢不止。

59366 **厚朴散**

【方源】《百一》卷十九。

【组成】厚朴(姜汁制) 白术各一两 神曲(炒) 麦蘖(炒)各半两 藿香 甘草各一分

【用法】上为细末。每服一二钱,枣汤调下。

【主治】①《百一》:小儿脾胃诸疾。②《普济方》:小儿脾胃虚冷,或吐或泻。

59367 **厚朴散**

《普济方》卷三十九。为《保命集》卷中"厚朴汤"之异名。见该条。

59368 **厚朴散**

《普济方》卷一四二。为《圣济总录》卷二十九"补阴养阳厚朴散"之异名。见该条。

59369 **厚朴散**

【方源】《普济方》卷一九九。

【组成】好厚朴一斤半(去皮,以生姜一斤半取汁涂,炙尽为度) 半夏一斤(汤洗过,以粟米炒黄)

【用法】上为散。每服二钱,水一盏,加生姜、大枣煎,去滓,早晚各一服。

【主治】山岚气,脾胃痰毒。

59370 **厚朴散**

《普济方》卷二〇一。为《肘后方》卷二"厚朴汤"之异名。见该条。

59371 **厚朴散**

《普济方》卷二二九。为《圣济总录》卷八十七"厚朴汤"之异名。见该条。

59372 **厚朴散**

【方源】《普济方》卷三四〇。

【组成】厚朴三两 吴茱萸三两 甘草 茴香子 干姜 陈橘皮各一两

【用法】上为细散。每服二钱匕，食前煎紫木瓜汤调下。

【主治】妊娠下痢，日夜频并，脐腹撮痛。

59373 **厚朴散**

【方源】《普济方》卷三六九。

【组成】干葛 苍术 陈橘（去瓤，用皮） 厚朴（去皮，以姜汁涂炙令香）各一两

【用法】上为末。每服一钱，水一盏，加生姜二片，大枣一个，同煎至六分，热服。

【主治】小儿外伤风冷，壮热憎寒，头痛体重，寒气逆，呕吐恶心，或手足厥冷，及脾胃不和。

59374 **厚朴散**

【方源】《金鉴》卷四十一。

【组成】厚朴 槟榔 木香 枳壳 青皮 陈皮 甘遂 大戟

【主治】单腹鼓胀、肠覃属气实者。

59375 **厚朴煎**

《鸡峰》卷十三。为《圣济总录》卷四十五“八味厚朴丸”之异名。见该条。

59376 **厚朴膏**

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】厚朴（制） 诃子（炮，去核） 白豆蔻（炮） 当归各半两 甘草（炙）一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡头子大。三岁一丸，食前白汤化下。

【主治】小儿吐泻，不思饮食。

【备考】本方方名，据剂型，当作“厚朴丸”。

59377 **厚肠丸**

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】川乌（炮） 肉桂 硫黄（另研） 赤石脂（煅）各一两 干姜（炒）二两

【用法】上为末，糯米糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】脾虚伤食，大便下赤白脓，肠鸣腹痛，泄下，米谷不化；小儿脾虚滑泄脱肛，疳瘦。

59378 **厚肠丸**

《卫生总微》卷十一。为《幼幼新书》卷二十九引张涣方“厚肠丹”之异名。见该条。

59379 **厚肠丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】钟乳粉二两 宣黄连（去须） 人参（去芦头） 白术 诃子（煨，去核） 肉豆蔻（面裹煨） 厚朴（生姜汁制） 白茯苓（去皮） 茴香（炒） 阿胶（蚌粉炒）各一两

【用法】上为细末，入钟乳粉同研匀，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心糯米送下。

【主治】脏气虚寒，下利不止，里急后重，脐腹疠痛。

59380 **厚肠丸**

【方源】《百一》卷六。

【异名】厚朴丸（《奇效良方》卷十四）。

【组成】白龙骨 干姜（炮） 附子（炮，去皮脐） 厚朴（姜制） 诃子（炮，去核） 肉豆蔻（面裹煨） 陈皮各等分

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，米饮送下。

【主治】久泻。

59381 **厚肠丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】人参（去芦） 白术（炒） 厚朴（去粗皮，姜制，炒） 丁香（不见火） 荜茇 红豆 诃子肉（煨） 附子（炮，去皮脐） 肉豆蔻（面裹煨） 神曲（炒） 缩砂仁 麦蘖（炒） 白豆蔻 良姜（炒）各二两 槟榔 胡椒 荜澄茄 白芍药 陈皮（去白，洗） 甘草（炙） 干姜（炮）各四两 肉桂五两（去粗皮，不见火） 白茯苓（去皮） 当归（去芦）各一两

【用法】上为细末，稀饧为丸，每二两作十丸。每服一丸或二丸，嚼细，白汤送下，不拘时候。

【主治】肠胃虚寒，不能克消水谷，大腑飧泄。

59382 **厚肠丸**

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】厚朴丸（《普济方》卷三九三）。

【组成】厚朴　青皮各二分　橘红　半夏　苍术　人参各三分　枳实　麦蘖面　神曲末各五分

【用法】上为极细末，水煮面糊为丸，如麻子大。每服二十丸，食前温水送下。

【主治】小儿失乳，以食饲之，不能克化，或生腹胀，四肢瘦弱，或痢色无常。

【宜忌】忌饱食。

59383　厚肠丸

《普济方》卷三八〇。为《圣济总录》卷一七三"厚朴丸"之异名。见该条。

59384　厚肠丹

【方源】《幼幼新书》卷二十九引张涣方。

【异名】厚肠丸(《卫生总微》卷十一)。

【组成】黄连(去须)　川楝子各一两　木香　阿胶(炙)　吴茱萸(微炒)　当归(洗，焙干)各一两

【用法】上为细末，粟米饭为丸，如黍米大。每服十丸，乳食前米饮送下。

【主治】①《幼幼新书》引张涣方：血痢肠虚。②《普济方》：脱肛。

59385　厚肠汤

【方源】《三因》卷十二。

【组成】罂粟壳八两(锉，炒)　地榆六两　白术　紫苏叶　木瓜干各二两

【用法】上为散。每服四钱，水一盏半，加生姜七片，大枣二个，煎七分，去滓，空腹服。

【主治】下痢赤白。

59386　厚肠散

【方源】《赤水玄珠》卷八。

【组成】川黄连(好酒煮一日夜，煮干炒)

【用法】上为末。每服二钱，空心米饮下。

【主治】腹疼泻黄，及痢久不止，热药不效者，及酒积泄。

59387　厚胃丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】诃子皮(纸裹蘸湿煨香，去核)　龙骨(煅)　肉豆蔻(面裹煨)　附子(炮，去皮脐)赤石脂(煅)　木香(不见火)　川白姜(炮，洗)各等分

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，食前米饮送下。

【主治】脾胃不和，泄泻不止。

59388　厚脾丸

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】厚朴(去粗皮，姜制)半两　肉豆蔻一个(面裹煨，去面)　龙骨半两(煅)　诃子肉(煨，去核)半两

【用法】上为细末，面糊为丸，如绿豆大。每服十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】小儿疳劳虚冷，白痢泄泻，手足逆冷。

59389　厚脾散

【方源】《痘疹仁端录》卷八。

【组成】龙骨　枯矾　米仁　山药　扁豆　赤石脂

【主治】泄泻不止。

59390　厚腹丸

【方源】《史载之方》卷下。

【组成】地榆　天麻　川芎　赤石脂各一分　诃子皮　削术各三分　厚朴(去皮，姜炙)一分　木香半分

【用法】上为细末，枣肉为丸。每服三十丸，不拘时候。

【主治】小儿泄。

59391　厚朴煮散

《圣济总录》卷十七。为《圣惠》卷四十三"厚朴散"之异名。见该条。

59392　厚朴煮散

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】厚朴(去粗皮，生姜汁炙)　高良姜　白术　干木瓜(锉)各一两　人参　白茯苓(去黑皮)各一两半　肉豆蔻(煨，去壳)二枚　甘草(炙，锉)　干姜(炮)各半两　草豆蔻(煨，去皮)三枚

【用法】上为散。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，空腹温服，一日二次。

【主治】脾胃虚冷，肠滑泄利，腹多胀满。呕

逆不思食，羸瘦。

59393 厚朴煮散

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【异名】调胃散（《宣明论》卷八）。

【组成】厚朴（去粗皮） 藿香叶 半夏（三味用生姜八两同为末，淹一宿，焙） 陈橘皮（去白，焙） 甘草（生）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，水一盏，加生姜三片，同煎至七分，去滓温服。

【主治】哕逆恶心，气不下降。

59394 厚朴煮散

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙）一两半 白术 芎䓖 干姜（炮） 当归（切，焙） 诃黎勒（煨，去核） 陈橘皮（汤浸，去白，焙）各一两 人参 芍药各半两 甘草（炙）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加大枣二个（擘），煎取七分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】妊娠腹胀，不欲饮食。

59395 厚朴煎丸

【方源】《普济方》卷二十二引《孟氏诜诜方》。

【组成】茴香（炒黄） 川椒（炒少时）各四两 附子（炮） 益智仁各二两 梓朴半斤（去皮，锉如指面大，用生姜半斤带姜皮切作片子，用水三升，慢火煮干，去姜） 干姜四两（锉碎如骰子大，用甘草二两锉半寸长，水五升，同煮焙干，去甘草）

【用法】上为细末，用生姜煮肥枣约一斤，去皮取肉为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮送下。

【功用】补脾胃，进饮食，滋荣卫，保固精血。温中升降气血，化痰涎。

59396 厚朴煎丸

《杨氏家藏方》卷六。为《圣济总录》卷五十四“姜朴丸”之异名。见该条。

59397 厚朴煎丸

【方源】《百一》卷二。

【异名】煮朴丸（《准绳·类方》卷五）。

【组成】厚朴（极厚者，去粗皮，锉指面大） 生姜一斤（不去皮，净洗，切作片子）各一斤（二味用水五升，同煮水尽，去姜，只收厚朴焙干） 舶上茴香四两（炒） 干姜四两（锉骰子大） 甘草二两（锉半寸长，二味再用水五升，同焙干，厚朴一处煮水尽，不用甘草，只将干姜、厚朴焙干） 附子二两（炮，去皮脐）

【用法】上为细末，生姜煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心米饮或酒送下。

【功用】温中下气，去痰进食。

59398 厚朴七枣汤

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】厚朴一斤 川乌头 茴香 益智 缩砂各半斤 干姜四两 甘草六两

【用法】上为细末。每服二钱，水二盏，加大枣七个，煎取一盏，去滓，空心、食前稍热服。

【主治】脾胃虚弱，内变寒气，泄泻注下，水谷不分，腹胁胀满，脐腹疼痛，腹中虚鸣，呕吐恶心，胸膈痞闷，困倦少力，不思饮食。

59399 厚朴七味汤

《外台》卷七。为《金匮》卷上“厚朴七物汤”之异名。见该条。

59400 厚朴七物汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】厚朴七味汤（《外台》卷七）、七物厚朴汤（《袖珍》卷三引《圣惠》）。

【组成】厚朴半斤 甘草三两 大黄三两 大枣十枚 枳实五枚 桂枝二两 生姜五两

【用法】上药以水一斗，煮取四升。每服八合，温服，每日三次。

【主治】①《金匮》：病腹满，发热十日，脉浮而数，饮食如故。②《千金》：腹满气胀。

【宜忌】《外台》：忌海藻、菘菜、生葱、羊肉、饧。

【加减】呕者，加半夏五合；下利，去大黄；寒多者，加生姜至半斤。

【方论选录】①《沈注金匮要略》：此有表证腹满也。发热十日之久，脉尚浮数，当责风邪

在表。然风气内通于肝，肝盛乘胃，故表见发热，而内作腹满；风能消谷，即能食而为中风，所以饮食如故。用小承气荡涤肠胃之热，桂、甘、姜、枣调和营卫，而解在表之风耳。②《张氏医通》：此本小承气合桂枝汤，中间裁去白芍之酸收，不致引邪入犯营血。虽同用桂枝、甘草，与桂枝汤泾渭攸分。其厚朴独倍他药，正以泄气之浊逆耳。

59401　厚朴人参汤

【方源】《外台》卷六引《广济方》。

【组成】厚朴四两(炙)　橘皮二两　人参二两　高良姜一两　当归一两　藿香一两

【用法】以水七升，煮取二升五合，绞去滓，分三次温服，服别相去如人行六七里。

【主治】霍乱心腹痛，烦呕不止。

【宜忌】忌生冷粘腻。

59402　厚朴人参汤

《伤寒总病论》卷三。为《伤寒论》“厚朴生姜半夏甘草人参汤”之异名。见该条。

59403　厚朴三物汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】厚朴汤(《千金翼》卷十八)、三物汤(《血证论》卷八)。

【组成】厚朴八两　大黄四两　枳实五枚

【用法】上药以水一斗二升，先煮二味，取五升，纳大黄，煮取三升，温服一升。以利为度。

【主治】腹满痛，大便闭。

①《金匮》：痛而闭者。②《千金翼》：腹满发热数十日。腹中热，大便不利。③《症因脉治》：暑湿腹痛，大便结。④《金匮翼》：食积痛，寒饮食过伤，心腹卒痛，如锥刺之状，若伤湿热之物，不得化而闷乱便秘者。

【方论选录】①《金匮玉函经二注》：闭者，气已滞也。《经》曰塞也，通因通用，此之谓也。于是以小承气通之。乃易其名为三物汤者，盖小承气君大黄以一倍，三物汤君厚朴以一倍者，知承气之行，行在中下也；三物之行，因其闭在中上也。绎此，可启悟于无穷矣。②《金匮要略心典》：痛而闭，六腑之气不行矣。厚朴三物汤与小承气同，但承气意在荡实，故君大黄；三物意在行气，故君厚朴。

59404　厚朴三棱丸

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】厚朴(去粗皮，为末，生姜汁拌和，银器内炒干)六两　京三棱(炮，锉)　半夏(汤洗七遍去滑，炒干)　槟榔(锉)各三两

【用法】上为末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前生姜汤送下。

【主治】心腹虚胀，两胁疼痛，不欲饮食。

59405　厚朴干姜丸

《圣济总录》卷七十四。为《医方类聚》卷十引《简要济众方》“厚朴丸”之异名。见该条。

59406　厚朴大黄汤

【方源】《金匮》卷中。

【异名】枳朴大黄汤(《赤水玄珠》卷四)。

【组成】厚朴一尺　大黄六两　枳实四枚

【用法】上药以水五升，煮取二升，分二次温服。

【主治】①《金匮》：支饮胸满。②《症因脉治》：腹痛，脉数，应下之症。

【方论选录】①《金匮玉函经衍义》：凡仲景方，多一味，减一药，与分两之更重轻，则异其名，异其治，有如转丸者。若此三味，加芒消则谓之大承气，治内热腹实满之甚；无芒消，则谓之小承气，治内热之微甚；厚朴多，则谓之厚朴三物汤，治热痛而闭。今三味以大黄多，名厚朴大黄汤，而治是证。上三药皆治实热而用之。②《千金方衍义》：此即小承气汤，以大黄多，遂名厚朴大黄汤；若厚朴多，即名厚朴三物汤。此支饮胸满，必缘其人素多湿热，浊饮上逆所致，故用荡涤中焦药治之。③《金匮要略心典》：胸满疑作腹满。支饮多胸满，此何以独用下法？厚朴大黄与小承气同，设非腹中痛而闭者，未可以此轻试也。

59407　厚朴六合汤

【方源】《元戎》。

【组成】四物汤四两　厚朴(姜制)一两

枳实（麸炒）半两

【主治】虚劳气弱，咳嗽喘满；妊娠伤寒汗下后，虚痞胀满者。

59408 厚朴石膏汤

《圣济总录》卷六十七。为《金匮》卷上“厚朴麻黄汤”之异名。见该条。

59409 厚朴半夏汤

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉） 半夏（汤洗七遍，焙）各一两 枳壳（去瓤，麸炒）半两 大黄（锉）二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一枣大（拍碎），煎至八分，去滓，空心温服，如人行五里再服。

【主治】伤寒大便不通，呕吐。

59410 厚朴半夏汤

《易简方》。为《金匮》卷下“半夏厚朴汤”之异名。见该条。

59411 厚朴豆蔻汤

《圣济总录》卷九十六。为原书卷七十五“厚朴饮”之异名。见该条。

59412 厚朴豆蔻散

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】厚朴（去粗皮，锉，姜制，炒） 干姜（炮，洗） 草果仁 肉豆蔻（面裹煨） 良姜（炒）各七钱半 人参（紧实者，去芦） 缩砂仁各半两 白术一两半（麸炒） 丁香三两半（不见火） 藿香叶七钱（去土） 木香三分半（湿纸裹煨）

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，加肥枣二个，煎至七分，温服，不拘时候。

【功用】补脾养胃。

【主治】脾胃不足，饮食生冷伤动所致。

59413 厚朴泻心汤

【方源】《伤寒微旨论》卷下。

【组成】半夏半两 黄连 厚朴各一两 干姜 白术各二两 人参三分

【用法】上锉，如豆大，分作八服。每服水二盏半，生姜二分，切为片，同煎至一盏半，去滓，分两次温服。如半日许未得利，再一服。

【主治】伤寒二三日，两脉沉数微涩，寸脉不甚浮大，胸腹满闷，按之不痛。

59414 厚朴建中汤

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】厚朴 生姜 大枣各一斤 半夏（合杵，焙） 甘草各四两 人参一两半 陈皮二两 良姜 草豆蔻仁 白术 神曲 藿香各一两

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓，食后服。

【功用】调适阴阳，建中补气，辟风寒湿冷非节之气、山岚瘴疟等疾气。

【主治】脾胃虚弱，忽中湿冷，心腹暴痛，胁肋胀满，水谷化迟，肠鸣泻痢，后重里急，脐腹冷痛，胸满气逆，呕吐恶心，手足不和，体重节痛，哕噫吞酸，不思饮食，怠惰嗜卧，四肢少力。

59415 厚朴枳壳汤

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】厚朴（去粗皮，涂生姜汁炙） 枳壳（去瓤，麸炒） 甘草（炙，锉）各三分 秦艽（去苗土）一两半 陈橘皮（汤浸，去白，焙）三分 半夏（汤洗去滑，生姜汁制）一两半 桂（去粗皮） 麻黄（去根节） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒） 黄芩（去黑心） 石膏（碎） 赤茯苓（去黑皮） 细辛（去苗叶）各半两 大戟（去苗，锉）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，生姜三钱，大枣二个（擘破），水一盏，煎至七分，去滓温服，每日三次。

【主治】上气胸满，喘息气绝，痰水盛溢。

59416 厚朴枳实汤

【方源】《保命集》卷中。

【异名】厚朴枳实散（《保命歌括》卷二十二）。

【组成】厚朴 枳实各一两 诃子一两（半生半熟） 木香半两 黄连二钱 甘草三钱（炙） 大黄二钱

【用法】上为末，每服三五钱，水一盏半，煎至一盏，去滓温服。

【主治】虚滑泻痢，久不愈者。

【备考】虚滑久不愈者，多传变为痢疾，太阴传于少阴，是谓贼邪，先以此汤防其传变。

59417　厚朴枳实散

《保命歌括》卷二十二。为《保命集》卷中"厚朴枳实汤"之异名。见该条。

59418　厚朴荜茇丸

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】荜茇　陈橘皮　胡椒　白石脂　龙骨各一两　干姜　诃子皮　缩砂仁　白术各三分　当归　桂各半两　厚朴一两半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】久痢不止，食不消化。

59419　厚朴草果汤

【方源】方出《临症指南医案》卷六，名见《温病条辨》卷二。

【组成】厚朴一钱半　杏仁一钱半　草果仁一钱　半夏一钱半　茯苓三钱　广皮白一钱半

【功用】《温病条辨》：苦辛通降。

【主治】湿疟。湿邪内蕴，脾阳不主宣达，舌白脘闷，寒起四末，渴喜热饮。

【方论选录】《成方便读》：夫疟之一证，多因伏暑所致。然暑必兼湿，若脾胃湿盛之人受之者，发则以上等证作矣。故虽热渴，而仍欲热饮也。治之者，当以苦辛温之法以化之，使湿化则暑无依附，而病自愈耳。草果辛温香燥，气猛而刚，能治太阴独胜之寒，可化脾部稽留之湿；助以半夏、茯苓之燥，厚朴、广皮之散以佐之；湿阻则周身气机皆滞，肺主一身之气，故以杏仁开其肺，使之清肃下行，其湿焉有不去者乎。

59420　厚朴茯苓汤

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【组成】厚朴(去粗皮，生姜汁炙)　赤茯苓(去黑皮)各一两半　陈橘皮(汤浸，去白，焙干)　人参各一两　甘草(炙，锉)半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜半分(拍碎)，同煎取半盏，去滓，食前温服。

【主治】伤寒后气未和，心腹胀满，不能饮食。

59421　厚朴香连丸

【方源】《幼科类萃》卷五。

【组成】黄连(净)三钱　木香　紫厚朴(制)　缩砂仁　夜明砂(隔纸炒)各三钱　诃子肉(炒)一钱

【用法】上为末，粳米饭为丸，如麻子大。每服十五丸，食前干艾叶、生姜煎汤送下。

【主治】小儿疳痢。

59422　厚朴桂心汤

【方源】《外台》卷六引《必效方》。

【组成】厚朴四两(炙)　桂心二两

【用法】上切。以水四升，煮取一升二合，绞去滓，内分六合，细细饮之。服了如其渴欲得冷水，尽意饮之。

【主治】霍乱后渴，口干，腹痛不止者。

【宜忌】忌生葱。

59423　厚朴健胃汤

【方源】《普济方》卷二十五引《十便良方》。

【组成】好厚朴二两　半夏一两　京枣二两(去核)　甘草一两半　丁香半两　生姜(切，焙干)一两半

【用法】上㕮咀，搅匀。每服二钱，加生姜一小块(擘破)，大枣一个，水一盏半，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】和脾胃，化痰涎，止逆，思饮食。

59424　厚朴麻黄汤

【方源】《金匮》卷上。

【异名】厚朴石膏汤(《圣济总录》卷六十七)。

【组成】厚朴五两　麻黄四两　石膏如鸡子大　杏仁半升　半夏半升　干姜二两　细辛二两　小麦一升　五味子半升

【用法】上药以水一斗二升，先煮小麦熟，

去滓，纳诸药，煮取三升，每次温服一升，一日三次。

【主治】①《金匮》：咳而脉浮。②《千金》：咳而大逆，上气胸满，喉中不利，如水鸡声，其脉浮者。

【方论选录】①《医门法律》：若咳而其脉亦浮，则外邪居多，全以外散为主，用法即于小青龙汤中去桂枝、芍药、甘草，加厚朴、石膏、小麦，仍从肺病起见。以故桂枝之热，芍药之收，甘草之缓，概示不用，而加厚朴以下气，石膏以清热，小麦引入胃中，助其升发之气，一举而表解脉和，于以置力于本病，然后破竹之势可成耳。一经裁酌，直若使小青龙载肺病腾空而去。②《沈注金匮要略》：此以脉之浮沉而分肺之营卫受病也。咳而脉浮，风邪在卫，即肺胀之类，其病尚浅，当使邪从表出。故以厚朴，杏仁下泄胸中气实，麻黄开腠驱邪、石膏以清风化之热，辛、半、干姜兼驱客寒而涤痰饮，五味收肺之热，小麦以调脾胃也。③《古方选注》：厚朴麻黄汤，大、小青龙之变方也。咳而上气作声，脉浮者，是属外邪鼓动下焦之水气上逆，与桂枝、芍药、甘草和营卫无涉。故加厚朴以降胃气上逆，小麦以降心气来乘，麻、杏、石膏仍从肺经泄热存阴，细辛、半夏深入阴分，袪散水寒，干姜、五味摄太阳而监制其逆，一举而泄热下气，散邪固本之功皆备，则肺经清肃之令自行，何患咳逆上气作声有不宁谧者耶？

【临症举例】咳嗽 《治验回忆录》：朱某，病患咳嗽，恶寒头疼，胸满气急，口燥烦渴、尿短色黄，脉浮而小弱。以《金匮》厚朴麻黄汤服药三剂，喘满得平，外邪解，烦渴止。再二剂，诸恙如失。

59425 厚朴温中汤

【方源】《内外伤辨》卷中。

【组成】厚朴(姜制) 橘皮(去白)各一两 甘草(炙) 草豆蔻仁 茯苓(去皮) 木香各五钱 干姜七分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水二盏，加生姜三片，煎至一盏，去滓，食前温服。

【功用】《谦斋医学讲稿》：温中散寒。

【主治】①《内外伤辨》：脾胃虚寒，心腹胀满，及秋冬客寒犯胃，时作疼痛。②《证治汇补》：脾胃着寒停食。

【方论选录】《成方便读》：夫寒邪之伤人也，为无形之邪，若无有形之痰、血、食积互结，则亦不过为痞满、为呕吐，即疼痛亦不致拒按也，故以厚朴温中散满者为君；凡人之气，得寒则凝而行迟，故以木香、草蔻之芳香辛烈，人脾脏以行诸气；脾恶湿，故用干姜、陈皮以燥之，茯苓以渗之；脾欲缓，故以甘草缓之；加生姜者，取其温中散逆除呕也。以上诸药，皆入脾胃，不特可以温中，且能散表，用之贵得其宜耳。

【备考】本方方名，《医方类聚》引作“厚朴汤”，无草豆蔻仁、木香。

59426 厚朴温中汤

【方源】《明医指掌》卷五。

【组成】厚朴(姜炒)八分 干姜七分 甘草(炒)六分 木香五分 陈皮八分 茯苓八分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，大枣二个，水二钟，煎八分服。

【主治】脾胃虚冷，心腹胀满疼痛。

59427 厚朴温中汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】厚朴 杏仁 半夏 枳壳 桔梗 炮姜 甘草 藿香 香茹 陈皮

【主治】中暑，脉沉细缓。

59428 厚朴温中饮

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】附子一钱半(炮) 厚朴一钱半(制) 白术一钱半(炒) 泽泻一钱半 吴萸一钱(醋炒) 木香一钱半 干姜一钱半(炒) 青皮一钱半(炒) 肉桂一钱半(去皮)

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】产后腹寒胀，脉紧涩者。

【方论选录】产后火虚，寒滞腹痛，而大便

溏泄,小便涩少,遂成腹胀,谓之寒胀。附子补火壮阳以生脾土,肉桂补火散寒以暖血分,干姜温中逐冷,吴萸温中降逆,白术健脾气以运化,厚朴散滞气以宽中,青皮平肝破气,木香调气醒脾,泽泻泻湿以利小便也。水煎温服。使火暖土强,则寒滞自化,而小水自快,大便亦实,安有腹胀疼痛之患乎。

59429　厚朴温肺散

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】厚朴(去粗皮,用糯米粥浸一次饭久,晒干,为末)一两半　葶苈子(微炒,捣为细末)一两　皂荚子一升(不蛀者,蒸两遍,焙干,为末)　接骨草(阴干,为末)三两　诃黎勒(煨,取皮为末)半两

【用法】上为散。每服两钱匕,空心以生姜蜜汤调下,晚饭后再服。若远行,炼蜜为丸,如弹子大,每服一丸,含化。

【主治】久患上气,胸胁支满。

59430　厚朴槟榔汤

【方源】《观聚方要补》卷二。

【组成】厚朴　槟榔　半夏　陈皮　泽泻　附子　木瓜各八分　木香四分　甘草一分　大腹皮一钱　珠参五分

【用法】加生姜,水煎服。

【主治】脾胃不和,成肿胀。

59431　厚朴橘皮丸

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙)一两　陈橘皮(汤浸,去白,焙)一两　木香一两　白术一两半　阿胶(炙燥)半两　当归(锉,焙)半两　干姜(炮)半两　诃黎勒皮半两　吴茱萸(洗,焙干,炒)一分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食前米饮送下。

【主治】胎动不安,心腹痛。

59432　厚朴橘皮丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】厚朴(去粗皮,用生姜制)三两　枳壳(麸炒,去瓤)　干姜(火炮裂)　良姜(锉)各一两二钱　青皮(去白)　陈皮(去白)　五灵脂　干蝎　桂(去皮)各八钱　肉豆蔻　草豆蔻　川乌头(炮裂,去皮脐)各四个　大附子(炮,去皮脐)　槟榔各三个　缩砂仁　益智仁　川椒(去目,出汗)　胡椒　丁香　木香　吴茱萸(汤洗七次,焙干,炒)各四钱　木通(锉)三钱

【用法】上为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸至四十丸,食前煎生姜、橘皮汤送下。

【主治】伤冷溏下,腹满膜胀,其状如覆栲栳,喘鸣奔急,鼻张口呿,厥气上下,不得分泄,又不任泻下药。

59433　厚朴橘皮煎

【方源】《医方大成》卷六引《澹寮方》。

【组成】厚朴(去皮,姜制)三两　枳壳(麸炒)　干姜(炮)　良姜各一两二钱　青皮　陈皮(各去白)　肉桂(去皮)　全蝎(去尾足毒)斟酌分量

【用法】上为末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,生姜、橘皮汤或紫苏汤送下。

【主治】伤冷溏泄,腹肚膜胀,其状如覆栲栳,喘息奔急,气不得舒。

59434　厚朴天南星丸

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】厚朴　天南星各等分

【用法】上为细末,姜汁煮糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,生姜汤送下,不拘时候。

【主治】脾虚停饮,痁疾。

59435　厚朴去干姜汤

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】厚朴(去皮,姜汁炒)　陈皮(泡,去浮白)　茯苓　炙草各等分

【用法】水煎服。

【主治】妊娠能食,腹痛后重,积秽稠粘之白痢。

59436　厚朴陈橘皮汤

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】厚朴(去粗皮,生姜汁炙)半两　陈

橘皮（汤浸，去白，焙） 甘草（炙，锉） 芎䓖 肉豆蔻（去壳） 赤茯苓（去黑皮） 防风（去叉） 吴茱萸（汤洗，焙干，炒） 羌活（去芦头）各一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，空心、食前温服。

【主治】飧泄，风邪干胃，食物不化，便利完出。

59437 厚朴半夏甘参汤

《医学入门》卷四。为《伤寒论》“厚朴生姜半夏甘草人参汤”之异名。见该条。

59438 厚朴姜夏草参汤

《内台方议》卷八。为《伤寒论》“厚朴生姜半夏甘草人参汤”之异名。见该条。

59439 厚朴半夏甘草人参汤

《医统》卷十四。为《伤寒论》“厚朴生姜半夏甘草人参汤”之异名。见该条。

59440 厚朴生姜人参甘草半夏汤

《医学纲目》卷三十一。为《伤寒论》“厚朴生姜半夏甘草人参汤”之异名。见该条。

59441 厚朴生姜半夏甘草人参汤

【方源】《伤寒论》。

【异名】厚朴汤（《千金》卷九）、厚朴人参汤（《伤寒总病论》卷三）、厚朴生姜人参甘草半夏汤（《医学纲目》卷三十一）、厚朴姜夏草参汤（《内台方议》卷八）、厚朴半夏甘草人参汤（《医统》卷十四）、厚朴半夏甘参汤（《医学入门》卷四）。

【组成】厚朴半斤（炙，去皮） 生姜半斤（切） 半夏半斤（洗） 甘草二两（炙） 人参一两

【用法】上药以水一斗，煮取三升，去滓，每服一升，温服，一日三次。

【功用】补中散滞，和胃降逆。

①《注解伤寒论》：和脾胃而降气。②《成方切用》引喻嘉言：益胃和脾，降气涤饮。③《医方集解》：补虚散滞。④《金鉴》：消胀散满，补中降逆。

【主治】中虚气滞，腹胀满，呕逆。

①《伤寒论》：伤寒发汗后，腹胀满者。②《圣济总录》：伤寒心腹胀满。③《张氏医通》：胃虚呕逆，痞满不食。④《胎产心法》：妊娠腹胀后重，赤白相兼之痢。

【方论选录】①《内台方议》：此汗后腹胀满者，为津液不足，气滞不通，壅而为满，为脾胀也。故用厚朴之苦，以泄腹满为君；生姜、半夏之辛，以散滞气为臣；人参之甘，生津液，补不足；甘草之甘，以缓其中者也。②《千金方衍义》：《伤寒论》原名厚朴生姜甘草半夏人参汤。本桂枝证误用麻黄发汗，浊阴之邪乘虚入里而致喘满，与泻心汤证似同而实小异。浊气填满，故首取厚朴以泄气滞，姜、半以破痰结，参、草以助清阳，清阳运动，而浊阴自除。本非结胸之寒热互结，故无藉于干姜，芩连，大枣也。③《古方选注》：太阴病，当腹满，是伤中也，与吐下后邪气入里腹胀治法不同。厚朴宽胀下气，生姜散满升津，半夏利窍通阴阳，三者有升降调中之理。佐以甘草和阴、人参培阳。补之泄之，则阴结散，虚满消。④《伤寒贯珠集》：发汗后，表邪虽解而腹胀满者，汗多伤阳，气窒不行也，是不可以徒补，补之则气愈窒；亦不可以迳攻，攻之则阳益伤，故以人参、甘草、生姜助阳气，厚朴、半夏行滞气，乃补泄兼行之法也。

【临症举例】腹胀 《岳美中医案集》：尹某，男性，自述心下胀满，日夜有不适感，是属虚胀症。投以厚朴生姜半夏甘草人参汤（厚朴12克，生姜9克，半夏9克，炙甘草6克，党参4.5克）。经复诊1次，未易方而愈。

威

59442 威灵丸

【方源】《普济方》卷二四二。

【组成】威灵仙一两 枳壳 槟榔 木香各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下。

【主治】干湿脚气，浮肿过膝，行步艰难。

59443 威灵散

【方源】《幼幼新书》卷十八引《惠济歌》。

【组成】威灵仙 仙灵脾 甘草(炙) 茯苓 子芩 青葙子 大青 芍药 大黄(蒸) 各等分

【用法】上为细末。每服半钱或一钱,豮猪胆二枚,批开掺药末,麻缠,米泔煮熟,冷吃。

【主治】小儿斑疮雀目、眼生翳。

59444 威灵散

《妇人良方》卷七。为《圣惠》卷七十一"威灵仙散"之异名。见该条。

59445 威灵散

《普济方》卷一五六。即《圣惠》卷四十四"威灵仙方"。见该条。

59446 威喜丸

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【异名】感喜丸(《丹溪心法》卷三),补虚威喜丸(《全国中药成药处方集》杭州方)

【组成】白茯苓四两(去黑皮,锉作大块,与猪苓一分,瓷器内同煮三二十沸,取茯苓再细锉,猪苓不用) 黄蜡四两

【用法】上先捣茯苓为末,炼黄蜡为丸,如小弹子大。每服一丸,细嚼干咽下。小便清为度。

【功用】《成方便读》:调理阴阳,固虚降浊。

【主治】元阳虚惫,精气不固,梦遗,遗尿,白淫;妇人血海久冷,白带,白浊,不孕。

①《圣济总录》:精气不固,小便白淫,及有余沥,或梦寐遗泄,妇人血海久冷,白带白漏,日久无子。②《三因》:两耳虚鸣,口干。③《医学入门》:肾有邪湿,精气不固。④《张氏医通》:溲溺如泔,涩痛梦泄,便浊属火郁者。⑤《古方选注》:肺虚痰火久嗽。

【宜忌】①《局方·续添诸局经验秘方》:忌米醋,只吃糠醋,切忌使性气。②《普济方》:忌腥气。③《古方选注》:尤忌怒气劳力。

【方论选录】①《古方选注》:《抱朴子》云,茯苓千万岁,其上生小木,状似莲花,名威喜芝。今以名方者,须择云茯苓之年深质结者,制以猪苓导之,下出前阴,蜡淡归阳,不能入阴,须用黄蜡性味缓涩,有续绝补髓之功,专调斫丧之阳,分理溃乱之精,故治元阳虚惫而为遗浊带下者。若治肺虚痰火久嗽,茯苓不必结,而猪苓亦可不用矣。②《成方便读》:诸症皆从虚而不固中来,治之者似宜纯用敛涩之剂,然淫浊带下,皆属离位之精,则又宜分消导浊。茯苓,黄蜡二味,一通一涩,交相互用,性皆甘淡,得天地之至味,故能调理阴阳,固虚降浊,以奏全功耳。

59447 威喜丸

《兰台轨范》卷一。为《局方》卷三(绍兴续添方)"感应丸"之异名。见该条。

59448 威灵仙丸

【方源】方出《证类本草》卷十一引《海上集验方》,名见《普济方》卷一一六。

【组成】威灵仙(洗,焙)

【用法】上为末,以好酒和令微湿,入在竹筒内,牢塞口,九蒸九晒,如干,添酒重洒之,以白蜜为丸,如梧桐子大。每服二十至三十丸,汤酒送下。鸦臭秽甚,气息不堪,勤服威灵仙,更用热汤尽日频洗,朝以苦唾调药涂身上内外,每日一次,涂之当得平愈。孩子无辜,令母含药灌之。

【功用】去众风,通十二经脉,宣通五脏。

【主治】中风不语,手足不随,口眼㖞斜,筋骨节风、胎风、头风、暗风、心风、风狂;伤寒头痛,鼻流涕;头旋目眩,白癜风;大风,皮肤风痒大毒,热毒风疮;劳疾连腰骨节风,绕腕风,言语涩滞,腹内宿滞,心头痰水,膀胱宿脓,口中涎水,好吃茶滓,手足顽痹,冷热气壅,腰膝疼痛,久立不得,浮气瘴气,憎寒壮热,头痛尤甚,攻耳成脓而聋,又冲眼赤;大小肠涩;黄疸、黑疸,面无颜色,瘰疬遍项,产后秘涩,腎腰痛曾经损坠,心痛注,气膈、气冷、气攻冲肾脏,风壅腹肚胀满,头面浮肿,注毒,脾肺气痰热咳嗽,气急坐卧不安,疥、癣等疮;妇人月水不来,动经多日,血气冲心;阴汗盗汗,鸦臭秽甚,气息不堪;痔疾秘涩,气痢绞结。

59449 威灵仙丸

【方源】《圣惠》卷二十三。

【异名】葳灵仙丸（《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》）。芎䓖丸（《圣济总录》卷十七）。

【组成】威灵仙二两 川大黄二两（锉碎，微炒） 独活一两 芎䓖一两 槟榔一两 牵牛子三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食前以温水送下。

【主治】大肠风热，结涩不通。

59450 威灵仙丸

【方源】《普济方》卷三十二引《博济》。

【组成】威灵仙（去土） 藿香叶 自然铜（煅赤，醋淬） 附子（炮裂，去皮脐） 狗脊（去毛） 草薢 漏芦（去芦） 肉苁蓉（酒浸，去皱皮，焙） 骨碎补（去毛） 牛膝（去芦，酒浸一宿，焙） 木鳖子（去壳） 防风（去芦） 地龙（去土，炒）各等分

【用法】上为细末，酒浸煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，加至二十丸，荆芥汤送下；木瓜酒亦得。

【主治】肝肾气虚，风邪攻注，筋骨拘急，机关不利，上攻口齿咽喉臭烂生疮，浮肿，头面虚肿；下疰脚膝少力，筋骨热疼。

59451 威灵仙丸

【方源】《养老奉亲》。

【组成】干薄荷（取末）一两 皂角一斤（不蛀肥者，以河水浸洗，去黑皮用，银石器内用河水软揉，去滓，绢滤去粗，熬成膏） 威灵仙（洗，择去土，焙干，为末）四两

【用法】上药入煎膏为丸，如梧桐子大。每服三十丸，临卧生姜汤吞下。

【主治】老人秋肺壅滞，涎嗽间作，胃脘痰滞，塞闷不快。

59452 威灵仙丸

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】威灵仙（去苗土）五两 草乌头（炒，锉）七两 骨碎补（去毛）二两半 地龙（去土，炒） 天南星（炮）各三两 自然铜（烧醋淬，研）一两半 苍耳 仙灵脾 侧子（炮裂，去皮脐） 防风（去叉）各四两 羌活（去芦头） 蔓荆实（揉去皮） 泽泻 藁本（去苗土） 革薢 独活（去芦头）各一两

【用法】上为末，合自然铜末研令匀，用好酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五丸，渐加至十五丸，空心温酒送下。觉唇口麻者，痹渐减也。

【主治】瘫缓风。脚膝无力，行履艰难，筋骨麻痹。

【宜忌】才服后，便忌吃热物。

59453 威灵仙丸

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】威灵仙（择）三两 乳香（研）一分 枫香脂（研）三分 五灵脂（研）一两 草乌头（炒黑）三分

【用法】上除研者外为细末，再和匀，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服一丸，生木瓜一片同嚼烂，温酒送下。

【主治】风身体疼痛。大风疾。

59454 威灵仙丸

【方源】《圣济总录》（人卫本）卷十。

【组成】威灵仙（去苗土） 五灵脂各一两 乌头（炮裂，去皮脐） 木鳖子（去壳） 乳香（研）各半两 赤芍药一分

【用法】上为末，滴酒为丸，如梧桐子大。每服七丸，加至十丸，食前冷酒送下。

【主治】风气走注，疼痛无常处。

【备考】本方方名，原书文瑞楼本作“灵仙丸”。

59455 威灵仙丸

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】威灵仙（去土） 蔓荆实 何首乌（去黑皮） 苦参各等分

【用法】上为末，用酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒或温熟水送下。

【主治】风气。

59456 威灵仙丸

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】威灵仙（去土）　枳壳（去瓤，麸炒）　青橘皮（去白，焙）各一两　防风（去叉）　牵牛子（炒）　郁李仁（汤浸，去皮尖）　大腹皮（锉）各半两　芍药三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，温水送下。以知为度。

【主治】大肠风热壅实，便秘不通，腹胁胀闷。

59457　**威灵仙丸**

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】威灵仙（去土）一两　桂（去粗皮）　当归（去土并芦头，洗净，锉，焙干）　白附子（炮）　地龙（去土，炒）　赤小豆　羌活（去芦头）各半两

【用法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心盐酒或盐汤送下。

【主治】肾经不足，风冷乘之，腰痛如折，或引背膂，俯仰不利，转侧艰难，或因役用力过多，劳伤于肾，或因寝卧冷湿地气伤于腰，或因坠堕伤损，或因风寒客搏，背冷腰痛。

59458　**威灵仙丸**

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【异名】神仙八味丸（原书卷一八五）。

【组成】威灵仙（去苗土）四两　牛膝（去苗，锉）一斤　天麻（锉）半斤　巴戟天（去心）四两（以上四味用好酒二斗浸两宿，焙）　肉苁蓉二斤（洗，切，以前浸药酒银石器慢火熬成膏）　何首乌一斤（米泔浸软，切片，于黑豆中蒸烂为度，焙干）　石斛（去根）四两　海桐皮（锉）半斤

【用法】上药除苁蓉外，焙干为末，用苁蓉膏为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空腹温酒送下，不嚼，一日三次。性温无毒。

【功用】久服辟风邪，调营卫，顺三焦，乌髭鬓，平补壮气活血，驻颜轻身健骨。

【主治】肾脏风毒流注，腰脚疼痛。

59459　**威灵仙丸**

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】威灵仙不拘多少（洗，切）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，临卧生姜清米饮送下。

【主治】大肠冷秘。

59460　**威灵仙丸**

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】威灵仙（去土，酒浸一昼夜，焙干）　大黄（锉，炒）　牵牛子（炒半熟）各二两　独活（去芦头，锉，焙）　芎䓖　槟榔（锉）　木通（锉，焙）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心熟水送下。

【主治】大肠风热，结涩不通。

59461　**威灵仙丸**

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】威灵仙（去土）　乳香（研）　枳壳（去瓤，麸炒）各一两

【用法】上为末，以粟米饭为丸，如梧桐子大。每服十五丸，米饮送下，一日三次。

【主治】气痔，大便涩。

59462　**威灵仙丸**

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】威灵仙（净洗，焙干）二两　木香一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，煎荆芥汤送下，不拘时候。

【主治】肠风痔瘘，肛边鼠乳，疼痛不可忍。

【宜忌】服药后，忌茶半日。

59463　**威灵仙丸**

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】威灵仙　肉苁蓉（酒浸，切，焙）　补骨脂（炒）　龙骨　菟丝子（酒浸一宿，别捣）　远志（去心）　人参　白茯苓（去黑皮）　熟干地黄（焙）　杜仲（去粗皮，切，炒）　续断　牛膝（酒浸，切，焙）　山芋　山茱萸　附子（先去皮脐，黑豆内煮透，切，焙）　五味子　泽泻　覆盆子　黄耆（锉）　桂（去粗皮）各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒或盐汤送下。服一月后，减半常服。

【功用】补虚益气。

【主治】五劳七伤。

59464 威灵仙丸

【方源】《鸡峰》卷十三。

【异名】葳灵仙丸（《医方类聚》卷一三五引《济生续方》）。

【组成】黄耆一两（蜜炙，切） 威灵仙（去土洗）半两 枳实一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，生姜汤送下。又服紫苏、麻仁粥甚佳。

【主治】年高之人，津液枯燥，无以润养，肠间干涩，气血俱衰，艰于运化，其脉燥大。

59465 威灵仙丸

【方源】《普济方》卷二四一引《海上名方》。

【组成】威灵仙一斤 木瓜半斤 牵牛半斤 白胶香半斤

【用法】上为末，薄糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒、盐汤任下，不拘时候。

【主治】寒湿脚气。

59466 威灵仙丸

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】草乌头（炮，去皮脐） 何首乌 赤芍药 荆芥穗 细松烟墨（烧红，醋淬） 苍术（米泔浸一宿取出，去粗皮，细切，焙）各二两 威灵仙 地龙（去土） 五灵脂各一两 没药半两（别研） 白僵蚕半两（炒、去丝嘴）

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，温酒送下。腰疼，胡桃酒送下；脚疼，木瓜酒送下；头疼，葱茶送下；手疼、肩背疼，乳香酒送下，不拘时候。

【主治】风湿攻注，腰脚肢节疼痛。

59467 威灵仙丸

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】威灵仙（洗净，焙干）四两 大黄二两（锉，炒） 槟榔 木香 陈皮 枳壳（去白，麸炒）各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温水送下，食后稍空服。以意斟量加减丸数，气顺为度。

【功用】疏风顺气，化痰消谷。

【主治】三焦气滞，大便秘难。

59468 威灵仙丸

《御药院方》卷八。为方出《证类本草》卷十一引《集验方》，名见《证类本草》卷十一引孙兆方“放杖丸”之异名。见该条。

59469 威灵仙丸

【方源】方出《丹溪心法》卷四，名见《医统》卷五十四。

【组成】南星（姜制） 苍术（泔浸） 黄柏（酒炒）各二两 川芎一两 白芷半两 神曲（炒）一两 桃仁半两 威灵仙（酒拌）三钱 羌活三钱 防己半两 桂枝三钱 红花（酒洗）一钱半 草龙胆半钱

【用法】上为末，曲糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心汤送下。

【主治】①《丹溪心法》：痛风，上中下疼痛。②《医统》：湿病风痛，周身不已。

59470 威灵仙丸

【方源】《普济方》卷一五四引《经验良方》。

【异名】定痛丸。

【组成】威灵仙（去土）半两 金樱子（去核，锉碎，炒焦）一两 舶上茴香半两 川乌（炮，去皮脐）一两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前温酒送下。二服为效。

【主治】气滞腰痛。

59471 威灵仙丸

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】灵仙

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。红绢袋盛一丸，同精猪肉四两煮烂，去药吃肉。积癖从大便下，以知为度。

【主治】小儿癖积。

59472 威灵仙方

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】威灵仙一两半　牵牛子一两(微炒)　陈橘皮半两(汤浸,去白瓤,焙)　吴茱萸一分(汤浸七遍,焙干,微炒)　槟榔一两　木香一两

【用法】上为散。每服三钱,于食前以温酒调服。服之泻下恶物为效。

【主治】腰脚疼痛,经年不愈。

【备考】本方方名,《普济方》引作"威灵散"。

59473 威灵仙汤

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】威灵仙(酒浸,去芦头)　仙灵脾(锉碎,羊脂拌炒过)　防风(去叉)　人参　白茯苓(去黑皮)　羌活(去芦头)　独活(去芦头)各三分　附子(炮裂,去皮脐)　柴胡(去苗)　一两半　秦艽(童便浸一宿,洗,焙)　槟榔　木香各三分　鳖甲(童便浸一宿,炙黄,去裙襕)　黄耆各一两　枳壳(去瓤,麸炒)　甘草(炙)　沉香　桂(去粗皮)　芎䓖各三分　苁蓉(酒浸,切,焙)　巴戟天(酒浸一宿,去心)各一两　牛膝(酒浸一宿,切,焙)　半夏(生姜汁浸一宿,焙)　当归(酒浸一宿,瓦上炒)　乌药(生,米泔浸一宿,锉,焙)各三分

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,水一盏半,生姜五片,羊肾半枚,同煎减半,入酒半合,更煎三两沸,去滓,适口服,空心、午前各一服。

【主治】丈夫元脏风虚,气血劳伤,饮食减少,四肢疲乏,气劣心悸,上热下冷,口苦舌干。

59474 威灵仙饮

《证治要诀类方》卷二。为《圣惠》卷四十四"威灵仙散"之异名。见该条。

59475 威灵仙散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】威灵仙一两半　牵牛子二两(微炒)　陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙)　厚朴三分(去粗皮,涂生姜汁,炙令香熟)　吴茱萸半两(汤浸七遍,晒干,微炒)

【用法】上为散。每服二钱,空心以温酒调下。当泻下恶秽。

【主治】伤寒后,腰脚疼痛。

59476 威灵仙散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】威灵仙二两　独活一两　羚羊角屑一两　麦门冬一两(去心,焙)　桂心一两　赤茯苓一两　防风一两(去芦头)　细辛一两　麻黄一两(去根节)　五加皮一两　薏苡仁一两

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至五分,去滓,加淡竹沥一合,更煎一两沸,温服,不拘时候。

【主治】中风。身如角弓反张,言语謇涩,心神烦乱。

59477 威灵仙散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】威灵仙一两　牵牛子一两(微炒)　陈橘皮半两(汤浸,去白瓤,焙)　羌活半两　厚朴半两(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟)　吴茱萸一分(汤浸七遍,焙干,微炒)

【用法】上为细散。每服二钱,于食前以温酒调下。得微利即效。

【主治】久患腰疼痛不愈。

59478 威灵仙散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【异名】威灵仙饮(《证治要诀类方》卷二)。

【组成】威灵仙五两

【用法】上为细末。每服一钱,食前以温酒调下。逐日以微利为度。

【主治】①《圣惠》:腰脚疼痛久不愈。②《外科大成》:癜风、囊风、紫云风、头风、历节风、破伤风、皮肤风痒、及疥癣、瘰疬、肿毒。

【宜忌】《外科大成》:忌茶、面。

59479 威灵仙散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】威灵仙二两 牵牛子二两(微炒) 木香半两 枳壳二两(麸炒微黄,去瓤)

【用法】上为细散。每服二钱,空心以茶清调下。以利为效。

【主治】妇人腰脚疼,大肠不利。

59480 威灵仙散

【方源】《圣惠》卷七十一。

【异名】威灵散(《妇人良方》卷七)、葳灵仙散(《赤水玄珠》卷二十)。

【组成】威灵仙一两 当归半两(锉,微炒) 没药半两 木香半两 桂心半两

【用法】上为细散。每服一钱,以热酒调下,不拘时候。

【主治】妇人久冷气滞,气血刺小腹疼痛。

【宜忌】《妇人良方》:忌茶。

59481 威灵仙散

【方源】《普济方》卷一〇六引《护命方》。

【组成】威灵仙一两(酒浸,切,焙) 芎䓖 羌活(去芦)各半两

【用法】上为散。每服二钱匕,空心葱汤调下。不转,第二日再服。

【主治】老人风气壅盛,大肠秘涩,五六日方大便一次,天阴日盛,头旋目暗,发作无时。

59482 威灵仙散

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】威灵仙(去土) 防风(去叉) 羌活(去芦头) 甘草(炙)各一两 紫参半两 荆芥穗一分

【用法】上为细散。每服二钱匕,蜜汤调下,不拘时候。

【主治】脾肺风毒攻皮肤瘙痒,或生疮癣。

59483 威灵仙散

【方源】《圣济总录》卷十八。

【异名】丹参散。

【组成】威灵仙(去土)二两 丹参六两 羌活(去芦头)一两 独活(去芦头)一两 苍耳四两 仙灵脾 玄参 人参 沙参各二两 紫参一两 甘草一两(生用) 黄芩(去黑心)半两

【用法】上为散。每服三钱匕,食后临卧用温熟水调下。若身体无疮,眼瞳仁不断,鼻梁不塌,服之一月可愈。

【主治】恶风;大风癞疾。

59484 威灵仙散

【方源】《圣济总录》卷五十二。

【组成】威灵仙(去苗土) 防风(去叉) 芎䓖 何首乌(去黑皮) 黄耆(锉) 白附子(炮) 白花蛇(去皮骨,酒炙) 蒺藜子(炒,去角) 白僵蚕(炒) 晚蚕沙(炒)各半两

【用法】上为散。每服一钱匕,早晨、日午、临卧温酒调下。

【主治】肾脏风毒攻注腰脚,或疮、或肿、或痛。

【备考】《普济方》有巴戟,无芎䓖。

59485 威灵仙散

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】威灵仙(去土)四两 防风(去叉)二两 枳壳(去瓤,麸炒) 黄耆(锉)各半两

【用法】上为散。每服二钱匕,麝香热米饮调下,日可二服,不拘时候。

【功用】常服祛风气,辟温疫,消肿满,除五痔等患。

【主治】肠痔下血痛肿。

59486 威灵仙散

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】威灵仙四两 干漆一两 雄黄一分 真麝香二钱

【用法】上为细末,拌匀。每服一大钱,水八分,煎至六分,空心和滓温服,至午后取下臭秽恶物,并是病根;服五七日后,恶物少,即与好理劳药及和气汤散疗之。或用汤浸蒸饼为丸,如梧桐子大,每服二十丸,每日空心、午后用温米饮送下。如传尸伏连患,取后别服桃仁散。

【主治】一切蓄热骨蒸,室女经脉不通,劳瘦。

59487 威灵仙散

【方源】《御药院方》卷八。

【异名】淋渫威灵仙散(《卫生宝鉴》卷十七)。

【组成】威灵仙　枳壳各一两

【用法】上为粗末。每用一两，以水三碗，同煎至一碗半，澄去滓，乘热熏，通手浴，不拘时候。

【主治】①《御药院方》：大肠头痒痛或肿闷。②《卫生宝鉴》：痔漏。

59488 威灵仙散

【方源】《普济方》卷二九〇。

【组成】威灵仙　贝母　白芷　甘草各等分

【用法】上㕮咀。每服半两，酒、水煎服。

【主治】发背便毒。

59489 威灵仙散

【方源】《普济方》卷四〇四。

【组成】威灵仙　仙灵脾　甘草　赤茯苓子芩　青葙子　大青　赤芍药　大黄各等分

【用法】上为末，羊肝掺药，箬叶、麻皮缠缚，米泔煮熟，放冷吃，量儿大小用之。

【主治】小儿斑疮雀目，眼生翳障遮睛。

59490 威灵仙散

【方源】《痈疽验方》。

【组成】威灵仙　贝母　知母各一两

【用法】上为末。每服三钱，空心酒调下。如不散，再服。

【主治】便毒。

59491 威灵龙脑散

【方源】方出《儒门事亲》卷十五，名见《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】铁脚威灵仙一钱(炒，末)　脑子一分

【用法】上为末。用温水调下服之，取下疮痂为效。

【主治】疮疹黑陷。

面

59492 面药

【方源】《千金翼》卷五。

【组成】朱砂(研)　雄黄(研)　水银霜各半两　胡粉二团　黄鹰屎一升

【用法】上合和。净洗面，夜涂之。以一两药和面脂令稠如泥，先于夜欲卧时，澡豆净洗面并手，干拭，以药涂面，厚薄如寻常涂面厚薄，乃以指细细熟摩之，令药与肉相入乃卧，一上经五日五夜勿洗面，只就上作妆即得，要不洗面，至第六夜洗面涂，一如前法，满三度洗，更不涂也。一如常洗面也，其色光净，与未涂时百倍也。

【功用】泽面。

59493 面药

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】夏枯草　僵蚕　羌活　海藻　白芷各一钱

【用法】上为末，加冰片少许，蜜调成膏。摊于油布上贴之。

【主治】皮肤疮疡，风热疥疮瘙痒者。

【方论选录】此药调膏薄贴，为光绪帝皮肤疮疡而设。白芷有排脓消肿止痛之功，为外科要药，其味芳香，富含油脂，《本经》谓其“长肌肤，润泽，可作面脂”，古方嫩面润肤方中辄用之。海藻除消坚散结外，其水浸剂对皮肤真菌也有一定的抑制作用。

59494 面脂

【方源】《外台》卷三十二引《延年秘录》。

【组成】白术　茯苓　杜蘅各六分　萎蕤藁本　芎䓖　土瓜根　栝楼各五分　木兰皮白僵蚕　蜀水花　辛夷仁　零陵香　藿香各四两　菟丝子八分　栀子花　麝香(酒浸，绵裹)　鹰屎白各三分　冬瓜仁五分　桃仁五合(并令碎)　白蜡三两　羊脂(肾边者)一升猪脂三升(水浸七日，日别易水)　猪胰一具白附子四分

【用法】上细切。酒二升，取猪胰、桃仁、冬瓜仁，绵裹纳酒中，挼令消，绞取汁，用渍药一宿，别煎猪脂令消，去滓，以鹅脂、羊脂、白蜡于铛中，用绵裹，纳铛微火煎，三上三下，药黄色，去滓，待澄候凝，纳鹰屎末，搅令匀。以涂

面妙。

【功用】泽面。

59495 面脂

【方源】《千金》卷六。

【组成】丁香 零陵香 桃仁 土瓜根 白蔹 防风 沉香 辛夷 栀子花 当归 麝香 藁本 商陆 芎䓖各三两 萎蕤（一本作白及） 藿香（一本无） 白芷 甘松香各二两半 菟丝子三两 白僵蚕 木兰皮各二两半 蜀水花 青木香各二两 冬瓜仁四两 茯苓三两 鹅脂 羊肾脂各一升半 羊髓一升 生猪脂三大升

【用法】上㕮咀。先以美酒五升，挼猪胰六具取汁，渍药一宿，于猪脂中极微火煎之，三上三下，白芷色黄，以绵一大两，纳生布中绞去滓，入麝香末，以白木篦搅之，至凝乃止。任性用之良。

【主治】面上皴黑。

59496 面脂

【方源】《千金》卷六。

【组成】白芷 冬瓜仁各三两 萎蕤 细辛 防风各一两半 商陆 芎䓖各三两 当归 藁本 蘼芜 土瓜根（去皮） 桃仁各一两 木兰皮 辛夷 甘松香 麝香 白僵蚕 白附子 栀子花 零陵香各半两 猪胰三具（切，水渍六日，欲用时，以酒挼取汁渍药）

【用法】上薄切，绵裹，以猪胰汁渍一宿，平旦以前，猪脂六升，微火三上三下，白芷色黄膏成，去滓，入麝，收于瓷器中。取涂面。

【功用】悦泽人面，耐老。

59497 面脂

【方源】《千金翼》卷五。

【组成】防风 芎䓖 白芷 白僵蚕 藁本 萎蕤 茯苓 白蔹 细辛 土瓜根 栝楼仁 桃仁（去皮尖） 蜀水花 青木香 当归 辛夷各半两 鹅脂一升 羊肾脂一升 猪脂二升

【用法】上细切，绵裹，酒二升，渍一日一夜，纳脂中，以柳木篦熟搅。任用之。

【主治】面及皴黡黑皯。

59498 面脂

【方源】《外台》卷三十二引《张文仲方》。

【组成】细辛 萎蕤 黄耆 白附子 薯蓣 辛夷 芎䓖 白芷各一分 栝楼 木兰皮各二分 猪脂三分炼成

【用法】上切，以绵裹，用少酒渍一宿，纳脂膏煎之，七上七下，别出一斤白芷，煎色黄药成，去滓，搅凝，以敷面，任用之。

【主治】人面无光润，黑及皱；金疮出血。

59499 面脂

【方源】《圣惠》卷四十。

【组成】防风一两半（去芦头） 萎蕤一两半 芎䓖一两半 白芷一两半 藁本一两半 桃仁一两半（汤浸，去皮） 白附子一两半 白茯苓二两 细辛半两 甘松香半两 零陵香半两 当归一两 栝楼瓤一两 川椒五十枚（去目） 鸬鹚粪三分（细研） 冬瓜子仁三分 麝香一分（细研）

【用法】上捣碎，以酒一斗，浸一宿，明日滤出，以薄绵裹之，用白鹅脂三升、羊脂二升，于铜器中微火煎之令沸，看白附子色黄膏成，滤去滓，入麝香、鸬鹚粪等，搅令稠，以瓷器盛，用鹿角锤子研二日，唯多则光滑。任用涂面。

【功用】令人面色润腻，鲜白如玉。

59500 面粥

【方源】《医学入门》卷三。

【组成】面（炒过）

【用法】每服方寸匕，煮米粥调下。

【功用】止泻。

【主治】寒痢，色白不渴者。

59501 面膏

【方源】《千金》卷六。

【组成】青木香 白附子 芎䓖 白蜡 零陵香 香附子 白芷各二两 茯苓 甘松各一两 羊髓一升半（炼）

【用法】上㕮咀。以水、酒各半升，浸药经宿，煎三上三下，候水、酒尽膏成，去滓。敷面作妆。如有鼾黯皆落。

【功用】去风寒，令面光悦，却老去皱。

59502　**面膏**

【方源】《千金翼》卷五。

【组成】杜蘅　牡蛎（熬，一云杜苦）　防风　藁本　细辛　白附子　白芷　当归　木兰皮　白术　独活　萎蕤　天雄　茯苓　玉屑各一两　菟丝子　防己　商陆　栀子花　橘皮（一云橘仁）　白蔹　人参各三两　甘松香　青木香　藿香　零陵香　丁香各二两　麝香半两　白犬脂　白鹅脂（无鹅脂以羊髓代之）　牛髓各一升　羊胰三具

【用法】以水浸膏髓等五日，日别再易水；又五日，日别一易水；又十日，二日一易水。凡二十日止，以酒一升，挼羊胰令消尽去脉，乃细切香，于瓷器中浸之，密封一宿，晓以诸脂等合煎，三上三下，以酒、水气尽为候，即以绵布绞去滓，研之千遍，待凝乃止，使白如雪。每夜涂面，昼则洗却，更涂新者，十日以后色等桃花。

【功用】泽面。

59503　**面膏**

【方源】《千金翼》卷五。

【组成】防风　藁本　辛夷　芍药　当归　白芷　牛膝　商陆　细辛　密佗僧　芎䓖　独活　鸡舌香　零陵香　萎蕤　木兰皮　麝香　丁香　未穿真珠各一两　蕤仁　杏仁各二两（去皮尖）　牛髓五升　油一升　腊月猪脂三升（炼）　獐鹿脑各一具（若无，羊脑亦得）

【用法】先以水浸脑髓使白，藿香以上㕮咀如麦片，乃于脑髓脂油内煎之，三上三下，即以绵裹搦去滓，乃纳麝香及真珠末，研之千遍，凝。即涂面上。甚妙。

【主治】面有皯䵴，及痞瘰并皮肤皴劈。

【备考】据用法，组成中当有藿香。

59504　**面膏**

【方源】《医方类聚》卷八十引《千金月令》。

【组成】白芷　藁本　白蜡各十两　萎蕤六两　辛夷　芎䓖各三两　木兰皮　当归　白术　白及　白附子各二两　白僵蚕一两半　桃仁脂三升

【用法】上细切，如豆大，暖酒浸之，两日后，入桃仁脂及蜡中煎，如鱼目沸讫，渐急火煎三五沸，直待白芷黄即成，绞去滓，以绵重滤，澄去浊恶物，以柳枝搅之，令至冷，入成炼钟乳末半两，熟调之。

【主治】面皯。

59505　**面饼丸**

《得效》卷七。为《杨氏家藏方》卷十"神授丸"之异名。见该条。

59506　**面消散**

【方源】《外科集腋》卷五。

【组成】面

【用法】上调匀，围住疮根，将黄蜡薄片铺平圈内，勿使渗漏，以炭火熏变青黑色，乃毒气出也。如法行三五次，俟蜡不变青色，内即消失。

【主治】上、中、下发。

59507　**面粉散**

【方源】《霉疠新书》。

【组成】面粉　白芥子（研）各八分

【用法】上药绢袋盛，浸滚汤，频频熨患处。

【主治】便毒不起胀，及不发溃者。

59508　**面药捣膏**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】大风子六钱（肉）　枯矾三钱　青黛三钱　雄黄二钱　樟脑二钱　蛤粉三钱

【用法】上为细末，加去皮核桃仁四钱、食盐四钱，用猪油捣膏。

【功用】清热燥湿解毒。

【现代研究】此方以大枫子为主药，实验证明大枫子水浸剂（1：2）在试管内对小芽胞癣菌有抑制作用，对癣病，甚至神经性皮炎均有效。

59509　**面药捣膏**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】大风子六钱（肉）　雄黄二钱　樟脑二钱　风化消三钱　枯矾二钱　蛤粉三钱

密陀僧三钱 食盐二钱

【用法】上为细末，用猪油捣膏。

【主治】皮肤痒。

【现代研究】实验表明，密陀僧对足跖毛癣菌、趾间毛癣菌、絮状表皮癣菌等多种皮肤真菌有不同程度的抑制作用，外用可减轻炎症。

59510 面色白瘦散

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】小米锅巴四两 薏米五钱（研） 砂仁五钱（炒） 莲肉二两（炒） 扁豆一两（炒）

【用法】上为细末，用红糖和成块。每服二钱，每天早、晚开水送下。

【主治】小儿气虚体弱，脾寒之甚，火不生土，脾肺不足，白兼青色，或慢惊。

59511 面色黄瘦散

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】扁豆三钱（炒） 青皮七分（炒） 薏仁五分（研） 鸡内金五分（研） 槟榔五分 谷芽一钱（炒） 神曲一钱（炒） 茵陈三分 木香一分

【用法】水煎服。

【主治】小儿内伤虚热，内有积聚、痞块、胀满、脾疳。

59512 面油摩风膏

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】麻黄 升麻（去黑皮） 防风各二钱 羌活（去皮） 当归身 白及 白檀各一钱

【用法】上用小油半斤，以银器中熬，绵包定前药，子油中熬之得所，澄净，去滓，入黄蜡一两，再熬之为度。

【主治】面有鼾黯，或生疮，或生痤痱及粉刺。

59513 面粉化毒散

【方源】《续名家方选》。

【组成】白面八钱 大黄四钱 雄黄二钱四分 反鼻 蜈蚣 血竭各一钱六分 乳香 没药各一钱 （或加轻粉五分）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日三钱或四钱，随症土茯苓煎汁送下。

【主治】远年近日杨梅疮结毒。

【备考】本方方名，据剂型，当作“面粉化毒丸”。

59514 面痛一号方

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】川芎 菊花 荆芥 半夏 陈皮 蝉蜕 赤芍 丹皮 丹参 地龙 当归 甘草

【功用】疏风散热，涤痰活络。

【主治】风热挟痰阻络面痛，面红目赤，喜冷，舌红苔黄，脉数，或伴有发热，微恶风寒。

59515 面痛二号方

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】川芎 白附子 桂枝 半夏 防风 白芷 羌活 细辛 当归 丹参 地龙 甘草

【功用】疏风散寒，涤痰通络。

【主治】风寒挟痰阻络面痛，面不红，喜温，舌淡苔薄白而润，脉紧，或伴有发热及较重之恶寒。

59516 面痛三号方

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】柴胡 郁金 山栀 青黛 丹参 地龙 当归 赤芍 川芎 陈皮 丹皮 甘草

【功用】清肝泻火，通经活络。

【主治】肝郁化火面痛，目赤面红，胁痛胀满，心烦易怒，口苦咽干，舌红苔黄燥，脉弦数。

59517 面痛四号方

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】黄耆 川芎 赤芍 当归 天麻 甘草 丹参 鸡血藤 牛膝 红花 茯苓 姜黄

【功用】补气活血，化瘀通络。

【主治】气虚血瘀面痛，舌淡白或有瘀斑，脉沉细而弱。

挂

59518　挂金散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】鸡内金一钱　青黛三分　薄荷四分　白芷四分　蒲黄三分　冰片一分　甘草三分　鹿角炭一钱　挂金灯子二钱

【用法】上为末。吹。

【主治】口痈，舌菌，重舌，喉蛾。

持

59519　持圣散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】麻黄二两(去根节)　甘草一分(炙微赤，锉)　桂心一两　附子一两(炮裂，去皮脐)　白术半两　五味子半两　陈橘皮半两(汤浸，去白瓤，焙)

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三个，煎至六分，去滓热服、不拘时候。汗出为度。

【功用】解肌。

【主治】伤寒。

【备考】本方方名，《普济方》引作“抵圣散”。

拱

59520　拱辰丹

【方源】《百一》卷十八引孙琳方。

【组成】鹿茸(酥炙，去皮毛用)　山茱萸(新好有肉红润者)　当归(洗去土)各四两　麝香半两(别研)

【用法】上为末，入麝香拌匀，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，或五十丸，温酒、盐汤送下。

【主治】方壮年而真气犹怯，乃禀气素弱，非虚衰而然。

59521　拱辰丹

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】鹿茸(燎去毛，酥炙)　当归(去芦，酒浸)　山茱萸(去核)　附子(炮，去皮脐)各一两　沉香二钱(不见火)

【用法】上为细末，酒面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒、盐汤任下。

【功用】温暖子宫，久服能令有孕。

挝

59522　挝胃汤

【方源】《普济方》卷一八四引《卫生家宝》。

【组成】良姜一两(水浸软，切片，用麻油炒令深黄色取出)　甘草三两(须先锉，称盐三两，与良姜及盐同炒黄色为度)　茴香(炒)

【用法】上为细末。每服二钱，沸汤调服。

【主治】一切冷气，胸膈胀闷，脾胃虚弱，不思饮食。

59523　挝脾丸

【方源】《普济方》卷一六八。

【组成】南星四两　半夏二两　舶上硫黄二两　轻粉三钱　锡胶三钱　雷丸一两　干胭脂五钱　白牵牛(炒)一两

【用法】上为末，酒糊为丸，如小豆大。每服三十丸，生姜汤送下，一日二次。

【主治】积聚。

59524　挝脾汤

【方源】《百一》卷二。

【组成】川姜(炮)　良姜(炮)　陈皮(去白)　青皮(去白)　草果(煨熟)　缩砂仁　白术　官桂各一两　甘草二两(炒)

【用法】上为细末。每服一大钱，入盐少许，沸汤点下，不拘时候。

【主治】脾胃病。

59525　挝脾汤

【方源】《局方》卷十(吴直阁增诸家名方)。

【组成】麻油四两　良姜十五两　茴香(炒)七两半　甘草十一两七钱半

【用法】上以炒盐一斤同药炒，为细末。每服一钱，白汤点下。

【功用】常服快气，大解中酒，美进饮食。

【主治】脾胃不快，宿酲留滞，呕吐酸水，心

腹胀痛，不思饮食，伤冷泄泻。

59526 **挝脾散**

【方源】《普济方》卷三九一。

【组成】石燕一对（醋蘸七次） 白丁香一两 定粉三钱 人参二钱 诃子一对 丁香半钱 轻粉五钱 陀僧二两 船上硫黄五钱

【用法】上为极细末。每服一钱，早晨米汤调下，食乳汁小儿，即用乳汁面汤亦可。三岁服一字，五岁服一钱，量小儿大小加减，大者每二日一次，小者三日一次。

【主治】小儿脾癖。

59527 **挝癖散**

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】海蛤粉 黄丹 硫黄各等分

【用法】初伏日修合为末，用醋调成膏，摊瓦盆内晒干，再研为末。一岁儿服一分，空心米饮下。取下癖积如蓝汁为验。

【主治】小儿癖积。

挺

59528 **挺子膏**

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】附子一两（去皮脐，生用） 赤芍药一两 当归一两 杏仁二两（汤浸，去皮尖双仁） 黄连一两 赤柳皮四两 麒麟竭一两 没药一两 黄丹三两 清油二斤

【用法】上细锉，先将清油及诸药入于铛中，煎令焦黄色，待冷澄滤过，后下黄丹、麒麟竭、没药同煎，以柳木篦子不住手搅，候黑色，取少许滴水中成珠子即膏成，放冷，剂作挺子。多年冷漏恶疮，先用甘草煎水洗，然后贴之。痈肿，每服一丸如弹子大，皂角酒调下。齿断痈肿贴之。

【主治】一切痈疽恶毒疮痛。

【备考】方中没药用量原缺，据《医方类聚》补。

59529 **挺子膏**

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】麒麟竭半两 定粉一两 没药半两 自然铜半两 黄丹一两 无名异半两 蜡四两

【用法】上为末，先用蜡于铫子内令熔，次下药末，以柳枝子搅，勿令住手，至冷剂为挺子。有患者，着漆碟子底上点生油，摩令浓，每日两上贴之。

【主治】一切恶毒疮。

59530 **挺子膏**

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】麒麟血 没药 乱发灰 密陀僧 丁香 麝香 木香 腻粉 雄黄 雌黄 自然铜 黑狗肝胆各一两（干者）

【用法】上为细末，先于铛中熔黄蜡，热后，入药末，熬炼成膏，取小竹筒子，热灌之，待冷方可取出，于黄丹中出色。若有患者，先以热水洗病上，用生油于漆碟中磨药，涂痛处立效。

【主治】伤折。

括

59531 **括痰丸**

【方源】《景岳全方》卷五十一。

【组成】半夏（制）二两 白芥子二两 干姜（炒黄）一两 猪苓二两 炙甘草五钱 陈皮四两（切碎，用盐二钱，入水中浸一宿，晒干）

【用法】上为末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服一钱许，滚白汤送下。

【主治】一切停痰积饮，吞酸呕酸，胸胁胀闷疼痛。

【加减】如胸胁疼痛者，加台乌药二两。

指

59532 **指甲散**

【方源】《普济方》卷七十八引《龙木论》。

【组成】左手中指甲（洗净候干）

【用法】上以刀刮其屑。用灯草蘸点眼中翳处。一二次即去。

【主治】眼翳；诸物入眼。

59533　指迷丸

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】半夏四两　茯苓三两　广皮三两　枳壳一两　玄明粉一两　甘草五钱

【用法】上为细末，竹沥为丸。钩藤汤送下。

【功用】消胃家上结之痰，化大肠下凝之垢。

【主治】痰饮攻注，四肢肩背，或为麻木，软痹肿痛。

【加减】肝胆有火，加胆星；痰积不消，加海石。

59534　指迷丸

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】半夏　陈皮　甘草　白茯苓　枳实　玄明粉

【主治】热痰下结大肠，谵语。

59535　指迷丸

《金鉴》卷四十一。为《百一》卷五引《全生指迷方》"治痰茯苓丸"之异名。见该条。

59536　指迷汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】人参五钱　白术一两　半夏　神曲各三钱　南星　甘草各一钱　陈皮　菖蒲各五分　附子三分　肉豆蔻一钱

【用法】水煎服。四剂愈。

【主治】起居失节，胃气伤而痰迷于心脘之下，以致一时而成呆病者。

59537　指迷七气汤

【方源】《便览》卷三。

【组成】莪术(醋制)　三棱(醋制)　藿香　甘草　官桂　桔梗　青皮　益智　陈皮　香附　大黄　槟榔

【用法】水二钟，煎至一钟，莫食晚饭，空心温服。先露一宿尤好。服后一二时，肚腹痛，取下如鱼冻或虫积等恶物，至午后方以温粥补之，后服退黄丸。

【主治】大人、小儿内有虫积，或好食生米，好食壁泥，好食茶炭、咸辣苦酸，以致诸般痞积，而色萎黄，肢体羸瘦，四肢无力。

59538　指迷七气汤

【方源】《杏苑》卷三。

【组成】木香五钱　槟榔八分　桔梗七分　厚朴七分　半夏七分　紫苏八分　香附一钱　橘红(去白)二钱　白术二钱　甘草(炙)五分　人参三钱　麦门冬一钱　桑白皮七分　丁香八分　草果七分　藿香四钱

【用法】上咀片。水煎，温服。

【功用】疏壅滞之气。

【主治】七情之气相干，阴阳不得升降，气道壅滞，攻冲作痛。

59539　指迷七气汤

【方源】《幼幼集成》卷二。

【组成】广陈皮　杭青皮　藿香叶　芽桔梗　蓬莪术　香附米　法半夏　上肉桂　公丁香　益智仁　炙甘草

【用法】上㕮咀。加生姜、红枣，水二碗，煎至一碗，母子同服。

【功用】疏利脏腑。

【主治】小儿阴阳不升降，气道壅塞，腹痛寒热，多啼不乳。

59540　指迷茯苓丸

《玉机微义》卷四。为《百一》卷五引《全生指迷方》"治痰茯苓丸"之异名。见该条。

59541　指迷铁落散

《观聚方要补》卷五引《十便良方》。为《素问》卷十三"生铁落饮"之异名。见该条。

59542　指迷宽中丸

《普济方》卷二十二引《简易方》。为《鸡峰》卷十三"宽中丸"之异名。见该条。

59543　指迷温经汤

【方源】《观聚方要补》卷九引《十便良方》。

【异名】温经汤(《妇人良方》卷一)、小温经汤(《医学入门》卷八)。

【组成】当归　川芎　芍药　桂　牡丹皮　莪术各半两　人参　甘草　牛膝各一两

【用法】水煎服。

【主治】①《观聚方要补》引《十便良方》：妇人经道不通，绕脐寒疝痛彻，其脉沉紧。②《医

学入门》：血海虚寒，或为风邪所袭，月水不利。

挑

59544 挑疔散

【方源】《医方考》卷六。

【组成】紫草 雄黄 巴豆各等分

【用法】上为细末，油胭脂调用。有痘疔、痘母者，用针挑破，以此药少许着之。

【主治】小儿痘疔、痘母。

【方论选录】紫草解毒利窍，雄黄解毒利气，巴豆化毒拔疔，乃挑疔之捷剂也。

拯

59545 拯阳汤

《证治汇补》卷二。为《医宗必读》卷六“新定拯阳理劳汤”之异名。见该条。

59546 拯阳汤

【方源】《会约》卷九。

【组成】黄耆（蜜炙）一两 白术三钱 附子二三钱 干姜（炒黄）一钱半 甘草（炙）一钱 熟地一两 当归身三钱

【用法】水煎，温服。

【功用】补气救血。益气以固生机。

【主治】血脱之盛者，气亦随之，因而昏愦者。

【宜忌】切忌凉药。

【加减】如泻泄，去当归，加乌梅二枚。此方加参更妙。

59547 拯阴汤

《证治汇补》卷二。为《医宗必读》卷六“新定拯阴理劳汤”之异名。见该条。

59548 拯阴汤

【方源】《证因方论集要》卷三引黄锦芳方。

【组成】当归 川芎 熟地 知母 红花（酒炒） 升麻

【主治】疟疾。阴虚夜发，热多寒少，口渴不呕，喃喃错语，饮食如故。

【方论选录】邪入血分，若不从阴提出，必致阴受热损而阴益竭。熟地补阴以沃血之源，当归入心以摄血之本，川芎行血中之气，知母清血分之热，红花破瘀，升麻升阳。

59549 拯肾汤

【方源】《会约》卷二。

【组成】熟地四钱 枣皮 山药 枸杞 杜仲（盐水炒） 巴戟（去心）各一钱半 茯苓一钱 五味三分 补骨脂（盐水炒）一钱

【用法】空心服。服之而效可照分量加二十倍，再加菟丝子酒蒸四两，青盐五钱，炼蜜为丸，每服七八钱，空心淡盐汤送下。

【主治】肾阴虚，神昏身倦，或遗精白浊，玉茎隐痛。

59550 拯损膏

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】天花粉 芙蓉叶 紫金皮 赤芍药 南星 独活 当归 白芷各一两 牡丹皮三钱

【用法】上为末，姜汁调。热敷贴。

【主治】诸伤损。

【加减】疼痛甚者，加乳香、没药各少许。

59551 拯伤接命丹

【方源】《杂病源流犀烛》卷三十引杨老七方。

【组成】紫金皮 官桂 大茴香 甘草节 川乌（姜汁炒透） 草乌（姜汁炒透）各等分

【用法】上为末，年壮而又伤重者，每服三钱；老弱而伤轻者，每服一钱半，砂糖调酒服下，妇人临时酌减。一服如神，多亦不过二服。服后身上应少发麻，不得疑畏。

【主治】跌打损伤，命在危急者。

【宜忌】须避风，出汗为度。

59552 拯阳理劳汤

《金鉴》卷四十。为《医宗必读》卷六“新定拯阳理劳汤”之异名。见该条。

59553 拯阴消瘖汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】胡黄连3克 青黛0.3克 玄参6克 阿胶9克 鸡蛋一个

【功用】救阴消疳。

【主治】疳疾上目，病到晚期阴竭，症见声直音哑，手足浮肿，大便如豆腐渣，或如羊屎者。

【方论选录】方中胡黄连、青黛清肝胆，消疳积，退热除蒸；玄参滋肾水以降浮游之火；阿胶滋肾水，养肝血，大补真阴，鸡蛋黄补心血，除心热，利咽开音，二味皆血肉有情之品，前味滋肾，后味养心，心肾交泰，阴生阳和，生肌复转。

59554　拯阴理劳汤

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】人参　麦冬　五味　当归　白芍　生地　龟版　女贞　薏苡　橘红　丹皮　莲子　百合　炙草

【主治】虚劳，阴虚火动。

【加减】汗多不寐，加枣仁；咳而嗽痰，加桑皮、贝母；嗽而湿痰，加茯苓、半夏；咳嗽咯血，加阿胶；骨蒸热深，加地骨皮。

59555　拯阴理劳汤

《杂病源流犀烛》卷二。为《医宗必读》卷六“新定拯阴理劳汤”之异名。见该条。

59556　拯济换骨丹

【方源】《元戎》。

【组成】槐荚子(生)　人参　桑白皮　苍术　川芎　何首乌　蔓荆子　威灵仙　防风各二两　五味子　苦参　香附子各一两　白芷二两　麝香二钱　龙脑二钱(另研)

【用法】上为细末，入麝香令匀。用麻黄十斤去根节，天河水三石三斗，熬至六斗，滤去滓，再熬至二升半，入银石器内熬成膏，入前药末和匀为丸，每一两作十丸，朱砂为衣。每服一丸，先捣碎，酒一盏，自晨浸至晚，食后、临卧搅匀服之。神清无睡是药之验，须更隔五日服之。

【主治】半身不遂，口眼㖞斜，手足不仁，言语謇涩，或痛入骨髓，或痹袭皮肤，或中急风，涎潮不言，精神昏涩，行步艰难，筋脉拘急，左瘫右痪，一切风疾。

【宜忌】如中风无汗宜服。若体虚自汗服之，是重亡津液也。若风盛之人当于密室温卧取汗。自汗者不宜服。

轻

59557　轻号散

【方源】《婴童百问》卷八。

【组成】轻粉一分　蜜少许

【用法】上以热汤调开蜜糊轻粉，点儿口。即通，与一二次，再不可与。

【主治】小儿初生大便不通。

59558　轻肌散

【方源】《卫济宝书》卷下。

【组成】慈姑一两　何首乌　甘草(炙)各三分　独行一两(去皮)　地黄半两　虾嗽唧三分

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，薄荷七叶，煎至八分，温酒调下。

【功用】止疼化毒脓，除寒热烦躁、脚手无力、四肢倦、虚渴、气乏不匀。

【主治】《普济方》引《鲍氏方》：瘰疬肿痛。

59559　轻体丸

【方源】《普济方》卷三一一。

【组成】乳香　没药各一两　草乌　山栀子　芍药各二两

【用法】上为细末，用酒曲糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，温酒送下。

【主治】一切闪肭，筋骨疼痛。

59560　轻身散

【方源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】黄耆一斤(锉，生姜汁煮三十沸，焙干)

【用法】上为散，入甘草、茯苓、人参、山芋、云母粉各一钱，拌匀。每服一钱匕，入盐少许，汤点下，不拘时候。

【功用】荡谷气，延寿命。

59561　轻青丹

《普济方》卷三六八。为《幼幼新书》卷十四引汉东王先生方“七宝轻青丹”之异名。见该

条。

59562 **轻矾散**

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】轻粉 生矾各等分

【用法】上为末。先将患处热汤洗净，搔破敷药。

【主治】坐板疮。

59563 **轻乳散**

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】轻粉二分 甘草五分 黄柏一钱 铜绿三分 乳香五分 黄丹五分 没药三分 冰片一分

【用法】上为细末。先用苎麻根四两，苦参三钱，煎汤洗净，再用此末掺之。

【主治】麻根疮。

59564 **轻金散**

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】甘菊花二分 川芎 白芷 旋复花 川乌头 藿香 天南星（并生用）各二钱

【用法】上为细末。每服一字，腊茶清调下，不拘时候。不可多服，只一两服，病愈便止。如患偏头疼，不问年深，但只闻合此药气味，其病已自半愈，服之神验。

【主治】太阳厥逆，偏正头痛，夹脑风。

59565 **轻骨丹**

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】狗脊（去毛） 木鳖子（去壳） 五灵脂 草乌头（去皮）各等分

【用法】上药并生用，为末，醋煮面糊，用东南引桃柳枝各七茎，搅候糊成为丸，如梧桐子大，阴干。每服七丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】脾胃虚弱，气血亏耗，风邪内攻，半身不随，少气汗出。

59566 **轻骨丹**

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】独活（去土） 牛膝（酒浸） 菟丝子（酒浸） 苁蓉（酒浸） 萆薢（蜜炒） 金毛狗脊（去毛） 川心巴戟（盐炒） 骨碎补（去毛） 破故纸（炒） 胡芦巴（炒） 大附子（炮，去皮脐） 熟地黄 当归（去土） 天麻 防风（去芦头） 羌活（去土） 白芥子（炒） 川芎 五味子（炒） 川乌头（炮，去皮脐） 木香各一两 木鳖子半两 甜瓜子半两（炒） 地龙半两（去土） 全蝎一两（炒） 乳香半两（别研） 没药半两（别研） 续断一两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸、四十丸，食前温酒送下。

【功用】壮筋骨，补虚，驻颜色，强骨生力，益真气，除骨髓间风邪。

【主治】中风手足缓弱，肢节不伸，筋脉挛急，瘫痪偏风，半身不遂，口眼㖞斜，语言謇涩，肌肉不生，一切诸风。

59567 **轻骨丹**

【方源】《卫生宝鉴》卷八。

【组成】苦参三两半 桑白皮（土下者） 白芷 苍术 甘松（另用栀子挺者） 川芎 麻黄（锉，去节，往返用河水三升，煎至一升，去滓，熬成膏）

【用法】上为末，入前麻黄膏为丸，如弹子大。每服一丸，温酒一盏，研化，温服之。卧取汗。五七日间再服，手足当即轻快。卒中涎潮，分利涎后用之。

【主治】中风瘫痪，四肢不遂，风痹。

59568 **轻骨汤**

【方源】《圣济总录》卷八十九。

【组成】知母（焙） 人参 天仙藤（洗，锉） 白术 秦艽（去土） 柴胡（去苗，洗，锉，焙） 鳖甲（去裙襕，醋炙）各一两 黄耆（洗，打破，手劈如丝，以盐少许和水揉，猛火焙干） 常山 当归（切，炙） 前胡（去芦头） 芎䓖 紫菀（洗，焙） 白茯苓（去黑皮） 甘草（生）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏半，加乌梅半个，同煎至八分，去滓温服。

【主治】虚劳身体倦怠，百节痠疼，羸瘦发热，神昏不爽。

59569 **轻骨散**

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】麻黄(去节)三两　乌头(炮裂,去皮脐)一两　附子(炮裂,去皮脐)　白附子(生用)各半两　秦艽(去苗土)一两半　柴胡(去苗)　鳖甲(去裙襕,醋炙)各一两　桂(去粗皮)　人参各半两　山茵陈一分

【用法】上锉细,用童便十盏,酒三盏,入瓷器内,同熬令干,再焙,为散。每服二钱匕,温酒调下。就浴后再服,以衣被盖卧汗出为候。

【主治】风劳。四肢乏力,嗜卧多困,饮食减少,身体疼痛,三焦气涩,发热口干。

59570 **轻骨散**

【方源】《医学正传》卷三。

【组成】乌梅　龙胆草　胡黄连　贝母　知母　鳖甲(酥炙)　桔梗　秦艽　柴胡　甘草(炙)　栀子　人参　青蒿(酒煮)　阿胶(炒成珠子)　杏仁(去皮尖,炒)各等分

【用法】上晒干为末,用好京墨一块,以井花水磨,调前药末作饼子,如大指头大,透风处阴干二七日。每用一饼,以井花水磨化,又用没药五分,磨成一盏,更加黄柏末二钱,同煎数沸,倾入盏内,频频打转,于五更时轻轻起服,服后就睡仰卧,甚者不过三服。

【主治】①《医学正传》:劳嗽。②《医统》:骨蒸劳热。

59571 **轻珠散**

【方源】《疡科捷径》卷下。

【组成】轻粉一钱　濂珠三分　冰片三分　白蔹一钱

【用法】上为细末。麻油调敷。

【主治】透肠疔。

59572 **轻桃丸**

【方源】《洞天奥旨》卷十。

【组成】轻粉一钱　白薇一钱　防风一钱　苏叶一钱

【用法】上药各为细末,用油胡桃肉三钱,捣碎研绝油,同猪板油再捣,为丸如弹子大。擦疮处。一二日即愈。

【主治】疥疮。

59573 **轻粉丸**

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】水银粉四钱　滑石二钱　凝水石三钱　海金沙一钱

【用法】上为细末,用白面裹,上用泥裹,以牛粪火烧,觉火稍炎便去之,取出药,恐粉走也。刮去泥及干面,就有湿者,烧面搜为丸,如绿豆大。每服第一日三丸,第二日六丸,一日二次;第三日十二丸,一日三次,煎浆水、灯心、生姜冷汤送下。若病势未行,第四日更服十二丸,然所服不可过多,若能不服第四服得行乃佳,恐药力太过,须慎此一服。若服第一服,牙齿便动水行,则不可治,不须与药;若得第二日、第三日小便行乃妙。服药腹中作声,背胛疼时牙欲动也,既动则用封渫牙方。

【主治】水气。

【备考】封渫牙方:青黛、枣肉各等分,和研如泥,封牙龈,更以荆芥汤渫三五度,若逐动小肠中水,往往小便淋滴,一日夜,身便瘦而愈。若水行患渴者,则调生凝水石末一钱,新汲水下,渴自减,小便定,迭服后补药一月,方得平复。

59574 **轻粉丸**

【方源】《圣济总录》卷一二七。

【组成】乌鸡子一枚(去黄取白,盛于盏内,用腻粉一钱半、巴豆一七粒新者去皮心,同入鸡白内蒸熟,取于乳钵内研令匀细)

【用法】别用腻粉三钱匕,于手掌中以病人津唾调和,合前药为丸,如绿豆大。每服五丸,荆芥、薄荷茶送下,黄昏时服,至一更如未转,更以薄荷茶投之。若腹痛,先取下宿食一次,第二次以水盛取,见病根恶物出也。或患年深,只可三度转,出尽恶物,其项渐小;或大者,先使线记,转了其项旋小为验。不得出风,一月内将息,后用补药。

【主治】瘰疬。

【备考】先服轻粉丸,后用补药:人参、玄参、白药、苦参各半两,锉细,焙干。为粗末。每服一钱匕,水一小盏,煎三五沸,去滓温服。

59575 **轻粉丸**

【方源】《名家方选》。

【组成】牵牛子二钱 竹茹一钱 轻粉一钱 梅肉一个

【用法】上为末，面糊为丸，茶末为衣。每服三分，白汤饮送下，一日三次，尽一剂。后服备急丸五分，秽物当下。凡施剂未必尽剂，随病人强羸可权之。

【主治】霉毒痼疾，累月积年难愈者。

59576 **轻粉串**

【方源】《串雅内编》卷三。

【组成】轻粉一分

【用法】砂糖为丸，如麻子大。每服一丸，空心米饮送下。良久泻去泥土，即愈。

【主治】小儿吃泥。

59577 **轻粉顶**

【方源】《串雅内编》卷三。

【组成】无雄鸡子一个 轻粉一分

【用法】用鸡子清入轻粉拌匀，银器盛，置汤瓶上蒸熟。三岁儿食尽，当吐痰或泄而愈。

【主治】小儿涎喘。

【宜忌】壮实者乃可用。

59578 **轻粉剂**

【方源】《霉疮证治》卷下。

【组成】轻粉二钱 大黄 赤小豆各五钱 鼺鼠霜二钱

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。更以大黄、芎劳各一钱半，土茯苓四钱，水煎，送服此丸，七日尽。

【主治】霉毒痼疾。

59579 **轻粉散**

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】轻粉一两（用银器内炒令黑色）

【用法】上药，如患左眼用纸拈缠左耳，右耳亦如此，以填满为度，如耳根痛，其膜自落。

【主治】小儿斑疮入眼。

59580 **轻粉散**

【方源】《小儿痘疹方论》。

【组成】真轻粉 黄丹各等分

【用法】上为细末。左眼有翳，吹入右耳；右眼有翳，吹入左耳。更以绿豆皮、谷精草、白菊花各一两，为末，每服三钱；干柿一枚，米泔一盏，煎干，将柿去核食之，每日三枚，不拘时候。

【主治】小儿出痘，眼内生翳。

59581 **轻粉散**

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】大枣十个 真轻粉一匣

【用法】每一个大枣人粉少许，合住，用盏子盛，纸覆之者，汤甑上蒸熟，细咀，白汤下。

【主治】大小便秘。

【宜忌】虚者不宜用。

59582 **轻粉散**

【方源】《普济方》卷三〇一引《神效方》。

【组成】马鸣退（烧灰）三钱 轻粉少许 乳香少许

【用法】上为细末，先以温浆洗净，干掺之。

【主治】疳疮。

59583 **轻粉散**

【方源】《普济方》卷二八一。

【组成】轻粉 斑蝥（去翅足）

【用法】上为细末。用温水以鸡翎扫之周围。立效。

【主治】人面上湿癣。

59584 **轻粉散**

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】轻粉 没药 乳香 密陀僧各等分

【用法】上为细末，熬浆水葱白汤洗净疮口，揾干，用药贴之。

【主治】疳疮漏。

59585 **轻粉散**

【方源】《普济方》卷三〇七。

【组成】旧墨一块（指大，烧存性） 轻粉一分许 乱毛一拳大（烧存性）

【用法】上为末。好酒调敷咬处。一过便愈。

【主治】蛇伤。

59586 **轻粉散**

【方源】《普济方》卷三八五。

【组成】天南星　半夏　滑石各一钱　巴豆霜一字

【用法】上为细末，轻粉半钱为末，面糊为丸，如粟米大。每服一岁三丸，三岁七丸，用葱汤送下。

【主治】小儿壮热惊风。

【备考】本方方名，据剂型，当作"轻粉丸"。

59587 轻粉散

【方源】《玉机微义》卷十五引郭氏方。

【组成】黄柏(蜜炙)　密陀僧　黄丹　高末茶　乳香各三钱　轻粉一钱半　麝少许

【用法】上为末。用葱汤洗疮后，次贴此药。

【功用】《金鉴》：化腐除湿止疼。

【主治】①《玉机微义》引郭氏方：下注疳疮，蚀臭腐烂，疼痛不可忍者。小儿疳疮。②《金鉴》：湿热流注臁疮证。

59588 轻粉散

【方源】《丹溪心法附余》卷十六。

【组成】寒水石一斤　硫黄　朴消各二两　松香五两　枯矾二两　轻粉五钱

【用法】上为末，香油调搽。

【主治】疥疮。

59589 轻粉散

【方源】《洞天奥旨》卷十六。

【组成】轻粉三分　萝卜子一钱　桃仁十四个(去皮尖)

【用法】上为末。擦疮上。即愈。

【主治】疮痛痒，流水流血。

59590 轻粉散

【方源】《梅氏验方新编》第七集。

【组成】轻粉一钱半　黄丹　黄柏　儿茶　乳香各三钱　麝香一分　冰片二分

【用法】上为极细末，先用葱汤洗，再用此撒之，或麻油调敷。

【主治】湿毒流注，脓水浸溃。

59591 轻黄散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】龙骨二钱　黄丹一钱　轻粉五个子　白矾一分　生田螺二枚

【用法】上先将白矾为末，入在田螺壳内，炭火煅过，白色为度，取出，同龙骨、黄丹等研为细末，次入轻粉和之。如患臁疮、恶疮，皆先用口温齑汁洗净，以软帛揾干，次用药末干贴疮上。两三次必愈。

【主治】风热恶疮。

59592 轻黄散

【方源】《卫生宝鉴》卷十。

【组成】轻粉一钱　雄黄半两　杏仁一钱(汤浸之，去皮尖并双仁)　麝香少许

【用法】上于乳钵内先研杏仁如泥，余药同研细匀，瓷合盖定。每有患者，不问深浅，夜卧用骨箸或竹箸，点如粳米大在鼻中息肉上，隔一日，夜卧点一次。半月有效。

【主治】①《卫生宝鉴》：鼻中息肉。②《明医指掌》：鼻臭。

59593 轻黄散

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】大黄三钱(烧灰存性)　黄柏二钱(烧灰存性)　轻粉少许　久年壁土(东向者)一钱

【用法】先用温热水洗净血水，以绵帛拭干，然后药干掺。

【主治】玉茎上生疮，不干见骨者。

【宜忌】切忌房室。

59594 轻黄膏

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】轻粉　川黄连各等分

【用法】上为细末，用麻油或凡士林油混合成膏。洗净患处，将药膏涂布之。

【功用】杀菌，燥湿。

【主治】黄水疮、头疮，搔痒浸淫，皮肤湿疹。

59595 轻脚丸

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】川乌头(炮，去皮脐)五两　木瓜二枚　牛膝(去芦头，酒浸一宿)七钱　巴戟七钱(紫色者，酒浸一宿)　青盐　肉苁蓉(酒浸，细锉，焙干)　天麻(去苗)各一两　海桐

皮一两半　防风（去芦头）一两半　甘草半两（炙）　金毛狗脊半两（去毛）　萆薢二两

【用法】上先将木瓜用竹刀切下盖子，剜去子，却填熟艾末令满，将盖子盖定，用竹签签住，入饭甑内蒸烂，先将乌头末同木瓜研匀，次将诸药为细末，同和为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，空心温酒送下。

【主治】脚气，脚膝沉重，疼痛肿满。

【加减】一方加羌活、乳香、没药各一两，兼治妇人产后脚软，行履不得，筋骨疼痛。

59596 **轻脚丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】宣州木瓜二枚（用竹刀切下盖子，剜去子，却填熟艾令满，以盖子盖好，用竹钉签定，入饭甑内蒸烂，然后以文武火焙干，入后药）　肉苁蓉（酒浸一宿）　牛膝（酒浸）　萆薢各二两　金毛狗脊（去毛净）　防风（去芦，去叉股者）　海桐皮（去粗皮）　天麻　全蝎（去毒）　青盐　川续断各一两　甘草（炙）　乳香（别研）　没药（别研）各半两

【用法】上为细末，用川乌头五两，炮，去皮脐，为末，酒煮为丸，如梧桐子大。每服三十丸，渐加至四五十丸，早、晚食前温酒送下；盐汤亦得。

【功用】常服壮脚膝，补虚损，下部之疾更不再发。

【主治】风寒湿留滞肝肾二经，下部虚大，发则攻筑，脐腹俱痛，自汗恶心，呕吐涎沫，肢体酸削，不进饮食。

59597 **轻脚丸**

【方源】《普济方》卷一一八引《余居士选奇方》。

【组成】地肤子一两　白术半两　赤茯苓半两　木猪苓半两（去皮）　舶上茴香半两（炒）　泽泻　赤芍药　紫苏叶　胡芦巴　槟榔　枳实各半两（麸炒，去瓤）　桃仁一两（去皮尖双仁，麸炒）

【用法】上药除桃仁外，为末，入桃仁捣，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，加至百丸，空心紫苏汤送下。

【功用】逐风去湿，消肿，行血止痛。

【临症举例】寒湿　旧有寒湿之疾，每发时痛不可忍，呻吟之声彻于户外，几濒于死，忽遇道人授此方，才服半料，间或发作，顿觉减前时，服尽全料，厥疾遂瘳，信而服之，其验如神。

59598 **轻脚丸**

【方源】《局方》卷一（续添诸局经验秘方）。

【组成】木鳖子（别研）　白胶香（别研）　白芍药各二两　草乌（去皮尖）四两　赤小豆一两（别研为末，打糊）

【用法】上为末，赤小豆糊为丸，如梧桐子大。每服七丸，旋加至十丸，温酒或木瓜汤送下。病在上，食后、临卧服；病在下，空心服。

【主治】左瘫右痪，脚弱不能行履。

【宜忌】忌热物少时。

59599 **轻脚散**

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】天灯心　紫背草　赤牛膝　钩藤根　山苏木　酒坛根　白马骨　马蹄金　铁马鞭　穿山蜈蚣

【用法】酒、水各半煎服。

【主治】锁脚马癀。

59600 **轻斑散**

【方源】《赤水玄珠》卷二十七。

【组成】丝瓜近蒂三寸（连皮子，烧存性，为末）　朱砂五分

【用法】上和匀，砂糖调下。痘出必稀，多者少，少者无。

【主治】痘未见点时。

59601 **轻硫散**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】硫黄一钱　轻粉三分　杏仁十四粒（去皮尖）

【用法】上为末，杏仁研膏，临卧涂鼻，早洗去。

【主治】酒渣鼻，及妇人面上粉刺。

59602 **轻蛤散**

【方源】《解围元薮》卷四。

【组成】五倍子　车米各等分

【用法】上为末用。

【主治】麻风。

59603　轻雷丸

【方源】方出《石室秘录》卷四，名见《洞天奥旨》卷八。

【异名】轻雷丹(《外科集腋》卷五)。

【组成】雷丸三钱

【用法】上为细末，加入轻粉一钱、白茯苓末一钱调匀。敷上即消。

【主治】人面疮。

【方论选录】雷丸此药，最能去毒而逐邪，加入轻粉深入骨髓，邪将何隐?用茯苓不过去其水湿之气耳。

59604　轻雷丹

《外科集腋》卷五。为方出《石室秘录》卷四，名见《洞天奥旨》卷八"轻雷丸"之异名。见该条。

59605　轻腰汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白术一两　薏仁一两　茯苓五钱　防已五分

【用法】水煎服。连服二剂而腰轻矣。

【功用】利腰脐之气，以祛风利湿。

【主治】因房劳力役，又感风湿，腰脐之气未通，风湿入于肾而不得出之腰痛，两腰重如带三千文，不能俯仰者。

【备考】此方惟利湿而不治腰，又能利腰脐之气，一方而两治之也。然不可多服者，以肾宜补而不可泻，防已多用必至过泄肾邪。肾已无邪可祛，而反损正气，故宜用补肾之药(三圣汤)，而前药(本方)不可再用矣。

59606　轻解散

【方源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】防风五分　麦冬三钱　生地三钱　桑白皮二钱　黄芩一钱　柴胡八分　白芍三钱　天花粉五分

【用法】水煎，服二剂。

【主治】天火丹。

59607　轻身一号

【方源】《中医杂志》(1980;10：40)。

【组成】黄耆　防已　白术　川芎　制首乌各 15 克　泽泻　生山楂　丹参　茵陈　水牛角各 30 克　仙灵脾 10 克　生大黄 9 克

【用法】上为一剂，水煎成 100 毫升。每次口服 50 毫升，一日 2 次。超重 25%以上者可增至每日 1.5 剂，即 150 毫升。

【功用】益气健脾，温肾助阳，活血化瘀，利水消肿。

【主治】单纯性肥胖症，症见体态肥胖，疲倦乏力，胸闷气促，腹胀肢沉，腰脊痠痛，便溏浮肿，月经不调，皮肤紫纹，舌胖质淡，苔薄白或白腻，脉象细弱等。

【宜忌】每日主食一般不超过 1 斤。

【方论选录】黄耆、白术益气健脾；仙灵脾温肾助阳；制首乌滋肾填精；川芎、丹参理气活血；防已、泽泻利水消肿；生山楂、水牛角、茵陈降脂；并取茵陈配大黄增加利胆作用，促进脂肪代谢；取黄耆配防已调节水盐代谢。综观全方，具有益气健脾、温肾助阳、滋肾填精、活血调经、利水消肿和降低血脂等药理作用，使肾脾健、阴阳和、痰湿化、瘀血去，代谢过程恢复正常，从而使病情向好的方面转化。

【临症举例】用中药"轻身一号"治疗单纯性肥胖症 50 例，症状、体征明显好转，体重下降者 48 例，无效 2 例，总有效率 96.0%，近期疗效满意。

59608　轻粉毒膏

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】轻粉三钱　炉甘石一两(火煅过，黄连汁浸之)　牡蛎一两(盐泥裹，火煅通红)　真绿豆粉二两(焙干)

【用法】上为末，同生桐油调匀，入瓷盆中，以艾火熏熟，作隔纸膏贴之，两日一换。

【主治】轻粉毒。

59609　轻乳生肌散

【方源】《金鉴》卷六十二。

【组成】石膏（煅）一两　血竭五钱　乳香五钱　轻粉五钱　冰片一钱

【用法】上为末。撒之。

【功用】定痛生肌。

【主治】大毒溃烂红热，肿痛腐脱者。

【加减】有水，加龙骨、白芷各一钱；不收口，加鸡内金（炙）一钱。

59610　**轻剂排石汤**

【方源】《古今名方》引中医研究院广安门医院方。

【组成】车前子　泽泻　石韦　滑石　冬葵子　牛膝　枳壳　王不留行各 15 克　金钱草 30 克　莱菔子 15～30 克　大黄 3～9 克

【功用】行气通淋。

【主治】尿路结石。

【加减】若有脾气虚，加党参、黄耆，去大黄；肾虚，加熟地、何首乌、补骨脂；肾结石，加补肾药；输尿管、膀胱结石，加乌药，重用大黄、莱菔子；少腹拘急，痛及脐中，结石下移时，重用冬葵子、牛膝。

鸦

59611　**鸦片散**

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】真鸦片一钱　莲肉（炒）一钱

【用法】每服半分或一分，米饮调下。立止。

【主治】小儿痘当起胀灌脓时，泄泻不止。

59612　**鸦参丸**

《医级》卷八。为原书同卷“荞参丸”之异名。见该条。

59613　**鸦胆丸**

【方源】《医碥》卷七。

【组成】鸦胆（去壳，捶去皮）一钱　文蛤（醋炒）　枯矾　川连（炒）各三分

【用法】面糊为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服十一二丸，盐梅皮或圆眼干肉或芭蕉子肉包吞，立止。

【主治】痢初起，邪实腹痛，去积滞不愈者。

59614　**鸦胆丸**

【方源】《医碥》卷七。

【组成】鸦胆霜　黄丹各一钱　木香二分

【用法】面糊为丸，亦可乌梅肉为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服十一二丸，盐梅皮或圆眼干肉或芭蕉子肉包吞，立止。

【主治】痢初起，邪实腹痛，去积滞不愈者。

59615　**鸦珠丸**

【方源】《鸡鸣录》。

【组成】沉香五钱　伽南香　母丁香　真珠各一钱

【用法】上为细末，用鸦片烟膏一钱为丸，如黍米大。

【主治】痔漏。

59616　**鸦啖散**

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】老鸦毛（烧灰）　大红绒（灰）各一钱　珍珠五分　冰片一分　枯矾五分　轻粉三分　黄丹一钱　麝香少许

【用法】上为细末，先用苦茶洗净，干掺。其煎剂以意加减用之。

【主治】鸦啖疮。

59617　**鸦鸽散**

【方源】《普济方》卷三八一。

【组成】老鸦头一枚（烧灰，研）　轻粉　黄丹　枯矾各一分　麝香少许

【用法】上为细末。先用温水洗净，掺药。良。

【主治】小儿鸦鸽痱疮。

59618　**鸦胆子油**

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】鸦胆子 30 克

【用法】将鸦胆子剥去壳，取仁捣碎，置瓶中，加入乙醚略高过为度，隔 2 小时后，将上层浮油倒于平底玻璃皿中，等乙醚挥发后即得鸦胆子油，装小瓶中备用。用牙扦挑取很少鸦胆子油小心点于扁平疣或寻常疣。不要碰及好皮肤。

【功用】去疣。

【主治】扁平疣、寻常疣。

59619　**鸦胆子粉**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】鸦胆子(剥去外皮)

【用法】用鸦胆子仁压碎,置小瓶内高压消毒。患处消毒后,用小刀刮破,以见出血为止,将此药粉敷上,用纱布、胶布固定。一周即可脱落。未脱落涂硼酸软膏类即脱落。

【主治】寻常疣。

59620　**鸦片马疳散**

【方源】《痘疹仁端录》卷七。

【组成】儿茶　雄黄　轻粉各五分　鸦片　梅脑　牛黄各一分　熊胆二分　血竭　乳香　没药各五分

【用法】上为末。外搽敷。

【主治】口疳,遍口牙齿烂落,口唇穿破者。

59621　**鸦胆子仁软膏**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】鸦胆子仁(研碎)30 克

【用法】凡士林加至 100 克,调匀外用。用时胶布剪洞,如病灶大贴上,再敷药膏,上盖纱布,每二天换一次。

【主治】瘢痕疙瘩。

鸥

59622　**鸥脂膏**

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】松脂七两　芍药　当归　芎藭　黄芩各二两　鸥脂七两　白蜡五两

【用法】上㕮咀。以腊月猪脂二升二合,微火煎一沸一下,三十过成。以摩于疮上。

【功用】止痛生肌。

【主治】痈疽。

皆

59623　**皆效散**

【方源】《普济方》卷三〇〇。

【组成】石硫黄(研)　干漆(熬)　文蛤(烧作灰)各等分

【用法】上绢筛之。每用取胡桃大,麝香枣核大,研和,先拭去恶物血等,然后敷之,每日三次。

【主治】疳虫蚀唇、鼻、齿、口及余处。

点

59624　**点药**

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】真轻粉五分　杏仁七粒(去皮)　冰片三厘

【用法】上药同捣极烂。洗净点上。

【主治】杨梅疮。

59625　**点药**

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】杏仁四十九粒(去皮尖)　雄黄一钱　轻粉二钱

【用法】先将杏仁捣细,加雄黄、轻粉细末,再研匀。猪胆调点。

【主治】杨梅疮。

59626　**点药**

【方源】《简明医彀》卷八。

【组成】银朱　轻粉　杏仁　雄黄各等分

【用法】上为细末。猪胆调搽;或掺膏药上贴。加冰片尤妙。

【主治】杨梅疮。

59627　**点药**

【方源】《霉疮秘录》卷下。

【组成】大杏仁二十个(针刺火上烧透存性)　胆矾四分　轻粉一钱

【用法】上药共研如膏。点患处。每日先熏后洗,点药,其效甚速。凡患疮头面及不便处者,先熏洗后,点药五日即好。

【主治】杨梅疮。

【备考】熏洗方:番打麻、雷丸各五钱,朴消、地骨皮各一两,黄芩一两半,用河水五碗煎药味出,先熏后洗。

59628　**点水丹**

《普济方》卷七十八。为《续本事》卷四"照水

丹"之异名。见该条。

59629 **点生丹**

【方源】《急救痧症全集》卷下。

【组成】真雄黄一钱 明朱砂一钱 明矾一钱 麝香一分 冰片一分 真飞金十二件 火消一钱 荜茇五厘

【用法】先将雄黄、朱砂等研细，再将荜茇捣碎，同冰片、麝香掺研千余次，末以飞金拂下研匀。将簪蘸吐沫粘药少许，点眼角。

【主治】时疫急痧。

59630 **点玄丹**

【方源】《外科百效》卷一。

【组成】明矾一两 金脚信五钱（火煅存性）

【用法】上为极细末。

【功用】善去恶毒。

59631 **点头散**

【方源】《百一》卷九。

【组成】川芎二两（生） 香附子（去毛，炒）四两

【用法】上为细末。每服一钱，好茶清调下。常服可除根。

【主治】偏正头痛。

59632 **点舌丹**

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】真蟾酥三钱（乳浸） 真麝三分 蜈蚣三条（炙，去头足） 川山甲三钱（土炒成珠） 全蝎 僵蚕（炒去丝） 蝉蜕 明雄黄 朱砂各一钱 乳香（枯） 没药（枯）各五分

【用法】上为细末，用乳浸蟾酥捣为丸，如绿豆大。每服先用二丸，置病人舌下，顷刻口舌觉麻，将葱白三寸，入病口嚼烂，吐在手心，将药三丸包于葱内，用无灰热酒送下。急煎漏芦汤服，外用神灯照之。但疔毒一症，有急疔已走，疔上有红筋一条，或上或下，即于红筋尽头，以针挑破，纳药一丸于针眼上，膏药盖定，其疔自回原处。春、夏、秋急寻菊叶，冬寻菊根同葱捣烂裹吞。

【主治】疔毒。

59633 **点虬丹**

【方源】《辨证录》卷十四。

【组成】水银一钱 冰片一钱 硼砂一分 雄黄三分 樟脑一钱 轻粉三分 白芷一钱 薄荷叶三分

【用法】上各为极细末，以不见水银星为度。水调少许，点虫头或身上，少刻即尽化为水。不须内服煎药，至奇之方也。

【主治】小儿有粪门边拖出长虫，不肯便下，又不肯进入直肠之内，不痛不痒。

59634 **点毒丹**

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】黄柏

【用法】上为极细末，入雄猪胆汁调如粘。用少许点疖中间即消。

【主治】热疖初起未出头。

59635 **点眼丹**

【方源】《玉案》卷四。

【组成】牙消二钱 麝香 朱砂 雄黄各五分

【用法】上为细末，瓷罐收贮。临病以银簪蘸药点两眼内。立时取效。

【主治】一切头痛，心腹绞痛，及绞肠痧，盘肠气痛，疝痛。

59636 **点眼药**

【方源】《洁古家珍》。

【异名】保命点眼药（《保婴撮要》卷四）。

【组成】当归二钱 黄连二钱 防风一钱五分 细辛五分 甘草一钱

【用法】上锉，如麻豆大，水一大碗，文武火煎，滴水中不散为度，入炼蜜少许。点眼。

【功用】除昏退翳，截赤定痛。

59637 **点眼药**

【方源】《济阳纲目》卷一〇一。

【组成】炉甘石一两（煅如鸭头色，以好醋少滴之，多则痛，另研筛过） 珍珠 辰砂 乳香 没药各一钱 硼砂一钱 熊胆（无则不用） 胆矾 轻粉各二分 片脑 麝香各一分

【用法】上为末,筛过,再为极细末,瓷器秘收。点眼。

【主治】赤眼风热壅痛,风眩诸般翳障。

59638 **点眼药**

【方源】《何氏济生论》卷六。

【组成】炉甘石三钱 新珠子七分 硼砂七分 朱砂五分 麝香二分 琥珀五分 真蟾酥(烘去油)一分 儿茶(烘去油)三分 冰片一分 磁石粉五分(人乳、黄连汁煅淬七次)

【用法】各研至无声,和匀。点之。

【功用】去翳膜。

59639 **点眼砂**

【方源】《张氏医通》卷十五。

【异名】人马平安散(原书同卷)、诸葛行军散(《卫生鸿宝》卷一)。

【组成】冰片 麝香 雄黄(水飞) 朱砂(水飞)各半钱 焰消一钱

【用法】上为极细末,瓷瓶收贮。男左女右,以少许点目大眦。立效。用此入时疫病家,则不沾染。

【主治】时疫毒气臭毒,痧胀腹痛。

59640 **点眼散**

《玉案》卷三。为《古今医鉴》卷五引黄宾江方"点眼膏"之异名。见该条。

59641 **点眼煎**

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】栀子仁 蕤仁(去皮) 决明子(微炒)各一两 石膏二两(研) 竹叶二握(洗) 车前叶(切)三合 秦皮(去粗皮)三分 白蜜三两(后人)

【用法】上前七味锉,以井花水五升,煎取汁一升,去滓,入蜜调匀,瓷器中重汤煮如稀饧。每点如大豆许。

【主治】肝实热,目眦热痛。

59642 **点眼膏**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】白蜜十二两(慢火熬,去沫,滤过) 朱砂一分(细研) 黄丹三分(细罗过) 马牙消三分(细研) 蕤仁一分(汤浸,去赤皮,研) 黄连半两(去须,细锉) 黄柏半两(细锉)

【用法】上药与炼蜜搅令匀,入于青竹筒内,安于釜汤中煮,自早至夜,不得住火,水少别暖水更添,时时用槐枝子搅之,至来日早晨取之,以绵滤三两度取清者,用瓷瓶子盛之。铜箸点之。

【主治】眼热毒所攻,肿涩痛。

59643 **点眼膏**

【方源】《古今医鉴》卷五引黄宾江方。

【异名】点眼散(《玉案》卷三)。

【组成】初胎粪(炙干)一钱 雄黄五分 黄连四分 片脑少许

【用法】上为极细末,水调。点两眦。神效。

【主治】一切赤白痢,及噤口危急之症。

59644 **点痣膏**

《外科证治全书》卷一。为《金鉴》卷六十三"水晶膏"之异名。见该条。

59645 **点翳散**

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】心红一钱 枯矾三分 麝香半分

【用法】乳极细无声,收密。点翳上。三次即没。

【主治】眼目翳。

59646 **点翳膏**

《东医宝鉴·外形篇》卷一。即《直指》卷二十"前麓点翳膏"。见该条。

59647 **点点金丹**

【方源】《古今医鉴》卷十五引胡前溪方。

【组成】虾豚一罐(三月清明收)

【用法】用雄黄一两,朱砂一两,为细末,人罐内晒之,至端午日取出听用。如搽疮,用药磨水,点上。立消。

【主治】疔疮发背,无名肿毒。

59648 **点眼水膏**

【方源】《续本事》卷四。

【组成】鹅梨(道按鹅梨,即梨肥大者)一个 鹰爪黄连半两

【用法】上用砂瓶一只,先入梨,次入黄连

末，候初冬第一次下雪时，取雪满铺入砂瓶内，油单封口，入地五寸深，候立春日交春时候过了取出。点眼，或温过洗。妙。

【主治】眼疾。

59649 点眼仙方

【方源】《寿世保元》卷六引马伏所方。

【组成】蕤仁三钱（去皮，将竹纸研去油方入药，用笔筒卷纸，将药铺纸上，重层卷研） 珍珠二分五厘（生用，绵纸包，打碎研） 琥珀二分（生用，纸包，打碎研烂） 熊胆一分五厘（生，研碎） 牛黄一分（生用） 麝香半分（生用） 片脑一分五厘（生用） 蜂蜜三钱五分（用慢火煨化，滤去滓）

【用法】上先称眼药罐，次加蜜，称后入药，搅以上药八味，调匀点眼。

【主治】远年近日烂弦风眼，翳障青盲，肿痛百病。

59650 点眼膏子

【方源】《续本事》卷四。

【组成】羊胆一个

【用法】入蜜一钱在胆内，线扎定，坩锅内满入水煮熟，冷水内浸，取出候干，顿入角罐内。竹箸点眼四角。立效。

【主治】眼目诸疾。

59651 点白还黑丹

《医学启蒙》卷三。为《墨宝斋集验方》卷上“仙方点白还黑丹”之异名。见该条。

59652 点白还黑丹

【方源】年氏《集验良方》卷五。

【组成】三汁膏一两（生地、桑椹、旱莲草各取汁，三汁共用一盂，入铁锅熬之极干，研末听用） 母丁香五钱 没石子五钱 真铅粉五钱（炒）

【用法】上为末，以瓷器盛之，勿泄气。拔去白须，即以笔点记，然后用鲜姜汁调药末少许点孔中。六七日后即变黑。

【功用】乌须。

59653 点药神效膏

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】铅丹二两 蜜半斤（以绢滤过） 硇砂一豆大（明净者） 青盐一钱 马牙消三钱 白龙脑一钱 白矾一豆大（烧过） 大猪胆二枚（新好者）

【用法】上药并入瓷瓶内和匀，用重汤于锅内煮，候紫色为度，兼不住手搅之，药成，只于瓶内盛贮封角。每遇使时，旋取些少，以井华水调，用铜箸子点，有泪下，以帛拭之，候泪住，即再点，每昼夜可三五度。

【主治】翳膜遮障，目风泪出。

【备考】本方方名，《普济方》引作“神效膏”。

59654 点烂弦风药

【方源】方出《医学入门》卷七，名见《东医宝鉴·外形篇》卷一。

【组成】薄荷 荆芥 细辛

【用法】上为末，如烧香状烧之，以碗涂蜜少许于内，覆烟上，取烟尽后，以瓷罐收之。凡眼见风热多泪者，皆可点之。

【主治】烂弦眼。

59655 点眼七宝散

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】珊瑚（研细） 琥珀（研细） 玉屑（研细） 曾青（研细） 紫贝（研细） 朱砂（研细） 鸡子壳（去白膜）各半两

【用法】上为极细末。点时仰卧，以铜箸取如绿豆大点眼，每日三五次。

【主治】风热上冲，目赤疼，久不愈。

59656 点眼万明膏

【方源】年氏《集验良方》卷四。

【组成】炉甘石三钱（火煅，研细，入人乳浸四十九日） 川黄连五分（乳制） 辰砂三钱 硼砂五分 胆矾三分 冰片三分

【用法】上为极细末听用。雨前茶陈年者四两，甘菊花四两，二味用水二大碗，子净瓦锅中熬四五十沸，滤去茶、菊，再用重汤熬成膏子一杯，入熊胆五分，溶化，收前药和匀成锭，入瓷器中。如遇一切眼疾，收清水化膏少许，用骨簪蘸药点入两眼，闭目片刻，出泪而愈。

【主治】眼疾。

59657　**点眼止泪散**

【方源】《眼科龙木论》卷五。

【组成】雄黄五钱　曾青一两　龙脑　白矾灰　细辛　干姜灰各等分

【用法】上为细末如粉面。每至夜后点在眼内。立效。

【主治】冲风泪出外障。

59658　**点眼贝齿散**

《圣济总录》卷一〇九。为《普济方》卷八十四引《圣惠》"贝齿散"之异名。见该条。

59659　**点眼丹砂散**

【方源】《同寿录》卷二。

【组成】硼砂　海螵蛸(去壳)　好炉甘石(童便煅淬七次，飞过)各一两　朱砂五钱(用此则不枯)

【用法】上为细末，瓷瓶收贮。临用少加冰片研，点。极妙。

【主治】眼疾。

59660　**点眼丹砂膏**

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】丹砂(研)半两　蕤仁(去皮)三分　胡粉两棋子大(火上炒)　龙脑(研)半钱

【用法】上合研，以真酥调如膏，再研匀，瓷合盛，勿令泄气。每点黍米许，每日三次。

【主治】风毒冲目赤痛。

59661　**点眼丹砂膏**

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】丹砂(研)　干姜(炮，捣)　越燕屎(研)各一分

【用法】上为细末。以人乳调，点眼中，每日三次。

【主治】目珠子卒脱出，并有青翳。

59662　**点眼艾熏散**

【方源】方出《圣惠》卷三十二，名见《圣济总录》卷一〇九。

【组成】蕤仁一分(汤浸，去赤皮)　腻粉半钱　黄牛酥一分　熟艾如鸡子大

【用法】上药前三味于乳钵内为细末，稀稠得所，令药着在乳钵底，然后取艾烧令烟出，却将乳钵合烟上熏之，候艾烟出尽，以槐木槌细研，令烟气相入。每用时，取少许，点眼大眦头。极效。

【主治】眼中胬肉。

59663　**点眼玉屑散**

【方源】《医方类聚》卷七十引《经验秘方》。

【组成】好净朴消二斗

【用法】上用河水二桶，用萝卜二个切作如指厚大片，同下釜内，滚七分，取出萝卜不用，将消脚盆内盛顿，冷定，将清水澄去，次日消定，另纸袋用针遍刺窍，装消在内，悬于通风处，至三月后化开，若白雪，细绢罗过点之。不通道路者，点两个月后明如初。修制依十一月、十二月盛寒之时。

【功用】去冷泪，截赤定痛，截恶眼。

59664　**点眼古钱煎**

《普济方》卷七十一。为《圣济总录》卷一〇二"点眼古字钱煎"之异名。见该条。

59665　**点眼石胆丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】石胆(研)　铜青(研)　硇砂(去石，研)　干姜(炮)　龙脑(研)　戎盐(研)各一分　石决明(七孔者，刮，洗，焙，捣末)　乌贼鱼骨(去甲)　秦皮(去粗皮)　细辛(去苗叶)　鸡舌香各半两　决明子(炒)三分　黄连(去须)一两

【用法】上为末，合和重研，炼蜜为丸，如麻子大。临卧纳大眦头各一丸。

【主治】眼赤风泪出，痒烂久积，生翳息肉。

59666　**点眼石胆散**

【方源】《圣济总录》卷一一三。

【组成】石胆(研如粉)一分　黄连(去须，捣)　黄柏(去粗皮，捣)各三分　蕤仁(去皮，研)　铜青(研)　芒消各半两

【用法】上为末，更入乳钵中，重研令极细匀。每取如黍米大，点目眦头。

【主治】针眼暴肿，痛不得开。

59667　**点眼龙脑煎**

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】龙脑（研）半钱　铅丹（罗）半两　白蜜（绵滤）二两

【用法】上药和匀，瓷瓶内密封，重汤煮一炊时，取出，点目眦。

【主治】风毒冲目赤痛。

59668 点眼龙脑膏

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】山栀子（去皮）三钱　甘草七钱（生）　生干地黄二两　熟干地黄一两　黄连（去须）　青葙子各八钱　当归四钱　决明子一合（以上为粗末）　马牙消六钱　青盐四钱　密陀僧半两　朴消一两一钱　石决明一枚（米泔浸三日，刮洗）　乳香一钱　硇砂一字　蓬砂　蕤仁各二钱（以上为细末）　灯心半束（切碎）　铅丹一两三分（罗过）　大枣三十个（去核，切）　白蜜三斤（以上同拌匀，入瓷瓶子内，用箬叶叶油纸封定，勿令透气，坐在锅内，重汤煮一日，取出，绢滤去滓）　丹砂（研）二钱　龙脑（研）一钱　麝香（成颗者，研）　腻粉各一字（研）

【用法】上除前膏外，将后四味同研令匀，入前膏内，搅令相得，以干瓷器收之。用铜箸如常法点眼；其药滓更以雪水二碗，搅和入罐子，依前法煮一日，滤取清者点眼；其滓焙干后，入蔓青子、恶实各二两炒过，同捣为末。每服一钱匕，食后荆芥、腊茶调下。如患眼只见一二分者，百日见效。

【主治】肝热冲发于目，赤肿碜痛。

【备考】本方方名，《普济方》引作“龙脑膏”。

59669 点眼白矾粉

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】白矾（色明净者）

【用法】上研如粉。每点如黍米大于翳上。即泪出，以新绵拭之，其病逐泪出。

【主治】目热，息肉淫肤，赤白膜。

59670 点眼圣仙方

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】人屎　猫屎　狗屎各一两（用黍糠二升炒黄色，入前三味制过，各净用六钱）　山茨菰五钱　白犀角（锉）七钱　羚羊角（锉）七钱　火消七钱　黄连（去毛）六钱　血竭五钱　没药五钱

【用法】上为细末，将小枣剖开去核，每一个入药末二分，合上，用针将枣刺遍眼，乌金纸包裹，入阳城罐内封固，打火线香一炷，取出冷定，去枣上皮。每枣连枣称一钱研细，入好片脑三分，为极细末。如伤寒，点男左女右大眼眦，汗出即愈；如伤寒十二日无汗者，用药吹入男左女右鼻孔，汗出即愈；如阴症瘟疫，头项俱肿者，俱如上点，汗出即愈。

【主治】伤寒大头瘟肿项，疟疾，痘疹。

59671 点眼地黄膏

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】生地一合　黄连一两　黄柏　寒水石各五钱

【用法】用地黄捣自然汁和成饼子。用时衬纸点眼上。

【主治】被物撞打，及风热暴赤肿痛，目热泪出。

【加减】如火烧汤泼，再加黄芩、山栀、大黄各等分为末，酒调敷。

59672 点眼光明丹

【方源】《医学正传》卷五。

【异名】开明银海丹（《卫生鸿宝》卷二）。

【组成】白炉甘石一两（以黄连五钱煎浓汁，滤去滓，用炭火煅炉甘石通红，淬黄连汁内，如此者七次，研）　辰砂一钱　硼砂二钱　轻粉五分　片脑三分（多至五分）　麝香一分

【用法】上各为极细末，一处和匀，再研一二日无声，银瓶盛贮，密封口不可令泄气。点眼。极妙。

【主治】一切风热上壅，两目赤肿涩痛，风弦烂眼，及内外翳障。

【加减】如赤眼肿痛，加乳香、没药各五分；内外翳障，加珍珠五分、鸭嘴胆矾二分、熊胆二分；烂弦风眼，加铜青五分、飞丹五分。

【备考】本方方名，《医统》引作“光明丹”。

59673　点眼朱砂煎

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】朱砂一分(细研)　琥珀一分(细研)　黄丹一钱　黄柏(生)一分　黄连末一分　蕤仁一分(汤浸，去赤皮，细研)　马牙消半两(细研)

【用法】上为细末，后用白蜜三两，并滤去滓，入诸药更研令匀，入一竹筒盛，纳重汤煮之半日，著柳枝子时时搅之，候色如紫，以绵再滤过。每日三四次，以铜箸取少许点之。

【主治】内障针开后，眼经年热涩痛，及眼障晕。

59674　点眼决明散

《圣济总录》卷一一一。为《圣惠》卷三十三“石决明散”之异名。见该条。

59675　点眼杏仁膏

【方源】《圣惠》卷三十二。

【异名】杏仁膏(《普济方》卷八十四)。

【组成】杏仁一分(去皮尖)　腻粉半钱

【用法】上合研如膏。每取少许点浮膜。不过四五度愈。

【主治】①《圣惠》：丹石毒冲目赤痒，及生浮膜。②《圣济总录》：目生胬肉，或痒或痛，息肉渐长，侵覆瞳仁。

59676　点眼杏仁膏

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】杏仁油半鸡子壳许　食盐(末)一钱

【用法】用银石器着盐末并杏仁油相和，以柳枝一握，紧束缚一头，研三日色黑，又取熟艾如鸡子大，掘地作坑子，置瓦于坑，上安艾，烧令通气，火尽即成，更和令匀，常盖头。每以绵缠杖头，点少许在两眦头，夜卧时点。频用甚效。

【主治】眼胎赤。

59677　点眼杏仁膏

《圣济总录》卷一〇五。为《圣惠》卷八十九“杏仁膏”之异名。见该条。

59678　点眼杏仁膏

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】杏仁(汤浸，去皮尖，研)半两　黄连(去须)一两　轻粉半钱

【用法】上药以新绵裹，水一盏，浸一复时。每日三五次点之。

【主治】肝热，飞血赤脉。

59679　点眼杏仁膏

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】杏仁(汤浸，去皮尖双仁，研如膏)半两　黄连(去须，锉)半两　青盐半两　腻粉一钱匕

【用法】先以水一盏半，煎杏仁、黄连至半盏，滤去滓，入盐及腻粉，更煎五七沸，入盒中盛候冷。每日点三次。

【主治】目生胬肉，风翳障。

【备考】本方方名，《普济方》引作“杏仁膏”。

59680　点眼还睛膏

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】黄连(去须)　铅丹(水飞过)各一两　黄柏(去粗皮)半两　桃仁(去皮尖双仁)　杏仁(去皮尖双仁)各七粒　龙脑(研)半钱　白沙蜜四两

【用法】上除龙脑、铅丹、蜜外，各为末，用井水二盏，及蜜、铅丹搅匀，浸三日后，入银石器内，文武火熬及一半，绵滤去滓，入龙脑成膏，瓷盒子内密封，掘地埋一宿，出火毒。点眼，不拘时候。

【主治】翳障。

【备考】本方方名，《普济方》引作“还睛膏”。

59681　点眼乳汁煎

《圣济总录》卷一〇七。为《外台》卷二十一引《集验方》“乳汁煎”之异名。见该条。

59682　点眼金丝膏

【方源】《圣济总录》(人卫本)卷一〇四。

【组成】黄连(去须)二两　大黄　龙胆　黄柏(去粗皮)　当归　山栀子仁各一两(以

上为末） 青竹叶一百片（切） 大枣二十个（去核，切） 灯心（切） 蓬砂（明者） 乳香（研）各一分

【用法】上药用水五升，不拘冬夏，浸一时辰取出，于银器内慢火熬，不令大沸，候气尽汁，下火放冷，用绢绞取汁，于无风土处澄一时辰，去滓，于银器内慢火熬令减半，入白蜜半斤，同搅不得住手，候有蜜香，以手挑起有丝即止，放冷，再以夹绢袋子滤过，以瓷合盛之。每取一茶脚许，研龙脑一字极细，入膏同研一二千遍令匀，取少许点之。

【主治】风热上攻，目赤肿痛。

【备考】本方方名，原书文瑞楼本作“金丝膏”。

59683 点眼金丝膏

【方源】《奇效良方》卷五十七。

【组成】硇砂（研） 晋矾（研） 青盐（研）各一钱 乳香（好者，细研） 片脑（研）各二钱 当归（锉，净洗） 黄丹（研）各半两 黄连一两

【用法】上用好蜜四两，除片脑外和七味，纳入青笙竹筒内，油单纸裹筒口五七重，紧系定，入汤瓶中，文武火煮一周时，取出劈破，新绵滤去药滓，方下片脑和匀，瓷瓶收贮，再用油单纸五七重封系瓶口，埋露地内去火毒，候半月取出。每用一粟米大点眼。

【主治】男子、妇人目疾远年近日，翳膜遮睛，攀睛胬肉，拳毛倒睫，黑花烂弦，迎风羞明冷泪，及赤眼肿痛。

59684 点眼金华水

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】黄连末一分 杏仁七枚（去皮尖双仁，细研） 硇砂一块（豌豆大，研） 乳香一块（黑豆大，研） 铜绿一字（煅过） 腻粉一钱匕（研） 青古老钱三文（与诸药同浸） 龙脑半钱匕（研） 滑石半钱匕（研） 艾灰半钱匕（研）

【用法】上除青古老钱外，为细末，与古老钱入在绵子内，用井华水浸三七日后。点目眦头。

【主治】肝脏有热，血脉壅滞，津液不荣，目中干涩碜痛。

59685 点眼枸杞煎

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】枸杞叶半斤（研取汁） 杏仁七枚（去皮尖，研） 黄连一分（去须，捣罗为末） 腻粉一钱 青盐半钱

【用法】上除枸杞汁外，以新绵裹，纳净瓷盒中，将枸杞汁浸一复时后，绞捩去滓。以铜箸头取少许点目中，每日三五次。

【主治】眼赤痛，昼夜不开。

【备考】本方方名，《普济方》引作“枸杞煎”。

59686 点眼胡粉膏

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】胡粉一两半 蕤仁（去皮）一两

【用法】先将蕤仁研令烂，次下胡粉，更研熟，又捣生麻子为烛燃着，别取猪脂肪于烛焰上烧，使脂流下，滴入蕤仁、胡粉中，更同研令匀如饧，以绵缠细杖子头，纳药中，乘温点目两眦头。药须夜用。如冷，还放烛焰上暖之。

【主治】久患胎赤眼。

59687 点眼香连膏

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】白沙蜜五两（绢滤去滓） 硇砂五钱（通明者，研） 乳香（研）一钱 青盐一钱（研） 铅丹一钱 黄连三两（去须，为细末。以上六味除蜜外，并用新汲水三大盏于银石器内，同煎至一大盏后入蜜，更用慢火熬成膏，不住手搅，候引之如丝线，以重绵绞去滓，入瓷瓶内盛） 水银半钱 轻粉一钱 龙脑一钱 麝香（研）一钱

【用法】上除前膏外，将后四味为细末，入在药膏内，用油单封三五重系定。如春、夏、秋合时，即以麻绳子坠在井底一七日取出；若冬月合时，即于背阴处封闭二七日出之。除打损眼外，并可治。

【主治】目生翳膜。

59688　点眼食盐膏

【方源】方出《千金》卷六，名见《圣济总录》卷一〇九。

【异名】石盐膏(《普济方》卷八十二)。

【组成】驴脂　石盐(末)

【用法】上和合，令调。注目两眦头，每日白天三次夜一次。愈。

【主治】目中息肉。

【备考】《圣济总录》本方用食盐一分、驴脂一两。

59689　点眼秦皮汤

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】秦皮(锉碎)三两　青五铢钱七文　黄连(去须)一两　蕤仁(去皮)半两　淡竹叶(洗，切)三十片

【用法】上药用水一升半，煎至七合，去滓。临卧时用净渍，点眼中；或洗眼亦得。

【主治】风热上冲，目赤痛，久患不愈。

59690　点眼秦皮煎

《圣济总录》卷一〇二。为《外台》卷二引张文仲方"秦皮汤"之异名。见该条。

59691　点眼真珠散

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】真珠(研)　水精(研)　琥珀(研)　石决明(捣末)各半两　丹砂(研)一两　龙脑(研)一分

【用法】上再研令匀细。每点如半小豆许，一日二次。

【主治】血灌瞳仁，渐生翳障。

59692　点眼真珠散

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】真珠末　琥珀各一分　龙脑　丹砂各半分　硇砂两豆大

【用法】上为细末。每日点眼三五次。

【主治】风热，赤脉贯黑睛，及有花翳。

59693　点眼真珠煎

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】真珠(细研)一分　鲤鱼胆二枚　白蜜二两

【用法】上合和铜器中，微火煎取一半，新绵滤过，瓷瓶中盛。每以铜箸点如黍米大，著目眦。即泪出，频点取愈。

【主治】肝虚寒，茫茫不见物。

59694　点眼盐绿膏

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【组成】盐绿一分　蜜半两

【用法】上药于蚌蛤壳内相合。每夜临卧时于火上炙令暖，点目眦头。立愈。

【主治】目胎赤痛。

59695　点眼黄连散

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】黄连(去须，末)　蕤仁(去皮)各一分　胡粉一钱

【用法】先将蕤仁去膜，于铜器中用槐木杵为极细末，次入黄连末、胡粉，合和更研，取细为度。每夜卧点一黍米大在目眦头，不过三两次愈。

【主治】眼赤风涩隐，肿疼生疮。

59696　点眼黄连煎

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】黄连半两(去须)　马牙消一分　蜜半匙

【用法】取大梨两枚，剜作坑子，留蒂作盖子，用绵裹诸药末，纳和梨中，以盖子覆之，冬月一伏时，夏月从旦至暮即得，勿令有尘污，取其汁。每日点眼三五次。

【主治】眼赤痛。

59697　点眼黄连煎

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【异名】黄连煎(《普济方》卷七十四)。

【组成】甘蔗(汁)二合　黄连(捣碎)半两

【用法】上药于铜器中，以慢火养，令汁涸去半，以绵滤去滓。每日点眼两次。

【主治】眼目暴赤，碜涩疼痛。

59698　点眼黄连煎

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【异名】黄连煎(《普济方》卷七十五)。

【组成】黄连(去须)三分　甘竹叶一握

乌梅二七枚　古钱二七枚

【用法】上除古钱外为末，入钱，以水一碗半，渍药半日，煎取七分，绵滤密封，勿泄气。每日点眼三次。

【主治】风毒目赤痛。

59699 点眼黄连煎

《圣济总录》卷一〇五。为《圣惠》卷三十二“胡黄连煎”之异名。见该条。

59700 点眼黄连煎

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】黄连（去须）半两

【用法】上锉，如麻豆，分作二分，一分瓷器内炒紫色，一分生用，同和；别以木炭灰二钱匕，与黄连同用沸汤半盏浸良久，以细熟绢滤过取汁，瓷器盛，就冷水内，沉令极冷。点眼中。或更细研少龙脑相和，尤佳。

【主治】肝热目赤，干涩磣痛。

59701 点眼黄连膏

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】黄连（去须，椎碎）半两　马牙消（研）一钱

【用法】将黄连用水浸，于日内晒令色浓，以绵滤过，后下消末子黄连汁中，依前日内晒干，为细末。每以一豆许，水调，点注目眦。

【主治】积年风热毒气不散，目眦赤烂磣痛。

59702 点眼黄连膏

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】黄连（去须）　黄柏（去粗皮，蜜炙）　升麻　蕤仁（去皮）各一两　细辛（去苗叶）三分　石胆末半钱（研极细）　龙脑（研细）一两　蜜一两

【用法】上除龙脑、石胆外，为粗末，以水二升，煎至一升，滤去滓，两遍澄清，次下白蜜一两，煎令稀稠得所，后入石胆、龙脑搅匀，纳瓷盒中蜜封。每点如黍米大。

【主治】风赤眼胬肉痒痛。

【备考】本方方名，《普济方》引作“黄连膏”。

59703 点眼雪花丸

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【异名】雪花丸（《普济方》卷七十五）。

【组成】杏仁（汤浸，去皮尖双仁，研）四十九粒　蕤仁（去皮，研）一百粒　青盐（皂子大）五块　砂糖弹子大

【用法】上为末，为丸如黍米大。每用一丸，入腻粉少许，生绢包，沸汤调，去滓，乘热洗，冷即止。

【主治】风毒赤眼，昏涩痒痛，翳膜瘀肉。

59704 点眼雀粪膏

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【异名】雀乳散（《奇效良方》卷五十七）。

【组成】雄雀粪

【用法】上取细直者，以乳汁和研细。点肤翳上。

【主治】①《圣济总录》：息肉淫肤赤白膜。②《奇效良方》：眼热毒，卒生翳。

59705 点眼铜绿膏

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】铜绿半两　龙脑半钱　麝香半钱　乌贼鱼骨一分　马牙消一分　蕤仁一分（汤浸，去皮）　水银一两（豆大）

【用法】上为细末。每用药一字，入人乳中，调和如膏。每以铜箸头取少许点之，每日三五次。

【主治】风赤眼及痒痛。

59706 点眼猪胆膏

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】豮猪胆不拘多少（取汁）

【用法】上入银石器中，慢火熬，以少浆水调如膏。每点少许，每日三五次。

【主治】①《圣济总录》：飞血赤脉及疼痛。②《梅氏验方新编》：眼生翳膜。

59707 点眼雄黄散

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】雄黄（研）一两半　细辛（去苗叶）三分　黄连（去须）一两半　干姜（炮）三分　黄柏（去粗皮）一两半　菊花一两（三月三日

日未出时收之)

【用法】上为极细末,于瓷器中盛。每取黍米许点目眦,闭目良久。

【主治】风毒赤痛,眦烂生疮,冲风有泪。

59708　点眼雄黄膏

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】雄黄(研)　干姜(炮,捣末)　黄连(去须,捣末)　矾石(烧令汁尽,研)　丹砂(研)各一分　麝香(研)一钱

【用法】上用雪水二盏调和,入瓷瓶子内,重汤煮一日,药成候冷,用绵滤过。点少许于目眦头。

【主治】眼暗晕生翳膜,累年不愈,兼干涩痛。

59709　点眼蜗牛浆

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】生蜗牛一枚

【用法】上药去其掩,纳丹砂末于口中,火上炙沸,以绵注取汁,敷眦中。

【主治】息肉淫肤,赤白膜。

59710　点眼熊胆膏

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】古铜钱二十一文(完用)　甘菊花四两　黄连(去须)　郁金　黄柏(去粗皮,蜜炙)各二两　铅丹　太阴玄精石　井泉石　龙骨　不灰木　芜荑(去皮)　代赭各半两　滑石　乌贼鱼骨(去坚处)各一两　蕤仁(去壳)半两　硼砂　麒麟竭　没药　青盐　铜青各半两　马牙消　乳香各一分　硇砂一钱半　麝香　龙脑各一钱　熊胆一分　雄雀粪七粒　腻粉二钱

【用法】前五味,菊花揉碎,黄连以下三物细锉,用水二升,入铜钱,同于银石器中慢火熬至一升,新布滤去滓;铅丹以下十味,细研成粉,入蜜六两,并前药汁和匀,银器内重汤煮六时辰,再以新绵绞滤去滓;硼砂以下十三味,并细研罗过,再研如面,入前膏内,再用重汤煮如稀饧。如要丸,即丸如梧桐子大。每用一丸,水化,以铜箸点两眦。久患瘀睑烂诸疾,点此无不愈者。暴赤目风痒,只点三两次即愈;有人瘀肉满眼,用此亦消尽,明如未病时。

【主治】久患瘀肉,睑烂诸疾,及暴赤目风痒。

59711　点眼蕤仁煎

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】蕤仁(去皮,研)二两　黄连(去须,锉)　地骨皮(取白者用)　曾青(研如粉)各一两　青盐一分　古钱十文　蜜二盏

【用法】上以新绵裹六味,安新瓷瓶中,与蜜相和,煮一复时后,以重绵滤去滓令尽,依前安瓶子中,著露地两宿去毒。每点黍米大,每日三五次。

【主治】风毒坠睛。

59712　点眼蕤仁煎

【方源】《圣济总录》卷一一三。

【组成】蕤仁(去皮,研)　秦皮(去粗皮)　黄柏(去粗皮)　青竹茹(洗,切)各一两　栀子仁半两

【用法】上锉。以水三升,入铜器内,煎取一升,以绵滤取清汁点眼,日三五度。

【主治】热毒攻注,目眦肿结赤痛。

59713　点眼蕤仁膏

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】蕤仁半两(汤浸,去皮)　腻粉二钱　驴脂一分

【用法】上先将蕤仁为细末,又下腻粉,以驴脂匀调如膏,盛于瓷盒内,勿令风土入。每夜卧时以铜箸取少许点目中。

【主治】风赤眼。

59714　点眼蕤仁膏

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】蕤仁(去皮,细研)半两　好酥一栗子大

【用法】将蕤仁与酥相和为末,摊碗内,后取艾一小团,烧令烟出,即将碗子覆烟上熏之,待艾烟尽即止,重为末。每以麻子大点两眦头,每日两次。

【主治】风热,眼飞血赤脉,仍痒痛无定。

59715 点眼蕤仁膏

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】蕤仁（去皮，研如膏）半两 青盐（末）一钱 龙脑少许

【用法】上为末，用乳汁少许调和如膏。每以麻子大点眼，每日三五次。

【主治】风热，目赤生疮。

59716 点喉神效方

【方源】《喉科紫珍集》卷上。

【组成】井华水四碗 剔牙松叶一握 人中白三钱

【用法】用井华水，入剔牙松叶，煎至三碗，用人中白研细，每碗入一钱调匀。能饮者饮之；不能饮者，取匙渐滴患处。立愈。不论喉间何毒已未成者，点之即效。

【主治】喉间肿痛，或溃烂出血，大发寒热。

59717 点药石决明散

《杂病源流犀烛》卷二十二。为《圣惠》卷三十三“石决明散”之异名。见该条。

59718 点眼小黄连膏

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】黄连（去须，捣末） 芦荟（研）各一两 龙脑（别研）半钱

【用法】先将黄连、芦荟末以新绵裹，用水二盏，于银器中以重火煮取汁，三分减二，即绵滤去药，入龙脑，以瓷瓶子内收。每日点眼三两次。

【主治】风毒赤烂，不以年月久近，发歇频并，视物泪出不止。

59719 点眼古字钱煎

【方源】《圣济总录》卷一〇二。

【异名】点眼古钱煎（《普济方》卷七十一）。

【组成】古铜钱三十文 食盐末二分 酽醋一升

【用法】将钱重以食盐末填孔中令满，以五月五日午时，于石上用炭火烧令极赤，然后投醋中，候冷倾向小瓷瓶中盛，用纸三十九重封瓶口，一日去一重，去尽。每以铜箸蘸如黍米大点目眦中。

【主治】积年赤眼胎赤。

59720 点眼白蜜黄连膏

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】白蜜半合 黄连（去须）一两 大枣五枚 淡竹叶一握（洗）

【用法】用水二升，先煎竹叶取一升，去滓；下大枣及黄连、白蜜，煎取三合，去滓，重汤煎如稀饧。逐夜取少许，点眼中三两滴。盖覆勿令尘灰入。

【主治】风毒攻眼，黑花不见物。

背

59721 背疽掺药

【方源】《洪氏集验方》卷二引童县尉方。

【组成】鲫鱼一尾（剖去肠脏）

【用法】以羯羊粪实其中，烘焙焦黑，极干燥，为细末。干掺之。

【主治】背疽。

【临症举例】背疽 龙游有患背疽，已溃，如碗面大，视五脏仅隔薄膜耳，自谓必死。用此方干掺之，疮口遂收，至今无恙。

【备考】本方方名，《景岳全书》引作“收口掺药”。

59722 背疽照火方

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】麝香二分 雄黄 朱砂 血竭 没药各一钱

【用法】上为细末，棉纸拈长尺许。每用药三分，真麻油润灼，离疮半寸许，自外而内周围徐徐照之。火头上出，药气熏入，毒疮随气解散，自不内侵脏腑。初用三条，渐加至五六七条，疮势渐消，又渐减之，熏罢，随用敷药。

【主治】背疽阴症。

临

59723 临汝药酒

【方源】《河南省药品标准》。

【组成】当归 250 克 高良姜 250 克 生草乌 750 克 丁香 250 克

【用法】取丁香制成粗粉，余药切片，混合装入袋内，加 61℃白酒 6000 毫升，密闭，水浴加热，使内温达 65～70℃，保持 24 小时，降至室温，过滤，压榨残渣，合并滤液与压榨液。另取红糖 1000 克，炒至棕色味苦，加入酒内搅匀，静置 5～7 天，纱布过滤，至澄清液灌装，灯检，包装即得。口服，每服 1 毫升，每日二次，早晚空腹服。

【功用】温中散寒，活血祛风。

【主治】风湿麻木，腰背冷痛，半身不遂，口眼歪斜，产后中风。

【宜忌】服后两小时内禁热饮食；高血压、心脏病、孕妇忌服。

59724 临河风气药酒

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】当归身一两五钱　白芍药　薏苡仁　生地各一两　香附　杜仲各八钱　虎骨(酥炙)　秦艽各六钱　真川芎七钱　川续断　羌活　五加皮各五钱

【用法】上用头生酒三十斤，封固煮三炷香，放土地上退火气一七。每晚温饮一杯。

【主治】痛风。

韭

59725 韭子丸

【方源】《外台》卷十六引《深师方》。

【组成】韭子五合(熬)　大枣五个　黄耆　人参　甘草(炙)　干姜　当归　龙骨　半夏(洗)　芍药各三两

【用法】上为末，以白蜜枣膏为丸，如梧桐子大。每服十丸，每日三四次。

【主治】虚劳，梦泄精。

【宜忌】忌海藻、菘菜、羊肉、饧。

59726 韭子丸

【方源】《千金》卷十九。

【组成】韭子一升　甘草　桂心　紫石英　禹余粮　远志　山茱萸　当归　天雄　紫菀　薯蓣　天门冬　细辛　茯苓　菖蒲　僵蚕　人参　杜仲　白术　干姜　芎䓖　附子　石斛各一两半　苁蓉　黄耆　菟丝子　干地黄　蛇床子各二两　干漆四两　牛髓四两　大枣五十个

【用法】上为末，牛髓合白蜜、枣膏为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空腹服，一日二次，可加至二十丸。

【主治】房室过度，精泄自出不禁，腰背不得屈伸，食不生肌，两脚苦弱。

【方论选录】《千金方衍义》：韭子丸中助阳益气，固精养荣，祛风涤垢利窍之品无不毕具。凡阳衰不能统御阴精者，于中采择数味便足成方，不必固守成法也。

【备考】《千金方衍义》：世本干胶作干漆，传写之误，万无峻药入于补益剂中，反倍诸味之理，观禁精汤第三方用干胶可以类推。

59727 韭子丸

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】韭子三合(微炒)　鹿茸二两(劈破，涂酥炙微黄)　杜仲一两半(去粗皮，微炙)　干姜一两(炮裂，锉)　桑螵蛸二两(微炒)　白龙骨一两　菟丝子二两(酒浸一宿，晒干，别捣为末)　天雄一两(炮裂，去皮脐)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】虚劳，小便白浊，及遗泄不知。

59728 韭子丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】韭子三合(微炒)　鹿茸二两(去毛，涂酥炙微黄)　杜仲二两(去皴皮，炙微赤，锉)　干姜二两(炮裂，锉)　桑螵蛸二两(微炒)　白龙骨三两　天雄二两(炮裂，去皮脐)　菟丝子三两(酒浸三日，晒干，别捣为末)　五味子二两　山茱萸二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】虚劳羸瘦，肾虚梦泄不知。

59729 韭子丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】韭子一两(微炒)　鹿茸一两半(去

毛，涂酥炙微黄） 桑螵蛸一两（微炒） 龙骨一两半 车前子一两 天雄一两（炮裂，去皮脐） 干姜一两（炮裂，锉） 菟丝子二两（酒浸三日，晒干，别研为末）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】虚劳，小便出精。

59730 **韭子丸**

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】韭子一两 乳香一分 臭黄一分 干蝎半两

【用法】上为末，消黄蜡成汁为丸，如弹子大。即以瓷瓶子内，先着灰，烧一丸，用纸盖，以笔管引烟出，熏牙蚛孔处。其虫尽出。或将药瓶于水碗中安着，其虫尽下，扑在水中。

【主治】牙齿有蚛虫，疼痛甚者。

59731 **韭子丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】韭子二两（酒煮十余沸，炒令干） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 龙骨一两 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 附子一两（炮裂，去皮脐） 鹿角屑一两 山茱萸一两 桂心一两 车前子一两 天雄一两（炮裂，去皮脐） 补骨脂二两（微炒） 槐子一两（黑大者，炒令香）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心以温酒送下。

【主治】下元虚惫，小便滑数，虚损不足。

59732 **韭子丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】韭子一两（微炒令香） 鹿茸一两（去毛，涂酥炙令微黄） 石斛三分（去根，锉） 柏子仁三分 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干） 桂心三分（去皮） 牛膝三分（去苗） 泽泻三分 川椒三分（去目及闭口者，微炒出汗） 远志三分（去心） 附子一两（炮裂，去皮脐） 蛇床子半两 芎䓖半两 五味子半两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 白术三分 薯蓣三分 巴戟三分 干姜半两（炮裂，锉） 黄耆三分（锉） 楮实一两（水淘去浮者，晒干，微炒） 狗脊三分（去毛） 杜仲三分（去粗皮，炙微黄，锉） 覆盆子三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日三十丸，渐加至四十丸为度，空心以温酒送下。

【主治】下元虚惫，惊悸梦泄，腰脚无力，肌体羸瘦，颜色萎弱，食欲减少。

59733 **韭子丸**

【方源】《圣济总录》卷九十一。

【组成】韭子二两（以醋汤煮后，炒令如油麻者） 牛膝（酒浸，切，焙） 当归（切，焙） 桂（去粗皮） 干姜（炮裂） 人参 芎䓖 大黄各半两 巴豆九十粒（去皮心，麸炒，别研出油）

【用法】将前八味为末，入巴豆旋调和令匀，次下熟蜜为丸，如梧桐子大。每服二丸至三丸，空心以温酒送下。取溏利为度。

【主治】虚劳积聚，满闷疼痛，及一切风劳冷气，积年不愈，攻击四肢，遍体疲疼，面无颜色，或即浮肿，脚膝虚肿，行步无力，大肠秘涩，常有结粪，膝冷腰疼，吃食无味。妇人虚冷血气，年深不愈，气攻四肢，心膈刺痛，经脉不调，面如蜡色，手足虚肿。

59734 **韭子丸**

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】韭子（炒）三两半 附子（炮裂，去皮脐）三分 狐阴一具（炙黄）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。一二岁儿每服五丸，米饮送下，早晨、夜卧各一服。量儿大小加减。

【主治】小儿阴㿉。

59735 **韭子丸**

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】韭子（微炒） 巴戟天（去心） 桑螵蛸（锉，炒） 菟丝子（酒浸，别捣） 牛膝（酒浸，焙） 牡蛎（左顾者，火煅） 熟干地黄各一两 干姜（炮）半两

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子

大。每服二十丸,空心盐汤送下。

【功用】秘精,补肾元,强志,解虚烦。

59736 **韭子丸**

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】韭子七升(净拣)

【用法】上以醋汤煮千百沸,取出焙干,旋炒令作油麻香,为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,加至三十丸,空心温酒送下。

【主治】肾脏虚冷,腰膀疼疼,腿膝冷痹,夜多小便,梦寐遗泄,日渐羸瘦,面无颜色;女人恶露,赤白带下。

59737 **韭子丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】鹿茸　茴香(炒)　补骨脂(微炒)各一两半　远志(去心)　龙骨(轻紧者,淬七遍)　葫芦巴(微炒)　附子(炮,去皮脐)　韭子(炒香熟)　金铃子(去核,麸炒)各一两　麝香一钱(别研)

【用法】上为细末,将麝香同研匀,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心、食前煎人参、白茯苓汤送下,一日三次。

【主治】水火不足,气不升降,夜梦遗泄,精滑不禁。

59738 **韭子丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】家韭子(炒)　巴戟(去心)　益智子(炒)　白茯苓(去皮)各等分

【用法】上为细末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食前温酒或米饮送下。

【主治】白浊。

59739 **韭子丸**

【方源】《袖珍》卷二引《济生》。

【组成】赤石脂(煅)　韭子(炒)　川牛膝(去芦,酒浸)　牡蛎(煅)　覆盆子(酒浸)　附子(炮,去皮脐)　桑螵蛸(酒炙)　鹿茸(酒蒸,焙)　肉苁蓉(酒浸)　龙骨(生)各一两　鸡膍胵(烧灰)　沉香(镑,不见火)各半两

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服七十丸,空心盐汤、盐酒任下。

【主治】膀胱肾冷,小便白浊滑数无度。

59740 **韭子丸**

【方源】《医统》卷七十。

【组成】韭子(炒)　车前子　菟丝子(酒煮另捣)　天雄(制)　龙骨各一两　鹿茸(去毛,酥炙)　桑螵蛸(炒)　干姜(炮)各三分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心黄耆汤送下。

【主治】虚劳寒脱漏精。

59741 **韭子丸**

【方源】《穷乡便方》。

【组成】鸡膍胵(烧灰)　螵蛸(酒炙)　龙骨　覆盆子(酒浸)　附子(炮)　牛膝　沉香　肉苁蓉　赤石脂　牡蛎粉(煅)各等分

【用法】炼蜜为丸。每服九十丸,空心盐汤送下。

【主治】阳不足。

【备考】本方名韭子丸,但方中无韭子,疑脱。

59742 **韭子丸**

《明医指掌》卷七。即《三因》卷十二"家韭子丸"。见该条。

59743 **韭子汤**

【方源】《医心方》卷十三引《小品方》。

【组成】韭子一升　龙骨三两　赤石脂三两

【用法】上药以水七升,煮取二升半,分三次服。

【主治】失精。

59744 **韭子汤**

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】韭菜子一撮

【用法】用碗足盛之,以火烧烟,用小竹梗将下截破四开,纸糊密如喇叭样,引烟熏其蛀齿。如下牙蛀者,以韭子煎浓汤漱之。

【主治】虫牙。

59745 **韭子散**

【方源】《外台》卷十六引《深师方》。

【组成】韭子　菟丝子　车前子各一升

附子三枚(炮) 当归 芎䓖 矾石(烧)各三两 桂心一两

【用法】上为末。每服方寸匕，温酒送下，一日三次。亦可炼蜜为丸，如梧桐子大，每服五丸，酒送下。

【主治】虚劳尿精，小便白浊，梦泄。

59746 韭子散

【方源】《千金》卷十九。

【组成】韭子 麦门冬各一升 菟丝子 车前子各二合 芎䓖三两 白龙骨三两

【用法】上为末。每服方寸匕，酒服，一日三次，不知稍增，甚者夜一服。

【主治】小便失精及梦泄精。

【宜忌】《千金方衍义》：此惟房室过劳者为宜，火盛精伤者切禁。

【方论选录】《千金方衍义》：方中菟丝续绝伤之精，芎䓖开血室之郁，天冬滋肺肾之津，车前子通气道之壅，龙骨敛浮散之火，韭子摄败伤之髓。

59747 韭子散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】韭子一两(微炒) 赤石脂一两 土瓜根一两 狗脊一两 牛膝一两(去苗) 牡蛎二两(烧为粉) 黄耆一两(锉) 附子一两(炮裂，去皮脐) 鹿茸一两(去毛，涂酥炙令微黄) 肉苁蓉一两(酒浸一宿，刮去皱皮，炙令干)

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】膀胱虚冷，小便白浊滑数，日夜出无节度。

59748 韭子散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】韭子三两(微炒) 麦门冬一两半(去心，焙) 鹿茸一两(涂酥炙，去毛) 龙骨一两 菟丝子一两(汤浸三日，晒干，别杵为末) 车前子一两

【用法】上为细散，入菟丝末和匀。每服二钱，食前温酒调下。

【主治】伤寒后肾脏虚损，夜梦失精，及尿后余沥。

59749 韭子散

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】韭子一两(微炒) 麦门冬一两半(去心，焙) 龙骨一两 车前子三分 菟丝子一两(酒浸三日，晒干，别杵为末) 人参一两(去芦头) 泽泻一两 石龙骨三分

【用法】上为细散，入菟丝子末和匀。每服二钱，食前以温酒下。

【主治】伤寒后虚损，夜梦精泄，或因小便亦有精出。

59750 韭子散

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】韭子二两(微炒)

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】虚劳肾损，梦中泄精。

59751 韭子散

【方源】《圣济总录》卷五十一。

【组成】韭子(醋煮，炒香)二两 附子(炮裂，去皮脐) 桑螵蛸(锉，炒) 泽泻各三分 蜀椒(去目及合口者，炒出汗)各三分 赤石脂(研) 龙骨(捶碎)各一两 甘草(炙，锉)一分

【用法】上为散。每服三钱匕，空心温酒调下，一日二次。

【主治】肾脏虚冷遗泄。

59752 韭子煎

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】家韭子 破故纸各一两

【用法】上为末。每服三钱，水煎服，一日三次，即住。

【主治】强中。茎强不痿，精流不住，常如针刺，捏之则痛。

59753 韭龙散

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】韭菜子(炒)二两 白龙骨四钱

【用法】上为末。每服二钱，空心黄酒下。

【主治】失精,暂睡即泄。

59754　**韭叶散**

【方源】《外科十法》。

【异名】韭菜散(《疡医大全》卷三十六)。

【组成】石灰　韭菜叶

【用法】上同捣饼,贴壁候干,为细末,筛下听用。掺破损处。

【功用】止血。

【主治】跌打损伤。

59755　**韭叶膏**

【方源】《医统》卷六十四引《经验方》。

【组成】韭叶(连根洗净)

【用法】上捣烂,同人家门限下及地板上细泥和匀。擦痛处腮上,外用纸贴。一时下有细虫在于泥上,可以除绝病根。

【主治】虫牙痛。

59756　**韭汁饮**

【方源】方出《肘后方》卷三,名见《普济方》卷一八三。

【组成】韭

【用法】上捣,绞汁。饮一升许。立愈。

【主治】卒上气鸣息,便欲绝。

59757　**韭汁饮**

【方源】《医方考》卷三。

【组成】生韭汁　醇酒各等分

【用法】每服二合,一日二次。

【主治】血噎膈。

【方论选录】血噎膈者,或因跌扑,或因大怒,血积胸膈,久久凝结,令人妨碍饮食,得热则宽,得寒则痛是也。生韭汁,能解畜血之瘀结,佐以醇酒行其势也。

59758　**韭汁饮**

《梅氏验方新编》卷二。为《医方考》卷五"韭汁酒"之异名。见该条。

59759　**韭汁酒**

【方源】《医方考》卷五。

【异名】韭汁饮(《梅氏验方新编》卷二)。

【组成】韭菜汁　清酒各等分

【用法】和服。

【功用】《士才三书》:散气行血。

【主治】(1)《医方考》:胸膈常时疼痛,得热则减,得寒则增者。(2)《寿世青编》:赤痢,心痛。

【方论选录】上件证,死血也。故用韭汁消瘀,清酒行滞。

59760　**韭附丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】大附子一只(炮,去皮脐,再炒令微黄色)

【用法】上为末,以韭菜根研烂,绞取汁为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心米饮送下。

【主治】泻痢。

【宜忌】老人尤宜服之。须是晒干服,不干恐麻。

59761　**韭根丸**

【方源】《本草纲目》卷十七引《经验良方》。

【组成】全蝎(糯米炒,去米)　大川乌(去皮,微炮)各等分

【用法】上为细末,用韭根取汁为丸,如绿豆大。每服十丸,茶清送下。

【主治】元阳虚,头痛如破,眼睛如锥刺。

59762　**韭根汁**

【方源】方出《千金》卷五,名见《卫生总微》卷十四。

【组成】韭根汁　猪脂

【用法】上煎,细细服之。

【主治】少小腹胀满。

59763　**韭根汁**

【方源】《圣济总录》卷一七四。

【组成】韭根汁

【用法】上药滴少许入鼻中。出黄水即愈。

【主治】小儿黄病;小儿鼻干身热。

59764　**韭根汤**

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】韭根(晒干)　蜀椒(去目并闭口,炒出汗)　野李根　蛇床子　续断　芜荑仁　皂荚白皮　松脂各一两　白矾半两

【用法】上锉细。每度二两,用水三碗,煎至

二碗，滤去滓，乘热于盆内先熏后洗，每日三次。

【主治】诸痔瘘出脓水，疼痛不止。

59765 **韭根散**

【方源】方出《金匮》卷下，名见《普济方》卷四〇一。

【异名】韭根茱萸汤（《医统》卷四十九）。

【组成】韭根一把 乌梅二七个 吴茱萸半升（炒）

【用法】以水一斗煮之，煮取三升，去滓，分饮之。

【主治】卒死，客忤死。

59766 **韭根散**

【方源】《圣惠》卷十四。

【异名】丰本汤（《圣济总录》卷二十九）。

【组成】韭根二两 栝楼根二两 青竹茹半两 干姜半两（炮裂）

【用法】上锉细和匀，分作八服。每服以水一大盏，煎至五分，去滓，入鼠粪末一字，搅令匀，温服，不拘时候。

【主治】伤寒后，阴阳易，头重，百节解痛，翕翕气劣，着床不能起动，甚者手足拳，卵肿疼痛。

59767 **韭根散**

【方源】方出《圣惠》卷五十七，名见《普济方》卷三〇六。

【组成】豉一合 雄鼠粪一两 杏仁一两 韭根一两

【用法】上药相和烂研。敷被咬处。良。

【主治】猘犬咬人，疼痛不止。

59768 **韭根散**

【方源】方出《圣惠》卷五十七，名见《普济方》卷三〇八。

【组成】韭根一握（去土） 麝香一钱

【用法】同研，敷之。

【主治】蜘蛛咬，遍身成疮。

59769 **韭菜丸**

【方源】《回春》卷五。

【组成】当归 川芎 人参 牡丹皮 桃仁 大黄 黄芩 姜黄 三棱 莪术 桔梗 枳壳 半夏 防风 羌活各等分（俱要生用）

【用法】上用韭菜根共一处，酒浸晒干又浸，如此三五次，为末，水为丸，如绿豆大。每服三五十丸或百丸，茶清送下。

【主治】胸膈背后死血积滞疼痛，或吐血后，或劳后饮酒，怒气过多，俱胸背作痛。

59770 **韭菜汁**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】韭菜（连根，洗净）

【用法】上捣烂，入童便在内，用布绞去滓，重汤煮热，澄清者饮之。立止。

【主治】诸血。

59771 **韭菜散**

《疡医大全》卷三十六。为《外科十法》“韭叶散”之异名。见该条。

59772 **韭子一物丸**

【方源】《医方考》卷四。

【组成】韭子

【用法】上为丸服。

【主治】大人遗浊，小儿遗尿。

【方论选录】《经》曰：淫气遗溺，痹聚在肾。痹聚者，湿气聚而为痹也。韭子润而辛热，辛热则能散湿，润则能就下，故孙真人每用之，令其就下而疗痹气尔。

59773 **韭子鹿茸丸**

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】鹿茸三分 韭子 柏子仁 菟丝子 黄耆 巴戟 附子各一两 泽泻 茯神 石斛 石龙芮 麝香各半两 天门冬一两半 龙骨 露蜂窠各三分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】虚劳，梦与鬼交，精泄不止，四肢羸瘦少力，心神虚烦。

59774 **韭汁牛乳饮**

【方源】《医方考》卷三。

【组成】韭汁 牛乳各等分

【用法】时呷之。

【主治】胃脘有死血，干燥枯槁，食下作痛，翻胃便秘者。

【方论选录】①《医方考》：韭汁味辛，消瘀行血，牛乳甘温，能养血润燥；②《医方论》韭汁去瘀生新，又能开通胃气；牛乳补血润燥，兼通大肠。不用辛热，劫阴伤津，洵为良法。

59775　**韭汁牛乳饮**

【方源】《温热经解》。

【组成】韭菜汁一小杯　鲜牛乳六两　藕汁一杯　姜汁十滴　梨汁一杯　莱菔汁一杯

【主治】胃中有瘀，噎膈反胃。

【临症举例】噎膈反胃　天津钱氏妇患噎膈反胃，粒米不下，日服稀粥饮，服至一杯，必须呕吐，不吐则心中难受，必以手探之，吐而后已，复服复吐，如是者已经月余。余曰：此胃中有瘀，为拟韭汁牛乳饮，服一剂不吐，连服七剂愈。

59776　**韭汁生地饮**

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】生地二钱　当归　郁金　降香各一钱

【用法】加韭菜捣汁半酒杯，童便少许冲药服。

【主治】经逆从口鼻出。

59777　**韭根茱萸汤**

《医统》卷四十九。为方出《金匮》卷下，名见《普济方》卷四〇一"韭根散"之异名。见该条。

削

59778　**削坚丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】鳖甲(醋浸两宿，去裙襕，更蘸醋炙黄色，取末称)　京三棱(锉如小枣大，好醋浸两宿，焙干，取末称)　干漆(捣碎，炒令烟出，捣细，取末称)各二两半　沉香半两　乳香二钱半(别研)　槟榔　木香　干姜(炮)　没药(别研)　肉桂(去粗皮)　细松烟墨(烧去胶)　胡椒　萝卜子　干蝎(微炒，去毒)　硇砂(通明者，为末，重汤飞炼，别研)各半两　粉霜二钱半(别研)　轻粉二钱半

【用法】上为细末，拌匀，用好醋煮薄面糊为丸，如小绿豆大。每服二十丸，淡醋煎生姜汤送下，日二次，夜一次。如未利渐加，微利即减。

【主治】五积六聚，气结成块，食积癖瘕，心腹胀满，瘦瘁少食。

59779　**削坚饮**

【方源】《玉案》卷五。

【组成】山楂　玄胡索　桃仁　槟榔各一钱五分　昆布　海藻　青皮　乌药各一钱二分

【用法】加生姜三片，临服加酒一杯。

【主治】疝气时常在一处疼痛有形，内有积瘀者。

59780　**削术豆蔻散**

【方源】《史载之方》卷上。

【组成】草豆蔻　削术　诃子皮各一两　大芎　陈橘皮各半两　甘草　藁本各八铢　独活　藿香各一分

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，加生姜二片，大枣二个，同煎，取八分，空心和滓服。

【主治】脾湿而泄，腹满溏泄，腹痛，体重食减，甚则足痿，行善瘈，脚下痛。

省

59781　**省风丸**

《普济方》卷三六七。为《圣惠》卷八十三"乌犀丸"之异名。见该条。

59782　**省风汤**

【方源】《普济方》卷一六七引《卫生家宝》。

【组成】半夏八两　防风四两　甘草二两

【用法】上为细末，分作四十服。每服用水一大盏半，加生姜二十片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】痰厥。

59783　**省风汤**

《女科百问》卷上。为原书同卷"百风汤"之

异名。见该条。

59784 省风汤

【方源】《局方》卷一（宝庆新增方）。

【组成】防风（去芦） 南星（生用）各四两 半夏（白好者，水浸洗，生用） 黄芩（去粗皮） 甘草（生用）各二两

【用法】上㕮咀。每服四大钱，用水二大盏，生姜十片，煎至一中盏，去滓温服，不拘时候。应一切风证可预服之。

【功用】《杂病源流犀烛》：散风豁痰降火。

【主治】卒急中风，口噤全不能言，口眼㖞斜，筋脉挛急，抽挛疼痛，风盛痰实，旋晕僵仆，头目眩晕，胸膈烦满，左瘫右痪，手足麻痹，骨节烦疼，步履艰辛，恍惚不定，神志昏愦。

59785 省风汤

【方源】《魏氏家藏方》卷一引姜居士方。

【组成】天南星一个（七钱重者，炮，去浮皮，切片） 全蝎梢二七个

【用法】上为粗末，平分二服，水两盏，加生姜二十片，慢火煎至八分，别用麝香一钱细研，入前药内调拌，再重汤暖令热，细细呷服，若不省者灌之。

【主治】中风。

59786 省风汤

【方源】《魏氏家藏方》卷一引姜居士方。

【组成】天南星一枚（半两重者，生用）

【用法】上切片子，用水三大盏，加生姜三大片，同煎至一大盏，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】头目眩，或游风，或口眼瞤动，非痰乃风之渐。

59787 省风汤

《直指》卷三。为《易简方》"醒风汤"之异名。见该条。

59788 省风汤

【方源】《医方类聚》卷二十一引《济生续方》。

【异名】醒风汤（《永类钤方》卷十一）。

【组成】半夏（生用） 防风（去芦） 甘草半两（炙） 全蝎（去毒）三个 白附子（生用） 川乌（生用） 木香 天南星（生用）各半两

【用法】上㕮咀。每服半两，水二盏，加生姜十片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】中风痰涎壅塞，口眼㖞斜，半身不遂，不省人事。

【方论选录】《医方考》：风涌其痰，干于面部，则口眼㖞僻；塞于胸中，则痰涎壅盛。是方也，防风、白附、全蝎、川乌，可以活经络之风痰而正口眼；南星、半夏、甘草、木香，可以疗胸次之风痰而开壅塞。方名曰省风者，省减其风之谓也。

59789 省风汤

【方源】《丹溪心法》卷一。

【组成】南星（生）八两 防风四两 独活 附子（生，去皮脐） 全蝎（炒） 甘草（生）各二两

【用法】每服四钱，水一钟半，生姜十片，煎服。

【主治】中风。

59790 省风汤

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】防风 犀角 大黄 知母 玄参 黄芩 羚羊角（肝虚不用） 桔梗

【用法】上为末。每服二钱，加灯心、竹叶，水煎，食前服。

【主治】①《银海精微》：肝热火旺，瞳仁不清或细小。②《眼科全书》：沉翳内障。

59791 省风汤

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷五。

【组成】半夏 防风 炙甘草 生附子 全蝎各二两 川芎 木香 南星各一两半

【用法】每服五钱，加生姜三片，水煎服。

【主治】妇人中风，口眼㖞斜，语言不清，头痛瘫痪。

59792 省风汤

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】防风 胆星 半夏 陈皮 赤苓

黄芩　枳壳　甘草　生姜

【主治】中风有热。

59793　**省风散**

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】羌活　防风　甘草　白茯苓各半钱　木香一分　人参　陈皮各三钱　天台乌药三钱　白术一两(面炒)　南星半两(重者一只,炮,去皮,切如豆大)　附子九钱(炮,去皮脐,切)

【用法】上㕮咀。每服四钱,加生姜十片,大枣二个,水煎服,不拘时候。

【主治】气不和,为风寒邪湿之气着于手足,麻痹,头重偏疼,起居旋运,四肢倦怠,足胫缓弱,掣痛无时,每遇阴晦风寒,神思不清,痰气相逆。

59794　**省风化痰汤**

【方源】《何氏济生论》卷一。

【组成】天麻　僵蚕　半夏　橘红　黄芩　黄连　麦冬　防风　枳实　远志　甘草　胆星　香附　茯神

【用法】加生姜汁一匙,竹沥半酒杯,食远服。

【主治】卒中风邪,语言謇涩,口眼歪斜,神智昏乱,偏废不仁。

59795　**省味金花丸**

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】川黄柏二两　黄芩　知母　桔梗　连翘各一两　地骨皮　薄荷各五钱

【用法】上炼蜜为丸。每服五十丸,桑白皮汤送下或薄荷汤送下。

【主治】肺实热,眼白仁常泪,红壅热胗,泪出而不绝者。

59796　**省味金花丸**

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】栀子　黄芩　黄柏　桑白皮　地骨皮　桔梗　知母　甘草

【用法】上为细末,炼蜜为丸,茶清送下。

【主治】脾胃积热,致生黄膜。

59797　**省风清痰转舌汤**

【方源】《回春》卷二。

【组成】陈皮二钱　半夏(姜制)一钱　枳实(去壳,麸炒)三分　黄芩(酒炒)三分　防己一钱　防风一钱　全蝎(洗去盐)七分　南星(姜制)二分　甘草五分　白茯苓八分　蝉蜕八分　天麻四分

【用法】上锉一剂。加生姜三片,竹茹一团,水煎服。为丸服亦可。舌强难治。

【主治】口眼㖞斜。

哑

59798　**哑惊丹**

【方源】《外科全生集》卷二。

【组成】天竺黄二钱　麝香　犀黄各四分　雄黄一钱　琥珀六分　僵蚕一钱　陈胆星四钱

【用法】上药各为末,用甘草、钩藤钩煎膏为丸,朱砂一钱为衣,外加赤金,每料匀作四十丸。每服一丸,研,用灯心炭四钱,薄荷汤送下。

【主治】①《外科全生集》:哑惊。②《丸散膏丹集成》:小儿哑惊风,痰壅发热喘促,及急慢惊风,搐搦痉厥。

咽

59799　**咽津丹**

《喉科紫珍集》卷上。为《外科正宗》卷二"噙化丸"之异名。见该条。

59800　**咽喉丹**

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】生地　茵陈　黄芩各一两　生石膏　石斛　麦冬各五钱　枳壳　乌犀角　马勃　人中黄　枇杷叶各三钱

【用法】上为极细末,炼蜜为丸,一钱五分重。每服一丸,小儿减半,早、晚食后白开水送下。

【功用】清咽解热,消肿除痰。

【主治】咽喉肿痛,双单乳蛾,咽干音哑,胃热口疮。

【宜忌】忌食五辛、发物。

59801 **咽醋丸**

《医学纲目》卷二十二。为方出《丹溪心法》卷三，名见《医方类聚》卷一九七引《新效方》“茱萸丸”之异名。见该条。

59802 **咽喉口齿药**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】人中白（煅）二两 硼砂五钱 儿茶五钱 豆根五钱 胡连一两 黄连一两 鸡内金五钱 黄柏五钱 玄明粉五钱

【用法】上为细末。用药少许抹患处。

【功用】清利咽膈，消肿止痛。

【主治】咽喉肿痛，口疮糜烂，牙疳，口臭，齿痛。

【宜忌】忌烟、酒、辛辣、油腻食物。

59803 **咽喉夺命丹**

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】珍珠二钱 金果榄二钱 真京墨（研）六分 川郁金二钱 犀角六分 飞辰砂二钱 赤金箔六分 煅中白五分 梅片五分 上血竭二钱 天竺黄二钱 上沉香二钱 苦甘草三钱 人指甲（炙脆）六分 川贝母三钱 真熊胆六分 上血珀六分 玳瑁（炙脆）七分 甜葶苈二钱 当门子三分

【用法】上为细末，用麻黄、钩藤、薄荷、陈皮各一两煎胶，用元米饮一勺，打和捣匀为丸，每丸重一钱，辰砂为衣，用蜡壳收置。极重喉症含之立效。

【主治】咽喉险症。

59804 **咽喉回生丹**

【方源】《梅氏验方新编》卷一。

【组成】皂矾（放新瓦上煅红，取放地下候冷去火气）

【用法】上为细末。撬开牙关，以指头蘸矾末擦其舌上即醒。

【主治】婴舌。喉痛咽哽，舌忽胀大渐至如脬，或舌伸出不能缩入。

59805 **咽喉冰硼散**

【方源】《梅氏验方新编》卷一。

【异名】冰硼散、金钥匙（《外科方外奇方》卷三）。

【组成】薄荷 硼砂各一钱 人中白 川连各八分 青黛 玄明粉各六分 陈胆星五分 山豆根八分 冰片五分

【用法】上为极细末。吹喉。

【主治】一切咽喉各症。

59806 **咽喉异功散**

《疡科纲要》卷下。为《中国医学大辞典》引《疫痧草》“异功散”之异名。见该条。

59807 **咽喉备急丹**

【方源】《卫生宝鉴》。

【组成】青黛三两 芒消二两 白僵蚕一两 甘草四两

【用法】上为细末，用腊月内牛胆汁儿有黄者盛药其中，荫四十九日，多时为妙。

【主治】喉闭。

59808 **咽喉独圣散**

《疡科纲要》卷下。为《疡医大全》卷十七“西瓜霜”之异名。见该条。

59809 **咽喉通闭散**

【方源】《梅氏验方新编》卷一。

【组成】青盐一钱 白矾一钱 硼砂一钱 玄明粉一钱

【用法】上为细末。吹之。吐尽痰涎即愈。

【功用】消肿止痛。

【主治】咽喉肿痛，滴水不下。

59810 **咽喉碧玉散**

【方源】《御药院方》卷九。

【异名】碧玉散（《卫生宝鉴》卷十一）、罗青散（《瑞竹堂方》卷五）。

【组成】青黛 盆消 蒲黄 甘草末各一两

【用法】上为细末。每用药少许干掺在咽，咽内细细咽津，绵裹噙化亦得。若作丸，砂糖为丸，每两作五十丸。每服一丸，噙化咽津亦得。

【主治】①《御药院方》：心肺积热上攻，咽喉肿痛闭塞，水浆不下，或生喉疖、重舌、木舌

肿胀。②《瑞竹堂方》：咽喉单双乳蛾。

【备考】本方改为丸剂，名"碧玉丸"(见《医方大成》)。

59811　**咽喉噙化丹**

【方源】《古今名方》引易玉泉家传方。

【组成】生地　熟地　白茯苓各15克　天冬　麦冬　西瓜霜　硼砂　法夏　乌梅肉各12克　人参　冰片　食盐各6克　黄柏　知母　薄荷　诃子肉(煨)各9克

【用法】将以上植物药类先为细末，过细绢罗筛后，再下西瓜霜、硼砂、冰片、食盐，合研为极细末，将药末摊开，先喷食醋(约3份)，再炼蜜(约7份)为丸，如龙眼大。用时含入口中，慢慢噙化。

【功用】滋阴润燥，降火利咽。

【主治】虚火喉痹，虚火乳蛾。

59812　**咽痛甘桔汤**

【方源】《简明医彀》卷二。

【组成】桔梗四钱　甘草三钱　荆芥一钱半　玄参一钱

【用法】水煎服，卧床慢咽。

【主治】喉痹，缠喉风，多感于酒腥辛辣厚味，七情痰火，发则通连颈项，头面肿胀；伤寒少阴咽痛及阴证下虚痛。

【加减】详脉证属热，渐加牛蒡、连翘、天粉、僵蚕、射干、山根、薄荷、芩、连、栀、柏、防风、升麻、生地、当归择用；大便秘，加大黄；小便涩，加木通。

响

59813　**响骨膏**

【方源】《永乐大典》卷一三八八〇引《风科集验方》。

【组成】生地黄(炒)　骨碎补(炒)　败姜各半斤(炒)　蒲黄四两(炒)

【用法】上为细末。每服用药三匙，人面半匙，米醋熬成膏。热贴患处，一二十遍讫。然后再敷上芸台子散。

【主治】风寒湿痹，筋骨肿胀，走注疼痛。

59814　**响圣破笛丸**

《直指附遗》卷八。为《医统》卷四十六引《医林集要》"向胜破笛丸"之异名。见该条。

59815　**响声破笛丸**

《回春》卷五。为《医统》卷四十六引《医林集要》"向胜破笛丸"之异名。见该条。

咬

59816　**咬头膏**

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】铜青　松香　乳香　没药　杏仁　生木鳖粉　蓖麻仁各等分　巴豆(不去油)加倍

【用法】上药捣成膏，每两膏内加入白砒一分，再捣匀。临用取绿豆大一粒放患顶，用膏掩，溃即揭下洗净，换膏贴。

【功用】《药奁启秘》：咬穿毒头。

【主治】痈疖有脓。

59817　**咬头膏**

【方源】《全国中药成药处方集》(南京方)。

【组成】巴豆仁二钱　蓖麻子仁　制乳香(研细末)　制没药(研细末)各一钱

【用法】上药共捣碎如泥状。每用少许如绿豆大，放在疮头上，用膏药贴之，破则揭去。

【主治】外疡肿胀，脓成未溃。

59818　**咬药锭**

【方源】《外科十三方考》引李仲美方。

【组成】白砒末　斑蝥末(去翅足)　巴豆仁各一钱(研细腻)　老山明雄三钱(研末)　硫苦五分(不研)　小麦面(量等诸药之半)

【用法】将前四味研末，合和再研，然后与不研之硫苦搅匀，称其轻重若干，用小麦面约半量，以水合和匀称，搓为锭子，长短、大小不拘，随用洋铁片一块，置炭火上焙干即成。折视中多细孔是不研硫苦之故。破口小且浅者用少；如深者则用略长，亦不必深及疮底；破口大，尽填满，或为末均可。外贴膏药须较疮形略宽大。如疔类，则用小钱一枚，按疔头上，以香火向钱孔一点，即置药粒，贴上膏药。一、

二三日不可揭视，须六七日效力方著，大多数腐肉随膏离掉，不用旧法纸捻，不填新法纱布，往往一次即毒尽。

【主治】一切痈疽，无论阴阳新久。

【宜忌】必是全身症状不甚者，乃可专恃，否则须用内服药先调理，不得先施腐蚀。

【临症举例】①环跳疽 一妇人三十余岁，患环跳疽已二年，疮口如茶碗大，无脓水，边起硬棱，底参差深浅不等，色灰黑，用外科腐蚀力最著之白降丹毫无知觉，即将此药锭碎为粗末，满填疮口，外以一厚大膏药膏之，三四日后淌流毒水，六七日揭视，腐肉完全脱离，渐渐痊愈，且不觉疼痛。②足趾脱疽 一男子三十余岁，足趾脱疽，肿至胫，色紫黑，骨外露，亦黑，疮口深约寸余，用此药锭排比填入，覆盖大膏药，六七日毒水淌尽，肿随全消，腐肉脱离，骨转白，渐愈。③发背 一男子五十余岁，患发背，形势甚剧，填入此药锭粗末，六七日揭视，疮坑内足容一鸭卵而不满，因是贫民，后竟未用他药，但贴膏药，亦渐愈。④疮 一男子二十余岁，尾脊骨上患疮约年余，延大如碟状，平塌灰黑，脓水稀秽不可近，已波及肛门，疮正中一小口，用药锭从疮口纳入，四面排比多锭，膏药之大约七八寸，如此屡屡洗涤敷药，脓乃渐稠，渐不臭，疮口渐大，外围渐收小，厚皮渐薄，终于从下沿开口，乃速愈。此案经过时间约两月以外，依例用药约近十次之多，后念如能早从疮之下沿割开，更当速愈。

59819 咬头提毒膏

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】蓖麻子肉三钱 巴豆肉(去油)五粒

【用法】先将蓖麻肉打烂如鱼冻水，后入诸药打膏，瓷罐收贮，勿令泄气。

【功用】咬头提毒。

咳

59820 咳气丸

《赤水玄珠》卷七。为《保命集》卷下“款气丸”之异名。见该条。

59821 咳血丹

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】青黛 瓜蒌仁 诃子 海石 杏仁 四物汤 姜汁 童便 栀

【用法】蜜调噙化。

【主治】咳血，困身热痰盛血虚。

59822 咳血方

【方源】《丹溪心法》卷二。

【异名】肺血丸(《医林纂要》卷四)。

【组成】青黛 瓜蒌仁 诃子 海粉 山栀

【用法】上为末，以炼蜜同姜汁为丸。噙化。

【功用】《古今名方》：清热化痰，敛肺止咳。

【主治】①《丹溪心法》：咳血。②《古今名方》：肺热咳嗽，痰中带血，咯痰不爽，心烦口渴，颊赤便秘，舌苔黄，脉弦数。

【加减】咳甚者，加杏仁(去皮尖)，后以八物汤加减调理。

【方论选录】①《医方考》：肺者，至清之脏，纤芥不容，有气有火则咳，有痰有血则嗽。青黛、山栀所以降火，瓜蒌、海粉所以行痰，诃子所以敛肺。然而无治血之药者，火去而血自止也。②《医方集解》：此手太阴药也。肝者，将军之官。肝火上逆，能烁心肺，故咳嗽痰血也。青黛泻肝而理血，散五脏郁火；栀子凉心而清肺，使邪热下行，二者所以治火。栝楼润燥滑痰，为治嗽要药；海石软坚止嗽，清水之上源，二者降火而兼行痰。加诃子者，以能敛肺而定痰喘也。③《医林纂要》：诃子肉苦酸涩，生用敛肺清金，降逆止咳；栀子苦酸，炒黑用，抑妄行之相火，决三焦之水道，敛肺宁心，降逆气，止妄血；海石咸涩，补心敛肺，清金降火，渗湿消痰；瓜蒌仁甘苦而能润，轻虚上浮，宁心润肺，泄逆清火，除痰去垢，开豁膻中之清气，亦治咳要药。青黛辛咸，此补肝而泻肺，然辛行肝气，使肝木自畅，则相火不至灼金；咸散肝血，则血各循经，而不至逆涌于上，且能解毒

热。蜜亦润肺，能补清高之气。④《医方论》：咳嗽痰血，固属君相之火犯肺。此方但清火而不治血，乃去所扰则自安之义。然业经失血，则肺已大伤，岂可置之不论不议。去诃子而加清养肺阴之药，始为得之。

【备考】《医学纲目》本方用量为各等分。

59823　**咳逆丸**

【方源】《回春》卷三。

【组成】花椒(微炒出汗，去目)

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，醋汤送下。

【主治】呃逆。

59824　**咳哮宁**

【方源】《古今名方》引天津市第三中药厂方。

【组成】旋复花　紫菀各 25 公斤　杏仁　野菊花各 30 公斤　鹅不食草　细辛　五倍子各 12.5 公斤　黄芩 35 公斤　花椒 5 公斤　明矾 10 公斤　麦冬 20 公斤　猪牙皂角　甘草粉各 7.5 公斤

【用法】上药共制成 180000 片。每服 2～4 片，一日三次。

【功用】止咳解哮，平喘祛痰。

【主治】咳哮。

59825　**咳特灵**

【方源】广州白云山制药总厂。

【组成】小叶榕

【用法】上药加水煎煮二次，合并煮液浓缩成流浸膏，在充分搅拌下加入乙醇，静置几小时，滤取上清液，浓缩成膏，干燥后加入扑尔敏，制片或装胶囊。每服片剂 3 片，一日二次，或胶囊 1 粒，一日三次。

【功用】消炎镇咳，祛痰平喘。

【主治】慢性气管炎。

【临证举例】以本方治疗慢性支气管炎 291 例，年龄 40～86 岁，病程 2～40 年，其中 10 年以上者 90 例(30.9%)，10 天为一个疗程，一般用 1～3 个疗程。结果：有效率(咳痰，喘症减少 30%以上者)96.5%，显效(咳痰、喘症减少 60%以上者)为 83.85%。

59826　**咳喘丸**

【方源】《内外验方秘传》卷下。

【组成】款冬花一两　桔梗一两　苏梗一两　川朴八钱　前胡八钱　叭杏二两　降香末一两　明矾二两　海螵蛸一两五钱(焙黄)　轻粉一钱　郁金一两　宋半夏一两　陈皮一两　木香六钱　沈香片四钱

【用法】上晒干为末，水泛为丸，如榧子大，二十个。每次一丸，海蜇皮一两煎汤送下。

【主治】咳哮气喘。

59827　**咳嗽散**

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】白术一钱(土炒)　云苓一钱　法夏一钱　杏仁一钱(去皮尖，炒，研)　橘红五分　归身一钱(土炒)　制草三分　枇杷叶五分(去毛，蜜炙)　煨姜一片

【用法】水煎服。

【主治】小儿脾寒肺虚，精神短少，口舌不燥，动则嗽重，静则嗽轻。

【加减】冬日，去枇杷叶，加冬虫草五分。

59828　**咳嗽散**

【方源】《全国中药成药处方集》(重庆方)。

【组成】苏子二两　枇杷叶三两　杜耳风　五皮半各二两　鹿衔草　蛇衔草　瓜子草各三两　铜钱草　肺筋草　淫羊藿各二两　川黄连三两

【用法】上为细末。每服一至三钱，用姜汤水下，一日三次。

【功用】散寒止咳。

59829　**咳嗽劳症膏**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】独角老鼠叶

【用法】水煎取汁，加冰糖收膏。每服一匙，开水冲下。百日乃痊。

【主治】咳嗽劳症。

【备考】方中药量是鲜老鼠叶五份，冰糖一份。

昨

59830 **昨叶何草丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】昨叶何草（去土，焙） 蒺藜子（炒，去角）各一两半 薄荷叶 羌活（去芦头） 荆芥穗 附子（黑豆一升同煮附子令软透，去皮脐，切，焙）各一两

【用法】上除黑豆外，为末，将黑豆烂研为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心温熟水送下。服此药后，更合蕤仁散间服之。

【主治】眼见黑花，视物不明。

59831 **昨叶荷草散**

【方源】《三因》卷十五。

【组成】昨叶荷草（即瓦松，晒干）一两 枯矾一钱 雄黄半钱

【用法】上为末，以羊蹄菜根先蘸醋揩癣上，令痒破，即以药末乘湿涂敷。不过三两次即愈。

【主治】一切癣，无问风湿气血。

贴

59832 **贴药**

【方源】《三因》卷十五。

【组成】蜀葵子半两 蝉蜕五个 槟榔一个

【用法】上为末，用大枣三个取肉研细，搜和药末，如觉硬，滴少蜜，研成膏。量大小贴于病处。

【主治】五痔。

59833 **贴药**

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】黄芩 黄连 黄柏各二钱 大黄 蒲黄各三钱 血竭 乳香各二分 没药二分 麝香少许

【用法】上为末，取生姜自然汁和鸡子清打匀调药，贴之。内服解毒汤。

【主治】小儿生疮毒肿疖者。

59834 **贴药**

【方源】《幼幼集成》卷四。

【组成】大生地 大黑豆各一两

【用法】用水同浸一夜，取起捣为膏，贴眼皮上。其血自散，血泪既出，肿黑即消。并内服泻白散。

【主治】小儿久嗽之血眼，其目两眶肿黑，如物伤损，白珠红赤如血。

59835 **贴凹散**

【方源】《幼幼新书》（古籍本）卷九引《张氏家传》。

【组成】石燕二个（烧红醋淬干为度） 艾心叶七个 朱砂皂子大 蓖麻子七粒

【用法】上为末。每用一钱，薄荷汁调贴山根上凹中。睡着候鼻尖汗出安。

【主治】急慢惊风。

【备考】本方方名，原书人卫本作“神效贴凹散”。

59836 **贴顶散**

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】地胆草半两 芒消一两 地龙粪半两 黄柏一分（锉）

【用法】上为细末。以猪胆汁和，捏作饼子两枚，更互贴于囟门上。

【主治】小儿脑热鼻干。

59837 **贴顶膏**

【方源】《外台》卷十五引《广济方》。

【组成】蓖麻（去皮） 杏仁（去两仁皮尖） 石盐 芎䓖 松脂 防风各等分

【用法】先捣石盐以后四味为末，别捣蓖麻、杏仁，相次入讫，即腊纸裹之。有病者先灸百会三壮讫，刮去黑毛使净，作一帛贴子，裁大于灸处，涂膏以贴之，两日三日一易之。其疮子后即烂破，脓血出，及帛贴之，似烂柿蒂出者良。

【主治】头风闷乱，鼻塞，及头旋眼暗。

59838 **贴顶膏**

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】蓖麻子（去壳，研） 杏仁（去皮，研） 食盐 芎䓖（为末） 松脂（研）各等分

【用法】先捣食盐，次下四味杵匀，即涂于腊纸上。有病者先灸百会三壮讫，将腊纸药于灸处贴之，每日一易，得脓血出效。

【主治】头旋脑闷，鼻塞眼运。

59839　**贴胁膏**

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】川大黄　玄参　川朴消各一两

【用法】上为细散，以生地黄汁调匀，摊于帛上。贴之下睑。

【主治】眼白睛肿胀，赤涩热痛。

59840　**贴项散**

【方源】方出《医方大成》卷十引汤氏方，名见《医统》卷九十。

【组成】附子(生，去皮脐)　南星(生)各等分

【用法】上为末。生姜自然汁调，摊贴患处。

【主治】①《医方大成》引汤氏方：肝胆停热，致令筋软。②《医统》：五软。

59841　**贴背膏**

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】京三棱(大者)一枚

【用法】上以湿纸裹，于慢火中煨熟，乘热为细末，醋煮面糊调。贴背第三椎上。

【主治】鼻衄。

59842　**贴脐散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【异名】贴脐膏(《医统》卷六十四)。

【组成】吴茱萸(醋炒香熟)半两　干姜(炮)半两　木鳖子五枚(去壳)

【用法】上为细末。每用半钱，冷水调，以纸靥贴脐上。

【主治】元脏气虚，浮阳上攻，口舌生疮。

59843　**贴脐膏**

【方源】《医方类聚》卷一三六引《施圆端效方》。

【组成】甘遂

【用法】上为细末，以生白面调为糊，摊纸花上，掺末在上，涂脐中，及涂脐下硬处。别煎甘草水，温凉随意服之。以通为度。

【主治】大小便不通。

59844　**贴脐膏**

【方源】《扶寿精方》。

【组成】木鳖仁五个　母丁香五个　麝一分

【用法】上为末，米汤调作膏，纳脐中。外以膏药掩之。

【主治】水泻不止。

59845　**贴脐膏**

《医统》卷六十四。为《杨氏家藏方》卷十一"贴脐散"之异名。见该条。

59846　**贴脐膏**

【方源】《痘疹传心录》卷十七。

【组成】木鳖子十个　赤石脂二两　诃子肉一两　粟壳二两　干姜三分　麻油一斤二两

【用法】上同煎去滓，入黄丹八两，再熬，滴水软硬得中，离火加乳香、没药各三钱，龙骨一两，麝香五分搅匀，出火毒，每一个用膏三钱，以犬皮摊。贴脐上。

【主治】痢久不止。

59847　**贴脐膏**

【方源】《膏药方集》引《外科活人定本》。

【组成】大川芎　当归　白芍　地黄　人参　牡丹皮　白术　白苓　黄耆　厚桂　泽泻各二钱　大附子　知母各四钱　黄柏三钱　干姜　北细辛　胡芦巴　白芷　远志　巴戟　菟丝子　蛇床子　故纸　苁蓉　锁阳　木鳖子　蓖麻子　龙骨　石枣　山药　杏仁各四钱

【用法】水煎去滓，至大半干入油四两，桃、柳枝搅不住手，搅至水干，入密陀僧极细末一两半，成膏后入龙骨一钱五分，麝香一分，樟脑一钱五分，摊用。

【主治】男子遗精、白浊，女人赤白带、崩漏。

59848　**贴敛药**

【方源】《医方类聚》卷一七四引《简易方》。

【组成】麦饭石(粗麻石是也，曾作磨者尤

佳，火煅七八次，煅红入米醋中淬，煅至三四次，其石定细碎，用甘锅盛煅，候通红，淬醋中，煅过七八次可用） 鹿角根（不用脑骨，不用角梢，只用角根三寸，火烧） 贝母（为末）各等分

【用法】上为末，先将旧净洁衣绢片净洗候干，约疮大小，剪绢作一轮子，中留一小口，却用一小铫子，热少米醋，约用多少，将前药投醋中，候冷，摊于绢轮子上。贴疮，一日一换。

【功用】合疮。

【主治】痈疽疮疖。

59849 **贴散膏**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】升麻 甘遂 白芷 贯众 苦参 昆布 羌活 全蝎 蜂房 商陆 海藻 白及 赤芍 瞿麦 竹箬 白蔹 大蓟 蛇蜕 花粉 苍术 防风 荆芥 姜黄 细辛 泽兰 香附 远志 官桂 延胡 河车 角针 防己 川椒 归尾 紫草 僵蚕各三钱 斑蝥二十只 川草乌各三钱 三棱 莪术各三钱蓖麻子 金星草 蒲公英 地丁草 牛蒡 夏枯草 巴豆肉 野菊花 苍耳子 血见愁 桑寄生 草大戟 白鲜皮 威灵仙 五灵脂 王不留行各三钱 水仙根七钱 生首乌五钱 野蔷薇根七钱 皂荚二块 忍冬藤七钱 芙蓉花二十朵 木鳖子一两 童子发三钱 透骨草三钱 生姜三钱

【用法】用大麻油十五斤，浸七日，下锅内，熬至药滓枯，滤去滓，再熬至滴水成珠，然后投下炒黄丹六斤收膏。

【主治】一切热毒疮疖。

【备考】《外科传薪集》有穿山甲五钱、白附子三钱。

59850 **贴喉膏**

【方源】《外台》卷二引《深师方》。

【组成】蜜一升 甘草四两 猪膏半斤

【用法】微火煎甘草、猪膏令数沸，去滓，乃纳蜜，温令销。相得如枣大，含化稍稍咽之。

【主治】①《外台》引《深师方》：伤寒舌强喉痛。②《圣济总录》：伤寒后咽喉痛，舌强，余热上攻。

【宜忌】忌海藻、菘菜。

59851 **贴痞膏**

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】三棱 陈皮 地骨皮 黄芩 黄连 五灵脂 苦参 玄参 赤芍药 两头尖 草乌 香附子 当归 香白芷 大黄各三钱 木鳖子十六个（去皮） 巴豆四十九个（去壳） 乳香 没药 轻粉 血竭 阿魏各五钱 麝香三钱 香油一斤四两 铅丹十两（去消，用水二碗，滚三四次，去水，焙干）

【用法】先将香油入铜锅内，即将十八味切碎粗药入油内，用桑柴慢火煎之，黑黄色为度，去粗滓，方入铅丹，用槐、柳条不住手搅千遍，将药滴入水内成珠，去火，才入六味细药，用绢摊。贴，每日换一次。如有痒，剥了用热鞋底烙下，再依法贴之，待药力尽自落，不要强去。

【主治】痞积。

【宜忌】忌食生冷、油腻并一切发物。

59852 **贴痞膏**

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】水红花子二钱 大黄 朴消 山栀 石灰各一钱 酒酵一块（鸡子大）

【用法】上共捣成膏，用布摊开。贴痞块上，再用汤瓶熨，手帕勒之。三日后揭起，肉黑如墨，是其效也。

【主治】诸积。

59853 **贴痛汤**

【方源】《点点经》卷一。

【组成】生姜一块

【用法】自嚼细，贴痛处裹紧，对昼为度。

【主治】足痛，或左或右不一，或钉痛不移。

59854 **贴腰膏**

【方源】《串雅内编》卷一。

【组成】生姜一斤（捣汁四两） 水胶一两

【用法】上同煎成膏，厚纸摊。贴腰眼。甚效。

【主治】腰痛。

59855 **贴熁膏**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】田中鼢鼠土三升　木香一两　川大黄五两　白蔹三分　寒水石六两

【用法】上为细散,用酒调如稠饧,匀摊于帛上。贴熁之。

【主治】眼热毒所攻,眉骨及头疼,壮热不止。

59856 **贴癖膏**

【方源】《便览》卷四。

【组成】穿山甲五钱　木鳖仁十五个　全蝎五钱　斑蝥二钱　川乌五钱　巴豆仁一两半　胆矾二钱　阿魏三钱　蟾酥二钱　轻粉二钱　番硇二钱　芦荟二钱　血竭二钱　蜈蚣五条　古石灰三钱　糊盐一钱　真麝五分

【用法】净油半斤,飞丹四两,熬用。

【主治】小儿癖疾。

59857 **贴恶核散**

【方源】《普济方》卷二七七。

【组成】赤小豆　猪牙皂角　消石　黄柏　木鳖子各半两

【用法】上为末。鸡子清调涂。气体壮实者,仍服凉膈散或四顺清凉饮之类。

【主治】恶核肿。

59858 **贴脐饼子**

【方源】《普济方》卷一六九。

【组成】穿山甲(炮燥)　五灵脂　巴豆(去皮)　大蒜(去皮)各三钱

【用法】上为细末,同研如泥,作饼子三钱大。用绵裹一饼,安脐中,着物系定。觉热药行宣取效。

【主治】虚中积滞,腹胀痞痛,大小便不通。

59859 **贴敛药方**

【方源】《普济方》卷二九〇。

【组成】麦饭石(粗磨石是也,曾作磨者尤佳。火煅七八次,煅红入米醋中淬,煅至三四次,其石定细研,用甘锅盛,煅通红淬醋中,煅过七八次可用)　鹿角根(不用脑骨,不用角梢,只用角根三寸,火煅)　贝母(为末)各等分

【用法】先将旧净洁衣绢片洗净,候干,约疮大小,剪绢作一轮子,中留一小口,却用一小铫子热少米醋,约用多少,将前药投醋中,候冷,摊于绢轮子上,贴疮,一日一换。此方数人累效,不可疑药低贱而忽之。

【功用】合疮。

【主治】诸疮口不合。

59860 **贴头起项膏**

【方源】《幼幼新书》卷二十六引《吉氏家传》。

【组成】川乌末　肉桂末　芸苔子　天南星　蓖麻子各一钱　黄丹(炒)一钱匕

【用法】上用大蒜一头,煨熟去皮,乳钵内研,和药细,每用一钱,入米醋和匀。贴项上一日许。

【主治】小儿疳热胆冷,头项软倒。

59861 **贴囟通关膏**

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】荆芥一两　香附子(炒)　白僵蚕各七钱半　猪牙皂角二钱半　川芎一两七钱半　细辛五钱

【用法】上为细末,用葱白研烂,入前药末研匀,拈作饼。贴囟门上。

【主治】小儿被乳母鼻息吹着儿囟,令儿鼻塞不能吮乳。

59862 **贴顶升肠散**

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】蓖麻三四粒　麝香三分

【用法】同捣如膏。将头顶心发去一钱大块,将此药贴之。少顷其肠即收入。如缓,再用醋一口喷患人面上,其肠即入。

【功用】内痔疮已好,此药将肠子收入如神。

59863 **贴胁乌头散**

【方源】《普济方》卷九十八。

【组成】乌头三分(去皮脐,生用)

【用法】上为散。以酽醋调,涂于故帛上敷

之。须臾痛止。

【主治】风腰脚，冷痹疼痛。

59864 **贴药乌龙角**

【方源】《医统》卷七十九。

【组成】白僵蚕（炒） 赤小豆各六两 川牛膝六两 山桂（去皮） 桔梗 百草霜 白及（生，锉，阴干） 枇杷叶各一斤 骨碎补（去毛，炒）半斤 当归尾 北细辛半斤 白芷 南星（煨） 赤芍药 何首乌 白蔹各十两 知母 草乌（姜汁煮）各三两

【用法】上为细末，每用以姜汁、冷水、冷茶调摊纸上。于患处贴之，二日一洗一换。若骨碎须用夹法。

【主治】跌打损伤，筋骨寸断，差爻出臼。

【备考】方中当归尾用量原缺。

59865 **贴药芫花散**

【方源】方出《得效》卷三，名见《普济方》卷一五四引《经验良方》。

【组成】芫花根

【用法】上为末。米醋调，随大小敷之。立止。贴敷不住，须以纸花覆其上，用绢帛扎定。

【主治】臂腿间忽一两点痛，著痛不可忍。

59866 **贴疮蜂房散**

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】露蜂房（蜜涂，文火炙令青色）半两 羊屎四十九枚（烧白色） 皂荚一梃（烧烟尽）

【用法】上为末。洗干疮口，用此药贴之，后可服血竭散。

【主治】瘰疬。

【备考】本方方名，《普济方》引作“蜂房散”。

59867 **贴脐截疟丸**

【方源】《种福堂方》卷二。

【组成】胡椒 雄精各等分

【用法】上为末，将饭研烂为丸，如梧桐子大，外以朱砂为衣。将一丸放在脐中，外以膏药贴上。疟即止，亲验。

【主治】疟。

【备考】本方方名，《医学从众录》引作“椒雄贴脐丸”。

59868 **贴痔乳香膏**

【方源】《秘传外科方》引《李防御五痔方》。

【组成】茱萸 白及 白蔹 黄连 黄柏 当归各等分

【用法】上用香油四两，入柳枝三尺四寸长，同煎，柳枝黑为度；入前药末同煎紫色，用绢滤去滓，再煎数沸；次入黄丹、乳香一二钱，熬成膏，以瓦瓶盛藏。用少许贴疮上。立效。

【功用】《外科启玄》：生肌长肉止痛。

【主治】痔。

59869 **贴喉异功散**

《中药成方配本》。即《中国医学大辞典》引《疫痧草》“异功散”。见该条。

59870 **贴喉异功散**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】斑蝥四钱 血竭六分 乳香（炙）六分 没药（炙）六分 玄参（去芦）六分 全蝎六分 牛黄三分 麝香三分 冰片三分

【用法】上为细末，瓶装。将药面撒在拔毒膏中间，贴腮下痛处，起泡揪下，将泡挑破。

【功用】消肿止痛。

【主治】咽喉肿痛，喉痹喉风，白喉乳蛾。

59871 **贴痞琥珀膏**

《景岳全书》卷六十四。为《丹溪心法》卷三“琥珀膏”之异名。见该条。

59872 **贴熁灵龟膏**

【方源】《圣惠》卷六十七。

【异名】败龟膏（《圣济总录》卷一四四）、灵龟膏（《普济方》卷三一二）。

【组成】龟甲五两 川大黄三两 木鳖子三两（去壳） 当归二两（锉，微炒） 桂心一两

【用法】上为细散。每用时，先空煎酒一升，煎去一半，停稍冷，然后入药末一两，以柳本篦不住手搅成膏，以油单子上摊。贴伤损痛处。立效。

【功用】伤折接骨。

【主治】①《圣济总录》:从高坠下,伤损肿痛。②《普济方》:伤折有瘀血不散,胁肋疼痛。

59873　**贴熁败龟膏**

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】败龟三两(涂醋,炙令黄)　百草霜二两　木鳖子仁二两　当归二两(锉,微炒)　桂心二两　没药三两　芎䓖二两　川大黄三两

【用法】上为细散。每用之时,先以好酒一升,煎至半升,下火,停酒稍冷,然后入药末一两,却于火上重煎,以匙不住搅成膏,摊于纸上。贴之。

【功用】止痛,消肿,散瘀血。

【主治】伤折。

59874　**贴癖神应膏**

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】皮砂　山栀子　蜂蜜　酒糟　猪脂　水萝卜皮各一两半　硇砂一钱半　鸡子清二个　大葱一根　水红花子二钱　阿魏五分

【用法】上各为细末,捣葱同鸡青,相和诸药,摊布上。贴患处,或用油纸裹住,频频润之。如今日午时贴起,至来日午时去之再贴,甚者不过三五次。

【主治】小儿癖疾。

59875　**贴眼大黄饼子**

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】大黄一两三分　大麦面半合　鸡子五枚(去黄)

【用法】前二味为末,以鸡于白和作饼子。敷肿上,干即易之。

【主治】眼热毒赤肿所攻眉骨,及头痛壮热不止。

呲

59876　**呲沙门丸**

【方源】《鸡峰》卷七。

【组成】熟干地黄二分　阿胶一分　黄耆　五味子　天门冬　山药各二分　柏子仁　茯神　百部　丹参　远志　人参　麦门冬各一分　防风二分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如樱桃大。每服一丸,水八分,煎至五分,临卧和滓热服。

【主治】诸虚热,头昏眩运,耳鸣作声,口干微嗽,手足烦热,忪悸不安。

虾

59877　**虾汁汤**

【方源】《医统》卷八。

【组成】虾半斤

【用法】上加酱、葱、姜等料物,水煮。先吃虾,次吃汁,后以鹅翎探引吐痰。

【主治】中风。

【方论选录】用虾者,盖引其风出耳。

59878　**虾米酒**

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】鲜虾米一斤(去皮须足)

【用法】上用净肉不拘多少,捣烂,陈酒热服,少时乳至,再用猪蹄汤饮之,一日几次。其乳如泉,屡验神效。

【功用】通乳。

【主治】《本草纲目拾遗》:无乳,及乳病。

59879　**虾米散**

【方源】《普济方》卷二一九。

【组成】虾米一斤(去皮壳,用青盐酒炒干香熟为度)　真蛤蚧(青盐酒炙脆为度)一对　茴香(青盐酒炒)四两　净川椒四两(同上制,不可过)

【用法】上药须用浑浊煮酒二升,带浮蛆醅酒最佳,搅入青盐制用,先制蛤蚧、椒皮、茴香,干却制虾米,以酒浸为度,候已熟,取前三味同和匀,用南木香粗末同和,乘热收入瓷器内,四围封固,候冷取用。每服一匀,空心盐酒细嚼下。

【功用】起阳补肾。

59880　**虾蟆丸**

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】虾蟆一枚(去爪,烧作灰)　熊胆

（研） 麝香（研） 猪牙皂角（去皮子，炙） 白芜荑各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸至七丸，米饮或温水送下，一日三次。如急疳曾退落牙齿者，以倒流水化五七丸，涂龈上。

【主治】小儿急疳。

59881 虾蟆丸

【方源】《幼幼新书》卷二十四引丁左藏方。

【组成】干虾蟆大者一个（泔浸三宿，去肠肚头爪，净洗，酥炙令黄香） 陈皮（去白）一分 胡黄连一两 郁金 芜荑仁各半两

【用法】上为末，于陶器内用豮猪胆汁和，令稀稠得所，放饭上蒸熟为度，取出半日，为丸如绿豆大。常服五七丸，陈米饮送下。肥孩儿，常服得效。

【主治】小儿疳疾。

59882 虾蟆丸

【方源】《幼幼新书》卷二十三引《谭氏殊圣方》。

【组成】绿矾半斤（为末） 枣一升半（去核）

【用法】上先用醋五升，并矾煮枣熟，后入黄连四两，诃子（去核）二两，使君子二两，夜明砂二两，虾蟆四个，烧存性，同捣碎，入前药内搅匀，直至干焦为度；再为末，枣肉为丸，如黍米大。三四岁每服三十丸，乳食前米饮送下。

【主治】小儿五疳羸瘦，毛发稀疏，揉鼻咬甲，好食泥土，腹大颈细，痢如泔淀，乳食不消，小便白浊。

59883 虾蟆丸

【方源】《幼幼新书》卷二十引郑愈方。

【组成】虾蟆一个（紫斑者，去肠爪甲，用姜汁涂，炙黄干，别研） 芦荟（研） 鹤虱 宣连各二钱 胡黄连一钱

【用法】上为末，取豮猪胆汁为丸，如绿豆大。每服三丸，饭饮送下，一日三次。

【功用】杀虫，去骨热，进食，驻颜。

【主治】小儿骨热。

59884 虾蟆丸

【方源】《卫生总微》卷十二引王绍祖方。

【组成】芦荟（研） 黄连（去须） 谷精草 桂心 朱砂（研）各一钱 缩砂仁二钱 熊胆半钱（温水化研） 麝香半钱（研）

【用法】上除研药外，锉细，用一大虾蟆去了肚肠，入锉药在内，以线缝合。先用好醋浸少时，次慢火炙，酒醋又炙，至焦黑，放冷，杵研为末，入研药拌匀，取豮猪胆汁为丸，如绿豆大。每服五七丸，米饮送下。

【主治】小儿诸疳疳泻。

59885 虾蟆丸

《直指》卷二十四。为《圣惠》卷二十四“下虫方”之异名。见该条。

59886 虾蟆丸

【方源】《直指》卷二十五。

【异名】虾蟆杀疳虫丸（《育婴秘诀》卷四）。

【组成】大虾蟆干一个（炙令焦） 木香 鸡心槟榔 桃仁（水浸，去皮，晒） 苦楝根 酸石榴根皮 贯众各三钱 芜荑 鹤虱各二钱 巴豆肉二钱半

【用法】上为末，粳米粉糊为丸，如麻子大。每服十丸，五更石菖蒲煎汤送下。

【功用】杀虫。

【主治】《育婴秘诀》：小儿虫痛，口馋好甜，或食泥土、茶脚、火灰之类。

59887 虾蟆丸

《直指小儿》卷三，为原书同卷“蚵蚾丸”之异名。见该条。

59888 虾蟆丸

【方源】《局方》卷十（续添诸局经验秘方）。

【组成】虾蟆 使君子（炒） 皂角（烧）各二两 青黛二两半 龙胆草（去苗）四两 雄黄（研飞）二两

【用法】上为细末，入研药令匀，水煮面糊为丸，如粟米大。一岁儿每服七丸，二岁十丸，三岁二十丸，随乳下，饭饮送下亦得，不拘时候。

【主治】小儿五疳八痢，腹胀面黄，肌肤瘦瘁，时作寒热，不思乳食，爱吃泥土，揉鼻咬甲，头发作穗，不长肌肉，多生疮癣，大便无时，小便如泔，哯吐乳食，痢色无定，或吃交奶，渐黄渐瘦，变成疳疾。

59889　虾蟆丸

《普济方》卷三八三。为《伤寒金镜录》"蟾蜍丸"之异名。见该条。

59890　虾蟆丸

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】蟾蜍一个（打死，连腹脏炙干，为末）　粪蛆　黄连　胡连　神曲　麦芽　槟榔　肉果（各为末）

【用法】以猪胆汁及好酒煮面糊为丸。

【主治】小儿疳。

59891　虾蟆丸

《观聚方要补》卷二。即《圣惠》卷二十七"虾蟆散"改为丸剂。见该条。

59892　虾蟆散

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《普济方》卷一〇一。

【组成】烧虾蟆。

【用法】上为末。每服方寸匕，酒下，一日三次。

【主治】①《肘后方》：卒发狂。②《普济方》：卒狂言鬼语，忽仆地吐涎，遗屎不知。

59893　虾蟆散

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】虾蟆一枚（干者，炙微黄，为末）　胡黄连三分（末）　麝香一钱（细研）　龙脑一钱（细研）

【用法】上为细散。每服二钱，取羊头一枚烂煮，取脑髓调散，空心用温酒调下，以皮肤滑为验。其羊头髓须逐日煮新者用之。

【主治】急劳，烦热干瘦。

【备考】本方改作丸剂，名"虾蟆丸"（见《观聚方要补》）。

59894　虾蟆散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】虾蟆一枚（端午日者，烧灰）　青黛半两（细研）　柑子皮半两（微炙）　干姜半两（末）　麝香一分（细研）　熏黄半两（细研）

【用法】上为细末。每用绵裹，可虫孔大小，纳蚛孔中。以愈为度。

【主治】牙齿蚛痛有虫。

59895　虾蟆散

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】干虾蟆一枚（炙焦）　青黛一分（细研）　柑子皮半两　细辛半两　白鸡粪一分（烧灰）　麝香半钱（细研）　干姜一分（炮裂，锉）　芦荟一分（细研）

【用法】上为细散，同研令匀。绵裹如黍米大，纳虫孔中；无虫孔者，以一字敷于患处。有涎即吐却。

【主治】䶬齿疼痛。

59896　虾蟆散

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】赤背虾蟆二分（涂酥炙微赤）　地龙三分（微炒）　麝香一钱

【用法】上为细散。每取少许含，有津勿咽之，含药取愈。虾蟆、地龙，端午日者良。

【主治】口舌久生疮，疳疮。

59897　虾蟆散

【方源】方出《圣惠》卷六十五，名见《普济方》卷三〇一。

【组成】兔粪　虾蟆

【用法】于月望夜取兔粪，纳虾蟆腹中，合烧为灰，细研敷之。

【主治】①《圣惠》：大人、小儿卒得月蚀疮。②《普济方》：阴蚀欲尽，疮痛甚者。

【备考】《普济方》本方用虾蟆一枚，兔粪一两。

59898　虾蟆散

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】虾蟆灰半两　杏仁七枚（熬黑，研如泥）　黄连半分（末）　雄黄半钱（细研）　白矾灰半钱　腻粉半分　鹿角七寸（烧令熟，细研）　麝香半钱（细研）　蚺蛇胆半钱

【用法】上为细末，以腊月猪脂调如膏。先以甘草、蛇床、槐白皮煎汤洗疮，拭干，敷药，以油单裹，外更着绵帛裹之。三日，其剩肉剩甲皆当自落，三日一换。

【主治】甲疽，皮厚肿痛。

59899 **虾蟆散**

【方源】《圣惠》卷八十九。

【组成】干虾蟆一枚（烧灰） 青黛（细研） 柑子皮 细辛 白鸡粪 熏黄各一分 麝香半分（细研） 干姜半分（炮裂，锉）

【用法】上为细散。以薄绵裹少许，纳䘌齿孔中，每日一次。

【主治】小儿齿痛风䘌，连腮微肿。

【备考】方中熏黄，《普济方》作“雄黄”。

59900 **虾蟆散**

【方源】《圣惠》卷九十二。

【组成】干虾蟆（涂酥炙令黄） 芜荑（微炒） 干姜（炮裂，锉） 葵茎灰 莨菪子（水淘，去浮者，水煮令牙出，候干，炒令黄黑色） 白矾（烧汁尽）各半两

【用法】上为细散。三岁儿每服一字，温水调下。

【主治】小儿下部疳䘌疮。

59901 **虾蟆散**

【方源】《普济方》卷一〇一。

【组成】虾蟆（烧灰） 朱砂各等分

【用法】每服一钱，水调下，一日三四次。

【主治】风邪不识人，不能语者。

59902 **虾蟆散**

【方源】《普济方》卷三〇一。

【组成】虾蟆一枚（五月五日，烧灰，研） 金银土锅 人粪灰（一方云发灰）各一两 麝香（研）一分 银末小豆许

【用法】上为末。每用少许，敷疮上即愈。痢者吹下部。

【主治】疳蚀人诸处；赤血痢久不愈。

59903 **虾蟆散**

【方源】《痘疹会通》卷四。

【组成】癞虾蟆一个

【用法】取生白矾五钱，黑枣三个，贯入虾蟆腹内，外加盐泥包好，入火内煅存性，为末收贮。

【主治】痘毒。

59904 **虾蟆散**

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】硫黄三钱 胡椒二钱

【用法】上为细末，取癞虾蟆一个，眼红腹无八字纹者勿用，将药纳入口内，用线将口捆紧，外用黄泥包裹，入炭火中烧之，俟泥团红透取出，用碗盖住候冷去泥。取虾蟆磨为细末，忌铁器，调真小磨麻油，用净鸭翎蘸敷，候疮出毒水，数日毒尽而愈。

【主治】一切无名肿毒，恶疮久不收口，阴疽，鼠疬，杨梅结毒。

59905 **虾蟆膏**

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】真小磨麻油十两 槐树枝（青而肥嫩者）三尺三寸 铅粉四两（临用须晒极干过筛） 大癞虾蟆一个（癞多者佳，小则二个，要数月前预取，阴干，眼红腹无八字纹者勿用）

【用法】五月五日午时配合，平时亦可，先将麻油熬滚，即用虾蟆熬枯，将滓捞起，必须捞净，不然则贴之作痛，次下槐枝煎枯，亦须捞净，然后下铅粉，用大槐枝二根顺搅，微火慢熬，俟滴水成珠为度，取起用瓷器收贮。临用摊贴。一切无名肿毒、大小疮疖或腿肿湿气，痞块，俱贴患处。大人小儿食积、疳疾、身瘦肚大，俱贴肚脐上。

【主治】一切无名肿毒，大小疮疖或腿肿湿气；大人小儿食积、痞块、疳疾、身瘦肚大。

59906 **虾蟆膏**

【方源】《理瀹骈文》。

【组成】干蟾皮（油熬） 黄丹

【用法】收槐枝搅。

【主治】食积、痞块、疳疾、腿肿、湿气疮毒。

59907 **虾蟆灰散**

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】虾蟆灰（细研） 青黛（细研） 柑

子皮 细辛 白鸡粪 麝香(细研) 干姜 熏陆香各一分

【用法】上为末。以绵裹如杏仁大,安于肿痛处,每日换三次。有涎,旋旋吐却。

【主治】急疳,齿龈肿痛有虫,齿根朽烂疼痛。

59908 **虾蟆煎丸**

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】虾蟆一枚(用头,炙黄,为末) 胡黄连 地龙(去土,炒) 木香各一分 肉豆蔻一枚(去壳) 麝香(研) 黄连(去须)各一钱半 夜明砂 白芜荑各一钱(为末) 丹砂二钱(研)

【用法】用虾蟆、芜荑末、豮猪胆二枚、法酒一盏,煎成膏,和其余药末为丸,如粟米大。每服五丸至七丸,米饮送下,一日三两次。

【主治】小儿疳气。

59909 **虾蟆猪肚丸**

【方源】《风痨臌膈》。

【组成】虾蟆一只(去肠肚)

【用法】以胡椒一钱入口内,猪肚包缝,煮烂,汤半碗,去虾蟆,收猪肚捣烂为丸。每用汤一杯,送下丸药。

【主治】单腹胀。

59910 **虾蟆杀疳虫丸**

《育婴秘诀》卷四。为《直指》卷二十五"虾蟆丸"之异名。见该条。

虻

59911 **虻虫丸**

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】虻虫半两(炒微黄,去翅足) 桃仁二两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 桑螵蛸半两(微炒) 蛴螬一两(微炒) 代赭一两 水蛭半两(炒令微黄) 川大黄一两(锉,微炒)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,食前以温酒送下。

【主治】妇人月水久不通,洒洒往来寒热。

59912 **虻虫散**

【方源】方出《圣惠》卷六十七,名见《普济方》卷三一一。

【组成】虻虫一分(微炒) 牡丹一两 生干地黄一两

【用法】上为细末。每服二钱,食前暖酒调下。

【主治】被打损伤,腹中有瘀血。

59913 **虻虫散**

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】虻虫三十枚(去翅足,微炒) 桃仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 桂心一两半 川大黄三两(锉碎,微炒) 水蛭三十枚(炒令微黄)

【用法】上为细散。每服二钱,用童便一中盏,煎至五分,温温和滓服,日五服,夜三服。如卒无小便,用酒、水代之亦得。

【主治】金疮内漏,瘀血在腹中胀满。

59914 **虻虫散**

【方源】《圣惠》卷七十一。

【异名】桃仁散(《妇人良方》卷七)。

【组成】虻虫半两(炒令微黄,去翅足) 水蛭半两(炒令微黄) 桃仁三分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 乌贼鱼骨半两 牛膝半两(去苗) 鲤鱼鳞半两(烧灰) 桂心半两 芫花半两(醋拌炒令干) 枳壳半两(麸炒微黄,去瓤) 当归半两(锉,微炒) 赤芍药半两 硇砂半两

【用法】上为细散。每服一钱,食前以暖酒调下。

【主治】妇人脏腑宿冷,经脉不利,腹中有瘀血攻刺疼痛。

59915 **虻虫散**

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】虻虫半两(炒令微黄,去翅足) 水蛭半分(炒令微黄) 当归半两(锉,微炒) 人参三分(去芦头) 木香一分 红蓝花半两 童子头发三分(烧灰) 井内倒悬草三分 干姜一分(炮裂,锉) 赤芍药三分 姜黄三分

荷叶一两

【用法】上为细散。每服一钱，食前以温酒调下。

【主治】妇人月水不通，血气攻刺，腹胁疼痛，四肢干瘦，不欲饮食。

59916 **虻虫散**

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】虻虫半两（去翅足，微炒） 川大黄二分（锉，微炒） 乱发灰半两 蒲黄半两 麒麟竭半两 延胡索三分 伏龙肝半两（细研） 当归半两（锉，微炒） 赤芍药半两 狗胆二枚（干者） 䗪虫半两（微炒） 水蛭半两（炒令黄） 麝香一分（研入） 朱砂半两（细研，水飞过）

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服二钱，食前以温酒下。

【主治】产后日久月水不通。

59917 **虻虫散**

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】虻虫一百枚 水蛭一百枚 延胡索一两 棕榈皮一两 赤鲤鱼鳞二两 干荷叶三片 干藕节一两

【用法】上为末，一同入瓷瓶子内固济，候干，烧令赤色，冷了细研为散。每服一钱，温酒调下，不拘时候。

【主治】产后恶露不下，腹中疼痛不止。

59918 **虻虫散**

【方源】《圣济总录》卷一四八。

【组成】虻虫（初食牛血者）二七枚

【用法】上药烧为灰。以温水调服。

【主治】蛇螫人窍出血。

59919 **虻虫散**

【方源】《外科集腋》卷八。

【组成】丹皮一两 牛虻虫二十个（晒干，去翅，炙）

【用法】上为末。每服七分，酒下。血化为水矣。若有宿血在骨节中，各等分为末。

【主治】跌打损伤，瘀血内攻。

【宜忌】妊娠骨折忌服。

59920 **虻虎汤**

【方源】方出《广笔记》卷三，名见《麻科活人》卷二。

【组成】西河柳一两许 玄参三钱 知母五钱 贝母三钱 麦门冬一两许 石膏一两半 竹叶七十片

【主治】痧疹因食肉饭而成极重者。

【临症举例】痧疹 贺知忍少子病痧疹，家人不知，尚以肉饭与之。仲淳适至，惊曰：此痧症之极重者，何易视之？遂以本方二剂而痧尽现，遍体皆赤；连进四剂，薄暮矣。知忍曰：儿今无恙乎？仲淳曰：痧虽出尽，烦躁不止，尚不可保。再以石膏三两、知母一两、麦门冬三两，加黄芩、黄连、黄柏各五钱，西河柳一两，竹叶二百片，浓煎饮之，烦躁遂定而愈。

品

59921 **品雷丹**

《重楼玉钥》卷上。即原书同卷“回生丹”去麝香。见该条。

炭

59922 **炭皮丸**

【方源】《千金翼》卷五。

【组成】炭皮 芎䓖各一分 桂心 干姜 干漆（熬） 白术各一分半 蜀椒（汗） 黄芩 芍药 土瓜根 大黄（炙令烟出） 虻虫各半两（去翅足，熬）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，白饮送下，一日三次，不知，稍增之。

【主治】妇人忧恚，心下支满，膈气腹热，月经不利，血气上抢心，欲呕不可眠，懈怠不勤。

显

59923 **显仁丸**

《宣明论》卷四。为原书同卷“藏用丸”之异名。见该条。

59924 **显仁丸**

《宣明论》卷四。为原书同卷“妙功藏用丸”

之异名。见该条。

星

59925　星乌散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】大南星　草乌头　辣桂各等分

【用法】上为末。用酒或醋调敷,软白纸贴,未穴再用。

【主治】痈疽已结,未作穴溃。

59926　星乌散

【方源】《奇效良方》卷二十四。

【组成】天南星　川乌(生,去皮尖)各等分

【用法】上为细末。每服二钱,入细茶一钱,薄荷七叶,盐梅一个,同煎一二沸,入生姜汁些少,温服

【主治】诸般头风,二三十年不愈者。

59927　星风散

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】南星　防风各二钱五分　蜈蚣二条　江鳔三钱

【用法】上为细末。每用二钱,黄酒调服,一日二次。

【功用】搜风发汗。

【主治】破伤风表证。

59928　星斗丸

《本草纲目》卷三十二引《如宜方》。为《局方》卷八(吴直阁增诸家名方)"夺命丹"之异名。见该条。

59929　星术丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】牛胆南星　白术　石膏　黄芩　芍药　薄荷各等分

【用法】上为末,砂糖调成膏,津液化下。或为丸服亦可。

【主治】吃茶成癖。

59930　星术丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十四。

【组成】白术一两　南星　青皮　陈皮各三钱

【用法】面糊为丸服。

【主治】茶积。好饮茶成癖积,或喜吃干茶叶而成积,面黄,胸膈或空或胀无常。

59931　星半丸

【方源】方出《丹溪心法》卷二,名见《医部全录》卷二四〇。

【组成】南星　半夏各一两　蛤粉二两

【用法】上为末,神曲糊为丸,如梧桐子大,青黛为衣。每服五十丸,生姜汤送下。

【主治】湿痰,及白浊因痰者。

【加减】湿痰,加苍术;食积痰,加神曲、麦芽、山楂;有热加青黛。

【备考】本方加苍术,名"星夏蛤粉丸"(见《明医指掌》)

59932　星半丸

【方源】《袖珍》卷一。

【组成】南星(姜制)　半夏曲　凝水石　枯矾　僵蚕(炒)　干生姜各一两

【用法】上为末,生姜汁糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食后生姜汤送下。

【主治】诸般咳嗽。

59933　星半汤

《回春》卷三。即方出《丹溪心法》卷三,名见《医学正传》卷三"软石膏丸"改为汤剂。见该条。

59934　星芎丸

【方源】《明医指掌》卷九。

【组成】南星(制)四两　苍术(泔浸)四两　川芎四两　香附(童便浸三日,炒)四两

【用法】上为细末,蒸饼糊为丸,如绿豆大。每服百丸,白汤送下。

【主治】女人脂肥痰多,占住血海,因而崩漏下多者。

59935　星朱丸

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】南星(湿纸炮香熟)一两　朱砂二钱

【用法】上为末,用生猪心血为丸,如梧桐子大。每服一丸,煎防风汤调下。

【功用】定痛利痰。

【备考】本方原名星朱散，与剂型不符，据《袖珍》改。

59936 **星苏散**

【方源】《直指小儿》卷二。

【异名】南星散（《袖珍小儿》卷三）。

【组成】天南星（略炮，锉散）

【用法】每服三字。以生姜四片，紫苏五叶，煎取其半，却入雄猪胆汁少许，温服。

【主治】小儿诸风，口噤不语。

59937 **星辛散**

【方源】《古方汇精》卷三。

【组成】生南星　生大黄　北细辛各等分

【用法】上为末。葱汁醋卤熬稠，调敷。

【主治】一切外症初起，色淡浮肿。

59938 **星附丸**

【方源】《杂病源流犀烛》卷十四。

【组成】南星　香附各等分

【用法】上为末，生姜汁糊为丸。每服二三十丸，生姜汤送下。

【主治】老人、小儿痃癖，往来疼痛。

59939 **星附汤**

【方源】《百一》卷五。

【组成】全蝎一钱（炒）　附子（炮，去皮脐）　天南星（炮，洗去灰）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱，以水两盏，加生姜十五片，煎至七分，去滓，澄清放冷服。

【主治】①《百一》：中风。②《普济方》：风痰。

59940 **星附汤**

【方源】《普济方》卷八十九引《济生》。

【组成】附子（生，去皮）　南星（生，去皮）各一两　木香（不见火）半两　（一方用沉香）

【用法】上㕮咀。每服四钱，以水一盏半，加生姜九片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。痰涎壅塞，声如拽锯，服药不下，宜于关元、丹田二穴灸之。

【主治】因虚中风，痰涎壅塞，不省人事，脉来沉伏，服凉药不得者。

【备考】兼寒者，用熟附子。

59941 **星附散**

【方源】《本事》卷一。

【异名】大星附汤（《医方类聚》卷二十三引《澹寮》）。

【组成】天南星（大者）　半夏（二味薄切，姜汁浸透）　黑附子（炮裂，去皮脐）　白附子（炮微黄）　川乌（灰火炮制，去皮尖用）　白僵蚕（去丝嘴，炒）　没药（别研入药）　人参（去芦）　白茯苓（去皮）各等分

【用法】上为粗末。每服二钱，水、酒各一盏，同煎至八分，去滓热服。二三服，汗出愈。

【主治】中风入腑，虽能言，口不㖞斜，而手足亸曳，脉虚浮而数者。

59942 **星附散**

【方源】《医部全录》卷四三二引《幼幼近编》。

【组成】人参　防风　全蝎　僵蚕　蕲蛇　胆星　白附子　蝉蜕　白茯苓　琥珀　朱砂各一分　麝香　冰片各半厘　牛黄半分

【用法】虾蟆胆汁调药抹口中，用蚌汁灌之。

【主治】小儿慢惊。

59943 **星附膏**

【方源】《保婴撮要》卷三。

【组成】天南星　附子各等分

【用法】上为末，用生姜自然汁调。敷项间，干则润之。

【主治】小儿项软。

59944 **星砂丸**

【方源】《百一》卷五。

【组成】南星四两（汤浸洗七次）　良姜　缩砂仁各一两

【用法】上为细末，以生姜自然汁煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五至二十丸，生姜汤送下，不拘时候。夏月吃生冷尤宜。服虽多至七八十丸无害，加香附子二两尤妙。

【功用】消痰积，温中顺气，利胸膈，壮脾胃。

【主治】一切风痰及内伤生冷，腹胁胀痛，酒后痰实呕吐。

59945　**星星散**

【方源】《普济方》卷二〇〇引《如宜方》。

【组成】半夏(制)　南星　常山　草果　陈皮(制)　厚朴(制)　槟榔　秦艽　柴胡　苍术(制)　乌梅　良姜各等分

【用法】上㕮咀。酒、水各一盏，加桃、柳枝各七寸，甘草一寸，水煎，去滓，露一宿，发日鸡鸣时服。

【主治】疟已表解，寒热不止，服秦艽散未效者。

59946　**星香丸**

【方源】《袖珍》卷一。

【组成】南星　半夏各三两　白矾一两(研，同水浸二味一宿)　陈皮(五两，泔浸一周时，去白)三两　香附子三两(皂角，水浸一周时，晒)

【用法】上药不见火，为末，生姜汁糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，临卧生姜汤送下。

【主治】诸气嗽生痰。

59947　**星香汤**

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】天南星(极大，半两以上者尤佳)　藿香叶　生姜各半两

【用法】用水一大碗，煎干取出，独取天南星为末，去藿香叶、生姜不用。每服一钱，人冬瓜子少许，同煎一盏至半盏服之。

【功用】止吐泻，截惊。

【主治】小儿吐或兼泻，或独泻、惊风。

59948　**星香汤**

《袖珍》卷一。即《易简方》“星香散”。见该条。

59949　**星香饮**

《直指》卷三。为《易简方》“星香散”之异名。见该条。

59950　**星香散**

【方源】《易简方》。

【异名】星香饮(《直指》卷三)、对星香散(《明医指掌》卷二)。

【组成】南星八钱　木香一钱　生姜十四片

【用法】水煎，分两次服。

【主治】①《易简方》：气盛人卒中，昏不知人，口眼㖞斜，半身不遂，咽喉作声，痰气上壅。②《明医指掌》：中风体肥，痰盛，口不渴者。

【备考】本方方名，《袖珍》引作“星香汤”。方中南星，《明医指掌》作“胆星”。

59951　**星香散**

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】南星(圆白者)一钱半　木香　橘红各半钱　全蝎一枚

【用法】上锉细。加生姜四片，慢火煎熟。灌下。大便出涎即愈。

【主治】小儿急慢惊风，搐搦，窜视，涎潮。

59952　**星香散**

【方源】《永类钤方》卷二十。

【组成】南星(炮)二钱　木香　净陈皮各一钱　全蝎二个(焙)　甘草(炙)半钱

【用法】上锉散。每服一钱，加生姜三片，水煎服。

【主治】小儿痉痓，中风。

【加减】虚冷，可加熟附、川乌少许，添生姜一钱。

59953　**星香散**

【方源】《永乐大典》卷九七六引《卫生至宝》。

【组成】南星七钱半　木香　防风　甘草各二钱半　僵蚕(去丝嘴，炒)　蝎梢各半两

【用法】上㕮咀。每服二钱，加生姜五片，水一大盏，煎服。

【主治】小儿惊风。

59954　**星香散**

《婴童百问》卷二。为《直指小儿》卷二“星香全蝎散”之异名。见该条。

59955　**星姜汤**

【方源】《直指》卷七。

【组成】圆白南星(半两者)一个 老生姜三钱半

【用法】上各切片,以水三盏,瓷器内煎取其半,逐渐温服。

【功用】治痰去风。

【主治】风痰。

【备考】本方方名,《普济方》引作"生姜汤"、"小省风汤"。

59956 星姜饮

【方源】《直指》卷八。

【组成】南星(略炮)半两 生姜四钱 橘皮三钱

【用法】上锉。每服三钱,加紫苏五叶,水煎服。

【主治】风邪风毒,缠喉不语。

【备考】本方方名,《医统》引作"姜橘饮"。

59957 星夏汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】南星 半夏 苍术 神曲 细辛 白芷 甘草 黄芩(酒炒) 黄连(酒炒)

【主治】鼻渊。鼻痈久不愈,结成息肉,如枣核塞于鼻中,气塞不通。

59958 星黄汤

【方源】《赤水玄珠》卷十四。

【组成】南星 大黄各等分

【用法】水煎服。

【功用】吐痰。

【主治】心风。

59959 星乌石膏散

【方源】《普济方》卷四十五。

【组成】南星 草乌 石膏(煅)各一两

【用法】上为细末。每服一钱,加生姜三片,薄荷七叶,盐梅一个,以水一盏,煎至半盏。如头风注眼,先将此药熏,服时再温,连白梅服之。

【主治】偏正头痛,头风注眼。

59960 星石二陈汤

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】二陈汤加胆星 石菖蒲

【主治】痰饮凝结中脘,上冲头额,时常作痛。

【加减】兼风者,加防风、荆芥;兼火者,加栀、连;兼寒者,加细辛、川芎;发热恶寒,加羌活;头额作痛,痛连于目,加干葛、白芷、升麻;往来寒热,痛连头角,下连耳之前后,加柴胡、川芎。

59961 星石降痰丸

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】青礞石二两(焰消四两,将礞石捶碎,拌匀,装瓷瓶内,以瓦盖之,盐泥封固一寸厚,大火煅过,放地上一宿,取出研末) 南星二两(掘地坑敲实,炭火烧红,将米醋二碗泼下,随下南星,以瓦盆盖之,四旁用泥封固,次日取出,为末) 辰砂一两(水飞) 沉香一两 滑石一两(甘草水煮过) 猪牙皂角(去皮净) 瓜蒌仁 贝母各七钱 黄芩 枯矾 荆芥穗各五钱

【用法】上为末,生姜汁炼蜜为丸,如龙眼核大。白汤化下。

【主治】小儿惊风,痰壅喘急。

59962 星半瓜蒌丸

【方源】《医统》卷四十四。

【组成】南星 半夏 瓜蒌仁 香附子 橘皮 萝卜子(炒) 杏仁 皂角灰

【用法】上为末,神曲糊为丸,如梧桐子大。每服六七十丸,生姜汤送下。

【主治】痰喘。

59963 星半安中汤

【方源】《赤水玄珠》卷四。

【组成】南星 半夏各一钱半 滑石 香附 枳壳 青皮 木香 山栀仁(炒黑) 苍术 砂仁 茯苓 橘红各一钱 甘草四分 生姜四片

【用法】水煎服。

【主治】痰积作痛。

【加减】气攻痛者,去南星、滑石,加厚朴、玄胡索各一钱;痰甚者,加白螺壳(烧灰)一钱,临卧调下。

59964　**星半消核汤**

【方源】《疡科选粹》卷三。

【组成】半夏　牛胆星　天花粉　桔梗　白芷　金银花　昆布　海藻　夏枯草　瓜蒌仁　陈皮　甘草　防风　川芎　当归　羌活　海粉　贝母

【用法】上用水二钟，姜三片，煎服。

【主治】大人，小儿颈内痰核疬疮。

59965　**星半蛤粉丸**

【方源】《医略六书》卷十九。

【组成】南星二两(制)　苍术一两半(炒)　半夏一两半(制)　白术一两半(炒)　蛤粉三两(煅)　广皮一两半(炒)

【用法】上为末，神曲浆糊为丸。每服三钱，淡生姜汤送下。

【主治】温痰肿胀，泄泻、白浊，脉弦细者。

59966　**星附定晕汤**

【方源】《魏氏家藏方》卷上。

【组成】大天南星一两(劈作两片，一半炮，一半生)　附子　天雄各一只(并生作两，一半生，一半炮)　川芎(半生，半炒)　橘红(半生，半炒)　川当归各半两(去芦)　丁香四拾玖粒(半生半微炒)　半夏(团大者)　三拾枚(一半姜汁同研为饼子，一半白矾汤煮片时)　白附子拾四枚(半生，半泡)　蝎稍二十枚(半生，半炒)　甘草十寸(半生，半炙)

【用法】上㕮咀。每服三大钱，生姜十片，枣子一枚，水一盏半，煎至七分，去滓。不拘时候服。

【功效】祛风化痰和胃，定晕止呕。

【主治】风邪痰饮伏留于三阳之经，每遇将息失宜，或有感冒，饮食不调，则头晕呕吐，心胸痞闷，甚至旋晕呕逆，如屋旋倒者。

59967　**星香二陈汤**

【方源】《医方简义》卷三。

【组成】胆星五分　沉香(陈酒磨冲)五分　人参一钱　姜半夏一钱五分　茯苓二钱　陈皮一钱　炙甘草五分　香圆叶五片(不用亦可)

【主治】痰厥证。

59968　**星香全蝎散**

【方源】《直指小儿》卷二。

【异名】全蝎散(《普济方》卷三七三)、星香散(《婴童百问》卷二。)

【组成】南星(湿纸煨)二钱　木香　人参　橘红各一钱　全蝎(炙)三个　甘草(炙)半钱

【用法】上为细末。每服一钱，加紫苏、生姜、大枣，以水浓煎，旋以匙送下。

【主治】小儿慢惊风，昏迷痰搐。

【加减】有热，加防风。

59969　**星香导痰丸**

【方源】《湿温时疫治疗法》卷上引《丹溪心法》。

【组成】制南星三两　生香附三两　皂角(水浸一周、晒)　法半夏三两　广橘红五两

【用法】姜汁糊丸服。

【主治】痰嗽无火。

59970　**星桂接骨膏**

【方源】《中西医结合治疗骨与关节损伤》。

【组成】天南星二两　木鳖子　乳香　没药　肉桂各一两

【用法】上为细末，以蜂蜜或凡士林调成软膏，加酒少许调。敷患处。

【主治】骨折。疼痛难忍，气滞血瘀，肿胀较重。

59971　**星夏栀子汤**

【方源】《类证治裁》卷三。

【组成】半夏　南星　香附　石膏　栀子

【主治】痰火嗳气。

59972　**星夏蛤粉丸**

《明医指掌》卷三。即方出《丹溪心法》卷二，名见《医部全录》卷二四〇“星半丸”加苍术。见该条。

59973　**星附六君子汤**

【方源】《法律》卷五。

【组成】六君子汤加南星　附子

【主治】①《法律》：痰饮。②《一盘珠》：慢惊风。

胃

59974 **胃丹**

【方源】《济生》卷一。

【组成】朱砂（大块不夹石者）五十两 新罗人参 肉豆蔻（面裹煨） 缩砂仁 荜澄茄 白豆蔻仁 红豆 高良姜（锉，炒） 附子（炮，去皮脐） 白术 厚朴（姜汁炒） 丁香（不见火） 藿香叶 五味子 干姜（炮，去皮） 胡椒 益智仁 麦门冬（去心） 草果仁 橘红各四两。

【用法】上药各如法修制，锉如豆大，用白沙蜜五斤，将药一半同蜜拌匀，入铜锅内；以夹生绢袋盛贮朱砂，悬宕锅内，以桑柴火重汤煮四日四夜，换蜜五斤，又入前药一半，和匀，再煮三日三夜，取砂淘净焙干，入乳钵，用玉槌研细，米粽为丸，如绿豆大，阴干。每服十粒，加至十五粒，空心食前用人参汤送下，大枣汤亦得；如或呕吐，用淡生姜汤送下。

【主治】真阳衰虚，心火怯弱，不养脾土，冲和失布，中州虚寒，饮食不进，胸膈痞塞，或不食而胀满，或已食而不消，痰逆恶心，翻胃吐食，脏气虚寒，米谷不化，心腹绞痛，泄利不止。一切脾胃诸疾。

【宜忌】忌食猪、羊血。

59975 **胃气丸**

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】丁香 厚朴 硫黄 附子 干姜 桂 豆蔻仁 半夏曲各等分

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如黍米大。每服十五至二十丸，米饮送下，不拘时候。

【功用】消进饮食。

59976 **胃气丸**

【方源】《三因》卷十一。

【组成】硫黄（猪脏内缚两头，以米泔、酒、童便各一碗，煮干一半，取出洗断秽气，控干）十两 半夏（汤洗去滑）五两 白茯苓 人参各一两 石膏一分（煅，一法同硫黄煮）

【用法】上为末，生姜自然汁释饮饼糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸至百丸，空腹米汤入少许生姜汁送下。

【主治】忧思过度，脾肺气闭，聚结涎饮，留滞肠胃，气郁于阴，凝寒于阳，阴阳反戾，吐利交作，四肢厥冷，头目眩晕，或复发热。及老人胃寒，大便反秘，妊娠恶阻，全不纳食。

59977 **胃风丸**

【方源】《永乐大典》卷一〇三三引《大方》。

【组成】人参 白茯苓 白术 天麻 防风（去叉）各半两 干蝎一个（去毒）

【用法】上为细末，面糊为丸，如麻子大。每服三十丸，食后米汤送下。

【主治】胃风下血，不下乳食。

59978 **胃风丸**

【方源】《解围元薮》卷三。

【组成】荆芥二两 蒺藜 天麻 白芨各一两五钱 独活 柴胡 羌活 木瓜各三两 风藤 皂荚 厚朴 前胡 象贝母 苍耳子 金银花各一两五钱 麝香二钱 乳香 檀香各三钱 紫背浮萍四两

【用法】上为末，炼蜜为丸，甘草、大黄末为衣。

【主治】麻风病。胃风遍传五脏，外证浑身溃烂。

59979 **胃风汤**

【方源】《局方》卷六。

【异名】胃风煎（《医级》卷八）。

【组成】白术 芎䓖 人参（去芦） 白芍药 当归（去苗） 肉桂（去粗皮） 茯苓（去皮）各等分

【用法】上为粗末。每服二钱，以水一大盏，加粟米百余粒，同煎至七分，去滓，空心稍热服。

【功用】《玉机微义》：补血活血，益胃气。

【主治】①《局方》：风冷乘虚入客肠胃，水谷不化，泄泻注下，腹胁虚满，肠鸣㽲痛，及肠胃湿毒，下如豆汁，或下瘀血，日夜无度。②《儒门事亲》：小儿风水，小便涩，饮食不进，形肿如腹，四肢皆满，状若水晶。

【方论选录】《医方集解》：此足阳明、厥阴药也。胃风者，胃虚而风邪乘之也。风属肝木，能克脾土，故用参、术、茯苓以补脾气而益卫；当归、川芎以养肝血而调荣；芍药泻肝而能和脾；肉桂散风而能平木，故能住泄泻而疗风湿也。又曰白术、茯苓能壮脾而除湿，川芎、肉桂能入血而驱风。

【备考】本方方名，《张氏医通》引作"人参胃风汤"。

59980　**胃风汤**

【方源】《幼幼新书》卷二十八引《庄氏家传》。

【组成】人参(去芦)　官桂(去皮)　白术　川芎　天麻(肥白者)　大附子(炮裂，去皮脐)各等分

【用法】上为粗末。每服二钱，以水一盏，入粟米煎七分，去滓温服。

【主治】小儿风冷入肠胃，腹痛泄泻。

59981　**胃风汤**

【方源】《普济方》卷二十三引《卫生家宝》。

【组成】川芎一两　白术一两　人参五钱　白茯苓五钱　五味子一两　诃子三个(湿纸裹，煨)　诃黎勒三个(湿纸裹，煨)　槟榔二个　官桂五钱(去皮)　川干姜五钱(油涂炙)　陈皮一两(去白)　薏苡仁一两(微炒)　神曲五钱　麦蘖五钱　甘草五钱(炙)　附子一个(去皮，炮制，去尖，切作片)

【用法】上为细末。每服二钱，以水一盏，加大枣一个，煎七分，温服。

【主治】脾胃久冷，心胁胀满，腹胀肠鸣，不思饮食。

59982　**胃风汤**

【方源】《脾胃论》卷下。

【异名】胃风饮(《赤水玄珠》卷十四)。

【组成】蔓荆子一分　干生姜二分　草豆蔻　黄柏　羌活　柴胡　藁本各三分　麻黄五分(不去节)　当归身　苍术　葛根各一钱　香白芷一钱二分　炙甘草一钱五分　升麻二钱　枣四枚

【用法】上锉，如麻豆大，分二服。每服以水二盏，煎至一盏，去滓，食后热服。

【主治】虚风证。能食麻木，牙关紧搐，目内蠕瞤，胃中有风，独面肿。

【加减】中风自汗，汗多不得重发汗，宜去麻黄，而用根节。

59983　**胃风汤**

【方源】《便览》卷二。

【组成】人参　白术　茯苓　川芎　芍药　当归　羌活　防风　黍米

【用法】上以水二钟，煎服。

【主治】风入肠胃作痢，或赤或白，或如豆汁，或痢久人弱脉虚，色如陈腐将危者。

59984　**胃风饮**

《赤水玄珠》卷十四。为《脾胃论》卷下"胃风汤"之异名。见该条。

59985　**胃风煎**

【方源】《解围元薮》卷三。

【组成】羌活　泽兰　藿香各二两　蒺藜　柴胡　防风　细辛　白芷　薄荷各三两　荆芥四两　独活　木瓜　牛膝　连翘　黄芩　生地　山楂各二两五钱　菖蒲　枳实　陈皮各一两　麻黄一两五钱

【用法】上作十剂服。

【主治】麻风病。胃风遍传五脏，外证浑身溃烂。

【加减】有痰，加象贝母、石膏各一两。

59986　**胃风煎**

《医级》卷八。为《局方》卷六"胃风汤"之异名。见该条。

59987　**胃乐片**

【方源】《中医方剂临床手册》。

【组成】乌贼骨　甘草　乳香　没药

【用法】制成片剂。每服 4—6 片，一日四次。

【功用】制酸，止痛。

【主治】胃痛，胃酸过多者。

59988　**胃宁汤**

【方源】《山东医刊》1964；(7)：27。

【组成】煅瓦楞子 9 克 炒乌贼骨 9 克 广陈皮 9 克 焦麦芽 9 克 焦神曲 9 克 沉香 4.5 克 广木香 9 克 制玄胡 9 克 砂仁 6 克 制香附 9 克 炒杭芍 9 克 丹参 9 克 甘草 3 克

【用法】水煎服。每日早、晚各服一次。与胃宁散配合应用。

【主治】胃溃疡病。

【加减】伴有呕吐者，加半夏、竹茹、生姜、白蔻；脾胃虚弱者，加台参、白术、云苓；肝郁气滞者，加青皮、川楝子；气血两虚者，加黄耆、当归；寒痛者，加吴茱萸；热痛者，加炒黄连；疼痛剧烈，加炒枳壳、姜川朴；有明显出血者，加藕节炭、阿胶珠（另冲服三七粉，每次服 1.5g 至 3g，每日早晚各一次）。

59989 **胃宁散**

【方源】《山东医刊》1964：（7）：27。

【组成】砂仁 300 克 酒元胡 500 克 广木香 240 克 煅瓦楞 500 克 炒乌贼骨 500 克 白芨 240 克 沉香 180 克 甘草 150 克

【用法】上为细末。每服 3 克，每日中午饭后冲服。早晚服胃宁汤。

【功用】《古今名方》：制酸止痛。

【主治】溃疡病。

59990 **胃关散**

【方源】《医钞类编》卷十。

【组成】熟附子 炮姜 肉桂 花椒（去目） 藿香 砂仁

【用法】水煎，热服

【主治】呕吐神倦，胃不纳食，四肢无力。

59991 **胃关煎**

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】熟地三五钱或一两 山药（炒）二钱 白扁豆（炒）二钱 炙甘草一二钱 焦干姜一二三钱 吴茱萸（制）五七分 白术（炒）一二三钱

【用法】上以水二钟，煎七分，食远温服。

【主治】脾胃虚寒作泻，或甚至久泻，腹痛不止，冷痢。

【加减】泻甚者，加肉豆蔻一二钱（面炒），或用破故纸亦可；气虚势甚者，加人参，随宜用；阳虚下脱不固者，加制附子一二三钱；腹痛甚者，加木香七八分，或加厚朴八分；滞痛不通者，加当归二三钱；滑脱不禁者，加乌梅二个，或北五味子二十粒；若肝邪侮脾者，加肉桂一二钱。

59992 **胃约汤**

【方源】《普济方》卷一四三。

【组成】枳壳一两 紫苏一两 橘皮一两 甘草 生姜各五钱

【用法】上以水三升，煮取一升半，去滓。温服五合。

【主治】伤寒腹满面喘，不大便，下重，其人虚者。

59993 **胃灵丹**

【方源】《青囊秘传》。

【异名】延香散。

【组成】广木香 延胡各等分。

【用法】上为末。可内服，或外入大膏药内贴之。

【功用】温通气血。

【主治】①《青囊秘传》：胃痛②《记恩录》：跌伤。

59994 **胃苓丸**

【方源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】平胃散 五苓散

【用法】上各一帖，用大蒜蒸熟为丸。每服五十丸，煎木通汤吞下。

【主治】①《朱氏集验方》：水肿。②《普济方》：肿满因积而得，既取积而肿作，小便不利。

59995 **胃苓丸**

【方源】《幼科指南》卷上。

【组成】苍术（米泔水浸，去黑皮，焙）五钱 陈皮 白术（土炒）各五钱 厚朴（姜制） 猪苓 茯苓各三钱 甘草 草果仁各二钱 泽泻（去皮）四钱 官桂一钱

【用法】上为细末，米糊为丸，如粟米大。炒

米汤送下;呕吐,煨姜汤送下;泄泻,车前子炒米汤送下;潮热,竹叶炒米汤送下;浮肿,长流水煎灯心、五加皮汤送下;黄疸,加真茵陈五钱,灯心汤送下;白浊,盐汤下;疝气,茴香汤送下。

【功用】分阴阳,退潮热,止吐泻,消肿胀,退黄疸,调脾胃,止便浊。

59996 **胃苓丸**

【方源】《痘疹传心录》卷十七

【组成】白术 厚朴 茯苓 陈皮各二两 甘草一两 泽泻三两 猪苓一两五钱 干葛一两五钱 山楂二两 麦芽二两 神曲二两 黄连一两 木香一两 砂仁一两 苍术一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。清米汤化下。

【功用】消食,利水,清热。

59997 **胃苓丸**

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】苍术(米泔浸,炒)一两 陈皮一两 厚朴(姜汁炒)一两 白术(去芦,土炒)一两 白茯苓(去皮)二两 肉桂五钱 猪苓一两 泽泻一两 人参五钱 黄连(姜汁炒)一两 白芍(炒)一两 甘草(炙)五钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五六十丸,清米汤送下。

【主治】途中伤暑而作水泻、腹痛烦渴者;行人不服水土。

59998 **胃苓汤**

【方源】《增补内经拾遗》卷三引《局方》。

【异名】经验对金饮子(《加减灵秘十八方》)、胃苓散(《普济方》卷三二一引《大全良方》)、术苓汤(《女科万金方》)、平胃五苓散(《脉因症治》卷上)、对金饮子(《医学纲目》卷二十三)。

【组成】苍术(泔浸)八钱 陈皮 厚朴(姜制)五钱 甘草(蜜炙)三钱 泽泻二钱五分 猪苓 赤茯苓(去皮) 白术各一钱半 肉桂一钱

【用法】上为粗末,每服一两,以水二钟,加生姜三片,大枣二枚,炒盐一捻,煎八分,食前温服。

【功用】①《增补内经拾遗》引《局方》:安胃利水止泻。②《方剂学》:祛湿和胃。

【主治】脾湿过盛,浮肿泄泻,呕吐黄疸,小便不利。

①《增补内经拾遗》引《局方》:小便癃闭,大便飧泄,濡泻。②《普济方》引《大全良方》:夏秋之间,脾胃伤冷,水谷不分,泄泻不止。③《普济方》引《如意方》:沉冷证小便不利,及胃虚不和,早晨心腹痛。④《丹溪心法》:阴囊肿,状如水晶,时痛时痒出水,小腹按之作声,小便频数,脉迟缓。⑤《保婴金镜录》:脾胃受湿,呕吐泄泻。⑥《便览》:黄疸。⑦《增补内经拾遗》引《保生备录》:阴水。⑧《杏苑》:中暑挟食不消,吐泻腹痛。⑨《张氏医通》:饮食停积,浮肿泄泻。

【加减】口渴者,去肉桂。

59999 **胃苓汤**

【方源】《得效》卷五。

【异名】胃苓散(《普济方》卷一一七引《仁存方》)。

【组成】五苓散 平胃散

【用法】上二药合和,紫苏、乌梅煎汤送下。未效,加木香、缩砂、白术、丁香煎服。

【主治】伤暑烦渴引饮,所下如水。

60000 **胃苓汤**

【方源】《保婴撮要》卷七。

【异名】胃苓散。

【组成】白术 茯苓 泽泻 厚朴 猪苓 陈皮 甘草(炒)各等分 桂少许

【用法】上为末。每服二钱,姜水、灯心、陈皮煎汤调下。若停食吐泻,小便短少,腹胀作痛,用此方分利之,更用六君子汤以调补脾胃。

【主治】肠胃受湿,呕吐泄泻。

【备考】本方改为膏剂,名"胃苓膏"。(见原书同卷)。

60001 **胃苓汤**

【方源】《准绳·疡医》卷二。

【组成】苍术(米泔浸,炒)二钱 厚朴(姜制) 陈皮 甘草(炙) 白术(炒)各一钱、茯苓一钱七分 泽泻 木香 白芍药(炒)各一钱 官桂五分 淡竹叶二十片

【用法】上作一剂。以水二钟,加生姜三片,大枣二枚,煎八分,食前服。

【主治】痈疽,四肢沉重。

60002 **胃苓汤**

【方源】《痘疹会通》卷四。

【组成】泽泻 白术 陈皮 云茯苓 苍术(制) 川朴 甘草 肉桂 三棱 莪术

【用法】水煎服。

【主治】痘疹吐泻,灰白陷伏不起者。

60003 **胃苓汤**

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】赤苓 猪苓 厚朴 甘草 陈皮 泽泻 姜 枣

【用法】水煎服。

【主治】白痢水湿,小便短涩,虚热泻利,烦躁不眠。

60004 **胃苓汤**

【方源】《镐京直指》。

【组成】制茅术二钱 川朴一钱 赤苓三钱 猪苓三钱 泽泻二钱 广木香一钱 白豆蔻八分(研,冲) 陈皮一钱 浙藿香二钱

【主治】暑湿伤中,腹痛泄泻,或气闷胸满,舌白而滑,脉细而滞。

60005 **胃苓散** 《普济方》卷三二一引《大全良方》。为《增补内经拾遗》卷三引《局方》"胃苓汤"之异名。见该条。

60006 **胃苓散**

《普济方》卷一一七引《仁存方》。为《得效》卷五"胃苓汤"之异名。见该条。

60007 **胃苓散**

《保婴撮要》卷七。为原书同卷"胃苓汤"之异名。见该条。

60008 **胃苓膏**

《保婴撮要》卷七。即原书同卷"胃苓汤"改为膏剂。见该条。

60009 **胃胀汤**

【方源】《千金翼》卷十五。

【异名】胃服丸、补脏汤。

【组成】人参一两 茯苓 橘皮 干姜 甘草(炙)各二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,以水二升,于铜器中火上煮一沸,不能饮者,服一升,一日三次。可长服。

【主治】胃气不足,心气少,上奔胸中愦闷,寒冷,腹中绞痛,吐痢宿汁。

60010 **胃服丸** 《千金翼》卷十五。为原书同卷"胃胀汤"之异名。见该条。

60011 **胃爱丸**

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】云片白术一两(鲜白者,米泔浸去涩水,切片,晒干,同麦芽拌炒) 怀庆山药一两(肥大上白者,切片,用男儿母乳拌湿,候润干晒,微焙) 上白茯苓一两(切一分厚,咀片,用砂仁二钱,用茯苓合碗内饭上蒸熟,只用茯苓) 清河人参一两(制毕晒干,共为细末) 白豆蔻三钱 陈皮(用老陈米先炒黄色,方入同炒,微燥勿焦)六钱 小紫苏(蜜拌透,晒干,微蒸片时,连梗叶切片)五钱 莲肉(去皮心,切片)五钱 甘草(炙)三钱。

【用法】上为细末,用老米二合微焙碾粉,泡荷叶汤打糊为丸,如梧桐子大。每服八十丸,清米汤送下,不拘时候。

【功用】《金鉴》:助脾气,开胃口。

【主治】痈疽溃疡,脾胃虚弱,饮食诸味不喜,用过开胃进食之药不效者。

60012 **胃爱汤**

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】白豆蔻 丁香(不见火) 白扁豆(炒) 木香(不见火) 藿香叶(去土) 神曲(炒) 麦蘖(炒) 人参(去芦) 白术(炒) 茯苓(白者,去皮)各等分

【用法】上为细末。每服二钱,以水一中盏,

加生姜七片，大枣一枚，煎至七分，去滓，食前温服。

【功用】调补脾胃。

60013　**胃爱散**

【方源】《幼幼新书》卷十八引《张氏家传》。

【组成】糯米一两　干淡木瓜三分　甘草一分　丁香二十五粒(上四味同炒焦)　藿香叶　紫苏叶各一分

【用法】上药晒干，为细末。每服一钱或半钱，煎粟米大枣汤调下。如无汗出，即用控心散发之，后服羌活散与本方。

【主治】①《幼幼新书》引《张氏家传》：小儿脾虚吐泻。如斑疮不出，医人不识形候，便将冷药冰却疮子，致令内伏不出。②《医统》：痘疹，脾胃不快，泄泻呕吐。

60014　**胃爱散**

【方源】《普济方》卷二十二引《十便良方》。

【组成】丁香一分　人参一两　白术　茯苓　甘草各一分　肉豆蔻三个　黄耆　干姜各五钱

【用法】上以白米二两，同为细末。每服二大钱，以水一盏，加生姜一片，同煎至七分，通口服。

【主治】①《普济方》引《十便良方》：脾久虚，中焦气滞上壅，或有冷涎上潮呕恶，或有胸腹疼痛，不思饮食。②《景岳全书》：脾胃久虚，泄泻不止。

60015　**胃病汤**

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】白术二钱五分　木通　酒连　炙草各七分五厘　茯苓一钱　人参一钱五分　神曲　陈皮　砂仁　山药　麦芽　山楂各一钱　肉果一钱

【用法】饼丸，日二服。

【主治】脾胃病。

【备考】本方方名，据剂型，当作“胃病丸”。

60016　**胃疸汤**

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】茵陈　苍术　陈皮　白术　茯苓　猪苓　泽泻　黄连　栀子　防已　葛根　秦皮

【主治】谷疸不属实热者。

60017　**胃脾汤**

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】白术　茯神　陈皮　远志　麦冬　沙参各六分　五味子　甘草各五分

【用法】水二钟，煎六分，食远服。

【主治】葡萄疫。多生小儿，感受四时不正之气，郁于皮肤不散，结成大小青紫斑点，色若葡萄。

【加减】虚弱自汗者，去沙参，加人参、黄耆各五分。

60018　**胃痛片**

【方源】《吉林省中成药暂行标准》。

【组成】牡蛎 9.2 千克　大黄 92 克　龙胆 92 克

【用法】将牡蛎研为细粉，过 120 目筛；将大黄、龙胆煎煮三次，分次过滤，合并滤液，浓缩成膏；将上述药粉、浓缩膏加适量的黄糊精，混合均匀，制颗粒，干燥，整粒，应出颗粒 10 千克，公差±3%。加硬脂酸镁，混合均匀，压片，每片重 0.5 克。每次 8 片，温开水送服，一日三次。

【功用】制酸止痛。

【主治】胃痛胃胀，吞酸吐酸。

60019　**胃痛片**

【方源】《河南省药品标准》。

【组成】鸡蛋壳(炒)1 千克　天花粉 15 克　川贝母(去心)5 克

【用法】将上药混合，制成细粉，混匀，用 5%淀粉浆适量，制粒，烘干，加硬脂酸镁 0.7%，拌匀，压片，片重 0.6 克。口服，每次 6～8 片，一日三次。

【功用】止酸，止痛。

【主治】胃疼，胃溃疡，十二指肠溃疡，胃酸过多。

60020　**胃痛宁**

【方源】《古今名方》引上海中药制药一厂

方。

【组成】枯矾 5 千克　海螵蛸 3.6 千克　延胡索　炼蜂蜜各 1.2 千克　橘皮油适量

【用法】粉碎，制片，每片含生药 0.5 克。每服 4～6 片，每日三次，饭前温开水吞服。

【功用】制酸缓急止痛。

【主治】胃痛，胃酸过多，胃溃疡，十二指肠溃疡。

60021 胃气痛丸

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】黑沉香　金铃子　制于术　九香虫各一钱　制香附　延胡索　法半夏各一钱五分　当归身　炒白芍　炙鸡金　吴茱萸　川郁金各二钱　炙甘草　广木香　陈佛手各五分　杜仲三钱　广陈皮　春砂仁各八分　上安桂四分　香橼皮三钱

【用法】上为末，加三年陈米，煎汤代水泛丸。作煎方亦可。

【主治】胃气痛。

60022 胃气痛片

【方源】《上海市药品标准》。

【组成】乌药 15 克　没药（制）5 克　香附（制）15 克　高良姜 5 克　乳香（制）5 克　白芍（麸炒）30 克　五灵脂（炒）20 克　公丁香 5 克　大茴香 4 克　郁金 15 克　木香 8 克　青皮（麸炒）　10 克　肉桂 10 克

【用法】上将乌药、香附、郁金、青皮四味水煎两次，每次 4 小时。取药汁烊化乳香、没药，过 80 目筛，沉淀 6～8 小时，取上清液，浓缩成稠膏。将五灵脂等其余七味共研细粉，与上述稠膏搅匀，60～70℃干燥，研成细粉，过 100 目筛，每 100 克药粉加入淀粉 7.5 克，白糊精 7.5 克，砂糖 5 克，制成颗粒，60～70℃干燥，每 100 克干颗粒拌加润滑剂 0.5～1 克，压制成片，即得。每片重 0.4 克。口服，每次 5 片，每日二次。早晚服或痛时服用。

【功用】温胃散寒，理气止痛。

【主治】胃寒疼痛，心腹闷郁，吐酸水，消化不良。

60023 胃风煮散

【方源】《元和纪用经》。

【组成】茅山术（去皮，净）一斤　生芍药三两（赤白各半）　甘草三两　厚朴四两（去粗皮）　姜半斤（上二味同杵烂，下甘草，又杵匀，文火炒干，入术又炒，令香黄色）

【用法】上为末。每服三匕，水一升半，加生姜、大枣（切碎），同煎一升，取清汁温服。

【主治】脾胃风湿寒滞，泻利，不思食。

60024 胃灵冲剂

【方源】《中药制剂手册》引杭州第一中药厂方。

【组成】甘草二十五两　海螵蛸二十五两　白芍二十一两　党参五两　白术十三两　元胡（醋炙）十三两

【用法】取甘草等六味，用煮提法提取二次。第一次加水 10 倍量，煮沸 4 小时；第二次加水 8 倍量，煮取 3 小时，滤取二次药液，沉淀过滤，浓缩成稠膏约 30 两。另取白糊精 17 两，与上项稠膏搅拌均匀，分成小块，晾干或低温干燥，轧为细粉，制粒。取上项细粉，喷洒适量冷开水搅拌成软材，过 14～16 目筛，制成颗粒，干燥后整粒，日服三次，开水冲化，摇匀服用。

【功用】健胃，镇痛，消炎，止血。

【主治】胃炎及胃与十二指肠溃疡。

60025 胃药 3 号

【方源】《常见病的中医治疗研究》。

【组成】延胡索三钱　牡蛎四钱　香附三钱　丹参三钱　枯矾　海螵蛸　乌药各四钱。

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服二钱，一日三次。

【功用】《古今名方》：行气活血，敛酸止痛。

【主治】溃疡病。

60026 胃虚饼子

【方源】《幼幼新书》卷十引《刘氏家传》。

【组成】丁香五十粒　藿香叶一分　木香　韶粉　大附子（炮）各一棋子大（一云各二钱）

【用法】上为末,搅匀,生姜自然汁作饼子。用粗灯盏内煮软,化开服。或要急用,作散子,大枣一枚,煎服。

【主治】小儿吐泻后生慢脾风,或久泻者。

60027 **胃溃疡片**

【方源】《山东省药品标准》。

【组成】海螵蛸 280 克 蒲公英 200 克 山药 100 克 白芨 100 克 姜半夏 100 克 洋金花 10 克

【用法】(1)取山药 粉碎成细粉,过筛。(2)白芨、姜半夏、蒲公英煮提两次,每次 2 小时,将提取液澄清,滤过,蒸发至比重 1.16(90℃测)。(3)将洋金花制粗粉,照渗漉法用 50%乙醇作溶媒,浸渍 24 小时后,开始渗滤,蒸发至比重 1.16(90℃测)。(4)取海螵蛸粉碎,去渣,过 120 目筛。(5)取(1)、(4)项细粉与(2)、(3)项稠膏照制颗粒法制粒,压片,即得。每片重约 0.5 克(相当原药材 0.8 克)。口服或嚼碎服。每次 4~6 片,每日三次。

【功用】止痛,制酸,消炎。

【主治】胃溃疡。

60028 **胃苓五皮汤**

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】胃苓丸 五皮汤

【用法】上共锉,取长流水,加灯心,煎服。

【主治】小儿水肿。

60029 **胃苓和中汤**

【方源】《片玉痘疹》卷八。

【异名】胃苓和中饮(《痘疹全书》卷上)。

【组成】猪苓 泽泻 白术 白茯苓 诃子肉 陈皮 甘草(炙) 黄连(酒炒) 木香 藿香 升麻

【用法】粳米饮水煎服。

【主治】痘疹自起发之后,内热或伤饮食,忽然泄泻,所泄之物焦黄酸臭者。

60030 **胃苓和中饮**

《痘疹全书》卷上。为《片玉痘疹》卷八“胃苓和中汤”之异名。见该条。

60031 **胃苓羌活紫苏汤**

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】甜白术三钱 茅苍术一钱二分 云苓五钱 泽泻一钱二分 羌活八分 紫苏一钱 柴胡六分 青皮一钱五分 草蔻仁一钱(研) 甘草三分

【用法】加煨姜三钱,大枣三枚为引,水煎服。

【主治】湿疟。因冬月受非时之邪,伏藏骨体之中,至春夏湿热之气上升而发。此疟发时,先热后寒,或但热不寒,身体重痛,肢节烦痛。

思

60032 **思仙丸**

【方源】《鸡峰》卷四。

【组成】思仙木二两 干蝎半两 五加皮 防风 草薢 天麻 薏苡仁 续断 白术 羌活 牛膝 生干地黄各一两半

【用法】上为细末,宣州木瓜(去瓤、皮、子)半斤,先蒸过,切作片子,以好酒二升化青盐三两,同盐酒煮烂为膏,为丸如梧桐子大。每服四五十丸,空心、食前温酒、盐汤任下。如膏稠,少添酒煮而糊为丸,一日三次。

【功用】久服补五脏内伤不足,调中益气,凉血,坚筋骨,轻身。

【主治】肝肾风虚弱,腿膝痠疼,不可履地,风湿毒流注脚气,行动不得,小便余沥,里急后重。

【加减】老人,加附子一两。

60033 **思仙丹**

【方源】《种福堂方》卷二。

【组成】莲须十两 石莲肉十两(去内青翳并外皮) 芡实十两(去壳)

【用法】上为末,再以金樱子三斤(去毛子,水淘净),入大锅内,水煎,滤过再煎,加饴糖和前药为丸,如梧桐子大。每服七八十丸。

【主治】①《种福堂方》:阴虚火动,梦遗。②《医级》:嗜欲太过,精血不固,多热。

60034 **思仙散**

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】川木香一钱 茴香三钱 杜仲（炒去丝）三钱

【用法】上以水一钟，酒半钟，煎服，去滓再服。

【主治】腰痛。

60035 思食丸

【方源】《简易方》引蔡医博秘方（见《医方类聚》卷一〇〇）。

【组成】神曲九钱（炒） 麦蘖六钱（炒） 人参 干姜（炮）各二钱 乌梅（去核）五钱 甘草（炙）二钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服三两丸，白汤送下。

【功用】《奇效良方》：助脾胃，消导饮食，止吐逆。

60036 思食丸

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】乌梅肉 大麦蘖 神曲（碎炒）各一两 干木瓜 桂（去粗皮） 茯苓（去皮） 人参（去芦头）各半两 干生姜二钱 甘草（炙）三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两作十丸。每服一丸。细嚼，白汤送下，一日三次，不拘时候。或作小丸，如梧桐子大，每服三十丸亦可。

【功用】生津，大进饮食。

60037 思仙续断丸

【方源】《本事》卷四。

【组成】思仙木（即杜仲也。去皮，锉，炒令黑）五两 五加皮 防风（去叉股） 薏苡仁 羌活洗去土 川续断（洗，锉，焙干） 牛膝（洗，锉，焙，酒浸一宿，再焙）各三两 草薢四两 生干地黄五两

【用法】上为细末，好酒三升，化青盐三两，用大木瓜半斤（去皮），以盐酒煮大木瓜成膏，为丸如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温酒、盐汤任下。膏子少益以酒糊。

【功用】补五脏内伤，调中益精，凉血，坚强筋骨，益智轻身耐老。

【主治】肝肾风虚气弱，脚膝不可践地，腰脊疼痛，风毒流注下经，行止艰难，小便余沥。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作"续断丸"。

60038 思仙续断丸

【方源】《局方》卷五（宝庆新增方）。

【组成】木瓜（去瓤）三两 续断 草薢各六两 牛膝（洗，去芦，酒浸一宿，焙） 薏苡仁（炒）各四两 川乌（炮，去皮脐） 防风（去芦叉） 杜仲（去皮，姜炒断丝）各二两

【用法】上为末，醋糊为丸。每服三十至五十丸，空心、食前温酒盐汤任下。

【功用】补五脏内伤，调中益精凉血，坚强筋骨，益智轻身耐老。

【主治】①《局方》（宝庆新增方）：脾肾风虚，毒气流注，腿膝痠疼，艰于步履，小便遗沥，大便后重。②《普济方》引《如宜方》：肝肾风虚，腰脊疼痛。

60039 思仙续断丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】杜仲二两（去皮，姜制，炒断丝） 全蝎（去毒） 木瓜 五加皮 防风（去芦） 当归（去芦，酒浸） 草薢 天麻（酒浸） 薏苡仁 续断 白术（炒） 羌活 牛膝（去芦，酒浸） 生干地黄（洗）各等分。

【用法】上为细末，以好酒三升化青盐三两，木瓜半斤（去皮瓤，切片），同青盐熬成膏，为丸如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，食前温酒、盐汤任下。

【功用】去寒湿，壮筋骨。

【主治】脚气。

60040 思食大人参丸

【方源】《简易方》引石大夫方（见《医方类聚》卷一〇〇）。

【异名】大人参丸（《普济方》卷二二二）。

【组成】白术二两半 人参 山药各二两 附子（炮，去皮脐）一两 甘草（炙）一两半 干姜（炮）半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每

服三丸，以水一中盏，加大枣二枚，同煎至六分，空心、食前温服。

【功用】思食。

60041 思食补益人参散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】人参一两(去芦头)　白术一两　陈橘皮一两(汤浸，去白瓤，焙)　五味子一两　黄耆一两(锉)　附子一两(炮裂，去皮脐)　木香半两　甘草一分(炙微赤，锉)　桂心半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】脾胃气虚弱，不思饮食，肌体羸瘦，四肢无力。

骨

60042 骨仙片

【方源】广州众胜药厂方。

【组成】骨碎补10.2%　广防己10.2%　熟地黄21.7%　黑豆13.5%　金樱子13.5%

【用法】制成片剂。每服4～6片，一日三次。30～50天为一疗程。

【功用】填精益髓，壮腰健肾，强壮筋骨，舒筋活络，养血止痛。

【主治】骨质增生症，及膝关节，腰椎、胸椎、颈椎等诸骨关节增生症。

60043 骨补丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】黄狗脊骨一条(两头去两节，截为五段，取硇砂一两，研细，以浆水一升调搅，令消化作水，下脊骨，在汁中浸三宿后用炭火炙干，以汁刷之，汁尽为末)　肉苁蓉(酒浸，切，焙)　桂(去粗皮)　附子(炮裂，去皮脐)　干姜(炮)各一两　蛇床子(炒)　牛膝(酒浸，焙干)各半两　鹿茸一只(酥炙)　阳起石(火煅，研为粉)　五味子　胡椒各半两

【用法】上药为末，和前狗脊骨末，用枣肉五两，酥一两，相和为丸，如小豆大，晒干。每日盐汤下十丸。服一月，其精温暖；两月，精结实；三月精秘不泄。

【功用】驻颜悦色，暖精固精，壮筋力。

【主治】下元伤惫。

60044 骨刺丸

【方源】《中医外伤科学》。

【组成】制川乌30克　制草乌30克　细辛30克　白芷30克　当归30克　萆薢60克　红花60克。

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重9克。每次9～18克，一日三次。

【功用】祛风散寒，活血止痛。

【主治】损伤后期及骨刺疼痛。

60045 骨填煎

【方源】《千金》卷二十一。

【组成】茯苓　菟丝子　山茱萸　当归　牛膝　附子　五味子　巴戟天　麦门冬　石膏各三两　石韦　人参　桂心　苁蓉各四两　大豆卷一升　天门冬五两

【用法】上为末，次取生地黄、栝楼根各十斤，取汁，于微火上煎之，减半，便作数分，纳药，并下白蜜二斤，牛髓半斤，微火煎之。令如糜。食如鸡子黄大，每日三次，亦可饮服之。

【主治】虚劳消渴。

【宜忌】《外台》：忌酢物、鲤鱼、生葱、猪肉、冷水。

【备考】本方方名，《外台》引作“填骨煎”，有远志，无苁蓉。

60046 骨痨灵

【方源】《古今名方》。

【组成】白毛草　金银花　比萎藤各12克　五月红18克　臭梧桐15克　鸡血藤　乌麻根　苏木子各9克　三白草　白鱼鲷　白木槿各6克

【用法】水煎服，每日一剂，连服5～6剂后，可加猪蹄一只炖服。

【功用】通络活血，去瘀生新。

【主治】骨结核，关节结核，慢性骨髓炎。

60047 **骨髓丸**

【方源】《古今名方》引《锦方汇集》。

【组成】牛骨髓 250 克 人参 15 克 熟地 龙骨 鹿角胶 冬虫夏草 制首乌 北沙参各 30 克

【用法】上为末，用煮熟的牛骨髓或少许蜂蜜为丸。每服 3 克，一日三次。

【功用】养肝肾，益精血。

【主治】白血病。

60048 **骨汁煮饼**

《医统》卷八十七。为《圣惠》卷九十七"骨汁煮索饼方"之异名。见该条。

60049 **骨碎补丸**

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】骨碎补一两 桂心一两 狗脊一两 木香一两 仙灵脾一两 附子三分（炮裂，去皮脐） 川乌头三分（炮裂，去皮脐） 威灵仙一两 山茄子一两 当归一两 甜瓜子三两 补骨脂一两（微炒） 麻黄三分（去根节） 白附子一两（炮裂） 虎胫骨一两（涂酥，炙令黄） 干蝎半两（微炒） 天南星半两（炮裂） 自然铜一两（研细） 芎䓖三分 没药半分 赤芍药三分 朱砂半两（研细） 白花蛇肉二两（酒浸，炙令黄） 羌活三分 白芷三分 甘草半两（炙令赤，锉）

【用法】上为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】一切风毒走注疼痛。

60050 **骨碎补丸**

【方源】《博济》卷一。

【组成】威灵仙 草乌头各半两 白附子 荆芥各一两 仙茅 川羌活 紫花白术 防风（去头） 金毛狗脊（去毛） 茯苓（去皮）各一两 九节石菖蒲 干姜 白牵牛各一两半 威灵仙二钱 何首乌 苍术各一两

【用法】上药各要新好者，洗择净，并生用，焙干，细辛为末，以白生沙蜜和为剂，炼熟为丸，如梧桐子大。每服五十丸至二十丸，冷水送下，不嚼；妇人月候不通，红花酒送下。半月见效。

【主治】风虚攻疰，元气耗损，遍身筋骨疼痛，坐卧不能，饮食减少，行步无力。

60051 **骨碎补丸**

【方源】《局方》卷一。

【组成】荆芥穗 白附子（炮） 牛膝（酒浸，焙干） 肉苁蓉（酒浸一宿，切作片，焙）各一两 骨碎补（去毛，炒） 威灵仙（去苗） 缩砂仁各半两 地龙（去土，微炒） 没药各二钱半 自然铜（醋淬九遍） 草乌头（炮，去皮脐） 半夏（汤洗七次）各半两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五丸至七丸，温酒送下；妇人醋汤或当归酒送下。

【主治】肝肾风虚，上攻下疰，筋脉拘挛，骨节疼痛，头面浮肿，手臂少力，腰背强痛，脚膝缓弱，屈伸不利，行履艰难。

【宜忌】妊娠不宜服之。

60052 **骨碎补丸**

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】骨碎补（去毛）一两半 威灵仙（洗，焙） 草乌头（炮，去皮）各二两 天南星（炮） 地龙（去土，炒） 自然铜（煅，醋淬） 木鳖子（去壳） 枫香脂各一两 没药（研） 乳香（研）各半两

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五丸，空心温酒送下。

【主治】风毒走注疼痛。

60053 **骨碎补丸**

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】骨碎补（炒） 附子（炮裂，去皮脐） 肉豆蔻（去壳）各二两 蒺藜子（炒去角） 杜仲（去粗皮，锉，炒） 山芋 五味子（炒） 牛膝（去根，酒浸，焙） 山茱萸 独活（去芦头）各一两 芎䓖三分 黄耆（锉）一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【主治】骨极。腰脊痛，不能久立，发堕齿

槁，手足疼甚。

60054　**骨碎补丸**

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【组成】骨碎补(炙去毛)三两　败龟(醋炙)　虎骨(酒炙)　泽兰叶　山芋　白薇各一两　自然铜(煅，醋淬七遍)　山茱萸　桂(去粗皮)各一两　当归(切，焙)　熟干地黄(焙)　五味子　干姜(炮)各半两　肉苁蓉(切，焙)三分　白槟榔(生，锉)　附子(炮裂，去皮脐)各一两　肉豆蔻(去壳)二枚

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下。欲作散，每服一钱匕，温酒调下，并空心、日午、临卧服。

【主治】一切金刃伤，及筋骨风冷所中疼痛。

60055　**骨碎补丸**

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】骨碎补一两　木鳖子(去壳)一两半　乳香(研)一两　青橘皮(汤浸去白，焙)　陈橘皮(汤浸去白，焙)各一两半　木香一两　没药(研)一两半　甜瓜子(炒)一两一分　自然铜(煅，醋淬七遍)一两　干漆(炒烟出)　苍术(米泔浸，锉，炒)各一两半　芫花(醋半升浸一日，炒令焦)　干姜(炮)　血竭(研)各一两

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服七丸至十丸，空心温酒送下，醋汤亦得，一日三次。

【主治】妇人血风攻身体疼痛，手足瘴痹，筋脉拘急，或时寒热，经脉不调。

60056　**骨碎补丸**

【方源】《准绳·疡医》卷二。

【组成】骨碎补　补骨脂　熟地黄　川当归　续断　石楠叶　黄耆　石斛　牛膝　杜仲　萆薢各二两　附子(炮)一两　白芍药　川芎　菟丝子　沙参　羌活　防风　独活　天麻各一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸。空心盐汤送下。与大偻丸同服。

【主治】久漏疮，败坏肌肉，侵损骨髓，以致痿痹。

60057　**骨碎补散**

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】骨碎补一两　蒲黄一两　木香半两　延胡索一两　当归半两(锉，微炒)　桂心半两　芎䓖半两　槟榔一两

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】一切磕损、落马辗着伤折，有恶血者。

60058　**骨碎补散**

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】骨碎补一两　当归一两半(锉，微炒)　牡丹一两　虎胫骨一两(涂酥，炙令黄)　白芷一两　芎䓖一两　赤芍药一两　败蒲一两(烧灰)

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，一日四五次。

【主治】马坠车辗，腕折，呼叫疼痛，声音不绝。

60059　**骨碎补散**

【方源】《圣惠》卷六十八。

【组成】骨碎补半两(去毛，麸炒微黄)　自然铜半两(研细)　虎胫骨半两(涂酥，炙令黄)　败龟半两(涂酥，炙微黄)　没药一两

【用法】上为细散。每服一钱，以胡桃仁半个，一处烂嚼，用温酒一中盏下之，一日三四次。

【主治】金疮，伤筋断骨，疼痛不可忍。

60060　**骨碎补散**

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】骨碎补一两　当归三分(锉，微炒)　白蒺藜三分(微炒，去刺)　羌活三分　海桐皮一两　芎䓖一两　桂心三分　仙灵脾一两　侧子一两(炮裂，去皮脐)　木香三分　桃仁三分(汤浸，去皮尖双仁，微炒)　枳壳三分(麸炒微黄，去瓤)

【用法】上为细散。每服一钱，以豆淋酒调下，不拘时候。

【主治】妇人血风，身体骨节疼痛，腰脚无力。

60061 **骨碎补散**

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】骨碎补一两 萆薢一两 牛膝一两（去苗） 赤芍药三分 海桐皮一两 当归一两 芎䓖三分 附子三分（炮裂，去皮脐） 桂心一两 槟榔一两 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 枳实半两（麸炒微黄）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前稍热服之。

【主治】妇人血风气攻，腰脚疼痛，腹胁拘急，肢节不利。

60062 **骨碎补散**

【方源】《圣济总录》卷一二〇

【组成】骨碎补（炒黑色）二两

【用法】上为细散。盥漱后揩齿根下，良久吐之，临卧再用，咽津不妨。

【主治】肾虚气攻，牙齿血出，牙龈痒痛。

60063 **骨碎补散**

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】骨碎补（去毛） 当归（切，焙） 芎䓖（锉） 桂（去粗皮） 蒲黄 蜀椒（去目并闭口者，炒出汗）各一两 泽兰叶 没药（研）各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】腕折，手足热肿疼痛。

60064 **骨碎补散**

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】乳香 没药各一钱半 骨碎补一两（燎去皮）

【用法】上为细末，和匀。分作三服，用童便调下，酒亦可。

【功用】接骨。

60065 **骨碎补散**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】骨碎补9克 萆薢9克 牛膝9克 桃仁3克 海桐皮9克 当归9克 桂心6克 槟榔3～9克 赤芍3克 附子3克 川芎3克 枳壳3克

【用法】水煎服。

【主治】足跟溃疡。

60066 **骨槽风丸**

【方源】《春脚集》卷一。

【组成】好肉桂一两 炮姜五钱 麻黄三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，梧桐子大。每服二三钱，用半夏三钱、白茯苓二钱 甘草一钱、白芥子二钱、生姜三片水煎汤送服。

【主治】骨槽风。

60067 **骨槽风汤**

【方源】《春脚集》卷一。

【组成】熟地一两 鹿角胶三钱（石碎，隔水炖化，冲服） 好肉桂一钱 白芥子二钱（炒，研） 甘草一钱 炮姜五分 麻黄五分

【用法】水煎，空心服。

【主治】骨槽风。

60068 **骨皮清膈散**

【方源】《麻科活人》卷三。

【组成】黄芩二钱五分 石膏七分 滑石七分半 地骨皮 当归 知母 桑白皮 紫菀茸（蜜炒） 白茯苓 桔梗 甘草各五分

【用法】上加生姜三片为引，水煎服。

【主治】麻后毒流于肺经，肺中伏火，金虚叶焦，气喘，咳嗽连声不住者。

60069 **骨质增生丸**

【方源】《外伤科学》。

【组成】熟地黄二两 鸡血藤一两五钱 骨碎补一两五钱 肉苁蓉一两 鹿衔草一两 淫羊藿一两 莱菔子五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸三钱。每服一二丸，一日二三次。

【功用】养血，舒筋，壮骨。

【主治】肥大性脊椎炎，颈椎病，关节间游离体，骨刺，足跟痛，以及筋骨受伤后未能很好修复，而致经常性疼痛者。

60070 **骨蝡千捶膏**

【方源】《医方类聚》卷七十五引《经验秘方》。

【组成】寒食面四两(隔年者妙) 大乌梅四十九个 陈米醋量药用

【用法】先以乌梅净肉置器中醋浸,次取仁去皮研烂,焙干为细末,和梅肉与仁同浸一宿令透,却入寒食面一处为丸,如橄榄状,待半干,横穿一窍,以线悬透风处,勿令上白花。用时仍以米醋微浸,系患处。立愈。

【主治】骨鲠咽喉。

60071 骨汁煮索饼方

【方源】《圣惠》卷九十七。

【异名】骨汁煮饼(《医统》卷八十七)。

【组成】大羊尾骨一条(水五大盏,煮取汁二盏五分) 葱白七茎(去须,切) 陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙) 荆芥一握 面三两 羊肉四两(细切)

【用法】上以骨汁煮五七沸,去滓,用汁少许,搜面作索饼,却于汁中与羊肉煮,入五味,空腹食之。

【主治】虚损羸瘦,下焦久冷,眼昏耳聋。

60072 骨科外洗一方

【方源】《外伤科学》。

【组成】宽筋藤30克 钩藤30克 金银花藤30克 王不留行30克 刘寄奴15克 防风15克 大黄15克 荆芥10克

【用法】煎水熏洗。

【功用】活血通络,舒筋止痛。

【主治】①《外伤科学》:损伤后关节强直拘挛,酸痛麻木,或外伤风湿者。②《中医伤科学》:骨折及软组织损伤中后期,或骨科手术后已能解除外固定,作功能锻炼者。

60073 骨科外洗二方

【方源】《外伤科学》。

【组成】桂枝15克 威灵仙15克 防风15克 五加皮15克 细辛10克 荆芥10克 乳香10克 没药10克

【用法】煎水熏洗。

【功用】《中医伤科学》:活血通络,祛风止痛。

【主治】①《外伤科学》:损伤后期肢体冷痛,关节不利。②《中医伤科学》:风寒湿邪侵注,局部遇冷则痛增,得温稍适的痹症。

拜

60074 拜堂散

【方源】《医方类聚》卷六十七引《修月鲁般经》。

【组成】铜青二钱 五倍子 黄连各半两

【用法】上为极细末。贴于烂皮上。立效。

【主治】烂风眼。

60075 拜堂散

【方源】《医方类聚》卷七十引《烟霞圣效》。

【组成】五倍子

【用法】上为细末。干贴赤处便可。

【主治】风赤眼。

60076 拜受齿药

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】香附子(新大者)半斤(去皮毛,锉细,以生姜一斤取汁拌和,浸五七日取出,去姜汁不用) 细辛 盐各二两

【用法】以上瓦器炒存性,为细末。每日擦牙。

【功用】固齿。

秬

60077 秬黍汤

【方源】《医林纂要》卷四。

【组成】秬黍(连壳炒)

【用法】水煎服。

【主治】霍乱吐泻,风泻,及腹中有食积、寒气、热邪而作痛者。

种

60078 种子丸

【方源】《何氏济生论》卷七。

【组成】白茯苓一两五钱 白芍七钱五分 白术一两五钱 当归一两五钱 枸杞七钱五

分 薄荷七钱五分

【用法】上为末，用猪油半斤熬，去滓；再用蜜半斤熬，去沫；再用糖半斤，入前药末拌匀，置瓷罐内，隔水煮三炷香，埋土内三日。每晨服二匙，白汤送下。

【功用】令精髓满溢，肌肤肥泽，虽七八十老人尚能生子。

60079 **种子丹**

【方源】《简明医彀》卷七

【组成】何首乌八两 仙茅（川者）四两 牛膝（酒浸） 白茯苓（人乳砂锅煮、蒸） 赤茯苓（牛乳砂锅煮） 生地黄（酒浸，蒸，捣） 枸杞（甘州红细者） 人参（坚明） 当归身（酒浸） 杜仲（姜汁拌，盐酒炒去丝） 远志（甘草汁浸，剥肉） 柏子仁（去油） 山茱萸肉 菟丝子（煮饼） 破故纸（盐酒炒香） 大胡麻（酒蒸九次） 核桃仁 松子仁（俱另研）各一两

【用法】上除地黄、桃仁、松仁外，各为末，入地黄，重晒，磨，加二仁，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心酒送下；夏月盐汤送下。

【功用】种子。

60080 **种子丹**

《叶氏女科》卷四。为《扶寿精方》"秘方千金种子丹"之异名。见该条。

60081 **种玉酒**

【方源】《叶氏女科》卷四。

【组成】全当归五两（切片） 远志肉五两（甘草汤洗）

【用法】上用稀夏布袋盛之，甜酒十斤安药浸之，密封口。浸过七日后，临卧温服，随量饮之，切勿间断，服完再制。又经净后，每日用青壳鸭蛋，针刺七孔，蕲艾五分，水一碗，将蛋安艾水碗内，饭上蒸熟食之，每月多则吃五六个，少则吃二三个亦可。

【主治】妇人经水不调，气血乖和，不能受孕；或生过一胎之后，停隔多年。

【方论选录】全当归行血凉血，远志肉散血中之滞，行气消痰。

60082 **种子金丹**

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十四。

【组成】川附子一只 草乌一两 川乌一两 母丁香一两 紫梢花一两 官桂一两 雄黄五钱 蟾酥一两 良姜五钱 五倍子五钱 倭硫七钱五分 黄柏一两 牡蛎一两 蛇床子二两 苏合油一两

【用法】上为末，白术煎膏，溶化蟾酥为锭。梦遗，水磨涂脐中；种子，酒磨润阳，午前用之，临事洗去。

【功用】种子。

【主治】阳痿遗精，不育。

60083 **种子药酒**

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十四。

【组成】淫羊藿半斤 淮生地四两 当归二两 枸杞子二两 胡桃肉四两 五加皮二两

【用法】上锉片，酒浸，重汤蒸透，男女俱服。如遇入房，调服人参细末一钱。

【功用】种子。

60084 **种子大补丸**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】人参 麦门冬 生地黄 熟地黄 杜仲 巴戟天 沙苑白蒺藜 天门冬 枸杞子 黄柏 白茯神 白茯苓 白术 白芍药各四两 牛膝 当归 黑桑椹 芡实 圆眼肉 鹿角胶各五两。

【用法】上为末，用雄鹿血和蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒、盐汤任下。

【功用】补肾种子。

60085 **种子延龄酒**

【方源】《医学正印》卷上。

【组成】生地黄二两 熟地黄二两 天门冬二两 麦门冬二两 当归二两 南芎一两 白芍药一两五钱（炒） 人参五钱 白术二两（土炒） 白茯苓二两 何首乌（同黑豆蒸，干片）二两 牛膝二两（盐酒炒） 杜仲二两（盐酒炒） 枸杞子二两（研碎） 巴戟（净肉，酒蒸过）二两 肉苁蓉（酒洗去甲膜）二两 远

志肉一两(甘草汤制过)　石菖蒲五钱　破故纸一两(盐酒炒)　山茱萸一两(去核净肉)　石斛一两(盐酒蒸晒)　甘菊花一两(去蒂净)　砂仁五钱(研末)　木香五钱(锉末)　虎胫骨二两(酥炙)　龟版二两(酥炙)　陈皮一两　柏子仁(去壳净肉)一两(研)　酸枣仁(炒)一两(研)　小茴香(盐酒炒)一两　大枣肉二两　圆眼肉一两　青盐一两　胡桃肉一两　生姜一两　灯心一两

【用法】上锉制如法,将药入坛内,用无灰酒四十斤煮三炷香取起,坐水缸内,频频换水,浸三日夜,倾绢袋内滤清。将药渣再用酒二十斤,如前煮三炷香,取起坐水缸浸三日夜,滤干去渣不用。将酒合一处埋土中三日,去火毒。每早晚或饥时量饮三五杯。清明后,霜降前,药不必煮,只将酒浸二十一日后取饮。其药渣晒干,焙燥磨为末,炼蜜为丸,将前酒下药甚妙。

【功用】和气血,养脏腑,助劳倦,补虚损,乌须发,清耳目,固齿牙。久服返老还童,延年种子。

【加减】虚人有火,加盐酒炒黄柏、知母各二两。

60086　种子济阴丸

《医学正印》卷下。为《古今医鉴》卷十一“济阴丸”之异名。见该条。

60087　种子济阴丹

《回春》卷六。为《古今医鉴》卷十一“济阴丸”之异名。见该条。

60088　种子兜肚丸

【方源】《内外科百病验方大全》。

【组成】附子一个(重二两,切片,烧酒煎过,晒干)　大茴(炒)　小茴(炒)　丁香　五味子各一两　升麻　木香　甘草　甘遂各四钱　沉香一钱

【用法】上为末,用新蕲艾四两,搓融晒干,将前药放在艾中间,用线密缝兜肚,置丹田上,外用手帕包固,昼夜缚定,不可换动,一二月后则去之。或加麝香二三分更妙。

【功用】调经种子。

【主治】赤白带下,腰腿痠痛,子宫寒;男子肚腹畏寒、遗精、白浊、偏坠、疝气,一切下部虚寒。

秋

60089　秋水丸

【方源】《内外科百病验方大全》。

【组成】生军十斤　煮酒一百五十斤

【用法】用锦纹大黄一味,置于缸内,煮酒一坛,泡而晒之,俟其浸透发软,切作厚片,日晒夜露,历百日百夜方可用,以黑透为度,干则加酒,时刻移缸就日,并须时刻翻动,以免上干下湿之患,恐其积酒过夜而酸。至交霉之时,须晒令极干,装入坛中,俟交伏天之后,再行取至缸内,照前加酒翻晒,伏天风燥日烈,可以日日加酒,交秋之后,得酒已多,一经夜露,即觉潮润,而加酒亦宜酌减。到九、十月间,色已黑透,然后杵和为丸,如梧桐子大,贮于瓶内。每服三四钱,开水送下。

【主治】湿热痰火积滞,一切疮疡肿毒,瘀阻停经。

60090　秋水丸

【方源】《中药成方配本》。

【组成】大黄十斤

【用法】制时应在夏秋两季,将大黄切片,用黄酒十斤拌透,日晒夜露,不时将药翻动,约二十天左右,几黑为度。最后晒干,研成细末,冷开水泛丸,如绿豆大,约成丸八斤。每次一钱,开水吞服,一日二次。

【功用】泻热通滞。

【主治】湿热积滞,赤痢腹痛。

【禁忌】孕妇慎用。

60091　秋石丸

【方源】《朱氏集验方》卷八。

【组成】秋石一两　白茯苓　南参　山药　川当归(酒浸)各半两　血茸(蜜炙)二两　龙骨(煅)半两　大附子(炮)一只　沉香一钱半　辰砂二钱半(别研,一半为衣,一半入药)

【用法】上为细末，鹿角胶煮酒为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，盐汤、温酒任下。

【功用】益精生血，补养心肾。

60092 **秋石丸**

【方源】《普济方》卷二一四。

【组成】肥膏油 白茯苓一两（研） 桑螵蛸（蜜炙） 秋石五钱（研） 鹿角胶（捣碎，炒黄焦，米粒大）半两

【用法】上为末，和糕糊为丸，如梧桐子大，每服五十丸，人参汤送下。

【主治】浊气干上，精散而成膏淋，黄赤白黯如汁。

【备考】方中肥膏油、桑螵蛸用量原缺。

60093 **秋石丸**

《医便》卷一。为原书同卷"苍术丸"之异名。见该条。

60094 **秋石丹**

【方源】《洪氏集验方》卷四。

【组成】秋石一两 干山药一两

【用法】上为末，别以酒调山药糊为丸，如梧桐子大，又以干山药为衣。每服二十丸，温酒米饮任下。

【主治】虚劳瘦弱。

60095 **秋石丹**

【方源】《何氏济生论》卷二。

【组成】真秋石十两 白茯苓四两 莲肉四两 山药四两 小茴香二两。

【用法】酒为丸。空心米饮送下。女子加生地二两，熟地四两，川芎三两，红枣肉为丸。

【功用】补肾水。

【主治】虚劳。

60096 **秋茄散**

【方源】《女科指掌》卷五。

【组成】茄子（经霜裂开者，阴干）

【用法】烧，为末。水调敷。

【主治】产后妬乳

60097 **秋莲丸**

【方源】《奇效良方》卷二十一。

【组成】莲肉一斤（先用酒浸一宿，待透人，于猪肚内线缝合，却用酒煮熟，取出晒干，猪肚不用） 苍术（用茅山者）一斤（分作四份：一份用米泔水浸，小茴香、破故纸各一两同炒；一份用酒浸，川乌、川楝子肉各一两同炒；一份用醋浸，川椒一两同炒；一份用盐水浸，黑牵牛一两同炒，去牵牛） 木香 五味子 枸杞子 熟地黄 牛膝 肉苁蓉 鹿茸各二两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒或盐汤送下。

【功用】壮筋骨，健脾胃，去痰涎，除风湿，添精气，和血驻颜，牢牙齿，乌髭发，理腰疼，疗疝气。

【主治】诸虚百损。

60098 **秋蓬散**

《普济方》卷一九〇。为《卫生宝鉴》卷十二"恩袍散"之异名。见该条。

60099 **秋葵油**

【方源】《医林纂要》卷七。

【组成】秋葵花（阴干）不拘多少

【用法】浸麻油中待用。

【主治】汤泡火伤。

60100 **秋霜丹**

【方源】《得效》卷十五。

【组成】真秋石

【用法】上为末，北枣去皮，煮烂为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心醋汤送下。

【主治】赤白带下。

60101 **秋霜白**

【方源】《外科十三方考》。

【组成】陈年石灰（百年以上者佳）半斤 冰片三钱

【用法】上为细末，用麻油拌成粥，装入猪尿脬内，将脬口扎紧，沉入井内七日，取出挂于背阴处，慢慢风干。去脬研细，收贮备用。用时以香油调涂疮口。

【主治】疮疡已溃，无脓无水，疮口干红者。

【加减】如痛，可加麝香少许。

60102 **秋霜散**

【方源】《博济》卷四。

【组成】信砒一分 粉霜半钱 腻粉半钱 麝香少许

【用法】上为细粉。用时以指头拈一粟米许，揩在患处牙龈上。立效。

【主治】小儿走马疳蚀唇颊，牙齿浮动宣露，口臭。

60103 秋霜散

【方源】《幼幼新书》卷二十五引茅先生方。

【组成】好砒半两 白矾四分

【用法】上用水三分一盏，先煎水令海眼沸来，便下砒煅，水干为度，即下白矾末同煅，干为末，取出好麝香少许，好坯子少许，同拌合为末。每使一字，用鹅毛点拂牙龈上，一日三四回拂。即愈。

【主治】小儿崩沙。

60104 秋霜散

【方源】《幼幼新书》卷二十五引《惠眼观证》。

【组成】粉霜 砒霜 白矾各一钱

【用法】上为末。用北艾一大团裹定药末，以石灰渗艾上，后用碗盛，发火烧尽，为细末。以手捻少许揩齿上，用盐汤漱口。烧时以盏子盖定，恐走了药气。

【主治】小儿崩沙，齿龈欲落。

60105 秋霜散

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】胆矾 白矾各二两 麝香 腻粉各少许

【用法】上为末。先以盐水漱口，次以少药干掺，沥涎少时，每日一次。

【主治】口舌疳疮。

【宜忌】慎肥腻滋味等物。

60106 秋石五精丸

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】秋石一两(童男女洁净无体气者，沐浴更衣，各聚一室，用清洁饮食及盐汤与之，忌葱、蒜、韭、牛肉、不洁之物，椒、茶不用尤妙。聚便各盈缸，然后男女童便各另熬成秋石，各另盛瓦罐，盐泥固济，铁线固定，打一火炷香为度，连换铁线，打七火，然后男女秋石称匀，和成一处。如成块，研开用龙水将纸七层滤过，用锅仍熬秋石，其色雪白。用初生男胎之洁净妇人香浓乳汁和成，日晒夜露，但干即添乳汁，待日精月华取足四十九日后入药，用五精丸方见效) 莲肉五钱 真川椒二分 小茴香五钱 白茯苓一两

【用法】上为丸，用初生男胎之妇人乳汁吞下。

【功用】补养。

60107 秋石四精丸

【方源】《万氏家抄方》卷三。

【异名】秋石固真丸(《医学入门》卷七)。

【组成】秋石 莲肉 茯苓 芡实各二两

【用法】上为末，枣肉十二两为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，温酒送下。

【主治】①《万氏家抄方》：肾虚盗汗，腰痛。②《医学入门》：思虑色欲过度，损伤心气，遗精盗汗，小便频数，肾虚腰痛。

60108 秋石交感丹

【方源】《本草纲目》卷五十二引《郑氏家传方》。

【组成】秋石一两 白茯苓五钱 菟丝子(炒)五钱

【用法】上为末，用百沸汤一盏，井华水一盏，煮糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，盐汤送下。

【主治】白浊遗精。

60109 秋石还元丹

【方源】《普济方》卷二二二引《十便良方》。

【组成】男子小便十石(更多不妨)

【用法】先掮大锅灶一副，于空屋内，锅上用深瓦甑接锅口令高，用纸筋杵石灰泥，涂甑缝并锅，勿令通气，候干下小便，只可于锅中及七分以来，灶下以稻火煮，令专人看之，若涌出，即添冷小便些少，勿令涌出；候干研细，入好合内，如法固济，入灰炉中煅之；旋取二三两，再研如粉，煮枣瓤为丸，如

绿豆大。每服五七丸，渐至十五丸，空心盐汤送下。其药末常近火收，或时复养火三五日，功效大也。

【功用】能大补暖，悦色进食，益下元；久服去百疾，强骨髓，补精血，开心智。

【主治】诸般冷疾，及多年冷劳虚惫甚者。

60110 秋石固真丸

《医学入门》卷七。为《万氏家抄方》卷三“秋石四精丸”之异名。见该条。

60111 秋用接骨散

【方源】《医方类聚》卷一八七引《永类钤方》。

【组成】姜黄 蒲黄 骨碎补（炒） 无名异（煅） 生地黄 生姜（自然汁）各一两

【用法】上为末，酒调，外用生癞蛤蟆一个，研如泥敷贴。

【主治】折伤。

60112 秋燥下痢汤

【方源】《医钞类编》卷八引舒弛远方。

【组成】生地 阿胶 姜仁 桔梗 葛白 甘草

【用法】水煎，鸡子黄冲服。

【主治】秋燥下痢。

60113 秋季补肾肾沥汤

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】黄耆三分（锉） 牛膝三分（去苗） 五味子三分 桂心三分 白茯苓半两 白芍药半两 人参半两（去芦头） 五加皮半两 甘草半两（炙微赤，锉） 当归三分（锉，微炒） 磁石二两（捣碎，水淘去赤汁，以帛包之）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，加羊肾一对（切去脂膜），生姜半分，大枣三枚，每与磁石包之，同煎至五分，去滓，食前温服。秋季宜用。

【主治】肾虚。

钟

60114 钟乳丸

【方源】《外台》卷十引《深师方》。

【异名】钟乳人参丸（《鸡峰》卷十一）。

【组成】钟乳 人参 桂心 干姜各八分 附子（炮） 款冬花 细辛各六两 紫菀十分 杏仁四分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服二丸，酒送下，一日三次。不知，稍稍加之。

【主治】咳逆上气，燥嗽冷嗽，昼轻夜甚，喉中水鸡声。

【宜忌】忌猪肉、冷水、生葱、生菜等物。

60115 钟乳丸

【方源】《外台》卷十引《深师方》。

【异名】半夏丸（《普济方》卷一八三）。

【组成】钟乳八分 干姜六分 款冬花 细辛 桑白皮 半夏（洗）各四分 贝母 附子（炮）各五分 蜀椒三分（汗） 芎䓖四分 紫菀八分 杏仁三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如大豆大。每服二丸，一日三次。

【主治】诸咳病，上气胸满，昼夜不得卧，困笃。

【宜忌】忌冷食、猪羊肉、饧、生菜。

60116 钟乳丸

【方源】《外台》卷三十七引曹公方。

【组成】炼成钟乳二十四分 石斛 蛇床子各五分 人参 桂心各四分 干姜三分 椒三分（汗，去目并合口者）

【用法】上以炼白蜜为丸，如梧桐子大。每服二十五丸，空腹以温无灰清酒送下，一日二次。如性嗜饮，宜加饮少许，仍行三数百步，即乳气溜下，任食。若能节量甚佳。

【功用】补益。

60117 钟乳丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】钟乳粉三两 五味子三分 桂心三分 石菖蒲三分 鹿角胶一两（捣碎，炒令黄燥） 白术三分 诃黎勒一两半（煨，用皮） 木香三分 人参一两（去芦头） 天门冬一两半（去心，焙） 白茯苓一两 黄耆一两（锉） 熟干地黄一两 川椒三分（去目及闭口者，微

炒出汗）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心及食前以温酒送下。

【主治】气极。肺脏虚寒，腹胁胀满，呼吸短气，咳逆胸痛，四肢洒淅，皮毛干焦，肌体羸瘦，面无光泽。

【宜忌】忌羊血、鲤鱼。

60118　钟乳丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】钟乳粉二两　肉苁蓉二两（酒浸一宿，去皱皮，炙干）　干漆一两（捣碎，炒令烟出）　甘草半两（炙微赤，锉）　桂心一两　熟干地黄二两　菟丝子二两（酒浸一宿，晒干，别捣）　柏子仁一两　酸枣仁一两（微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹及晚食前以温酒送下。

【功用】令人肥白。

【主治】五劳六极七伤，瘦损虚冷。

60119　钟乳丸

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】钟乳粉三两　石斛一两（去根，锉）　甘草一两（炙微赤，锉）　牛膝一两（去苗）　蛇床子一两　细辛三分　山茱萸三分　熟干地黄二两　桂心三分　菟丝子二两（酒浸一日，晒干，别捣为末）　防风三分（去芦头）　杜仲三分（去粗皮，炙微黄，锉）　枳壳三分（麸炒微黄，去瓤）　五味子一两　川椒半两（去目及闭口者，炒去汗）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】五劳六极七伤，腰疼膝痛，小便余沥，心虚健忘，荣卫不调。

60120　钟乳丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】钟乳粉二两　熟干地黄一两　续断三分　白茯苓三分　黄耆三分（锉）　覆盆子三分　甘草半两（炙微赤，锉）　石斛一两（去根，锉）　五味子三分　桂心三分　肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）　菖蒲三分　人参一两（去芦头）　山茱萸三分　薯蓣一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煮生姜、大枣粥饮送下，不拘时候。

【主治】虚劳上气，肢体羸瘦，不能饮食。

【宜忌】忌生冷、饴糖。

60121　钟乳丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】钟乳粉三两　蛇床子三分　石斛一两（去根，锉）　菟丝子三两（酒浸三日，晒干，别捣为末）　桂心三分　肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】虚劳衰弱，绝阳阴痿，膝冷。

60122　钟乳丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】钟乳粉二两　熟干地黄一两半　人参一两（去芦头）　薯蓣一两　肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）　牛膝一两半　黄耆一两　白茯苓一两　枸杞子一两　巴戟一两　杜仲一两半（去粗皮，炙微黄，锉）　续断一两　天门冬一两半（去心，焙）　石斛一两半（去根，锉）　桂心一两　蛇床子一两　补骨脂一两（微炒）　石龙芮一两　覆盆子一两　防风一两（去芦头）　山茱萸一两　五味子一两　远志一两（去心）　附子一两（炮裂，去皮脐）　鹿茸二两（去毛，涂酥炙微黄）　车前子一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】虚劳乏弱，精少骨痿，腰膝无力，不能饮食，日渐羸困。

60123　钟乳丸

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】炼成钟乳三两　吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干微炒）　石斛一两（去根，锉）　菟丝子三两（酒浸一宿，焙干，别捣为末）　雄蚕蛾五十枚（微炒）　肉苁蓉三两（酒浸一宿，刮

去皱皮，炙干）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心及晚食前以温酒送下。服讫行数百步，更饮温酒三五合。饮讫复行百余步以展药势，及吃干饭豆酱一日。

【功用】安五脏，补肠胃，息万病，下气消食，长肌肤，和中焦。

【主治】丈夫衰老，阳气虚乏，手足常冷，心中少气，髓血虚耗，腰疼脚痹，体烦口干，不能饮食。

【宜忌】不可闻见尸臭等气；勿食粗臭陈恶之物。

60124 钟乳丸

【方源】《圣惠》卷四十。

【组成】钟乳粉一两 金屑半两 银屑半两 真珠半两 珊瑚半两 水精半两（以上并研细，水飞过） 琥珀半两（研细） 密陀僧半两（研细） 白檀香半两 千岁枣半两 乳香一两 零陵香一两 人参一两（去芦头） 木香一分 诃黎勒皮一分 白附子一两 桃仁半两（汤浸去皮尖双仁，麸炒微黄） 胡粉半两黄鹰粪半两 丁香半两 光明砂半两（研细） 牛黄半两（研细） 辛夷一两 杏仁半两（汤浸去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为末，入研药，以冻冷为丸，如弹子大。每夜取一丸，以温水化破服。经一月，面如童子。

【功用】悦颜色，除皯䵟。

【主治】面上百病。

60125 钟乳丸

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】钟乳二两 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒） 石斛一两（去根，锉） 菟丝子一两（酒浸一宿，别捣为末） 附子一两（炮裂，去皮脐） 肉桂一两半（去皴皮）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下，晚食前再服。服讫，行二三百步。

【主治】五种腰痛，肾脏衰冷，行立无力。

60126 钟乳丸

【方源】《圣惠》卷四十四。

【异名】钟乳粉丸（《圣济总录》卷八十九）。

【组成】钟乳粉二两 薯蓣一两 续断一两 桂心一两 肉苁蓉一两（酒浸一宿，刮去皴皮，炙干） 附子一两（炮裂，去皮脐） 牛膝一两（去苗） 萆薢一两（锉） 槟榔一两半 石斛一两（去根，锉） 覆盆子一两 五味子一两 菟丝子二两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 山茱萸一两 蛇床子一两 狗脊二两 杜仲二两（去粗皮，炙微黄，锉） 巴戟一两 熟干地黄一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹以温酒送下，晚食前再服。

【主治】①《圣惠》：肾脏虚惫，风冷所侵，致腰间久痛，行立不得。②《圣济总录》：虚劳少气，羸瘦无力。

60127 钟乳丸

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】钟乳粉三两 泽兰二两 防风一两（去芦头） 人参一两（去芦头） 柏子仁二两（微炒） 石膏一两半（研细，水飞过） 芎䓖一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 续断一两 白芷一两 牛膝一两（去苗） 当归一两半（锉碎，微炒） 木香一两 干姜一两（炮裂，锉） 藁本一两 细辛一两 桂心一两 艾叶三分（微炒） 麦门冬一两半（去心，焙） 白芜荑一两 熟干地黄一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】妇人风虚劳冷，羸瘦，四肢烦疼，脐下时痛，不能饮食，面目黄黑，忧恚不乐。

60128 钟乳丸

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】钟乳粉一分 防风一分（去芦头） 熟干地黄二分 牛黄一分（研细） 甘草一分（炙微赤，锉） 漆花一分

【用法】上为末，入研了药，更研令匀，以犬脑髓为丸，如麻子大。每服三丸，以粥饮送下，

早晨、午间、日晚各一服。

【主治】小儿解颅囟大，身有痼热，头汗出，腹胀，咳嗽，上气肩息，胫蹇足交，三岁不行。

60129 **钟乳丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】钟乳粉三分 巴戟二两 牛膝二两（去苗） 甘菊花二两 石斛二两（去根，锉） 续断二两 防风二两（去芦头） 枸杞子二两 羌活二两 桂心二两 覆盆子二两 云母粉二两 熟干地黄三两 磁石三两（烧，醋淬七遍，捣碎研细，水飞过）

【用法】上为末，入钟乳、磁石、云母粉等，研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下。

【功用】补益脏腑，悦泽颜色，聪耳明目，轻身益力。

60130 **钟乳丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】钟乳粉三两 鹿茸二两（去毛，涂酥炙令微黄） 附子二两（炮裂，去皮脐） 石斛二两（去根，锉） 蛇床子二两 菟丝子二两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 桂心二两 干漆二两（捣碎，炒令烟出）

【用法】上为末，入钟乳粉研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下。

【主治】水脏虚冷，五劳七伤，腰脚疼痛无力，面色萎黄，肌肤消瘦。

60131 **钟乳丸**

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】钟乳粉三两 吴茱萸二两（汤浸七遍，焙干微炒） 石斛二两（去根，锉） 菟丝子二两（酒浸三日，晒干，别捣为末） 附子二两（炮裂，去皮脐） 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙干）

【用法】上为末，入钟乳粉，同研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒送下。

【功用】补暖虚冷，充益肌肤，安利五脏，强壮腰脚，通利血脉，悦泽颜色。

60132 **钟乳丸**

【方源】《圣济总录》卷四十八。

【组成】钟乳（研）一两一分 五味子一两半 白石英（研） 款冬花（去心，焙） 麦门冬（去心，焙） 干姜（炮） 桂（去粗皮） 桑根白皮（锉，炒）各二两

【用法】上将六味为末，与钟乳、白石英同研令匀，以枣肉研膏为丸，如梧桐子大。每服十五丸，粥饮送下，一日三次，不拘时候。

【主治】肺虚失声，胸中痛，上气息鸣。

60133 **钟乳丸**

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】生钟乳五两（取长半寸以上，明净有光润者用之，研细如粉） 黄蜡三两（锉）

【用法】上先取黄蜡盛子细瓷器，用慢火化开，投入钟乳粉末，搅和令匀，取出用物封盖定，于饭甑内蒸熟，研如膏，旋丸如梧桐子大。每服一两丸，温水下。

【主治】肺虚壅，喘急，连绵不绝。

60134 **钟乳丸**

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】钟乳粉 沉香（锉） 桑螵蛸（炙） 龙骨（煅）各半两 白茯苓（去黑皮）一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前温酒送下。

【主治】膀胱虚冷，小便利多，少腹冷痛，脚筋拘急。

60135 **钟乳丸**

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】炼成钟乳粉 续断 熟干地黄（焙） 石韦（去毛）各一两 杜仲（去粗皮，锉，炒）三两三分 天雄（炮裂，去皮脐）半两 山茱萸 蛇床子各一两 远志（去心）一两三分 肉苁蓉（酒浸，切，焙）一两三分 防风（去叉） 山芋 石斛（去根） 赤石脂各一两三分 甘草（炙，锉） 牛膝（酒浸，切，焙）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每

服三十丸，温酒送下。

【主治】消渴后虚乏。

【备考】方中远志用量原缺，据《普济方》补。

60136 钟乳丸

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】钟乳（研一复时） 白矾（烧令汁尽）各一两 阿胶（炙令燥） 紫石英（研细） 蜀椒（去目及闭口者，炒出汗） 生干地黄（焙） 五味子（炒） 蛇床子（炒） 原蚕蛾（炒） 石亭脂（研极细）各半两

【用法】上除石药别研外，余药为末，同和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，空心暖酒送下。

【主治】妇人断绪无子。

60137 钟乳丸

【方源】《全生指迷方》卷四。

【组成】钟乳（银石器内煮一伏时，研一伏时）一两 紫菀（去苗及枯燥者）半两 桑白皮一分（锉，微炒） 款冬花 黄耆各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸、食前粥饮送下。

【主治】肺咳恶寒，脉微弱者。

60138 钟乳丸

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】钟乳粉三两 人参 白术 干姜 甘草各二两 紫菀 款冬各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，含化。

【主治】肺虚寒，嗽不已。

60139 钟乳丸

【方源】《鸡峰》卷十三。

【异名】小钟乳丸（《普济方》卷一二〇引《十便良方》）。

【组成】钟乳粉半钱 硫黄末三钱 干山药一钱

【用法】上为细末，用枣肉为丸，如梧桐子大。每服七八丸至十丸，空心米饮或酒送下。

【主治】虚冷。

60140 钟乳丸

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】钟乳粉 赤石脂 石斛 肉豆蔻 干姜 附子 当归 人参 白茯苓 龙骨 川椒各一两 桂 诃子皮各二两 神曲末半两

【用法】上为细末，酒煮曲末为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心米饮送下。

【主治】虚劳泄痢，肠胃虚冷，饮食不消，腹内雷鸣，疞刺疼痛。

60141 钟乳丸

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】团参 细辛 干姜 当归 附子各半两 钟乳粉一两 吴茱萸一分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一二十丸，空心温酒送下。

【主治】脾胃受寒，中焦停饮，咳嗽喘满，冲气奔急，背冷面浮，呕吐白沫，呀呷有声，乘秋风冷，多作喘急而咳。

60142 钟乳丸

【方源】《得效》卷五。

【组成】滑石半两 钟乳粉（见成者）一两 南星（炮，切片，生姜制）

【用法】上为末，煮干柿（去蒂核，捣细）为丸，如梧桐子大。每服四十丸，加生姜、大枣煎汤送下。气弱人更服养正丹。

【主治】远年近日喘嗽，痰涎稠粘，昼夜不止，不得坐卧。

【备考】方中南星用量原缺。

60143 钟乳丸

【方源】《普济方》卷一六〇。

【组成】钟乳粉一两 桂心（去心皮） 紫菀（择紫润者） 款冬花 黄耆各半两（炒） 桑白皮三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前米饮送下。

【主治】脾咳恶寒。

60144 钟乳丸

【方源】《张氏医通》卷十三。

【组成】滴乳石(酒湿研七日,水飞七次,甘草汤煮三伏时,蘸少许捻开,光亮如蠹鱼为度)　麻黄(醋汤泡,焙干)　杏仁(拣去双仁,泡,去皮尖)　甘草(炙)各等分

【用法】上为末,炼白蜜为丸,如弹子大。五更、临卧各噙化一丸。去枕仰卧,勿开言。数日效。

【主治】冷哮痰喘。

【备考】有血者勿服。

60145　钟乳丹

《鸡峰》卷十一。为《圣惠》卷六"补肺钟乳丸"之异名。见该条。

60146　钟乳汤

【方源】《千金》卷二。

【异名】石钟乳汤(《圣济总录》文瑞楼本卷一六六)。

【组成】石钟乳　白石脂各六铢　通草十二铢　桔梗半两(切)　消石六铢(一方用滑石)

【用法】上㕮咀。以水五升,煮三沸,三上三下,去滓,纳消石令烊,分服。

【主治】妇人乳无汁。

60147　钟乳汤

【方源】方出《千金》卷二,名见《张氏医通》卷十五。

【组成】石钟乳四两　甘草二两　漏芦三两　通草五两　栝楼根五两(一云用栝楼实一枚)

【用法】上㕮咀。以水一斗,煮取三升,分三次服。

【主治】①《千金》:妇人乳无汁。②《张氏医通》:妇人肺胃虚寒,乳汁不通。

60148　钟乳汤

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】钟乳五两

【用法】上为细末,两重帛练袋盛,纳五升清酒中,用白瓷瓶盛,密封,安汤中,煎令二分,减二分即出汤,还添酒满原数,更封好。七日后,每服暖饮三合,一日一次。

【功用】安五脏,通百节,利九窍,益精明目,补下焦伤竭,脚弱疼痛;久服延年益寿,肥健悦泽,不老。

【主治】风虚气上。

【备考】本方方名,《普济方》引作"钟乳酒"。

60149　钟乳汤

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】钟乳粉　白石英(研)　麻黄(去根节)　五味子(炒)　桂(去粗皮)　赤茯苓(去黑皮)　紫苏子　杏仁(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)　人参各一两　麦门冬(去心,焙)　款冬花各半两

【用法】上先以十味为粗末,次入钟乳粉,再研匀。每服三钱匕,以水一盏,加生姜半分(切),大枣三枚(劈破),同煎至七分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】风冷搏肺,气塞不通,声嘶不出。

60150　钟乳汤

【方源】《普济方》卷一五九引《余居士选奇方》

【组成】钟乳粉　半夏　天南星(炮)各一两　滑石三钱(别研)

【用法】上将半夏、南星为细末,和钟乳粉、滑石令匀。每服三钱,加生姜十片,水二盏,煎至八分,食前温服。如禀受虚弱人,以此药下黑锡丹五十丸,或四神丸二十丸,无不效者。

【主治】虚冷咳嗽痰盛

60151　钟乳饮

《胎产秘书》卷下。为《局方》卷九(续添诸局经验秘方)"成炼钟乳散"之异名。见该条。

60152　钟乳酒

【方源】《千金》卷七。

【组成】钟乳八两　丹参六两　石斛　杜仲　天门冬各五两　牛膝　防风　黄耆　芎䓖　当归各四两　附子　桂心　秦艽　干姜各三两　山茱萸　薏苡仁各一升

【用法】上㕮咀,以清酒三斗,渍之三日。初服三合,每日二次。后稍加之,以知为度。

【主治】风虚劳损，脚疼冷痹，羸瘦挛弱，不能行。

60153 钟乳酒

【方源】《千金》卷七。

【组成】钟乳五两 附子 甘菊各二两 石斛 苁蓉各五两

【用法】上㕮咀，以清酒三斗渍。每服二合，一日二次。稍增至一升。

【功用】补虚损，通顺血脉，极补下元。

60154 钟乳酒

【方源】《外台》卷十七引《广济方》。

【组成】钟乳三两（研，绢袋盛） 附子二两（炮） 甘草二两（炙） 当归二两 石斛二两 前胡二两 薯蓣三两 五味子三两 人参二两 生姜屑二两 牡蛎二两（熬） 桂心一两 菟丝子五合 枳实二两 干地黄五两

【用法】上切，以绢袋盛，清酒二斗渍之。春、夏三日，秋、冬七日，量性饮之。效。

【主治】阴痿不起，滴沥精清。

【宜忌】忌食海藻、菘菜、猪肉、冷水、生葱、芜荑、生冷粘食等。

60155 钟乳酒

《普济方》卷二六〇。即《圣惠》卷三十八"钟乳汤"。见该条。

60156 钟乳粉

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】石钟乳一斤

【用法】煅成粉，再入石鼎内煮三炷香，为极细末。每服三钱，煎粟米汤送下。一切虚证，先于脐下灸三百壮，后服此药更效。

【主治】劳咳咯血，老人上气不得卧，或膈气腹胀，久咳不止，及喉风喉肿，两目昏障，童男女骨蒸劳热，小儿惊风，胎前产后发昏不省人事。

60157 钟乳散

【方源】《外台》卷十七引《经心录》。

【组成】钟乳粉五分 附子五分（炮） 白术十四分 防风十分 牡蛎十分（熬）栝楼十分 干姜五分 桔梗五分 茯苓五分 细辛五分 桂心五分 人参五分

【用法】上为散。每服方寸匕，渐加至二匕，酒送下，一日两次。五十以上可数服，得力乃止。

【功用】令人丁壮能食，去风冷。

【主治】阳虚气衰，畏寒气短，腹胀喘急，皮毛焦枯。

①《外台》引《经心录》：伤损虚乏少气，虚劳百病。②《千金》：气极虚寒，阴畏阳气，昼差暮甚，气短息塞。③《三因》：气虚极，皮毛焦，津液不通，力乏，腹胀，甚则喘急，气短息塞。

【宜忌】忌食生菜、生葱、猪肉、冷水、桃、李、雀肉、大酢。

60158 钟乳散

【方源】《外台》卷十七引《延年秘录》。

【组成】钟乳粉二分 防风一分 人参一分 细辛半分 桂心二铢 干姜一铢（一方钟乳粉半两）

【用法】上为散。分作三帖，每日一帖，食前温酒送下，每日一次。

【功用】补虚劳，益气力，消食，强腰脚。

【宜忌】进食不用过饱，亦不得饥。常饮酒令体中熏熏。若热烦，以冷水洗手面即定。不用热食，亦不得大冷。忌生葱、生菜。

60159 钟乳散

【方源】《千金》卷十九。

【组成】钟乳六两（无问粗细，以白净无赤黄黑者为上，铜铛中可盛三两斗，并取粟粗糠二合许，纳铛中煮五六沸，乃纳乳煮水，欲减添之如故，一晬时出，以暖水净淘之，晒干，玉锤研，不作声止，重密绢水下，澄取之用） 铁精一两 鹿角一两（白者） 蛇床子三两 人参 磁石 桂心 僵蚕 白马茎（别研） 硫黄（别研） 石斛各一两

【用法】上为末，以枣膏为丸，如梧桐子大。每服三十丸，酒送下，一日二次。

【主治】五劳七伤，虚羸无气力，伤极。

【宜忌】忌房事及生冷、酢滑、鸡、猪、鱼、陈败之物。

【备考】本方方名，据剂型，当作"钟乳丸"。

60160 **钟乳散**

【方源】《千金》卷二十七。

【组成】成炼钟乳粉三两　上党人参　石斛　干姜各三分

【用法】上为末，合和相得，均分作九帖，平旦空腹温淳酒服一帖，日午后服一帖，黄昏后服一帖。三日后准此服之。凡服此药法，皆三日一剂。三日内只食一升半饭、一升肉，肉及饭惟烂，不得服葱、豉。三日服药既尽，三日内须作羹食补之，任意所便，仍不用葱豉及硬食也。三日服讫，还须准式服药如前，尽此一斤乳讫，其气力当自知耳，不能具述。一得此法，后服十斤二十斤，任意方便可知也。

【主治】虚羸不足。六十以上人，瘦弱不能食者。

【备考】问曰：何故三日少食，勿得饱也？答曰：三夜乳在腹中，熏补脏腑，若此饱食即推药出腹，所以不得饱食也。何故不得生食？由食生故即损伤药力，药力既损，脂肪亦伤，所以不得食生食也。何故不得食葱、豉？葱、豉杀药，故不得食也。本方方名，《外台》引作"炼钟乳散"。

60161 **钟乳散**

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】钟乳粉一两　紫石英一两(研细，水飞过)　白石英一两(研细，水飞过)　白术　防风(去芦头)　桂心　栝楼根　干姜(炮裂，锉)　细辛　杜蛎粉　川椒(去目及闭口者，微炒去汗)各三分　人参一两(去芦头)　白茯苓一两　桔梗半两(去芦头)　附子一两(炮裂，去皮脐)

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服二钱，食前以温酒调下。

【主治】风劳。脏气虚损，肌体羸瘦，头目昏闷，四肢少力，神思不安。

60162 **钟乳散**

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】钟乳粉二两　黄耆一两(锉)　桂心一两　干姜三分(炮裂，锉)　肉苁蓉一两(酒浸一宿，刮去皱皮，炙令干)　白术一两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以温酒调下。

【功用】益气力，思饮食。

【主治】虚劳不足。

60163 **钟乳散**

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】炼成钟乳三两　人参二两(去芦头)　熟干地黄一两　黄耆二两(锉)　甘草一两(炙微赤，锉)　杜仲一两(去粗皮，炙令黄，锉)　白茯苓一两　薯蓣二两　麦门冬三两(去心，焙)　石斛二两(去根，锉)　肉苁蓉一两(酒浸一宿，刮去皱皮，炙令干)

【用法】上为细散，入钟乳研令匀。每服二钱，空心及晚食前以温酒调下。

【主治】诸虚不足，羸弱，不能起止。

60164 **钟乳散**

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】钟乳粉一两　防风半两(去芦头)　丹参半两　细辛半两　桂心半两　干姜一分(炮裂，锉)

【用法】上为细散。每于食前以温酒送下二钱。

【主治】五种腰痛。风冷气攻肾脏，致腰痛，转动不得。

60165 **钟乳散**

《圣惠》卷四十六。为《外台》卷九引《古今录验》"四味石钟乳散"之异名。见该条。

60166 **钟乳散**

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】钟乳(研)　海蛤　丹砂(研)　浮石　白石英(研)　真珠(研末)　麝香(研)　珊瑚(研)各一分

【用法】上为细散，再研令匀。用柳枝咬头令软，点药揩齿甚妙。

【功用】令牙齿鲜明润泽。

【主治】牙齿黑黄。

60167 **钟乳散**

【方源】《朱氏集验方》卷五。

【组成】钟乳粉 人参 阿胶（炒）各等分

【用法】上为末。糯米饮送下。

【主治】寒嗽不止。

60168 **钟乳散**

《济阴纲目》卷十四。为《局方》卷九（续添诸局经验秘方）"成炼钟乳散"之异名。见该条。

60169 **钟乳粥**

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】钟乳粉

【用法】上以粥调半两，乘热服之，每日二次。其效如神。

【主治】久泻，诸药不效者。

60170 **钟乳煎**

【方源】《赤水玄珠》卷十。

【组成】钟乳粉三两

【用法】以夹绢袋盛之，牛乳一大碗，煎减三分之一，取乳饮之，一日一服；次日用酒将袋淋净，再入牛乳，照前煎服。一袋可煎三十度，则力尽，再换。其用过者，和面喂乌骨鸡，使其生蛋，食之有益。

【功用】久服延年益寿，全神驻颜。

【主治】丈夫衰老阳绝，肢冷气乏，减食，腰痛脚痹。

60171 **钟乳石丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】成炼钟乳粉半两 硫黄半两（别研） 白矾（火飞）一分 阳起石一分（别研）

【用法】上为细末，煮面糊为丸，如小豆大。每服十丸，空心、食前粟米饮送下。

【主治】脏寒腹痛，下利不禁。

60172 **钟乳粉丸**

《圣济总录》卷八十九。为《圣惠》卷四十四"钟乳丸"之异名。见该条。

60173 **钟乳粉散**

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】玉女粉二钱半（系益母草） 白附子二钱 白及二钱半 白蔹二钱 轻粉半钱 钟乳粉二钱 密陀僧一钱半 细辛末半钱

【用法】上为细散。用孩儿母乳汁调，涂患处，或温水调亦得，临卧用，次日用温水洗去。

【主治】皯黯，黯子。

60174 **钟乳粉散**

《普济方》卷三四六。即《局方》卷九"成炼钟乳散。见该条。

60175 **钟乳粉散**

【方源】《外科发挥》卷四。

【组成】钟乳粉（煅炼熟） 桑白皮（蜜炙） 紫苏 麦门冬（去心）各五分

【用法】上作一剂。以水一钟，加生姜三片，大枣一枚，煎六分，食后服。

【主治】肺气虚，久嗽，皮毛枯槁，唾血腥臭，或喘之不已。

60176 **钟乳七星散**

《千金》卷十八。为《外台》卷九引《古今录验》"四味石钟乳散"之异名。见该条。

60177 **钟乳人参丸**

《鸡峰》卷十一。为《外台》卷十引《深师方》"钟乳丸"之异名。见该条。

60178 **钟乳云母散**

【方源】《医心方》卷五引葛氏方。

【组成】钟乳四分 茯苓四分 远志四分 细辛四分 云母四分

【用法】上为散。每服半钱匕，稍增至一钱。

【主治】目失明，三十年不识人。

60179 **钟乳生附汤**

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】钟乳粉 附子（生，去皮脐）各半两 天南星一两

【用法】上为细末。每服二钱，加生姜一两（作十片），煎至七分，去滓服，不拘时候。

【主治】肺虚寒，咳嗽痰壅。

60180 **钟乳白泽丸**

【方源】《局方》卷五（续添诸局经验秘方）。

【组成】白檀香（取末） 滴乳香（别研）各一两 阳起石（煅令通红，研） 附子（炮，去皮脐）各一两半 钟乳粉二两 麝香（别研）一钱

【用法】上和匀,滴水搜成剂,分作六十丸。每服一丸,以水一盏,煎至七分盏,空心热服。如急病,不拘时候。

【功用】久服补益精血,助阳消阴,安心神,定魂魄,延年增寿。

【主治】一切虚劳之疾。丈夫诸虚损,五劳七伤,真气不足,元脏不固,神志俱耗,筋力顿衰,头目眩晕,耳内虚鸣,心腹急痛,气逆呕吐,痰嗽喘促,胸膈胀闷,脾泄下痢,遗精便浊,厥冷自汗,脉微欲绝;妇人血海虚冷,崩漏不止,赤白带下,经候不调,脐腹时痛,面无颜色,饮食不进。

60181　钟乳补肺汤

【方源】《局方》卷四。

【异名】补肺汤(《三因》卷八)。

【组成】钟乳(碎如米粒)　桑白皮　麦门冬(去心)各三两　白石英(碎如米粒)　人参(去芦)　五味子(拣)　款冬花(去梗)　肉桂(去粗皮)　紫菀(洗去土)各二两

【用法】上除白石英、钟乳外,同为粗末,与白石英等同拌令匀。每服四钱,以水二盏,加生姜五片,大枣一枚(擘破),粳米三十余粒,同煎至一盏,用绵滤去滓,食后温服。

【主治】肺气不足,咳嗽上气,胸满上迫,喉咽闭塞,短气喘乏,连唾不已,寒从背起,口中如含霜雪,语无音声,甚者唾血腥臭,干呕心烦,耳闻风雨声,皮毛瘁,面色白。

60182　钟乳泽兰丸

【方源】《千金》卷四。

【组成】钟乳三两　泽兰三两六铢　防风四十二铢　人参　柏子仁　麦门冬　干地黄　石膏　石斛各一两半　芎䓖　甘草　白芷　牛膝　山茱萸　薯蓣　当归　藁本各三十铢　细辛　桂心各一两　芜荑半两　艾叶十八铢

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,加至四十丸,酒送下,一日二次。

【功用】《局方》:补虚损,益血气;久服补暖元脏,润泽肌肤,长发去鼾,除头风,令人有子。

【主治】①《千金》:妇人久虚羸瘦,四肢百体烦疼,脐下结冷,不能食,面目瘀黑,忧恚不乐。②《局方》:冲任虚损,月水不调,脐腹疞痛,腰腿沉重,四肢倦怠,百节痠痛,心忪恍惚,面少光泽,饮食无味;下脏风冷,带下三十六疾,崩中漏下五色,子宫久冷无子,及数堕胎,或因产劳损,冲任血气虚羸,肌瘦嗜卧。

60183　钟乳泽兰煎

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】钟乳粉二两　泽兰叶二两二钱半　防风一两三钱　人参　柏子仁　麦门冬　熟干地黄　石膏　石斛　芎　甘草　牛膝　山茱萸　干山药　当归　白芷各一两半

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前温酒送下。

【功用】补虚损。

60184　钟乳养肺丸

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】钟乳粉二两　人参(去芦头)　紫菀(去土,洗焙)　黄耆(蜜炙)　款冬花各半两　桑白皮一分(锉)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后米饮送下。

【主治】肺脏虚损,咳嗽不已,渐至羸瘦。

60185　钟乳姜蓣汤

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】苁蓉　钟乳　蛇床子　远志　续断　薯蓣　鹿茸各三两

【用法】上为细末。每服方寸匕,酒送下,一日一次,倍蛇床子、远志、鹿茸、钟乳尤效。

【主治】阴痿,精薄而冷。

【备考】本方方名,据方中用药,当作"钟乳薯蓣汤"。

60186　钟乳健脾丸

【方源】《局方》卷六。

【组成】肉桂(去粗皮)　人参　黄连(去须)　干姜(炮)　龙骨　当归(去芦)　石斛(去根)　大麦蘖(炒)　茯苓(去皮)　细辛

（去苗土） 神曲（碎，炒） 赤石脂（煅）各二两 蜀椒（去目及闭口者，微炒出汗）六两 附子（炮，去皮脐）一两 钟乳粉三两

【用法】上为细末，入钟乳粉炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温米饮送下，一日三次。

【主治】男子、妇人虚损羸瘦，身体沉重，脾胃冷弱，饮食不消，腹胀雷鸣，泄泻不止；又治肠虚积冷，下利清谷，或下纯白，腹中疠痛，及久痢赤白，肠滑不禁，少气羸困，不思饮食。

60187 **钟乳健脾散**

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】成炼钟乳粉 人参（去芦）各二两 肉豆蔻（面裹，煨） 诃子（煨，去核） 高良姜（炒） 厚朴（去粗皮，姜制，炒） 白茯苓（去皮） 甘草（炙） 陈皮（去白） 神曲（炒） 草果仁 麦糵（炒）各一两 干姜一两半（炮，洗）

【用法】上为细末。每服二钱。以水一盏，加生姜三片，大枣一枚，盐一捻，同煎至七分。通口服，不拘时候。

【主治】一切冷气，脾胃久虚，胸膈痞塞，中脘气滞，腹胀虚鸣，上气喘急，心腹绕痛，宿食不化，留饮停积，痰逆呕吐，嗳气不通，不进饮食，面黄肌瘦，四肢怠堕。膈气噎塞，霍乱吐泻。

60188 **钟乳浸酒方**

【方源】《圣惠》卷二十七。

【组成】钟乳粉三两 石斛二两（去根，锉） 牛膝二两（去苗） 黄耆二两（锉） 防风二两（去芦头） 熟干地黄五两

【用法】上锉细，以生绢袋盛，以酒二斗浸三日后，每于食前温饮一小盏。

【功用】补养五脏，疗风气，坚筋骨，益精髓。

【主治】虚劳不足。

60189 **钟乳益黄丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【异名】钟乳益黄丹（《普济方》卷三九六）。

【组成】定粉 黄丹各半两 巴豆七粒（去壳，同定粉、虢丹三味研匀，水和作一块，阴干，置瓦上，熟炭火煅红，出火毒三宿，研细） 钟乳粉（炼者） 丁香 石榴皮（炒焦） 益智子仁各半两 人参（去芦头） 朱砂（别研）各二钱半 木香七钱半 白豆蔻仁七钱 诃子（煨去核）七钱 黄连四钱 乌梅十枚（取肉，炒）

【用法】上为细末，煮面糊为丸，如黍米大。每服十五丸，加至二十丸，空心、乳食前煎木瓜、陈橘皮汤送下。

【主治】小儿久利不止，及挟积作泻，疳气腹胀，全不思食。

60190 **钟乳益黄丹**

《普济方》卷三九六。为《杨氏家藏方》卷十八“钟乳益黄丸”之异名。见该条。

60191 **钟乳黄耆汤**

【方源】方出《千金》卷十七，名见《普济方》卷二十六。

【组成】黄耆五两 甘草 钟乳 人参各二两 桂心 干地黄 茯苓 白石英 厚朴 桑白皮 干姜 紫菀 橘皮 当归 五味子 远志 麦门冬各三两 大枣二十枚

【用法】上㕮咀，以水一斗四升，煮取四升，分五服，日三次，夜二次。

【主治】肺气不足，逆满上气，咽中闷塞短气，寒从背起，口中如含霜雪，言语失音，甚者吐血。

60192 **钟乳震灵丹**

【方源】《直指小儿》卷四。

【组成】震灵丹三丸（为末） 钟乳粉半钱 破故纸（炒）一钱半 生肉豆蔻一钱 大枣二枚

【用法】煎取清汁，乘热调，空心灌下。

【主治】小儿肾泄。面黧黑，齿消脱，骨力弱，小腹痛，泄多白脓。

60193 **钟乳白石英丸**

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】钟乳粉 白石英粉 鹿角胶 五

味子 山药 麦门冬 黄耆 干姜 熟地黄 人参 桂各一两 甘草半两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心米饮或酒送下。

【主治】肺虚咳嗽,背寒,食少泄泻。

钩

60194 钩虫丸

【方源】《治法与方剂》引陈彰维方。

【组成】栀子 黄柏 甘松 白矾 甘草各10克 茵陈30克 茅苍术 青矾(煅)各20克

【用法】上为细末,红糖为丸。早、晚各服一次,七日服完。重症患者,可连服4~5剂。

【功用】清热燥湿,利胆杀虫。

【主治】钩虫病。心悸气短,肢体面色萎黄或黄肿,或喜吃生米、泥土等物。亦治湿热型慢性胆囊炎。

60195 钩肠丸

《疡科选粹》卷五。为《局方》卷八"钓肠丸"之异名。见该条。

60196 钩苓散

《普济方》卷二七五。即《外科精义》卷下引陈宫宝方"钓苓散"。见该条。

60197 钩蝎煎

【方源】《医级》卷七。

【组成】柴胡 薄荷 钩藤 全蝎 当归 芍药 广皮 甘草 木通 黄芩

【主治】时感风热,头痛,筋掣,胁痛,溺赤,烦渴。

60198 钩藤丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】钩藤半两 天竹黄一分(研细) 牛黄一分(研细) 胡黄连半两 天麻一分 白附子一分(炮裂) 干蝎一分(微炒) 朱砂一分(研细) 米粉一分 麝香半分(研细)

【用法】上为末,用槐胶为丸,如绿豆大。于囟门上津调摩一丸,荆芥汤送下一丸。二岁以上加之。

【主治】小儿天钓,身体壮热,筋脉拘急,时时抽掣。

60199 钩藤丸

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】钩藤 铅丹(研) 茵芋叶 石膏(研) 杜蘅 防葵(炙) 秦艽(去土) 甘草(炙)各一两 菖蒲(九节者,去节,焙) 黄芩(去黑心)各一两半 松萝(炒) 蜣螂(去翅足,炒)各半两

【用法】上将十味为末,与别研二味和匀,炼蜜为丸,如小豆大。每于食后良久服,五岁以下五丸,十岁以下七丸至十丸,十五岁以上及长年并十五丸,金银汤送下。

【主治】小儿风痫,至大不除,发即百脉挛缩,行步不正,口面㖞戾,言语无度。

60200 钩藤丸

《普济方》卷三七七。为《御药院方》卷十一"钓藤丸"之异名。见该条。

60201 钩藤丸

【方源】《育婴秘诀》卷二。

【组成】钩藤 白茯苓各五分 天麻 防风 朱砂(水飞) 蝉退 羌活 独活 青皮 炙甘草各二分半

【用法】上除朱砂另研外,余药为末,水煎,调朱砂末服。

【主治】小儿惊风内钓。

【备考】本方方名,据剂型,当作"钩藤散"。

60202 钩藤丸

《幼科折衷》卷下。为《活幼心书》卷下"钩藤膏"之异名。见该条。

60203 钩藤汤

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】钩藤 桑根白皮(锉) 马牙消各一两 栀子仁 甘草(炙)各三分 大黄(锉,炒) 黄芩(去黑心)各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加竹叶三七片,煎至六分,去滓,下生地黄汁一合,搅匀,食后温服。

【主治】伤寒头痛壮热,鼻衄不止。

【备考】本方方名，《普济方》引作“钩藤散”。

60204 **钩藤汤**

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【异名】钩藤饮（《普济方》卷二三七）。

【组成】钩藤 黄芩（去黑心） 升麻 甘草（炙令赤色，锉）各一两 鳖甲（去裙襕，醋浸，炙令黄色） 丁香各半两 大黄（锉，微炒）四两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，用水一盏半，煎至一盏，去滓，每日食后分温二服。相去如人行七八里再服之。

【主治】传尸劳瘦，骨蒸、伏连、殗殜，命在须臾，精神尚爽。

60205 **钩藤汤**

《圣济总录》卷一五五。为方出《经效产宝》卷上，名见《圣惠》卷七十七“钩藤散”之异名。见该条。

60206 **钩藤汤**

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】钩藤一两 使君子（去皮） 干蝎（炒） 人参 子芩 川大黄（锉碎，微炒） 犀角屑各一分 蚱蝉三枚（微炙） 甘草半两（炙微赤，锉） 川升麻半两 石膏半两

【用法】上为粗末。每服一钱匕，以水一小盏，煎至五分，去滓，加竹沥半合，牛黄末一字服之。

【主治】小儿风热，惊痫潮热。

60207 **钩藤汤**

《普济方》卷三七二。为《外台》卷三十五引《必效方》“钓藤汤”之异名。见该条。

60208 **钩藤汤**

《普济方》卷三七六。为《圣济总录》卷一七一“甘草汤”之异名。见该条。

60209 **钩藤汤**

《普济方》卷三七七。为《外台》卷三十五引《古今录验》“钩藤汤”之异名。见该条。

60210 **钩藤汤**

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【异名】钓藤汤（《准绳·幼科》卷六）。

【组成】钩藤 红花 木香 川芎 当归 白芍 甘草 白术 青皮 黄连 官桂 生姜各等分

【用法】水煎服，不拘时候。

【主治】痘后口噤僵直，绕脐腹痛。

60211 **钩藤汤**

【方源】《痘疹仁端录》卷六。

【组成】荆芥 牛蒡 紫草 川芎 白术 白芍 当归 人参 官桂 钩藤 甘草 木香 青皮 黄连

【用法】水煎服。

【主治】痘症腹痛、口噤，冷汗僵直。

60212 **钩藤汤**

【方源】《诚书》卷八。

【组成】橘红 钩藤 胆星 天麻 僵蚕 人参 远志 石菖蒲 犀角

【用法】加灯心，水煎，临服加牛黄、真珠末。

【主治】小儿诸痫痉痓。

60213 **钩藤汤**

【方源】《何氏济生论》卷七。

【组成】钩藤钩 当归 茯神 人参各一钱 苦梗一钱五分 桑寄生一钱

【用法】水煎服。

【主治】妊娠胎动，面青冷汗，气欲绝者。

【加减】烦热，加石膏。

60214 **钩藤汤**

《嵩崖尊生》卷十五。为《闫氏小儿方论》“钩藤膏”之异名。见该条。

60215 **钩藤汤**

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】钩藤 茯神 当归 川芎 木香 甘草

【用法】加生姜、大枣，煎服。

【主治】小儿夜啼。

60216 **钩藤汤**

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】钩藤 枳壳 延胡各五分 甘草

三分

【用法】水半钟，煎二分服。

【主治】小儿盘肠内钓，啼哭，两手足上撒，或弯身如虾者。

60217　**钩藤饮**

《旅舍备要方》。为《永乐大典》卷九八〇引《养生必用》"钓藤饮子"之异名。见该条。

60218　**钩藤饮**

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】钩藤　升麻　甘草(炙)　人参各半两

【用法】上为粗末。每服一钱匕，以水一盏，煎至五分，去滓，分温二服，空心、午后各一服。

【主治】小儿壮热不安。

60219　**钩藤饮**

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【组成】钩藤三分　蚱蝉(去头足翅，炙)二枚，犀角屑(微炒)　麦门冬(去心，焙)　升麻各半两　石膏(捣碎)三分　柴胡(去苗)半两　甘草(微炙)一分

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一小盏，煎至六分，去滓，下竹沥半合，重煎三五沸，分温三服。空心、午后、夜卧各一次。

【主治】小儿惊热，睡眠不稳。

60220　**钩藤饮**

《圣济总录》卷一七一(文瑞楼本)。即原书人卫本"钓藤饮"。见该条。

60221　**钩藤饮**

《圣济总录》卷一七二(文瑞楼本)。即原书人卫本"钓藤饮"。见该条。

60222　**钩藤饮**

《普济方》卷三七一引《全婴方》。为《小儿药证直诀》卷下"钩藤饮子"之异名。见该条。

60223　**钩藤饮**

【方源】《直指小儿》卷二。

【异名】钩藤散(《普济方》卷三七二)。

【组成】钩藤　白茯苓各半两　大黄(湿纸裹煨)二钱半　防风　朱砂　蝉壳　羌活　独活　青皮　甘草(炙)各二钱半

【用法】上为粗末，每服一钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】小儿天钓。

60224　**钩藤饮**

《普济方》卷二三七。为《圣济总录》卷九十三"钩藤汤"之异名。见该条。

60225　**钩藤饮**

《普济方》卷三七三。即《得效》卷十一"钓藤饮"。见该条。

60226　**钩藤饮**

《普济方》卷三七七。为原书卷一〇〇"钩藤皮汤"之异名。见该条。

60227　**钩藤饮**

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】全蝎(炙)　蝉蜕　僵蚕(炒)　明天麻　犀角　胆星　青黛　辰砂各八分

【用法】上为末，猪胆汁为丸，如绿豆大。井花水调一丸，入鼻令嚏，次以钩藤汤调六丸服。

【主治】小儿天钓，壮热惊怖，眼目反张，手足抽掣。

【备考】本方方名，据剂型，当作"钩藤丸"。

60228　**钩藤饮**

《保婴撮要》卷下。为《婴童百问》卷三"钓藤饮"之异名。见该条。

60229　**钩藤饮**

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】钩藤　陈皮　半夏　麦冬　茯苓　石膏各一钱　人参　菊花　防风各一钱　甘草五分

【主治】头目不清。

60230　**钩藤饮**

《金鉴》卷五十。为《医方大成》卷十引汤氏方"钓藤饮"之异名。见该条。

60231　**钩藤饮**

《金鉴》卷七十八。为《奇效良方》卷六十四"钓藤饮子"之异名。见该条。

60232　**钩藤饮**

【方源】《医级》卷七。

【组成】钩藤 天麻 柴胡 当归 茯神 甘草 桑寄生

【主治】时感风寒、风温等证。

【加减】热甚加黄芩、栀子；湿盛加苍术；痰多加半夏、南星；风胜加僵蚕、全蝎。

60233 **钩藤饮**

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】党参（去芦） 防风各一钱 蝉退（去头足）四只 钩藤一钱五分 荆芥六分 竹叶十片 陈皮四分 甘草二分

【主治】感冒，兼肝风内动者。

【加减】如有痰，加竺黄一钱一分。

60234 **钩藤散**

【方源】方出《经效产宝》卷上，名见《圣惠》卷七十七。

【异名】钩藤汤（《圣济总录》卷一五五）。

【组成】钩藤二两 茯神 人参各二两 当归二两 桔梗三两 寄生一两

【用法】上以水五升，煎取二升，分三次服。

【主治】妊娠子痫及产后发痉。

①《经效产宝》：妊娠经八九个月，胎动不安，或因用力劳乏，心腹痛，面目清，冷汗出，气息欲绝。②《胎产心法》：孕妇手少阴，足厥阴血虚风热，发为子痫。③《妇科玉尺》：产后发痉，口噤背强。

【宜忌】忌猪肉、菘菜。

【加减】若烦热，加石膏二两半；临产月，加桂心一两。

【方论选录】《医方集解》：此足厥阴药也。钩藤之甘寒以除心热而散肝风；柴胡、桔梗之辛凉，黄芩、栀子之苦寒，以平少阳，厥阴之风热，风热去则瘈疭止矣；人参、茯神以益气而宁神；当归、寄生以养血而安胎也。

60235 **钩藤散**

【方源】《圣惠》卷八十二。

【异名】钓藤汤（《圣济总录》卷一六七）。

【组成】钩藤半两 川升麻半两 蜣螂二枚（去翅足，微炒） 黄芩半两

【用法】上为细散。每服一钱，以水一小盏，加入芦根一分，煎至四分，去滓，徐徐温服。

【主治】小儿新生，发噤撮口。

【备考】本方方名，《普济方》引作“撮口散”。

60236 **钩藤散**

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】钩藤一分 犀角屑半两 赤茯苓半两 天竹黄一分（细研） 龙胆半两（去芦头） 川大黄二分（锉碎，微炒） 地骨皮一分 川芒消半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服。

【主治】小儿壮热惊悸，大小便赤涩。

【备考】《圣济总录》有茯神。

60237 **钩藤散**

【方源】《圣惠》卷八十二。

【组成】钩藤一分 龙胆一分（去芦头） 犀角屑一分 茯神一分 黄芩一分 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为细散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，频服。

【主治】小儿惊啼壮热，心烦不得稳睡。

60238 **钩藤散**

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】钩藤 蝉壳（微炒） 马牙消 黄连（去须） 甘草（炙微赤，锉） 川大黄（锉碎，微炒） 天竹黄（细研）各等分

【用法】上为细散。每服半钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿惊热。

60239 **钩藤散**

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】钩藤半两 人参一分（去芦头） 子芩一分 蚱蝉三枚（微炙） 犀角屑一分 甘草半两（炙微赤，锉） 川升麻半两 石膏半两 川大黄一分（锉碎，微炒）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，入竹沥半合，牛黄末一字，

服之。

【主治】小儿壮热发痫,或时时四肢抽掣,多吐白沫。

60240 钩藤散

《圣惠》卷八十五。为《外台》卷三十五引《古今录验》"钓藤汤"之异名。见该条。

60241 钩藤散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】钩藤半两 犀角屑一分 牛黄一分(研细) 虎睛一对(微炙) 防风一分(去芦头) 栀子仁半两 石膏半两(研细,水飞过) 蚱蝉一枚(微炙) 独活一分 人参一分(去芦头)

【用法】上为细散。每服一钱,水一中盏,煎至五分,去滓,分为二服,如人行二三里进一服。

【主治】小儿四五岁,忽患惊痫。

60242 钩藤散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】钩藤一分 蚱蝉二枚(微炒,去翅足) 川升麻半两 子芩半两 麦门冬半两(去心,焙) 蛇蜕皮五寸(烧灰) 川大黄半两(锉碎,微炒) 石膏二两 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓,入竹沥半合服之。

【主治】小儿风壅气盛,心胸痰滞,壮热发痫。

60243 钩藤散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】钩藤三分 蚱蝉二枚(微炒,去翅足) 人参半两(去芦头) 子芩半两 牛黄半两(研细) 川大黄半两(锉碎,微炒)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓,加牛黄一字温服。

【主治】小儿热痫,时时戴眼、吐沫。

60244 钩藤散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】钩藤三分 白茯苓三分 黄芩三分 川升麻三分 白鲜皮三分 龙齿一两 玄参一两 石膏一两 寒水石二两

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓,加竹沥半合,搅令匀,重煎一两沸,分温二服。

【主治】小儿忽得惊痫,壮热口燥。

60245 钩藤散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】钩藤半两 龙齿一两 石膏三分 栀子仁一分 子芩半分 川大黄半两(锉碎,微炒) 麦门冬三分(去心,焙)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿惊痫,仰目嚼舌,精神昏闷。

60246 钩藤散

《幼幼新书》卷十九引《聚宝方》。(人卫本),即原书古籍本"钓藤散"。见该条。

60247 钩藤散

《妇人良方》卷四。即《本事》卷二"钓藤散",见该条。

60248 钩藤散

《丹溪心法》卷五。为《直指小儿》卷四"钓藤散"之异名。见该条。

60249 钩藤散

《普济方》卷一三四。即《圣济总录》卷二十九"钩藤汤"。见该条。

60250 钩藤散

【方源】《普济方》卷三六六。

【组成】钩藤 玄参 升麻 黄芩 赤茯苓 苦梗 甘草 山栀子各等分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如皂角子大。每用以灯心、淡竹叶、薄荷煎汤化服。或研细雄黄调下。

【主治】风热喉痹。

【备考】本方方名,据剂型,当作"钩藤丸"。

60251 钩藤散

《普济方》卷三七二。为《直指小儿》卷二"钩藤饮"之异名。见该条。

60252 钩藤散

【方源】《普济方》卷三八五。

【组成】连翘 瞿麦 车前子 牛蒡子 赤芍药 滑石各一两 栀子 木通 当归 防风各半两 荆芥 黄芩各半两 柴胡 甘草各二两 蝉壳二钱半

【用法】上㕮咀。加灯心，煎服。

【主治】小儿风热惊悸，大小便赤涩。

60253 钩藤散

《婴童百问》卷三。为《小儿药证直诀》卷下"钩藤饮子"之异名。见该条。

60254 钩藤散

【方源】《审视瑶函》卷五。

【组成】钩藤 陈皮 麦门冬 石膏 家菊花 人参 明天麻 防风 白茯苓 鹿茸 制半夏 甘草各等分

【用法】上为粗末。每服四钱，加生姜三片，白水煎服。

【主治】恣酒嗜燥，头风痰火之人阴虚血少，虚火上旋，视定反动。

60255 钩藤散

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】生地五两 川贝二两(去心) 池菊三两(去蒂) 薄荷一两半 茯神一两半(去木) 羚羊角一两半 甘草一两半 金斛三两 钩藤五两

【用法】上为散。水煎五钱，去滓温服。

【主治】妊娠血亏木旺，肝热生风，眩晕卒仆，胎孕不安，脉数急。

【方论选录】生地滋阴壮水以护胎；羚羊角解热清肝以定眩；池菊解郁热，兼益金水；石斛退虚热，兼荣肾肝；薄荷散热清头；甘草缓中泻火；川贝清心解热；茯神渗湿安神；钩藤抑肝舒筋，以熄肝风也。为散水煎，使肾热退而肾水得滋，则水润木荣，而眩晕自退，胎无不安，何卒仆之不省哉。

60256 钩藤煎

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】钩藤一分 子芩半两 知母半两 寒水石三分 川升麻半两 沙参一两(去芦头) 蚱蝉二枚(去翅足，微炒) 蜣螂二枚(去翅足，炒微黄) 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为末，加蜜五两，以慢火煎炼为膏。每以熟水调一杏仁大服。一日三次。

【主治】小儿惊痫，体热羸瘦。

60257 钩藤膏

【方源】《阎氏小儿方论》。

【异名】钓藤膏(《幼幼新书》卷十引汉东王先生方)、钩藤汤(《嵩崖尊生》卷十五)。

【组成】没药(研) 好乳香(水中坐乳钵研细称) 木香 姜黄各四钱 木鳖仁十二个

【用法】先将后三味为细末，次研入上二味，炼蜜和成剂收之。每一岁儿可服半皂角子大，煎钩藤汤化下，不拘时候。次服魏香散。

【主治】①《阎氏小儿方论》：小儿盘肠内钓，腹中极痛，干啼后偃。②《局方》(淳祐新添方)：小儿胎寒胃冷，肚腹疞痛，夜间啼哭，呕吐乳食，大便泻青，状若惊搐，时有冷汗。

60258 钩藤膏

【方源】《活幼心书》卷下。

【异名】钩藤丸(《幼科折衷》卷下)。

【组成】钩藤(和钩) 玄胡索 当归(酒洗) 粉草(炙) 乳香各五钱 肉桂(去粗皮)二钱 麝香一字

【用法】前四味焙干，桂不过火，同为末。乳香箬叶裹，熨斗盛火熨透，候冷，入乳钵同麝香研细，后入前药末，再和匀，炼蜜为丸，如芡实大。每用一丸至二丸，空心白汤化服。

【主治】①《活幼心书》：百日内婴孩唇面青冷，腹痛夜啼，及周岁以上者盘肠内钓，诸疝气疾。②《幼科折衷》：小儿阴囊肿。

60259 钩藤膏

【方源】《普济方》卷三六一。

【组成】乳香(用灯心研末) 五灵脂 没药 当归各一钱 麝香一字

【用法】上为末，炼蜜为丸，如豌豆大。一百日内儿每服一丸，煎钩藤汤化下，饥服。

【主治】小儿内钓夜啼，仰身叫哭，唇面青冷。

60260　**钩藤膏**

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】没药　乳香　木香　僵蚕各四钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如豆大。钩藤汤化下。

【主治】盘肠内钓。

60261　**钩藤膏**

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】钩藤　当归　川芎　生地　白芍药

【主治】肝血少生风，皮肤干揭，遍身燥痒，手足难于举动，渐至肌肉黑瘦，筋脉挛缩。

60262　**钩藤膏**

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】钩藤　木香　槟榔　姜黄片子　五灵脂　乳香　没药　缩砂仁

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三五钱，钩藤汤送下。

【主治】小儿内钓腹痛，咬奶多啼，唇乌如囊，腰曲头垂，四肢、额上有汗，面白黄惨，眼内红筋，斑斑血丝，脚冷肚胀，哭声细小，关纹隐隐不明，眼慢流涎者。

60263　**钩藤皮汤**

【方源】《普济方》卷一〇〇。

【异名】钩藤饮(原书卷三七七)。

【组成】钩藤皮　麻黄(去节)各二分　龙齿六分(研，绵裹)　银一斤　寒水石　栀子(劈)　知母　石膏(碎，绵裹)　杏仁(去两仁皮尖，研)各十二分　升麻十分　子芩十四分　蛇蜕皮七寸(炙)　蚱蝉四枚(去足翅，炙)　柴胡十分　芍药　沙参各八分　生葛汁五分　蜜七合　牡牛黄(如大豆粒)十枚(煎成研下之)

【用法】上㕮咀。以水六升，加淡竹沥二升，合煮取二升四合，绞去滓，纳杏仁脂、葛汁、蜜，于微火煎，搅不停手，令余二升三合。三四岁一服二合，五六岁一服二合半，每日二次。稍增。

【功用】救急疗痫。

【主治】小儿癫痫。

【宜忌】慎热面、炙肉、鱼、蒜、粘食、油腻、冷水。

【加减】若大便涩者，加大黄十分。

60264　**钩藤饮子**

【方源】《圣惠》卷七十六。

【组成】钩藤半两　蚱蝉一枚(去翅足，微炙)　人参一分(去芦头)　子芩一分　川大黄一分　牛黄一小豆(研入)

【用法】上锉细。每服一钱，以水一小盏，煎至四分，加竹沥半合，更煎微沸，下牛黄搅令匀，温服，不拘时候。以微利一两度为妙。

【主治】小儿发热，时时戴目，口中吐沫。

【宜忌】乳母忌蒜、面、炙煿物。

60265　**钩藤饮子**

《圣惠》卷七十六。为《外台》卷三十五引《古今录验》"钩藤汤"之异名。见该条。

60266　**钩藤饮子**

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【异名】钩藤饮(《普济方》卷三七一引《全婴方》)、钩藤散(《婴童百问》卷三)、钩藤钩饮(《兰台轨范》卷八)。

【组成】钩藤三分　蝉壳　防风(去芦头，切)　人参(去芦头，切)　麻黄(去节，秤)　白僵蚕(炒黄)　天麻　蝎尾(去毒，炒)各半两　甘草(炙)　川芎各一分　麝香一分(别研入)

【用法】上为细末。每服二钱，以水一盏，煎至六分，温服，不拘时候。

【主治】吐利，脾胃虚风慢惊。

【加减】寒多，加附子末半钱。

【备考】本方方名，《幼幼新书》引作"钩藤饮"，《准绳·幼科》引作"钩藤饮子"。

60267　**钩藤饮子**

【方源】《幼幼新书》卷十一引张涣方。

【组成】钩藤　蝉壳各半两　黄连(拣净)　甘草(微炙)　川大黄(微炮)　天竺黄各一两

【用法】上为细末。每服半钱至一钱，水八分盏，加生姜、薄荷各少许，煎至四分，去滓温

服。

【主治】小儿诸痫啼叫。

60268 **钩藤饮子**

《幼幼新书》卷十九引《婴童宝鉴》(人卫本)。即原书古籍本“钓藤饮”。见该条。

60269 **钩藤饮子**

《幼幼新书》卷十引《张氏家传》(人卫本)。即原书古籍本“钓藤饮”。见该条。

60270 **钩藤饮子**

《卫生总微》卷五。为《永乐大典》卷九八〇引《养生必用》“钓藤饮子”之异名。见该条。

60271 **钩藤饮子**

【方源】《灵验良方汇编》卷三。

【组成】钩藤钩 防风 独活 天麻 天竺黄 羌活 川芎各一钱 升麻 甘草(炙) 龙胆草 麻黄各五分 蝉退五个(去头足)

【用法】加生姜二片,大枣一枚,水煎服。

【主治】一切惊风潮搐,目视昏迷。

60272 **钩藤钩饮**

《兰台轨范》卷八。为《小儿药证直诀》卷下“钩藤饮子”之异名。见该条。

60273 **钩藤大黄汤**

【方源】《伤寒广要》卷十二。

【组成】钩藤皮 当归 甘草(炙) 芍药各半两 大黄三分

【用法】上为粗末。每服三钱,以水一盏,煎六分,温服。以利为度。

【主治】小儿伤寒,里不解,发惊妄语,狂躁潮热。

60274 **钩藤子芩汤**

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】钩藤 黄芩 沙参各三分 知母(焙) 升麻 犀角(镑)各一两 蚱蝉二枚(炙,去翅头足) 蛇蜕皮三寸(炙) 柴胡(去苗) 甘草(炙,锉) 白术各半两

【用法】上为粗末。以水二升,煎取六合,去滓,入蜜二合,竹沥三合,再炼如饧,每服一钱匕,微微与服。

【主治】小儿惊痫体虚者。

60275 **钩藤紫草汤**

【方源】《治痘全书》卷十四。

【组成】钩藤 紫草茸 牛蒡子

【用法】水煎服。

【主治】痘疹惊狂。

60276 **钩藤紫草饮**

《痘疹仁端录》卷十四。为《奇效良方》卷六十五“钩藤紫草散”之异名。见该条。

60277 **钩藤紫草散**

【方源】《奇效良方》卷六十五。

【异名】钩藤紫草饮(《痘疹仁端录》卷十四)。

【组成】钩藤钩子 紫草茸各等分

【用法】上为细末。每服一字或半钱,温酒调下,不拘时候。

【主治】痘疹发出不快。

【方论选录】《痘治理辩》:紫草滑窍利小便,散十二经毒气;钩藤治小儿寒热,十二惊痫。盖疮疡、烦躁,痛痒皆出于心,惊痫,心病也,疮疡亦心所主,故用之。

60278 **钩藤生地竹沥饮**

【方源】《产孕集》卷上。

【组成】钩藤三钱(后入) 大生地三钱(酒炙) 炒当归三钱 炒白芍二钱 明天麻一钱(煨) 川芎一钱五分 川贝母一钱(去心) 制半夏一钱五分 苏梗一钱 陈皮八分 川朴七分(姜汁炒) 桔梗二钱

【用法】加竹沥三茶匙,冲服。一剂不效,再服一剂。

【主治】妊娠七八月,因冬月外感风寒,壅于肺络,内风煽炽,痰气升逆,昏迷不醒,手足筋脉拘挛,右手脉闭,左手脉数而涩,症属于痫。

复

60279 **复元丸**

【方源】《朱氏集验方》卷三。

【组成】川楝子二十五个(锉肉,作五份,一份茴香炒,一钱;一分陈皮炒,二钱;一份黑牵

牛炒，二钱；一份神曲炒，二钱；一份巴豆五粒，炒，除去巴豆，或破故纸二钱代用）

【用法】上为细末，煮少面糊为丸，取江水、井水、溏水、田水、圳水，合煮汤吞下，空心服。

【主治】钓肠病。

60280 **复元丹**

【方源】《三因》卷十四。

【异名】复元散(《嵩崖尊生》卷十一)。

【组成】附子(炮)二两　南木香(煨)　茴香(炒)　川椒(炒去汗)　独活　厚朴(去皮，锉，姜制，炒)　白术(略炒)　陈橘皮　吴茱萸(炒)　桂心各一两　泽泻一两半　肉豆蔻(煨)　槟榔各半两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，紫苏汤送下，一日三次，不拘时候。先是旋利如倾，次乃肿消喘止。

【功用】助真火，养真土，运动枢机。

【主治】①《三因》：水肿。真火气亏，不能滋养真土，故土不制水，水液妄行，三焦不泻，气脉闭塞，枢机不通，喘息奔急，水气盈溢，渗透经络，皮肤溢满，足胫尤甚，两目下肿，腿股间冷，口苦舌干，心腹坚胀，不得正偃，偃则咳嗽，小便不通，梦中虚惊，不能安卧。②《一盘珠》：脾肾两虚，发肿，怕风。

【宜忌】禁欲并绝盐半年。

60281 **复元汤**

《古今医鉴》卷十二。为《云岐子保命集》卷下"归原散"之异名。见该条。

60282 **复元汤**

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】熟附　黄连　甘草　人参　五味子　麦门冬　知母　芍药　童便

【用法】上加生姜、大枣，水煎服。临服加葱白二茎捣汁调之，温服。

【主治】伤寒汗、下太过，下元虚弱，无根虚火泛上，无头痛、无恶寒，身微热，面赤微渴，目无精光，语无伦次，脉数无力，名曰戴阳症。

60283 **复元汤**

《寿世保元》卷九。为《医学发明》卷三"复元活血汤"之异名。见该条。

60284 **复元汤**

【方源】《济阴纲目》卷十四。

【组成】荆芥穗　藿香叶　臭椿皮各等分

【用法】上㕮咀。煎汤熏洗。子宫即入。

【主治】产后子宫不收。

60285 **复元散**

【方源】《痘疹传心录》卷十八。

【组成】土鳖虫不拘多少(用壁喜巢包虫在内，以苧麻线缚定，将黄泥包封，火煅)　红花(为末)五分　大仙人柴(火煅，醋淬，为末)五分　古文钱(火煅，为末)一钱　自然铜(煅三次，为末)五分　乳香　没药各五分(为末)

【用法】上和匀。每用二分，小儿一分，空心好酒调下。

【主治】扑堕损伤。

60286 **复元散**

《嵩崖尊生》卷十一。为《三因》卷十四"复元丹"之异名。见该条。

60287 **复元散**

【方源】《麻科活人》卷一。

【组成】贝母　百合　阿胶(炒)　枇杷叶(蜜炙，去毛)　桔梗　罂粟壳(炒)各一钱

【用法】上为末。每服一钱，用桑白皮煎汤送下。

【主治】麻后喘急，鼻孔干黑如煤。

60288 **复元散**

【方源】《医学探骊集》卷四。

【组成】万年灰一两　象皮四分　冰片三分　麝香一分

【用法】上为极细末，瓷瓶盛之备用。先服加味犀角地黄汤一二剂，再以本方闻之。

【主治】鼻衄。

60289 **复正汤**

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】防风一钱　荆芥一钱　细辛八分　黄芩二钱　乌药二钱　天麻二钱　当归(酒洗)三钱　白芍(酒炒)二钱　川芎一钱五分　白术一钱五分(去芦)　白茯苓三钱(去皮)

陈皮一钱五分（去白） 半夏二钱（泡） 枳壳一钱（去瓤，麸炒） 白芷八分 桔梗八分 僵蚕三钱 甘草八分

【用法】上锉一剂。加生姜，水煎服。

【主治】风中经络，口眼㖞斜。

60290 复正汤

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】熟地 白术各五钱 柴胡 山茱萸 茯苓 丹皮各二钱 甘草一钱 山药三钱 神曲五分 贝母五分

【用法】水煎服。

【主治】思虑忧愁，脾肾两伤，面黄体瘦，感冒风邪。

60291 复正散

【方源】《外科百效》卷下。

【组成】僵蚕 清风藤 生地黄 白附子各七钱 当归 川芎 何首乌 防风 白芷 荆芥 天麻 蒺藜 赤芍 胡麻 连翘 桔梗 藁本 蔓荆子各五钱 羌活 全蝎各三钱 升麻二钱 白僵蚕二钱 金银花一两 白花蛇二两（净）

【用法】上以好酒二十斤，大坛盛封。早、晚随量饮之。

【主治】口眼歪斜，痫症。

60292 复目汤

【方源】《外科证治全书》卷一。

【组成】当归二钱 赤芍二钱 大熟地五钱（或用生地） 黄芩一钱五分（酒炒） 薄荷二钱 甘菊二钱 甘草五分 川芎一钱

【用法】上水煎，食后、卧时稍热服。

【主治】目病。目痒肿痛，翳膜，目珠夜痛，目中赤脉，及肝虚泪多等。

【加减】目痒，加蝉退、防风各一钱五分；目肿，加羌活、木通各一钱；目痛，加酒连五分、山栀仁一钱；目生翳膜，加木贼、刺蒺藜各二钱、柴胡一钱或八分；伤酒，加葛根二三钱；目珠夜痛，加夏枯草、香附各二钱；目中赤脉，加密蒙花二钱；白眼上红不退，加桑白皮三钱；两瞳痛，去川芎，加泽泻一钱五分、盐炒黄柏一钱；肝虚泪多，加鲜首乌五七钱或一两；红肿而不羞明者，加山萸肉、杜仲各二钱；肿痛、两眼如桃，合而为一、痛不可忍者，先用防风通圣散下之，然后服此方加连翘、蔓荆子各一钱五分。

60293 复生丸

【方源】《回春》卷七。

【组成】当归 白芍 西芎 升麻 葛根 甘草各五钱 嫩紫草茸一两 辰砂一两二钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一丸，冰、雪、雨三水送下；如无，河水亦可，或糯米汤一匙送下亦可。五日以前可服。

【功用】解痘毒。

【主治】小儿痘疹不起发，紫黑陷伏，或痘疹初作，已发或未发者。

60294 复生丸

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【异名】神效复生丸（《寿世保元》卷八）。

【组成】当归身 西芎 升麻 干葛 白芍 人参 黄耆 甘草各五钱 辰砂一两二钱 紫草茸一两

【用法】上为末，糯米粽为丸，如鸡头子大。每服一丸，河水煎滚，入黄酒少许送下。

【主治】痘疹不起胀。

60295 复生汤

【方源】《春脚集》卷四。

【组成】蒡子 牡蛎 皂刺 银花 栀子 花粉 木通 骨皮 乳香 没药 僵蚕 川连各等分

【用法】用磨刀锈水一钟，黄酒一钟，煎服，大便行一二次即苏，出汗生，无汗危。

【主治】疔毒内攻，面肿欲死者。

【加减】便闭，加朴消一钱。

60296 复生饮

【方源】《玉案》卷六。

【组成】牙皂 僵蚕 穿山甲各六分 麻黄 防风 胆星 半夏各五分 甘草三分 大黄一钱（后人，略煎一滚）

【用法】先以此儿脱下脐带煎五六沸，去带，再入前药煎，临服加生姜汁，竹沥各二茶匙，麝香少许，调匀，徐徐以匙灌之。以通利则有生机。

【主治】一切脐风撮口。

60297　**复生散**

【方源】《卫生宝鉴》卷二十。

【组成】半夏不拘多少

【用法】上为细末。心头温者，用一字许，吹入鼻中，立活。

【主治】卒病死、压死、溺死、一切横死，但心头温者。

60298　**复全膏**

【方源】《疡科选粹》卷四。

【组成】蜜蜂二十一个　蛇蜕七分五厘

【用法】用香油四两，入二味，慢火熬化，滤去滓，加光粉二两，以桑枝急搅，候冷，在水中浸七昼夜，纸上摊。贴患处。

【主治】瘰疬未破者。

60299　**复阳丹**

《医统》卷二十二。即《济生》卷四"洞阳丹"。见该条。

60300　**复阳丹**

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】荜澄茄　木香　干蝎　附子（炮）　硫黄　吴萸各五钱　干姜一钱

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，生姜汤送下，复以热酒投之取汗。

【主治】伤寒面青肢冷，心腹胀，脉沉细。

60301　**复阳丹**

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】附子（制）　炮姜　胡椒　北五味（炒）　炙甘草各一两　白面二两（炒熟）

【用法】上为末，和匀，加温汤为丸，如梧桐子大。每服一钱，随证用药引送下。

【主治】阴寒呕吐、泄泻、腹痛、寒疝。

60302　**复阳汤**

《鸡峰》卷五。为《伤寒论》"甘草干姜汤"之异名。见该条。

60303　**复阴丹**

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】熟地一两　山茱萸五钱　芡实　山药各二两　肉桂一钱

【用法】水煎服。

【功用】大补水中之火。

【主治】肾寒水泛为痰，涎如清水者。

60304　**复苏散**

【方源】《全国中药成药处方集》（昆明方）。

【组成】羌活　防风　粉葛各一两　砂仁八钱　厚朴　广香　法夏　广皮各六钱　薄荷　甘草　枯矾　细辛　牙皂　草果　槟榔各四钱　雄黄二钱　朱砂四钱　草蔻三钱　藿香　桔梗各八钱

【用法】上为末。每服二钱半，幼童减半，开水送下。

【主治】感冒风寒，食积气滞，恶心呕吐。

【宜忌】非时令症不宜服。

60305　**复坚散**

【方源】《杂类名方》。

【组成】独活半钱　羌活一钱半　防风半钱　藁本一钱半　黄芩　生地黄　知母各一钱　黄连　黄柏各一钱半（以上五味皆酒洗）　防风梢半钱　当归身　连翘各三钱　黄耆一钱半　人参半钱　甘草一钱（炙）　生甘草梢半钱　橘皮半钱　汉防己半钱（酒洗）　泽泻七分　桔梗一钱

【用法】上㕮咀，作二服。以水二盏，浸半日，煎至一盏，去滓，稍热服。将二服滓更作一服。

【主治】疮。

【宜忌】服药后不得饮冷水，恐再作脓。

60306　**复肝丸**

【方源】《黑龙江省中草药制剂汇编》（第一集）。

【组成】胆草5千克　黄耆5千克　鸡血藤5千克　红花5千克　当归5千克　炼蜜8千克

【用法】取红花、当归为细末；再取黄耆、胆草、鸡血藤置煎煮锅中煎煮二次，首次二小时，第二次一小时，合并煎液滤过，浓缩成稠膏状，与上末混合搅匀，烘干后粉碎过筛（应小于一百目），加炼蜜混合均匀，使柔软滋润，搓条为丸，烘干包装，丸重二钱。每次一丸，一日二至三次。

【功用】活血化瘀，消炎解毒。

【主治】肝炎，肝硬化。

60307　复亨丹

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】倭硫黄（即石硫黄）十分　鹿茸八分（酒炙）　枸杞子六分　人参四分　云茯苓八分　淡苁蓉八分　安南桂四分　萆薢六分　全当归六分（酒浸）　小茴香六分（酒浸，与当归同炒黑）　川椒炭三分　炙龟版四分

【用法】益母膏为丸，如小梧桐子大。每服二钱，开水送下，一日二次。冬日渐加至三钱。

【主治】燥气久伏下焦，不与血搏，老年八脉空虚。

【方论】复亨大义，谓剥极而复，复则能亨也。其方以温养温燥兼用，盖温燥之方，可暂不可久，况久病虽曰阳虚，阴亦不能独足，至老年八脉空虚，更当豫护其阴。故以石硫黄补下焦真阳，而不伤阴之品为君；佐以鹿茸、枸杞、人参、茯苓、苁蓉补正；而但以归、茴、椒、桂、丁香、萆薢通冲任与肝肾之邪也。

60308　复肾散

【方源】《千家妙方》引任继学方。

【组成】广狗肾 2 具　海马 50 克　鹿肾 1 对　土茯苓 200 克　淡菜 100 克　鹿角菜 50 克　鲍鱼 50 克　头发菜 50 克　砂仁 50 克　杜仲炭 50 克　杞果 100 克　冬虫草　酒生地各 50 克

【用法】上为细末。每服 10 克，以淡盐汤送下，一日三次。

【功用】补阴培阳。

【主治】肾功能不全（阴阳俱虚）。浮肿尿少，腹胀，恶心呕吐，纳呆，呼吸气短，不能平卧，口干不欲饮，腰痠膝冷，四肢欠温，颜面青白，口唇淡，舌体肥大，质嫩红，少苔，脉沉弦而数，证属阴阳两虚者。

60309　复明丸

【方源】《普济方》卷七十三。

【组成】炉甘石半两（童便淬七次）。铜绿一两（水飞）　乳香三钱　白土子一两三钱（水飞）　枯矾三钱

【用法】上除乳香外，另为细末，生蜜为丸服。

【主治】眼赤烂肿痒。

60310　复明丸

【方源】《审视瑶函》卷五。

【组成】冬青子（生用）一斤（陈酒共蜜拌，蒸七次、晒七日，露七夜，焙干）　元蝙蝠（活捉）一只　夜明砂（酒洗，煮，炒）　枸杞（捣，焙）　熟地（酒浸，焙）　绿豆壳（炒）各一两　川黄连（微炒）　白术（制）各三钱　辰砂一两半（用一半蝙蝠捣烂，余为衣）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服五十丸，食后热酒送下。

【主治】青盲症。

60311　复明汤

《审视瑶函》卷五。为《准绳·类方》卷七“复明散”之异名。见该条。

60312　复明散

【方源】《卫生总微》卷十八。

【异名】还明散（《普济方》卷三六三）。

【组成】苍术二两（米泔浸，去皮，切，焙干）　谷精草一两　地肤子半两　决明子半两　黄芩半两

【用法】上为细末。每服一钱，水八分，加荆芥少许，煎至五分，去滓，食后温服。

【主治】小儿雀目，至暝不见物。

60313　复明散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】草龙胆（去芦头）　麻黄（去节）各等分

【用法】上为细末。每服三钱，食后，炙鼠肝

香熟蘸药食之，一日二次。服药五六日后，眼白睛与翳膜皆粉红色，眼觉痒涩，不得揉动，亦不可疑，此是翳膜渐退也，频频用温盐汤洗之。病大者，每日三次。小儿酌减。如不食鼠肝，只用第二次淘粟米生泔水调下。

【主治】斑疮入眼，或成翳膜，或眼睛高出而不枯损者。

60314　复明散

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】青皮三分　橘皮　川芎　苍术各五分　炙甘草　生地黄　连翘　柴胡各一钱　黄耆一钱五分　当归身二钱

【用法】上锉，如麻豆大，都作一服。以水二大盏，去滓，食后稍热服。

【主治】内障。

【宜忌】忌酒、醋、湿面、辛热，大料物之类。

60315　复明散

【方源】《痘疹金镜录》卷下。

【组成】当归　川芎　白芍　生地　防风　蔓荆子　荆芥　柴胡　白芷

【用法】水、酒各半煎服。

【主治】痘后目痛，红丝、翳膜。

60316　复明散

【方源】(《准绳·类方》卷七)。

【异名】复明汤(《审视瑶函》卷五)。

【组成】黄耆一钱半　生地黄　柴胡　连翘　甘草(炙)各一钱　当归二钱　苍术　川芎　陈皮各五分　黄柏三分

【用法】上用水二大盏，煎至一盏，去滓稍热服。

【主治】①《准绳·类方》内障。②《审视瑶函》：内络气郁，玄府不和，视物却非本色。譬观太阳若冰轮，睹灯火反红色，视粉墙转如红如碧者。

【宜忌】忌酒、湿面、辛热大料之物。

60317　复明散

【方源】《幼科金针》卷下。

【组成】天麻一两　胡黄连六钱　夜明砂一两(炒)　芦荟三钱　银柴胡一钱　木贼一两　青黛一两　蝉退一两　草决明一两(炒)　五灵脂一两(酒炒)　龙胆草一两　蔓荆子四钱　谷精花三钱

【用法】上为末。用不入水鸡肝连胆一并捣烂，加酒酿少许，包于麻布内，滤去渣滓，将前药调和，每服一钱。

【主治】小儿肝疳。

60318　复明散

【方源】《本草纲目拾遗》卷九引《眼科要览》。

【组成】蛔虫一条(童子口中吐出者)

【用法】用竹刀剖开，清水洗净，放新瓦上以炭火焙干，勿焦，为极细末，乌金纸包好；再用硼砂四两，将蛔末包藏其中，七日取出。以骨簪蘸药点眼，一日三次；后将骨簪脚拨去眼中翳膜，热水洗之，少顷又点

【主治】翳膜遮睛，瞽者亦可复明。

60319　复明膏

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】马牙消(研)一两半　酸浆草(干者)五两

【用法】上于六月六日入童便浸，于日中晒之，夜或阴雨覆之，晴即露之，小便耗即旋添，至七月初去酸浆草，只空晒小便，令干，收之，别以新盆盖药，埋净地深可五寸，至来年夏至前二日收之，其霜飞上盆于盖，以乌鸡毛扫取。患者以一米粒大按于大眦头。避风。

【主治】目障翳，胬肉昏暗。

60320　复明膏

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】白丁香(腊月收者尤佳，水飞)八钱　拣黄连一两　防风(去芦，锉一指许)一两　新柳枝(方一寸者)三片

【用法】上用新水一升半，雪水更妙，春、秋两三时，冬月一宿，以银石器内熬至六分，滤去滓；另用蜜一斤，密陀僧(为极细末)三字，入蜜搅匀另熬，以无漆匙撩点，下蜜中急搅，候沸汤定，一人搅蜜，一人旋搅药汁，都下在内搅匀，再熬三两沸，色稍变，用新绵三两，重

滤去滓，盛器内。点眼如常。本方每药半合，用片脑一麦粒大，不用亦可。

【主治】外障。

60321 复明膏

《兰室秘藏》卷上。为原书同卷“羌活退翳膏”之异名。见该条。

60322 复明膏

【方源】《永乐大典》卷一一四一三引《烟霞圣效》。

【组成】黄连（去须土） 防风（去芦头） 黄丹（水飞）各一两 诃子一对（去核用皮） 白丁香二两（水飞） 柳桃枝四两（锉碎） 蜜一斤（用旧葱同煎，去滓）

【用法】上先将黄连等五味，用水四升，砂锅内熬至水欲药平，绵滤过，同蜜再熬数沸，后下黄丹滴水不散，土内埋一二日，去其火毒。点眼。

【主治】远年近日云翳瘀肉攀睛，一切眼病。

60323 复明膏

【方源】《丹溪心法附余》卷十二。

【组成】黄连一斤（洗净，去须，锉） 当归半斤（洗净，擘开腹儿） 诃子三两（洗净，捶碎） 黄柏三两（去粗皮）

【用法】上四味，以腊水一大桶，瓷器内浸十五日，人铜锅内熬至数十沸，滤去滓；炉甘石半斤，桑柴火煅七次，用前药四味汁醮七次，如鸡子黄色，为极细末，水飞过；鹅梨二十五个，捣烂，用生绢袋，滤去滓；黄丹半斤，水飞过，蜜二斤半，水二升半，葱一把，熬水尽，去滓；猪胰子十五个，择净脂油，用捍草裤一大把，同捣烂泥，生绢袋滤去滓，再过一次，同煎药汁下铜锅内煎熬，欲成稀膏，下后六味：青盐、盆消各一两，铜绿（研极细末）、硇砂、硼砂、熊胆各五钱，共为细末，入锅再熬一时，欲成稠膏子，下后四味：麝香三钱（水研细），龙脑、轻粉、粉霜各一钱（研细）。上药再熬，从紧至慢，渐渐微火熬成膏，出锅入瓷器内盛，放土中埋一个月，去火毒可用，以后若干时，却用乳汁化开。每日可点三五十次，若肿时歇一二日再点。以效为度。

【主治】远年近日眼目昏花。

60324 复明膏

【方源】《医学正传》卷五。

【组成】人参 川归 硼砂（生，研）各一钱五分 青盐 乳香（另研） 没药（另研） 芦荟各一钱 珍珠五分 麝香五分（后加） 黄丹一两（水飞，炒） 海螵蛸五钱（炒） 黄连四钱（炒） 黄柏六钱 赤炉甘石（淬数次） 白沙蜜半斤 蕤仁五钱（去壳） 白蔹一钱五分

【用法】上各研为极细末，先将白蜜煎沸，掠去沫再熬，滴水中沉碗底不散可用，然后入前药末，略沸搅匀，瓷罐收贮。日三五次点之。效。

【功用】去翳膜。

60325 复明膏

【方源】《玉案》卷三。

【组成】川黄连五斤（煎极浓，去滓） 秋梨二十斤（取汁）

【用法】二汁同雪水熬成膏，入熟蜜一斤，人乳五碗，羊胆汁一碗，和匀，晒微干成饼。用井花水磨点。

【主治】一切翳障及时气眼疾。

60326 复春丸

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】萆薢四两 破故纸（炒） 杜仲（去丝） 胡芦巴（炒） 木通各二两 骨碎补（去毛） 虎骨（酥炙） 乳香（研） 槟榔 没药 木香各一两 甜瓜子（炒）二两 牛膝（去芦，酒浸，焙干） 巴戟（去心）各二两 胡桃仁一百个（去皮，另研极细末） 黑附子一两（炮）

【用法】上为细末，再与胡桃仁同研极细，酒糊为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，食前温酒送下。

【功用】活血驻颜，补虚。

【主治】腰脚风湿劳损，手足麻痹，筋骨疼痛，不能屈伸。

60327 **复春丹**

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】杜仲(酥炒断丝)　破故纸(酒浸一宿,用脂麻炒黄色)　萆薢(酥炙黄)　巴戟(去心)各一两　沉香五钱　胡桃五七个(去皮)

【用法】上为细末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,空心服。每服药时,先嚼胡桃一枚,同药温酒送下,干物压之。

【主治】腰腿疼痛。

【宜忌】《医方大成》:忌食油腻之物,猪、羊血,绿豆粉,芫荽,浆水冷物。

60328 **复脉汤**

《伤寒论》。为原书"炙甘草汤"之异名。见该条。

60329 **复脉汤**

《本草纲目》卷十二。即《百一》卷七"破证夺命丹"。见该条。

60330 **复脉汤**

《温病条辨》卷三。为原书同卷"加减复脉汤"之异名。见该条。

60331 **复脉汤**

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】炙甘草　西洋参　火麻仁　生地　麦冬

【用法】水煎服。

【功用】益阴生脉。

60332 **复音丸**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】硼砂一两　玄明粉　胆星　诃子肉各一钱　百药煎三个　冰片三分

【用法】上为细末,外用大乌梅肉一两,捣如泥,为丸如龙眼核大。每用一丸,噙化。

【主治】哑喉。

60333 **复蚕丸**

【方源】《卫生总微》卷十一。

【组成】复蚕一个(用线串其头,阴干,只取向后有粪处,研细)　辰砂三分(研,水飞)　麝香三字(研)　荜茇三钱半　雄黄三钱半(研,水飞)　胡黄连三钱半

【用法】上为末,以新蒸粟米饭一块,泥裹煨之,取中心软者和药,为丸如绿豆大。每服五七丸,麝香汤送下。

【主治】小儿诸疳泻痢,惊风等疾,久不痊愈;及断乳后羸瘦,尪羸,渐困不能治者。

【备考】复蚕者,第二次所出之蚕也。

60334 **复黄片**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄鳝藤 46 克　白及 15 克　白茅根 15 克　丹参 9 克　红枣 62 克

【用法】将上药熬水,浓缩,制成 5 克重的糖衣片,为成人一日量,分两次服,儿童酌减,十天为一疗程。

【主治】紫斑。

60335 **复黄片**

【方源】《实用中医外科学》。

【组成】生地榆 10 千克　生蒲黄 4.5 千克　生槐角 4.5 千克　生大黄 1.5 千克

【用法】上药除生地榆、生槐角煎汁浓缩外,其余均为细末,将浓汁吸入细末内,做成颗粒,轧片,每片为 0.3 克。每次 5 片,一日二至三次。

【功用】清化肠热,通便止血。

【主治】内痔实热便血。

60336 **复睛丸**

【方源】《银海指南》卷三。

【组成】当归　蝉退　槟榔　夏枯草　胡黄连　黄耆　白蒺藜各一两　羌活　独活　防风　细辛　枳壳　白芍　赤芍　川芎　柴胡　青皮　陈皮　甘草各四钱　茯苓三钱　白芷二钱　木贼七钱　蛇退　藁本各二钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二钱。

【主治】一切目疾。

60337 **复煎散**

【方源】《普济方》卷二七五引《德生堂方》。

【组成】羌活　独活　防风　藁本各一钱半　黄芩　黄连(汤洗)　黄柏(酒洗)　知母

生地黄　当归一钱半　连翘三钱　黄耆一钱半　人参　甘草（炙）　甘草梢（生）　陈皮　麦门冬（去心）　苏木　当归梢　猪苓　山栀子　五味子　防已（酒浸）　泽泻　桔梗　枳壳各一钱

【用法】上㕮咀。每服一两，水二盏，浸一时，入酒类点，煎至三五沸，滤去滓，随病上下服之。有神效。

【主治】痈疽发背，一切无名诸肿恶疮，赤焮肿痒，或如小豆白色，或如黍粟大，但痒而不疼，或疼而不肿，毒气内攻，渴闷不已，呕哕恶心，憎寒壮热。预宜服之，已成者溃，未成者散。

【备考】方中黄芩、黄连、黄柏、知母、生地黄、用量原缺。

60338 复煎散

《医方类聚》卷一七五引《居家必用》，为《东垣试效方》卷三"黄连消毒散"之异名。见该条。

60339 复煎散

【方源】《普济方》卷二八七。

【组成】归梢一钱　归身二钱　防风梢一钱　风身一钱　苏木半钱　黄柏二钱　甘草二钱半　全蝎一钱　陈皮一钱　羌活一钱　人参五分　黄芩一钱　防己五分　连翘三分　藁本一钱　黄耆一钱　桔梗二钱　泽泻五分　知母五分　生地黄五分　芍药一钱

【用法】上为粗散，只作一服。先用井水浸药一个时辰，再用长流水一大碗，煎七分，又用好酒数十滴入药内，作一服温饮，看病上下，分食前后服。

【主治】诸般痈疽、肿毒、疖毒。

60340 复煎散

【方源】《杂病治例》。

【组成】地骨　芩　苓　参　耆　芍　白术　桂　甘草　防己　当归各一钱　防风三钱

【用法】上作一服。先煎仙术三钱，再煎余药，内服。

【主治】诸疮肿势已过。

60341 复煎散

【方源】《仙传外科集验方》。

【组成】黄柏　黄芩　黄连　知母　生地黄各一钱（酒洗）　防已　山栀　羌活　黄耆　麦门冬　甘草（炙）　独活各半钱　人参半钱　当归尾二钱　陈皮　防风梢　甘草梢（生）　苏木　当归身　五味子　猪苓　藁本　连翘　桔梗各一钱

【用法】上㕮咀。每服四钱，水二盏，煎至七分，去滓，随证上下，食前后服。

【主治】痈疽发背。

60342 复煎散

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】当归　川芎　生地　玄参　羌活　荆穗各一钱　葱白三根　淡豆豉五六十粒

【用法】上用浮萍四两，水煎汤二碗，去滓入药，再煎至一碗，热服。出汗避风。

【主治】诸癣。

60343 复聪汤

【方源】《丹溪心法附余》卷十二引姚方伯方。

【异名】复聪散（《便览》卷一）。

【组成】半夏（制）　陈皮（去白）　白茯苓（去皮）　甘草（炙）　萹蓄　木通　瞿麦　黄柏（去粗皮，炒褐色）各一钱

【用法】上用水二茶钟，加生姜三片，煎至一茶钟，空心、临卧各一服。

【主治】痰火上攻，耳聋耳鸣。

60344 复聪散

《便览》卷一。为《丹溪心法附余》卷十二"复聪汤"之异名。见该条。

60345 复燃丹

【方源】《痘科金镜赋》卷六。

【组成】人参二两　川芎五钱　归身一两　红花五钱　山楂一两　丹皮五钱　没药二钱　元参二钱

【用法】引用元米三钱，以水三碗，煎取一碗半，去滓，再煎服。

【主治】孕妇痘疮，堕胎后血不止者。

【加减】痘疮发胖，加笋兜五钱，减人参一两；浆灌，加黄耆(炙)二两，白术一两，附子一钱。

60346 **复竭饮**

【方源】《痘科方药集解》卷六。

【组成】银花　连翘　黄芩　白莲花蕊　黄连　生地　知母　银柴胡　薄荷　荆芥　元参　栀子仁　石膏　甘草　芦根

【用法】水煎，温服。

【主治】痘后口疳臭烂。

60347 **复元大补汤**

【方源】《会约》卷二十。

【组成】人参　黄耆(蜜炙)一钱半　当归一钱三分　炙草八分　肉桂　白术　川芎各八分　南木香四分

【主治】痘疮，气血大虚而浆不行，二三日细小，四五日渐大，六七日脚阔顶陷，色白如豆壳者。

60348 **复元活血汤**

【方源】《医学发明》卷三。

【异名】伤原活血汤(《奇效良方》卷五十六)、再生活血止痛散(《跌损妙方》)、复元汤(《寿世保元》卷九)、复元通气汤(《证治宝鉴》卷九)、复元通气散(《证治宝鉴》卷十一)、当归复元汤(《医略六书》卷二十)。

【组成】柴胡半两　瓜蒌根　当归各三钱　红花　甘草　川山甲(炮)各二钱　大黄(酒浸)一两　桃仁(酒浸，去皮尖，研如泥)五十个

【用法】上除桃仁外，锉如麻豆大。每服一两，以水一盏半，加酒半盏，同煮至七分，去滓，食前温服。以利为度，得利痛减，不尽服。

【功用】①《伤科补要》：祛瘀生新。②《方剂学》：活血祛瘀，疏肝通络。

【主治】跌仆损伤，瘀血内停胁下，疼痛不可忍，或伴发热便秘。并治虚劳积瘀，咳嗽痰多者。①《医学发明》：从高堕下，恶血留于胁下，疼痛不可忍。②《景岳全书》：痞闷及便毒初起疼痛。③《医略六书》：瘀血留结，发热便闭，脉数实涩大者。④《不居集》：虚劳积瘀，咳嗽痰多，夜不能卧。

【方论选录】①《医学发明》：《黄帝针经》云：有所堕坠，恶血留内。若有所大怒，气上而不行，下于胁则伤肝，肝胆之经俱行于胁下，经属厥阴、少阳，宜以柴胡为引，用为君；以当归和血脉；又急者，痛也，甘草缓其急，亦能生新血，阳生阴长故也，为臣；川山甲，瓜蒌根、桃仁、红花，破血润血，为之佐；大黄酒制，以荡涤败血，为之使。气味和合，气血各有所归，痛自去矣。②《医略六书》：血瘀于经，热壅于府，不能荣运一身，故发热有潮，大便闭结焉。当归养血活血，桃仁破瘀开结，甲片通经透络，大黄荡热通肠，红花活血滞，花粉清瘀热，柴胡疏腠理以升阳，甘草缓中气以和药。水煎温服，使瘀化气行，则大便自通而瘀热无不化，何潮热之有？此化瘀通闭之剂，为瘀结潮热便毒之专方。③《成方便读》：夫跌打损伤一证，其痛皆在腰胁间，尤为明证。故此方以柴胡之专入肝胆者，宣其气道；行其郁结；而以酒浸大黄，使其性不致直下，随柴胡之出表入里，以成搜剔之功；当归能行血中之气，使血各归其经；甲片可逐络中之瘀，使血各从其散；血瘀之处，必有伏阳，故以花粉清之；痛盛之时，气脉必急，故以甘草缓之；桃仁之破瘀；红花之活血；去者去，生者生，痛自舒而元自复矣。

【临证举例】①异位妊娠破裂出血(不稳定型)　《南京中医学院学报》(1982；3：21)：施某某，女，33岁，已婚。月经过期旬余未潮，夜间起突然下腹疼痛，呈绞痛样，痛不可忍，阴道持续点滴出血，量不多，伴有腹胀，大便不通。妇科检查：子宫颈着色，有抬举痛，呈绞痛样，痛不可忍，后穹窿饱满，穿刺有暗红色血液，不凝固，舌苔薄白，脉弦涩。辨证：冲任亏损，不任胞胎，孕育于宫之外，阻滞气血。治拟

活血祛瘀，行气止痛。处方：大黄 10 克，天花粉 15 克，当归 10 克，桃仁 10 克，红花 5 克，延胡索 10 克，柴胡 10 克，枳壳 10 克，穿山甲 10 克，甘草 5 克，连服三剂。服首剂后腹痛略增，阴道出血量亦略增多，并有血块排出，随后出血减少，腹痛缓解，三天后出血即止。剂小其制，改用：大黄 5 克，天花粉 10 克，红花 5 克，赤芍 10 克，穿山甲 10 克，当归 10 克，甘草 5 克，连服四剂，一周后出院。②带状疱疹后遗神经疼痛《湖南中医学院学报》(1984；(2)：36)：用复元活血汤治疗带状疱疹后遗神经疼痛 23 例，其中男 17 例，女 6 例。最小年龄 24 岁，最大者 71 岁，以 40～55 岁较多。疼痛在腰胁部 16 例，背部 7 例，疼痛时间最短 2 月，最长者 10 月，本组除 2 例肝癌患者经治疗无效外，均已痊愈。

60349 复元养荣汤

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】远志肉五分 人参一钱半 酸枣仁(炒)一钱 黄耆(蜜炒)一钱 荆芥八分 白芍(酒炒)一钱 当归头一钱 地榆一钱 白术(去芦)一钱 甘草三分

【用法】上锉一剂。加大枣一枚，水煎温服。

【主治】血崩，恶血去多，心神恍惚，战慄虚晕。

60350 复元通气汤

《保命歌括》卷十六。为《医学入门》卷八“复元通气散”之异名。见该条。

60351 复元通气汤

《证治宝鉴》卷九。为《医学发明》卷三“复元活血汤”之异名。见该条。

60352 复元通气汤

《中西医结合治疗骨与关节损伤》。为《秘传外科方》“复元通气散”之异名。见该条。

60353 复元通气散

【方源】《医学正传》卷六引《局方》。

【组成】当归 穿山甲(煨脆)各五钱 川芎 天花粉(炒) 青皮 陈皮各一两 大黄 甘草 黑丑(取头末)各五钱

【用法】上为细末。每服二钱，温酒调下。

【主治】诸疮。

60354 复元通气散

【方源】《活法机要》。

【异名】复元通圣散(《医学入门》卷八)、复原通气散(《便览》卷一)。

【组成】青皮 陈皮各四两 甘草三两(生熟各半) 川山甲(炮) 栝楼根各二两

【用法】上为细末。热酒调下。

【功用】《卫生宝鉴》：活血止痛，内消疮肿，通一切气。

【主治】①《活法机要》：诸气涩耳聋，腹痈，便痈，疮疽无头。②《金鉴》：乳痈。

【备考】原书治上证，加金银花一两，连翘一两。

60355 复元通气散

【方源】《直指》卷二十三。

【异名】复原通气散(《准绳·疡医》卷四)。

【组成】穿山甲(酒浸，炙焦)二两 天花粉(酒浸一宿，焙) 白芷 舶上茴香(炒) 白牵牛末(炒) 延胡索(擦去皮) 南木香 当归 甘草(炙)各一两 青木香半两

【用法】上为细末。每服二钱，食前温酒调服；不饮酒，南木香煎汤送下。

【主治】便毒初发。

60356 复元通气散

【方源】《医方类聚》卷八十八引《管见良方》。

【组成】木香 大黄(煨) 粉草(炙) 皂角刺(锉，炒)各三钱 瓜蒌子(炒) 青木香 天花粉 黄荆子 穿山甲(地灰炒焦) 白芷各半两

【用法】上为细末。每服二钱，温酒调下。

【主治】痈疖，发背，恶疮，遍身生疮，气不顺，胸膈刺痛，挫气腰疼，肾气发动。

60357 复元通气散

【方源】《局方》卷八(续添诸局经验秘方)。

【异名】复元通圣散(《万氏家抄方》卷三)。

【组成】舶上茴香(炒) 穿山甲(锉，蛤粉

炒,去粉)各二两 南木香(不见火)一两半 延胡索(擦去皮) 白牵牛(炒,取末) 陈皮(去白) 甘草(炒)各一两

【用法】上为细末。每服一大钱,热酒调服。病在上,食后服;病在下,食前服;不饮酒人,煎南木香汤调下。

【主治】①《局方》(续添诸局经验秘方):疮疖痈疽,方作焮赤,初发疼痛,及脓已溃、未溃,小肠气、肾痈、便毒,腰痛气刺,腿膝生疮,及妇人吹奶。②《准绳·类方》:气不宣流或成疮疖,并闪挫腰胁,气滞疼痛。

【备考】本方方名,《准绳·类方》引作"复原通气散"。

60358 复元通气散

【方源】《普济方》卷一八二。

【组成】陈皮 青皮(去白)各二两 白药子一两半(半两炒) 广木香半两 甘草一两八钱(半生半熟) 川山甲一两三钱(酥炙) 牡蛎(烧)半两 乳香半两(另研) 江米五钱 白僵蚕五钱

【用法】上为末。每服三钱,酒调下。病在上,食后服;病在下,食前服。如大便燥,后服通气丸。

【主治】诸风诸气,气滞不通,肢节烦痛,半身不遂,口眼㖞斜,语言蹇涩。

60359 复元通气散

【方源】《普济方》卷一八二。

【组成】柴胡(去白) 桂(去粗皮) 桃仁(去皮尖双仁,麸炒黄) 木香 吴茱萸 干姜(炮) 细辛(去毛叶) 桔梗(锉) 赤茯苓(去黑皮) 芎䓖各三分 大黄(锉,炒)二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,食前以温酒送下。渐加至二十丸。

【功用】和血。内消疮肿。

【主治】诸气涩闭,耳聋头痛,腹皮痈疮无头,一切刺痛、痈肿。

【备考】本方方名,据剂型,当作"复元通气丸"。

60360 复元通气散

【方源】《秘传外科方》。

【异名】复原通气散(《正体类要》卷下)。复元通气汤(《中西医结合治疗骨与关节损伤》)。

【组成】木香 茴香 青皮 川山甲(炙酥) 陈皮 白芷 甘草 漏芦 贝母(去心,姜制)各等分

【用法】上为细末,南酒调服;若为㕮咀,水煎服之亦可。

【主治】①《秘传外科方》:发乳、痈疽及一切肿毒。②《保婴撮要》:打扑伤损作痛及乳痈、便毒初起,或气滞作痛。

【备考】方中漏芦、贝母用量原缺,据《保婴撮要》补。

60361 复元通气散

【方源】《疮疡经验全书》卷二。

【组成】木香 青皮 白芷 贝母 金银花 陈皮 穿山甲(炮) 紫苏 当归 川芎 连翘 甘草节 木通 瓜蒌仁

【用法】内服。

【主治】乳发。

60362 复元通气散

【方源】《医学入门》卷八。

【异名】复元通气汤(《保命歌括》卷十六)。

【组成】陈皮 白丑 甘草 玄胡索各一钱 茴香 穿山甲 木香 当归各一钱半 乳香 没药各五分

【用法】上为末。每服二钱,热酒、白汤任下。

【主治】①《医学入门》:一切气不宣通,瘀血凝滞,周身走痛;并跌坠损伤,或负重挫闪,气滞血分作痛。②《保命歌括》:气疝作痛。

60363 复元通气散

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】青皮 陈皮(去白)各四两 甘草三寸半(炙) 连翘一两

【用法】上为末,热酒调下。

【功用】止痛消肿。

【主治】诸气涩耳聋,腹痈,便痈,疮疽无

头。

60364 复元通气散

《证治宝鉴》卷十一。为《医学发明》卷三“复元活血汤”之异名。见该条。

60365 复元通圣散

《万氏家抄方》卷三。为《局方》卷八（续添诸局经验秘方）“复元通气散”之异名。见该条。

60366 复元通圣散

《医学入门》卷八。为《活法机要》“复元通气散”之异名。见该条。

60367 复方十灰散

【方源】方出《蒲辅周医疗经验》，名见《千家妙方》卷下。

【组成】党参一两　熟地一两　生杜仲三钱　川断三钱　炮姜炭一钱　鹿角霜七钱　十灰散（另包）一钱

【用法】浓煎两次，分两次服。每次入十灰散五分，加入几滴醋同服。

【功用】调和冲任，益气止血。

【主治】冲任不固，崩漏下血。

【方论选录】《千家妙方》：重用党参、熟地益气固肾；加杜仲等调补冲任；用十灰散、炮姜止血塞流，标本同治而收效卓著。

【临证举例】崩漏。杜某，女，47岁，1967年5月25日初诊。月经已来43天未净，量多，色红，夹有血块，伴有轻度浮肿，大小便正常。曾患慢性肾炎及心血管病。经检查已除外肿瘤。舌淡苔薄白腻，脉沉细涩无力。属冲任不固，治宜调和冲任，益气止血。处方：复方十灰散。5月29日复诊：经漏基本已止。色淡，睡眠欠佳，食欲较好，二便正常。舌正苔微腻，脉沉缓。病情基本稳定，继固冲任，原方去炮姜，又进三剂，而收全功。

60368 复方丹参片

【方源】《古今名方》引上海中药制药二厂方。

【组成】丹参750克　三七225克　冰片25克

【用法】依法制片，共制成1000片。每服3片，一日三次。

【功用】活血化瘀，芳香开窍，理气止痛。

【主治】冠心病胸闷，心绞痛。

60369 复方左金丸

【方源】方出《黄文东医案》，名见《千家妙方》。

【组成】川连一钱　吴萸五分　半夏三钱　赤白芍各三钱　制川军二钱　木香三钱　煅瓦楞一两　失笑散四钱（包）

【功用】辛开苦泄，化瘀止痛。

【主治】胃小弯溃疡，气机郁滞，湿热熏蒸，宿瘀阻络。

60370 复方地榆丸

【方源】《农村中草药制剂技术》。

【组成】铁苋菜一斤　马齿苋六两　地榆五两　仙鹤草六两

【用法】铁苋菜、地榆共为细末，马齿苋、仙鹤草煎取适当煎液，共搅拌，再以药液为丸。口服，每次二钱半，一日三至四次。小儿酌减。

【功用】清热解毒，消积止痢。

【主治】细菌性痢疾。

60371 复方地锦片

【方源】《中药制剂手册》引上海中药制药一厂方。

【组成】地锦草一百六十六两四钱　辣蓼一百六十六两四钱　车前草五十四两四钱

【用法】取地锦草、辣蓼各三十三两，车前草十一两，共为细粉。取地锦草等三味下余药料，用煮提法提取二次，合并浓缩为稠膏约七十七两，取地锦草等三味下余药料，用煮提法提取二次，合并浓缩为稠膏约七十七两，取地锦草等细粉，与上项稠膏搅软，制颗粒，压片，包淡红色糖衣（胭脂红、滑石粉各适量）。每服三至六片，温开水送下，一日三次。

【功用】清热解毒，利水。

【主治】细菌性痢疾，肠炎。

60372 复方红砒膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】红砒4克　轻粉4克　雄黄3克

冰片 3 克　液体石蜡 10～20 毫升　凡士林 100 克

【用法】前四味药分别为细粉，混合均匀，加液体石蜡分散后，再加入凡士林，研磨成均匀细腻的软膏 100 克即成。将药膏涂布患处约铜板厚，上敷凡士林纱布一层，干纱布二层，再用绷带包扎。

【主治】银屑病。

60373　复方陀柏散

【方源】《中西医结合皮肤病学》。

【组成】陀柏散加轻粉 3 克

【用法】花生油调敷。

【功用】清热除湿，解毒祛风。

【主治】腋臭，各类湿疹有继发感染者。

60374　复方松塔丸

【方源】《北京市中成药规范》。

【组成】松塔 200 两　生杏仁 50 两　黄豆 40 两　蒲公英 100 两　冰片 2.5 两

【用法】将药材加工洁净。取松塔 40 两，黄豆 40 两　蒲公英 100 两，用水洗净，加入适量清水，加热煮提三次，时间分别为 3 小时、2 小时、1 小时。合并煮提液，过滤沉淀，减压浓缩至比重 1.30～1.35，温度(50℃)的稠膏。取余松塔 160 两，粉碎为细粉，过一百孔罗，生杏仁 50 两，轧成泥状，串入药粉内，过 60 孔罗，兑入冰片二两五钱，混匀。取原粉及稠膏按比例泛为丸，低温干燥，每斤干丸药用滑石粉三两五钱，外用香墨三钱，熬水上衣闯亮。干燥后装入洁净瓶内，加盖。每百粒干重四钱，每瓶内装一两二钱。每次二钱，温开水送服，一日二次。

【功用】定喘止咳。

【主治】老年慢性气管炎。

60375　复方金荞片

【方源】《中药知识手册》。

【组成】开金锁　生干蟾　鱼腥草　百部　穿心莲

【用法】制成片剂。每服 4～6 片，一日四次。

【功用】止咳化痰、抗痨。

【主治】肺结核，结核性胸膜炎，骨结核。

60376　复方胎盘片

【方源】《上海市药品标准》。

【组成】胎盘粉 1.6 千克　麦芽 100 克　党参 400 克　橘皮 100 克　黄耆 400 克

【用法】将胎盘粉、橘皮、麦芽三味各为细粉，过 100 目筛，各取净粉，和匀。再将黄耆、党参二味水煎二次，每次 4 小时，药汁滤过，澄清，混合后浓缩成清膏。然后将白糊精 120 克、饴糖 640 克，与清膏混合成浆，加入上述混合细粉，制成颗粒，干燥，每 100 克干燥颗粒拌加饴糖 5～8 克，润滑剂 1 克，压制成片，片重 0.24 克，外包糖衣即得。口服，每次 4 片，一日三次。

【功用】益精气，健脾胃。

【主治】①《上海市药品标准》：神经衰弱，贫血，消化不良。②《古今名方》：体倦乏力，血虚眩晕，白细胞减少。

60377　复方益母膏

【方源】《中草药验方制剂栽培选编》。

【组成】益母草 400 克　泽兰 100 克　寄生 100 克

【用法】将上述药材先行粉碎，加五倍量的水，煮沸浸渍一小时，滤过，滤渣再加水浸没，煮沸 30 分钟，滤过。收集二次滤液合并，加热浓缩至成膏状，调整重量为 300 克即得。每次一汤匙，口服，一日三次。

【功用】养血调经。

【主治】月经不调，产后流血。

60378　复方益母膏

【方源】《中草药验方制剂栽培选编》。

【组成】益母草 10 千克　寄生 1 千克　风仙花全草 2 株　五味子 150 克　泽兰 1 千克

【用法】将上述药材先行粉碎，加五倍量的水，煮沸浸渍一小时，滤过，滤渣再加水浸没，煮沸 30 分钟，滤过。收集二次滤液合并，加热浓缩至成膏状，调整重量为 300 克即得。口服，每次一汤匙，一日二次。

【功用】养血调经，安神利尿。

【主治】月经不调，产后流血。

60379 **复方桑椹膏**

【方源】《浙江省药品标准》。

【组成】桑椹清膏 125 克　山海螺 250 克　炙甘草 31.25 克　炒冬术 93.75 克　炒白芍 62.5 克　熟地 62.5 克　麦门冬 62.5 克　制黄精 125 克　金樱子肉 93.75 克　夜交藤 62.5 克　女贞子 93.75 克　旱莲草 62.5 克　桔皮 46.875 克　红枣 31.25 克

【用法】除桑椹清膏外，桔皮等十三味酌予切碎，用水煎 2～3 次，至煎出液基本味尽，煎出液分次过滤合并，浓缩成稠膏状，加入烊化的砂糖(17 两)液及桑椹清膏，充分搅拌，再浓缩成稠膏。口服，每次五钱，开水冲眼，一日二三次。

【功用】滋阴补血，调补肝肾。

【主治】血虚阴亏，神经衰弱，头目昏晕，腰背痠痛。

60380 **复方黄杨片**

【方源】《古今名方》引芜湖市中药制药厂方。

【组成】黄杨木 50 克　川芎　青木香　紫丹参浸膏各 37.5 克　细辛　射干各 25 克　栝楼皮　茵陈浸膏各 12.5 克

【用法】黄杨木、射干为细粉；青木香、细辛分别提油，然后将药渣与余药合并煎煮 2 次，取滤液浓缩收膏，再与细粉混合，制片，外包糖衣。每服 2～4 片，一日三次。

【功用】行气活血，祛风湿，解痉止痛。

【主治】风湿痛，胸腹气胀，跌打损伤。慢性冠状动脉供血不足，心功能不全，心肌炎。

60381 **复方黄连散**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】黄连 31 克　青黛 6 克　马牙消 1.5 克　冰片 1.5 克

【用法】上为细末。外用。

【主治】鹅口疮。

60382 **复方蓍草散**

【方源】《新中医》1977；1：38。

【组成】蓍草 300 克　七叶一枝花 180 克　高良姜 180 克　枯矾 210 克　青木香 180 克　肉桂 120 克

【用法】晒干，研粉过 120 目筛即成。每服一钱，一日三四次。(每天早餐后一小时和晚睡前各服一次)，用量可酌情增减。

【功用】暖胃健脾，化腐解毒，止痛消胀，制酸止血，促溃疡愈合。

【主治】溃疡病。

60383 **复方雷榧丸**

【方源】《中医内科临床治疗学》引冷柏枝方。

【组成】生雷丸末 30 克　榧子仁 30 克　苍术 15 克　白术 15 克　皂矾 15 克

【用法】共为细末，水泛小丸，如梧桐子大。每服 9 克，一日二次，开水送服，可连服 7～15 天，不可间断。

【主治】钩虫病。

【方论选录】方中生雷丸，榧子仁杀钩虫；苍术、白术、皂矾健脾土，开化源。

60384 **复老还童丸**

【方源】《普济方》卷二二一引《德生堂方》。

【组成】苁蓉(酒浸)　菟丝子(酒浸)　巴戟(酒浸，去心)　牛膝(去芦，酒浸)各一两　山药　川楝子(盐炒)　蛇床子(炒)　茯神　八角茴香　黄芩　五味子　续断　人参　枳实　槟榔　干姜各一两　丁香(母者佳)　乳香　木香　沉香　白檀各半两

【用法】上为细末，先入井花水一盏和药，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心温酒送下。

【功用】补下元，乌髭须。

60385 **复寿延春丹**

【方源】《普济方》卷一一五。

【组成】人参二两　白茯苓二两　远志(去心)　牛膝(酒浸)　杜仲(炒去丝)　黄耆　菖蒲　当归　苍术(泔浸，去皮)　甘菊花　地骨皮各一两　天麻　半夏(制)　生地黄

熟地黄　益智　萆薢(酒浸)　羌活各半两

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服三五十丸,空心以温酒送下。

【功用】补五脏,分阴阳,止咳嗽,助声音,驻颜色,黑髭发,明耳目,不忘记,添精髓,壮筋骨,美饮食,去一切诸风。

【主治】左瘫右痪,口眼㖞斜,半身不遂。

60386　复原固本丸

【方源】《疯门全书》。

【组成】北枸杞一两　红枣皮一两半　莲花须一两　淮牛膝一两　川续断(上皆酒蒸)一两　拣归身一两半　牡丹皮(二味酒洗)二两　川杜仲一两　光泽泻一两半　川萆薢(土盐水洗)二两　北五味(蜜蒸)一两　白云苓(乳蒸)一两　天门冬(去心)一两半　淮山药(微炒)一两　芡实米(微炒)一两　熟地黄一两　川黄柏一两　败龟版(酒炙)十两　真虎骨(酒炙十次)十两

【用法】将虎骨、龟板二味打碎,用佳酒二十四碗,熬至三四碗,去滓取汁。预将余药为末,入汁内,打糊为丸。每早空心服四钱。

【功用】生气血,扶元神,健筋骨,活经络,润颜色。

【主治】年四十以上,六脉微细,气血衰败。

60387　复原通气散

《正体类要》卷下。为《秘传外科方》"复元通气散"之异名。见该条。

60388　复原通气散

《准绳·类方》卷二。即《局方》卷八(续添诸局经验秘方)"复元通气散,"见该条。

60389　复原通气散

《准绳·疡医》卷四。为《直指》卷二十三"复元通气散"之异名。见该条。

60390　复原通气散

《便览》卷一。为《活法机要》"复元通气散"之异名。见该条。

60391　复方大承气汤

【方源】《中西医结合治疗常见外科急腹症》。

【组成】炒莱菔子 30 克　厚朴　枳实各 15 克　木香 10 克　生军 15～30 克(后下)　芒消 15～30 克(冲服)

【用法】水煎服,或胃管注入,每日 1～2 次。

【主治】痞结型肠梗阻,肠腔积液少者。

60392　复方大柴胡汤

【方源】《医学资料选编》。

【组成】柴胡 12 克　黄芩　枳壳　川楝子　大黄各 9 克　玄胡　白芍各 10 克　蒲公英 15 克　木香　丹参　甘草各 6 克

【功用】和解表里,清泻热结。

【主治】溃疡病穿孔缓解后腹腔感染,腹部有压痛,肠鸣,便燥,身热,脉数,舌苔黄。

60393　复方大陷胸汤

【方源】《急腹症方药新解》。

【组成】大黄 10～20 克　川朴 15～24 克　枳实 10 克　芒消 10～15 克(冲服)　甘遂末 0.9～1.5 克(冲服)

【功用】泻热通下,行气逐水。

【主治】单纯性机械性肠梗阻,肠腔积液较多者,以及因腹腔炎症所致的肠麻痹。

【宜忌】体虚无实邪者忌用。

60394　复方千日红片

【方源】《中药知识手册》。

【组成】千日红　鼠曲草　平地木　四季青

【用法】作片剂。每服 4～5 片,一日三次。

【功用】清热化痰,止咳平喘。

【主治】慢性支气管炎。

60395　复方五加皮汤

【方源】《新医药学杂志》1974;(8):35。

【组成】北五加皮 3～9 克　党参　太子参　茯苓　泽泻各 9 克　车前子　猪苓各 12 克

【功用】《古今名方》:强心健脾,利水消肿。

【主治】慢性充血性心力衰竭所致心悸、气促、尿少、浮肿、脉结代,舌质暗紫者。

【加减】纳呆、恶心,加白术、莱菔子、陈皮、山楂;胸胁胀满,加栝楼皮、薤白、郁金;头痛、

头晕、血压高者，加夏枯草、牛膝、黄芩；有明显瘀血征者，加桃仁、红花、赤芍。

60396 **复方补骨脂酊**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】补骨脂 30 克 菟丝子 20 克 栀子 20 克 75%酒精 200 毫升

【用法】上为粗末，浸于酒精中成酊剂。外用。

【主治】白癜风。

60397 **复方青黛糊剂**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】青黛粉 31 克 黄柏粉 31 克 生甘草粉 31 克 生石膏粉 31 克 薄荷脑(研细末)1.5 克

【用法】上药混合瓶贮，用时香油调成薄糊状。每次用时，洗后揩干，涂上薄薄一层。

【主治】漆性皮炎。

60398 **复方马齿苋洗方**

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】马齿苋四两 蒲公英四两 如意草四两 白矾四钱

【用法】上为粗末，装纱布袋内，加水五至六斤，煮沸 30 分钟。用软毛巾蘸汤溻洗，或溻洗后加热水浸浴。

【功用】清热解毒，除湿止痒。

【主治】多发性疖肿，脓泡疮。

60399 **复方白藓皮煎剂**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】白鲜皮 15 克 赤芍 9 克 赤苓 9 克 炒僵蚕 9 克 银花 15 克 连翘 15 克 蛇床子 9 克 生地 9 克 丹皮 6 克 防风 6 克 白芷 4 克 生甘草 3 克 黄耆 15 克

【用法】水煎服。

【主治】药物性皮炎。

60400 **复方垂盆草糖浆**

【方源】《新医学》1974；(7)：324。

【组成】鲜垂盆草 125 克 平地木 31 克 蔗糖适量

【用法】水煎，制成糖浆 100 毫升。分二次服(一日量)。

【功用】降转氨酶。

【主治】慢性迁延性肝炎。

60401 **复方健脾术苓汤**

【方源】方出《朱仁康临床经验集》，名见《千家妙方》。

【组成】苍白术各 9 克 赤苓 9 克 猪苓 9 克 泽泻 9 克 陈皮 9 克 淮山药 9 克 扁豆衣 9 克 炒薏仁 9 克 萹蓄 9 克 萆薢 9 克 六一散 9 克(包)

【用法】水煎服。

【功用】健脾理湿。

【主治】淋巴管瘤，脾经湿盛，水湿外溢。

60402 **复方消肿通络汤**

【方源】方出《赵炳南临床经验集》，名见《千家妙方》。

【组成】金银花一两 连翘三钱 赤小豆一两 当归三钱 防己五钱 鸡血藤一两 赤芍三钱 牛膝三钱 车前子(包)一两 活血止痛散 1/4 瓶 云南白药一瓶(兑服)

【功用】清热消肿，活血通络。

【主治】急性创伤性关节炎，疼痛肿胀，运动障碍，苔薄白，脉弦滑数。

60403 **复方益气固脱汤**

【方源】方出《关幼波临床经验选》，名见《千家妙方》。

【组成】西洋参 6 克 麦冬 24 克 五味子 12 克 生甘草 10 克 炙麻黄 0.9 克 杏仁 10 克 生石膏 30 克 银花 30 克 板兰根 30 克 生地 10 克 玄参 15 克 天花粉 15 克 知柏各 10 克 瓜蒌 10 克 川贝 10 克 青蒿 10 克 浮小麦 30 克

【用法】兼服安宫牛黄丸 1 丸。

【功用】益气固脱，清热养阴，宣肺开窍。

【主治】感染性多发性神经炎。肺部感染。肺热不清，逆传心包，正气欲脱，高热不退，神志不清，气喘短促，大汗如油，四肢发凉，小便短，大便黑，舌质红无苔，脉数而无力。

60404 **复方祛风通络方**

【方源】方出《关幼波临床经验选》，名见《千家妙方》。

【组成】生耆15克　僵蚕4.5克　全蝎3克　钩藤30克　玄参12克　知柏各10克　桔梗7.5克　蜈蚣4条　滁菊花10克　生地15克　川芎4.5克　赤白芍各12克　当归12克　丹参15克　刺蒺藜10克

【功用】祛风化痰通络，养血平肝。

【主治】脑干脱髓鞘病阴虚阳亢，风痰阻络。头晕头胀，耳鸣，脸面及右肢发麻，震颤，目睛转动不灵活，舌麻言謇，进食不顺利，右腿不能站立，行动困难。

60405　复方清肺止咯汤

【方源】方出《黄文东医案》，名见《千家妙方》。

【组成】桑叶皮各三钱　地骨皮五钱　生甘草三钱　生地五钱　地榆五钱　枇杷叶四钱(包)　炙紫菀五钱　黄芩三钱　黛蛤散五钱(包)

【组成】水煎服，每日一剂。

【功用】平肝清肺，宁络止血。

【主治】支气管扩张咯血，肺有燥热，肝火亢盛，灼伤肺络，迫血妄行，咳嗽痰中带鲜血，胸痛胁胀，急躁易怒，腰痠，月经超前，经临腹痛，鼻干口燥欲饮，舌质红，苔薄腻，脉弦细数。

60406　复方犀角地黄汤

【方源】方出《张伯臾医案》，名见《千家妙方》。

【组成】金银花15克　紫草18克　炒赤芍9克　大生地15克　炒丹皮9克　炒知母9克　木通6克　生米仁18克　白蔻仁2.4克(后下)鲜荷梗一枝　牛黄解毒片一包(分吞)

【功用】清热凉血，解毒化湿。

【主治】红细胞增多症，热毒蕴结血分，挟湿交阻，头晕口热，倦怠乏力，苔白中裂，脉弦细。

60407　复方矮地茶糖浆

【方源】《湖南省中成药规范》。

【组成】矮地茶100克　铁包金100克　金樱子100克　岗梅50克　沙参50克

【用法】将上药锉碎，煮提两次，过滤，滤液合并，浓缩至400毫升时，静置沉淀，取上清液过滤。另取蔗糖88克制成糖浆，加入上清液中，继续浓缩至160毫升即得。口服。每次25毫升，一日二次。

【功用】祛痰止咳。

【主治】慢性及急性气管炎。

60408　复方墨旱莲软膏

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】墨旱莲8千克(干品3千克)

【用法】先将墨旱莲捣烂挤汁(干品煎后浓缩)，置锅内浓缩至500毫升，加明矾75克溶解后，另加苯甲酸5克，调匀备用。下田前涂四肢。

【主治】稻田皮炎。

香

60409　香沥

【方源】《外台》卷三十引《深师方》。

【异名】沉香沥(《圣济总录》卷一三七)。

【组成】柏节　杉节　沉香节　松节各一斤

【用法】上碎如指大，以布囊盛之，令囊注麻油中半食顷，出滤；先取一枚白坩，穿去底，令孔如鸡、鸭卵大，以松叶一小把藉孔上，以坩安着白盐上，以黄土泥坻坩合际，令厚数分毕，以药纳坩中；以生炭着药上使燃，其沥当流入坻中，须燃尽乃开出。取坻中汁以敷疮上，每日二次。

【主治】燥湿癣、瘑疥百疮及白秃、疽、疥、恶疮。

60410　香沥

【方源】《千金翼》卷二十四。

【组成】沉香　松节各一斤

【用法】上破如指大，以布袋盛之，令置麻油中半食久，滤出；取一口瓷坩，穿底，令孔大如鸡子，以松叶一小把藉孔上，以坩安着白碗

上，以黄土泥坩固济，令厚五分，以药纳坩中；以生炭着药上使燃，其沥当流入碗中，燃尽，乃开出坩取汁。以敷疮上，每日二次，兼服小秦艽散。

【主治】燥湿癣、瘑疥百疮及白秃、疽、恶疮。

60411 香油

【方源】《百一》卷九引《四时纂要》。

【组成】蔓荆子三合 香附子三十个（北地者佳） 附子 零陵香 羊踯躅花 旱莲子各一两 葶苈子一两半（上七味锉细，绵裹） 故铧铁半斤（碎，用生铁亦可）

【用法】上用生麻油一大升，浸七日。取以涂发，油干旋添，药气尽即易之。

【主治】头风白屑，头痒发落，头旋妨闷等症。

60412 香茶

【方源】《串雅外编》卷三。

【组成】芽茶二两，麝香一分 硼砂五分 儿茶末一两 诃子肉二钱五分。

【用法】共为末，甘草汤为丸、为片任意。

【主治】痰火症，及口臭口干，生疮。

60413 香粉

【方源】《千金翼》卷五。

【组成】白附子 茯苓 白术 白芷 白敛 白檀各一两，沉香 青木香 鸡舌香 零陵香• 丁香 藿香各二两 麝香一分 粉英六升

【用法】上药各为细末，取色青黑者，贮粉囊中，置大盒子内，以白粉覆之，密闭七日后取之，粉香至盛而色白。如本欲为香粉者，不问香之白黑悉以和粉，粉虽香而色至黑，故必须分别用之，不可悉和之。粉囊以熟帛双线作之。

【功用】令身体百处皆香。

60414 香脯

【方源】《袖珍小儿》卷六。

【异名】香脯散（《准绳·幼科》卷七）。

【组成】精猪肉一两（批薄作片） 腻粉

【用法】上将猪肉于炭火上慢炙，旋铺腻粉令匀成脯。每以少许与吃。如未知吃，且放鼻上自然知吃。

【主治】小儿胃口有毒，刮肠下痢，噤口不食，闭口合眼至重者。

60415 香膏

【方源】《外台》卷二十二引《小品方》。

【组成】白芷 当归 芎䓖 细辛 辛夷 通草 桂心 薰草各三分

【用法】上㕮咀，以苦酒渍一宿，以猪膏一升煎，以白芷色黄成膏，滤去滓。取少许点鼻中，或绵裹纳鼻中。以愈止。

【主治】鼻中窒塞。

60416 香膏

【方源】《外台》卷二十二引《古今录验》。

【异名】纳鼻膏药方（《圣惠》卷三十七）、合膏（《普济方》卷五十六引《圣惠》）。

【组成】当归 芎䓖 青木香 细辛 通草 蕤核仁 白芷各二分

【用法】上切，以羊髓微火煎，白芷色黄成膏，去滓。以小豆许纳鼻中，每日二次。以愈为度。

【主治】鼻中不通利，窒塞者。

60417 香膏

【方源】《千金》卷六。

【异名】当归膏（《圣济总录》卷一一六）。

【组成】当归 薰草 通草 细辛 蕤仁各十八铢 芎䓖 白芷各半两 羊髓四两（猪脂亦得）

【用法】右㕮咀，以微火合煎，三上三下，白芷色黄膏成，去滓。取如小豆大纳鼻中，一日二次。

【主治】鼻不利。

【加减】先患热后鼻中生赤烂疮者，去当归、细辛，加黄芩、栀子。

60418 香鳗

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】肥鳗一斤 白薇半两 小茴香三钱 甘草一钱 薏仁五钱 榧子十个（去壳）

【用法】上于砂锅内用水煮烂，加五味和

之。乘饥时饱餐一顿,不可少留些须,以食尽为度。不必再进饭食,亦半日不可用茶水。

【主治】肺痨。

60419　香儿粉

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】麝香 0.3 克　儿茶 15 克　轻粉 6 克　冰片 6 克

【用法】配成软膏。外用。

【主治】麻风溃疡。

60420　香儿散

【方源】方出《种杏仙方》卷二,名见《东医宝鉴·内景篇》卷四。

【组成】真麝五分　葱白一根(捣取汁)　孩儿茶三钱半　琥珀二分半

【用法】上药各为细末。用百沸汤调前药,入葱汁,空心服。

【主治】小便淋血或砂膏如条,其痛如刀割。

60421　香云散

《观聚方要补》卷十引《医林方》。为《博济》卷四"真珠散"之异名。见该条。

60422　香中丸

【方源】《梅氏验方新编》卷二。

【组成】陈香橼(去瓤)四两　真人中白三两

【用法】上为末。每服二钱,用猪苓、泽泻煎汤,空心送下。

【主治】鼓胀发肿。

【宜忌】忌盐三月。

【备考】本方方名,据剂型,当作"香中散"。

60423　香气散

《理瀹》。为原书同卷"郁金散"之异名。见该条。

60424　香牛饮

【方源】《得效》卷五。

【组成】牛涎(先以犒牛用绳挂开牛口,以净布巾抹令口舌净,却拖牛舌出来,候有涎出,以碗盛之)　麝香一捻

【用法】每服用八分盏为一服,研好麝香末打匀,却以银盏盪令温,以以绢帛束缚中脘胃口令极紧,候气喘,乘热解开,随气喘一二口便服,药时先对病人说煮白粥恼烦之。服药罢,随与粥吃。神效。

【主治】哽噎,翻胃,吐食。

60425　香牛散

《普济方》卷二四七。为《杨氏家藏方》卷十"香壳散"之异名。见该条。

60426　香乌丸

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】透明乳香　川乌头尖各等分。

【用法】上滴水为丸,如梧桐子大。安在蛀牙窍子内。噤定须是食顷,涎多吐出,温水漱口。如无窍子,旋用药末擦敷牙缝,噤定食顷,涎多吐出,温水漱口。如此用药三两次即愈。

【主治】风蛀牙疼不可忍。

60427　香艾丸

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】艾叶(炒)　陈橘皮(汤浸去白,焙)各等分

【用法】上为末,酒煮烂饭为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空心盐汤送下。

【主治】气痢腹痛,睡卧不安。

60428　香艾丸

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】净香附一斤　干艾叶四两

【用法】上瓦器盛之,用醇醋浸经七日,于净锅内用火煮令醋尽,就炒干为细末,仍用醋煮粳米粉为糊,入乳钵和匀,小儿丸如萝卜子大,大人丸如梧桐子大。每服三十至五十丸,或七十丸,汤、酒、米饮随意送下,不拘时候。

【功用】小儿常服,惊积自除,色泽殊异,手足肥健,脾胃调和;兼理男子、妇人诸虚不足,生气血,暖中焦,固养精神,消进饮食;男子服之身体强壮,寒暑耐安;妇人投之百病不生,经脉通顺。

【加减】妇人血气素虚无生育者,加琥珀二两,同作丸服,粒数汤使皆依前法,或用大枣汤送下。

60429 香平丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】香附 黑牵牛 三棱 莪术 干生姜各三两 平胃散一斤

【用法】上为末，醋糊为丸，或入鸭头鲜血为丸，如梧桐子大。生姜汤送下。

【主治】水肿、气肿、血肿。

60430 香术丸

【方源】《史载之方》卷下。

【组成】白术一两（炒） 丁香一钱半 半夏 木香（炮） 蓬莪术各一分 防风 麦蘖（炒） 神曲（炒）各半两 茯苓半两 甘草（炙）一分

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每朝米汤送下三十丸，食后服。

【功用】进饮食。

60431 香术丸

【方源】《普济方》卷十四引《护命方》。

【异名】苍术丸（《圣济总录》卷四十一）。

【组成】苍术（米泔浸去皮，焙） 芎䓖 防风（去叉）各一两 五味子 黄耆（锉细） 当归（切，焙）各半两 硫黄（研）一两。

【用法】上先以六味为细末，再入硫黄末，研匀，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前盐汤米饮送下。一方炼蜜为丸。

【主治】肝脏虚，客邪攻之，真气微弱，不能主血，脉气微细，大便失血。

60432 香术丸

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】白术一斤（糯米泔浸三日）

【用法】上锉细，以慢火炒焦为末，取干地黄半斤（净洗），用碗盛，于甑上蒸烂细研，入白术末，和匀，如硬，滴好酒少许，为丸如梧桐子大，焙干。每服十五丸，加至二十丸，空心粥饮送下。

【主治】肠风痔漏，脱肛泻血，面色萎黄，积年不愈。

60433 香术丸

【方源】《普济方》卷三十九引《余居士选奇方》。

【组成】苍术 厚朴（姜汁炙） 陈皮各一两 生好硫黄二两（用萝卜煎沸汤洗三两次）。

【用法】上为末，浸蒸饼糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，米汤送下，一日一次。

【主治】腹胀痛，脏腑秘。

60434 香术丸

【方源】《赤水玄珠》卷十五。

【组成】苍术半斤（米泔水浸一宿，晒干，用生姜半斤，葱白四两，捣炒苍术，干则去葱姜不用） 茴香半斤（用生姜汁四两，浸一二宿，后用盐炒干） 吴茱萸（汤泡，炒）四两

【用法】上为末，捣葱白成膏，为丸如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒或盐汤送下。

【主治】寒湿成疝，肾肿疼痛。

60435 香术丸

【方源】《回春》卷六。

【组成】香附（醋浸煮干）八两 苍术（米泔浸）四两 陈皮 当归（酒洗） 川芎 白芍（酒炒） 熟地黄（姜汁、酒浸，焙）各二两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【主治】妇人白带，脐腹胀痛。

60436 香术汤

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】苍术（米泔浸一宿，切，焙）二两 陈橘皮（汤浸去白，焙） 防风 麻黄（去根节，汤煮，掠去沫，焙干） 当归（切，焙） 桂（去粗皮） 甘草（炙）各一两 白茯苓（去黑皮） 吴茱萸（洗，焙干炒） 人参 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 羌活（去芦头）各半两。

【用法】上除桂外锉碎，慢火炒黄，入桂，同为粗末。每服三钱匕，水一盏，加葱白一寸，生姜二片，同煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】发汗。

【主治】伤寒二三日，头痛肌热，烦躁不解，四肢倦痛。

60437 香术散

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】木香　人参(去芦头)　白术　白茯苓(去皮)　草豆蔻仁　陈橘皮(去白)　肉桂(去粗皮)　枳壳(去瓤,麸炒)各半两　细辛(去叶土)一分　神曲一两(炒)

【用法】上为细末。每服三钱,水一盏,加生姜三片,盐少许,同煎至七分,空心热服。

【功用】和脾胃,养三焦,美饮食,化痰饮,破滞气。

【备考】《普济方》有诃子。

60438　香术散

【方源】《妇人良方》卷十二。

【异名】香莪散(《济阴纲目》卷八)。

【组成】广中莪术一两(煨)　丁香半两　粉草一分

【用法】上为细末。空心盐汤点服一大钱,觉胸中如物按下之状。

【主治】妊娠五个月以后,因喜怒忧虑过度,饮食失节,以致胸腹间气刺满痛,或肠鸣,呕逆减食。

【临床举例】①妊娠心腹痛　《妇人良方》:蔡元度宠人有子,夫人怒欲逐之,遂病。医官王师处此方,三服而愈,后用累验。②妊娠恶阻　《普济方》:一妇患妊娠呕吐不止,粥药不下,众医袖手,吉安医官,用以此药,一服见效。后以治心脾疼痛呕逆之证,不问男女服之,良验。

60439　香甘散

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】香附　甘草各一两

【用法】上为末。每服三钱,白汤送下。

【主治】因怒所致诸痛。

60440　香石散

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】丁香　滑石　舶上硫黄　白芍药　甘草各等分。

【用法】上为末。每服一钱,米饮调下。

【主治】小儿伏热中暑,烦躁发渴,泄泻,小便不利,及吐泻无时。

60441　香龙散

【方源】《续名家方选》。

【组成】蝮蛇一钱　鸡舌香二分。

【用法】上为细末。临卧服。凡自七岁至十岁,每服五分;自十岁至十五岁,随年壮每增一分;十五岁以上,每服一钱,温酒送下;恶酒者白汤亦佳。不过二十四日而愈。

【主治】遗溺。

60442　香归丸

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】人参四两　沉香五两　当归　白芍　熟地　川芎　蒲黄　香附　乌药各二两　白茯苓一两

【用法】水煎服。

【主治】产后一切经脉不行,脐腹疼痛,面色痿黄,心怯乏力,腹胀胁痛,头晕恶心,身热,饮食少减,自汗羸瘦,积聚癥瘕。

【宜忌】服时须避风寒,绝欲耐气,戒沐浴,忌食生冷油面。

【备考】本方方名,据剂型,当作“香归汤”。

60443　香归饮

【方源】《普济方》卷三二二。

【组成】木香(不见火)　人参　牡丹皮　白芍药　干姜(炮)　官桂　熟地黄　丁香(不见火)　香附子(炒去毛)　藿香　厚朴(姜制)　茯苓(去皮)　缩砂仁　莪术(炮)　白芷　当归　沉香　青皮(去瓤)　白檀各一两

【用法】上为粗末。每服四钱,水一大盏半,加生姜三片,煎至一盏,食前温服,滓再煎服。

【功用】调顺荣卫,通利三焦,温暖五脏,调和饮食,滋血顺气,疏风益损。

【主治】妇人营卫不调,气血不顺,或气盛血弱,经脉不匀,或前或后,或多或少,临行腹痛,淋沥不绝,身体无力,四肢倦怠,筋骨烦疼,面色萎黄,不思饮食,腹肚膨胀。

60444　香归饮

《郑氏家传女科万金方》卷一。即原书“七气汤”加归尾、川芎。见该条。

60445　香归饮

【方源】《女科指南》。

【组成】藿香 青皮 陈皮各一钱 莪术 三棱 益智仁各一钱半 赤芍一钱 桔梗六钱 官桂七分 甘草三分 香附二钱 半夏 乌药各一钱 归尾一钱

【用法】加生姜五片，水煎服。

【主治】产后恶露上攻，败血冲胃，饱闷，恶心呕吐。

60446 **香甲丸**

【方源】《普济方》卷二二九引《护命》。

【组成】川楝子十个（炒） 葫芦巴一分 上茴香一两 附子一个（炮，去皮脐） 柴胡半两 宣连半两 鳖甲二两（醋炙令黄）

【用法】上为末，煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五丸，茶、酒任下。

【主治】男子热劳，四肢无力，手足浑身壮热，不思饮食，口苦舌干，夜梦鬼交，多饶惊魇。

60447 **香甲丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十一引《张氏家传》。

【组成】柴胡 生干地黄 荆三棱各三分 鳖甲（醋炙黄） 神曲（炒） 杏仁 熟干地黄 麦糵（炒）各一两 牛膝 木香 姜黄 当归各半两 白术 芎各一分。

【用法】上为细末，白面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心清茶送下；米饮亦得。

【功用】健脾胃，畅神气，充肌肤，泽颜色。

【主治】男子、妇人、童男、室女气血虚疏，肌肤消瘦，百节痛，潮作温，五心烦热，四肢逆冷，不思饮食，中满气滞，妇人经血凝涩。

60448 **香甲丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十六引《庄氏家传》。

【组成】木香一分 鳖甲 （去裙襕，醋炙） 槟榔 使君子（用肉） 柴胡（去芦） 黄连（去须）各半两

【用法】上为末，豮猪胆汁为丸，如绿豆大。每服二十丸，日中、临卧米饮送下。

【功用】轻骨长肌。

【主治】小儿疳积。潮热盗汗，羸瘦烦渴，手足心热，多汗无力。

60449 **香甲丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】鳖甲（醋浸一宿，蘸醋炙令黄色）三两 荆三棱（大者，锉细，醋浸三日，焙干）三两 干漆（捣碎，炒烟出，取末）三两 没药三分（别研） 木香 肉桂（去粗皮） 补骨脂（微炒） 干姜（炮） 槟榔 细松烟墨各半两 硇砂四钱（别研）

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，淡醋汤送下，不拘时候。

【主治】妇人血海虚冷，久积癥癖，心腹胀痛，胸膈注闷，及月候不调，产后蓐劳瘦瘁。

60450 **香甲丸**

《普济方》卷三九〇。为《幼幼新书》卷二十引张涣方“沉香鳖甲丹”之异名。见该条。

60451 **香甲汤**

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【异名】香甲煮散（原书卷八十九）。

【组成】沉香（锉） 青木香 人参 白茯苓（去黑皮） 柴胡（去苗） 槟榔（锉） 桂（去粗皮） 黄耆（锉） 赤芍药 山芋 甘草（炙，锉）各半两 干姜（炮）一分 熟干地黄（焙） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉） 白术 鳖甲（去裙襕，以童便浸，炙）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜一枣大（拍碎），大枣二枚（去核），煎至七分，去滓，食后良久温服，每日三次。

【主治】气劳。不思饮食，身体疼痛，胸膈妨闷，四肢烦热。

60452 **香甲汤**

《圣济总录》卷一五〇。为《博济》卷四“香甲散”之异名。见该条。

60453 **香甲汤**

【方源】《幼幼新书》卷二十四引《医方妙选》。

【组成】沉香 鳖甲（涂酥炙令黄，去裙襕）

牛蒡子(微炒)　安息香　诃黎勒皮(炒)　乳香(研)各半两　漏芦一两

【用法】上为细末,同乳香拌匀。每服一钱,以水八分,加人参少许,煎取四分,去滓,放温服。

【功用】《普济方》:截疳辟邪。

【主治】①《幼幼新书》:无辜疳癖。②《卫生总微》:小儿一切诸疳,羸瘦不痢。

60454　**香甲散**

【方源】《博济》卷四。

【异名】香甲汤(《圣济总录》卷一五〇)

【组成】木香三分　鳖甲(去皮肉,醋炙令香)二两　牡丹皮　赤芍药　陈橘皮(去白)　官桂(去皮)　人参　茯苓　熟干地黄　秦艽　柴胡(去苗)　白术　当归(炒)　黑附子(炮制,去皮脐)各一两　干姜三分(炮制)　甘草半两(炙)

【用法】上为末。每服二钱,以水一盏,加生姜三片,大枣二枚,同煎至七分,去滓,稍热服。

【主治】妇人血气虚劳,四肢少力,肌肉黄瘦,多困减食,遍体疲疼,真邪相击,心腹撮痛。

【加减】如烦渴心躁,加乌梅一两(为末)。

60455　**香甲散**

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】青橘皮(汤浸去白,焙)一两　甘草(炙)二两　芎䓖四两　甘菊花半斤

【用法】上为散。每服二钱匕,沸汤调下,不拘时候。

【主治】风毒上攻头目,痛彻眉骨,眼渐昏暗。

60456　**香甲散**

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】甘菊花二两　芎䓖一两　甘草(生用)　青橘皮(汤浸去白,焙)　檀香(锉)各半两

【用法】上为散。每服二钱匕,沸汤入盐少许点服,不拘时候。

【主治】风热头目疼痛,连绕额角。

60457　**香甲散**

【方源】《幼幼新书》卷十七引张涣方。

【组成】鳖甲(酥炙黄,去裙襕)　木香各一两　川大黄(微炒)　陈橘皮(去白,焙干)　当归(洗,焙干)　柴胡(去苗)　知母　甘草(炙)各半两　槟榔三枚

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,加生姜二片,煎至六分,去滓温服。

【主治】小儿寒热往来,肌瘦。

60458　**香甲散**

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】鳖甲　常山　柴胡各三分　麦糵　神曲各一两　枳实　荆三棱各半两　人参　藿香叶各一两　甘松三分　黄橘皮(不去白)　厚朴各一两　甘草三分　槟榔一枚　茯苓三分　半夏　桔梗各一两　大腹皮　木香各半两　乌梅七个

【用法】上为粗末,水煎服。患劳气者,与童便、酒、桃李枝同煎三钱,去滓热服。

【主治】一切劳疟,四肢无力,浑身疼痛,脾胃不和。

60459　**香甲散**

【方源】《妇人良方》卷五。

【组成】鳖甲三两(醋浸去裙,炙黄,又入醋蘸,炙七次)　当归　木香　人参　羌活　川芎　沉香　肉豆蔻　酸枣仁　附子　槟榔　大腹子各半两　北柴胡半两　厚朴　川牛膝　白茯苓　秦艽各一两　桂心半两

【用法】上㕮咀。每服五钱,以水一盏,加生姜三片,乌梅一个,煎至八分,去滓,空心温服,一日三次。

【功用】久服驻颜。

【主治】热病后虚劳,或四肢倦怠,脚手疼痛,饮食无味,肌肤黄瘦,或热疟盗汗,头晕虚烦。

【宜忌】忌生冷、面食、鸡肉、酢酱之类。

60460　**香白丸**

【方源】《得效》卷四。

【异名】白香丸（《普济方》卷二〇六）。

【组成】青州白丸子 青木香丸

【用法】上各三十丸。生姜汤吞下。

【主治】气不顺，痰涎壅盛，呕吐不止。

60461 **香瓜丸**

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】大黄瓜（黄色者）一个（去瓤） 川大黄（湿纸裹煨至纸焦） 胡黄连 柴胡（去芦） 鳖甲（醋炙黄） 芦荟 青皮 黄柏各等分。

【用法】上除黄瓜外，同为细末，将黄瓜割去头，填入诸药置满，却盖口，用杖子插定，慢火内煨熟，面糊为丸，如绿豆大。每服二三丸，食后冷浆水或新水送下；大者五、七丸至十丸。

【主治】①《小儿药证直诀》：遍身汗出。②《普济方》：小儿疳黄，盗汗，骨蒸潮热，腹大肌瘦。

【备考】方中用量原缺，据聚珍本补。聚珍本有黄连。

60462 **香瓜汤**

【方源】方出《百一》卷六引宇文尚书方，名见《普济方》卷二〇九。

【组成】干木瓜 藿香叶 良姜各半两

【用法】上为粗末，分作二服。每服用水二大盏，煎至一盏，空心食前服，并滓再煎一服。

【主治】吐泻。

60463 **香发散**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】零陵草一两 辛夷五钱 玫瑰花五钱 檀香六钱 川锦纹四钱 甘草四钱 粉丹皮四钱 山奈三钱 公丁香三钱 细辛三钱 苏合油三钱 白芷三两

【用法】上为细末，用苏合油拌匀，晾干，再研为细末。用时掺匀发上，再篦去。发有油腻，勿用水洗，将药掺上一篦即净。

【功用】发落重生，至老不白。

【方论选录】本方大都为性温气厚之品，殆取通窍、辟秽与温养之义，既可香发，又可防白。其中零陵草即《山海经》中之薰草、《开宝本草》中之香草，《名医别录》云可“去臭恶气”。山奈于《本草纲目》则有：“山奈生山中，人家栽之，根叶皆如生姜，作樟木香气”之说。辛夷于《名医别录》云可“生须发”。檀香、细辛、白芷或是取其香性。之所以加川锦纹与粉丹皮，或用为避免过于温燥。

60464 **香地膏**

【方源】方出《本事》卷六，名见《卫生鸿宝》卷六。

【组成】生地黄（研如泥成膏） 木香（细末）

【用法】上以地黄膏随肿大小摊于纸上，掺木香末一层，又再摊地黄。贴肿上。不过三五次即愈。

【功用】内消伤肿。

【主治】打扑伤损及一切痈肿未破。

【临证举例】跌打损伤 宋人许元公，赴省试卷，骑马于途中跌伤，致右臂臼脱，神昏已不觉痛。后用香地膏封其肿黯处，至夜中方省，达旦已疼止。翌日至，悉去其封药，损处已白，其瘀血青黯已移在臂臼之上，如是数日易之，其肿黯直至肩背，于是用药之下，泻黑血一二升，三五日如旧，臂亦不痛，遂得赴试。

60465 **香朴丸**

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】沉香（锉）二两 茴香子（炒） 二两 厚朴（去粗皮）五两 附子（去皮脐，生用）二两 蜀椒（取红）二两

【用法】上除椒红、沉香、茴香子外，用浆水六升，青盐三两，生姜三两（切作片子） 同于银锅中煮令水尽，晒干，加椒红、沉香、茴香子，为细末，以水浸炊饼为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【主治】脾胃气虚弱，面黄肌瘦，小便频数，脐腹疼痛，不能饮食。

60466 **香朴丸**

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】厚朴 生姜各一斤 大枣一百个

半夏半斤　陈皮二两

上用水二斗，煮尽水，如大枣先软，即去皮核，余直至水尽，漉出焙干，加：

人参　白术　白茯苓各二两

【用法】上为细末，以枣肉为丸，如梧桐子大。每服三五丸，米饮送下。

【主治】肺胃虚寒，久冷不除，四时往来，动作咳嗽，中脘气痞，气道不利，饮食进退，肌肉不泽，多倦乏力，恶怕风寒，鼻中清涕，喘出清痰，谷饮不消，脏腑不调。

60467　香朴丸

【方源】《三因》卷十一。

【组成】厚朴五两(姜汁制，炒)　白术三两　茴香(炒)　陈皮各三两　诃子(炮，去核)　赤石脂(煅)各一两半

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空腹米汤送下。

【功用】常服暖肠胃。

【主治】肠胃虚冷，泄泻注下无度，脾虚气闭，不进饮食。

60468　香朴丸

《永类钤方》卷二十一。为《活幼口议》卷十九“正气丸”之异名。见该条。

60469　香朴丸

《嵩崖尊生》卷七。即《回春》卷三“香朴汤”改为丸剂。见该条。

60470　香朴汤

【方源】《百一》卷二。

【组成】草果　厚朴(姜制)　陈皮各二钱　良姜四钱　甘草(炙)　川姜(炮)　白术各一钱

【用法】上为粗末。每服三钱，以水一盏，加生姜三片，大枣一个，同煎至七分，去滓热服，不拘时候。

【主治】脾胃病。

【加减】有气者，加木香二钱。

60471　香朴汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】厚朴(姜炒)一两　大附子(炮，去皮脐)七钱半　木香三钱

【用法】上锉。加生姜七片，大枣一枚，水煎服。

【主治】老人中寒下虚，心腹膨胀，不喜饮食，脉浮迟而弱，此名寒胀。

【备考】本方改为丸剂，名香朴丸(见《嵩崖尊生》)。

60472　香朴散

【方源】《医方类聚》卷一〇七引《神巧万全方》。

【组成】厚朴(姜汁炙)　陈橘皮　人参　白术　干木瓜各一两　干姜(炮)　甘草(炙)各半两

【用法】上为末。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎，去滓服。

【主治】霍乱吐逆及利，并脚转筋。

60473　香朴散

【方源】《博济》卷四。

【组成】厚朴一两　木香一分　麦蘖一分(炒)　神曲一分(炒)　青皮(去白)一分　陈皮(去白)一分

【用法】上为细散。每服半钱，温水调下。

【功用】和气止泻，止疼痛。

【主治】①《博济》：小儿脾痛及腹肋刺痛，不思饮食。②《圣济总录》：小儿脾胃气弱，乳食迟化，宿苔成积，久而不消。

60474　香朴散

【方源】《幼幼新书》卷二十七引张涣方。

【组成】丁香　麦门冬(去心)各半两　厚朴(去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟)　人参(去芦头)各一两

【用法】上为细末。每服一钱，以水一小盏，加生姜二片，大枣一枚，同煎至五分，去滓温服。

【功用】调冷热。

【主治】小儿呕吐。

60475　香朴散

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】丁香　当归(洗，焙)各一分　厚朴

(去粗皮,生姜汁制)　草豆蔻　人参(去芦头)　白术　甘草(炙)各半两　白石脂一两(别研)

【用法】上为细末。每服半钱,乳食前煎枣汤调下。

【主治】小儿下利青白,腹中作痛,面无颜色,四肢瘦瘁,不思饮食。

60476　**香朴散**

《普济方》卷三九六。为《圣惠》卷九十三“丁香散”之异名。见该条。

60477　**香朴散**

【方源】《保婴撮要》卷六。

【组成】藿香叶　陈皮　厚朴(姜汁制)各七钱　半夏一两(汤泡七次)　甘草(炙)一钱

【用法】每服三钱,加生姜、大枣,水煎服。

【主治】积冷呕吐。

【加减】泻甚,加木香、肉豆蔻。

【备考】本方原名香附散,但方中无香附,据《景岳全书》改。

60478　**香芎丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】芎䓖　苍术(米泔浸一宿,切,焙)　枸杞子　荆芥穗各一两　莎草根(炒去毛)　细辛(去苗叶)　蝉壳(洗,焙)　菊花　决明子　旋覆花　石膏(碎)　甘草(炙)各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,腊茶嚼下,不拘时候。

【主治】风毒冲目,赤涩痒痛。

60479　**香芎丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】川芎十两　天麻(去苗)一两　细辛(去叶土)半两　荜茇二钱半　甘草二两(炙)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每一两作十丸。每服一丸,食后细嚼,荆芥汤送下。

【主治】风气上攻,头目昏痛,身体倦怠。

60480　**香芎丸**

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】净香附(盐水炒)　川芎　赤茯苓(去皮)各半两　海金砂　滑石各一两　枳壳(水浸润,去壳,锉片,麦麸炒微黄)　泽泻(去粗皮)　石苇(去毛梗,取薄叶)　槟榔(不过火)各二钱半

【用法】上为末,糯米粉煮为清糊,为丸如麻子大。每服三十三丸至五十五丸,或七十七丸,空心用麦门冬煮水送下。若小便涩痛,三五点滴者,取长江顺流水,用火微温,入盐少许调匀,空心咽服。

【主治】①《活幼心书》:小儿诸淋证。②《片玉心书》:小肠受气,客于膀胱,销烁肾水,水道涩而不利,小便涩痛。

60481　**香芎汤**

【方源】《伤寒微旨论》卷上。

【组成】川芎一分　石膏二两　升麻三分　甘草半两　厚朴半两

【用法】上为末。每服三钱,水一盏,煎至七分,去滓温服。芒种以后立秋以前用之。

【主治】病人中风,两手脉浮而缓,或伤寒阴盛,寸脉力小,尺脉力大,恶风不自汗者。

【加减】如三五服后寸脉力尚小,加细辛二分。

60482　**香芎汤**

《圣济总录》卷十七。为《博济》卷二“香芎散”之异名。见该条。

60483　**香芎汤**

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【异名】香芎散(《御药院方》卷九)。

【组成】芎䓖　羌活(去芦头)　细辛(去苗叶)　防风(去叉)　莽草　郁李仁(去皮,研)各半两

【用法】上为粗末。每用五钱匕,以水一盏半,煎三五沸,热漱冷吐。

【主治】风壅齿痛不可忍,或牙齿动摇,并口内生疮者。

60484　**香芎汤**

【方源】《云岐子脉诀》。

【组成】香附子一两半　白芍药　当归各一两　芎半两

【用法】上为粗末。水煎一两,食前服。

【主治】败血不止,面色无光,脉微。

60485　**香芎油**

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】秦椒　香白芷　川芎各一两　蔓荆子　附子　零陵香各半两

【用法】上锉细,用绵裹,以生麻油一斤,于瓷器内浸三七日。涂发稀少处。不可滴在面上。

【主治】头风发落不生。

60486　**香芎散**

【方源】《博济》卷二。

【异名】香芎汤(《圣济总录》卷十七)。

【组成】旋覆花一两　细辛一两(去叶)　川芎二两　甘草半两(炙)　独活　羌活各半两　皂角二挺(烧存性)

【用法】上为细末。每服一大钱,水一盏,煎至六分,食后、临卧热服。

【功用】利膈,化痰涎。

【主治】上焦风壅,中脘有痰,头目昏暗,心烦口干。

60487　**香芎散**

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】芎䓖　荆芥穗　白芷　槐蛾　莎草根(炒去毛)　甘草(炙,锉)各等分。

【用法】上为散。每服一钱匕,茶酒调下,一日三次。

【主治】脑风。邪气留客,头痛久不已。

60488　**香芎散**

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】芎䓖　独活　旋覆花　藁本(去苗)　细辛(去苗)　蔓荆子各一两　石膏(研)　甘草(炙)　荆芥穗各半两

【用法】上为末。每服三钱,以水一盏,加生姜三片,同煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】肝虚血弱,风邪乃生。头晕目眩,不能俯仰,头重不能举,目不能开,开则不能视物,或身如在舟车上,是谓徇蒙招尤,目瞑耳聋,下实上虚,过在足少阳、厥阴,左手关脉虚弦。

60489　**香芎散**

【方源】《中藏经·附录》。

【组成】香附子半斤(炒去毛)　川芎三两　甘草二两　石膏一两(研)

【用法】上为细末。每服一钱,食后腊茶、荆芥汤点服。

【主治】一切头风。

60490　**香芎散**

【方源】《传信适用方》卷一。

【组成】香附子(炒,去皮)六两　川芎　香白芷　甘草(炙)各二两　藿香叶四两　石膏(研如粉)三两

【用法】上为细末。每服一大钱,热茶调下,不拘时候。

【主治】感寒伤风,鼻塞头痛,及时行瘟疫。

60491　**香芎散**

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】香白芷　菖蒲各三分(并炒)　川芎　甘草(炙)各一分　川乌头(炮去皮脐)　香附子各二分(去毛)

【用法】上为细末。每服二钱,以水一盏,加生姜三片,煎至六分,食后微温服。

【主治】头风。

60492　**香芎散**

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】贯芎　香附子(炒)　石膏(乱纹者良,水飞)　白芷　甘草　薄荷各一两(一方川乌头半两,去脐皮)

【用法】上为细末。每服二钱,温酒或茶清调下。

【主治】偏正头风。

60493　**香芎散**

《御药院方》卷九。为《圣济总录》卷一二〇"香芎汤"之异名。见该条。

60494　**香芎散**

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】香附二两(炒去毛)　川芎　甘草一两(炙)　石膏半两　细辛　防风　草乌

川乌 白芷 荆芥 羌活

【用法】水煎服。

【主治】一切头风。

【备考】方中细辛以下用量原缺。

60495 香曲散

【方源】《普济方》卷一七二。

【组成】麦曲

【用法】上熬曲微香为末。每服方寸匕。须大麦生曲佳，无曲以蘖亦得。

【主治】食过饱烦闷，但欲卧而腹胀。

60496 香肉丸

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】木香 肉豆蔻各等分（并裹面煨，令面焦为度）

【用法】上面糊为丸，如小豆大，白汤送下；若作末，白水煎亦可；咳嗽热服。

【主治】小儿吐泻不定，兼咳嗽。

60497 香朱散

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】香白芷一两（锉，为细末） 朱砂一钱（研细）

【用法】上为一处同和，每服一钱，浓煎小麦汤调下。

【主治】小儿盗汗。

60498 香朱散

【方源】《解围元薮》卷四。

【组成】木香 朱砂 车米 赤石脂（煅） 东丹各等分。

【用法】上为细末。先以茶叶、川椒煎汤洗净掺上，外用绵纸以面糊贴七八层，不数日内长平。

【主治】大麻风，足底穿烂者。

60499 香汗丸

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】牛黄（研细） 麝香（研细） 朱砂（研细） 龙脑（研细） 干蝎（微炒） 鹿角胶（捣碎，炒令黄燥） 白僵蚕（微炒）各一分 白花蛇肉（涂酥炙微黄） 白附子（炮裂） 白蒺藜 天麻 赤茯苓 白芷 羌活 独活 蔓荆子 麻黄（去根节） 汉防己 木香 乌蛇肉（涂酥，炙微黄） 槟榔 藁本 防风（去芦头） 芎䓖 当归各一两

【用法】上为末，入研了药，更研令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，以温酒嚼下。服经一月，汗出皆香，经一百日，洗面水自香。凡有风气，随汗而出。如是中风者，薄荷酒研下五丸。

【主治】一切风。

60500 香汗散

【方源】《本草纲目》卷十三引《杏林摘要》。

【组成】马蹄香

【用法】上为末。每服一钱，热酒调下。少顷饮热茶一碗催之，出汗即愈。

【主治】风寒头痛。伤风伤寒，初觉头痛发热者。

60501 香红饮

【方源】《医家心法》。

【组成】人参 炙甘草 当归各二钱 香附 红花各半钱 生姜 （一本无甘草，用益母草二钱）

【主治】疟疾，发在酉时者。

60502 香麦汤

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】丁香三粒 广皮一钱 麦芽三钱（炒）

【用法】水煎服。

【主治】哯乳。直出而不留，如屋漏。

60503 香豆散

【方源】《幼幼新书》卷二十七引张涣方。

【异名】人参豆蔻散（《传信适用方》卷下）。

【组成】藿香叶 肉豆蔻各一两 白扁豆 人参各半两 甘草一分（炙）

【用法】上为细末。每服一钱，水八分一盏，加生姜二片，煎至四分，去滓温服。

【主治】小儿霍乱烦渴。

60504 香壳丸

【方源】《宣明论》卷十三。

【组成】木香 黄柏各三钱 枳壳（去瓤，

炒) 厚朴各半两 黄连一两 猬皮一个(烧) 当归四钱 荆芥穗三钱

【用法】上为末,面糊为丸,如梧桐子大。每服二三十丸,食前温水送下,一日三次。

【主治】湿热内甚,因而饱食,肠癖成痔,久而成瘘。

60505 香壳丸

《玉机微义》卷二十。为《济生》卷四"香棱丸"之异名。见该条。

60506 香壳丸

【方源】《便览》卷二。

【组成】青皮 陈皮各四两 萝卜子(炒) 木香 三棱 莪术 神曲 麦芽各一两 枳壳二两 半夏二两半 香附一两半 槟榔 山楂 草果各一两 枳实(麸炒)二两 巴豆二十粒

【用法】上为末,用水加生姜汁二两为丸。量老幼虚实,用温水送下十丸至二三十丸。

【功用】消食化气,醒脾去积,消痰。

【主治】食积。

【加减】膈痛,加乳香、没药各二钱。

【备考】本方改为散剂,名"香壳散"(见《济阳纲目》)。

60507 香壳汤

【方源】《明医指掌》卷九。

【异名】香壳散(《类证治裁》卷八)。

【组成】香附五钱(炒) 枳壳四钱(炒)

【用法】上为末。每服二钱,白汤送下。

【主治】①《明医指掌》:妊娠实证,气不清爽,心腹胀满或痛。②《妇科玉尺》:胎动因实。

60508 香壳散

【方源】《卫生总微》卷七。

【组成】橘皮(洗去瓤)

【用法】上为细末。每服一钱,乳前食生姜汤调下。

【主治】小儿伤寒,心胸满闷不快。

60509 香壳散

【方源】《宣明论》卷十三。

【组成】舶上茴香(用盐炒) 枳壳各一两 没药半两

【用法】上为末。每服一钱,温热酒送下,不拘时候,并二三服。

【主治】小肠气,脐腹搅痛急,阴股中疼闷,不省人事。

60510 香壳散

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【异名】香牛散(《普济方》卷二四七)。

【组成】黑牵牛三钱 茴香一两(炒) 延胡索半两(炒) 枳壳(去瓤)半两(麸炒)

【用法】上为细末。每服二钱,食前热酒调下。

【主治】①《杨氏家藏方》:小肠疝气。②《普济方》:外肾肿痛。

60511 香壳散

《济阳纲目》卷十一。即《便览》卷二"香壳丸"改为散剂。见该条。

60512 香壳散

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】香附(姜汁炒)三钱 枳壳(炒)二钱 青皮(炒) 陈皮 乌药 赤芍药 蓬术(醋炒)各一钱 归尾三钱 红花五分 甘草炙二分,生三分

【用法】上为散。每服四五钱,水煎去滓,加童便半盏,空心温服,更以桃核黑糖酒助之。不应,加延胡索、穿山甲。

【功用】《通俗伤寒论》:理气活血。

【主治】①《张氏医通》:蓄血暴起,胸胁小腹作痛。②《通俗伤寒论》:伤寒愈后,因事触怒,气郁血结,少腹急痛者。

【加减】有外风寒,加桂枝、羌活。

60513 香壳散

《类证治裁》卷八。为《明医指掌》卷九"香壳汤"之异名。见该条。

60514 香壳散

【方源】《女科指南》。

【组成】枳壳 红花 白芍 青皮 陈皮 甘草 乌梅 当归 莪术 香附

【用法】水煎服。

【主治】骨疲劳伤呕血。

60515 **香芷汤**

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】香附二钱 白芷六分 当归一钱五分 川芎八分 防风一钱 桑叶一钱 菊花二钱 蝉衣一钱 蔓荆子一钱五分 桔梗一钱 黑脂麻三钱

【主治】头痛有因于风者，肌表不固，太阳受风，巅顶作痛，鼻窍微塞，时流清涕。

60516 **香芷散**

【方源】《直指》卷十九。

【组成】新白芷（锉，以萝卜汁浸，晒干）

【用法】上为末。食后沸汤调服。或以少许吹入鼻，左用右，右为左。

【主治】①《直指》：头面诸风。②《医学入门》：风痰上攻。

【备考】本方方名，《普济方》引作“香白芷散”。

60517 **香芥散**

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】荆芥穗 香附子（去毛）各等分

【用法】上为粗末。每服五钱，水一碗，煎至半碗，去滓，频频嗽之。

【主治】风牙疼不可忍者。

60518 **香苏汤**

【方源】《千金》卷十五。

【组成】香豉五两 生苏一把（冬用苏子三两）

【用法】上以水五升，煮取二升，顿服之。

【主治】下痢后烦，气暴上。

60519 **香苏饮**

《准绳·幼科》卷五。为《婴童百问》卷十“香苏散”之异名。见该条。

60520 **香苏饮**

【方源】《女科指掌》卷三。

【组成】香附 苏叶 陈皮 甘草 砂仁

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】妊娠伤寒。

【加减】如太阳经，加羌活、防风；阳明经，加葛根、知母；少阳经，加柴胡。

60521 **香苏饮**

【方源】《金鉴》卷五十。

【组成】藿香 苏叶 厚朴（姜炒） 陈皮 枳壳（麸炒） 茯苓 木香（煨） 炙甘草

【用法】引用生姜，水煎服。

【功用】温散。

【主治】婴儿生育时触冒寒邪，入里犯胃，曲腰而啼，吐沫不止者。

60522 **香苏饮**

【方源】《医方简义》卷四。

【组成】制香附 苏叶 防风各一钱五分 杏仁泥三钱 甘草 陈皮各五分

【功用】芳香疏气，微发汗。

【主治】肿病初起。两目下如卧蚕状，身重微喘者。

60523 **香苏散**

【方源】《博济》卷二。

【组成】紫苏叶一分（拣择净，焙干） 肉豆蔻一分（去壳） 天雄一分（锉碎，以盐一分同炒令黄色住） 青皮（去白）一分 蛮姜半分（炮） 白术半两（锉细，微炒黄色） 缩砂仁一分 川芎 甘草各一分（炙）

【用法】上为细末。每服二钱，以水一盏，加生姜三片，同煎至五分，温服，每日三次。

【功用】调顺中脘，平和胃气。

【主治】肝亢风盛，刑于脾胃，致多飧泄。

【备考】本方方名，《普济方》引作“紫苏散”。

60524 **香苏散**

【方源】《局方》卷二（绍兴续添方）。

【异名】神授香苏散（《保命歌括》卷六）。

【组成】香附子（炒香，去毛） 紫苏叶各四两 甘草（炙）一两 陈皮二两 （不去白）

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏，煎七分，去滓热服，不拘时候，一日三次；若作细末，只服二钱，入盐点服。

【主治】外感风寒，内有气滞，形寒发热，头痛无汗，胸膈满闷，嗳气恶食，以及妊娠霍乱、

子悬、鱼蟹积等。

①《局方》(绍兴续添方):四时瘟疫、伤寒。②《医方集解》:四时感冒,头痛发热,或兼内伤,胸膈满闷,嗳气恶食。③《叶氏女科》:妊娠霍乱。④《杂病广要》:鱼蟹积。⑤《医方简义》:子悬。

【方论选录】①《医方集解》:此手太阴药也,紫苏疏表气而散外寒,香附行里气而消内壅,橘红能兼行表里以佐之,甘草和中,亦能解表为使也。②《医林纂要》:紫苏辛温,补肝祛风发汗,亦表散风寒主药;香附辛温,行肝气于脾胃,以祛郁宣滞,此用治内也;陈皮辛,行肝气,苦理脾胃,去白则轻而能表,此以兼行内外;甘草缓肝和中;加姜、葱煎,以祛风表汗为主。此表里兼治,而用药有条理,亦良方也。此补肝而平胃也。

60525　香苏散

【方源】《卫生宝鉴》卷十四。

【组成】陈皮(去白)一两　防己　木通　紫苏叶各半两

【用法】上为末。每服二钱,以水二盏,加生姜三片,煎至一盏,去滓,食前温服。

【主治】①《卫生宝鉴》:水气虚肿,小便赤涩。②《普济方》:久居卑湿,或为雨露所袭,致身重脚弱,关节疼,发热恶寒,小便涩,大便泄,自汗,或腹满。

60526　香苏散

【方源】《得效》卷一。

【组成】香附子五两(炒去毛)　紫苏(去根)二两半　陈皮二两　甘草二两　苍术二两(切片,米泔浸,炒黄)

【用法】上锉散。每服四钱,水一盏半,加生姜三片,葱白二根,煎服,不拘时候,得汗为妙。

【主治】四时伤寒伤风,伤湿伤食,头痛,咳嗽声重,痰多涕稠,心疼,泄泻,自汗,时行暴泻。

【加减】头痛,加川芎、白芷、北细辛、荆芥穗,每服各半钱;咳嗽声重,痰多涕稠,加半夏、苦梗、乌梅各半钱,桑白皮七寸;心疼,加石菖蒲、半夏各半钱;泄泻,加木瓜、藿香各半钱;伤湿自汗,时行暴泻,加生姜三片,车前子一撮。

【备考】本方加沉香,名"沉香饮子"。

60527　香苏散

【方源】《证治要诀类方》卷三。

【组成】紫苏　香附　陈皮　甘草　槟榔　木瓜(加木香一钱)

【用法】加生姜、葱白,水煎服。

【主治】将产脚赤肿,俗名皱脚。

60528　香苏散

【方源】《婴童百问》卷十。

【异名】香苏饮(《准绳·幼科》卷五)。

【组成】香附子　陈皮　紫苏　川芎　甘草　白芷各等分。

【用法】上锉散。加生姜、葱白,水煎服。

【主治】小儿出疹作泻。

【加减】泻症,加白术、茯苓;呕症,加茯苓、白芍药。

60529　香苏散

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】香附　苏叶　陈皮　甘草　柴胡　桂枝　防风　羌活

【用法】上加生姜三片,水煎,热服。

【主治】小儿呕吐。

60530　香苏散

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】香附(炒)　紫苏各二钱　陈皮一钱　藿香叶　缩砂　炙草各五分

【用法】水煎服。

【主治】妊娠霍乱。

【加减】如转筋,加木瓜一钱;胎动不安,加土炒白术一钱五分;如夏月得之,加黄芩一钱五分,炒黄连一钱,香薷二钱;如冬月得之,加人参、土炒白术各一钱,炮姜五分。

60531　香苏散

《笔花医镜》卷一。为《医学心悟》卷二"加味香苏散"之异名。见该条。

60532 香连丸

《证类本草》卷七引《兵部手集方》。

【异名】二和丸（《卫生总微》卷十）、秘方香连丸（《医方类聚》卷一四一引《经验良方》）。

【组成】宣连 青木香

【用法】上分两停，炼白蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，空腹饮送下，一日二次。其久冷之人，即用煨熟大蒜作丸。

【主治】热痢。内热口渴，下痢赤白，日夜不止，肛门灼痛；或泄泻不止。

①《证类本草》引《兵部手集方》：下痢。②《卫生总微》：泻不止。③《医方类聚》引《经验良方》：泻及痢下脓血，日夜不止。④《医宗说约》：痢，内热口渴，肛门焦痛。

【临证举例】伤寒带菌者 《中医杂志》（1959；11：1）：成人口服每次一钱，儿童每次五分，每日二次，连服六天为一疗程。结果：观察15例，经一次治愈者13例，两次治愈者1例，另1例经两个疗程治疗仍为阳性，未继续观察。

【备考】本方改为散剂，名香连散（见《医方类聚》引《吴氏集验方》）。

60533 香连丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】木香一两 黄连一两（去须，剉炒） 地榆一两（锉） 诃黎勒二两（煨，用皮） 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 当归一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，粥饮送下，不拘时候。

【主治】虚劳，泄痢腹痛，不欲饮食。

60534 香连丸

【方源】《圣惠》卷九十三。

【异名】豆蔻香连丸（《局方》卷十吴直阁增诸家名方）。

【组成】木香半两 黄连三分（去须，微炒） 诃黎勒半两（煨，用皮） 肉豆蔻一二枚（去壳） 丁香一分

【用法】上为末，以烧饭为丸，如黍粒大。每服五丸，以米粥饮送下，每日三四次。

【主治】①《圣惠》：小儿赤白痢。②《局方》（吴直阁增诸家名方）：小儿乳食不节，肠胃虚弱，冷热之气客于肠间，下痢赤白，肠内疞痛，日夜频并，不欲饮食。

60535 香连丸

《局方》卷十。为《圣惠》卷九十三“龙骨丸”之异名。见该条。

60536 香连丸

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】木香 黄连（去须，炒） 甘草（炙，锉） 肉豆蔻（去壳）各等分

【用法】上为末，沙糖为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心米饮送下。

【主治】热痢。

60537 香连丸

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】黄连（去须）三两 地榆（锉） 赤石脂各二两 龙骨 阿胶（炙令燥） 木香 赤芍药 艾叶（炒） 黄芩（去黑心）各一两 肉豆蔻（去壳）一两半 无食子三分

【用法】上为末，煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下，不拘时候。

【功用】调脏气，止便泄。

【主治】下痢脓血，脐腹疞痛，虚气痞满，肠鸣里急。

60538 香连丸

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【异名】小连丸（《普济方》卷三九八）。

【组成】黄连（去须，炒）半两 干姜（炮） 吴茱萸（汤浸，焙干，炒）各一分 肉豆蔻（去壳）二枚 草豆蔻（去皮）一枚

【用法】上为末，烧粟米饭为丸，如绿豆大。每服七丸，乳食前米饮送下。

【主治】小儿肠胃虚寒，洞泄下痢，腹痛。

60539 香连丸

【方源】《幼幼新书》卷二十六引《聚宝》。

【组成】木香一分 川黄连半两 没石子一个 肉豆蔻二个 诃皮三个 胡椒四十粒

【用法】上以吴茱萸一合，慢火同炒紫色，去茱萸，为末，酒糊为丸，如麻子大。每服十丸，空心、食前杆草汤送下，一日三四次。

【主治】小儿疳泻及夏末秋初泻痢。

60540　香连丸

【方源】《幼幼新书》卷二十八引茅先生方。

【组成】木香　黄连(用茱萸半两，同于铫内炒令烟起，取出，去茱萸)　肉豆蔻　诃子(炮，去核)各半两　阿胶(面炒)　朱砂各一钱

【用法】上为末，饭饮为丸，如梧桐子大。每服十至十四丸，用饭饮吞下。儿小碎之。

【主治】小儿泻痢。

60541　香连丸

【方源】《幼幼新书》卷二十九引《吉氏家传》。

【组成】黄连　木香　诃子皮各一两　豆蔻二个　子芩半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服大人十丸，小儿五丸，空心煎醋浆汤送下；日午再服，煎生姜蜜汤送下。

【主治】小儿赤白痢。

60542　香连丸

【方源】《幼幼新书》卷二十九引《吉氏家传》。

【组成】木香　宣连　胡黄连各一分

【用法】上为细末，水煮稀糊为丸，如绿豆大。每服七至十丸，饭饮吞下。

【主治】小儿赤白痢，腹中气痛，羸弱不思食。

60543　香连丸

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】黄连　地榆　赤石脂各二两　龙骨　阿胶　木香　艾叶　黄芩各一两　肉豆蔻一两半　使君子三分　赤芍药一两

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，乌梅米饮送下，不拘时候。

【主治】脏气虚弱，便泄下痢，日夜无数，怠堕力少，米谷不化，脓血相杂，脐腹疞痛，气虚痞满，肠鸣里急。

60544　香连丸

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】黄连(去须，择净)一两(杵碎，微炒)　木香一分　诃子七个(炮，去核)　肉豆蔻二个(面裹，煨)

【用法】上为细末，姜汁糊为丸，如绿豆大。每服十丸至十五丸，米饮送下，一日四五服。

【主治】小儿冷热不调，霍乱吐泻，腹内疞痛。

60545　香连丸

【方源】《女科百问》卷下。

【组成】木香　黄连　吴茱萸　白芍各等分

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心浓煎米饮汤送下，一日三次。

【主治】妊娠泄痢不止。

60546　香连丸

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】木香　诃子肉(面炒)　黄连(炒)各半两　龙骨二钱

【用法】上为细末，饭丸如黍米大。每服二十丸，米饮汤送下。

【主治】小儿痢。

60547　香连丸

《直指》卷十四。为《局方》卷六(吴直阁增诸家名方)“大香连丸”之异名。见该条。

60548　香连丸

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】南木香半两(不过火)　净黄连一两(锉，用茱萸炒，仍去叶梗)　乌梅肉二钱半(薄切，用屋瓦慢火焙干)

【用法】上为末，用阿胶半两(锉碎，炒胀)，水化如糊，候冷入乳钵内同前药末亭分拌匀，丸如麻子仁大。赤痢每服三十三丸至五十五丸，或七十七丸，空心甘草汤送下；白痢丸数同前，空心白姜汤送下；赤白交作，空心温米清汤咽服。

【主治】赤白下痢，烦渴作痛。

60549 香连丸

【方源】《普济方》卷二二〇。

【组成】硫黄一两（研） 硇砂一两（研水煎霜） 生木瓜一枚（去皮，切取盖子，剜瓤尽，入硫黄，硇砂在内，却盖，竹签定，蒸一伏时，研如膏） 肉豆蔻三枚（去壳，炮）槟榔三枚（生，锉） 当归（切，焙） 石斛（去根） 牛膝（酒浸，切，焙） 附子（炮，去皮脐） 巴戟（去心） 苁蓉（酒浸，切，焙干） 茴香子（炒） 木香 沉香（锉）各半两 白茯苓（去皮） 丁香 京三棱（炒，锉） 麝香 乳香（另研） 人参 桂（去皮） 毕澄茄 阿魏（醋化面作饼子，炙干） 干姜（炮）各一两

【用法】上除前膏外，为末，入前膏为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心、食前温酒送下。

【功用】补骨髓，益真气，治痼冷，润皮肤，悦颜色。

【备考】本方名香连丸，但方中无黄连，疑脱。

60550 香连丸

【方源】《袖珍》卷一。

【组成】黄连五两（锉） 粉草二两半（碎） 木香一两（不见火）

【用法】上先将粉草、黄连用蜜水略拌湿，安在铫中，重汤熏之，良久取出，晒焙干，再依上法熏之，再晒，得九熏九晒九炒，再晒十分干，与木香一处为末，水糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前酒或米饮送下。

【主治】痢疾。

60551 香连丸

【方源】《袖珍小儿》卷六。

【组成】黄连一两（去毛，以吴茱萸二两炒，去茱萸用黄连） 木香二钱 诃肉五钱（面煨）

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，米饮吞下。

【主治】积泻下痢，里急后重，夜起频并。

60552 香连丸

【方源】《医统》卷二十六引《活人心统》。

【异名】香连丹（《济阳纲目》卷十六）。

【组成】川连（姜炒） 香附子（制末）各四两

【用法】上为末，神曲糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，白汤送下。

【主治】①《医统》引《活人心统》：久郁，心胸不快，痞塞烦痛。②《医学入门》：嘈杂干呕吞酸。

60553 香连丸

【方源】《育婴秘诀》卷四。

【组成】黄连（大如鸡爪者，去枝梗，横切） 吴茱萸 木香 石莲子肉各三钱

【用法】上为末，酒糊为丸，如黍米大。陈米炒煎汤送下。

【主治】①《育婴秘诀》：小儿赤白痢。②《保命歌括》：下痢脓血，赤白相杂，里急后重。

60554 香连丸

【方源】《准绳·幼科》卷五。

【异名】香橘丸。

【组成】黄连一两（以茱萸五钱同炒，去萸不用） 木香半两 石莲子（取肉）二钱半 陈皮半两

【用法】上为末，醋调神曲糊为丸，如麻子大。每服二三十丸，陈仓米汤送下。

【主治】①《准绳·幼科》：小儿痘疮，热毒下流，暴泄或脓血不止者。②《痘疹仁端录》：热呕，并噤口痢。

60555 香连丸

【方源】《伤暑全书》卷下。

【组成】木香二两 黄连（茱萸炒）八两 广陈皮二两 槐角子一两五钱 地榆一两 枳壳（麸炒）二两 枳实（麸炒）一两 槟榔二两 益元散二两

【用法】上醋糊为丸。每服一钱，红痢米汤送下，白痢生姜汤送下，一日三次。

【主治】痢疾。

【宜忌】老弱数服后，即当温补。

60556　香连丸

【方源】《幼科折衷》卷上。

【组成】苍术一斤　明矾一斤(为末,入苍术炒)　木香二两　黄连二两　乌梅一斤(煮烂)

【用法】上为末,以乌梅肉为丸。每服三钱,生姜汤送下。

【主治】噤口痢。

60557　香连丸

【方源】《慈幼心书》卷九。

【组成】川黄连一斤(去毛芦)　广木香四两

【用法】外用吴茱萸四两,当归、白芍、川芎、生地、厚朴、车前、木通、枳壳、槟榔、茯苓、白术、黄芩、香附、陈皮、苍术各二钱,水七碗,煎至四碗,滤去滓,将汁煮川连,至汁干为度,取起焙脆,同木香为细末,以老米粉和,滴醋打糊为丸,如梧桐子大。每服一二十丸,白痢生姜汤送下,赤痢细茶送下。

【主治】小儿痢疾。

60558　香连丸

【方源】《医学启蒙》卷三。

【组成】川黄连(净)一斤(切豆大,同吴萸用汤浸泡良久,去汤,以湿萸同连闷过,方炒连赤色,去吴萸用连)　广木香四两　白芍药四两(醋炒)　平胃散四两

【用法】上为末,醋糊为丸,如梧桐子大。空心米汤送下百余丸;淋浊带下,空心白水送下八十丸。

【功用】和脾胃,除湿热,止泻痢,解宿醒。

【主治】吐酸嘈杂,腹痛,并男子淋浊,女人带下。

60559　香连丸

【方源】《活人方》卷三。

【组成】川黄连二两五钱(用吴茱萸一两三钱,同煮汁干,去吴萸用连,切片,焙干)　白芍药(醋炒)一两　黄芩(炒)五钱　当归(酒焙)七钱五分　地榆(醋炒)五钱　广木香五钱　乌梅肉(炙)二钱五分　陈神曲(炒黄为末,一两二钱)

【用法】上为细末,即以神曲调糊为丸,如麻子大。早晨空心吞服一钱五分,病久及年老者以参汤送下。

【主治】男、妇、小儿之痢,表里俱清之后,里急后重,肚腹仍痛,所去血积或鲜或黑,及滞下而不痛,久不能愈者。

60560　香连丸

【方源】《活人方》卷四。

【组成】川黄连二两五钱(用吴茱萸一两三钱同煮汁干,去茱萸用连,切片,焙干用)　白芍药(醋润一宿,晒极干,炒黄色)一两　广木香五钱　陈神曲(炒黄,为细末)一两二钱

【用法】上以前三味为细末,即用神曲调糊为丸,如麻子大。早晨空心米汤吞服一钱五分。

【功用】清火顺气。

【主治】白痢,里急后重。

【加减】肝泄者,脉必浮弦或沉弦,加防风一钱五分,柴胡一钱,升麻、川芎各五分,以升阳益气,兼服四神丸。

60561　香连丸

【方源】《女科秘旨》卷七。

【组成】黄连(为末)　莲肉(研粉)各等分

【用法】上和匀,酒为丸。每服四钱,酒调送下。

【主治】产后噤口痢。

【备考】本方名香连丸,但方中无木香,疑脱。

60562　香连丸

【方源】《梅氏验方新编》卷二。

【组成】川黄连一两二钱　广木香八钱(不要见火)　山楂肉一两二钱(炒)　川厚朴(去粗皮,姜汁炒)　小青皮(醋炒)各八钱　生甘草五钱　红花三钱(酒洗)　大黄二两(酒炒)　黄芩　大白芍各一两二钱　陈枳壳(麸炒)　尖槟榔各八钱　油当归　地榆各五钱　桃仁六钱(去皮尖)　橘红四钱

【用法】上为细末,荷叶包米煨饭为丸。每

服三钱，扁豆花泡汤化下。

【功用】清邪热，导滞气，行瘀血。

【主治】热痢。

【宜忌】孕妇忌服。

60563 香连丸

【方源】《人己良方》。

【组成】黄连（酒、蜜、姜、土制）一两 使君子肉七钱（炒） 白芍五钱 木香二钱半

【用法】上为细末，米汤为丸。五六岁服五分，八九岁服八分，每日服二次。虚弱者服一分。

【主治】小儿脾胃虚弱，疳泻疳痢，延缠不愈。

60564 香连丸

【方源】《全国中药成药处方集》（昆明方）。

【组成】广木香 甘草 陈皮 槟榔 泽泻各四两 黄连 苍术各八两 枳壳 厚朴各六两 吴萸四两 杭芍八两 茯苓六两

【用法】水泛为丸。每服二钱半，幼童减半，开水吞服。

【主治】赤白痢疾，里急后重。

【宜忌】胃弱泄泻不宜服用。

60565 香连丸

【方源】《全国中药成药处方集》（抚顺方）。

【组成】黄连 广木香 川朴 槟榔 白芍 枳壳各一两

【用法】上为细末，水泛小丸。每服一钱，开水送下，一日二次。

【功用】消炎整肠。

【主治】肠炎腹痛，里急后重，脓便血便，或如鱼脑，或如烂肉，日行数十次。

【宜忌】忌食瓜、果、生冷、油腻等物。

60566 香连散

【方源】《圣惠》卷五十六。

【组成】木香半两 黄连三分（去须，微炒） 缩砂三分（去皮） 当归三分（锉，微炒） 龙骨一两 诃黎勒三分（煨，用皮） 莨菪子一两（水淘去浮者，水煮令芽出，晒干，炒令黄黑色） 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）

【用法】上为细散。每服二钱，以粥饮调下，不拘时候。

【主治】水泻，时有腹痛。

60567 香连散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】木香一分 黄连半两（去须） 当归一分（锉，微炒） 干姜一分（炮裂，锉） 阿胶半两（捣碎，炒令黄燥）

【用法】上为细散。每服半钱，以粥饮调下。

【主治】小儿冷热不调，腹痛下痢。

60568 香连散

【方源】《圣济总录》卷三十三。

【组成】木香半两 黄连（去须）一两 青橘皮（去白，焙） 半两 栀子仁一分

【用法】上为散。每服二钱匕，米饮调下，不拘时候。

【主治】伤寒后，下痢脓血，疼痛。

60569 香连散

【方源】《圣济总录》卷七十六。

【组成】黄连（去须，炒）一两 木香一两 丁香 干姜（炮） 诃黎勒皮（炒）各半两

【用法】上为散。每服三钱匕，陈米饮调下，一日二次。

【主治】赤白痢。

60570 香连散

【方源】《幼幼新书》卷二十三引《谭氏殊圣》。

【组成】胡黄连 熊胆各一钱 丁香 麝 芦荟各半钱 五灵脂 赤箭芝 白龙骨各一分

【用法】上为末。每服半钱，陈米饮送下。日夜五六服。

【主治】急疳频泻绿和青，好睡多饶局绿惊，才觉翻身还又泻，唇干焦渴欲烟生。

60571 香连散

【方源】《幼幼新书》卷二十七引张涣方。

【组成】木香 川黄连（去须）各一两 人参 厚朴（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）各半

两

【用法】上为细末。每服一钱,粟米饮调下。

【功用】分清浊,定霍乱吐利。

【主治】小儿吐泻霍乱。

60572　**香连散**

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】木香一分　黄连(去须)半两(炒)　诃子(煨,去核取皮)一分　肉豆蔻三个(面裹煨,去面)　甘草一分(炙)

【用法】上为细末。每服一字或半钱,乳食前米饮汤调下。

【主治】脾疳泄泻,腹大脚细,渐成瘦弱,及诸脾胃不和,气不调顺。

60573　**香连散**

《医方类聚》卷一四一引《吴氏集验方》。即《证类本草》卷七引《兵部手集方》"香连丸"改为散剂。见该条。

60574　**香连散**

【方源】《普济方》卷三八三。

【组成】龙胆草一钱　胡黄连一钱　五灵脂一钱(炒)　丁香半钱　赤剪子一钱　麝香半钱　芦荟　龙骨半钱

【用法】上为末,烂饭为丸,如粟米大。饮汤吞下。

【主治】小儿五疳泻痢。

【备考】本方方名,据剂型,当作"香连丸"。方中芦荟用量原缺。

60575　**香连散**

【方源】《明医指掌》卷九。

【组成】黄连(炒)一钱半　木香一钱二分　白术(炒)二钱　白芍药(炒)二钱　滑石一钱(研细)　甘草(炙)五分

【用法】上锉一剂。水二盏,煎八分服。

【主治】产后痢疾,里急后重,腹中疞痛不可忍。

60576　**香连煎**

《鸡峰》卷二十四。为《圣惠》卷九十三"龙骨丸"之异名。见该条。

60577　**香连膏**

【方源】《普济方》卷七十八。

【组成】白沙蜜五两(绢滤去滓)　硇砂五钱(通明者,研)　乳香(研)一钱　青盐一钱　铅丹一钱　黄连(去须)三两(为细末)

以上六味除蜜外,并用新汲水三盏,于银石器内同煎至一盏,后入蜜,更用慢火熬成膏,不住手搅,候引之如丝线,以重绢绞去滓,入瓷瓶内盛贮。

水银半钱　轻粉一钱　龙脑一钱　麝香(研)一钱

【用法】上除前膏外,将后四味一处细研匀,入药膏内,用油单封三五重系定。如春、夏、秋各时,即以麻绳子坠在井底,七日取出;若冬月合时,即于背阴处封闭二七日出之。除打损眼外,并可治。

【主治】眼生翳膜。

60578　**香皂粉**

【方源】《解围元薮》卷四。

【组成】麝香一分　儿茶五钱　冰片六分　轻粉　胎骨灰各二钱

【用法】上为细末。掺臭烂深潭处。

【主治】三十六种大风诸恶危症。

60579　**香皂膏**

【方源】《普济方》卷三六三引《海上名方》。

【组成】肥皂(烧灰存性)

【用法】用麻油、腻粉调涂。

【主治】小儿头上有疮,因入汤入水成毒,脓水出不止。

60580　**香身丸**

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【异名】共殿香、一座香。

【组成】白豆蔻四两　木香二两　檀香一两　甘松一两　广陵零香一两半　丁香七钱半　白芷　当归　附子　槟榔　三奈　甘草(炙)　益智　桂心各五钱　麝香少许

【用法】上为极细末,炼蜜同酥油或羊尾油为丸,如黄豆大。每用一丸噙化。当日口香,后身亦香。又用一丸,投酒中,自然香美。

【主治】男女秽气,心腹疼痛,胸膈不利,痰

证诸疾。

60581 **香身丸**

【方源】《串雅外编》卷三。

【组成】丁香一两五钱 藿香叶 零陵香 甘松各三两 香附子 白芷 当归 桂心 槟榔 益智仁各一两 麝香五钱 白豆蔻二两

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每噙化五丸。常觉口香，五日身香，十日衣香，二十日他人皆得闻香也。

【主治】遍身炽气，恶气及口齿气。

60582 **香身汤**

【方源】《解围元薮》卷三。

【组成】白芷 香附 当归 桂心 槟榔 益智 甘松各三两 檀香二两 麝香 韶脑各五钱 木香 沉香 松子各一两五钱 香蛇二两

【用法】上为末，甘草膏为丸，如梧桐子大。临卧含化五丸。

【主治】大风腥臭，秽人不能近者。

60583 **香饮子**

【方源】《普济方》卷一六〇引《经验良方》。

【组成】干柿蒂十五枚

【用法】上为末。水一盏，加白盐，乌梅少许，煎至六分服。

【主治】咳逆不止。

60584 **香肚丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】龟甲一枚（九肋者，醋浸一宿，炙黄） 柴胡（去苗）二两 杏仁半斤（汤浸，去皮尖） 青蒿半斤（洗净，焙干） 青橘皮（去白）四两

【用法】上㕮咀，用猪肚一枚（去皮膜），酿药在内，用线缝合，以童便四升煮烂如泥，切碎，同药焙干，为细末。次入黄连末三两，麝香（研细）二钱，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前温熟水送下。

【主治】虚劳羸瘦，潮热盗干，肢节酸疼，行步少力。

60585 **香沙丸**

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】茴香（盐炒香，去盐不用） 新蚕沙（晒干）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。空心细嚼，温酒送下。甚者，一日二次。

【主治】小肠疝气。

60586 **香灵丸**

【方源】《本事》卷四。

【异名】香脂丸（《卫生家宝产科备要》卷五）、六丁丸（《百一》卷二引姜尧章方）。

【组成】丁香 好辰砂（研，飞）各六钱 五灵脂（拣如鼠屎者，淘去沙石，晒干）四钱

【用法】上香、脂先为细末，后入砂，再研匀，狗胆或猪胆汁为丸，如鸡头子大。每服一丸，生姜、橘皮汤磨下。

【主治】①《本事》：呕吐不止。②《百一》引姜尧章方：翻胃。

60587 **香灵丸**

【方源】《理瀹》。

【组成】香附 灵脂（生、熟）各一两 黑白丑（生、熟）各五钱

【用法】加醋炒熨。如加川芎、灵仙、枳壳、青皮、乌药、延胡、木香、炮甲之类亦妙。

【功用】消食，消水，消酒，消气，消痞，消胀，消积，消痛。

【主治】内伤饮食，胸膈饱闷。

60588 **香灵散**

【方源】方出《直指》卷二十二，名见《东医宝鉴·杂病篇》卷八。

【组成】辣桂一分 木香 芍药 北五灵脂各半分

【用法】上锉散。每服三钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】痈疽腹痛。

60589 **香灵散**

【方源】《证治宝鉴》卷十一。

【组成】五灵脂（醋炒）一两 茅山玄胡索（醋炒）一两 广木香七钱 乳香（去油） 没

药(去油)　陈皮(去白)各五钱　荜茇四钱　沉香三钱　香附末(制)一两五钱　吴萸(去梗)五钱　青木香(炒)一两

【用法】上药各为末，称准配合。每服五分时酒送下；甚者火酒送下；不饮食者，吴萸汤送下。

【主治】胃脘痛。

60590　香附丸

【方源】《圣济总录》卷九十九。

【异名】如智丸、化虫丸(《普济方》卷二三九)。

【组成】木香(为末)一分　附子(生，去皮脐，为末)　硫黄(研)各半两

【用法】上先用蜜陀僧末半两，入醋熬成膏，然后入三味药末，一处为丸，如小豆大。每服十五丸，食前温酒送下。

【主治】①《圣济总录》：胡芦虫(寸白虫)。②《普济方》：诸虫腹痛。

60591　香附丸

【方源】《朱氏集验方》卷十一。

【组成】牵牛(炒)　香附子(炒)　石燕(煅红，酒浸，研)　巴豆七粒(同牵牛炒，去巴豆)

【用法】上研末为丸。用蓖麻汤送下。

【主治】膀胱疝气，外肾肿痛。

60592　香附丸

【方源】《普济方》卷三三一。

【组成】香附子二两(醋煮)　吴茱萸　白薇各一两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米汤送下。

【主治】妇人白带，下元虚冷。

60593　香附丸

《普济方》卷三六六。为《幼幼新书》卷六引张涣方“香附丹”之异名。见该条。

60594　香附丸

【方源】方出《医学正传》卷二，名见《东医宝鉴·杂病篇》卷五。

【组成】苍术三两　香附一两半　萝卜子(蒸)　杏仁　瓜蒌仁　半夏各一两　黄芩　茯苓各五钱　川芎三钱

【用法】为丸服。

【主治】①《医学正传》：痰嗽气急。②《东医宝鉴·杂病篇》：食积痰嗽。

60595　香附丸

《医学入门》卷八，为《医学正传》卷七引《产宝》“香附一物丸”之异名。见该条。

60596　香附丸

【方源】《同寿录》卷三。

【组成】香附米(童便浸一宿，醋煮三次，晒干，炒，为末)四两　当归(酒洗)　生地(酒洗)　熟地(九蒸酒煮)　川芎(酒洗)　白芍(酒炒)各一两　黄芩(酒炒)一两五钱　白术(土炒)二两　陈皮(去白)一两　小茴香五钱(炒)

【用法】上为细末，醋糊为丸。每服八九十丸，空心清米汤送下。

【主治】妇人百病。

【加减】如热，加地骨皮(去木)、柴胡(酒炒)各一两。

60597　香附丸

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】鲜橘叶一两(石臼内捣烂)　童便制香附五钱　夏枯草花五钱(切碎)　青皮五钱　川贝母五钱(去心)　蒲公英五钱

【用法】先将青皮、香附晒干为末，后入捣烂橘叶拌匀，再晒极干，为细末，陈米饭为丸。开水送服，不拘时候。以消为度。

【主治】乳痈。

60598　香附丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十六引《杨氏黄病方》。

【组成】香附(童便浸，炒)一斤　针砂(醋煅)一两　厚朴(姜汁炒)五两　甘草(炒)一两　陈皮(去白，炒)三两　白芍(炒)五两　制苍术五两　山楂肉(炒黑)五两　茯苓(乳蒸，晒，焙)三两　青皮(炒)六两　苦参(炒，春夏)二两(秋冬)一两　白术(土炒)三两

【用法】醋糊为丸。每服一钱，米饮送下；弱者七八分，白术汤送下。服过七日，手心即凉，内有红晕起，调理半月即愈矣。

【主治】脱力劳伤黄病，及一切黄胖病。

【宜忌】忌食一切生冷、油腻、发硬之物。

60599 香附丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归三百二十两　川芎八十两　白芍一百六十两　白术(炒)一百六十两　熟地一百六十两　香附(炙)四百八十两　砂仁四十两　橘皮八十两　黄芩八十两

【用法】上为细末，过罗，炼蜜为丸，每丸重三钱，或用绍酒泛为小丸。每服一丸，水丸每服二钱，温黄酒送下，温开水亦可，一日二次。

【功用】舒郁和肝，调经养血。

【主治】血虚气滞，胸闷胁痛，经水不调，经期腹胀。

60600 香附丸

【方源】《全国中药成药处方集》(抚顺方)。

【组成】白人参一两半　当归二两五钱　生地　川芎　酒芍各二两　贡术二两半　橘红一两　元胡一两　坤草二两半　黄芩一两　广砂仁七钱五分　阿胶一两　艾炭一两半　香附七两　茯苓　枣仁　炙草　天冬　山萸各一两　熟地二两半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸二钱重。每服一丸，空腹白水送下。

【功用】活血温经。

【主治】血寒经闭，血因寒凝，脐腹疼痛，坚硬拒按，脯热骨蒸；气滞经闭，经血不行，胸脘胀满，气促呃逆，筋骨疼痛；经行腹痛，血色不正，腰痛腿瘦，肢软神疲。

【宜忌】忌食生冷；孕妇忌服。

60601 香附丹

【方源】《幼幼新书》卷六引张涣方。

【异名】蟾蜍丸、香附丸(《普济方》卷三六六)。

【组成】大香附子(拣净，刮去皮)　沉香各一两　槟榔　雌鼠粪(烧灰)　干蟾(烧灰)各半两

【用法】上为末，用羊髓四两，煮烂和成膏，如黍米大。每服十粒，麝香汤送下。

【主治】小儿齿不生。

60602 香附汤

【方源】《普济方》卷九十一引《卫生家宝》。

【组成】大附子一个(重八钱，生，去皮尖)　木香半两(湿纸裹，煨熟)　甘草一分(炙)

【用法】上为细末。分二服，每服用水二大盏，加生姜二十片，煎至七分，去滓，空心温服。

【功用】通关顺气。

【主治】卒暴中风，涎潮目瞑，口面歪斜，偏风瘫痪，精神昏愦，便利不禁。

60603 香附汤

《普济方》卷一八五。为《杨氏家藏方》卷一"附香散"之异名。见该条。

60604 香附汤

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】香附五钱　川芎二钱　当归三钱　柴胡　青皮各一钱

【主治】怒气胁痛。

【备考】《杂病源流犀烛》本方用法：水煎服。

60605 香附汤

【方源】《不知医必要》卷二。

【组成】香附(酒炒，杵)二钱

【用法】加生姜二片，盐少许，同瘦猪肉煎，去药，连肉食。

【主治】心气痛。

60606 香附饼

【方源】《外科发挥》卷五。

【异名】五香饼(《医统》卷八十一)。

【组成】香附

【用法】上为末，酒和，量疮大小做饼覆患处，以热熨斗熨之。若风寒湿毒，宜用姜汁作饼。

【功用】未成者内消，已成者自溃。

【主治】瘰疬流注肿块，或风寒袭于经络，

结肿或痛。

60607 **香附饼**

【方源】《医学心悟》卷五。

【组成】香附(细末,净)一两　麝香二分

【用法】上为末。以蒲公英二两煎酒,去滓,以酒调药,顿热敷患处。即时消散。

【主治】乳痈,及一切痈肿。

60608 **香附散**

【方源】方出《本事》卷十引徐朝奉方,名见《本事方释义》卷十。

【组成】香附子(舂去皮毛,中断之,略炒)

【用法】上为末。每服二钱,用清米饮调下。

【功用】资血调气。

【主治】①《本事》:下血不止,或成五色崩漏;产后腹痛。②《丸散膏丹集成》:吐血。

60609 **香附散**

【方源】《三因》卷十四。

【组成】香附子不拘多少

【用法】上为末。每用酒一盏,煎海藻一钱重,至半盏,先捞海藻嚼细,用所煎酒调香附末二钱服。

【主治】①《三因》:癞胀。②《普济方》:小肠气。

60610 **香附散**

【方源】《普济方》卷六十六引《卫生家宝》。

【组成】香附子四两(先以河水洗净,控干用)　生姜三两(洗净,切如谷子大)

【用法】上为末。三宿慢火炒,以干为度,如牙药用之。如牙疼先揩药,良久,却以荆芥汤漱口。

【功用】乌髭益气,去风疾。

【主治】一切牙疼,及无故牙动,牙宣出血。

60611 **香附散**

《百一》卷八。为《医说》卷三引《类编》"一服饮"之异名。见该条。

60612 **香附散**

【方源】《妇人良方》卷十五引陈景初方。

【异名】天仙藤散。

【组成】天仙藤(洗,略炒)　香附子(炒)　陈皮　甘草　乌药(不须要天台者,但得软白,香而辣者良)各等分

【用法】上为细末。每服三钱,水一大盏,加生姜三片,木瓜三片,紫苏三叶,同煎至七分,放温澄清,空心、食前服,一日三次。小便利,气脉通,体轻,肿渐消,更不须多服。

【主治】妊娠自三月成胎之后,两足自脚面渐肿腿膝以来,行步艰辛,以至喘闷,饮食不美,似水气状。

60613 **香附散**

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】香附子(炒)　槐花(炒)各一两　大黄半两

【用法】上为细末。每服三钱,入沙糖少许,食后冷水调下。

【主治】眼赤肿痛,眵泪生疮。

60614 **香附散**

【方源】《普济方》卷五十五引《经验良方》。

【组成】香附子(去毛)

【用法】上为末。以棉杖送于耳中,或干掺。立效。

【主治】①《普济方》引《经验良方》:脓耳。②《准绳·杂方》:聤耳。

60615 **香附散**

【方源】《普济方》卷五十五。

【组成】香附子末三钱　干胭脂一钱　密陀僧一钱　轻粉少许

【用法】上为细末。每用少许,吹入耳中。

【主治】耳内有脓水不干。

60616 **香附散**

【方源】《万氏家抄方》卷三。

【组成】香附一两(炒)　枳壳七钱半(炒)　当归半两　川芎半两　槐花半两(炒)

【用法】上为末。每服三钱,以水一钟,加生姜三片,大枣一枚,煎取七分,温服。

【主治】肠风。

60617 **香附散**

【方源】《慎斋遗书》卷八。

【组成】香附(盐、酒、便、醋四分制之)　乌

药

【用法】上为细末。酒送下四五分。

【主治】气血凝滞,浑身胀痛,六脉有力者。

60618 **香附散**

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】香附米(童便浸晒略炒)

【用法】上为末。每服二钱,白汤、温酒任下。

【主治】胎前产后诸症。

【加减】呕吐泄泻膨胀,饮食不化,加砂仁三分,或木香一分,莪术、槟榔各二分,藿香正气散下;吐痰噎食不下,诸气心腹小腹腰痛,或结痘块,聚散无时,加玄胡索、砂仁各四分,甚者加莪术、姜黄、木香各三分;一应头痛脑眩,加川芎五分,茶清下;产后恶露不下,脐腹作痛,或胎衣不下,甚则冲心迷闷,加莪术、玄胡索、五灵脂、香附、木香各七分,五积散下。

60619 **香附散**

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】夏枯草三两 香附二两 甘草四钱

【用法】上为末。每服一钱半,茶清调下。服下则疼减半,五服全止。

【主治】目珠、眉棱骨及头半边痛。

60620 **香附散**

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】香附 山栀 黄连 橘红 半夏

【主治】嗳气。

60621 **香附散**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】香附一斤 白及四两

【用法】上为末。葱白、生姜汁调服。或再将麸皮炒热熨,随症用。

【主治】皮肤色白木硬之症。

60622 **香附膏**

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】附子二枚(去皮脐,生用) 菖蒲 矾石(烧枯) 杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒)各半两 麝香(研)二钱 蓖麻子六十粒(去皮)

【用法】上先将附子、菖蒲、矾石为细末,次将蓖麻、杏仁为膏,次研麝香,同拌匀,丸如枣核大,以蜡裹,用大针穿透,塞于耳中,每日二次。

【主治】耳中疼痛。

60623 **香枨汤**

【方源】《鸡峰》卷二十五。

【组成】绵枨十个(细切,去子) 生甘草(同枨淹一宿) 盐各三两 白檀一分

【用法】上为细末。每服二钱,白汤点服。

【功用】行滞气。

【宜忌】不得犯铁器。

60624 **香苓汤**

【方源】《岭南卫生方》卷中。

【组成】香薷一斤半 茯苓(去皮) 陈皮 干姜(炮)各二两 甘草五两 厚朴一两(姜制)

【用法】上为细末,入盐少许,沸汤调服,不拘时候。

【主治】伤暑。

60625 **香苓散**

【方源】《得效》卷七。

【组成】五苓散 辰砂妙香散

【用法】上和匀,用天门冬、麦门冬(去心)煎汤,空心调服一大钱,每日三次。当顿愈。

【主治】男子妇人小便赤浊,诸药不效者。

【备考】本方方名,《普济方》引作"香砂散"。

60626 **香苓散**

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】香薷一钱五分 黄连(姜汁制,炒) 白扁豆 厚朴各五分(姜炒) 甘草五分 猪苓 泽泻 赤茯苓 白术各七分 官桂三分

【用法】上㕮咀。水煎服,不拘时候。

【主治】中暑霍乱,吐利交作。

60627 **香枣丸**

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】苦丁香

【用法】上为细末，用熟枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎大枣汤送下，空心服之立效，三服必愈。

【主治】①《瑞竹堂方》：十种蛊气病。②《普济方》：腹满。

【方论选录】《医方考》：诸腹胀内热，此方主之。苦丁香，即苦瓜蒂也，散用之则吐，丸用之则泻，凡有形之邪无不出之，亦良方也。

60628　香矾丸

【方源】《赤水玄珠》卷二十。

【组成】白矾四两　香附子二两　黄狗头骨灰四两

【用法】上为末，粥为丸，如梧桐子大。每服三十丸。

【主治】经年崩漏不止，诸药不效，脉濡微者。

60629　香矾丹

【方源】《幼幼新书》卷二十八引张涣方。

【组成】木香　白矾（慢火枯成粉）各一两　诃黎勒皮（微炮）　酸石榴皮（炒黑）各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如黍米大。每服十丸，粥饮送下。

【主治】泄泻久不愈。

60630　香矾散

【方源】《普济方》卷三六〇引《圣惠》。

【组成】枯矾半两　龙骨一钱　黄丹一钱　麝香少许（研）

【用法】上为细末。每用干掺之。

【主治】小儿断脐之后不干，及脓出耳中。

60631　香矾散

【方源】《普济方》卷二七五引《卫生家宝》。

【组成】白矾半两　乳香二钱半（先飞矾，令溶后，下乳香，飞住）　麝香　轻粉各半钱

【用法】上为细末。先用盐汤或浆水洗过，干贴或掺患处。

【主治】恶疮及嵌甲。

60632　香矾散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】白矾　胆矾　红花各一钱　麝香少许　蛇蜕一条（烧留性）

【用法】上为细末。用药少许，先以新绵缠细筷头搌令脓干，然后用斡耳挑药入耳中。明日用斡耳子斡去昨日药，再用前法。以愈为度。

【主治】久患聤耳，风毒冷疮，时发痒痛。

60633　香矾散

《普济方》卷三八一引《卫生家宝》。为原书同卷“红铅散”之异名。见该条。

60634　香矾散

【方源】《普济方》卷三六四。

【组成】白矾一两（烧灰）　蛇床子一钱　麝香一钱（研）

【用法】上为末，拌匀。每用一分，掺疮上。

【主治】小儿耳疮。

60635　香矾散

【方源】《医学六要·治法汇》卷七。

【组成】香附子　白矾末

【用法】用醋浸香附一宿，炒极黑为灰，存性，每一两入白矾末二钱。空心米饮调服。

【主治】血崩，带下。

60636　香郁散

【方源】《验方新编》卷三。

【组成】青皮橘子一百个　香附一斤　郁金四两

【用法】先将橘子铺大蒸笼内，蒂眼朝上，用新布垫底，再将香、郁二味研末掺入，于挨晚时盖好，蒸极透熟，每橘蒂眼上放生姜一薄片，姜上加艾绒一小团，将艾烧燃，烧过另换姜艾，连烧三次，晒过一天，次晚再蒸，接连蒸晒九次，每蒸一次，照前法连烧三次，无日晒，即风吹亦可，制好用瓷瓶收贮。每服连橘带药共一钱，用水煎，一服可煎两三次。宜于冬天配制，以免霉坏。

【功用】止痛。

【主治】心胃气痛。

60637　香和丸

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】豆豉（捣为末）　大蒜（去皮，研如

泥)

【用法】上合和成剂为丸,如梧桐子大。每服二十至三十丸,温热水送下。先进至圣缠金丹,次服此丸子。

【主治】疟疾成积。

60638 **香乳散**

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】乳香少许 荆芥穗三穗

【用法】上药咬在病牙上。

【主治】牙痛。

60639 **香金丸**

【方源】《永乐大典》卷九七八引《全婴方》。

【组成】天麻 雄黄 蝎各半两 白附子 大川乌(炮,去皮) 铁粉 青黛 南星(炮)各一分 麝半钱 石燕(醋煅)一分 朱砂一分

【用法】上为末,面糊为丸,如鸡头子大。三岁一丸,薄荷汤磨下。

【主治】小儿急慢惊风,来去不定,涎鸣昏瞀。

60640 **香肥皂**

【方源】《医统》卷九十八。

【组成】肥皂不拘多少(劈作两边,用清水煮干取起,晒半干,切碎,晒极干,为末) 檀香 真排草 甘松 三柰 白芷 细辛 辛夷 藁本 独活 丁香 广零陵各半两

【用法】上除肥皂外,为末,等分,同肥皂对半,炼蜜为丸。

【主治】雀斑等症。

【加减】去雀斑,加鹰条,白丁香,白蒺藜,木贼,密陀僧。

60641 **香肥皂**

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】藿香 甘松 朝脑 细辛各一两 猪胰一两 白芷一两 肥皂(去皮弦子)半斤

【用法】上为末,捣熟枣一两为丸,如干,少加煮枣汁,为丸如弹子大,晒干收用。

【主治】金疮。

60642 **香泽油**

【方源】《杂病源流犀烛》卷十四。

【组成】香泽

【用法】香油一斤,入香泽煎之,盛置病人头边,令气入口鼻,勿与饮之。疲极眠睡,虫当从口出,急以石灰粉手捉取,抽尽即是发也。初出,如不流水中浓菜形。

【主治】发瘕。

60643 **香参丸**

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】人参 生蒲黄 麦门冬(去心,焙) 当归(切,焙)各半两 甘草(炙,锉)一分 生干地黄(焙)一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如小弹子大。每服一丸,温水化下,一日三四次。

【主治】心脏热盛,舌上出血。

60644 **香参丸**

【方源】《奇方类编》卷上。

【组成】木香四两 苦参六两(酒炒)

【用法】以甘草一斤,熬膏为丸,如梧桐子大。每服二钱,白痢,姜汤送下;红痢,茶送下。

【主治】红白痢。

60645 **香参汤**

【方源】《幼幼新书》卷二十七引张涣方。

【组成】藿香叶 人参 舶上丁香皮 丁香 白茯苓各一两 青橘皮(去白) 木香 甘草(炙)各半两

【用法】上为细末。每服一钱,水一小盏,加生姜二片,煎至五分,去滓温服。

【功效】消寒痰。

【主治】寒痰呕吐。

60646 **香参散**

【方源】《百一》卷一引苏韬光方。

【组成】新罗人参(锉薄片)半两(湿纸裹煨) 大北枣三枚(以丁香三七粒纳其中,湿纸裹煨) 生姜指大一块(切作两片,以青盐少许纳其中,湿纸裹煨)

【用法】上㕮咀。以水一升,于银石器内慢火熬成一盏以下,睡觉烦闷时顿服。若常服则

每帖可作数剂。

【功用】大治心气，育神养气。

60647　**香参散**

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】陈皮一两　木香　人参　当归半两　诃子皮　乌梅　地榆　香茸三分　甘草一分(炙)

【用法】上为末。每服二大钱，水一盏，煎至五分，空心温服。白痢加生姜四片同煎。

【主治】荣卫俱虚，脏腑不调。泄泻不止，痢赤白，日无度，腹内疼痛，饮食不进。

【备考】方中木香、人参、诃子皮、乌梅、地榆用量原缺。

60648　**香参散**

【方源】《观聚方要补》卷二引《证治大还》。

【组成】人参　白术　白茯　白芍　白扁豆　陈皮　肉果　乌梅　木香　甘草　陈米

【用法】水煎服。滑溜，加粟壳(为末)，沙糖汤送下三钱。

【主治】痢久积秽已尽，腹中不痛，或微痛不后重，但滑溜不止。

60649　**香参散**

【方源】《杂病广要》引《证治大还》。

【组成】人参一两　茯苓　橘红各五钱　沉香二钱五分　熟附一钱二分

【用法】新瓦上焙，为细末。每用四钱，煎服。

【主治】脾虚胀满。

60650　**香参散**

【方源】《风劳臌膈》。

【组成】人参一两　沉香二钱五分

【用法】新瓦上焙，为细末。每服四钱，水煎服。

【主治】脾虚胀满，小便癃闭。

60651　**香参膏**

【方源】《幼幼新书》卷二十七引《惠眼观证》。

【组成】人参一指大(锉)　丁香十四粒　藿香一钱　糯米七十粒(同丁香炒令米黄)

【用法】上为末，用枣肉和为膏。每服一指头大，用盐姜汤送下。

【主治】霍乱泻住，吐不住。

60652　**香枳丸**

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】木香　枳壳(去瓤，麸炒)　羌活(去芦头)　独活(去芦头)　干姜(炮)　桂(去粗皮)　人参　陈橘皮(汤浸，去白，焙)　芎䓖　甘草(炙，锉)　白术　附子(炮裂，去皮脐)　京三棱(煨，锉)　大黄(蒸过，切，焙)各半两　肉豆蔻(去皮)一分　槟榔(锉)一两　牵牛子(净淘，拣，焙干)一斤(取粉半斤，别入用)

【用法】上除牵牛子外，为末，瓷合收，勿泄气。每用时，旋称药末一两，牵牛子粉半两，和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸；葱白、腊茶送下；生姜汤、温酒亦可。

【功效】除风气，利胸膈。

【主治】风气及心腹诸疾；妇人血风劳气，心腹胀痛；小儿疳痢、时疫、癥瘕。

60653　**香枳汤**

【方源】《普济方》卷三十九。

【组成】枳壳　防风　槟榔　甘草各一两

【用法】上为末。每服二钱，空心热汤调服。

【功效】调风顺气。

【主治】大便秘结。

60654　**香枳散**

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】枳壳(去瓤，麸炒)　防风(去叉)各一两(锉)　甘草(炙，锉)半两

【用法】上为散。每服二钱匕，沸汤点服，空心、食前各一次。

【功用】祛风顺气。

【主治】大肠秘涩。

60655　**香枳散**

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【异名】蛤粉散(《普济方》卷三八七引《全婴方》)。

【组成】藿香二十一叶　枳壳二片(湿纸裹

焙） 蚌粉一块（如枳壳大）

【用法】上为散。每服半钱匕，米饮调下。

【主治】小儿胃虚哕逆，咳嗽，吐乳食。

60656 **香荆散**

【方源】《三因》卷十二。

【组成】香附子 荆芥穗各等分。

【用法】上为末。每用三匙，水一大碗，煎十数沸，淋洗患处。

【主治】大人、小儿肛门脱出。

60657 **香荆散**

【方源】《直指》卷十四。

【组成】大香附 荆芥穗各半两 缩砂二钱半

【用法】上为末。每服三钱，食前新水煎服。

【主治】脱肛。

【备考】本方方名，《普济方》引作"荆芥散"。

60658 **香茸丸**

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】鹿茸（去毛，酒浸煮，焙干）一两 麝香（研细）一分 山茱萸（去核，焙干）二两 沉香（锉）一钱

【用法】上为末，入麝香研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒或盐汤送下。

【功用】调荣卫，利腰脚。

【主治】精耗血少，阳气衰弱。

60659 **香茸丸**

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】麝香一钱 破故纸四两 牛膝 鹿茸各二两 附子 苁蓉各四两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前盐汤或温酒送下。

【功用】补益。

【主治】肾脏虚寒，腰膝沉重。

60660 **香茸丸**

【方源】《本事》卷二。

【组成】鹿茸（酥炙黄，燎去毛） 熟干地黄（酒洒，九蒸九晒，焙干）各二两 苁蓉（酒浸水洗，焙干） 破故纸（炒香） 附子（炮，去皮脐） 当归（洗，去芦，薄切，焙干）各一两 麝香一钱 沉香半两

【用法】上为末，入麝研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心盐汤送下。

【功用】补肾经。

【主治】①《本事》：肺肾经病。②《永类钤方》：诸虚。

【方论选录】《本事方释义》：此通补督脉之方也。鹿茸气味甘温，入足太阳、少阴；熟地黄气味甘寒微苦，入足少阴；附子气味咸温，入手、足少阴；肉苁蓉气味咸温，入足少阴；破故纸味辛温，入脾肾；当归气味辛甘微温，入手少阴、足厥阴；沉香气味辛温，入肾；麝香气味辛温，入手、足少阴，能引诸药入经络，送药用盐汤者，引药入下也。乃叶元长所服之药，因年高下焦阳气衰弱，投入温暖，必藉血气有情辛香走窍之药，庶几效验之速耳。

60661 **香茸丸**

【方源】《本事》卷二。

【组成】鹿茸二两（酥炙黄，燎去毛） 沉香 白芍药 人参（去芦） 熟干地黄（酒洒，九蒸九晒，焙干） 苁蓉（酒浸，水洗，焙干） 牛膝（酒浸，水洗，焙干） 泽泻 大附子（炮，去皮脐） 当归（洗，去芦，薄切焙干）各一两 生干地黄一两 麝香一钱

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，盐酒或盐汤送下。

【功用】补肾经。

【主治】①《本事》：肺肾经病。②《普济方》：虚损。

60662 **香茸丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】鹿茸（火燎去毛，酥涂炙） 麋茸（火燎去毛，酥涂炙）各二两 沉香 五味子 白茯苓 白龙骨（火煅） 肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙干）各一两 麝香半两（别研）

【用法】上为细末，用熟干地黄三两（焙干，为细末），同酒二升熬成膏，加诸药为丸，如梧

桐子大。每服五十丸，空心、食前温酒、盐汤任下。

【功用】滋补精血，益养真元。

【主治】下焦伤竭，脐腹绞痛，饮食减少，目视䀮䀮，夜梦鬼交，遗泄失精，肌肉消瘦。

60663　香茸丸

【方源】《普济方》卷二二〇引《十便良方》。

【组成】熟干地黄五两　菟丝子四两(另末)　鹿茸三两

【用法】上为细末，入麝香半钱，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，盐酒、盐汤任下。

【功用】补真气，暖肾脏，缩小便，退阴进阳，壮筋骨，耐寒暑，进饮食。

60664　香茸丸

【方源】《百一》卷六。

【组成】麝香半钱(别研，临时入)　鹿茸一两(火燎去毛，酥炙)

【用法】上将鹿茸为细末，方入麝香，以灯心煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心服。

【主治】①《百一》：下痢危困。②《普济方》：下痢危困，气血衰弱。

【临证举例】痢疾　绍熙壬子，绍兴人苦痢疾者极多，往往而死，凡平时所用治痢，如罂粟壳之类，不可向口，唯服此等药或没石子丸作效。

【备考】每料添滴乳香半两，尤效。

60665　香茸丸

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】乳香三钱(别研)　鹿茸半两(酒浸一宿，炙)　肉豆蔻一两(净洗，每个作两片，安乳香在内，外用面裹煨，去面)

【用法】上为细末，陈米饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前米饮送下，一日三四次。

【主治】日久冷痢。

60666　香茸丸

【方源】《得效》卷五。

【组成】嫩鹿茸(草火燎去毛，酥炙黄)　肉豆蔻(火煨)　生麝香(另研)

【用法】上为末。白陈米饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空腹米饮送下。

【主治】饮酒多，遂成酒泄，骨立不能食，但再饮一二盏泄作，几年矣。

60667　香茸丸

【方源】《普济方》卷四十。

【异名】麝香丸。

【组成】麝香半两　鹿茸(炙)二两

【用法】上为末；酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，粥饮送下，一日三次，不拘时候。

【主治】脱肛。

60668　香茸丸

【方源】《普济方》卷二二〇。

【组成】附子二个(重六钱，以火炮裂，去皮脐)　胡芦巴(洗，淘净)　白茯苓(去皮)　鹿茸(以酒洗净，炙黄)　桃仁(麸炒，去皮)　苁蓉(酒浸，切，焙)　木香各二两　麝香一钱

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心食前盐汤送下。

【功用】补下元虚惫，除一切寒冷病。

【主治】下元虚惫，面色黧黑，一切寒冷病，及小肠尿白脬寒。

60669　香茸丸

【方源】《南雅堂医案》卷六。

【组成】麝香一钱　鹿茸三两　当归身二两　生川乌五钱

【用法】上药为细末，以雄羊肾三对，用黄酒煮烂，将前药和匀为丸。每服一钱，开水送下。

【主治】痿症。精血内夺，无以营养筋骨，腰脊伛偻不伸，周身骨节尽痛，濈然汗出不解，冬月尤甚。

60670　香茂散

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】藿香(去土)　蓬茂(炮，锉)　茯苓(焙)各等分

【用法】上为细末。每服半钱或一钱，白汤点服，不拘时候。

【主治】小儿泻后胸中不快。

60671 香荚散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】猪牙皂角 细辛（去叶土） 川乌头（生用，不去皮尖） 升麻 荜茇 香附子各二钱 乳香一钱（别研）

【用法】上为细末，次入乳香研匀。每用一钱，揩贴患处，仍频用。

【主治】牙疼。

60672 香草汤

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】莎草根（去毛）五两 甘草一两（锉，炙）

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎取七分，去滓温服。

【主治】吐血。

60673 香草散

【方源】《养老奉亲》。

【组成】香薷 桔梗 白芷 当归 地榆 芍药 槟榔 白豆蔻各半两 麝香一钱

【用法】上为末。每服二钱，以水一盏，加生姜、大枣，同煎至数沸，通口食前服，一日三次。

【功用】温脾肺，活荣生机，进食，益冲任二经。

【主治】妇人气羸，肠寒便白，食伤积滞，冷结，阳不盛。

60674 香草散

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】香附 茯神各三钱 玄胡索 甘草 神曲 天花粉各一钱 炒栀子 黄芩各二钱 白术 生地 麦冬各五钱 陈皮五分

【用法】水煎服。

【主治】妇人因郁火所致经前疼痛，数日后行经者，其经水多是紫黑之块。

60675 香草散

【方源】《串雅外篇》卷一。

【组成】香附（醋浸透，铜锅炒）一两半 草乌（面同炒，去面）五钱

【用法】上为末。每用一分，临发时先含舌上，滚汤下，老弱七八厘，小儿五厘。极重二服即愈。

【功用】截疟。

60676 香茱汤

【方源】《麻科活人》卷四。

【组成】香附米 吴茱萸 五灵脂（俱用醋炒） 台乌药各三钱

【用法】水煎浓汁，顿服。中病即止。

【主治】寒痛，绞肠痧。

60677 香茶饼

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】孩儿茶四两 桂花一两 南薄荷叶一两 硼砂五钱

【用法】上为末，用甘草煮汁，熬膏作饼。噙化咽下。美味香甜。

【功用】清膈化痰香口。

60678 香茶饼

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】细辛四两 葛花 沉香 白檀 石膏 硼砂各一两 薄荷二两 孩茶五钱 乌梅五钱 百药煎五钱 白豆蔻一两 片脑一钱

【用法】上为细末，甘草膏为丸。捏饼噙化。

【功用】香口生津，止痰清热，宁嗽，清头目。

60679 香茶散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】细辛 草乌头各一分 陈茶牙二钱 麝香少许（候熟入）

【用法】上为细末。每服三钱，水二盏，煎至八分，临熟入麝香少许。不过三服愈。

【主治】痰癖头痛。

60680 香茗散

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】香附子二钱 川芎一钱 细茶一撮

【用法】上锉二剂。水煎，温服。

【主治】因气脑冲动，头痛。

60681 **香药丸**

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】硇砂　乳香　没药　半夏　轻粉　赤石脂各等分。

【用法】上为末，糯米粉为丸，如梧桐子大。每服十丸，加至二十丸，临卧皂角子汤送下。

【主治】瘰疬疮。

60682 **香砂丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十七引《张氏家传》。

【组成】乳香　朱砂各一钱　半夏一两(汤洗七遍，姜汁炒黄)

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大。每服五丸，米饮送下，一日三次。

【主治】小儿霍乱，吐泻不定。

60683 **香砂丸**

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】黄连三钱　木香　厚朴　夜明砂　砂仁各二钱　诃子一钱

【用法】上为末，粳米饭为丸，如麻子大。每服十五丸，姜、艾煎汤送下。

【主治】疳痢。见有疳疾，加之伤食及感冷热不调，以致痢下五色，里急后重者。

60684 **香砂丸**

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】三棱　蓬术　香附　槟榔　青皮各一两　山楂　麦芽　神曲　陈皮各二两　砂仁　木香　白蔻仁各五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。米汤化下。

【主治】小儿停食不化。

60685 **香砂丸**

【方源】《准绳·幼科》卷二。

【组成】香附子(炒)一两　缩砂(去壳)五钱　三棱(煨)　蓬莪术(煨)　陈皮　麦蘖(炒)　芦荟各二钱半

【用法】上为极细末，煮面糊为丸，如黍米大。食前用米饮、盐汤送服。

【主治】婴孩小便白浊。

60686 **香砂丸**

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷二。

【组成】香附　白术　砂仁

【主治】妇人胎前产后噎膈，属气多者。

60687 **香砂散**

【方源】《普济方》卷一〇一引《十便良方》。

【异名】朱麝散。

【组成】颗块朱砂(研如粉)　真麝香(研)

【用法】上同研末。用无灰酒满注瓷瓶内，以糠头火慢烧于瓷瓶外，约一时久，用银器搅令热，随病人饮得酒多少，须至醉方止。候患人睡着，以衣被厚盖令汗出，其人自愈。每酒二升，使朱砂半两，麝香二铢，如病人只饮得一升，生用朱砂一分，麝香一铢。心神既定，却服补心之药，即愈。

【主治】心转不定，好登高临险，恶言骂詈，不避亲疏，日夜强走，独言独笑，或登高叫怒，举止非常，大便秘结，小便赤涩，解衣裸露，不得安处，虚言妄乱，称神说鬼，遂成狂易之疾。

60688 **香砂散**

《普济方》卷三十三。即《得效》卷七“香苓散”。见该条。

60689 **香砂散**

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷二。

【组成】香附　砂仁　陈皮　贝母　厚朴　茯神　白术　大腹皮　草果　苏梗　桔梗　枳壳　甘草　姜

【主治】胎前产后噎膈，气多者。

60690 **香砂散**

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】制苍术　木香　砂仁　陈皮　熟半夏　甘草　防风

【用法】生姜为引，水煎服。兼服和中丸。

【主治】风裹饮食，胃气痛者。

60691 **香饼子**

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】全蝎十四个(姜汁浸)　麻黄(缠匝，慢火炙干，又蘸姜汁，又炙，凡三次)　花

蛇肉 乌蛇肉(并酒浸,焙) 直僵蚕(炒)各一分 白附子(焙) 人参 天麻 防风各一钱 乳香半钱 麝一字

【用法】上为末,用南星末煮糊为丸,如梧桐子大,捏作饼,晒干。每服一饼,薄生姜汤调下。

【主治】慢惊初传,涎潮昏搐。

60692 香胆丸

【方源】《普济方》卷三七九引《全婴方》。

【组成】干蚵蚾(酒浸,炙黄,去骨甲)一两 青黛 使君子各一分 定粉 天竺黄 青皮各一钱 麝香二钱(研)

【用法】上为末,米饭为丸,如小豆大。三岁服三十丸,米汤送下。

【主治】小儿疳,面黄。

60693 香胆丸

【方源】《普济方》卷二九六。

【组成】九犍牛儿胆、胃各一个 腻粉五十文 麝香二十文

【用法】将胃、胆汁、腻粉、麝香和匀,入牛胆内,悬于簷前四十九日,熟,旋取为丸,如麦粒大。却送入疮内。后追退出恶物是验,疮口渐合,生面盖疮内一遍,出恶物。

【主治】痔漏脱肛。

60694 香胆丸

【方源】《普济方》卷三七九。

【组成】干蟾一枚(炙焦) 麝香(研)半钱 牛黄(研) 蛇蜕(烧灰) 雄黄(研) 天竺黄(研) 熊胆(研) 蝉蜕(炙)各一分 天仙子半合(水浸出芽子为度,焙干为细末) 肉豆蔻一枚(去壳)

【用法】上为细末,糯米饭为丸,如黄米大。每服七丸至十丸,米饮送下,不拘时候,一日三次。

【主治】小儿疳气,面黄肌瘦,发热多困,好吃泥土,揉眉咬甲,时伏土地。

60695 香疥药

【方源】《古今医鉴》卷十五引郑中仙方。

【组成】大风子(去壳)三十个 木鳖子(去壳)三十个 蛇床子五钱 白蒺藜五钱 杏仁三十个 川椒四钱 枯矾三钱 朝脑三钱 轻粉一钱半 人言一钱半

【用法】上药各为末,入桕油三两,搽疮。

【主治】疥疮。

60696 香疥药

【方源】《赤水玄珠》卷二十九。

【组成】轻粉 水银 樟脑各三钱 大风子四十九枚 川椒四十九粒 杏仁二十一粒 桕油烛一对。

【用法】上为细末。疥,用绢包于疮上熨之;黄水疮,干掺。神效。

【主治】风疥癣疮,黄水疮,牛皮癣。

60697 香津膏

【方源】《圣济总录》卷一四九。

【组成】齿垢

【用法】上取少许,敷痛处。

【功用】定痛。

【主治】蜂螫。

60698 香姜散

《三因》卷十一。即《博济》卷三“神圣香姜散”。见该条。

60699 香珠散

【方源】《疡科选粹》卷四。

【组成】血竭五分 冰片一分 麝香一分 珍珠一分 轻粉一分

【用法】上为末。洗净,麻油调搽。或加飞丹少许。

【主治】下疳及臁疮。

60700 香蚕散

【方源】《杨氏家藏方》卷十七。

【组成】白附子一两(炮) 天麻 全蝎(去毒,微炒) 白僵蚕(炒去丝嘴) 天南星(炮裂) 人参(去芦头) 附子(炮,去皮脐)各二钱 甘草(炙黄) 朱砂(别研) 钩藤各一钱 脑子一字(别研) 麝香一字(别研)

【用法】上为细末。半岁儿每服一字,一岁儿服半钱,煎荆芥汤调下,不拘时候。

【主治】小儿慢惊,涎盛口噤,昏塞,项背强

直，手足搐搦，进退不定，睡卧多惊。

60701　**香桂丸**

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】木香一分　桂(去粗皮)　大黄(湿纸裹煨，锉)　郁李仁　羌活(去芦头)　槟榔(锉)各半两　黑牵牛子(炒)一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，茶、酒任下。

【主治】风秘肠胃不宣利，令人壅闷。

60702　**香桂丸**

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】丁香　干姜(炮)各半两　芎藭三分　桂(去粗皮)　当归(切，焙)　枳壳(去瓤，麸炒)　槟榔(煨，锉)　厚朴(去粗皮，生姜汁炙)　桃仁(去皮尖双仁，炒)各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前炒生姜盐汤送下；或温酒亦可。

【主治】心痛不可忍。

60703　**香桂丸**

【方源】《圣济总录》卷一五〇。

【组成】桂(去粗皮)　芎藭　肉豆蔻(去壳)　人参　赤茯苓(去黑皮)　附子(炮裂，去皮脐)　木香　白芷　当归(切，焙)　槟榔(锉)　黄耆(锉)　山芋　泽泻　京三棱(煨，锉)　枳壳(去瓤，麸炒)　干漆(炒烟出)　楮实(炒)　牛膝(去苗，酒浸，切，焙)　牡丹皮　陈橘皮(汤浸去白，炒)　独活(去芦头)各半两　防风(去叉)　芍药　吴茱萸(汤浸，焙干，炒)各三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、晚食前温酒送下。

【主治】妇人血风，荣卫气涩，经脉不调，皮肤不泽，肢体烦热，头目昏眩，骨节痠疼。

60704　**香桂丸**

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】当归三两　川芎一两半　桂心一两半　木香一两半

【用法】上为末，炒砂糖糊为丸。每服三钱，炒荷叶煎汤送服。

【主治】产后脐下痛，脉弦沉涩者。

【方论选录】产后冲任脉虚，清阳下陷，寒邪内伏而气滞，血不得行，故脐下疼痛不止焉。当归养经中之血，川芎行血中之气，桂心温经散寒，以行血滞，木香开胃醒脾，以行气滞也。炒焦砂糖糊为丸，炒荷叶汤送下，使气行血活则冲任复完，而清阳上奉，精微四达，岂有脐下疼痛之患乎。

60705　**香桂汤**

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】桂(去粗皮)　陈橘皮(去白，焙，炒)　槟榔(生，锉)　当归(切，焙)　甘草(炙，锉)　木香　芍药　枳壳(去瓤，麸炒)　大黄(锉，炒)各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，食后去滓温服。

【主治】积聚心腹胀满，痞塞不通，大肠燥结，腰腹疠痛，面赤口干。

60706　**香桂散**

【方源】《博济》卷四。

【异名】桂香饮(《易简方》)、桂香散(《普济方》卷三二八)。

【组成】当归　川芎各一分　官桂(去皮)半两

【用法】上为细末，分作三服。每服酒一盏，煎三五沸，更入童便少许，同煎至七分温服，甚者不过二服必愈。

【主治】①《博济》：产后脐下疼痛不止。②《金鉴》：胞寒腹痛。

60707　**香桂散**

【方源】《医方类聚》卷二二九引《济生》。

【异名】单桂饮(《朱氏集验方》卷十)、桂心散(《医方类聚》卷二二九引《王氏集验方》)、桂香散(《医方类聚》卷二二九引《胎产救急方》)、夺命散(《医方类聚》卷二二九引《徐氏胎产方》)。

【组成】麝香半钱(别研)　官桂三钱(为末)

【用法】上为末，只作一服。温酒调服。须臾，如手推下。

【功用】下死胎。

60708 **香桂散**

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】当归 肉桂各等分

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，入醋少许，煎七分，空心热服。

【主治】妇人血刺，心腹疼痛。

60709 **香桂散**

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】香白芷三钱 肉桂三钱 麝香三分

【用法】上为末。童便酒调下，即产。

【主治】坐产涩滞，心腹大痛，死胎不能下者。

60710 **香桂散**

【方源】《马培之医案》。

【组成】生附子二钱 麝香二分 川乌二钱 细辛二钱 木香二钱 炙没药二钱 肉桂二钱 草乌二钱 丁香二钱 樟冰二钱

【用法】上为细末，掺膏药上贴之，随症听用。

【功用】温经通络。

【主治】一切风寒湿气，筋骨疼痛。

60711 **香格散**

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】消石一两

【用法】上为细末。每服二钱。诸淋各依汤使如后：劳淋者，用葵子末煎浓汤调下；血淋、热淋者，并用冷水调下；气淋者，用木通汤放温调下；石淋者，将药末先入铫子内，用纸隔炒至纸焦为度，再研令极细，温水调下，小便不通，小麦煎汤调下。卒患诸淋，只用冷水调下，并空心先调，使药消散如水后即服之，更以汤使送下。诸药不效者，服此立效。

【主治】五种淋疾。劳淋、血淋、气淋、热淋、石淋及小便不通至甚者。

60712 **香桃串**

【方源】《串雅补》卷二。

【组成】巴豆半粒 桃仁五钱 枳实三分 生军三分

【主治】血积。

60713 **香桃散**

【方源】《鸡鸣录》。

【组成】胡桃壳隔（煅存性）三两 木香八钱

【用法】上为细末。每服二三钱，好酒送下。三五服愈。

【主治】疟痞。

60714 **香莲汤**

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】香附米（童便浸炒）六钱 旱莲草五钱 当归二钱（一方用夏枯草更妙）

【用法】水煎服。

【主治】眼痛夜甚。

60715 **香莲散**

【方源】《卫生家宝产科备要》卷五。

【组成】石莲十个（炒熟） 丁香十个

【用法】上为末。用水三合，煎十沸，温服。

【主治】产后咳逆。

60716 **香莲散**

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】白芷 黄柏 防风 细辛 乌药 甘松各等分

【用法】上为细末。衬于中鞋屉中，数日一洗足，洗后换药。

【主治】妇人脚臭。

60717 **香莪散**

《济阴纲目》卷八。为《妇人良方》卷十二“香术散”之异名。见该条。

60718 **香莪粥**

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】香莪叶一握（切） 生姜半两（切） 人参半两（去芦头）

【用法】上以水二大盏，煎至一盏三分，去滓，研入白米一合，煮稀粥饮之。

【主治】妊娠霍乱吐泻，心烦多渴。

60719　**香劳散**

【方源】《百一》卷七。

【组成】香附子(去毛,炒)六两　藁本(去芦)四两　川芎(锉)　橘皮(去白)各二两　甘草一两半(炙)

【用法】上为细末。每服三钱,以水一盏,加生姜三片,煎七分,温服,不拘时候。

【功用】发散表邪。

【主治】伤风感寒。

60720　**香盐散**

【方源】《济生》卷五。

【组成】大香附子(炒令极黑)三两　青盐半两(别研)

【用法】上为细末,和匀。用如常法。

【功用】牢牙,去风冷。

【主治】蛀䘌宣露,一切齿疾。

60721　**香盐散**

【方源】《医方类聚》卷八十三引《经验秘方》。

【组成】香附子一斤(连皮,生姜半斤取汁,浸一宿,煮干)　孛姑缨一斤(少者半斤,根花叶皆用)　食盐八两　破故纸六两　象兜　大黄各五两　青盐　地黄各四两

【用法】上为末。先将瓶一个,用纸筋、盐、韭和泥固济,窨干盛药,以小瓦片盖瓶口,泥封之。若泥缝有裂处,以泥补合,候干,择成定日,就地做大深土盆一个,径阔二尺,先于内放炭火,厚五寸,上坐药瓶,周围及顶上亦用炭火,煅炼约多半日,存性,火冷,埋土内去火毒,为细末,瓷瓶收之。每早、晚蘸药刷牙,将口内咸唾津吐手心,润搽面皮并髭鬓。每月初六、十六、二十六日,摘去白者。常用此药,白者自黑,又时用酥油、胡桃油、乌臼油搽润发鬓,用之日久,自知功效。

【功用】乌发,嫩容,牢牙,补肾。

60722　**香盐散**

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】大鼠骨一具(煅)　炒川椒　乳香(炙)各二两　白蒺藜　青盐各一两

【用法】擦牙。

【主治】脱营失精,饮食无味,神倦肌瘦。

60723　**香砻散**

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】鸡舌香(研)一钱　黄砻(锉)一分　丹砂(研)二钱　五灵脂半钱

【用法】上为散。每服半钱匕,陈米饮调下。

【主治】小儿惊痫,风痫掣动,定后再作。

60724　**香铃丸**

【方源】《普济方》卷二二〇引《博济》。

【组成】茴香(舶上者,慢火炒令香)　金铃子(麸内炒过)　芸苔子(炒)　大附子(炮裂,去皮脐)　桑螵蛸(略炒)　马蔺花(醋浸一宿,炒令紫色)各一两

【用法】上拣令净,为末,酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心盐汤送下。

【功用】补助元气,壮筋骨,进饮食。

【主治】膀胱、小肠等气疾。

60725　**香铃散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】黑牵牛(微炒)　木香　马兜铃各等分

【用法】上㕮咀。每服一钱,水一小盏,煎至五分,去滓温服。不拘时候。

【主治】小儿咳嗽喘急,腹胸胀硬,全不思食。

60726　**香积丸**

《明医指掌》卷四。为《丹溪心法》卷三"香棱丸"之异名。见该条。

60727　**香积散**

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】荆三棱　土茴香　川楝子　巴戟天　当归各一两　黑附子　益智仁　南木香各半两　枳实二分

【用法】上为细末。每服一钱半,空心温酒调下。

【主治】小肠气发作,疼痛不可忍,及膀胱偏坠,结硬不散。

60728　**香脂丸**

《卫生家宝产科备要》卷五。为《本事》卷四“香灵丸”之异名。见该条。

60729 香脂膏

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】郁金 地骨皮各一分 矾石一钱（研） 龙脑半钱（研）

【用法】上为细末，用腊月猪脂油调。涂之。若用鼠脑调更佳。

【主治】米疽。生耳中，连头肿疼不可忍。

60730 香脐散

【方源】《博济》卷三。

【异名】麝脐散（《圣济总录》卷一二一）。

【组成】香脐十个（无香者，皮子是，切细） 牛膝一斤（去芦，切细） 木律四两 郁李仁二两 秋熟出子黄茄子二个（切细）

【用法】上入铁臼内，捣令相着，握作团，入罐子内，上用瓦子盖口，留一小窍，用盐泥固济，烧令通赤，候烟白色即住，去火，以新土罨一伏时，取出，入麝香一钱，再同研细。每日早晨揩牙痛处，候须臾，温水漱口。临卧更贴少许，咽津亦无妨。

【功用】解骨槽毒气，令齿坚牢。

【主治】牙齿动摆。

60731 香胶散

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】鹿角胶 阿胶 槐实 人参 黄药（去皮，麸炒黄） 荷叶（生） 蒲黄（生）各一两

【用法】上将鹿角胶、阿胶、槐实三味同糯米一合，炒胶令燥，与余四味为散，研匀。每服一钱匕，食后服，藕汁调下，一日三次。

【主治】虚劳内伤吐血。

60732 香胶散

【方源】《三因》卷七。

【组成】鱼胶（烧）七分（留性）

【用法】上为细末，入麝香少许。每服二钱，酒调下；不饮酒，米汤送下。

【主治】破伤风，口噤强直。

60733 香粉丸

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】香附四两 海粉 桃仁 白术各一两

【用法】上为末，神曲糊为丸服。

【主治】妇人血块如杯，有孕难服峻药。

60734 香粉散

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】白胶香半两（别研） 腻粉二钱（别研）

【用法】上为末。用猪脂调敷。

【主治】小儿一切疮疡久不愈者。

60735 香粉散

【方源】《医方类聚》卷一九一引《经验秘方》。

【组成】香粉

【用法】上为末。每服三钱，食前新水调下。

【功用】托里止痛，去虚热。

【主治】诸疮。

60736 香粉散

【方源】《瑞竹堂方》卷五。

【异名】粉香散（《医学纲目》卷十五）。

【组成】白矾三钱 巴豆二粒（去皮） 轻粉少许 麝香少许（研）

【用法】上于铁器内飞白矾，至沸，入巴豆在上，矾枯，去巴豆不用，只用三味，为细末，和合吹喉。

【主治】乳蛾。

60737 香粉散

《外科精义》卷下。为《圣济总录》卷一三一“托里汤”之异名。见该条。

60738 香粉散

【方源】《普济方》卷三九〇。

【组成】藁本 牡蛎粉 川芎 白芷 蚌粉 麻黄根各等分

【用法】上为末。周身敷之。

【主治】小儿盗汗不止。

60739 香粉散

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】松香 枯矾 川椒各五分 水粉

三分

【用法】上为末。实放葱内，扎住两头，白水煮沸，用时去葱皮，擦患处。

【主治】小儿头上肥疮。

60740　香粉膏

《冯氏锦囊·杂症》卷三。为《圣惠》卷八十九“香薷煎”之异名。见该条。

60741　香梅丸

【方源】《医方类聚》卷一八三引《济生》。

【组成】乌梅（同核烧灰存性）　香白芷（不见火）　百药煎（烧灰存性）

【用法】上为末，米糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心米饮送下。

【主治】肠风脏毒。

60742　香豉丸

【方源】《外台》卷五引《深师方》。

【组成】香豉一分（熬）　常山七分　蜀漆十分　附子一分（炮）　大黄二分（好者）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。发日早服五丸，须臾又服五丸；发晚者，至发可三四服。令其得吐为佳。疟不即断而畏吐者，但长将久服，无不愈。

【主治】久疟难断。

【宜忌】忌食生葱、生菜、猪肉。

60743　香豉丸

【方源】《外台》卷九引《深师方》。

【组成】香豉四分（熬）　杏仁二分（去尖皮双仁，熬）　紫菀三分　桂心三分　甘草八分（炙）　干姜二分　细辛三分　吴茱萸二分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四丸，一日三次。不知，增之。能含嚼咽汁亦佳。

【主治】三十年咳嗽上气，短气久冷，五脏客热，四肢烦疼，食饱则剧，时有发甚不能行步，夜不得卧，多梦。

【宜忌】忌食海藻、菘菜、生葱、生菜。

60744　香豉丸

【方源】《外台》卷七引《集验方》。

【组成】香美烂豉（晒干，微熬，令香即止）小芥子（去土石，微熬，令赤即止）各一升

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，空腹酒送下，一日二次。初服半剂以来，腹中微绞痛，勿怪之，是此药攻病之候。

【主治】积年腹内宿结疝冷气，及诸癖癥等。

60745　香豉丸

【方源】《外台》卷九引许明方。

【组成】食茱萸一两　甘草一两　香豉二十枚　细辛　杏仁（去尖皮双仁者，熬）各一两　紫菀二两

【用法】上为末，别捣杏仁如膏，乃纳末搅令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，一日三次。不知，增至五丸，暮卧时含十丸，着咽喉中咽之。

【主治】①《外台》引许明方：上气久咳，久寒冷痹。②《普济方》：气久寒，令肺脾中客热变为冷。

【宜忌】忌食海藻、菘菜、生菜。

60746　香豉丸

《儒门事亲》卷十五。为《宣明论》卷十“二胜丸”之异名。见该条。

60747　香豉汤

【方源】《普济方》卷三一一引《肘后方》。

【组成】豉一升

【用法】以水三升煮三沸，分二次服，不愈，重作；更取麻子如煎豉法，不愈，更取豉如上法。

【主治】被打殴击损伤，聚血腹中满闷。

60748　香豉汤

【方源】《外台》卷四引《删繁方》。

【组成】香豉一升（绵裹）　葱须（切）四两　石膏八两　栀子仁三两　生姜八两　大青二两　升麻三两　芒消三两

【用法】上切。以水六升，煮七味，取二升五合，去滓，然后下芒消，分三次服。

【主治】肺腑脏热，暴气斑点。

60749　香豉汤

【方源】《外台》卷六引《删繁方》。

【组成】香豉一升 生地黄一升 白术三两 甘草二两(炙) 竹叶一升 石膏八两 茯苓三两 葱白一升

【用法】上切。以水七升,煮取二升五合,去滓,分三次服。须利下,加芒消三两。

【主治】①《外台》引《删繁方》:霍乱,走哺不止,或呕噫,热气冲心满闷。②《圣济总录》:下焦热结,呕吐不止,心腹满闷。

【宜忌】忌食芜荑、海藻、菘菜、桃、李、雀肉、酢物等。

60750 香豉汤

【方源】《外台》卷二十五引《删繁方》。

【组成】香豉一升 白术六两 薤白(切)一升 升麻二两

【用法】上切。以水七升,煮取二升半,分三次服。

【主治】下焦冷热不调,暴下赤白痢。

【宜忌】《普济方》:忌食桃、李、雀肉等。

60751 香豉汤

【方源】《千金》卷二。

【组成】香豉一升半

【用法】以水三升,煮三沸,漉去滓,纳鹿角末一方寸匕,顿服之,须臾血自下。鹿角烧亦得。

【主治】半产下血不尽,苦来去烦满欲死。

【方论选录】《千金方衍义》:若半产血脱而烦,则用鹿角温散积血于下,香豉清解虚烦于上,而腹满自除,无藉除血而瘀自不能留矣。

60752 香豉汤

【方源】《千金》卷二十。

【组成】香豉 薤白各一升 栀子 黄芩 地榆各四两 黄连 黄柏 白术 茜根各三两

【用法】上㕮咀。以水九升,煮取三升,分三次服。

【主治】下焦热毒痢鱼脑,杂痢赤血,脐下少腹绞痛不可忍,欲痢不出。

【宜忌】《千金方衍义》:若痢久元气下降而见虚滞不食者,禁用。

【方论选录】《千金方衍义》:毒痢势甚而饮食尚强,胃气未艾,故可用黄连解毒清燥之剂,其用香豉、薤白必缘邪热未除,后重不减,故专取二味为方中之首推,且以白术除热消食,茜根、地榆解散滞血,然惟毒势方张者为宜。

60753 香豉汤

【方源】方出《圣惠》卷四十五,名见《普济方》卷二四六。

【组成】香豉一合 栀子仁二分 川升麻半两。

【用法】上以水一大盏半,煮取一盏,去滓,分三次温服。

【主治】瘴毒脚气,烦热,心闷气促。

60754 香豉汤

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【组成】豉半合 山栀子仁 乌梅肉 甘草(炙)各一分 薤白五茎

【用法】上锉,如麻豆大,分二服。每服水一盏半,煎至八分,去滓,食前温服。

【主治】伤寒后,下痢赤白如烂肉,壮热,大肠痛。

60755 香豉汤

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】豉(炒令香熟)三两 芒消(烧令白,于湿地上用纸衬出火毒)四两

【用法】每取豉半两,先以水一盏,煎取七分,去滓,下芒消末三钱匕,再煎三四沸,空腹分二次温服,如人行三里更一服,日夜可四服。但初看是风狂者,宜暂缚两手足,三服之后解之,即无不愈者。

【主治】伤寒风热毒气内乘于心,心狂欲走。

60756 香豉汤

【方源】《圣济总录》卷三十九。

【组成】豉七合(绵裹) 栀子仁 厚朴(去粗皮,姜汁炙)各三两

【用法】上㕮咀,如麻豆大。每服六钱匕,水

二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】霍乱，心中烦闷。

60757　香豉汤

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】香豉(微炒)二两　栀子仁一两　黄柏(去粗皮)半两　地榆(锉)一两　白术　茜根(拣净，锉碎)各三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，用薤白四寸，水一盏，同煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】霍乱，下焦热毒，痢如鱼脑，杂赤血并下，脐腹疞痛不可忍，里急后重。

60758　香豉汤

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【异名】香豉散(《普济方》卷三一一)。

【组成】豉半升(略炒)　苏枋木(细锉)一两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，不拘时候。

【主治】因诸伤损，血积在内。

60759　香豉汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】豉半合　猪肾一只(去脂膜，作四片)　当归(切，焙)半两　葱白三茎(切)　人参　桂(去粗皮)各半两　白粳米(淘)一合

【用法】将当归、人参、桂为粗末。每服三钱匕，水三盏，入猪肾、葱白、豉、米，煎取一盏半，去滓，空心、日午、临卧温服。

【主治】产后虚羸，肌肉枯瘁，肌体虚热。

60760　香豉汤

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】豉半升　葳蕤　甘草(炙，锉)各半两　黄柏(去粗皮，蜜炙，锉)　麦门冬(去心，焙)各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至八分，去滓温服，一日二次。

【主治】服石后，食少谷气不足，药气积在胃脘，致乳石发动，口中伤烂，舌强而燥，不得食味。

60761　香豉汤

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】豉二合　栀子仁十四枚　葱白一握(切)　黄芩(去黑心)三两

【用法】除葱味外，为粗末。每服先以水三盏，煮葱、豉至一盏半，下药四钱匕，更煎至八分，去滓温服。

【主治】乳石发动，内有虚热，胸腹痞满，外风湿不解，肌肉拘急。

60762　香豉汤

【方源】《普济方》卷一五九。

【组成】香豉三升(炒)　川椒一升(炒出汗，研)　干姜一片　猪肪半斤

【用法】上为末。纳肪药中，以水五升，合豉等物熟煎，每服二合，大效。

【主治】三十年咳逆上气，咽喉如水鸣鸣，或唾脓血不能疗者。

60763　香豉饮

【方源】《外台》卷三十七引《小品方》。

【组成】香豉三升　葱白一虎口

【用法】上以水三升，煮三沸服之。不止，乃至三四剂自止。

【主治】自劳太过，乳石发动，体上生疮，结气肿痛不得动者。

60764　香豉饮

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】香豉一分　生地黄一两　葱白三茎

【用法】上锉细，相和，以童便二盏半，浸一宿，平旦煎至八分，去滓，空腹、日午分二次温服。

【主治】骨蒸肿气，每至日晚即恶寒壮热，颊色赤，不下食，日渐瘦。

60765　香豉饮

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】香豉(微炒)一分　栀子五枚(去皮)　黄连(去须)一分

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水七分，入薤白两茎(切)，同煎至四分，去滓，分二次温

服，空心、日晚各一服。

【主治】小儿毒热血痢。

60766 **香豉饮**

《圣济总录》卷一八四。为《千金》卷二十四“葱白豉汤”之异名。见该条。

60767 **香豉酒**

【方源】《外台》卷十八引《崔氏方》。

【组成】香豉一斗

【用法】以酒三斗，浸三日。任性多少饮之，利即减之，不利任性。其中用橘皮、生姜调适香味服之。服尽再制，以愈为度。

【功用】《普济方》：和腰脚，除湿痹。

【主治】①《外台》引《崔氏方》：脚气。②《普济方》：脚气冲心；兼治瘴毒脚气，心神烦闷。

60768 **香豉散**

【方源】《外台》卷十九引《古今录验》。

【组成】生地黄三十斤　香豉三升（绵裹）

【用法】洗地黄㕮咀，先蒸半日晒燥，更合豉蒸半日，晒令燥，为末。每服三方寸匕，酒送下，一日三次。亦可水服。服数月有效。

【功用】益精爽气。

【主治】三十年风躄，偏枯不能行。

60769 **香豉散**

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】豉二合　甘草半两（炙微赤，锉）　白术一两　槟榔一两　川大黄一两（锉碎，微炒）　川芒消半两

【用法】上为散。每服半两，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。以疏利为度。

【主治】伤寒已愈后，食饮过多复发。

60770 **香豉散**

【方源】《幼幼新书》卷三十五引张涣方。

【组成】香豉二两（炒焦）　伏龙肝一两

【用法】上为细末。每服半钱，以生油调涂患处。

【主治】小儿白丹痒痛，虚肿如吹。

60771 **香豉散**

《普济方》卷三一一。为《圣济总录》卷一四四“香豉汤”之异名。见该条。

60772 **香豉散**

【方源】《华氏医方汇编》。

【组成】香豉　牛蒡　荆芥　桔梗　连翘　黑栀　马勃　大贝母　甘中黄

【用法】水煎服。

【主治】津液不足，邪火内伏所致痧隐脉郁，喉腐舌干。

60773 **香豉粥**

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】麻黄三分（去根节）　葛根一分　栀子仁一分　石膏半两　荆芥半两　生姜一分　豆豉一合　糯米一合半

【用法】上锉细。以水三大盏，先煎麻黄等七味，至一盏半，去滓，下米煮作稀粥。不拘时候服之。衣盖出汗即愈。

【功用】发汗。

【主治】伤寒三日，壮热不解。

60774 **香豉膏**

【方源】《圣济总录》卷一四九。

【组成】豉半两

【用法】上为末，醋调。敷疮上。

【主治】蠼螋尿疮。

60775 **香菽散**

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【组成】大豆（炒熟，挞去黑皮）一合

【用法】上为散。用粥清调服一钱匕，一日二次。

【主治】下痢身肿。

60776 **香萸丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十九引《聚宝方》。

【组成】黄连　茱萸各三分　诃子皮八个　木香一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸至十五丸。白痢，艾汤送下；赤痢，陈皮汤送下。三服见效。小儿，丸如粟米大，每服七丸至十丸。

【主治】赤白痢。

60777 **香萸丸**

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【组成】硫黄一两(研)　硇砂一两(研,水煎成霜)　生木瓜一枚(去皮,切取盖子,剜瓤尽,入硫黄、硇砂末在内,却盖,竹签定,蒸一复时,研膏)　肉豆蔻(去壳,炮)三枚　槟榔三枚(生锉)　当归(切,焙)　石斛(去根)　牛膝(酒浸,切,焙)　附子(炮裂,去皮脐)　巴戟天(去心)　肉苁蓉(酒浸,切,焙干)　茴香子(炒)　木香　沉香(锉)各半两　白茯苓(去黑皮)　京三棱(炮,锉)　干姜(炮)　丁香　麝香　乳香(别研)　人参　桂(去粗皮)　荜澄茄　阿魏(醋化面调作饼子,炙干)各一分

【用法】除木瓜膏外,为末,人木瓜膏为丸,如梧桐子大。每服二十丸至三十丸,空心、食前温酒送下。

【功用】补骨髓,益真气,润皮肤,悦颜色。

【主治】痼冷。

60778　香黄丸

【方源】《普济方》卷三七九引《全婴方》。

【组成】黄连　木香　肉豆蔻　青皮　陈皮　使君子　蛔蝕(酒浸,去骨,炒)　芦荟各一两

【用法】上为末,面糊为丸,如小豆大。三岁儿每服三十丸,米汤送下。

【主治】脏腑不调,食物不化,饮食虽多,不生肌肉,致小儿疳黄腹大,壳热心躁。

60779　香黄散

【方源】《续易简方后集》卷四。

【组成】白芷　大黄各等分

【用法】上为细末。蜜醋调,敷赤肿痛处;蜜汤亦得,一日一换。愈。

【主治】痈肿。

60780　香硇丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】乳香半两(别研)　硇砂一钱(研细)　好沉香二钱半(碾)

【用法】上用黄蜡半两,熔化了,下药末,研和作条子,丸如鸡头大。每服一丸,温酒吞下。

【主治】小肠气,刺满胀痛不可忍者。

60781　香蛇酒

【方源】《秘传大麻疯方》。

【组成】乳香　雄黄　朱砂各五钱　寸香五钱　血竭一两　木香一两　蟾酥二钱

【用法】上为末。用元米二斗五升,入药拌匀,蒸熟做酒,听用。又用白花蛇、乌梢蛇各一条,蜈蚣十条,蝉蜕五两,全蝎二十个,用水二斗煮一斗五升,和前药酒,将药并蛇等为末,酒糊为丸,好酒送下。

【主治】截指疯,筋骨先烂,后损十指,先起指肿,甲下出水,不过一年,逐节脱落;并治杨梅疮,一切无名肿毒,恶疮服轻粉太过者;遍身痛痒,风症左瘫右痪,风癣疥疮。

60782　香银丸

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】丁香　干葛各一两　半夏(汤浸七次,切,焙)　水银各半两

【用法】上为细末。将水银与药同研匀,生姜汁为丸,如麻子大。每服一二丸至五七丸,煎金银汤送下,不拘时候。

【主治】小儿呕吐。

60783　香银丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】藿香叶(去土)一两　丁香(大者)六十枚　草豆蔻仁(大者)四枚　附子(炮,去皮脐,取末)　生硫黄　水银各一钱

【用法】先将硫黄、水银同研,后碾诸药为细末,和匀,煮枣肉为丸,每一两作十五丸。每服一丸至二丸,煎生姜、大枣汤化下,不拘时候。

【主治】一切吐逆,粥药不下者。

60784　香银丸

《普济方》卷三九四。为《圣济总录》卷一七六"水银丸"之异名。见该条。

60785　香盒方

【方源】《青囊秘传》。

【组成】连翘心一两　生大黄一两　鬼箭羽二钱五分　白芷二钱五分　苍术一钱五分　台乌药二钱五分　甘松香一钱五分　真降香

五钱 真檀香五钱 山柰一钱五分 丁香二钱

【用法】上为细末。

【功用】去秽辟邪。

【宜忌】勿受湿。

60786 香脯散

《准绳·幼科》卷七。为《袖珍小儿》卷六"香脯"之异名。见该条。

60787 香麻散

【方源】《名家方选》。

【组成】香附子 苎麻

【用法】上药制成黑霜，白汤送下。

【主治】产后儿枕块痛。

60788 香清饼

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】生香附 生半夏各等分

【用法】上为细末，蛋白调作饼。贴男左女右涌泉穴。一周时愈。

【主治】小儿口疳。

60789 香绵散

【方源】《普济方》卷一九四。

【组成】生漆滓一两半 春蚕绵三两 麝香五钱

【用法】上以漆滓放在铁锅炒做灰，绵用剪细，入此锅内，同漆滓炒作灰，同碾为末，后将麝香研细匀入。饭饮汤调下；好酒亦得。

【主治】蛊胀。

60790 香棱丸

【方源】《济生》卷四。

【异名】仙方香棱丸（《卫生宝鉴》卷十四）、香壳丸（《玉机微义》卷二十）、仙方香壳丸（《济阳纲目》卷四十一）。

【组成】木香（不见火） 丁香各半两 京三棱（锉细，酒浸一宿） 枳壳（去瓤，麸炒） 青皮（去白） 川楝子（锉，炒） 茴香（炒） 蓬术（锉细）一两（用去壳巴豆三十粒同炒黄色，去巴豆不用）

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大，以朱砂研极细为衣。每服二十丸，炒生姜盐汤送下，温酒亦得，不拘时候。

【功用】破痰癖，消癥块。

【主治】①《济生》：五积，痰癖癥块，冷热积聚。②《金鉴》：肠覃。寒气客于肠外，与卫气相搏，气不得荣，因有所系，瘕而内著，恶气乃起，瘜肉乃生，始如鸡卵，稍以益大，如怀子状，按之则坚，推之则移，月事以时下。

60791 香棱丸

【方源】《瑞竹堂方》卷一。

【组成】京三棱 广茂 青皮 陈皮（各锉碎，醋煮，焙干） 萝卜子（炒，别研） 缩砂仁 白豆蔻仁 沉香 木香 半夏曲各一两（炒） 神曲（炒） 麦蘖（炒，另研）各一两 阿魏半两（别研） 香附子（炒去毛） 乌药 枳壳（麸炒，去瓤） 荜澄茄 槟榔 良姜各半两

【用法】上为细末，以神曲、麦蘖末打糊，研入阿魏，搜和为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，姜汤送下，不拘时候。

【功用】消食快气，宽中利膈，化痰。

【主治】食积。

60792 香棱丸

【方源】《丹溪心法》卷三。

【异名】香积丸（《明医指掌》卷四）。

【组成】三棱六两（醋炒） 青皮 陈皮 莪术（炮，或醋炒） 枳壳（炒） 枳实（炒） 萝卜子（炒） 香附子各三两（炒） 黄连 神曲（炒） 麦芽（炒） 鳖甲（醋炙） 干漆（炒烟尽） 桃仁（炒） 硇砂 砂仁 归梢 木香 甘草（炙）各一两 槟榔六两 山楂四两

【用法】上为末，醋糊为丸。每服三五十丸，白汤送下。

【主治】五积六聚，气块。

60793 香棱丸

【方源】《婴童百问》卷五。

【组成】木香 丁香 槟榔（去脐） 枳壳（炒） 甘松 使君子（去壳） 神曲（炒） 麦蘖（炒）各二钱半 京三棱（煨） 蓬莪术 青皮 陈皮 香附子（炒）各五钱 胡黄连一钱

【用法】上为细末，蒸饼为丸，如黍米大。空

腹时用米饮送下。

【主治】小儿积气发热,肚腹膨胀,肢体瘦弱,饮食不滋肌肤。

60794　**香棱丸**

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】川楝子(炒)　茴香(炒)　蓬术各一两　木香　三棱各五钱

【用法】上为末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,姜汤送下。

【功用】温脾消积。

60795　**香棱丸**

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】香附八两　三棱(醋浸)　蓬术(醋浸)　陈橘皮　青皮　良姜　干姜(各炒微黄)　唐球(晒干)各四两

【用法】上为末,醋煮面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食前米饮汤送下。

【主治】停滞寒物不消,或饮食积聚泄泻。

60796　**香棱丸**

【方源】《简明医彀》卷三。

【组成】三棱四两(醋炒)　青皮　陈皮　蓬术(煨)　枳实　萝卜子　香附子　厚朴各二两　黄连　肉桂　神曲　麦芽　山楂肉　槟榔　益智各一两　干漆(炒烟尽)　木香　砂仁　桃仁各五分

【用法】上为末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服七十丸,空心生姜汤送下。

【主治】五积六聚,二焦痞塞,痃癖诸积。

60797　**香棱丸**

【方源】《诚书》卷十。

【组成】木香　丁香各一钱半　大茴香(炒)　枳壳(炒)　青皮(炒)　三棱(煨)　蓬茂(切片,同巴豆七粒炒豆赤色,去豆)各一钱

【用法】上为末,面糊为丸,米饮送下。

【功用】消积聚癥块。

60798　**香棱散**

【方源】《女科万金方》。

【组成】三棱　赤芍　莪术　甘草　官桂　乌药　桃仁　红花

【用法】水煎服。

【主治】产后儿枕痛。

【备考】《郑氏家传女科万金方》有香附。

60799　**香椒散**

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】川椒　细辛　莨菪子　白芷　海桐子各等分

【用法】上为末。每用三钱,加白矾、槐枝(拍破)各少许,以水一大盏,煎至七分,热漱冷吐,痛时用之。

【主治】牙齿冷疼。

60800　**香椒散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】草乌头(生用)　胡椒　乳香(别研)　蝎梢(不去毒)各等分

【用法】上为末。擦牙痛处。吐涎,立愈。

【主治】牙疼。

60801　**香椒散**

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】香附　红川椒(炒)　故纸(炒)各二钱　荜茇一钱

【用法】上为末。和炒盐二钱,擦敷。

【主治】①《直指》:冷证齿痛。②《普济方》:虫证齿痛。

60802　**香榔散**

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】木香　槟榔各等分

【用法】酒磨服。

【主治】胃气移痛,兼治虫积。

60803　**香葛汤**

【方源】《永类钤方》卷二十一引《集验方》。

【组成】干葛一两　川升麻　羌活　桔梗(微炒)　白芍药　川芎　白茯苓　白芷　甘草各半两

【用法】上㕮咀。每用三钱,水半盏,加生姜、葱白,煎取其半服之。

【主治】小儿伤寒。

60804　**香葛汤**

【方源】《幼幼新书》卷二十七引张涣方。

【组成】藿香叶　白茯苓　甘草(炙)各半两　丁香　干葛根(锉)　人参(去芦头)各一两

【用法】上为细末,次用麝香一钱(研细)同拌匀。每服半钱至一钱,生姜汤调,放温服。

【主治】小儿呕吐后渴甚,津液燥少。

60805 香葛汤

【方源】《得效》卷一。

【组成】紫苏(去根)　白芍药　香附子(炒,去毛)　川升麻　白干葛　薄陈皮各一两　白芷　大川芎各半两　苍术(米泔浸,切,炒黄色)一两　大甘草半两

【用法】上锉散。每服四大钱,水一盏半,加生姜三片,煎热服,不拘时候。

【主治】四时感冒不正之气,头痛身疼,项强寒热,呕恶痰嗽,腹痛泄泻,或风寒湿痹。

【加减】如发热无汗,遍体疼痛,加葱白二根,豆豉七粒,煎热服,得汗即解;呕,去苍术,加白术数片,藿香数叶;中脘胀满,大便秘,加枳实、槟榔各半钱;有痰,加半夏半钱;咳嗽,加五味子七粒;鼻塞,加桑白皮三寸;腹痛,加枳壳半片(去瓤,切);泄泻,加木瓜三片;如伤寒不分表里,以此药导引经络,如热多,口渴心烦,脏腑坚,或加前胡;无汗,可加麻黄;汗太过,加麻黄根。

60806 香葛汤

【方源】《医学入门》卷五。

【组成】香薷散　升麻葛根汤

【用法】上㕮咀。加生姜,煎服。

【主治】夏月感冒暑邪。

60807 香葛汤

【方源】《医级》卷七。

【组成】香薷　葛根　厚朴　扁豆

【主治】暑月郁闷,胸膈不舒,或作呕泄。

60808 香葛饮

《赤水玄珠》卷二十六。为《永类钤方》卷二十一“香葛散”之异名。见该条。

60809 香葛散

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】藿香(去土)　干葛　甘草(炙)各一两　白梅肉半两(炒)

【用法】上为细末。煎浮萍草汤调下半钱,不拘时候。

【主治】小儿疳渴饮水。

60810 香葛散

【方源】《永类钤方》卷二十一。

【异名】香葛饮(《赤水玄珠》卷二十六)。

【组成】香附子(净)　陈紫苏叶各二两　陈皮一两　甘草(炙)半两　粉葛一两

【用法】上为粗末。每服三钱,水半盏,加生姜、葱白煎,半温热服。

【主治】①《永类钤方》:小儿伤寒,夹食夹惊,及四时瘟疫。②《育婴秘诀》:夹食伤寒,不吐利者。

60811 香葛散

《普济方》卷三八六。为《圣惠》卷八十三“枇杷叶散”之异名。见该条。

60812 香粟散

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】罂粟壳(蜜炙)二两　地榆　木香　陈橘皮(去白)　干姜(炮)　甘草(炙)各半两

【用法】上为粗末。每服三钱,水一盏半,加大枣一枚,同煎至一盏,去滓,食前通口服。

【主治】久新痢疾。

60813 香硫饼

【方源】《种福堂方》卷二。

【组成】麝香二钱　辰砂四钱　硼砂二钱　细辛四钱(俱为细末)　角刺二钱　川乌尖二钱(俱用黄酒半斤煮干,为末)　硫黄六两四钱

【用法】先用硫黄、角刺、川乌入铜勺内,火上化开,再入前四味末搅匀,泼在干净土地上,候冷取起,打碎成黄豆大。用时以干面捏成钱大,比钱薄些,先放在患处,置药一块在上,以香火点着,连灸三火即愈。

【主治】寒湿气。

60814 香蛤散

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】车螯壳(火煅)一两　乳香半两(别研)　甘草一两(炙锉)　腻粉半钱

【用法】上为细末。每服一钱,食后用乳香温酒调下,日进三服。

【主治】妇人奶痈,才觉作疼,毒气欲结者。

【备考】本方方名,《普济方》引作"香螯散"。

60815　香腊膏

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】黄连(宣州者,去须)　秦皮各一两

【用法】上为粗末,用腊月腊日五更井华水一碗,浸前药三七日,绵滤银器内,用文武火煎尽水如膏,加生龙脑少许和匀,瓷合收。每用倒流水化少药,候匀点之。

【主治】暴赤眼,风热痒痛。

60816　香犀丸

【方源】《幼幼新书》卷八引《刘氏家传》。

【组成】金银箔各三十片　羌活　远志　使君子(炮)　京墨(烧过)　全蝎　白附子　麻黄(去根节)　犀角各三钱　青黛(研细)　滴乳(别研)　熊胆　芦荟(各汤化)　朱砂(别研)　陈腊茶(第一等好者)　天竺黄(别研)各二钱　真麝香(别研)一钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如小弹子大。每用一丸分作六服,用薄荷汤化下。

【功用】镇心化涎。

【主治】小儿惊积,一切无辜惊疾。

60817　香犀丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】犀角屑　羚羊角屑　玳瑁屑　琥珀末　地骨皮　大黄各半两　威灵仙(去骨)　黄芩各一两　牵牛子五两(炒)　芍药二两

【用法】上为细末,淡面糊为丸,如梧桐子大,晒干。每服三十丸,加至五十丸,开水送下,不拘时候。

【主治】腿膝脚气及风毒在经络,小便闭涩。

60818　香犀酒

【方源】《普济方》卷二四六。

【组成】香豉三升　犀角八两(锉末)

【用法】香豉九蒸九晒,三蒸三晒亦得。用一生绢袋贮,好酒九升渍之五日。其犀角末散着袋外,每服常搅,令犀角末入酒中。每服三合,量性增减,一日三次。

【主治】脚气。

60819　香椿散

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】香椿嫩叶(酒浸,焙)三两　甘草(炙)　南壁土(向日者)　腊茶各一两

【用法】上为散。每服二钱匕,用酒调下,空心临卧服。如患久者,更入甘遂、柴胡各半两。

【主治】瘴气恶心,四肢疼痛,口吐酸水,不思饮食,憎寒壮热,发过引饮,谓之黑脚瘴、虾蟆瘴、哑瘴、黄芒瘴、黄茅瘴。

60820　香楝饮

【方源】《类证治裁》卷七。

【组成】石菖蒲　青木香　荔枝核　川楝肉　草薢

【用法】上为末。每服二钱,入麝香少许,茴香(盐炒,研末),同热酒冲调服。

【主治】久疝。

60821　香楝酒

【方源】《回春》卷五。

【组成】南木香　小茴香　大茴香　川楝肉各三钱

【用法】上合作一服,锅内炒至香,入葱白(连须)五根,用水一碗,淬入锅内,以碗罩住,候煎至半碗,取出去滓,加好酒半碗合和,入炒盐一茶匙,空心热服。极痛者,一服立愈。

【主治】偏坠疝气。

60822　香槐散

【方源】《医统》卷四十二。

【组成】香附子(炒)　槐花(炒)各一两　枳壳　当归　川芎五分　甘草三分

【用法】上以水一盏半,加生姜三片,大枣一枚,煎服。

【主治】肠风。

【备考】方中枳壳、当归用量原缺。

60823 **香蒲丸**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】松香二十两(水澄化七次) 草乌八两 川乌四两(上二味用水二桶,煎浓去滓) 鲜菖蒲(煎浓去滓)二斤 防风 荆芥 羌活 甘草各一两(水一桶煎浓汁,沉去滓泥脚)

【用法】将二乌汁煎松香,干;次入防风等汁煮松香,干;又入菖蒲汁煮松香,干;又将醋一碗煮松香,干,熬之,水浸出火毒,取晒为末。病在上部醋为丸,病在下部面糊为丸。初服一钱半,三日;次三日服二钱半,进两次;到七日,再服一钱五分,每日二次;到十日服二钱五分,每日二次,周而复始,空心酒送下。

【主治】大麻风。

60824 **香雷散**

【方源】《幼幼新书》卷三十一引张涣方。

【组成】雷丸 鹤虱 苦楝根 淡芜荑各半两

【用法】上为细末。每服半钱,用生精猪肉淡汤调下,不拘时候。

【主治】①《幼幼新书》引张涣方:小儿虫动啼叫不止。②《卫生总微》:蛲虫攻蚀下部。

60825 **香鼠散**

【方源】《中藏经》。

【组成】香鼠皮四十九个(河中花背者是) 龙骨半两 蝙蝠二个(用心肝) 黄丹一分 麝香一钱 乳香一钱 没心草一两(烧灰)

【用法】上入埚合中,用泥固济,以炭三斤煅,火终,放冷,为末。用葱浆水洗净,以药贴之。立效。

【主治】漏疮。

60826 **香煎丸**

【方源】《普济方》卷三九九。

【组成】乳香 沉香各一钱 肉豆蔻一个(煨) 百草霜 木香 丁香各一钱 巴豆十四粒(出油如霜)

【用法】上为末。煮酒封头蜡为丸,如绿豆大。每服三五丸,淡生姜汤送下。常服以通为度。

【主治】小儿虫动,腹痛啼叫,口吐涎沫。

60827 **香槟散**

【方源】《普济方》卷三八六。

【组成】木香 槟榔 黑牵牛 青皮各半两 商陆一两

【用法】上为末。三岁一钱,煎木通汤调下。或面糊为丸,如小豆大。每服三十丸,米汤送下。常服肚大自消。

【主治】小儿疳食气,腹大气粗,浮肿。

60828 **香槟散**

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】木香 槟榔各等分(一方加黄连、当归各等分)

【用法】上为末。掺上;干者蜡油调涂。

【功用】生肌敛肉,止痛。

60829 **香蔻丸**

【方源】《普济方》卷三九八。

【组成】黄连(去须) 木香 诃子肉(煨) 肉豆蔻 缩砂仁 白茯苓各二钱

【用法】用饭为丸。米饮送下。

【主治】小儿疳泻、疳痢。外由风寒暑湿,冷热不调,内因停滞积聚,水谷不化,频下恶物。外证毛干唇白,额上青纹,肚胀肠鸣,泄下糟粕。

【备考】本方改为饮剂,名"香蔻饮"(见《冯氏锦囊·杂症》)。

60830 **香蔻饮**

《冯氏锦囊·杂症》卷五。即《普济方》卷三九八"香蔻丸"改为饮剂。见该条。

60831 **香蜡膏**

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】香油 黄蜡

【用法】涂于纱布上外敷,或制成油纱布经高压消毒备用。

【功用】润肤生肌。

60832 **香罂散**

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】木香半两(用黄连半两同炒)　甘草一两(炙)　罂粟壳(去顶带瓤)半两(用生姜半两同炒)

【用法】上为细末。入麝香少许,食前陈米饮调下。

【主治】积痢。

60833　**香蜜散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】石燕子一枚　丁香　腻粉(别研)　密陀僧各半两　木鳖子(去壳)一两

【用法】上为细末。每服一钱,乳食前温米饮调下。

【主治】小儿乳癖不消,心腹胀硬。

60834　**香蝎丸**

【方源】《普济方》卷四〇〇引《全婴方》。

【组成】川乌头(大八角者)二个(生用)　全蝎二十一个(生用)　黑豆二十一粒(生用)　地龙(去土)半两(生用)

【用法】上为末,加麝香半字(研),拌糯米糊为丸,如麻子大。三岁十丸,酒送下,临卧服。微有汗即愈。

【主治】小儿白虎历节、诸风疼痛,游走无定,状如虫啮,昼静夜作,及一切手足不时作疼。

60835　**香蝎丸**

【方源】《朱氏集验方》卷一引《梁国佐见效方》。

【组成】檀香一钱　麝香　川乌各二钱　没药三钱　穿山甲三钱(酒炙)　全蝎一钱(草乌炒,去乌)　红曲五钱　白胶香五钱

【用法】上为末,面糊为丸。每服三十丸,空心温酒送下。

【主治】脚气。

60836　**香蝎散**

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】乳香一钱　蝎梢二钱　川乌头(去皮,生用)三钱

【用法】上为细末。每服一钱,水一盏,煎至七分,入盐少许,空心连滓热服。

【主治】小肠疝气,阴囊肿痛。

60837　**香墨丸**

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】细香墨半两　甘遂半两(煨令黄)　甜葶苈半两(隔纸炒令紫色)　前胡一两(去芦头)　川大黄二两(锉碎,微炒)　巴豆半两(去皮心,研,纸裹压去油)

【用法】上为末,入巴豆更研令匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三丸,临卧以粥饮送下。

【主治】咳嗽,喉中呀呷声。

60838　**香墨丸**

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】香墨三分　肉豆蔻三分(去壳)　槟榔三分　甘遂三分(麸炒微黄)　续随子半钱　朱砂一钱(研细)　麝香一钱(研细)　巴豆一分(去皮心,研,纸裹压去油)　木香三分　猪牙皂荚一钱(去黑皮,涂酥炙焦黄,去子)

【用法】上为末,入麝香、朱砂、巴豆等研药,更研令匀,以醋糊为丸,如绿豆大。每服三丸,以生姜汤送下。

【主治】食不消化,结聚成癥癖块,头面浮肿,腹胀不能食。

60839　**香墨丸**

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】香墨半两　硫黄半两　硇砂半两　朱砂半两　麝香一分　巴豆半两(去皮心,研,纸裹压去油)

【用法】上为极细末,以醋糊为丸,如绿豆大。每服三丸,空心以温酒送下。

【主治】妇人癥痞。

60840　**香墨丸**

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】香墨半两　芫花一两(醋拌炒令干)　川大黄半两(锉碎,微炒)　青礞石半两　巴豆一两(去皮心,研,纸裹压去油)　硇砂半两(研细)

【用法】上为末,用醋糊为丸,如小豆大。每服五丸,空心暖干姜汤送下。

【主治】妇人积年食癥及血气。

60841 **香墨丸**

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】香墨半两 芫花半两(醋拌炒令干) 京三棱一两(微煨,锉) 硇砂半两(研细) 巴豆一分(去皮心,研,纸裹压去油) 桃仁半两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 狗胆二枚(干者)

【用法】上为末,以醋一大碗,熬上药末,候可丸,即丸如绿豆大。每服三丸,食前温酒送下。

【主治】产后血瘕,腹胁疼痛,经脉不利。

60842 **香墨丸**

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】香墨 麝香各一钱(同研细)

【用法】以腊月兔脑为丸,如梧桐子大。每服三丸,以温酒送下,不拘时候,以下为度。

【主治】产难,胞衣不下,心腹痛。

60843 **香墨丸**

【方源】《卫生总微》卷七。

【组成】好细墨(为末)

【用法】以鸡子清为丸,如黍米大。每服五七丸,米饮送下或灌之。

【主治】小儿伤寒衄血,儿小不能服散药者。

60844 **香墨汁**

【方源】《济生》卷四。

【组成】香墨 葱汁

【用法】以葱汁磨墨,滴少许于鼻中。即止。

【主治】鼻衄不止。

60845 **香墨散**

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】香墨三分 枳实一两(麸炒微黄) 黄耆一两(锉) 代赭一两 当归一两(锉,微炒) 麝香一分(研细) 白芍药三分

【用法】上为细散,入麝香,更研令匀。每服一钱,食前以粥饮调下。

【主治】痔瘘,下脓血不止。

60846 **香墨散**

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】香墨半两 露蜂房半两(微炒) 龙骨半两

【用法】上为细散。每服二钱,食前用水煎干地黄汤调下。

【主治】产后崩中,下血不止。

60847 **香墨散**

《圣济总录》卷五十八。为原书卷四十九“栝楼散”之异名。见该条。

60848 **香鲫膏**

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】乌背鲫鱼一尾

【用法】须活者约重三四两。连肠杂鳞翅,入石臼内捣烂,加当归三分,再捣匀摊布上,贴脐上。次日取下再换。贴后有黄水流出为妙。

【主治】黄疸。

60849 **香鳖散**

《普济方》卷三四七。即《杨氏家藏方》卷十六“香蛤散”。见该条。

60850 **香橙汤**

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】橙子(大者)三斤(破去核,切作片子,连皮用) 生姜五两(去皮,切片,焙干)

【用法】于净砂盆内烂研如泥,次入炙甘草末二两,檀香末半两,并搜和捏作饼子,焙干为细末。每服一钱,入盐少许,沸汤点服。

【功用】宽中,快气,消酒。

60851 **香橙饼**

【方源】《随息居饮食谱》。

【组成】橙皮二斤(切片) 白沙糖四两 乌梅肉二两(同研,捣烂) 甘草末一两 檀香末五钱

【用法】上捣成小饼,收干藏之。汤煮代茶,或噙口中。

【功用】生津舒郁,辟臭解酲,化浊痰,御岚瘴,调和肝胃,定痛止呕。

60852 **香橘丸**

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】丁香皮六钱 青橘皮(去白,焙)半

两　硇砂(研细,水飞)一分　木香　京三棱　蓬莪术(炮,锉)　缩砂仁　桂(去粗皮)　陈橘皮(去白,焙)各半两　巴豆二十二枚(去皮,同乌梅一处捣令匀烂)　乌梅(和核用)二两

【用法】上为末,面糊为丸,如绿豆大。每服十五丸,食后温生姜、橘皮汤送下。

【主治】胃寒肠热,腹胀泄利。

60853　香橘丸

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【异名】木香丸。

【组成】木香一分　青橘皮(去白,盐炒)　槟榔(锉)各半两　半夏(汤洗七遍,去滑)　白矾(熬令汁枯)各一分　牵牛子(炒)三分

【用法】上为末,煮枣肉为丸,如梧桐子大。每服二十丸至三十丸,生姜汤送下,不拘时候。

【主治】留饮宿食,腹胁胀满,不喜饮食;膈痰结实,胁膈不利,头目昏眩。

60854　香橘丸

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】陈橘皮(汤浸,去白,焙)二两　丁香　诃黎勒皮　甘草(炙)　青橘皮(汤浸,去白,焙)各半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服一丸,生姜汤化下,三岁以上二丸。

【功用】和胃气。

【主治】小儿洞泄,心腹胀痛,不思奶食。

60855　香橘丸

《卫生总微》卷十三。为《幼幼新书》卷十七引张涣方“香橘皮丹”之异名。见该条。

60856　香橘丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】青橘皮(去白)　肉豆蔻各二两　黑牵　木香(锉)各半两

【用法】先将橘皮炒黄,次下肉豆蔻、牵牛、木香,略同炒转色,并为细末,煮面糊为丸,如黍米大。周岁儿每服十丸,乳食后生姜汤送下。

【功用】宽中快膈,消化乳食。

【主治】小儿脾胃挟伤,心腹胀满,胸膈不快,哽气喘粗,小便不利。

60857　香橘丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】香附子(去毛)　橘皮(去白)　生姜各等分

【用法】上为细末,神曲糊为丸,如梧桐子大。每服四五十丸,白汤送下,不拘时候。

【功用】降气消痰,宽中快膈。

60858　香橘丸

【方源】《医方类聚》卷九十四引《经验良方》。

【异名】香橘皮丸(《普济方》卷一八四)。

【组成】生姜半斤　陈皮二钱(不去白)　青皮二钱(不去白)　甘草　缩砂　神曲　麦蘖各半两　丁香三钱

【用法】上以陈皮、青皮、甘草、缩砂,用生姜烂研,同淹四味一宿,次日同诸药焙为末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,细嚼,白汤送下。

【主治】冷气攻刺心腹,及脾胃不和,中脘气痞,心腹胀闷,不思饮食,呕吐痰逆,噫气吞酸,及宿食不消,吐之不出,咽之不下,诸般气疾。

60859　香橘丸

【方源】《医方类聚》卷二五五引《经验良方》。

【组成】使君子(去皮壳)一两　诃子　神曲　麦蘖　甘草　厚朴(姜汁制)各半两　陈皮　木香各二钱半

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如樱桃大。米汤化下一丸。

【主治】①《医方类聚》引《经验良方》:小儿疳瘦,泄泻无时,不思饮食。②《普济方》:小儿疳痢,冷热不调,水谷不化。

60860　香橘丸

【方源】《普济方》卷三八六。

【组成】杏仁十四个　巴豆十四个　青皮

陈皮各半两 麸半升

【用法】上一处炒白，为细末，醋糊为丸，如绿豆大。每服十丸至二十丸，冷生姜汤送下。

【主治】小儿四肢肿满。

60861 **香橘丸**

《痘疹传心录》卷十七。为《奇效良方》卷六十四“香橘饼子”之异名。见该条。

60862 **香橘丸**

《准绳·幼科》卷五。为原书同卷“香连丸”之异名。见该条。

60863 **香橘丸**

【方源】《玉案》卷六。

【组成】橘红 茯神 青皮 麦芽 厚朴 山楂各二两 砂仁 三棱 神曲 人参 泽泻各一两 甘草五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，生姜汤化下。

【主治】吐泻或食积所伤，肚腹作痛，脾胃不和，蛔虫上行。

60864 **香橘丸**

《慈幼新书》卷十。为《活幼心书》卷下“香橘饼”之异名。见该条。

60865 **香橘丹**

《普济方》卷三八七。为《幼幼新书》卷十七引张涣方“香橘皮丹”之异名。见该条。

60866 **香橘丹**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【异名】小儿香橘丹(《中药制剂手册》)。

【组成】茯苓十八两 苍术(炒)十八两 白术(炒)十八两 橘皮十八两 香附(炙)十八两 山药十二两 法半夏十二两 白扁豆十二两 薏米(炒)十二两 莲肉十二两 枳实(炒)十二两 厚朴(炙)十二两 山楂十二两 神曲(炒)十二两 麦芽(炒)十二两 砂仁六两 泽泻六两 甘草六两 木香三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重一钱。每服一丸，温开水送下，一日二次。周岁以内小儿酌减。

【功用】理脾止泄，健胃消食。

【主治】①《北京市中药成方选集》：停食伤乳，脾胃不和，呕吐泄泻，身热腹胀，不思饮食。②《全国中药成药处方集》：肠胃虚弱，消化不良，胃口不开，慢性肠胃炎；小儿脾胃衰弱，吐泻，久泻，久痢，大小便不分。

【宜忌】《全国中药成药处方集》：忌食生冷、油腻。便秘者勿服。

60867 **香橘丹**

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】橘红 广木香 青皮(醋炒)各五钱 神曲(麸炒) 炒麦芽各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸一钱重，蜡皮或蜡纸筒封固。每次服一丸，周岁以内酌减，白开水化下。

【功用】健胃，化滞，止泻。

【主治】伤乳伤食，腹胀腹痛，呕吐泄泻，红白痢疾。

【宜忌】忌食寒凉硬食。

60868 **香橘汤**

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】青橘皮(汤浸，去白，焙) 乌头(炮裂，去皮脐) 干姜(炮) 白豆蔻(去皮)各半两 益智(去皮) 甘草(炙)各一两 沉香一分 茴香子(微炒)一两半

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，入盐少许，大枣一枚(擘破)，同煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】脾虚，胸膈妨闷，不思饮食，四肢乏力，脐腹撮痛，大便滑泄。

60869 **香橘汤**

【方源】《直指》卷五。

【组成】香附(炒) 半夏(制) 橘红各二两 甘草(炒)三分

【用法】上锉散。每服三钱，加生姜五片，大枣二枚，水煎服。

【主治】七情所伤，中脘不快，腹胁胀满。

60870 **香橘汤**

【方源】《普济方》卷一八一。

【组成】香附子(大者，去须) 陈皮(去白)

枳实(生用)　白术各四两　甘草

【用法】上为细末。每服二钱,入盐少许,沸汤点服;或用生姜、大枣煎服尤妙。如伤风,用生葱白二寸,生姜五片,大枣二枚,水一盏,煎至七分,温服,不拘时候。

【主治】一切气不快,久病服药不效者。

【备考】方中甘草用量原缺。

60871　**香橘饮**

【方源】《直指》卷十一。

【组成】木香　白术　半夏曲　橘皮　白茯苓　缩砂各半两　丁香　甘草(炙)各一分

【用法】上为散。每服三钱,加生姜五厚片同煎,吞苏合香丸。

【主治】气虚眩晕。

【加减】血虚眩晕,加当归、川芎各三分,官桂半两。

【备考】本方方名,《普济方》引作"香橘散"。

60872　**香橘饮**

【方源】《玉案》卷四。

【组成】白茯苓　香附各一钱五分　石斛　橘红　人参　砂仁各二钱

【用法】加大枣二枚,水煎服。

【主治】脾脏不和,饮食不进,神思困倦。

60873　**香橘饼**

【方源】《活幼心书》卷下。

【异名】香橘丸(《慈幼新书》卷十)。

【组成】南木香　陈橘皮(去白)　青皮(去白)各二钱半　厚朴(去粗皮,锉碎,每一斤用生姜一斤薄片,切、烂杵拌匀,酿一宿,慢火炒干用)七钱　缩砂仁　神曲(湿纸裹炮)　麦芽(净洗,焙)各五钱　三棱(炮,锉)三钱

【用法】上除木香不过火外,余七味锉、焙,仍同木香研为细末,炼蜜捻作饼子,如芡实大。每服一饼至三饼,用大枣汤化开,空心温服;米清汤亦可。

【主治】婴孩过伤乳食,或吐或泻,及病后虚中感积成痢,气弱神昏,面黄目慢。

60874　**香橘饼**

《婴童百问》卷七。为《奇效良方》卷六十四"香橘饼子"之异名。见该条。

60875　**香橘饼**

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】橘红　青皮　厚朴(姜汁炒)　青木香　山楂肉　茯神(去皮木)　神曲(炒)　麦芽(炒)　白术(炒)各四两　香附(炒)　三棱　砂仁(炒)各二两　蓬术一两　广木香五钱　甘草二两(炙)　人参二两(虚者用)

【用法】上为末,炼蜜作饼,空心米汤送下;白痢,生姜饭汤送下。

【主治】小儿久泻痢致脾虚脱肛不收,冷热不调,赤白脓血痢疾,小腹疼痛,或禁口不食,日夜无度,里急后重,经久不愈,及疳积下痢,泄泻不止。

60876　**香橘饼**

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】丁香　橘红各等分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如黄豆大。作饼噙化。

【主治】小儿吐泻。

60877　**香橘饼**

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】木香　橘皮　青皮各二钱半　半夏　厚朴　神曲　麦芽　砂仁各五钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如芡实大。每服一丸,紫苏煎汤或米汤任下。或加豆蔻、诃子。

【主治】初生吐泻,壮热不思乳食,大便色白或不通。

60878　**香橘散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】茴香(炒)　青橘皮(汤浸去白)　京三棱(炮,切)　槟榔(鸡心者)各一两　木香半两

【用法】上为细末。每服二钱,入盐一捻,沸汤点服,不拘时候。

【主治】小肠气发作,攻筑疼痛,及诸般冷气刺痛。

60879　**香橘散**

《普济方》卷四十七。即《直指》卷十一"香橘饮"。见该条。

60880 **香橘散**

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】小茴香　橘核（或枳实核）　糖球各一两　八角茴香七枚

【用法】上为细末。每服二钱，空心温酒调下。

【主治】①《杏苑》：一切疝气。②《张氏医通》：睾丸偏坠。

60881 **香橘散**

【方源】《女科指掌》卷五。

【组成】香附　橘核（酒炒）

【用法】上为末。每用五钱，水煎，去滓服。

【主治】产后呃逆。

60882 **香橘膏**

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】砂仁二钱　白蔻仁一钱　莲肉山药　木香　青皮（炒）各五钱　陈皮　厚朴（制）各一两　麦芽（炒）　神曲（炒）各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡头大。每服一丸，吐，用紫苏汤送下；泻，用荆芥汤送下。

【主治】小儿吐泻。

60883 **香橼丸**

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】陈极香橼皮二两　真川贝三两（去心）　炒黑当归一两五钱　白通草一两（或烘或晒）　甜桔梗三钱　陈西瓜皮一两（隔年预备，晒干）

【用法】上为细末，煎浓，白檀香水泛为丸，如梧桐子大。每服三钱，开水送下。大虚者酌用。

【主治】一切气逆，不进饮食，或即呕哕。

60884 **香橼汤**

【方源】《遵生八笺》卷十一。

【组成】大香橼（不拘多少）二十个

【用法】切开，将内瓤以竹刀刮出，去囊袋并筋，收起，将皮刮去白，细细切碎，以笊篱热滚汤中焯一二次，榨干收起，入前瓤内，加炒盐四两，甘草末一两，檀香末三钱，沉香末一钱（不用亦可），白蔻仁末二钱，和匀，用瓶密封，可久藏用。每以箸挑一二匙，充白滚汤服。

【功用】醒酒化食，导痰开郁。

【主治】胸膈胀满膨气。

60885 **香橼散**

【方源】《续刊经验集》。

【组成】香橼一个（床内挂干者，将内衣去净）　真人中黄一钱

【用法】将真人中黄放入香橼内，外用泥坛头糊碗大，用文武火煨透，以烟尽为度，研极细末，放土上存性，调下一服即愈，重者二服全好。

【主治】一切小儿疳疾，饮食过伤，以至成疳。

60886 **香橼膏**

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷五。

【组成】陈香橼（好者）六七只（鲜者亦可）

【用法】刻下蒂，如钱大一圈，每只人上好松萝茶叶一层，浇入上白福蜜沥净者，茶一层，蜜一层，填满实，上盖一分厚生姜一大片，仍将刻下圆蒂盖好，苎麻扎好，日蒸夜露四五次，开蒂盖看，如觉干，独加蜜少许，不加茶叶，覆盖好扎紧，再蒸露至九次后，共捣成膏，装人磁器内。每晨雨水滚汤化下三四匙。甚妙。

【主治】远年痰火咳嗽，结痰音哑，气逆不顺。

60887 **香糖丸**

【方源】《普济方》卷三八二。

【组成】轻粉一钱

【用法】糖沙溲和为丸，如鸡头子大。三岁一丸，米汤化下。食久泻下泥土后，服益黄散。若治疳泻痢，以陈皮、地榆煎汤化下。

【主治】小儿吃泥害肚，进退不定，并治疳泻。

60888 **香薷丸**

【方源】《局方》卷二。

【组成】香薷（去土）　紫苏（茎叶，去粗梗）

干木瓜各一两 丁香 茯神(去木) 檀香(锉) 藿香叶 甘草(炙)各五钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每两作三十丸。每服一丸至二丸,细嚼,温汤送下,或新汲水化下亦得;小儿服半丸,不拘时候。

【功用】《北京市中药成方选集》:清暑祛湿。

【主治】①《局方》:大人、小儿伤暑伏热,燥渴瞀闷,头目昏眩,胸膈烦满,呕哕恶心,口苦舌干,肢体困倦,不思饮食,或发霍乱,吐利转筋。②《北京市中药成方选集》:伤暑伤湿,发热头痛,呕吐恶心,腹痛泄泻。

【方论选录】《慈禧光绪医方选议》:此方芳香除秽,酸甘养阴,略佐淡渗去湿,而重用香薷辛温解表散寒,兼能祛暑化湿。

60889 香薷丸

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【异名】小香薷丸(《鸡峰》卷五)。

【组成】香薷一两半 白扁豆(炒) 木香各一两 丁香皮二两 藿香(去梗) 零陵香各半两 益智仁一分

【用法】上为末,面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食前紫苏汤送下。

【主治】①《圣济总录》:冷热不调,霍乱吐泻。②《鸡峰》:暑气。

60890 香薷丸

《鸡峰》卷十九。为《外台》卷二十引《深师方》“香薷术丸”之异名。见该条。

60891 香薷汤

【方源】《外台》卷六引《救急方》。

【组成】生香薷(切)一升 小蒜一升(碎) 厚朴六两(炙) 生姜十两

【用法】上切。以水一斗,煮取三升,分三次温服。得吐痢止。

【主治】霍乱,腹痛吐痢。

60892 香薷汤

【方源】方出《圣惠》卷三十六,名见《赤水玄珠》卷三。

【组成】香薷一斤

【用法】以水一斗,煎取三升,热含冷吐。

【主治】口臭。

60893 香薷汤

《圣济总录》卷三十八。为《局方》卷二“香薷散”之异名。见该条。

60894 香薷汤

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【异名】香薷散(《普济方》卷二〇二)。

【组成】香薷(锉)二握 木瓜(去瓤子,焙干,锉) 荆芥穗 熟艾各半两 陈廪米(炒)半合 黑豆(炒)一合

【用法】上为粗末。每服半钱匕,以水一盏半,煎至一盏,去滓温服。一日三次,如人行三五里进一服。

【主治】①《圣济总录》:卒霍乱吐泻,腹刺痛,上吐下泻。②《普济方》:霍乱吐泻,烦渴腹痛,或转筋体冷,脉微。

60895 香薷汤

【方源】《圣济总录》卷三十九。

【组成】香薷二两 蓼子一两

【用法】上为末。每服二钱匕,水一盏,煎七分,去滓温服,一日三次。

【主治】霍乱吐利,四肢烦疼,冷汗出,多渴。

60896 香薷汤

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】香薷 藿香叶 白豆蔻(去皮) 甘草(炙,锉) 白术 麦门冬(去心,炒) 陈橘皮(去白,焙)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后呕逆不止。

60897 香薷汤

【方源】《圣济总录》卷一八四。

【组成】香薷三分 木瓜(干者,去瓤) 人参 陈橘皮(汤浸去白,焙) 厚朴(去粗皮,生姜汁炙熟)各一两 桂(去粗皮)半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,加生姜半分(切),煎取八分,去滓温服,不拘

时候。

【主治】乳石发，霍乱转筋不止。

60898 香薷汤

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】香薷叶（洗净） 甘草（炙） 干姜一两半（炮，洗） 橘红半两 赤茯苓（去皮） 檀香（不见火） 缩砂各一两 川厚朴三两（去皮，姜汁制）

【用法】上为细末。沸汤加盐点服。不肯服五苓散，恶其滑精者，乃以此代之。

【主治】伏暑。

60899 香薷汤

【方源】《局方》卷二（续添诸局经验秘方）。

【异名】香薷饮（《内科摘要》卷下）。

【组成】白扁豆（炒） 茯神 厚朴（去粗皮，锉，姜汁炒）各一两 香薷（去土）二两 甘草（炙）半两

【用法】上为细末。每服二钱，沸汤点服，入盐点亦得，不拘时候。

【功用】宽中和气，调营卫。常服益脾温胃，散宿痰停饮，能进食，辟风、寒、暑、湿、雾露之气。

【主治】①《局方》：饮食不节，饥饱失时，或冷物过多，或硬物壅驻，或食毕便睡，或惊忧恚怒，或劳役动气，便欲饮食，致令脾胃不和，三脘痞滞；内感风冷，外受寒邪，憎寒壮热，遍体疼痛，胸膈满闷，霍乱呕吐，脾疼翻胃；中酒不醒；四时伤寒头痛。②《东医宝鉴·杂病篇》：暑病吐泻。

60900 香薷汤

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】香薷一两五钱 甘草一两五钱 扁豆一两五钱 赤苓一两 黄耆二钱 厚朴二钱 陈皮二钱 菊花一钱

【用法】水煎服。

【功用】益气调中，清暑去湿。

60901 香薷饮

【方源】方出《证类本草》卷二十八引《肘后方》，名见《不知医必要》卷二。

【组成】香薷汁

【用法】共服一升，每日三次服尽。

【主治】舌上出血如钻孔者。

60902 香薷饮

【方源】方出《圣惠》卷四十七，名见《圣济总录》卷四十。

【组成】香薷一握（切） 生姜半两（切） 木瓜一两（锉）

【用法】上药以水二大盏，煎至一盏，去滓，加白米半合，煮成粥，入少酱汁为味，吃一二服效。

【主治】①《圣济总录》：霍乱后，胃气虚，不能安卧。②《普济方》：霍乱后，胀满，手足冷。

60903 香薷饮

【方源】《圣济总录》卷三十八。

【异名】香连饮子（《杨氏家藏方》卷三）、黄连饮（《普济方》卷二〇一）。

【组成】香薷（去梗）二两半 草乌头（浸，切，去皮脐，晒干）二两（入盐三两同炒乌头黄褐色，去盐不用） 藿香（去梗，焙）二两 黄连（去须，以吴茱萸二两同炒黄连，去茱萸不用）二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水二盏，加酒半盏，同煎至一盏，去滓，用新汲水沉冷顿服。相次四肢暖，吐泻定。病轻每服一二钱匕。

【主治】霍乱吐泻，四肢厥冷。

60904 香薷饮

【方源】《普济方》卷一九九引《医方集成》。

【组成】香薷二两 厚朴一两 白扁豆一两半（炒研） 甘草（炙）一两

【用法】每服加灯心二十茎，麦门冬（去心）二十粒，淡竹叶七片，车前草二根，晚禾根一握，槟榔一枚（切片），水煎服，不拘时候。

【主治】瘴疟，伤暑，霍乱，痢疾，头痛。

①《普济方》引《医方集成》：瘴疟，但热不寒，阴气孤绝，阳气独发，少气烦冤，手足热而欲呕，兼渴。②《丹溪心法》：伤暑脏腑不调，霍乱吐利，烦渴引饮。③《玉机微义》：伏暑吐泻。

④《郑氏家传女科万金方》:胎前霍乱吐泻;夏秋脏腑冷热不调,饮食不节,吐利,心腹疼痛,发热烦闷。⑤《杂病源流犀烛》:暑湿痢疾,伤暑头痛,恶热。

60905　香薷饮

【方源】《普济方》卷三九〇。

【组成】香薷四两　厚朴(制)　扁豆(姜制)各二两

【用法】上锉。加乌梅水煎,临熟入生姜汁温服。

【主治】暑疟。

60906　香薷饮

《内科摘要》卷下。为《局方》卷二(续添诸局经验秘方)"香薷汤"之异名。见该条。

60907　香薷饮

《直指附遗》卷三。即《局方》卷二"香薷散"。见该条。

60908　香薷饮

《回春》卷二。为《苏沈良方》卷四引《五脏论》"神圣香茸散"之异名。见该条。

60909　香薷饮

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】香薷一钱半(盐水煮干)　厚朴一钱半(盐水炒灰)　扁豆五钱　茯苓一钱半　木香一钱半(切)　藿香一钱半　甘草五分

【用法】水煎去滓,微温服。

【主治】孕妇腹中卒痛,脉虚者。

【方论选录】妊娠暑伤脾胃,气滞不化而痞塞于中,故腹卒满疼痛,胎因之不安。香薷散皮肤之暑,煮熟不耗胎孕之气;厚朴除腹里之满,炒灰不伤胎元之气;扁豆健脾却暑;茯苓渗湿和脾;木香醒脾开胃;藿香快胃祛暑;甘草缓中以和胃气。水煎微温服,使脾胃气调,则暑邪自散,腹满除而腹痛止,胎孕得安。

60910　香薷散

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】香薷　前胡(去芦头)　麦门冬(去心)各三分　人参(去芦头)　白术　甘草(炙微赤,锉)　半夏(汤洗七遍去滑)　陈橘皮(汤浸,去白瓤,焙)　诃黎勒皮各半两

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后霍乱,吐利烦渴,心胸满闷。

60911　香薷散

【方源】《局方》卷二。

【异名】香薷汤(《圣济总录》卷三十八)。

【组成】白扁豆(微炒)　厚朴(去粗皮,姜汁炙熟)各半斤　香薷(去土)一斤

【用法】上为粗末。每服三钱,水一盏,入酒一分,煎七分,去滓,水中沉冷,连吃二服,不拘时候。立有神效。

【功用】《方剂学》:祛暑解表,化湿和中。

【主治】①《局方》:脏腑冷热不调,饮食不节,或食腥脍、生冷过度,或起居不节,或路卧湿地,或当风取凉,而风冷之气归于三焦,传于脾胃,脾胃得冷,不能消化水谷,致令真邪相干,脾胃虚弱,因饮食变乱于肠胃之间,便致吐利,心腹疼痛,霍乱气逆。有心痛而先吐者,有腹痛而先利者,有吐利俱发者,有发热头痛,体疼而复吐利虚烦者,或但吐利心腹刺痛者,或转筋拘急疼痛,或但呕而无物出,或四肢逆冷而脉欲绝,或烦闷昏塞而欲死者。②《方剂学》:夏月乘凉饮冷,外感于寒,内伤于湿,致恶寒发热,无汗头痛,头重身倦,胸闷泛恶,或腹痛吐泻,舌苔白腻,脉浮者。

【备考】本方方名,《直指附遗》引作"香薷饮"。

60912　香薷散

《活人书》卷十八。为《传家秘宝》卷中"无比香薷散"之异名。见该条。

60913　香薷散

【方源】《圣济总录》卷三十四。

【组成】香薷二两

【用法】上为散。每服二钱匕,水一盏,煎取七分,不去滓,温服,不拘时候。

【主治】中暑烦躁。

60914　香薷散

《普济方》卷二〇二。为《圣济总录》卷三十

八"香薷汤"之异名。见该条。

60915 **香薷散**

【方源】《校注妇人良方》卷七。

【组成】香薷二钱 白扁豆 厚朴(姜制) 茯苓各一钱

【用法】上水煎，冷服，连进二三剂。

【主治】①《校注妇人良方》：吐利腹痛，发热头痛，或霍乱转筋拘急。②《保婴撮要》：寒温不适，饮食失调，或外因风寒暑邪致吐利心腹疼痛，霍乱气逆，发热头痛或疼痛呕哕，四肢逆冷。

【备考】加黄连，名"黄连香薷饮"。

60916 **香薷散**

《幼科证治大全》。为《圣惠》卷八十九"香薷煎"之异名。见该条。

60917 **香薷散**

【方源】《家庭治病新书》。

【组成】香薷 陈皮各一钱 白扁豆 茯苓各三钱 厚朴一钱五分 黄连八分 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】霍乱吐泻，身热腹痛者。

60918 **香薷煎**

【方源】《本草图经》引《胡洽方》(见《证类本草》卷二十八)。

【组成】干香薷五十斤

【用法】上锉，纳釜中，以水淹之，水出香薷上一寸，煮使气力都尽，清澄之，严火煎令可丸，即丸如梧桐子大。每服五丸，日渐增之。以小便利为度。

【主治】①《本草图经》引《胡洽方》：水病洪肿。②《普济方》引《十便良方》：水病肿胀，不消食。

60919 **香薷煎**

【方源】《圣惠》卷八十九。

【异名】香粉膏(《冯氏锦囊·杂症》卷三)、香薷散(《幼科证治大全》)。

【组成】陈香薷二两 胡粉一两 猪脂半两

【用法】上以水一大盏，煎香薷，取汁三分，去滓，入胡粉、猪脂，相合令匀，涂于头上，每日二次。

【主治】①《圣惠》：小儿白秃，不生发，燥痛。②《冯氏锦囊·杂症》：小儿发迟。

60920 **香薷膏**

【方源】《医心方》卷十引《耆婆方》。

【组成】香薷一百斤

【用法】以水煮之令熟，去滓更煎，令如饴糖。少少服之。当下水，小便数，即愈。

【主治】水病，四肢、脚、肤、面、腹俱肿。

60921 **香藤散**

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】香藤 甘草 陈皮 羌活 厚朴 当归各半两 木罂皮四两

【用法】上为细末。每服四钱，以水二盏，煎，取清温服，不拘时候。

【主治】下痢赤白，脓血不止。

60922 **香蟾丸**

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】干蟾一枚(炙焦) 麝香(研)半钱 胡黄连半两 丹砂(研) 牛黄(研) 蛇蜕(烧灰) 雄黄(研) 天竺黄(研) 熊胆(研) 蝉蜕(炙)各一分 天仙子半合(水浸出芽子为度，焙干，为细末) 肉豆蔻一枚(去壳)

【用法】上为细末，糯米饭为丸，如黄米大。每服七丸至十丸，米饮送下，一日三次，不拘时候。

【主治】小儿疳气，面黄肌瘦，发热多困，好吃泥土，挦眉咬甲，时好伏地。

60923 **香蟾丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十三引《张氏家传》。

【组成】干虾蟆(酥炙黄色) 大黄连(洗，去须) 芜荑仁 芦荟各等分

【用法】上为末，猪胆汁和面糊为丸，如梧桐子大。每服四十粒，用饭饮吞下，一日二至三次，不拘时候。

【功用】杀虫止痛，消肚膨，止泻痢，生

肌肤。

【主治】五疳,泻痢。

【宜忌】忌生冷、宿食、毒物。

60924　香蟾丸

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】大蟾一只(去肠肚,好醋浸三日,焙焦干)　芜荑(去皮)一分　黄连(去须)一分　甘草一分(炙)　夜明沙半合(用粳米百粒,同炒至焦黄,去米)　使君子(去壳)一分　麝香一字(研)

【用法】上为细末,猪胆汁为丸,如萝卜子大。每服五七丸,米饮送下,不拘时候。

【主治】小儿诸疳。

60925　香蟾丸

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】干蟾三个(酥炙焦黄)　五灵脂(去沙石)二两　蝉壳(去土)半两　雄黄半两(研飞)　诃子肉半两　母丁香半两　胡黄连一两　黄连(去须)一两　使君子仁一两　青黛一分

【用法】上为细末,面糊为丸,如绿豆大。每服二三十丸,白汤送下,不拘时候。

【主治】小儿诸疳。

60926　香蟾丸

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】鳖甲(去裙襕,醋炙黄)　虾蟆(炙黄)　诃子(炮,取肉)　木香各一两　芦荟(研)　铁粉(研)　雄黄(研飞)　胡黄连各半两　麝香二分(研)

【用法】上为细末,面糊为丸,如粟米大。每服十丸,米饮送下。病大羸瘦者,不过五七服愈。

【主治】小儿诸疳。

60927　香蟾丸

【方源】《丹溪治法心要》卷八。

【组成】三棱(炮)　蓬术(炮)　青皮　陈皮　神曲(炒)　麦蘖(炒)　龙胆草　槟榔各五钱　胡黄连　川楝子　使君子　川连各四钱　白术一两　木香二钱　干蟾五个

【用法】上为末,将蟾醋煮烂捣,再以醋糊为丸,如粟米大。每服二十丸,米饮送下。

【主治】小儿疳积、食积、虫积、肉积,腹胀。

60928　香蟾丸

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】木香　人参　黄耆　当归　桔梗　三棱　莪术　鳖甲　绿矾　枳实　使君子　楝根皮　诃子各一两　干蟾七钱五分　黄连一两

【用法】上为末,为丸如绿豆大。每服三四十丸,水饮送下。

【主治】小儿癖积。

60929　香蟾丹

【方源】《普济方》卷三七九引《医方妙选》。

【组成】干蟾五枚(水浸去骨,用瓦一个,顶头上取肉入蟾瓶内,盐泥固济,米炭火烧,留窍子,烟息为度,取出放地一宿,出火毒)　蛇蜕皮一两(烧灰)　地龙半两(炒)　天竺黄一分　蝉壳一分(以上并为细末,次入)　朱砂半两(研)　麝香一分(研)　胡黄连二两

【用法】上为末,糯米饭为丸,如黍米大。每服十粒,米饭送下,不拘时候。

【主治】①《普济方》引《医方妙选》:小儿肌瘦面黄,胸高脚细。②《卫生总微》:诸疳肌瘦,肚大筋多,发稀脚细。

60930　香蟾散

【方源】《卫生总微》卷十。

【组成】蟾一只

【用法】于五月五日取之,烧末。每服一钱,食前米饮调下。

【主治】小儿洞泻注下。

60931　香蟾散

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】干蟾一枚(涂酥,炙微黄)　蜣螂一分(去翅足,微炒)　麦蘖一分(微炒)　神曲一分(微炒)

【用法】上为细末。每服半钱,粥饮调下,不拘时候。

【主治】小儿食疳,羸瘦不进乳食。

60932 香蟾煎

【方源】《鸡峰》卷二十三。

【组成】干蟾二个（一个烧存性，一个以酒一升煮，候烂滤去骨，慢火熬成膏） 黄连 胡黄连 白芜荑各一两 青黛 麝香 芦荟各一分

【用法】上以蟾膏为丸，如麻子大。看儿大小加减服之。

【主治】小儿疳瘦。

60933 香鳔汤

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】茜草 麻黄 乌药各一撮 细茶 鱼鳔二钱（用芝麻同炒成珠） 槐子（炒焦） 花椒各五钱 乳香一钱 生姜五片 葱白五根

【用法】上锉一剂。水煎至一钟，通口温服。二三剂即愈，不发。

【主治】杨梅疮，筋骨痛久不愈者。

60934 香鳔散

【方源】《普济方》卷四〇八。

【组成】荆芥一两半 小枣儿十个（二味先烧存性） 羖羝羊须一两（烧灰存性） 枯白矾二钱半（另研细）

【用法】上为极细散，再入轻粉一钱半，调研匀。每用少许，香油调搽。重者不过三次，立效。

【主治】香鳔疮，又名月耳疮、浸淫疮。小儿耳边、身面上、胸项上浸淫黄水，到处成疮。

60935 香木洗剂

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】香附 30 克 木贼 36 克 板兰根 30 克

【用法】水煎，洗患处。

【主治】青年扁平疣。

60936 香甲煮散

《圣济总录》卷八十九。为原书卷八十七"香甲汤"之异名。见该条。

60937 香白芷散

【方源】《养老奉亲》。

【组成】当归三钱（洗） 香白芷三钱（洗） 茯苓三钱（去皮） 枳壳二钱（麸炒） 木香一钱

【用法】上为末。每服一钱，以水半盏，加生姜少许，同煎至四分，温服。

【主治】老人脏腑冷热不调，里急后重，阑门不和。

60938 香白芷散

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】香白芷半两 盐绿一钱 五倍子一分 麝香少许

【用法】上为细散。每用一字，掺疮上。

【主治】小儿口疮。

60939 香白芷散

【方源】《普济方》卷六十六引《兰室秘藏》。

【组成】麻黄（去节）一钱半 草豆蔻皮七个 草豆蔻仁七分 黄耆一钱 吴茱萸四分 藁本三分 羌活八分 香白芷四分 当归身半钱 熟地黄半钱 升麻一钱 桂枝三分

【用法】上为细末。先用温水漱洗，以药擦之。

【主治】大寒犯脑，朔风牙疼。

60940 香白芷散

《普济方》卷四十五。即《直指》卷十九"香芷散"。见该条。

60941 香白芷散

【方源】《普济方》卷二一四。

【组成】白芷 郁金 滑石各一两

【用法】上为末。每服一钱，砂石血淋，用竹叶灰温酒调下。甚者二服愈。

【主治】五淋。

60942 香朴饮子

【方源】《永类钤方》卷二十一引《幼幼方》。

【组成】人参 茯苓 甘草 紫苏叶 木瓜 泽泻 香薷 半夏曲 陈皮（净） 扁豆（炒） 乌梅肉 制厚朴各一钱

【用法】上为末。每服一钱，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】小儿伏暑吐泻，虚烦闷乱，如发

【主治】牙齿疼痛，往来不歇。

60953 **香附子散**

【方源】《普济方》卷三三一。

【组成】百草霜一两 当归 香附子 紫金皮 乌药各八钱 伏龙肝一两

【用法】上为末，以水牛膏同茴香炒，用酒调三大钱，通口服，不拘时候。

【主治】赤白带下。

【宜忌】忌食鱼腥、母猪等肉。

60954 **香附米丸**

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】香附米四两（用陈米醋泡七天七夜，以沙锅泡制七次） 小茴香四钱（黄酒炒）

【用法】上为细末，用陈米醋打浆为丸，如梧桐子大。每服三十丸，早、晚开水送下。

【主治】一切水肿肚大，两腿肿，不能行走，或因病误服凉药以致肿胀。

60955 **香茯苓散**

【方源】《普济方》卷一九三引《经验良方》。

【组成】木香（炮） 赤茯苓各一钱 大黄 甘草 鳖甲（炙）各二钱 黑牵牛三钱（头末）

【用法】上为末。每服半钱，温热水调下。以利为度。

【主治】水气，四肢浮肿，腹胁妨闷，大便秘涩。

60956 **香胭脂散**

【方源】方出《百一》卷十二，名见《普济方》卷三〇〇。

【异名】麝香散（《普济方》卷三〇〇）。

【组成】五倍子（烧灰黑存性） 染胭脂各等分 麝香少许

【用法】上为极细末，掺患处。五倍子生用亦得。

【主治】嵌甲侵肉不愈。

60957 **香栾皮汤**

【方源】《三因》卷十六。

【异名】香栾皮散（《普济方》卷四〇六）。

【组成】香栾皮一两

【用法】以一大碗水同煎，取半碗，以翎毛刷患处。

【主治】诸种丹毒，发于四肢、腹背、头面，或赤或白，或痒或痛，或寒或热。

60958 **香栾皮散**

《普济方》卷四〇六。为《三因》卷十六“香栾皮汤”之异名。见该条。

60959 **香豉饮子**

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】香豉半合 葱白七茎（切） 恒山二分 川升麻一两 鳖甲一两半（涂醋，炙令黄，去裙襕） 知母一两半 槟榔三分 生地黄一两半（切）

【用法】上锉碎。以水二大盏半，煎至一盏半，去滓，分为三服，不拘时候，一日服尽。

【主治】瘅疟，但热不寒，呕逆不下食。

60960 **香粟饮子**

【方源】《中藏经·附录》。

【组成】丁香五枚 罂粟壳五个（炙黄） 甘草一寸（炙） 白豆蔻仁一枚 乳香一皂子大

【用法】上㕮咀。以水一碗，煎至半碗，温服。

【主治】痢疾。

60961 **香遍满方**

《普济方》卷一五六。即方出《千金》卷六，名见《圣济总录》卷一〇一“丁沉丸”。见该条。

60962 **香橘皮丸**

《普济方》卷一八四。为《医方类聚》卷九十四引《经验良方》“香橘丸”之异名。见该条。

60963 **香橘皮丹**

【方源】《幼幼新书》卷十七引张涣方。

【异名】香橘丸（《卫生总微》卷十三）、香橘丹（《普济方》卷三八七）。

【组成】陈橘皮（去白，焙干） 木香各一两 白术（炮） 草豆蔻（面裹微炮） 牵牛子 姜黄各半两

【用法】上为细末，滴水为丸，如黍米大。每服十粒，煎葱白汤送下；大小便涩或不通，乳食前服。

【主治】小儿宿食痰滞，大小便涩或不通。

60964　香橘饼子

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【异名】香橘饼(《婴童百问》卷七)、香橘丸(《痘疹传心录》卷十七)。

【组成】木香(炮)　青皮(去白)　陈皮(去白)各二钱半　厚朴(制)七钱半　神曲(炒)　麦蘖(炒)各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸作饼。用淡生姜汤化下，不拘时服。

【主治】①《奇效良方》：伤食聚泻。②《简明医彀》：小儿伤食，冷积腹痛及痢疾。

60965　香薷术丸

【方源】《外台》卷二十引《深师方》。

【异名】香薷丸(《鸡峰》卷十九)。

【组成】干香薷一斤　白术七两

【用法】上白术为末，浓煮香薷取汁，和术为丸，如梧桐子大。饮服十丸，日夜四五服。夏取花、叶合用亦佳。

【功用】利小便。

【主治】暴水风，水气水肿；或疮中水，通身皆肿。

60966　香薷锉散

【方源】《直指》卷三。

【组成】香薷二两　厚朴(制)一两　茯苓　陈皮　甘草(炙)各半两　良姜二钱

【用法】上锉细。每服二钱半，加盐一捻，水煎服。

【功用】解暑毒，止霍乱。

【主治】伤暑霍乱。

60967　香贝养荣汤

【方源】《金鉴》卷六十四。

【组成】白术(土炒)二钱　人参　茯苓　陈皮　熟地黄　川芎　当归　贝母(去心)　香附(酒炒)　白芍(酒炒)各一钱　桔梗　甘草各五分

【用法】上加生姜三片，大枣二枚，以水二钟，煎八分，食远服。

【主治】肝经郁结，气血凝滞经络，致成石疽。①《金鉴》：肝郁凝结于经络，石疽生于颈项两旁，形如桃李，皮色如常，坚硬如石，痛而不热，初小渐大，难消难溃，既溃难敛，而属气虚者。②《医钞类编》：筋瘰，由肝伤恚怒，血虚不能荣筋，核坚筋缩，推之不移。③《疡科捷径》：石瘀。

【加减】胸膈痞闷，加枳壳、木香；饮食不甘，加厚朴、苍术；寒热往来，加柴胡、地骨皮；脓溃作渴，倍人参、当归、白术，加黄耆；脓多或清，倍当归、川芎。胁下痛或痞，加青皮、木香；肌肉生迟，加白蔹、肉桂；痰多，加半夏、橘红；口干，加麦冬、五味子；发热，加柴胡、黄芩；渴不止，加知母、赤小豆；溃后反痛，加熟附子、沉香；脓不止，倍人参、当归，加黄耆；虚烦不眠，倍人参、熟地，加远志、枣仁。

【备考】本方去人参，加黄耆、柴胡，名“抑气养荣汤”(见《医钞类编》)。

60968　香艾芎归饮

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】香附　焦艾　延胡各三钱　当归　川芎各二钱

【用法】水煎，温服。

【功用】理气行滞。

【主治】产后恶露不下或所下甚少，腹胀而痛，但不拒按，腰部亦痛，舌淡苔薄白，脉弦。

【加减】气滞而兼瘀，腹痛拒按，加蒲黄三钱，五灵脂二钱；面赤唇红，兼有心烦者，去川芎、当归，加桃仁、丹皮各三钱。

60969　香归止疼散

【方源】《履霜集》卷二。

【组成】当归身二钱(酒洗)　炙草一钱　元胡(炒)一钱　乳香一钱

【用法】水煎服。

【主治】妊妇心腹作痛。

60970　香归白术散

【方源】《女科指南》。

【组成】白芍　黄芩　黄连　陈皮　川芎　白术　茯苓　厚朴　泽泻　槟榔　木香　当归　砂仁七粒　甘草

【用法】上加生姜五片，水煎服。
【主治】胎前产后，下痢赤白。
【备考】方中除砂仁外，余药用量原缺。

60971 **香归愈痛汤**

【方源】《女科万金方》。
【组成】青皮 陈皮 枳壳 桔梗 香附 甘草 官桂 三棱 莪术
【主治】小腹腰痛。

60972 **香朴补虚汤**

【方源】《鸡峰》卷五。
【组成】厚朴 苍术各十分 茴香 附子 干姜各五分 陈皮四分 甘草三分
【用法】上为细末。每服二钱，以水一盏，加生姜三片，大枣一个，同煎至八分，空心温服，生姜盐煎亦可，不拘时候。
【功用】补益脾胃。
【主治】伤寒伤食，及夏秋疟疾。

60973 **香芎二陈汤**

【方源】《症因脉治》卷二。
【组成】半夏 白茯苓 广皮 甘草 香附 川芎 白芥子
【主治】寒痰郁结，胸满饱胀，脉沉迟。

60974 **香衣辟汗方**

【方源】《本草纲目》卷三十四引《多能鄙事》。
【组成】丁香一两（为末） 川椒六十粒
【用法】和之，绢袋盛。佩带。绝无汗气。
【功用】香衣辟汗。

60975 **香壳黄连丸**

【方源】《杏苑》卷八。
【组成】木香 荆芥穗 黄柏各三钱 枳壳 厚朴各五钱 黄连一两 猬皮一个（烧灰） 当归四钱
【用法】依法制度为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前热水送下，一日三服。
【主治】湿热内甚，因而饱食，肠澼为痔，久而成瘘者。

60976 **香芩四物汤**

【方源】《医略六书》卷二十八。
【组成】生地五钱 当归三钱 白芍一钱半（炒） 川芎一钱 条芩一钱半 木香八分 茯苓二钱 甘草八分
【用法】水煎，去滓温服。
【主治】妊娠血虚，不能配气，而阳热过旺，肠胃受伤，下痢脓血，胎孕不安，脉虚数者。
【方论选录】方中生地滋阴凉血以配阳，条芩清热安胎以治痢，当归养血润燥，川芎活血行气，白芍敛阴止血，甘草泻热缓中，茯苓渗湿以清治节，木香调气以醒脾胃。水煎温服，使阴血内充，则阴得维阳，而阳热自化，肠胃清和。

60977 **香苏二陈汤**

【方源】《医醇剩义》卷三。
【组成】沉香六分 苏子二钱 橘红一钱 半夏一钱五分 茯苓二钱 枳壳一钱 厚朴一钱 杏仁三钱 郁金二钱 苡仁（炒）四钱
【用法】上以生姜汁两小匙，冲服。
【功用】《重订通俗伤寒论》：化痰平喘。
【主治】①《医醇剩义》：痰气结胸，湿痰上泛，窒滞中郁。②《重订通俗伤寒论》：哮症因子湿痰上泛，窒滞中都者。

60978 **香苏五皮饮**

【方源】《湿温时疫治疗法》引《时方妙用》。
【组成】制香附 紫苏叶 广皮各一钱半 浙苓皮 大腹皮 五加皮 桑白皮各三钱 炙甘草五分
【用法】上加鲜生姜二片，葱白两枚，水煎服。
【主治】阳水肿。气郁不舒，肿由面目先起，自上而下，皮肤如灌气状，以手按之随手而起，大便不爽，小便黄热，时或赤涩，甚则气粗而喘。

60979 **香苏正胃丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。
【异名】香苏正胃丹（《全国中药成药处方集》）。
【组成】橘皮二十两 厚朴（炙）四十两 藿香四十两 紫苏叶八十两 茯苓十两 山

楂十两　六神曲(炒)十两　麦芽(炒)十两　枳壳(炒)十两　砂仁十两　扁豆三十二两　香薷六十四两　滑石三十二两　甘草五两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每丸重一钱。每服一丸,温开水送下,一日两次。

【功用】①《北京市中药成方选集》:清热解表,健胃化滞。②《中国药典》:解表和中,消食行滞。

【主治】①《北京市中药成方选集》:小儿感冒中暑,头痛身热,停乳伤食,呕吐泄泻。②《中国药典》:小儿暑湿感冒,腹痛胀满,小便不利。

60980　香苏正胃丹

《全国中药成药处方集》。为《北京市中药成方选集》"香苏正胃丸"之异名。见该条。

60981　香苏平胃散

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】平胃散加藿香　紫苏

【用法】水煎服。

【主治】湿气呕吐,身热脉浮者。

60982　香苏败毒散

【方源】《痘疹心法》卷二十二。

【组成】香附子　紫苏叶　苍术　厚朴　青皮　甘草　山楂肉

【用法】加生姜一片,水煎服。

【主治】痘疹初发,疑似伤食者。

60983　香苏败毒散

【方源】《痘疹会通》卷四。

【组成】紫苏　香附　白术　山楂　陈皮　川朴

【用法】生姜皮为引,水煎服。

【主治】痘疹初发,形似伤寒。

【备考】方中白术,《痘疹心法》作"苍术"。

60984　香苏葱豉汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】制香附一钱半至二钱　新会皮一钱半至二钱　鲜葱白二三枚　紫苏一钱半至三钱　清炙草六分至八分　淡香豉三钱至四钱

【用法】水煎服。

【功用】理气发汗。

【主治】妊娠伤寒。

【方论选录】女子善怀,每多抑郁,故表无汗,以香苏饮为主方,盖香附为气中血药,善疏气郁;紫苏为血中气药,善解血郁;况又臣以葱、豉,轻扬发表;佐以陈皮理气,炙草和药,又气血调和,则表郁解而津津汗出矣。此为妊妇伤寒之主方,既能疏郁达表,又能调气安胎,血虚者可略加归、芍。

60985　香连八物汤

【方源】《医方简义》卷四。

【组成】藿香梗三钱　川连一钱　淡吴萸一钱　茯神三钱　苍术一钱　厚朴一钱　天仙藤一钱　炒车前二钱

【用法】水煎服。

【主治】脾胃俱虚,水泻及霍乱。

【加减】如口渴,加乌梅一枚;如腹痛,更加桂枝三分。

60986　香连化毒汤

【方源】《片玉痘疹》卷九。

【组成】木通　黄连(炒)　猪苓　甘草(炙)　白术

【用法】水煎服。

【主治】痘疮成浆之时,因热泄泻,色黄而臭者。

60987　香连化滞丸

《妇科玉尺》卷二。即《明医指掌》卷九"香连化滞汤"改为丸剂。见该条。

60988　香连化滞丸

《全国中药成药处方集》(兰州方)。即《寿世保元》卷三"香连化滞汤"改为丸剂。见该条。

60989　香连化滞汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】当归尾一钱　白芍一钱半　黄连一钱(去毛)　黄芩一钱(去皮)　黄柏一钱(去皮)　枳壳(去瓤,麸炒)一钱五分　槟榔一钱　木香一钱　大黄三钱(虚人用半)　滑石二钱　甘草二分

【用法】上锉。水煎，空心服。

【功用】《全国中药成药处方集》（兰州方）：清肠热，化食滞。

【主治】赤白痢疾初起，积滞不行，里急后重，频登圊而去少，腹痛等症。

【宜忌】《全国中药成药处方集》（兰州方）：虚寒气弱及孕妇忌服。

【备考】本方改为丸剂，名“香连化滞丸”（见《全国中药成药处方集》兰州方）。

60990 香连化滞汤

【方源】《明医指掌》卷九。

【组成】青皮（炒）一钱　陈皮一钱二分　厚朴（姜炒）一钱　枳实（炒）一钱　黄芩（略炒）一钱　黄连（炒）一钱　当归（酒洗）一钱　白芍药（炒）一钱　滑石一钱二分　槟榔八分　木香五分　甘草四分（炙）

【用法】上锉作一剂。用水二大盏，煎至八分，空心温服。

【功用】①《北京市中药成方选集》：清热利湿，分解化滞。②《全国中药成药处方集》（天津方）：清肠热，化食滞，杀菌止痢。

【主治】湿热积滞，痢疾腹痛，里急后重，便脓血。

①《明医指掌》：妊娠痢疾初起，腹中痛，积滞不行，里急后重，频欲上圊。②《妇科玉尺》：妊娠痢疾初起，元气尚实者。③《全国中药成药处方集》（天津方）：红白痢疾，里急后重，肠热便脓便血，食物停滞不消，作痛作胀。

【备考】本方改为丸剂，名香连化滞丸（见《妇科玉尺》）。

60991 香连平胃散

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】川黄连　木香　熟苍术　厚朴　陈皮　甘草

【主治】①《症因脉治》：疫痢湿热，满闷不舒者。②《张氏医通》：食积发热，腹痛作泻。

60992 香连术苓汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】白术　茯苓　猪苓　泽泻　桂枝　苍术　厚朴　陈皮　甘草　木香　黄连

【用法】上以水二钟，加生姜、大枣，水煎，食前服。

【主治】产后泄泻。

60993 香连四物汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】香附（童便炒）　黄连　当归　川芎　白芍　生地　甘草　丹皮　赤芍各等分

【用法】水煎，热服。

【主治】经水因血热色紫而浓，脉洪实者。

60994 香连生化汤

【方源】《产宝》。

【组成】川芎一钱五分　当归三钱　赤芍（酒炒）一钱　茯苓一钱　木香三分　黄连（姜汁炒）四分　甘草（炙）四分　枳壳五分　陈皮三分

【用法】上药用水一盏，煎五分，空心服。

【主治】产后七日内外，患赤白痢，后重便脓。

60995 香连导滞汤

【方源】《金鉴》卷五十二。

【组成】青皮（炒）　陈皮　厚朴（姜炒）　川黄连（姜炒）　生甘草　山楂　神曲（炒）　木香（煨）　槟榔　大黄

【用法】灯心为引，水煎服。

【主治】小儿肠胃积热凝滞，因致痢疾，日久下痢，或赤或白，腹痛窘急。

60996 香连护胎饮

【方源】《妇科胎前产后良方注评》。

【组成】木香五分　姜黄连一钱　白芍七分　茯苓六分　陈皮七分　枳壳（炒）八分　苏梗五分　川朴五分　山楂一钱　当归六分　泽泻八分　砂仁（炒）一钱　乌梅一枚　甘草三分

【用法】水煎服。

【主治】妊娠下痢，脉沉细者。

60997 香连固本丸

【方源】《活人方》卷三。

【组成】白术四两　人参二两五钱　肉果

二两　粟壳一两五钱　诃子肉一两五钱　肉桂一两　附子一两　黄连(吴茱萸汁煮干)一两　白芍(醋炒)一两

【用法】醋调神曲为丸，如绿豆大。每服二三钱，空心参汤或米汤送下。

【功用】温中益气，固本培元。

【主治】久痢真气脱，血液枯，湿热之余毒不尽，随肝脾之气虚陷，而肾气不能固，或积或水或粪，不时滑泄无度，甚至脾胃虚寒，饮食不进，即进而难消，四肢厥冷而呃逆不已。

60998　香连和胃汤

【方源】《金鉴》卷四十二。

【组成】黄芩　芍药　木香　黄连　甘草　陈皮　白术　缩砂　当归

【功用】调气血。

【主治】痢疾攻后病势大减者。

【加减】赤痢下血多虚者，加炒椿根白皮、炒地榆；白痢日久气虚者，加人参、茯苓、炒干姜。

60999　香连治中汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】广木香八分　潞党参二钱(米炒)　黑炮姜三分　炒广皮一钱　小川连六分(醋炒)　生冬术一钱半　清炙草五分　小青皮六分

【功用】清肝健脾，和中止泻。

【主治】肝阳下迫，脾阳亦衰，大便飧泄，肠鸣腹痛，欲泄而不得畅泄，即泄亦里急气坠，脉左弦右弱者。

【方论选录】方中以香、连调气厚肠为君，臣以参、术、姜、甘温运脾阳，佐以广皮调气和中，使以青皮泄肝宽肠。

61000　香连枳术丸

【方源】《活人方》卷五。

【组成】白术四两　枳实二两(麸炒)　广橘红一两　半夏一两　麦芽粉一两　神曲一两　陈黄米二合(炒焦)　木香五钱　川连五钱(姜炒)

【用法】荷叶汤为丸。每服二钱，食前空心，白滚汤吞服。

【主治】湿热之气郁于胃腑阳明，热毒久伏不清，以致痞满嘈杂，吞酸吐酸，恶心呕吐。

61001　香连茱萸丸

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】黄连四两(锉如豆大)　吴茱萸(汤泡七次，去枝梗)四两

【用法】上药同炒香，微黄色，地上去火毒，各拣一处，另为细末；每末一两入木香末二钱，醋糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，温酒或米汤送下。

【主治】赤白痢疾。

61002　香连逍遥散

【方源】《医学探骊集》卷五。

【组成】木香三钱　吴茱萸四钱　毛苍术四钱　黄连二钱　焦槟榔三钱　川大黄四钱　升麻二钱　滑石四钱　黄芩三钱　泽泻三钱　甘草二钱

【用法】上先水煎，温服一剂，去滑石、大黄，加地榆三钱、粟壳四钱，再服一二剂即愈。

【主治】赤白痛痢。

【方论选录】此方以苍术燥湿，以木香、槟榔行气，以黄连、黄芩清热，以泽泻降浊，升麻升清，以甘草调胃，吴萸温中，以滑石、大黄推荡其湿热下行。一剂热减，再稍为加减，痢自止矣。

61003　香连健脾丸

【方源】《活人方》卷三。

【组成】乌梅炭十六两　生姜(干)五两　制半夏五两　麦芽粉二两五钱　神曲二两五钱　山楂二两五钱　槟榔一两　三棱七钱　蓬术七钱　青皮七钱　陈皮八分　枳壳八分　木香八分

【用法】水叠为丸。每服一二钱或二三钱，空心米汤吞下。

【功用】补益脾胃，消湿热积滞。

【主治】休息痢，脾胃虚弱，不能营运，犹有积滞不清，绵远难愈；酒积腹痛而泄泻者。

61004 香连猪肚丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】木香五钱 黄连 生地 青皮 银柴胡 鳖甲各一两

【用法】上为末,入猪肚内,以线缚定,于砂锅内煮烂,取出为丸,如梧桐子大,小儿如黍米大。每服三十丸,米饮送下。

【主治】骨蒸疳痨羸瘦;痨痢。

61005 香连断下丸

【方源】《永类钤方》卷二十一引《管见大全良方》。

【组成】黄连一斤 南木香一斤

【用法】上为末,神曲糊为丸,大人丸如梧桐子大,小儿丸如黍米大。每服五十丸,空心浓粥饮送下;陈仓米汤更佳。

【主治】赤白痢。

【备考】本方为原书"神仙断下丸"之第三方。

61006 香陆胃苓丸

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】丁香(去梗) 商陆 赤小豆 陈皮(去白) 甘草(炙)各二两 苍术(制)三两 泽泻(去粗皮)二两半 赤茯苓(去皮) 猪苓(去皮) 白术各一两半 肉桂(去粗皮)一两 厚朴(制)二两

【用法】上除丁香、肉桂不过火,余药锉焙,同前二味为末,用面微炒,水浸透,煮糊为丸,如绿豆大。每服二十丸至五十丸,或七十丸,空心温汤送下。儿小者,丸作粟米大,吞服。

【功用】实脾导水。

【主治】小儿肿疾日久不愈。

61007 香附一物丸

【方源】《医学正传》卷七引《产宝》。

【异名】香附调经丸(《松崖医径》)、香附丸(《医学入门》卷八)。

【组成】香附子(杵去皮毛)不拘多少(米醋浸一日夜,用瓦铫煮令熟,焙干)

【用法】上为细末,醋糊为丸,如梧桐子大,晒干。每服五十丸,淡醋汤送下。

【主治】①《医学正传》引《产宝》:经候不调,血气刺痛,腹胁膨胀,头眩恶心,崩漏带下。②《医学入门》:便血癥瘕。

61008 香附八物汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】人参(或用山药四五钱代之) 白术二钱 茯苓一钱五分 香附(童便炒)一钱 当归二钱(若血热者用一钱) 甘草(炙)一钱 白芍(酒炒)一钱 熟地二三钱 川芎一钱

【用法】或加青皮五六分,水煎服。

【主治】性急躁怒,气逆血少,月经后期者。

61009 香附八珍汤

【方源】《医统》卷八十四。

【组成】香附子 人参 白术 茯苓 当归 白芍药 熟地黄 川芎 甘草各等分

【用法】上以水二钟,加生姜三片,大枣一枚,煎至八分服。

【主治】经后续来,气血不足者。

61010 香附乌药散

【方源】《温热经解》。

【组成】制香附一钱半 绿萼梅八分 陈皮八分 青皮五分 乌药八分 左金丸一钱 焦枳实七分 甘草八分 白芍一钱

【主治】肝气为病,脾寒肝旺。

61011 香附六一汤

【方源】《医方类聚》卷一〇一引《澹寮》。

【异名】香附甘草散(《医统》卷五十引丹溪方)、香附六一散(《医抄类编》卷十三引丹溪方)。

【组成】香附子六两 甘草一两

【用法】上为细末。任意点服。

【主治】胸烦痞满。

61012 香附六一散

《医抄类编》卷十三引丹溪方。为《医方类聚》卷一〇一引《澹寮》"香附六一汤"之异名。见该条。

61013 香附六合汤

《赤水玄珠》卷二十。即《元戎》卷二十"香桂六合汤"。见该条。

61014　香附甘草散

《医统》卷五十引丹溪方。为《医方类聚》卷一〇一引《澹寮》"香附六一汤"之异名。见该条。

61015　香附四物汤

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】熟地四钱　川芎　香附(酒炒)　元胡索各一钱五分　白芍(酒炒)一钱五分　当归三钱　木香一钱

【功用】补气行气。

【主治】经脉气血凝滞而痛胀者。

61016　香附地榆汤

【方源】《普济方》卷二一五引《指南方》。

【组成】香附子(切)　新地榆(切)各不拘多少

【用法】上药各浓煎汤一盏,先呷附子三五呷,地榆汤以尽为度,未效再进。

【主治】尿血。

61017　香附芎归汤

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】川芎　当归　香附　白芍　蕲艾　熟地　麦冬　杜仲　橘红　甘草　青蒿

【主治】经行后期。

【加减】半边头痛,加甘菊、藁本、荆芥、童便,去艾、杜仲、香附、橘红。

61018　香附助阴丸

【方源】《普济方》卷三三二引《德生堂方》。

【组成】香附子一斤　茹叶艾一斤(香附子分作四分,童便、酒、醋、浆水浸;醋煮艾捏饼,醋干另煨)　晚蚕砂半斤(炒净)　莪术四两(酒浸)　当归四两(头尾全,酒浸)

【用法】上为细末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服五六十丸,空心酒送下,米汤亦可。

【主治】妇人月经不调,久不成胎,脾积癥病;一切风气之疾。

61019　香附桃仁丸

【方源】《保命歌括》卷二十七。

【组成】香附子(醋煮)四两　桃仁(去皮尖)一两　海石(醋煮)二两　白术一两

【用法】上为细末,神曲为丸。白汤送下。

【主治】妇人血块如盘,有孕,难服峻药。

61020　香附胶艾丸

【方源】《同寿录》卷三。

【组成】香附米(陈醋煮,炒干,净末)十二两　元胡索二两　川芎二两　当归身(酒浸洗,烘干,净末)二两　白芍药(净末)二两　蕲艾叶(去梗,醋煮,焙干,净末)二两　生地三两(酒蒸熟,细研为膏,勿犯铁器)　阿胶(蛤粉炒成珠,净末)二两

【用法】上药各为末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服八十丸,空心米汤送下。

【功用】安胎。

【主治】常半产者。

61021　香附海粉丸

【方源】《女科秘旨》卷四。

【组成】醋煮香附四两　桃仁(去皮尖)　蛤粉(醋煮)　白术各一两

【用法】上为末,面糊为丸服。

【主治】妊娠积聚,血块如盘,难服峻药者。

61022　香附调经丸

《松崖医径》卷下。为《医学正传》卷七引《产宝》"香附一物丸"之异名。见该条。

61023　香柿理中汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】人参　白术　炙草　干姜(炮)　陈皮各一钱　丁香二分　柿蒂二钱

【用法】水煎,温服。

【主治】产后胃虚气寒,呃逆之声上冲。

【加减】如有热证热脉,去丁香,加竹茹二钱。如阴火上冲,加肉桂、附子各一钱,引火归源,不致游移上逆也。

61024　香苓生化汤

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】川芎二钱　当归五钱　炙草五分　桃仁十粒(去皮尖)　茯苓一钱　陈皮四分　木香一分

【用法】水煎服。

【主治】产后七日内患赤白痢。

【加减】如红痢腹痛，加砂仁三分；七日外，可加白芍、黄连、炒莲肉、制厚朴各五分。

61025 **香栀平肝饮**

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】炒栀子三钱　茯苓　白芍　白术各五钱　陈皮　甘草各一钱　香附二钱

【用法】水煎服。

【主治】肝气旺克脾土，而肠中自鸣，终日不已，嗳气吞酸，无有休歇。

61026 **香茸八味丸**

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】八味丸去桂、附，加沉香一两，鹿茸一具。

【主治】肾与督脉皆虚，头旋眼黑。

61027 **香茸六味丸**

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】鹿茸血片一钱　生地　熟地各一两　山萸肉四钱　淮山药　茯神各八钱　桑叶　丹皮各四钱　定风草三钱　真麝香五厘

【用法】上为细末，豆淋酒糊为丸。每服三钱，细芽茶五分，杭茶菊五朵，泡汤送下。

【主治】内风挟痰，上冲头脑，抬头屋转，眼常黑花，见物飞动，猝然晕倒者。

61028 **香砂二陈汤**

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】香附子一钱　砂仁七枚　半夏一钱五分　茯苓一钱五分　橘皮一钱　甘草五分

【用法】上㕮咀。水煎，食远服。

【主治】①《杏苑》：噎塞不通，病人气血未衰。②《嵩崖尊生》：心痛喜按。

【备考】原书治上证，予本方加红花、桃仁，稍宽止服。

61029 **香砂二陈汤**

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】二陈加藿香　砂仁

【主治】寒湿体虚呕吐者。

61030 **香砂二陈汤**

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】白檀香五分　姜半夏三钱　浙茯苓三钱　春砂仁八分（杵）　炒广皮二钱　清炙草五分

【功用】温运胃阳，消除积饮。

【主治】多吃瓜果或冷酒、冷菜，胃有停饮，或伤冷食，胸痞脘痛，呕吐黄水，感寒感热，俱能触发。

【加减】痛甚者，加白蔻末二分（拌捣），瓦楞子四钱；呕甚者，加控涎丹八分（包煎），速除其饮。

61031 **香砂二陈汤**

【方源】《笔花医镜》卷二。

【组成】木香一钱　砂仁一钱　制半夏　陈皮　茯苓　炙草各一钱五分

【用法】加生姜一片，大枣二枚，水煎服。

【主治】脾滞腹痛。

61032 **香砂七气汤**

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【组成】陈皮　青皮　厚朴　半夏　三棱　莪术各一钱半　香附子二钱　砂仁一钱　甘草五分　木香五分　槟榔一钱

【用法】上用水一钟半，加生姜三片，煎至八分，温服。

【主治】心腹疼痛。

61033 **香砂万安丸**

【方源】《活人方》卷四。

【组成】香附（醋炒）八两　蓬术（醋炒）四两　山楂四两　广藿香叶四两　甘松二两　益智仁（盐焙）二两　厚朴（姜炒）二两　甘草二两　丁皮一两　木香一两　砂仁（炒）一两　干姜一两

【用法】水泛为丸。每服二钱，早晨空心生姜汤吞下。

【功用】调和脾胃，温散虚寒。

【主治】脾胃虚寒，不易消谷，而胃脘痞满，恶心欲吐，肠腹冷痛不和，大便滑泄不止，肠鸣如雷，隐痛无时。

61034 **香砂六君丸**

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】党参　于术　茯苓　制香附各二两　姜半夏　广皮　炙甘草各一两　春砂仁一两半

【用法】水泛为丸。每服二三钱。

【主治】中虚气滞,饮食不化,呕恶胀满,胃痛,腹鸣泄泻。

61035　香砂六君丸

《全国中药成药处方集》(北京方)。即《古今名医方论》卷一"香砂六君子汤"改为丸剂。见该条。

61036　香砂六君汤

《麻科活人》卷二。为《古今名医方论》卷一"香砂六君子汤"之异名。见该条。

61037　香砂六君汤

《成方便读》卷一。为《杏苑》卷四"香砂六君子汤"之异名。见该条。

61038　香砂平胃丸

【方源】《保命歌括》卷二十一。

【组成】苍术(米泔浸,炒)五两　厚朴(酒炒)　陈皮各三两　甘草　香附子(盐水浸透)　神曲(炒)　砂仁各一两

【用法】上为细末,荷叶水煮粳米粉为丸,如梧桐子大。每服五十丸,生姜、大枣汤送下。

【功用】消食积,补脾胃。

【主治】伤食泄泻,心腹胀满,下泄必臭,湿气作酸,先用下法去其积滞之物,待酸臭去尽,以本方和之。

61039　香砂平胃丸

《中药成方配本》。为原书"香砂养胃丸"之异名。见该条。

61040　香砂平胃丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】橘皮八十两　厚朴(炙)八十两　苍术(炒)八十两　砂仁十六两　木香十六两　甘草十六两

【用法】上为细末,过罗,用冷开水泛为小丸,每十六两用滑石细粉四两为衣闯亮。每服二至三钱,温开水送下。

【功用】和胃止呕,顺气健脾。

【主治】脾虚伤食,胃脘不和,呕吐恶心,倒饱嘈杂。

61041　香砂平胃散

【方源】《片玉痘疹》卷三。

【组成】木香　砂仁　苍术　厚朴　陈皮　黄芩(酒炒)　甘草　山楂　麦冬　香附　神曲(炒)　黄连(酒炒)　白芍　藿香叶

【用法】煨姜三片为引,水煎,空心服。

【主治】痘疮发热腹痛者,或吐或泻,或吐酸臭兼食积者。

【备考】原书视履堂本无麦冬,有麦芽。

61042　香砂平胃散

【方源】《片玉痘疹》卷三。

【组成】木香　砂仁　苍术　厚朴　白茯苓　山楂肉　陈皮　炙草　麦芽　人参　白术

【用法】生姜、大枣为引,水煎,空心服。

【主治】痘疮收靥,兼有食积,腹痛,屎臭,泄泻。

61043　香砂平胃散

【方源】《回春》卷二。

【组成】香附(炒)一钱　砂仁七分　苍术(米泔制,炒)一钱　陈皮一钱　甘草五分　枳实(麸炒)八分　木香五分　藿香八分

【用法】上锉一剂。加生姜一片,水煎服。

【主治】伤食。

【加减】肉食不化,加山楂、草果;米粉面食不化,加神曲、麦芽;生冷瓜果不化,加干姜、青皮;饮酒伤者,加黄连、干葛、乌梅;吐泻不止,去枳实,加茯苓、半夏、乌梅。

61044　香砂平胃散

【方源】《回春》卷二。

【组成】苍术(米泔制)　厚朴(姜汁炒)　陈皮各二钱　香附(童便炒)一钱　砂仁五分　枳壳(麸炒)　山楂(去子)　麦芽(炒)　神曲(炒)　干姜各三分　木香五分　甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片,萝卜子一撮,水煎,磨木香同服。

【主治】嗳气作酸，胸腹饱闷作痛，恶食不思，右关脉紧盛，名曰食郁。

【加减】食郁久成块，去干姜，加大黄。

61045 **香砂平胃散**

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】苍术一钱五分　陈皮二钱　厚朴（姜炒）八分　白术一钱五分　白茯苓（去皮）三钱　半夏（姜炒）二钱　砂仁一钱　香附（炒）二钱　神曲（炒）三钱　白芍二钱　甘草（炙）八分

【用法】上锉。加生姜，煎服。

【主治】食积泄泻。腹痛甚而泄泻，泻后痛减者。

61046 **香砂平胃散**

【方源】《济阳纲目》卷十六。

【组成】苍术（米泔浸，炒）　厚朴（姜制）　陈皮（去白）　甘草（炙）　香附　砂仁　黄连（炒）　山栀（炒）　川芎　白芍药　辰砂各等分

【用法】水煎服。

【主治】食郁嘈杂。

61047 **香砂平胃散**

【方源】《济阳纲目》卷七十四。

【组成】香附　陈皮（去白）　枳实（麸炒）　山楂　麦芽（炒）各一钱　砂仁　木香各五分　干姜　槟榔　甘草（炙）各三分　青皮（去白）一钱

【用法】上锉。加生姜，水煎服。

【主治】食积胁痛。

61048 **香砂平胃散**

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】藿香　苍术　厚朴　甘草　熟砂仁

【主治】食积胃家成疟，胸膈不利，噫气吞酸，临发胸前饱闷，呕吐不宁，多发午后未、申之时。

【加减】呕，加葛根、半夏。

61049 **香砂平胃散**

【方源】《金鉴》卷五十四。

【组成】苍术（米泔水浸，炒）　陈皮　厚朴（姜炒）　甘草（炙）　缩砂（研）　香附（醋炒）　南山楂　神曲（炒）　麦芽（炒）　枳壳（麸炒）　白芍（炒）

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】伤食腹痛。

61050 **香砂平胃散**

【方源】《疫疹一得》卷下。

【组成】苍术一钱半（炒）　厚朴一钱（炒）　陈皮一钱　木香五分　砂仁八分　甘草五分　生姜一片

【主治】疫病愈后，余热未尽，肠胃虚弱，不能食而强食之，热有所藏，因其谷气留搏，两阳相合而病者，名曰食复。

【加减】有食积，加山楂、麦芽、神曲、茯苓。

61051 **香砂正胃丹**

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】藿香二钱　甘草　香附　橘红各一两　苏叶四钱　厚朴　桔梗　神曲炭　山楂各一两　砂仁六钱　赤茯苓　半夏各一两　扁豆六钱　枳壳　苍术各一两

【用法】上为极细面，炼蜜为丸，每丸二钱重。每服一丸，生姜水送下。

【功用】健胃消食。

【主治】四时不正之气，山岚瘴疠之毒，宿食不消，胸膈痞满，停食停水，郁结腹痛。

【宜忌】孕妇忌服。

61052 **香砂四物汤**

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】熟地黄　当归　白芍　川芎　阿胶（炒珠）　条芩各一钱　砂仁　香附（炒黑）　艾叶各五分

【用法】上加糯米一撮，水煎服。

【主治】妊娠胎漏，血虚有热者。

61053 **香砂生化汤**

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】当归四钱　川芎一钱　制半夏八分　桃仁十粒（去皮尖）　炙姜　藿香　砂仁各四分　陈皮三分　炙草五分

【用法】上加生姜一片，水煎服。

【主治】产后块痛未除，气逆呕吐。

61054　香砂白术汤

【方源】《济阳纲目》卷二十三。

【组成】木香　砂仁各一钱　白术二钱　茯苓　芍药(炒)　陈皮各一钱半　甘草(炙)五分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】疟后变成痢疾。

【加减】有热，加炒芩、连；血痢，加当归、生地黄；虚，加人参；里急后重，加枳壳、槟榔。

61055　香砂达郁汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】广木香　春砂仁各七分　制香附　焦山栀　广郁金各二钱　川芎　制苍术各六分　六神曲一钱半

【功用】调气和血。

【主治】伤寒夹胃脘痛。

【加减】若湿郁重，加茯苓、滑石；热郁重，加青黛、川连；痰郁重，加浮海石、竹沥、半夏；食郁重，加枳实、山楂；血郁重，加桃仁、红花。

61056　香砂安胃汤

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】香附子　枇杷叶各一钱　砂仁七枚　橘红一钱五分　茯苓一钱五分　半夏曲一钱一分　甘草三分　桔梗四分　藿香四分　生姜五片

【用法】上㕮咀。水煎，加生姜汁一蛤壳服。

【主治】呕吐不止，胸膈痞塞。

【加减】如觉寒，加丁香三分。

61057　香砂助胃膏

《保婴撮要》卷一。为《传信适用方》卷一"助胃膏"之异名。见该条。

61058　香砂苓术散

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】香附　缩砂仁　白茯苓　三棱　蓬莪术　青皮　小木通　神曲　广皮　泽泻　滑石　甘草

【用法】上为末。每服一钱，灯心汤调下。

【主治】小儿乳食伤脾胃，致使清浊不分，尿如白浊者。

61059　香砂和中汤

【方源】《便览》卷二。

【组成】藿香　苍术各一钱半　砂仁　厚朴(姜炒)　陈皮　茯苓　半夏(姜制)　香附　青皮各一钱　甘草五分　木香(磨水)三匙

【用法】上以水一盏半，加生姜三片，煎服。

【功用】和脾胃。

【主治】心腹气痛。

【加减】有郁，加栀子仁。

61060　香砂和中汤

【方源】《赤水玄珠》卷十三。

【异名】香砂调中汤(《准绳·类方》卷二)。

【组成】藿香　砂仁各一钱半　苍术二钱　厚朴　陈皮　半夏　茯苓　青皮　枳实(麸炒)各一钱　甘草三分

【主治】饮食伤脾胃，呕吐，胸满嗳噫，或胸腹胀疼。

【加减】大便泻，去枳实、青皮，加麦蘖、山楂。

【备考】本方改为丸剂，名"香砂调中丸"(见《杂病源流犀烛》)。

61061　香砂和中汤

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】藿香一钱二分　砂仁一钱二分　苍术(炒)一钱半　厚朴(姜汁炒)　陈皮(去白)　半夏(姜汁炒)　白茯苓(去皮)　神曲(炒)　枳实(麸炒)　青皮(去瓤)　山楂肉各一钱　白术(去芦，炒)一钱半　甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜，煎服。

【主治】病人初起，因于食伤脾胃，湿痰气郁，食积作胀，心腹胀满。

61062　香砂枳术丸

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】枳实(尖，炒)一两　白术二两　砂仁　香附子各五钱

【用法】上为末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食远白汤送下。

【主治】脾胃虚弱，饮食减少，胸膈痞闷。

【备考】方中砂仁原缺，据《济阳纲目》补。

61063 **香砂枳术丸**

【方源】《景岳全书》卷五十四。

【组成】木香 砂仁各五钱 枳实（麸炒）一两 白术（米泔浸，炒）二两

【用法】上为末，荷叶裹烧饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白术汤送下。

【功用】破滞气，消宿食，开胃进食。

【主治】①《张氏医通》：气滞宿食不消。②《杂病源流犀烛》：食积停滞，腹痛不可近或泄泻或头痛。

61064 **香砂枳术丸**

【方源】《活人方》卷三。

【组成】白术四两 枳实二两 陈黄米一两五钱 姜制香附一两五钱 神曲一两 麦芽粉一两 木香五钱 砂仁五钱

【用法】荷叶汤为丸。每服二三钱，早晚空心生姜汤吞下。

【功用】开郁醒脾顺气，补脾胃之元气而复营运之机，腐熟五谷而佐健行。

【主治】胸中痞胀。

61065 **香砂枳术丸**

【方源】《古方汇精》卷一。

【组成】香附子 苡仁各四两 茅山苍术 赤茯苓 蛀神曲各二两 麦芽一两五钱 砂仁 广木香 枳壳各一两 甘草八钱

【用法】上药各取净末，水泛为丸。每服二钱，淡生姜汤送下。

【主治】一切食积，胸闷气逆。

61066 **香砂枳术丸**

【方源】《医方集解》。

【组成】白术 枳实 制半夏 陈皮 木香 砂仁

【用法】荷叶包陈米饭为丸服。

【功用】①《医方集解》：破滞气，消饮食，强脾胃。②《成方便读》：理气宽胸，助脾消导。

【主治】《成方便读》：饮食停滞，痞闷不消，或痰或气阻塞。

【方论选录】方中枳实破滞削坚，行胃中之气，化胃中之食，能消能磨，无所不至；然必以白术补脾之元气，助脾之健运，而赞辅之；积之所停，气必为滞，故以香、砂理气；气滞则痰必聚，故以橘、半化之；用荷叶烧饭为丸者，助清阳之气上升，藉谷气以和脾胃耳。

61067 **香砂枳术丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】白术（炒）一百二十两 枳实（炒）一百二十两 香附（炙）七十二两 橘皮四十八两 山楂二十四两 神曲（炒）十二两 麦芽（炒）十二两 木香十二两 砂仁十二两

【用法】上为细粉，用冷开水泛为小丸。每服二至三钱，温开水送下，一日二次。

【功用】顺气宽胸，和胃扶脾。

【主治】脾胃不和，饮食减少，胸中痞闷，宿食不化，痰滞停留。

61068 **香砂胃苓丸**

《全国中药成药处方集》（南京方）。即《摄生众妙方》卷五"香砂胃苓汤"改为丸剂。见该条。

61069 **香砂胃苓汤**

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】陈皮 厚朴 泽泻 藿香 砂仁各一钱半 苍术 茯苓 猪苓各二钱 甘草五分 官桂五分 白术二钱

【用法】上㕮咀。用水一钟半，加生姜三片，煎至七分，温服。

【功用】《全国中药成药处方集》：除湿健胃。

【主治】①《摄生众妙方》：饮食过多泄泻。②《全国中药成药处方集》：呕吐泄泻，浮肿，小便不利。

【备考】本方改为丸剂，名"香砂胃苓丸"（见《全国中药成药处方集》）。

61070 **香砂保安丸**

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】香附子二两 砂仁 白术 神曲 麦芽各一两（炒） 糖球一两半 益智 陈皮

各七钱半 甘草三钱 木香 槟榔 使君子(去壳,炒)各五钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如芡实大。每服一丸,空心米汤化下。

【主治】小儿乳食停滞,胸膈不宽,肚腹膨胀,脾疳惊积,积聚。

61071 **香砂顺气汤**

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】橘皮 半夏 茯苓 香附子各一钱 枳壳八分 乌药六分 甘草五分 木香四分 缩砂仁七枚

【用法】上㕮咀。加生姜五片,水煎,食远服。

【主治】怒气伤肝,或七情郁滞,背胁胸腹攻走疼痛者。

【加减】如胁痛,加柴胡七分,川芎五分。

61072 **香砂养胃丸**

【方源】《集验良方》卷三。

【组成】人参一两 木香一两 砂仁一两六钱 香附(醋制,炒)一两六钱 白术(土炒)二两 甘草(炙)一两六钱 白茯苓一两六钱 白蔻仁一两四钱 陈皮一两六钱 干姜一两 官桂一两 厚朴一两六钱 苍术

【用法】夹肉蒸烂为丸,如梧桐子大。每服五六十丸。

【主治】胃气虚寒,胸膈饱闷寒痛。

【备考】方中苍术用量原缺。

61073 **香砂养胃丸**

《饲鹤亭集方》。即《回春》卷二"香砂养胃汤"改为丸剂。见该条。

61074 **香砂养胃丸**

《丸散膏丹集成》。即《杂病源流犀烛》卷二十七"香砂养胃汤"改为丸剂。见该条。

61075 **香砂养胃丸**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】广皮二两 香附二两(炙) 神曲二两 麦芽二两(炒) 白术二两(土炒) 枳实一两五钱(炙) 半夏一两五钱(炙) 苍术一两五钱(炒) 茯苓一两五钱 厚朴一两五钱(炙) 桔梗一两五钱 川连一两 砂仁一两 木香一两 山楂一两(炒) 甘草一两 炒栀一两二钱五分 藿香一两二钱五分 抚芎一两二钱五分

【用法】上为细末,水泛为丸,如绿豆大。每服三钱,白开水送下。

【主治】脾胃虚弱,不思饮食,大便不调,食物不化者。

61076 **香砂养胃丸**

【方源】《中药成方配本》。

【异名】香砂平胃丸。

【组成】制香附四两 西砂仁二两 制川朴四两 炒茅术五两 广皮四两 炙甘草二两

【用法】各取净末和匀,冷开水为丸,如绿豆大,约成丸二十两。每服一钱五分,食前开水吞服,一日二次。

【功用】燥湿平胃。

【主治】气滞湿阻,脘腹胀痛。

61077 **香砂养胃汤**

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】藿香 陈皮 砂仁各七钱 苍术(米泔浸,炒)五分(久病用白术) 甘草(炙)三分 茯苓八分(去皮) 厚朴(制)七分 半夏(泡)七分 人参四分 神曲(炒)四分

【用法】上以水一钟半,加生姜三片煎服,渣再煎服。

【功用】《济阳纲目》:理脾胃,逐寒邪,止呕吐。

【主治】①《活人心统》:脾胃虚寒,呕泻不食。②《济阳纲目》:饮食所伤,胸痞肠鸣泄泻。

61078 **香砂养胃汤**

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 苍术 厚朴 香附子 藿香 枳实 砂仁各一钱半 甘草五分

【用法】上㕮咀。用水一钟半,煎至八分,食远温服。

【主治】脾胃不和。

61079 香砂养胃汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】香附（炒） 砂仁 苍术（米泔制，炒） 厚朴（姜汁炒） 陈皮各八分 人参五分 白术（去芦）一钱 茯苓（去皮）八分 木香五分 白豆蔻（去壳）七分 甘草（炙）二分

【用法】上锉一剂。加生姜、大枣，水煎服。

【主治】①《回春》：脾胃不和，胃寒不思饮食，口不知味，痞闷不舒。②《饲鹤亭集方》：胃气虚寒，胸膈不舒，湿痰呕恶，胀满便泄，食不运化，中虚气滞。

【加减】脾胃寒，加干姜、官桂；肉食不化，加山楂、草果；米粉、面食不化，加神曲、麦芽；生冷瓜果不化，加槟榔、干姜；胸腹饱闷，加枳壳、萝卜子、大腹皮；伤食胃口痛，加木香、枳实、益智；伤食泄泻，加干姜、乌梅、白术；伤食恶心呕吐，加藿香、丁香、半夏、乌梅、干姜。

【备考】本方改为丸剂，名“香砂养胃丸”（见《饲鹤亭集方》）。方中甘草用量原缺，据《寿世保元》补。

61080 香砂养胃汤

【方源】《济阴纲目》卷十三。

【组成】半夏一钱 白术 陈皮 茯苓 厚朴 香附子各八分 人参 藿香 砂仁 槟榔 草果各五分 甘草四分

【用法】上锉。加生姜三片，乌梅一个，水煎服。

【主治】产后败血攻于脾胃之间，呕吐，饮食不下，腹胀。

61081 香砂养胃汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】白术 陈皮 茯苓 半夏各一钱 香附 砂仁 木香 枳实 蔻仁 厚朴 藿香各七分 甘草三分 姜三片 枣二枚

【功用】①《杂病源流犀烛》：调养脾胃，升降阴阳。②《中国药典》：和胃止呕。

【主治】①《杂病源流犀烛》：饮食不消致痞。②《中国药典》：由胃寒气滞引起的不思饮食，呕吐酸水，胃脘满闷，四肢倦怠。

【宜忌】《中国药典》：忌食生冷，油腻之物。

【备考】本方改为丸剂，名“香砂养胃丸”，（见《丸散膏丹集成》）。

61082 香砂健脾丸

【方源】《活人方》卷二。

【组成】白术四两 陈皮二两 茯苓二两 陈冬米二两 神曲一两 麦芽粉一两 肉蔻五钱 砂仁五钱 木香五钱 香附九两

【用法】水泛为丸。每次二三钱，食前生姜汤吞服。

【主治】不思饮食，即食而不消，倒饱嗳气，吞酸呕恶，肠鸣泄泻，面黄肌瘦，四肢浮肿。

61083 香砂健脾丸

【方源】《活人方》卷五。

【组成】白术四两（炒黄） 陈皮二两 香附二两（姜制） 陈黄米二合（炒） 神曲一两（炒） 麦芽粉一两 木香五钱 砂仁五钱（炒）

【用法】荷叶汤为丸。每服二三钱，空心白滚汤送下。

【主治】脾胃虚寒，不能营运，湿痰食积稽留，致饮食不思而难进，虽进而难消，呕恶吞酸，倒饱嗳腐，肠鸣泄泻，浮黄肿胀，及中气不和，三脘痞闷不舒，肢体消瘦无力者。

61084 香砂宽中丸

《杂病源流犀烛》卷四。即《准绳·类方》卷三引《医学统旨》“香砂宽中汤”改为丸剂。见该条。

61085 香砂宽中汤

【方源】《准绳·类方》卷三引《医学统旨》。

【异名】香砂宽中散（《嵩崖尊生》卷九）。

【组成】木香（临服时磨水人药三四匙） 白术 陈皮 香附各一钱半 白豆蔻（去壳） 砂仁 青皮 槟榔 半夏曲 茯苓各一钱 厚朴（姜制）一钱二分 甘草三分

【用法】上以水二钟，加生姜三片，煎八分，入蜜一匙，食前服。

【主治】气滞胸痞噎塞，或胃寒作痛者。

【备考】本方改为丸剂，名“香砂宽中丸”

(见《杂病源流犀烛》)。

61086　香砂宽中汤

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】香附子　厚朴　枳壳各一钱　缩砂仁七枚　半夏　茯苓各一钱五分　橘皮一钱　甘草五分

【用法】上㕮咀。水煎熟,食远温服。

【主治】气食不散,心下痞闷。

61087　香砂宽中散

《嵩崖尊生》卷九。为《准绳·类方》卷三引《医学统旨》"香砂宽中汤"之异名。见该条。

61088　香砂宽中散

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】制香附　广木香各五钱　春砂仁　白蔻仁各三钱　真川朴一两　炙黑甘草二钱

【用法】上为细末。每服三钱。

【主治】气不通畅而痞满者。

61089　香砂调中丸

《杂病源流犀烛》卷五。即《赤水玄珠》卷十三"香砂和中汤"改为丸剂。见该条。

61090　香砂调中汤

《准绳·类方》卷二。为《赤水玄珠》卷十三"香砂和中汤"之异名。见该条。

61091　香砂调气散

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】香附子　橘红　茯苓　半夏　枳壳各一钱　木香五分　白豆蔻　甘草各五分　缩砂仁七枚

【用法】上㕮咀。加生姜五片,水煎熟,食前温服。

【主治】气逆心胸不得升降,得之于七情者。

61092　香砂理中丸

【方源】《医统》卷二十三。

【组成】人参　白术(炒)　干姜(炮)　甘草(炙)各二两　木香　砂仁(炒)各半两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如胡椒大。每服七八十丸,空心白汤送下。

【功用】《重订通俗伤寒论》:温健脾阳。

【主治】脾虚感寒,腹痛吐泻,肢冷脉微。

①《医统》:脾胃虚弱,感寒停饮,心腹卒痛,手足厥冷,呕吐清水,饮食不进。②《重订通俗伤寒论》:夏月饮冷过多,寒湿内留,上吐下泻,肢冷脉微,脾阳惫甚,中气不支者。③《全国中药成药处方集》(福州方):脾胃冷弱,阴阳亏损,腹痛吐泻,反胃噎膈,及寒痹。

【方论选录】《重订通俗伤寒论》:君以参、术、草守补中气,臣以干姜温健中阳,佐以香、砂者,取其芳香悦脾,俾脾阳勃发也。

【备考】本方改为汤剂,名"香砂理中汤"(见《医灯续焰》)。

61093　香砂理中汤

【方源】《赤水玄珠》卷四。

【异名】香砂理气汤(《医钞类编》卷五)。

【组成】理中汤加藿香　砂仁

【主治】①《赤水玄珠》:腹中寒痛、水鸣,欲得热手按,及热物熨者。②《医钞类编》:腹中寒痛,呕吐下利。

61094　香砂理中汤

《医灯续焰》卷三。即《医统》卷二十三"香砂理中丸"改为汤剂。见该条。

61095　香砂理中汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】人参　白术　炮姜　甘草　砂仁　香附　藿香

【主治】伤食。生冷伤脾者,脉来沉缓无力。

【加减】滞重,去白术,加枳壳、厚朴;寒甚,加肉桂。

61096　香砂理气汤

《医钞类编》卷五。为《赤水玄珠》卷四"香砂理中汤"之异名。见该条。

61097　香饼金锁丹

【方源】《医方类聚》卷一五三引《经验秘方》。

【组成】磁石一钱　脑子二钱　麝香一钱　腽肭脐三钱　沉香三钱　麝香脐壳二钱(炙存性)　花蜘蛛二钱

【用法】上为细末，用苏合香油和为饼，作十饼。以生针砂泡酒饮一二盏，然后烧此香饼。

【主治】诸虚。

61098 香桂六合汤

【方源】《元戎》。

【组成】四物汤四两 桂心 香附子各半两

【主治】妇人赤白带下。

【备考】本方方名，《赤水玄珠》引作“香附六合汤”。

61099 香豉栀子汤

《伤寒总病论》卷三。为《伤寒论》“栀子豉汤”之异名。见该条。

61100 香豉石膏汤

【方源】《伤寒总病论》卷四。

【组成】香豉二合 葱须一两 石膏二两 栀子三分 生姜二两 大青 升麻 芒消各三分

【用法】上㕮咀。以水三升，煮取一升三合，去滓，下芒消，温服。

【主治】肺腑藏热，暴发气斑。

61101 香葛半夏散

【方源】《幼幼新书》卷二十七引《王氏手集》。

【组成】藿香 干葛 牙消 滑石各三分 半夏半两 甘草(炙)二分

【用法】上为细末。每服一钱，以水八盏，加生姜三片，木瓜少许，同煎至四分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿痰逆呕吐，胸膈痞滞，烦渴冒昏，壮热头痛。

61102 香葛发斑汤

【方源】《普济方》卷四〇三引夏真人家传方。

【组成】紫苏一两半 升麻一两半 干葛二两 香附子一两半 陈皮一两 甘草一两 赤芍药一两 紫草二两

【用法】上㕮咀。每服四钱，重水一大盏，加生姜二片，葱白一根，同煎至七分，去滓温服，滓再煎服，不拘时候。

【主治】小儿四时感冒发热，及痘疮尚未出过者，身发热头疼，或手心冷、耳冷，此痘疮之苗也。宜连进此药数服，痘疮纵出则必少。

【加减】如痘疮已出者，不加紫草，只服前药。

61103 香榔妙应丸

【方源】《医级》卷八。

【组成】槟榔一两 木香 鹤虱 贯众 锡灰各五钱 使君子八钱 轻粉一钱 巴豆仁二钱五分(去油) 雷丸二钱半 干漆五钱(烧净油)

【用法】上为末，曲糊为丸，如麻子大。每服十丸至十五丸，空心米饮送下。

【主治】诸虫积攻痛胸腹。

61104 香蔻和中丸

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】白术(去芦，炒) 山楂肉 连翘各四两 莱菔子(炒)五钱 白茯苓(去皮) 枳实(去瓤，麸炒) 陈皮(去白) 半夏(姜汁炒) 神曲(炒)各二两 干生姜一两 白豆蔻(炒)五钱 木香五钱

【用法】上为细末，神曲糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，食后白滚汤送下。

【主治】噫气吞酸嘈杂，有痰有热，有气有食，胸膈不宽，饮食不化。

61105 香蜡生肌膏

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】白丁香一钱(即公麻雀屎) 麻油一两 黄蜡三钱

【用法】上熬成膏。遇诸疮不收口，将此膏填满疮口，外盖膏药，一二日自能生肌收口。汤火伤，用此膏搽之，次日即愈。

【功用】生肌收口。

【主治】诸疮不收口。汤火伤。

61106 香橼甘蔗汤

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】干香橼二大只(熬浓汁) 甘蔗汁

五碗　生姜汁一茶杯

【用法】上和匀。早、晚各服大半茶杯。

【主治】反胃。

61107　香橼雄黄散

【方源】方出《种福堂方》卷二，名见《医学从众录》卷五。

【组成】陈香橼一个(去顶皮，大者)　透明雄黄三钱

【用法】雄黄为细末，掺入香橼内，炭火中煅存性，再为极细末。每服七分，用软腐衣分作六七包，干咽下。此日不可吃汤水，任其呕去顽痰即愈。

【主治】疟疾。

61108　香薷四苓散

【方源】《家庭治病新书》引《集验良方》。

【组成】香薷　厚朴　茅术　木通各一钱　白扁豆二钱　滑石　茯苓各三钱

【用法】水煎服。

【主治】暑湿，发热烦渴，小便不利者。

61109　香薷补气饮

【方源】《洞天奥旨》卷八。

【组成】香薷一钱　天花粉一钱　生黄耆一钱　白术二钱　炙甘草一钱　黄芩一钱　茯苓二钱　人参五分　厚朴五分　麦冬二钱　陈皮三分　桔梗一钱五分

【用法】水煎服。数剂愈。

【主治】天疱疮。

61110　香薷保安汤

【方源】《产孕集》卷上。

【组成】香薷八分　柴胡　羌活各五分　陈皮六分　白术二钱　黄芩一钱　炙甘草四分　当归一钱五分　生姜一片　枣二枚

【主治】子疟。发当夏秋，寒热往来，一日一作，或间日一作，若有定期。

61111　香薷散暑汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】香薷　厚朴　甘草　藿香　柴胡　陈皮　杏仁　半夏

【主治】中暑。头痛恶寒，身体拘急，脉来细缓无力。

【方论选录】香薷原利小便，何以又能发散，以其味辛而淡，辛者先走表分，淡者乃入膀胱，所以又能散暑也；佐以藿香、柴胡，走表更速；暑邪在经，必有痰滞留结，故用杏、朴、半夏。

61112　香薷葛根汤

【方源】《医方集解》。

【组成】三物香薷饮加干葛

【主治】暑月伤风咳嗽。

【备考】此方当治伤暑泄泻。

61113　香薷解毒汤

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】旧香薷三钱　厚朴(姜炒)　白扁豆(炒)　山栀(炒)　黄连　黄柏(炒)　黄芩(炒)各一钱

【用法】上锉。水煎服。

【主治】夏月中暑危笃，而大便下血者。

61114　香薷缩脾饮

【方源】《直指》卷三。

【组成】缩砂仁二两　草果仁　乌梅肉　香薷　甘草(炒)各一两半　白扁豆(姜制)　白干葛各一两

【用法】上锉。每服三钱，加生姜五厚片，水煎，微温服。

【功用】驱暑和中，除烦止渴。

【主治】中暑。

61115　香朴四君子汤

【方源】《金鉴》卷五十四。

【组成】人参　白术(土炒)　白茯苓　甘草(炙)　香附(制)　厚朴(姜炒)

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】小儿久病脾虚，或吐泻暴伤脾气，健运失常，所以饮食不化，食少腹即胀满，精神倦怠，面黄肌瘦。

61116　香附六君子汤

【方源】《回春》卷三。

【组成】香附(炒)　砂仁　厚朴(姜汁炒)　陈皮　人参　白术(去芦)　芍药(炒)　苍术

(炒) 山药(炒) 甘草(炙)各等分

【用法】上锉一剂。加生姜一片,乌梅一个,水煎,温服。

【主治】脾泻症,食后到饱,泻后即宽,脉细。

【加减】腹痛,加木香、茴香,去人参、山药;渴,加干葛、乌梅;小水赤短,加木通、车前;呕哕恶心,加藿香、乌梅、半夏;夏月加炒黄连、白扁豆;冬月加煨干姜,去芍药。

61117 香附旋复花汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】生香附三钱 旋复花三钱(绢包) 苏子霜三钱 广皮二钱 半夏五钱 茯苓块三钱 薏仁五钱

【用法】上以水八杯,煮取三杯,分三次温服。

【主治】伏暑、湿温胁痛,或咳或不咳,无寒,但潮热,或竟寒热如疟状。

【加减】腹满者,加厚朴;痛甚者,加降香末。

61118 香砂六君子丸

《丸散膏丹集成》。即《古今名医方论》卷一"香砂六君子汤"改为丸剂。见该条。

61119 香砂六君子汤

【方源】《明医杂著》卷六。

【组成】六君子加香附 藿香 砂仁。

【主治】①《内科摘要》:脾胃虚寒而致饮食少进,或肢体肿胀,肚腹作痛,或大便不实,体瘦面黄,或胸膈虚痞,痰嗽吞酸。②《医学传灯》:中寒呕吐痰水,微寒微热,甚则昏晕不醒,二便皆遗,脉沉细者。痰火初起之时,外无寒热诸症,内无烦热气急,但见神昏不安,肢体无力,声音低小,饮食不进,脉来沉细无力者。痰泻者,或多或少,或泻或不泻,中焦有痰,饮食入胃,里结不化,所以作泻,脉来弦细无力者。

61120 香砂六君子汤

【方源】《口齿类要》。

【异名】参砂和胃散(《痘疹传心录》卷十九)。

【组成】人参 白术 茯苓 半夏 陈皮各一钱 藿香八分 甘草(炒)六分 宿砂仁(炒)八分

【用法】上加生姜,水煎服。

【主治】脾胃虚寒,恶心呕吐,食欲不振,或口舌生疮。

①《口齿类要》:口舌生疮,服凉药过多,或中气虚热,以致食少作呕。②《外科正宗》:溃疡,脾胃虚弱,恶心呕吐,或饮食不思。③《金鉴》:小儿饮水过多,以致停留胸膈,变而为痰,痰因气逆,遂成呕吐之证,头目眩晕,面青,呕吐涎水痰沫,属虚者。④《笔花医镜》:胃寒吐泻。

61121 香砂六君子汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】香附一钱 砂仁五分 人参五分 白术一钱 茯苓(去皮) 半夏(姜制) 陈皮各一钱 木香五分 白豆蔻 厚朴(姜汁炒)一钱 益智仁 甘草(炙)各五分

【用法】上锉一剂。加生姜、大枣,水煎服。

【主治】脾虚不思饮食,食后倒饱。

【备考】方中白豆蔻用量原缺。

61122 香砂六君子汤

【方源】《杏苑》卷四。

【异名】香砂六君汤(《成方便读》卷一)。

【组成】香附子一钱 缩砂仁七枚 橘皮 白术各一钱五分 半夏 茯苓各一钱 人参一钱五分 甘草(炙)五分

【用法】上㕮咀。加生姜五片,水煎,食前服。

【主治】①《杏苑》:脾胃不和,恶心懒食。②《医方集解》:虚寒胃痛,或腹痛泄泻。

61123 香砂六君子汤

【方源】《古今名医方论》卷一引柯韵伯方。

【异名】香砂六君汤(《麻科活人》卷二)。

【组成】人参一钱 白术二钱 茯苓二钱 甘草七分 陈皮八分 半夏一钱 砂仁八分 木香七分

【用法】上加生姜二钱，水煎服。

【功用】①《中药成方配本》：疏补化痰。②《中国药典》：益气健脾，和胃。

【主治】①《古今名医方论》：气虚肿满，痰饮结聚，脾胃不和，变生诸证者。②《丸散膏丹集成》：中虚气滞，痰湿内阻，胸中满闷，食难运化，呕恶腹疼，肠鸣泄泻。

【方论选录】四君子气分之总方也。人参致冲和之气，白术培中宫，茯苓清治节，甘草调五脏，胃气即治，病安从来。然拨乱反正，又不能无为而治，必举夫行气之品以辅之，则补品不至泥而不行，故加陈皮以利肺金之逆气，半夏以疏脾土之湿气，而痰饮可除也。加木香以行三焦之滞气，缩砂以通脾肾之元气，膹郁可开也。四君得四辅，而补力倍宣，四辅有四君，而元气大振，相须而益彰者乎。

【备考】本方改为丸剂，名"香砂六君子丸"（见《丸散膏丹集成》）、又名"香砂六君丸"（见《全国中药成药处方集》）。

61124　香砂六君子汤

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】六君子汤加木香　砂仁　乌梅

【主治】气虚痰食气滞。

61125　香砂四君子汤

【方源】《医灯续焰》卷十二。

【组成】四君子汤加砂仁　木香

【主治】中恶腹胀，服药吐下者。

61126　香砂四君子汤

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】人参　白术（土炒）　茯苓　麦冬（去心）各八分　当归一钱　陈皮　制香附　砂仁　红花　炙草各四分

【用法】水煎服。

【主治】产妇脾虚，食少无乳。

61127　香蔻六君子汤

【方源】《温证指归》卷三。

【组成】木香五分　蔻仁五分　人参二钱　茯苓一钱　甘草五分　陈皮一钱　半夏一钱　白术一钱

【主治】温病屡经攻下，中气损伤，呕不止而舌无苔，多汗心烦。

61128　香薷六君子汤

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】人参　白术　白茯　甘草　陈皮　半夏　香薷　山栀　黄连　赤芍

【主治】伏暑留于少阳胸胁部分，以致微寒微热，恶心自汗，小便短少，脉来沉弦细数。

【方论选录】此方用六君子以祛痰益脾肺，使正气旺则客邪易逐矣；时当炎暑，热蒸于外，湿蕴于中，故用栀、连以清里，薷、芍以解表和荣。

61129　香附瓜蒌青黛丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】香附　瓜蒌　青黛各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如芡实大。每服一丸，食后临卧噙化。

【主治】燥痰、郁痰、酒痰，咳嗽呃逆。

61130　香橘顺气愈胃汤

【方源】《飑后方》。

【组成】陈皮（去白）八分　茯苓一钱　枳壳（麸炒）五分　青皮（麸炒）七分　半夏（姜汁煮）四分　桔梗五分　香附（童便炒）一钱　川芎四分　苍术（米泔水浸，炒）一钱　厚朴（姜汁炒）五分　神曲八分　甘草（炙）三分　茴香（盐水炒）八分

【用法】煨姜三片为引。

【主治】翻胃。

【加减】胃脘痛，加草豆蔻三分。

选

61131　选奇汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】羌活选奇汤（《伤寒大白》卷一）。

【组成】炙甘草（夏月生用）　羌活　防风各三钱　酒黄芩一钱（冬月不用，如能食，热痛者加之）

【用法】上㕮咀。每服五钱，以水二盏，煎至一盏，去滓，食后服。

【主治】风热挟痰上壅，头痛眩晕，眉棱骨痛。

①《兰室秘藏》：眉痛不可忍。②《内科摘要》：风热上壅，头目眩晕。③《古今医鉴》：眉棱骨痛，属风热与痰，痛不可忍者。④《伤寒大白》：太阳风热头痛。

适

61132 适兴丸

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】白芍一斤 当归 熟地 白术 巴戟天各八两 远志二两 炒枣仁 神曲各四两 柴胡八钱 茯神六两 陈皮八钱 香附 天花粉各一两

【用法】上药各为细末，炼蜜为丸。每服四钱，白滚水送下。服一月怀抱开爽，可以得子矣。

【功用】种嗣。

【主治】男子怀抱素郁而不举子者。

61133 适志汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】白芍 茯苓各五钱 甘草 枳壳 半夏各五分 砂仁一粒 神曲 香附 人参各二钱 苏子一钱

【用法】水煎服。

【主治】肝气不宣，木克脾胃，胸怀两胁胀闷，饮食日减，颜色沮丧，渐渐肢瘦形凋，畏寒畏热。

毡

61134 毡矾散

【方源】《普济方》卷二九九。

【组成】竹蛀屑 毡(烧灰) 红枣(烧灰存性) 黄丹 白矾(飞) 韶粉各等分

【用法】上为末。掺之。

【主治】脚烂疮。

61135 毡根煎

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】僵蚕三两 蝉壳 柴胡各二两 天麻三两 皂角一挺 牛黄 脑子各一字

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后荆芥汤送下。

【主治】肺经风热上冲，面生痤痱及赤痒渣刺。

熏

61136 熏台散

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】重台一两 黄耆一两(锉) 川大黄一两(生用) 羊桃根三分(锉) 消石三分 半夏三分 白蔹一分 莽草三分 丁香半两 木香半两 没药半两 白芷半两 赤芍药半两

【用法】上为散。有患处，以醋旋调，稀稠得所，涂故布，或疏绢上，每日三贴之。以肿退为度。

【主治】痈肿，一切风毒热肿，发背乳痈。

61137 熏汤丸

【方源】方出《证类本草》卷九引《孙尚药方》，名见《圣济总录》卷一七九。

【组成】胡黄连 柴胡各等分

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如鸡头子大。每服二丸至三丸，银器中用酒少许化开，更入水五分，重汤煮三二十沸，放温，食后和滓服。

【主治】小儿盗汗，潮热往来。

61138 熏汤丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】藿香叶 胡椒 白术 当归 桂 青皮 良姜 茯苓 肉豆蔻 神曲 大麦糵 缩砂仁 诃子各一两 木香 半夏曲 丁香各三分 厚朴半斤 甘草三两 干姜二两半 草豆蔻四个 附子一两 荜茇 红豆各二钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，以一盏水化开，重汤煮沸，空心服之。

【主治】脾胃虚弱，脏腑不调。

61139 熏听丸

【方源】《外台》卷十七引《广济方》。

【组成】石斛五分　五味子六分　牡丹皮八分　桂心四分　白术六分　丹参六分　磁毛石十分(研)　芍药四分　槟榔仁十分　枳实六分(炙)　通草六分　细辛四分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,渐加至三十丸,空腹酒送下,一日二次。

【主治】腰肾虚冷,脚膝疼痛,胸膈中风气。

【宜忌】忌生葱、雀肉、桃、李、生菜、胡荽。

61140　**重明散**

【方源】《宣明论》卷十四。

【组成】川独活　川羌活　川芎　吴射干　仙灵脾　防风　甘草　井泉石　苍术各半两　丹参　白术　石决明　草决明各三分

【用法】上为末。每服二钱,以水一盏半,煎至一盏,食后温服,一日三次。

【主治】一切风热,内外障气眼疾。

61141　**重明散**

【方源】《卫生宝鉴》卷十。

【组成】炉甘石一斤(火烧,用黄连水淬为末)　川椒二钱(熬膏子,入炉甘石末,以火焙干为度)　黄连　铜绿各半两　硇砂三钱　蒲黄半两　雄黄二钱　绿豆粉四两

【用法】上同炉甘石为极细末,齿上嚼不椮为度,后用脑子一钱,南硼砂一钱,研细,用大豆养之。每用少许,以骨筷干点,卧少时。

【主治】一切风热之毒上冲眼目,暴发赤肿疼痛,或生翳膜瘀肉,隐涩羞明,两睑赤烂。

【宜忌】忌酒、湿面、诸杂、鱼肉、辛热等物。

61142　**重明散**

【方源】《普济方》卷七十八引《经效济世方》。

【组成】黄鹰条一钱(研细)　白丁香一钱(研细)　乳香一钱(研细)　炉甘石一分(烧赤)　白矾一钱(飞过)　麝香少许

【用法】上为细末。每次以灯芯少点入眼眦内。

【主治】两眼生翳膜,连眼眶赤烂,久不效者,及一时赤眼。

61143　**重明膏**

《普济方》卷七十八引《瑞竹堂方》。为《保命集》卷下"洗眼药"之异名。见该条。

61144　**重明膏**

【方源】《普济方》卷八十六。

【组成】诃子一个(锉,去核)　黄连五钱　黄丹三两(水飞)

【用法】上为细末,用好蜜十两,熬去白沫,滤净,入前药末于银铜器中,用文武火慢熬,用槐条搅成膏,紫色为度,用净瓷器盛贮,子地内埋一伏时,去火毒。每用一豆大,温水化开洗眼。

【主治】一切目疾。

61145　**重粉散**

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】轻粉三钱(夹纸炒)　铅粉三钱　甲片三钱(炙)　漂冬丹三钱

【用法】上为末。用油调敷。

【主治】小儿月蚀疮。

61146　**重台草散**

【方源】《圣惠》卷六十四。

【组成】重台草　木鳖子(去壳)　半夏各一两

【用法】上为细散。以酽醋调涂之。

【主治】风毒暴肿。

61147　**重剂排石汤**

【方源】《急腹症方药新解》。

【组成】三棱15克　莪术15克　穿山甲9克　皂角刺9克　桃仁12克　赤芍15克　乳香9克　没药9克　牛膝15克　青皮12克　白芷15克　薏苡仁30克　枳壳15克　厚朴15克　金钱草30克　车前子15克

【用法】每日一剂,煎取150～200毫升,每剂2～3煎,每日服2～3剂。

【功用】破血破血,活血祛瘀。

【主治】尿路结石,石体较大,停留嵌顿时间较久,或结石部位有粘连。

【方论选录】方中三棱，莪术、桃仁、赤芍、乳香、没药活血祛瘀止痛；皂角刺消肿，下胞；薏苡仁利水排脓；白芷消肿止痛。

61148 **重型消黄汤**

【方源】《中医原著选读》引关幼波方。

【组成】茵陈90克　生石膏一两　炒知柏各三钱　藿香三钱　佩兰三钱　鲜茅根一两　杏仁三钱　赤芍五钱　丹皮五钱　泽兰五钱　酒胆草五钱　六一散（包）三钱

【功用】清热利湿，活血解毒，芳香透表。

【主治】肝炎。湿热弥漫三焦，热重于湿，黄疸重，恶心，呕吐，厌油，发热口渴，便干，尿赤，脉弦滑数，舌苔黄厚而燥。

【加减】高烧（39度以上），或兼神昏谵语者，加服安宫牛黄散四分，分二次冲服；或加服紫雪散一钱，分二次冲服；或加服局方至宝丹一丸，分二次服。便秘者，加酒军三钱，瓜蒌五钱。退黄时茵陈的用量要大，最大可用四两，并加活血药，以加速退黄的作用。

61149 **重校定香茸丸**

【方源】《普济方》卷二二六引《十便良方》。

【组成】麝香二钱（研）　鹿茸　熟地黄　肉苁蓉　牛膝各四两　沉香二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，空心温酒或盐汤任下。

【功用】补诸虚不足。

便

61150 **便立丹**

【方源】《普济方》卷二九一。

【组成】黄丹　雄黄　龙骨八停（煅）　金脚信少许（研）

【用法】上为末，捏作饼子。脓水干，葱白汤洗过，贴在疮上。

【主治】瘑疮。

【备考】方中黄丹、雄黄用量原缺。

61151 **便血丸**

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】血见愁一两　卷柏灰一两　乌梅灰二两　地榆灰二两　莲房灰二两　荷叶灰二两　榴皮灰二两　五倍灰二两　血余灰一两　柏叶灰二两　棕灰二两　木耳灰一两　槐花灰二两　白蔹一两　当归炭三两　白芍一两五钱　升麻一两　白术二两　生耆三两　党参三两　椿根皮二两　凌霄花

【用法】晒干为末，醋泛为丸。每服三钱，开水送下。

【主治】便血日久不止。

【备考】方中凌霄花用量原缺。

61152 **便血散**

【方源】《仙拈集》卷二引《普济方》。

【组成】发灰五钱　柏叶　鸡冠花各一两

【用法】上为末。每服一钱，卧时酒送下，来早以温酒投之。一服见效。

【主治】大肠泻血，虚盛皆宜。

61153 **便易散**

【方源】《外科百效》卷五。

【组成】花椒一两　香附半斤　槟榔三两　蛇床二两　白矾一两

【用法】上为极细末。核桃油或木油调搽。

【主治】疥疮。

61154 **便毒散**

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】大黄　五灵脂　川山甲　白芷各四钱　乳香　没药一钱半

【用法】上为末。每服五钱，空心好酒送下。

【主治】便毒。

61155 **便浊汤**

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】黄耆一钱　白术一钱　陈皮八分　香附一钱　川芎八分　苍术一钱　车前八分　半夏一钱

【用法】水煎服。

【主治】便浊。

61156 **便浊饮**

【方源】《医编》卷七。

【组成】白茯苓　半夏　甘草梢　泽泻　车前　土牛膝　萆薢

【主治】胃中湿热下流,伤于气分,而发膏淋。

61157 **便消散**

【方源】《外科十三方考》。

【组成】金银花一钱 知母一钱 花粉一钱 白芨一钱 法半夏一钱 穿山甲一钱 乳香一钱半(制) 皂角刺一钱二分

【用法】用水、酒煎服,疮在肚脐以上者,饭后服;疮在肚脐以下者,饭前服。

【主治】疮症初起,红肿高大者。

61158 **便蜜饮**

【方源】《松峰说疫》卷二。

【组成】童便一钟 白蜜二匙

【用法】共搅去白沫,顿服。取吐,碧绿痰出为妙,不然终不除。

【主治】瘴疠诸疟,无问新久。

61159 **便产神方**

《良方集腋》卷下。为《增补内经拾遗》卷四"无忧散"之异名。见该条。

61160 **便血红痢膏**

【方源】《全国中药成药处方集》(抚顺方)。

【组成】椿皮半斤 酸梨一斤 鲜姜三两 红糖四两

【用法】先将椿皮多加水(约三升)熬剩一斤,去渣取汁,再将姜、梨捣汁去渣,将汁对在一起,放在锅内熬开,再下红糖成膏。每日早、晚各服一匙,开水冲下。

【主治】便血,赤痢。

修

61161 **修肝散**

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】栀子 薄荷 防风 当归 甘草 连翘 大黄 黄芩 苍术 羌活 菊花 木贼 赤芍药 麻黄各等分

【用法】上为末。每服二钱,食后蜜水调下,或煎服,一日二三次。

【主治】风轮生翳,如针如麻米,疼痛甚者。

61162 **修肝散**

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】防风 羌活 当归 生地黄 黄芩 栀子 赤芍药 大黄 甘草 蒺藜各一两

【用法】水煎服。

【功用】散血退热。

【主治】飞尘入眼少疗,日久生翳膜,遮满瞳人。

61163 **修肝散**

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】当归 甘草(少) 防风 连翘 薄荷 黄芩 栀子 大黄 草决明 蔓荆子 细辛 白芍

【用法】上为末。每服三钱,食后加蜜少许调下,一日三次。

【主治】偃月翳内障。

61164 **修善散**

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】当归不拘多少

【用法】上为细末。每服一大钱,浓煎赤小豆汁,取一盏,与当归同煎五七沸,食前空心通口顿服,一日三次。立效。

【主治】肠风大便下血。

61165 **修肝活血汤**

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】归尾 赤芍各一两半 川芎 羌活各七钱 黄耆 防风 大黄 黄连各三钱 薄荷 连翘 白蒺藜 菊花各一两

【用法】每服四钱,水煎服。

【主治】血翳包睛,眼中赤涩肿痛,泪出,渐有赤脉通睛,常时举发,久则发筋结厚,遮满乌睛,如赤肉之相,及风轮生疮或突起,愈后变成白翳,久不散者。

保

61166 **保乙丸**

【方源】《幼科指掌》卷四。

【组成】丁香 木香各二钱 槟榔 川楝子 锡灰 干漆各三钱,巴霜一钱

【用法】上为末，蒸饼为丸，如芡实大。每服一丸，汤化下。

【主治】小儿疳蛊，虫出形如马尾，或如丝发，多出于头项腹背之间，黄白赤者。

61167 保元丸

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】当归 枳壳 独活 防风各一两 前胡 麻黄 大黄各五钱

【用法】炼蜜为丸。米汤送下。

【主治】小儿风入脊髓，致患龟背。

61168 保元丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】龙骨 牡蛎（煅）各二两 沙苑蒺藜 酸枣仁 菟丝子 芡实 白茯苓 山药各三两 莲须八两 覆盆子 山茱萸肉各四两

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服三钱，盐汤送下。

【主治】阴虚遗精，白浊阳痿，面黄耳鸣。

61169 保元丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】鹿胶一百六十两 五味子（炙）二十两 补骨脂（炒）二十两 山药四十两 牛膝二十两 芦巴（炒）二十两 杜仲炭十二两 益智仁二十两 柏子仁二十两 茯苓四十两 全蝎三两 小茴香（炒）二十两 淫羊藿（炙）二十两 熟地四十两 川楝子二十两 沉香六两 菟丝子三十两 巴戟（炙）二十两 远志（炙）二十两 山甲（炙）六两 山萸肉（炙）二十两 苁蓉（炙）八十两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重三钱。每服一丸，温开水送下，一日二次。

【功用】滋阴补肾，益智宁神。

【主治】气虚肾寒，腰膝无力，精神疲倦，小便频数。

61170 保元丹

【方源】《普济方》卷一二〇。

【组成】附子（炮，去皮脐） 肉豆蔻 白术 山药 干姜（炮） 赤石脂各一两 肉桂半两

【用法】上为细末，水糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，空心酒送下。

【主治】老弱诸沉寒痼冷，小便滑数，大便时泄，腰腿脐腹疼痛，困倦，瘦虚食减。

61171 保元丹

【方源】《纲目拾遗》卷八引《千金不易方》。

【组成】黄精一斤 甘枸杞四两 酒酿五斤 好黄酒五斤

【用法】入罐煮一炷香，每饮一茶杯，药渣加胡桃肉八两，大黑枣八两，青州柿饼一斤，捣为丸服。

【功用】保养元气。

61172 保元丹

【方源】《重楼玉钥》卷上。

【组成】稻草不拘多少

【用法】密扎成把，候冬日放露天粪缸内，至春分取起，于长流水洗净污秽，置屋上，任日炽雨淋雪压，愈陈愈妙，再将草烧成黑灰，为末，每两加冰片三分，和乳极细。吹患处。

【主治】牙疳久不愈者。

61173 保元丹

《全国中药成药处方集》（沈阳方）。为《博爱心鉴》卷上“保元汤”之异名。见该条。

61174 保元汤

【方源】《博爱心鉴》卷上。

【异名】参耆汤（《痘疹活幼至宝》卷终）、参耆饮（《简明医彀》卷六）、保元丹（《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】人参一钱 黄耆三钱 甘草一钱 肉桂五分至七分

【功用】①《全国中药成药处方集》（沈阳方）：滋养益气，扶弱补虚。②《方剂学》：补气温阳。

【主治】①《简明医彀》：元气虚弱，精神倦怠，肌肉柔慢，饮食少进，面青㿠白，睡卧宁静，痘顶不起，浆不足，及有杂证。②《全国中药成药处方集》：气血不足，婴儿怯弱，痘毒内陷，面色苍白，气陷久泻，肢体无力，肺脾虚

弱,恶寒自汗。

【宜忌】①《简明医彀》:血热毒壅之火证禁用。②《全国中药成药处方集》(沈阳方):禁忌生冷。

【方论选录】①《博爱心鉴》:人参益内,甘草和中,实表宜用黄耆,助阳须凭官桂。前三味得三才之道体,后一味扶一命之巅危。②《古今名医方论》引柯韵伯:参、耆非桂引道,不能独树其功;桂不得甘草和平气血,亦不能绪其条理。

61175 保元汤

《直指小儿》卷五。即《兰室秘藏》卷下"黄耆汤"。见该条。

61176 保元汤

《医学入门》卷四。为原书同卷"加味黄耆汤"之异名。见该条。

61177 保元汤

【方源】《片玉痘疹》卷三。

【组成】人参 黄耆 甘草 牛蒡子 木香 防风 白芷 青皮 官桂 当归 生地 麦冬 桔梗 连翘

【用法】上以大枣、莲肉、糯米为引,水煎,空心服。

【功用】补气。

【主治】血虚气实,血至而气不至,痘起发四周红活有水色,中心顶陷不起者。

61178 保元汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】人参 黄耆 白术各一钱 甘草三分

【用法】上加生姜一片,大枣二枚,以水二钟,煎八分,食远服。

【功用】助脾健胃。

【主治】①《外科正宗》:痘痈出脓之后,脾胃虚弱,脓清不敛者。②《金鉴》:气血虚弱,痘痈毒留经络中,发无定处肿不红。

【备考】《金鉴》有当归一钱。

61179 保元汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】石斛 巴戟天 人参 白茯苓各一钱 黄柏 柴胡 甘草 地骨皮各七分 黄连一钱二分 荆芥 知母 升麻各六分

【用法】加大枣二枚,水煎,空心服。

【主治】赤白带下,久久不愈,气血亏损。

61180 保元汤

【方源】《痘疹仁端录》卷十一。

【组成】人参 黄耆 甘草 黄芩 阿胶 杜仲

【用法】水煎服。

【主治】妇女出痘脓期。

61181 保元汤

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】炙耆三钱 人参一钱五分 炙草七分 川芎一钱 肉桂一钱 白术一钱

【用法】加生姜、大枣,水煎服。

【主治】痘顶陷皮薄而软者。

【加减】气不行,加木香。

61182 保元汤

【方源】《会约》卷十二。

【组成】熟地三五钱 枣皮二钱 山药一钱半 菟丝子(炒香,捣碎)二三钱 五味三分 益智仁(酒炒)一钱 附子一钱半 肉桂一二钱

【用法】水煎,空心服。

【功用】补阴固涩。

【主治】肾虚无火而下焦滑遗者。

【加减】虚滑遗甚者,加金樱子(净肉)二钱,或加乌梅二个;兼大便溏泄,加骨脂、吴茱萸之属。

61183 保元汤

【方源】《观聚方要补》卷一。

【组成】桂枝二钱 白术 人参各一钱 黄耆八分 当归三分 生附子七分

【用法】水煎服。

【主治】中风虚脱,卒昏塞不省人事,半身不遂。

【加减】肾气易动而燥者,加芍药、地黄。

61184 保元汤

【方源】《易简方便》卷四。

【组成】肉桂二钱 生耆四钱 生甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】阴疽。

61185 **保元汤**

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】苍术 黄柏 当归 独活 灵仙 加皮 防已 牛膝 姜 酒

【主治】内因湿热，致成湿脚气，肿而又红。

【加减】热盛，加芩、连。

61186 **保元膏**

《北京市中药成方选集》。为原书"宝珍膏"之异名。见该条。

61187 **保牙散**

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】软石膏一两 川乌三钱 草乌三钱 花椒三钱

【用法】上俱生用为末。擦牙漱口。吐之立已。

【主治】风牙肿痛。

61188 **保中丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十引东方先生方。

【组成】天灵盖（用醋浸一宿，羊脂炙黄） 鳖甲（去裙，治如上法） 虎头骨（锉细，酒拌炒）各一两 青蒿子（赤梗者） 揀人参 桃仁（去皮尖，麸炒，研） 知母（切） 甘草（生锉，焙干）各半两

【用法】上为细末，加阿魏二钱研开，同桃仁再研，和诸药匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十粒，煎乌梅汤送下，不拘时候。岁数小者作小丸，以意加减。

【主治】劳气，久困床枕。

61189 **保中汤**

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】陈皮八分 半夏（姜制）八分 茯苓八分 甘草三分 白术（土炒）二钱 藿香一钱 黄连（土炒）二钱 黄芩（土炒）一钱 山栀子（姜汁炒）二钱 砂仁三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，长流水和胶泥澄清水二钟，煎至一钟，稍冷频服。

【主治】呕吐不止，饮食不下。

【加减】吐逆甚，加伏龙肝一块同煎；因气，加香附、枳实；心烦，加竹茹。

61190 **保气丸**

《胎产心法》卷中。即《妇人良方》卷十六"保气散"改为丸剂。见该条。

61191 **保气饮**

《准绳·女科》卷四为《妇人良方》卷十六"保气散"之异名。见该条。

61192 **保气散**

【方源】《妇人良方》卷十六。

【异名】保气饮（《准绳·女科》卷四）。

【组成】香附子四两 山药二两 缩砂仁一两 木香四钱 粉草一两一分 益智仁 紫苏叶各半两

【用法】上为细末。每服二钱，白汤点服。

【功用】安胎，宽气进食，瘦胎易产。

【主治】居处失宜，偶然顿仆，胎动胎痛，漏胎下血。

【备考】本方改为丸剂，名"保气丸"（见《胎产心法》）。

61193 **保气散**

【方源】《得效》卷十四。

【组成】大腹皮 紫苏 枳壳（去瓤） 桔梗（去芦） 粉草 缩砂 香附子各等分

【用法】上锉散。每服三钱，以水一盏半煎，食前服。兼服芎归汤、枳壳散。

【功用】安胎，宽气进食，瘦胎易产。

【主治】居处失宜，偶然顿仆，胎动胎痛，漏胎下血。

61194 **保心丹**

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】蟾酥一分 牛黄一分 绿豆粉一钱 穿山甲一钱 天竺黄二钱 胎骨一分 人参五分

【用法】如初起只用蟾酥，酒化为丸，不用人参，至八九日毒盛元虚，始用粪清水制人参

三次，晒干，用蟾酥酒化为丸，如芡实大。大者一丸，小者半丸，甘草汤送下。

【主治】痘疮毒盛稠密，不能起发。

61195　**保孕丸**

【方源】《医级》卷九。

【组成】熟地　当归　川断　白术各四两　阿胶　香附各二两　陈皮　艾叶　益母草　川芎　黄芩各一两　砂仁五钱

【用法】上以枣肉为丸。每服三四钱，米饮送下。

【主治】妇人受孕，气血不足，经三月而堕胎者。

【宜忌】宜节饮食，戒恼怒，绝嗜欲，静养。

61196　**保孕丸**

《医钞类编》卷十七。为《济生》卷七"杜仲丸"之异名。见该条。

61197　**保孕丹**

【方源】《全国中药成药处方集》(抚顺方)。

【组成】当归　香附炭　白人参　熟地　茯苓　广砂　川断各一两　白术四两　杜仲炭　艾炭　贡胶　陈皮　益母草各八钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸二钱重。每服一丸，早、晚二次，大枣水送下。

【功用】补血安胎。

【主治】流产，妊娠漏血，腹痛腰痠，跌闪伤胎，妊妇腰痛白带。

61198　**保生丸**

《千金》卷二。为原书同卷"千金丸"之异名。见该条。

61199　**保生丸**

【方源】《周碰济急方论》。

【组成】金钗石斛　贝母(去心)　黄芩　明净石膏(细研如粉)　桂心　乌头卷　秦椒(去目，炒)　蜀椒(去目，炒)　甘草(炙)　糯米(炒)各二两

【用法】上为散，炼蜜为丸，如弹子大。或有妊娠诸疾，吃食减少及气喘疾痛，面目萎黄，身体羸瘦，四肢无力，手脚浮肿，胎脏不安，并以大枣汤研送一丸；气痛，酒研送一丸，空心服之。

【主治】妊娠十个月内诸疾，食欲不振及气喘疾痛，面目萎黄，身体羸瘦，四肢无力，手脚浮肿，胎脏不安，及气痛等证。

【宜忌】忌腥腻、果子、粘食、杂物、冷肉。

61200　**保生丸**

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】巴豆七枚(生用，去皮心)　天南星一枚(炮裂)　蜣螂五枚(生用)

【用法】上药于晴朗初夜，在北极下露之一宿，明旦为末；取豉四十九粒，口内含不语，脱去皮，烂研为丸，如黍米大。以温水送下。

【主治】小儿天钓，脏腑壅滞，壮热搐搦。

61201　**保生丸**

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】干虾蟆一枚(于小罐子内，以瓦子盖口，勿令透气，烧灰)　蜣螂(微炒，去翅足)　母丁香　麝香(研细)　夜明沙(微炒)　甜葶苈(隔纸炒令紫色)　苦葫芦子　胡黄连　熊胆(研细)各半两

【用法】上为末，以软粟米饭为丸，如绿豆大。每服三丸，以粥饮送下。

【功用】充肌肤，悦泽颜色。

【主治】小儿五疳。

61202　**保生丸**

【方源】《博济》卷四。

【异名】保生丹(《鸡峰》卷十五)。

【组成】金钗石斛一分(别杵)　秦艽　官桂(去皮)　干地黄　贝母　防风　糯米　甘草(炙)　干姜(炮)　细辛各一分　当归　蜀椒(去目子)　大麻仁　大豆卷　黄芩各二分　石膏(明净者)　麒麟竭　没药　龙脑各一钱半

【用法】上为末，炼蜜六两，热，须入水一分，同炼令水尽，和药为丸，如弹子大，约成七十二丸。产前产后血气头旋身战，薄荷汤送下；月信不通，当归酒送下；赤白带下，温酒送下；妇人临产难产，胎衣不下，子死腹中，横产倒产，昏死不语，但看头热气在，取一丸用芎、

枣汤研，灌口中，但入喉立苏；产后恶血不尽，脐腹疼痛，呕吐发热，憎寒烦闷，月候不调，或多或少，皮肤虚肿，产血不止，虚劳中风，口噤不语，半身不遂，产前产后赤白痢，大便秘涩，口渴血晕，狂语见鬼，头痛，面色痿黄，渐成劳瘦，饮食无味，并无灰酒研下一丸，服至五七丸，临产五脏不痛，易生；催生，当归酒送下；产后中风血晕，生地黄汁同煎十沸，研药一丸灌之，立愈；御风，但五日一度，嚼烂一丸，空心热酒送下，或浴后嚼一丸，温酒送下；小儿天钓惊风，薄荷酒送下一丸，分作三服；中风不语，身忽如板，用消梨好瓤与薄荷同研，热服一丸灌之，盖衣被，但汗出相次揭衣被，便当风坐卧，立愈；其妇人一切诸疾，但只以温酒及当归、薄荷同研一丸，立愈。

【功用】《鸡峰》：补宫脏。

【主治】①《博济》：产前产后，血气风冷及妇人所患一切疾病。②《鸡峰》：气虚，肢体瘦倦。

【宜忌】忌生冷、油腻、鱼、鸡等物。

61203 保生丸

【方源】《幼幼新书》卷三十四引《谭氏殊圣》。

【组成】大黄 黄柏（为末，别研） 宣连各一分半 丁香一钱 麝香一字 金箔五片（以水银结砂子）

【用法】上为细末，枣肉为丸，如皂子大。每服一粒，温水化下。

【主治】小儿心热，客壅伤神，绕口生疮，钓引，重舌，涎流不断，食乳摇头，夜夜啼哭。

61204 保生丸

《杨氏家藏方》卷十七。为《幼幼新书》卷九引《刘氏家传》“保生丹”之异名。见该条。

61205 保生丸

【方源】《医方类聚》卷二一二引《仙传济阴方》。

【组成】黑豆一升（炒熟，去皮） 香附子末四两半 干姜（炮） 生干地黄各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，以苎根糯米煎饮送下；或以秦艽、糯米煎饮亦好；胎漏下血，以温酒咽下。

【主治】妇人初受胎时，胎气不安，多卧少起，不进饮食；或胎漏下血不止，或下黄赤汁，腰腹痛重。

61206 保生丹

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】朱砂半两（研细，水飞过） 天麻半两 白附子半两（炮制） 白僵蚕半两（微炒） 干姜一分（炮制，锉） 干蝎半两（头尾全者，微炒） 牛黄一分（研细） 麝香一分（研细）

【用法】上为末，入朱砂等同研令匀，炼蜜为丸，如麻子大。每服三丸，以金银汤送下，不拘时候。

【主治】小儿慢惊风，多涎昏闷，或口噤搐搦，发歇无时。

61207 保生丹

【方源】《幼幼新书》卷九引《刘氏家传》。

【异名】保生丸（《杨氏家藏方》卷十七）、延寿睡惊丸（《普济方》卷三七四）。

【组成】天南星（炮） 白附子（炮） 朱砂（别研） 麝香（别研）各半两 蛇黄四个（辰地上煅铁色者，用楮叶研自然汁涂却，火煅全赤，用生甘草水洒出火毒，研令极细）

【用法】上用端午三家粽子尖为丸，如梧桐子大。每服一丸，用淡竹沥磨下；治丈夫、妇人一切疾，每次二丸，薄荷酒嚼下。

【主治】小儿急慢惊风。

61208 保生丹

《鸡峰》卷十五。为《博济》卷四“保生丸”之异名。见该条。

61209 保生丹

【方源】《回春》卷四。

【组成】嫩乌药 益智仁 朱砂（另研，水飞过，留一半为衣）各一两 干山药二两

【用法】上药各为末，将山药打糊为丸，如不成，再加些酒糊为丸，如梧桐子大。每服百丸，空心淡盐汤送下。

【主治】夜梦遗精，旬无虚夕，或经宿而再者。

61210　**保生丹**

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】枸杞八钱　熟地　柏仁　莲蕊(酒煮)各四钱　菟丝子　芡实各四钱　龙骨(煅)一钱

【用法】金樱汤和蜜为丸。如欲泄，饮车前汤半盏即泄。

【主治】梦遗。

61211　**保生汤**

【方源】方出《旅舍》，名见《普济方》卷三七五。

【组成】蛇蜕皮一分　牛黄(研)一钱

【用法】上以水一盏，先煎蛇皮至五分，去滓，调牛黄顿服。五岁以上倍服。

【主治】小儿急慢惊风，手足搐搦，日数十发，摇头弄舌，百治不效，垂困。

61212　**保生汤**

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】紫菀(去苗土)　柴胡(去苗)　龙骨　赤石脂各一两半　艾叶(炒)　白术各三分　黄连(去须)　厚朴(去粗皮，生姜汁炙)　阿胶(炙令燥)　枳壳(去瓤，麸炒)各一两　地榆一两一分　肉豆蔻(去壳)一枚　益智(去皮)　干姜(炮)　旋覆花(炒)　黄芩(去黑心)各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓温服。

【功用】祛散寒湿，安和胎气。

【主治】妊娠心腹痛。

61213　**保生汤**

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】陈橘皮二两(汤浸，去白瓤，焙)　人参一两(去芦头)　白术半两　麦门冬一两(去心)　厚朴一两(去粗皮，涂生姜汁炙令香熟)　白茯苓一两

【用法】上为末。每服四钱匕，以水一中盏，加生姜三片，淡竹叶二十片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠呕逆，不下食饮。

61214　**保生汤**

【方源】《妇人良方》卷十二引温隐居方。

【组成】人参一分　甘草一分　白术　香附子　乌药　橘红各半两

【用法】上㕮咀。每服三大钱，以水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。或作末调服。

【主治】①《妇人良方》引温隐居方：妊娠恶阻，经候不行，身无病而似病，脉滑大而六部俱匀，精神如故，恶闻食臭，或但嗜一物，或大吐；或时吐清水。②《校注妇人良方》：少食呕吐，或兼吐泻作渴。

【加减】如觉恶心呕吐，加丁香、生姜，煎服。

【备考】方中乌药，《校注妇人良方》作“乌梅”。《玉案》有艾叶。

61215　**保生汤**

【方源】《女科万金方》。

【组成】人参　白术　白茯　甘草　香附　陈皮　厚朴　门冬　丁香　生姜五片

【用法】水煎服。

【主治】妊娠恶阻，经候不行，二三月之间，无病似病，脉浮大，而六部俱匀，精神如困，恶闻食臭，或呕吐痰水者。

61216　**保生汤**

【方源】《诚书》卷六。

【组成】防风七分　枳壳(炒)五分　橘红四分　茯神二分　荆芥穗三分　远志(去心)四分　南星(姜炒)五分　桔梗三分　甘草二分

【用法】上加灯心，水煎服。

【主治】小儿脐风，锁肚，口噤。

61217　**保生汤**

【方源】《金鉴》卷四十六。

【组成】砂仁　白术　香附　乌药　陈皮　甘草

【用法】生姜为引。

【主治】妊娠恶阻，呕吐而无其他兼证者。

【加减】若气弱者，量加人参；气实者，量加枳壳。

61218 保生汤

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】熟地三钱 人参 牛膝各二钱 当归 川芎各一钱半分

【用法】上水煎，临产服之，最妙。

【功用】和气血，保母子并无产后诸证。

61219 保生汤

【方源】《胎产护生篇》。

【组成】白茯苓一钱 甘草五分 白术一钱 橘红一钱五分 厚朴 香附各一钱

【用法】上药用水一钟半，加生姜五片，煎七分，温服。

【功用】养卫调气。

【主治】妊妇恶心阻食。

【加减】呕吐，加砂仁一钱。

61220 保生散

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【组成】蜈蚣一条（赤足者，炙令干） 乌头尖六枚（生用） 麝香（研）一字

【用法】上除麝香外，为末，同研极细。每服半字匕，煎金银薄荷汤调下。

【主治】小儿因剪脐伤风，致唇青口撮。

61221 保生散

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】胡黄连半两（水煮） 硼砂（研） 铁粉 轻粉各一钱

【用法】上为末。每服一字，薄荷乳汁调下。服药后有青赤物下是效，如无，隔日服琥珀丸，不拘时候。

【主治】新生儿胎惊，心神不宁，睡卧不醒，壮热躁烦，啼哭无时，面青赤，腰直身冷，搐缩口撮，或粪青黄水。

61222 保生散

【方源】《产宝诸方》。

【组成】神曲（炒） 大麦蘖（炒） 陈皮（去瓤） 人参 诃子（煨，去核） 白术各等分

【用法】每服二钱，用水一盏，煎至七分，空心热服。临产每日一服，才觉痛，速进三服，减十分辛苦。

【功用】临产令子母气顺。

【主治】临产腹痛。

61223 保生散

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】紫河车一具（焙，为末） 龟版（酥炙）五钱 （一方有鹿茸五钱）

【用法】上为末。每服五七分或一钱，气虚者，保元汤送下；血虚，芎、归、紫草煎汤送下。

【主治】痘证气血俱虚，灰白色，不灌脓回浆者。

61224 保生锭

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】牛黄三钱 天竺黄 辰砂各一两 雄黄三钱 麝香五分 片脑五分 琥珀一两 珍珠五钱 赭石三钱（火煅七次） 蛇含石三钱（火煅七次） 金银箔各四帖 天麻 防风 甘草 茯神（去皮） 人参各三钱 僵蚕 血竭各五钱 远志三钱（去心） 陈皮 牛胆南星各一两

【用法】上为细末，用粉米糊为锭，辰砂为衣。用薄荷汤化下。

【功用】镇惊安神宁心。

【主治】小儿急慢惊风，痰涎壅盛，胎惊内钓，多啼，夜间恍惚不宁，久患癫痫，咳嗽发热，夏月中暑发搐。

61225 保生锭

【方源】《简明医彀》卷七。

【组成】辰砂（上好，水飞） 当归 川芎各等分

【用法】上为末，蜜和，印定金银。以山楂一两，当归五钱，荆芥（炒）二钱，煎汤化下。

【功用】产后镇养心神。

61226 保生锭

【方源】《诚书》卷八。

【组成】蛇含石（醋煅七次） 代赭石（醋煅七次）各一两 僵蚕（制） 全蝎（制） 半夏

曲 天竺黄 白附子(炮) 犀角(镑) 羚羊角(镑) 天麻(煨)各一钱 黄连(炒)五钱 人参二钱半 麝五分 胆星一钱二分半

【用法】上为末，糯米糊为锭，薄荷汤磨化下。

【主治】小儿盘肠内钓，叫号反弓，直视搐搦，痰壅客忤不食。

61227 保全散

《女科指掌》卷三。为《圣惠》卷七十七"当归散"之异名。见该条。

61228 保安丸

【方源】《幼幼新书》卷二十九引《博济》。

【组成】巴豆(去皮心后，一两，研细，纸裹去油，入药内同研)半两 青橘(去白，切作片子，炒令转色)一两一分 黄连(去毛，锉，炒令紫色) 蓬莪术(锉，炒令黄色) 干姜(炮裂，切细，再炒少时)各一两

【用法】上四味同为细末，入前巴豆同研令匀，以米醋糊为丸，如麻子大，用朱砂为衣。常服白汤送下二丸，大人三丸；霍乱吐泻，用煨生姜汤送下五丸，小儿二丸；心气痛，醋汤送下三丸；白痢，干姜汤送下；赤痢，甘草汤送下五丸，小儿一丸至二丸。

【功用】取积滞，行冷气。

【主治】男子、女人一切酒食所伤。

61229 保安丸

《圣济总录》卷四十四。为《博济》卷三"保安丹"之异名。见该条。

61230 保安丸

【方源】《产乳备要》。

【异名】万灵丸(《普济方》卷三一六)。

【组成】赤茯苓(去皮) 牡丹皮 白芍药各三分 吴茱萸 沉香各一分 人参(去芦) 当归(洗，切，焙) 桂(去皮) 牛膝(酒浸) 香白芷 木香 藁本(去芦) 麻黄(去根节) 川芎 附子(炮，去皮脐) 细辛(拣净) 兰香叶 甘草(锉，炙) 寒水石(烧) 防风(去芦) 桔梗(去芦) 蝉壳(去足翅)各半两 马鸣退一两(炙) 生干地黄一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如小弹子大。每日空心用温酒化下一丸；或每一丸细嚼，空心温汤送下；产前伤寒中风，体如板，煎麻黄汤化下一丸。立效。

【主治】产前产后三十六种冷血气，半身不遂，手脚疼痛诸疾。

61231 保安丸

【方源】《普济方》卷三二八引《海上方》。

【组成】白豆蔻 赤茯苓 牡丹皮 红芍药 沉香 诃子皮 槟榔 朱砂 石茱萸各三两 马鸣退(炒) 生地黄各一两 人参 当归 官桂 牛膝(酒浸) 白芷 木香 藁本 麻黄(去节) 黑附子(炮) 川芎 细辛(去叶) 兰香叶 甘草 桔梗(去芦) 寒水石(烧粉) 防风(去芦) 蝉壳 乳香 没药 白术各五钱 龙脑一钱 麝香少许

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，空心细嚼，温酒送下。

【功用】催生。

【主治】产前产后诸证。血淋，胎衣不下，产前产后腹痛，子死腹中，脐下如刀刺，遍身生黑斑，经脉不通，产前产后伤寒。

61232 保安丸

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】川大黄三两(新水浸一宿，蒸熟，切片子，焙) 干姜一两(炮) 大附子半两(去皮脐) 鳖甲一两半(好醋一升伏时炙令焙干)

【用法】上为末，取三年米醋一大升，先煎四五合，然后和药，为丸如梧桐子大。每服十丸至二十丸，空心服，或酒米饮送下。后取积如鱼肠、脓血烂肉汁、青泥当下。

【主治】瘕积。心腹内结如拳，渐上不止，抢心疼痛，及绕脐腹痛不可忍者。

61233 保安丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十七。

【组成】附子半两(炮，去皮脐) 白附子(炮) 天麻 全蝎(去毒，微炒) 蔓荆子 防风(去芦头) 羌活(去芦头) 川芎 肉桂

（去粗皮） 白僵蚕（炒，去丝嘴） 当归（洗，焙）各一两 麻黄（去根节）一分 乌蛇（酒浸，去骨取肉，焙干）半两 乳香一分（别研）

【用法】上为细末，次入乳香，研匀，炼蜜为丸，每一两作四十丸。每服一丸，煎荆芥汤化下，不拘时候。

【主治】小儿诸风惊痫，潮发搐搦，口眼牵引，项背强直，精神昏困，痰涎壅塞，嗳气喘急，目睛斜视，一切虚风。

61234 保安丸

【方源】《简易方》引《究源方》（见《医方类聚》卷二十）。

【组成】草乌（去皮） 五灵脂各等分

【用法】上为细末，猪心血为丸，如鸡头子大。每服一丸，薄荷、生姜汁浸汤，食后服。

【主治】诸风痫，不问久远。

61235 保安丸

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】川乌（生，去皮尖）二钱半 五灵脂半两

【用法】上为末，猪心血为丸，如梧桐子大。每服一丸，生姜汁泡汤调下。

【主治】诸风痫。

61236 保安丸

《卫生宝鉴》卷十二。为原书同卷“全真丸”之异名。见该条。

61237 保安丸

【方源】《普济方》卷九十三。

【组成】羌活二斤 谷芽一升五合（水中取沉者）

【用法】上为散。每服方寸匕，酒送下，一日三次，稍加之。

【主治】一切瘫痪风。热风瘫痪常发者。

【备考】本方方名，据剂型，当作“保安散”。

61238 保安丸

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】巴豆一枚（去皮心）

【用法】上分作十小丸。每服一丸，开水研服。当快利三五行，即以浆水粥补之。

【主治】小儿干霍乱，不吐不利，烦闷不知所为。

61239 保安丸 《奇效良方》卷六十四。为《普济方》卷三八三“保命丸”之异名。见该条。

61240 保安丸

【方源】《肯堂医论》卷下。

【组成】益母草

【用法】五月五日取，去根晒干为末，炼蜜为丸，如弹子大。怀孕八九月，每晨服一丸，砂仁汤送下。服二三十朝，必无倒产之逆。

【功用】预防难产。

61241 保安丸

【方源】《玉案》卷六。

【组成】人参 麦门冬 黄连 茯神 龙齿 远志各五钱 朱砂一钱五分 金箔二十片。

【用法】上为末，炼蜜为丸，朱砂、金箔为衣。每服一丸，滚汤化下。

【主治】小儿夜啼。

61242 保安丹

【方源】《博济》卷三。

【异名】保安丸（《圣济总录》卷四十四）。

【组成】附子（炮） 当归 陈皮（去白） 干姜（炮）各一两 蜀椒（去子） 厚朴（去皮，以姜汁炙令香熟） 吴茱萸各半两 舶上硫黄一分（另研至细）

【用法】上为细末，硫黄末和匀，以米醋和作剂，分为两团，别用白面半斤裹药令匀，如烧饼法，煨令面熟为度，杵烂为丸，如梧桐子大。每患一切气痛及宿酒食不消，炒生姜盐汤送下二十丸；如患泻痢，米饮送下。

【主治】脾元虚滑及久患泻，服药未效，日夜不止，脐腹冷疼及一切气刺、气痛。

61243 保安汤

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】常山半两 青蒿 知母各一两 桃仁（汤浸，去皮尖双仁，研）半两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，以水一盏，加生姜半分，同煎至六分，去滓，稍热服，不拘

时候。

【主治】山岚瘴疟，寒热久不愈。

61244　**保安汤**

【方源】《洁古家珍》。

【组成】瓜蒌(新者)一个(去皮，火焙)　没药(通明者)一钱(研)　金银花　甘草　生姜各半两

【用法】上为细末。用好无灰酒三升，于银石器内煎至一升，分作三盏，三次饮尽，病微者只一服。

【功用】治疮托里，或已成者速溃。

61245　**保安汤**

【方源】《玉案》卷六。

【组成】黄耆　麦门冬　藿香各一钱二分　当归　白茯苓　川芎各一钱五分　桔梗　半夏　陈皮　白术　甘草　人参各一钱

【用法】加黑枣五枚，食后煎服。

【主治】脑痈已溃，流脓内痛，饮食减少。

61246　**保安散**

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】黄耆(锉)　木通(锉)　青橘皮(汤浸，去白，焙)　桑根白皮(锉)　白术　陈橘皮(汤浸去白，焙)各半两　木香三分　黑牵牛(一两，炒，捣，取末)半两

【用法】上为散。每服二钱匕，浓煎大枣汤调下。

【主治】伤寒过经不解，三焦滞闷，身重疼痛。

61247　**保安散**

《产乳备要》。为《圣惠》卷七十七“当归散”之异名。见该条。

61248　**保安散**

【方源】《产宝诸方》。

【组成】附子一个　地黄　棕榈灰　木香　肉桂各等分

【用法】上为末。每服二钱，羊胫炭烧红浸酒调下。

【主治】妇人妊娠不调，血海久病，带下诸虚。

61249　**保安散**

【方源】《永乐大典》卷九七八引《全婴方》。

【组成】蝎尾一钱半(炒)　蜈蚣一条(炙)　轻粉　麝香　龙脑各一字　川乌尖七个(生)　南星半钱(姜汁浸一夕)　花蛇肉一钱(酒浸，炙)

【用法】上为末。一岁一字，薄荷汤调下。

【主治】小儿急慢惊风，诸痫涎盛，头颈强直如弓。

【备考】本方原名“保安丸”，与剂型不符，据《奇效良方》改。

61250　**保安散**

【方源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】连皮缩砂不拘多少

【用法】上炒黑去皮，为末。每服二钱，温酒一盏调下。若觉腹中热，胎已安矣。

【主治】妊娠因有所伤，胎动疼痛不止，不可忍，及血崩不止。

61251　**保安散**

【方源】《观聚方要补》卷六引《经验良方》。

【组成】甜瓜子一合　蛇蜕皮一尺　当归一两(锉，微炒)

【用法】以水一大盏，煎至七分，去滓，分作二服，食前、食后温服。以利下恶物为效。

【主治】肠痈。

61252　**保安散**

【方源】《普济方》卷六十。

【组成】石胆　硇砂

【用法】上为细末。每用竹筒吹之，或以箸头蘸之。

【主治】喉内结核不消。

61253　**保安散**

【方源】《普济方》卷三五六。

【组成】蝉退不拘多少　真麝香少许

【用法】用蝉退灯上烧存性，研入麝香。每服半钱，临时以淡醋汤调下。

【主治】因漏胎胞干，难产横逆不顺。

61254　**保安散**

【方源】《普济方》卷三九四。

【组成】五倍子一个(生用，湿纸裹煨)

【用法】上为细末。每服一钱，米泔水调下，不拘时候。若禀受怯弱，用汤略烫过。

【主治】小儿胃气虚损，因成吐奶。

61255 **保安煎**

《古方汇精》卷三。为《增补内经拾遗》卷四"无忧散"之异名。见该条。

61256 **保安膏**

【方源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】当归(切，焙) 附子(去皮脐) 芎䓖 防风(去叉) 白蔹 升麻 细辛(去苗叶) 侧柏 萆薢各一两 桃仁(去皮) 甘草 桑根白皮 垂柳枝 白芨 黄耆 白芷 白僵蚕各半两 铅丹(研)五两 雄黄(研) 麝香(研) 硫黄(研)各半两 杏仁(去皮)三分 丹砂(研)一分

【用法】上㕮咀，以麻油二斤，于新瓷器内浸药一宿，次日纳铛中，文武火炼，候稀稠得所，以绵滤去滓，入雄黄、铅丹、丹砂、麝香、硫黄等物再煎，须臾息火，别入黄蜡四两，候药凝稍过，倾入热瓷器内盛之，勿令尘污。发背，酒调两匙，每日两服，外贴，二日一换；瘰疬瘘疮、疽疮、风肿、干癣、奶癣、肾癣、发鬓、发脑、发牙、蛇虫咬，皆贴之；折伤筋骨，酒服半匙；箭入骨，贴之自出；喉闭，含之即通；难产并胎死腹中，并酒化下半两；血气冲心，生姜自然汁加小便同煎，温酒化下一匙；但诸恶疮，数年不瘥者，以盐汤先洗，然后贴之。

【主治】一切疮肿。发背，瘰疬，瘘疮，疽疮，风肿，干癣，奶癣，肾癣，发鬓，发脑，发牙，蛇虫咬，折伤筋骨，箭入骨，喉闭，难产并胎死腹中，血气冲心，及诸恶疮，数年不瘥者。

61257 **保安膏**

【方源】《普济方》卷三七五引《全婴方》。

【组成】蛇头一个(酒浸) 蜈蚣一条(酥炙) 全蝎一钱 草乌一个(去皮尖) 麻黄(去节)一钱 朱砂一钱半 脑子 麝香各一字

【用法】上为末。每服一钱，薄荷汤酒调下。

【主治】小儿急慢惊风，潮作不定，心肺中风。

61258 **保安膏**

【方源】《普济方》卷三一三。

【组成】香油三斤 木香半两 木鳖子二两 当归一两 赤芍药二两 白芍药三两 白芨末十两 乳香半两 没药半两 黄丹八两 柳枝二十五根 桃枝十四根(各长二寸半) 沉香一钱半

【用法】上药各锉碎，除乳、没、黄丹外，用香油三斤浸煎，试白芷黄色为度，去药滓，将油再熬沸，下黄丹，柳枝急搅，滴油水中不散，看老嫩，下乳香、没药，再试，倾入水中出火毒三日用。

【主治】男子、妇人痈疽发背，疔肿瘰疬疮疖，诸般肿毒异证。

61259 **保安膏**

【方源】《理瀹》。

【组成】川乌 草乌 苍术 羌活各四两 钗斛 川芎 当归 白芷 麻黄 防风 细辛 荆芥 首乌 全蝎 天麻 藁本 生甘草 薄荷各一两 雄黄 朱砂 两头尖各五钱

【用法】上为末，葱捣敷。

【功用】开提发汗。

【主治】诸风疼痛及破伤角弓反张，蛇犬金刃伤出血。

61260 **保阴汤**

【方源】《医方简义》卷二。

【组成】南沙参三钱 麦冬(去心)三钱 五味子九粒 桔梗一钱 苏梗一钱五分 黄芩一钱五分 知母 贝母各一钱 橘红八分 桑叶 神曲各二钱

【用法】上加竹叶二十片，生姜一片，水煎服。

【主治】夏月阴虚阳胜，感热邪而致头痛发热，项强口渴，不恶寒，反恶热，脉虚者。

61261 **保阴煎**

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】生地　熟地　芍药各二钱　山药　川续断　黄芩　黄柏各一钱半　生甘草一钱

【用法】上以水二钟，煎七分，食远温服。

【主治】①《景岳全书》：男妇带浊遗淋，色赤带血，脉滑多热，便血不止，及血崩血淋，或经期太早，凡一切阴虚内热动血等证。②《妇科玉尺》：胎气热而不安，及产妇淋沥不止。

【加减】如小水多热或兼怒火动血者，加焦栀子一二钱；如夜热身热，加地骨皮一钱五分；如肺热多汗者，加麦冬、枣仁；如血热甚者，加黄连一钱五分；如血虚血滞，筋骨肿痛者，加当归二三钱；如气滞而痛，去熟地，加陈皮、青皮、丹皮、香附之属；如血脱血滑及便血久不止者，加地榆一二钱，或乌梅一二个，或百药煎一二钱，文蛤亦可；如少年或血气正盛者，不必用熟地、山药；如肢节筋骨疼痛或肿者，加秦艽、丹皮各一二钱。

61262　保阴煎

【方源】《顾松园医镜》卷十一。

【组成】熟地三钱至一两　生地　麦冬各二三钱　天冬二钱　牛膝(酒蒸)二三钱　茯苓二钱　山药(蒸)二三钱　玉竹　鳖甲　龟甲各四五钱(加圆肉十枚)

【主治】①《顾松园医镜》：真阴虚衰，相火炽盛而发热，其热在于午后子前，或但皮寒骨蒸，五心常热，鼻中干燥，唇红颧赤，口苦舌干，耳鸣目眩，腰膝痠软，四肢无力，倦怠嗜卧，大便燥结，小便黄赤，六脉弦数或虚数无力。或病日久，饮食少思，大便溏泄，午后洒淅恶寒，少顷发热，或热至鸡鸣寅卯时分，盗汗身凉等证。②《吴医汇讲》：虚劳。

【加减】骨蒸内热有汗，加骨皮二钱；无汗，加丹皮一钱；腰痛，加枸杞三五钱，杜仲二钱，或猪腰子一枚，脊髓四、五条；盗汗，加枣仁(炒，研细)二钱至八钱，五味子二分至一钱；咳嗽，加鲜百合一二两，款冬花二三钱，枇杷叶三大片；有痰，加贝母二三钱；有血，加藕汁、童便各一杯；食少，加米仁(炒)五钱至一两；肺经无热、肺脉按之无力者，量加人参；便溏，去生地、天冬。

61263　保寿丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】麋茸二两(去毛，酒洗，炙微黄)　钟乳粉二两　补骨脂一两(微炒)　天雄二两(炮裂，去皮脐)　硇砂二两(研细)　腽肭脐一两(酒洗，炙)　菟丝子二两(酒浸三宿，晒干，别杵为末)　阳起石一两(酒煮半日，研细，水飞过)　肉苁蓉一两(酒浸，去皴皮，炙干)　青盐一两　巴戟一两　白马茎二两(涂酥，炙令微黄)　雄雀儿三十枚(去毛足肠肚，研如泥，以酒五升煎如膏)　硫黄一两(研细，水飞过)　桂心一两　雄鸡肝三具(切，焙干)　黄戌茎并肾一对(切，焙干)

【用法】上为末，入雀肉膏为丸，如梧桐子大。每日三十丸，空心及晚食前温酒送下。

【主治】肾脏虚损，阳气全乏。

61264　保寿丸

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】牛黄(研)　丹砂(研)　雄黄(研)　犀角(镑屑)　天麻　蝉壳(去土)　干姜(炮)　白僵蚕(炒)　半夏(汤洗十遍，焙)　乌蛇(酒浸，去皮骨，炙)　天南星(炮)　白附子(炮)　当归(切，焙)　麝香(研)各半两　腻粉一分

【用法】上为细末，用槐胶三两，以长流水浸三日，取捣令烂，入药末为丸，如鸡头子大。常服一丸，茶酒嚼下；小有风疾，用槐、柳、桃枝、葱白各十茎锉细，同盐浆水浓煎送下二丸，浴后更服二丸，盖衣被汗出，立愈；产后中风，或中急风，豆淋酒及梨汁、薄荷汁化下五丸，立效。

【主治】风痱身体不痛，四肢不收，神智不乱，时能言者。

61265　保寿丸

【方源】《普济方》卷一八二。

【组成】杏仁(去皮尖)　萝卜子　麦蘖　神曲各四两

【用法】上为细末，用大蒜捣为丸，如梧桐

子大。每服三四十丸，热水任下。

【功用】消酒化食。

【主治】一切气疾。

61266 **保寿丹**

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】附子（炮，去皮脐） 肉豆蔻（面裹煨）各一两 赤石脂（煅） 白姜（炮，洗） 荜澄茄各半两

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下。

【主治】脏腑虚寒，泻痢不止。

61267 **保寿散**

【方源】《卫生总微》卷五。

【组成】雄黄（研细，水飞） 茯苓（去黑皮） 人参（去芦）各一分 朱砂半两（研飞） 牙消一钱

【用法】上为细末。每用半钱，热水调下，一岁用一字，不拘时候。

【主治】小儿惊痫偏搐。

61268 **保寿散**

【方源】《婴童百问》卷十。

【组成】白茯苓 新罗参 川雄黄 牙消 甘草（炙）各一两 片脑 麝香 牛黄各少许（无亦得）

【用法】上为细末，入锡合内收之。一岁儿半钱，二三岁儿一钱，并薄荷汤调下；金银薄荷汤尤好。

【主治】婴孩惊热、潮热、风热、虚热，头额温壮，白日夜间多啼，伤湿鼻流清涕，喉咽时时有清涕，夜多睡卧不稳，或手足口舌生小热毒疮，或因吃着、喜怒、乳食，胸膈不快，时复吐哯呕乳，忽因人物所惊，日夜间手足心热，痰壅咳嗽，兼患天吊急惊风。

61269 **保寿膏**

【方源】《普济方》卷三七三引《卫生家宝》。

【组成】羌活一分 藿香叶半两 全蝎一分（去毒） 防风一分 天麻一分 川芎二钱 朱砂二钱（别研） 独活二钱 人参二钱

【用法】上为末，入朱砂和匀，炼蜜为丸，如皂角子大。每服一粒，金钱薄荷汤化下。

【功用】镇心截风。

【主治】小儿心神不安，多惊夜啼。

61270 **保志膏** 《鸡鸣录》卷十六。为《疡科选粹》卷七引戚少保方"保赤膏"之异名。见该条。

61271 **保赤丹**

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】甘遂末三钱 朱砂一钱 熟石膏三钱

【用法】上为细末，和透，将开水一碗，用麻油滴在水面，以药末分许滴麻油上，即成丸流下。成人服一粒，开水送下。

【主治】肺风痰喘之症。

61272 **保赤丹**

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】柴胡一两 粉葛一两 槟榔二两 紫朴一两 姜夏三钱 广皮五钱 姜连三钱 杭芍一两 木香三钱 车前一两 薏米三两 桔梗五钱 黄芩三钱 苍术五钱 赤苓三钱 神曲 麦芽 焦楂各五钱 益元散一两半

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，每丸二钱重。每服一丸，生姜水送下。

【功用】清瘟解热，健胃消食。

【主治】小儿四时感冒，头痛发热，伤食伤水，泄泻痢疾，食积痞块，各种疳疾，呕吐腹满，食滞咳嗽，腹痛胀闷，肌肉消瘦。

61273 **保赤膏**

【方源】《疡科选粹》卷七引戚少保方。

【异名】保志膏（《鸡鸣录》卷十六）。

【组成】当归 生地 熟地 刘寄奴 合欢木皮 男子黑发（洗净）各一两 乳香 没药 血竭各五钱 黄蜡 白蜡各八钱 龙骨（煅，童便渍）一钱

【用法】上用麻油四两，煎前六味至发溶尽，滤去滓，复油入锅，下二蜡，不住手搅，离火，仍搅至温，将乳香等四味极细末细细投之，搅匀，候冷收瓷器内。临阵携之，遇有伤者涂之，伤处以帛包裹。

【主治】①《疡科选粹》引臧少保方：金疮。②《鸡鸣录》：杖疮。

【宜忌】不可见风。

61274　**保身丸**

【方源】《全国中药成药处方集》(武汉方)。

【组成】党参三两　牡蛎二两　炙黄耆三两　巴戟天四两　当归三两　龙骨二两　甘草一两　杜仲　补骨脂各二两　续断三两　菟丝子四两　川芎　益智仁各二两　枸杞子四两　酸枣仁三两　淮牛膝　杭白芍各二两　远志四两　白术三两　广陈皮一两　云茯苓三两

【用法】小丸：取上药干燥，为细末，明净粉量加炼蜜50～52%，迭成小丸，每钱不得少于二十五粒。大丸：加炼蜜115～125%，和成大丸，每丸重二钱。每服二钱，白开水送下。

【主治】精神疲倦，腰痠肢软，虚烦盗汗，心悸不宁。

61275　**保身丹**

【方源】《扶寿精方》引《医林集要》。

【组成】白槟榔　车前子　大麻子(略炒)一两(砖微磨去壳，另研)　郁李仁(汤泡去皮)　菟丝子(酒浸二宿，蒸，捣，晒，去皮，再酒蒸)　牛膝(酒浸二宿)　山茱萸(酒洗取肉)　山药各二两　大黄(酒拌，蒸黑色)五两　枳壳　独活各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日早、晚服二十丸，米汤、茶、酒任下。药后如泄，以羊肚、肺煮羹补之。

【功用】搜风顺气。

【主治】三十六种风，七十二般气，上热下冷，腰膝酸疼，手足倦怠，喜睡恶食，颜枯肌馁，赤黄疮毒，气块下注，肠风痔漏，语颤言謇，左瘫右痪，憎寒毛竦，久疟吐泻，洞痢，男子阳痿，女人无嗣，七癥八瘕。

【加减】风盛，加防风二两；气盛，加广木香五钱。

【备考】方中白槟榔、车前子用量原缺。

61276　**保身散**

【方源】《洞天奥旨》卷十引巫彭真君传方。

【组成】轻粉一钱　黄柏五钱　乳香一钱　水粉三分　孩儿茶三钱　百草霜一钱　冰片三分

【用法】上药各为末。猪胆汁调搽。

【主治】杨梅疳疮。

61277　**保肝丸**　《增补内经拾遗》卷四引《汤氏方》。为《小儿药证直诀》卷下“**抱龙丸**”之异名。见该条。

61278　**保肝散**

【方源】《回春》卷五。

【组成】当归　川芎　枸杞　苍术(米泔制)　白术(去芦)　密蒙花　羌活　天麻　薄荷　柴胡　藁本　石膏　木贼　连翘　细辛　桔梗　防风　荆芥各一钱　栀子　白芷各五分　甘草一钱

【用法】上锉一剂。水煎，先食干饭后服药。

【主治】肝病目生内障者。

61279　**保应丸**

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】天南星不拘多少(用石灰炒令焦黄色)

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温酒送下。

【主治】肠风泻血，诸药不效者。

61280　**保灵丹**

【方源】《刘涓子治痈疽神仙遗论》。

【异名】丹砂丸(《医级》卷八)。

【组成】朱砂(研)一两　麝香(研)二钱　巴豆(去皮，出油，研)二分　斑蝥(去头足，炒半生半熟)一分　雄黄一分　蜈蚣(一生、一炙)二条　黄药子(研)一钱　山豆根(杵末)一两　续随子(去皮，生用，研末)一钱

【用法】上药各入乳钵内，研末，于五月五日五时，九月九日配合妙。糯米稀糊为丸，如鸡头子大。有入中毒，觉胁气满，攻心腹胀痛，更令患人先嚼黑豆闻香，不腥者，即是中毒，便以好茶送下一丸，不得嚼。斯须间，患人觉

心头如拽断皮条声相似，毒物便下，或自口鼻或自大便中出。毒物嫩，只为血，老牙禁，即打一齿下药。若蛇蝎并马汗一切毒，但以好醋磨涂伤处，立解。

【功用】解虫毒及一切毒。

【宜忌】忌酒、肉毒食一月。

61281 保灵丹

《普济方》卷二二四。为原书同卷引《德生堂方》"还童丹"之异名。见该条。

61282 保坤丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归四两　白芍三两　白术(炒)二两　茯苓四两　橘皮二两　党参(去芦)二两　丹皮二两　川芎二两　肉桂(去粗皮)二两　玄胡(炙)二两　香附(炙)四两　黄耆一两　熟地二两　藁本五钱　白芷五钱　木香一两　砂仁一两　甘草一两　艾炭一两　知母一两　黄柏二两

【用法】上为细末，用冷开水泛为小丸，以滑石十两、朱砂五钱为衣，闯亮，每粒重五厘，每付四十粒，每袋装四付。每日早、晚各服一付，温开水送下。

【功用】调经养血，舒郁化滞。

【主治】妇女血寒白带，月经不调，经期腹痛，气郁心跳。

61283 保坤丹

【方源】《集成良方三百种》卷上。

【组成】当归四两　川芎一两　熟地半斤　赤芍四两　桃仁二两　红花二两　香附一斤　茯苓四两　丹皮四两　吴萸一两　陈皮四两　甘草四两　酒芩二两　坤草四两　玄胡索二两　鹿角霜二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重三钱。开水送服。

【功用】常服此药，月经按期，生子肥健。

【主治】妇女经水不调，赶前错后，百病丛生，难以孕育。

61284 保坤丹

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】益母草一斤　当归一斤　川芎䓖八两　香附八两

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，每丸二钱重，朱砂为衣。每服一丸，黄酒送下。

【功用】养血调经，化瘀定痛。

【主治】经血不调，癥瘕疼痛，产后血迷，胎衣不下。

61285 保和丸

【方源】《圣济总录》卷一七一。

【组成】丹砂(研)一钱　蝎梢二七个　雄黄(研)二钱　芦荟(研)　熊胆(研)各半钱　蛇蜕(烧灰)一钱　瓜蒂二七枚　蟾酥一皂子大(汤浸)　腻粉(研)　龙脑(研)　麝香(研)　牛黄(研)各半钱

【用法】上为末，用浸蟾酥并面糊为丸，如黍米大。每服用倒流水先化一丸，滴鼻内，良久嚏讫，即用薄荷水送下一丸。

【主治】小儿惊痫，身热，手足瘈疭，目睛上视，状如中风。

61286 保和丸

【方源】《医统》卷八十九引《直指小儿》。

【组成】白术五两　茯苓　半夏(制)　山楂　神曲(炒)各三两　陈皮　连翘　萝卜子各二两　苍术(制)　枳实(炒)　香附子(制)　厚朴(制)　黄芩(酒炒)　黄连(酒炒)各一两

【用法】上为细末，生姜汁打面糊为丸，如黍米大。每服五十丸，渐加至七八十丸，食后茶汤送下。

【功用】消食导滞，健脾和胃。

①《医统》引《直指小儿》：益脾胃。②《古今医鉴》：消痰利气，扶脾胃，进饮食。③《全国中药成药处方集》(北京方)：助消化，利胸膈，健胃肠，止泄泻。

【主治】小儿食滞，脾胃不和，嗳气吞酸，呕吐泄泻，胸膈痞闷。

①《医统》引《直指小儿》：小儿食伤发热，欲成痞证。②《古今医鉴》：一切饮食所伤，胸膈满闷不安，或腹中有食不化，或积聚痞块。③《全国中药成药处方集》(北京方)：嗳气吞酸，

呕吐泄泻，胸膈痞满，不思饮食。

【宜忌】《全国中药成药处方集》(北京方)：忌饮酒及食肉面。

61287　**保和丸**

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】山楂六两　神曲二两　半夏　茯苓各三两　陈皮　连翘　莱菔子各一两

【用法】上为末，炊饼为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，食远白汤送下。

【功用】《中国药典》：消食导滞和胃。

【主治】食积停滞，胸膈痞满，腹胀腹痛，嗳腐吞酸，厌食呕恶，或腹中有食积癖块，或大便泄痢。

①《丹溪心法》：一切食积。②《医学正传》引丹溪方：一切饮食所伤，胸腹饱闷不安，或腹中有食积癖块。③《保婴撮要》：饮食停滞腹痛，或恶寒发热。④《赤水玄珠》：食积痢，腹痛不知饿。⑤《准绳·幼科》：饮食停滞，胸膈痞满，嗳气吞酸或吐泻腹痛。⑥《景岳全书》：饮食酒积停滞，胸膈痞满腹胀。⑦《医方集解》：食疟。⑧《金鉴》：乳食过饱蓄胃中，乳片不化吐频频，身热而黄腹膨胀；滞热丹毒。

【方论选录】①《医方考》：伤于饮食，故令恶食。诸方以厉药攻之，是伤而复伤也。是方药味平良，补剂之例也，故曰保和。山楂甘而酸，酸胜甘，故能去肥甘之积；神曲甘而腐，腐胜焦，故能化炮炙之腻；卜子辛而苦，苦下气，故能化面物之滞；陈皮辛而香，香胜腐，故能消陈腐之气；连翘辛而苦，苦泻火，故能去积滞之热；半夏辛而燥，燥胜湿，故能消水谷之气；茯苓甘而淡，淡能渗，故能利湿伤之滞。②《医方集解》：此足太阴阳明药也。山楂酸温收缩之性，能消油腻腥膻之食；神曲辛温蒸署之物，能消酒食陈腐之积；菔子辛甘下气而制面；麦芽咸温消谷而软坚；伤食必兼乎湿，茯苓补脾而渗湿；积久必郁为热，连翘散结而清热；半夏能温能燥，和胃而健脾；陈皮能降能升，调中而理气。此内伤而气未病者，但当消导，不须补益。③《成方便读》：山楂酸温性紧，善消腥膻油腻之积，行瘀破滞，为克化之药，故以为君；神曲系蒸署而成，其辛温之性，能消酒食陈腐之积；莱菔子辛甘下气，而化面积，麦芽咸温消谷，而行瘀积，二味以之为辅；然痞坚之处，必有伏阳，故以连翘之苦寒散结而清热；积郁之凝，必多痰滞，故以二陈化痰而行气。此方虽纯用消导，毕竟是平和之剂，故特谓之保和耳。

【备考】《医学正传》引丹溪方有麦蘖面。《准绳·类方》引丹溪方有麦芽、黄连。

61288　**保和丸**

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】糖球四两　陈皮　茯苓　半夏曲各半两　萝卜子二钱五分　白术　使君子肉　神曲　麦蘖各一两　木香二两二钱四分　砂仁四两四钱　黄连四两五分

【用法】上为细末，水发为丸，如萝卜子大。每服一钱，米饮汤送下，不拘时候。

【主治】小儿脾胃虚弱，饮食不能克化，日久羸瘦。

61289　**保和丸**

【方源】《直指小儿附遗》卷四。

【组成】白术(泔浸，土炒)　苍术(泔浸，炒)　厚朴(姜汁制)　陈皮(去白)各二两　甘草(炙)五钱　莪术(醋炒)一两　三棱(醋炒)　香附(炒)各二两　砂仁(炒)五钱　益智(炒)六钱　萝卜子(炒)一两　山药八钱　人参(去芦)五钱　肉果(去油)四十个　白豆蔻四钱　槟榔三个　木香五钱　神曲(炒)一两　麦芽(炒取粉)　山楂二两　茯苓(去皮)一两　使君子肉一两　干荸荠一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，米饮化下；吐多，生姜汤化下。

【主治】小儿乳食所伤，吐泻积滞，肚腹疼痛。

【备考】方中麦芽用量原缺。

61290　**保和丸**

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】陈皮五钱 枳壳(炒)三钱 黄连(姜汁炒)五钱 神曲 山楂肉 麦蘖各三钱 莱菔子(炒)三钱 槟榔三钱

【用法】上为末,水糊为丸,如麻子大。白汤送下。

【主治】小儿湿热食积所致痢疾。

61291 保和丸

【方源】《墨宝斋集验方》。

【组成】白术一斤(蒸) 陈皮八两(洗) 厚朴八两(姜汁炒) 山楂肉六两(饭上蒸) 苍术半斤(炒) 甘草(炙)六两 谷芽半斤(炒) 莱菔子四两(炒)

【用法】上为末,老粳米煮汤为丸,如绿豆大。每服一钱或二钱,以白汤送下。

【功用】调理脾胃。

61292 保和丸

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】山楂肉六钱 苍术(米泔浸) 白术各三钱 半夏(姜制) 黄芩(土炒) 白茯苓各三钱 橘红三钱 萝卜子二钱 黄连(土炒,去土) 神曲各四钱 吴茱萸一钱 连翘一钱

【用法】上为末,生姜自然汁煮宿,蒸饼糊为丸,如梧桐子大。每服六十丸,食远橘皮汤送下。

【主治】吞酸嘈杂。

61293 保和丸

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】陈皮 半夏(姜汁炒) 白茯苓(去皮) 连翘 神曲 山楂肉 萝卜子(炒)各三钱 黄连(姜炒)二钱

【用法】上为末,稀米糊为丸,胭脂为衣,如粟米大。每服六七十丸,人参煎汤,入竹沥同下。

【主治】实热翻胃。

61294 保和丸

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】莱菔子 楂肉 神曲 麦芽 陈皮 甘草

【主治】食积痢。

61295 保和丸

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】山楂 麦芽 莱菔子 熟半夏 连翘 香附 枳壳

【主治】食滞中焦,生冷抑遏,致发狂症。

【加减】热甚,加栀、连;湿郁痞满,合平胃散、石菖蒲。

61296 保和丸

【方源】《一盘珠》卷三。

【组成】苍术 陈皮 白术 茯苓 半夏 砂仁 香附 神曲 白芍 厚朴 甘草各等分

【用法】灯心为引。

【主治】食积泄泻,泄时腹痛,泄后痛减。

【备考】本方方名,据剂型,当作"保和汤"。

61297 保和丸

【方源】《幼幼集成》卷六。

【组成】人参(切,焙) 漂白术各三钱 白云苓一钱五分 炙甘草 山楂肉 老麦芽 六神曲各一钱

【用法】上为细末,米糊为极小丸。每服一二钱,米饮送下。

【主治】痘后一向能食,今不思食,闻食气即呕。

61298 保和丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷十四。

【组成】楂肉 姜半夏 黄连 陈皮各五钱 神曲三钱 麦芽二钱

【用法】将神曲打糊为丸。每服五十至七十丸,白汤送下。

【主治】食积、酒积。

61299 保和丸

《笔花医镜》卷二。即《医学心悟》卷三"保和汤"改为丸剂。见该条。

61300 保和丸

《血证论》卷七。即《修月鲁般经》引《劳证十药神书》(见《医方类聚》卷一五〇)"保和汤"

改为丸剂。见该条。

61301　**保和丸**

《陈氏幼科秘诀》。为原书同卷"大黑丸"之异名。见该条。

61302　**保和汤**

【方源】《修月鲁般经》引《劳证十药神书》(见《医方类聚》卷一五〇)。

【异名】保肺汤(《杏苑》卷五)、保真汤(《证治宝鉴》卷六)。

【组成】知母　贝母　天门冬　麦门冬　款花各三钱　天花粉　薏仁　五味子各二钱　粉草　兜铃　紫菀　百合　桔梗各一钱　阿胶　当归　地黄各一分半　紫苏　薄荷各半分

【用法】上各味依常法修制成粗末。每服用水二大盏,加生姜三片,共煎一盏,去滓,却用饴糖一匙,入药汁内服之。每日食后各进三盏。

【功用】①《医学入门》:止嗽宁肺。②《血证论》:润肺清火。

【主治】①《修月鲁般经》引《劳证十药神书》(见《医方类聚》):劳证久嗽,肺燥成痿者。②《便览》:咳血、呕血、吐血。

【加减】血盛,加用蒲黄、茜根、藕节、大蓟、小蓟、茅根;痰盛,加用南星、半夏、橘红、茯苓、枳壳、枳实;热盛,加用大黄、山栀、黄连、黄柏、黄芩、连翘;风盛,加用防风、荆芥、旋复、甘菊、细辛、香附子;寒盛,加用人参、芍药、桂皮、麻黄、五味、腊片;喘盛,加用桑白皮、陈皮、大腹皮、苏子、卜子、葶苈子。

【方论选录】《血证论》:方用饴、胶、地、归、百合、百部、甘草、紫菀、花粉、款冬,大生津液以润肺;五味、天冬、知母以清肺火;犹恐外寒闭之,则火郁而不清,故佐以姜、苏、薄荷以疏解其郁;痰饮滞之,则火阻而不降,故用贝母、苡仁以导利其滞。郁解滞行,火清肺润,咳嗽愈而痿燥除。

【备考】本方改为丸剂,名"保和丸"(见《血证论》)。《十药神书》(陈修园注本)有杏仁、百部,无麦门冬。

61303　**保和汤**

【方源】《医统》卷七十六。

【组成】厚朴(姜制)　大腹皮(黑豆水洗)　半夏(制)　陈皮(去白)各八分　柴胡　枳壳　甘草各五分　生姜三钱(煨)

【用法】水煎,温服。

【主治】中瘴气,发热呕吐,腹满不食。

61304　**保和汤**

【方源】《杏苑》卷四。

【组成】橘皮(去白)　茯苓各一钱五分　半夏一钱二分　南星一钱　山栀仁(炒)　白术一钱　黄芩(炒)一钱　甘草五分　生姜五片

【用法】上㕮咀。以水二钟,煎一钟,食前服。

【主治】嘈杂或食后腐作酸臭,心中烦杂者。

【加减】如热甚,加青黛五分。

【备考】方中山栀仁用量原缺。

61305　**保和汤**

【方源】《简明医彀》卷四。

【组成】知母　贝母　天冬　麦冬　冬花蕊各二钱　天花粉　苡仁　五味子　当归　生地　桔梗各一钱　甘草五分

【用法】上加生姜一片,水煎,化入阿胶一钱,饴糖数匙服。

【主治】嗽痰肺痿诸证。

【加减】嗽甚,加紫菀、百合;润肺,加瓜蒌仁、杏仁;火盛,加黄芩、黄连、薄荷、栀子、竹茹;失血,加蒲黄(炒黑)、茜根、藕节、小蓟;喘,加真苏子、桑皮、橘红、沉香。

61306　**保和汤**

【方源】《证治宝鉴》卷六。

【组成】生地　人参　茯苓　熟地　五味子　当归　白芍　知母　黄柏　地骨皮　黄耆　赤芍　赤苓　炙草　陈皮　柴胡　萸肉　天冬　麦冬

【用法】加生姜、大枣,水煎服。

【功用】止嗽宁肺。

【主治】虚劳咳嗽。

61307 **保和汤**

【方源】《蕙崖尊生》卷九。

【组成】苍术 厚朴 白术 山楂 神曲 麦芽 半夏 茯苓 陈皮 甘草

【主治】停食积火，腹痛而泻，泻后痛减。

61308 **保和汤**

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】知母（蒸）五分 贝母二钱 天冬（去心）三钱 麦冬（去心）一钱 苡仁五钱 北五味十粒 甘草 桔梗 马兜铃 百合 阿胶（蛤粉炒成珠）各八分 薄荷二分

【用法】水煎，加饴糖一匙，温服。

【功用】《血证论》：清火降痰。

【主治】①《医方简义》：肺痿久咳不已，时吐白沫如米粥者。②《血证论》：肺津不足，痰凝火郁，肺痿咳嗽。

【加减】虚者，加人参。

【方论选录】《血证论》：肺经之津足，则痰火不生，而气冲和。若津不足，则痰凝火郁，痿咳交作，而气失其和矣。方用饴糖、甘草、阿胶，补胃以滋肺津；复加清火、祛痰、敛浮、解郁之品，凡以保护肺金，使不失其和而已。

【备考】方中天冬用量原缺，据《血证论》补。

61309 **保和汤**

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】麦芽 山楂 卜子 厚朴 香附各一钱 甘草 连翘各五分 陈皮一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】伤食心痛。

【备考】本方改为丸剂，名“保和丸”（见《笔花医镜》）。

61310 **保和汤**

【方源】《医方简义》卷二。

【组成】神曲三钱 茯神三钱 北沙参三钱 白芍一钱 广皮一钱 山楂炭三钱 藿香一钱半

【用法】上加荷叶一角，水煎服。

【功用】霍乱愈后调养脾胃。

61311 **保和汤**

【方源】《镐京直指》。

【组成】制川朴一钱（炒） 炒莱菔子四钱（包） 炙枳壳三钱 姜半夏二钱 炒神曲三钱 赤苓三钱 山楂肉三钱 陈皮一钱五分

【功用】调中消食。

【主治】痢由食积，脾胃不运，饱闷嗳腐。

61312 **保和散**

【方源】《伤寒大白》卷三。

【组成】楂肉 麦芽 莱菔子 半夏 连翘 香附 枳壳

【主治】痰食胸满，呃逆。

【宜忌】若尚有表邪，仍兼表散。

61313 **保命丸**

【方源】《圣惠》卷八十五。

【异名】保命丹。

【组成】牛黄一分（研细） 干蝎一分（微炒） 白僵蚕一分（微炒） 蝉壳一分（微炒） 天麻一分 白附子一分（炮裂） 蟾酥半分（研入） 犀角屑一分 天南星一分（炮裂） 青黛一分（研细） 朱砂一分（研细） 麝香一分（研细） 天浆子一分（麸炒令黄，去壳）

【用法】上为末，用豮猪胆汁为丸，如绿豆大。每服三丸，用薄荷汤送下，不拘时候。又以水化二丸滴入鼻中，令连连嚏后再服。

【主治】小儿慢惊风及天钓惊热，心胸痰壅，攻咽喉作呀声，发歇多惊，不得眠卧。

61314 **保命丸**

【方源】《圣济总录》卷七十二。

【组成】当归（切，炒） 乌头（炮裂，去皮脐） 芍药 桂（去粗皮） 干姜（炮）各半两 大黄（锉，炒）一两 斑蝥二十一枚（用糯米炒令黄色为度，去翅足）

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服一丸，空心、食前温酒送下。

【主治】积年血气癥块，往来疼痛，吐逆不纳饮食。

61315 **保命丸**

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】蛤蚧一枚(如丈夫患,用雄者腰上一截;女人患,用雌者腰下一截。酥炙)　皂荚(不蚛者,酥炙,去皮子)两挺　款冬花　杏仁(去皮尖,童便浸一复时,控干,蜜炒)　木香　天麻　干地黄(熟者如黑饧,研,焙)　半夏(汤洗二七遍去滑,焙)　五味子各一分　丁香半分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸,加至二十丸,食后生姜汤送下。

【主治】①《圣济总录》:虚劳咳嗽,日久不愈。②《普济方》:自汗,口中无味。

61316 **保命丸**

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【组成】熟干地黄(焙)　肉苁蓉(酒浸,切,焙)　桂(去粗皮)　丁香　附子(炮裂,去皮脐)　菟丝子(酒浸,别捣)　人参各一两　白豆蔻(去皮)　木香　槟榔(锉)　甘草(炙)各半两　鹿茸(去毛,酒浸一宿,酥炙)　白茯苓(去黑皮)　蒺藜子(炒去角)各三分

【用法】上将十三味为末,再加菟丝子末,炼白蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸,空心、食前温酒送下。渐加丸数。

【主治】耳内虚鸣。

61317 **保命丸**

《普济方》卷三七二。为原书同卷"保命丹"之异名。见该条。

61318 **保命丸**

《普济方》卷三七四。即《幼幼新书》卷十引《谭氏殊圣》"辰砂膏"。见该条。

61319 **保命丸**

【方源】《普济方》卷三八三。

【异名】保安丸(《奇效良方》卷六十四)。

【组成】香附一两(净)　白姜(炮)　青皮　陈皮(去白)各一两　砂仁一两　三棱(炮)半两　莪术半两　甘草(炙)半两

【用法】上为末,面糊为丸,如绿豆大。每服十二丸　食前淡生姜汤送下。

【主治】小儿瀼泻、伤食泻。

【备考】方中三棱用量原缺,据《奇效良方》补。

61320 **保命丸**

《婴童百问》卷三。为《卫生总微》卷六"神授至圣保命丹"之异名。见该条。

61321 **保命丸**

《医学入门》卷七。为《医统》卷三十二"保命丹"之异名。见该条。

61322 **保命丸**

【方源】《诚书》卷八。

【组成】犀角　琥珀　甘草(炙)　人参各二钱　天麻(煨)　茯神各三钱　全蝎(制)十二个　僵蚕　朱砂　防风各一钱　麝一字

【用法】上为末,白米饭为丸。麦冬汤送下。

【功用】安神定魄,止啼镇惊。

61323 **保命丸**

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】苦参十斤　草胡麻　当归　防风　芜荑　白蒺藜各五斤　大风肉　薄荷叶　土木鳖　荆芥各二斤　胡连　银柴胡各十二两

【用法】上为末,以水为丸。每日服四次,约二合,细茶送下。轻者不过七八升,重者一斗五升,再重者二三斗痊愈。

【主治】大麻风。

【加减】如身发多疮,或生湿毒,通身如蛇皮,或破流血水者,是脾经受毒,加白术十两;如手足破伤,麻木遍身,发紫块、白癜癞,满身肉痛,此胃经受毒,加厚朴十两;如眉发脱落,遍身发疮癣,满头面上蝇虫痕,此肺家受毒,加黄芩十两;如面起紫泡,身如紫云朵,四肢先见者,乃肝属木面有此疮也,春二三月、秋九十月各发一次,此肝经受毒,加山栀、连翘各一斤;如脚底先穿,眼泪如珠流者,遍身骨节刺痛,又发血癣如桃花朵者,此心经受毒,加黄连、山栀各一斤;如遍身起紫块,手足拳挛,口眼歪斜,此肾经受毒,加破故纸十两;如五脏受病,则藏于内,不发于外,多生冷疾,手足如瘫痪软状

者，加苍术、黄柏各八两，甘草四两；五脏受风者，加川续断、何首乌、威灵仙各半斤；遍身浮肿，加乳香（去油）、没药（去油）各四两；骨节疼痛，加虎骨三斤；如六腑受病，如紫云块，似核桃风，多由内热，两鼻出血，筋脉弛长，四肢无力，行步艰难，加威灵仙、川续断各八两，何首乌一斤。春则地气融和，万物发生，加连翘二斤；夏则火旺烦躁，加黄连二斤，薄荷一斤，；秋则雾露乍寒乍热，加白术一斤，苍术二斤；冬则严寒地冻，加乌药二斤。

61324 **保命丹**

【方源】《直指附遗》卷三引《千金》。

【组成】朱砂一两 珍珠二钱 南星一两 麻黄(去根节) 白附子(炮) 雄黄 龙脑各半两 琥珀三钱 僵蚕(炒) 犀角(镑) 麦门冬(去心) 枳壳 地骨皮 神曲 茯神 远志(去心) 人参 柴胡各一两 金箔一薄片 牛黄三钱 天麻半两 脑子少许 麝香少许 胆矾半两 牙消四钱 毫车 天竺黄 防风 甘草 桔梗 白术 升麻各一两 蝉退半两 黄芩二两 荆芥二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，薄荷汤化下，不拘时候。更加川乌(炮，去皮脐)、姜制半夏、白芷、川芎各一两，猪牙皂一两，和前药丸服，尤妙。

【主治】诸风瘈疭，不能语言，心忪健忘，恍惚去来，头目晕眩，胸中烦郁，痰涎壅塞，抑气攻心，精神昏愦；心气不足，神志不定，惊恐怕怖，悲忧惨蹙，虚烦少睡，喜怒不时，或发狂癫，神情昏乱；及小儿惊痫，惊风抽搐不定；及大人暗风，并羊癫、猪癫发叫。

【宜忌】忌猪、羊、虾、核桃动风引痰之物，及猪羊血。

61325 **保命丹**

《圣惠》卷八十五。为原书同卷“保命丸”之异名。见该条。

61326 **保命丹**

【方源】《袖珍》卷一引《圣惠》。

【异名】朱砂丸。

【组成】辰砂 麝香(另研) 川乌头(去皮尖) 大半夏(生)各一两 凤凰台三钱 雄黄五钱

【用法】上为末和匀，熟枣肉为丸，如梧桐子大。每服一丸或两丸，冷水送下。以吐为度。

【主治】破伤风，目瞪口噤不语，手足搐搦，项筋强急，不能转侧，发则不识人。

61327 **保命丹**

【方源】《鸡峰》卷二十七。

【组成】滑石 缩砂 青黛 山栀子 白茯苓 草龙胆 寒水石 甘草 管仲 黄芩 干葛 大豆(以上生用)各一两 益智 地黄(生干者) 大黄 山豆根 桔梗 紫河车 马勃 薄荷 黄药子 花粉 百药煎 兰根(上生用)各半两

【用法】上药各拣择令洁净，为末，用生蜜为丸，如鸡头子大，青黛为衣。每服一丸，细嚼，新水送下。

【功用】化解诸毒。

【主治】一切诸毒，并瘴疫、久年暑积、咽喉不利之患。

61328 **保命丹**

【方源】《续本事》卷十。

【组成】虎睛一对(将瓦上安之，以瓦盖定，慢火逼干) 箭头朱砂半两 蜈蚣二条(去头尾、赤脚者) 麝半钱 全蝎半钱 天麻一分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如鸡头子大。瓦罐贮之，又入脑、麝窨定。每服三丸，急惊风，薄荷蜜汤化下；慢惊风，薄荷汤化下。

【主治】小儿急慢惊风，四肢逆冷，眼张口噤，流涎不止。

61329 **保命丹**

【方源】《永乐大典》卷九七八引《全婴方》。

【组成】牛黄 辰砂各二钱 麝香半钱 脑子 乳香 五灵脂 铁粉 代赭石各一钱 全蝎一钱半 蜈蚣一条 附子(炮) 僵蚕(炒)蛇含石(煅，醋淬三次)各半两

【用法】上为末，白面糊为丸，如鸡头子大。

三岁儿一丸，薄荷汤磨下。病退常服，永除根。

【主治】小儿急慢惊风，潮作不定，涎盛气急，精神不爽。

61330　**保命丹**

《百一》卷三。为《洪氏集验方》卷一引张真甫方"一粒金丹"之异名。见该条。

61331　**保命丹**

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】人参五两　麻子仁二两(炒，去皮)　干地黄　瓜蒌子(炒)　菟丝子(酒浸)各二两　生地黄　干大枣各三两　大豆黄卷一升(煮去沫)　黑附子二两(一两生用，一两炮去皮心用之)　白茯苓　茯神　地骨皮(去粗皮)　蔓荆子(煮熟用)　杏仁(去皮尖用)　麦门冬(炒，去心用)　地肤子(蒸七遍)　黍米(作粉)　粳米(作粉)　白糯米(作粉)　天门冬(去心)　车前子(蒸)　侧柏叶(煮三遍)各二两五钱

【用法】上为细末。各拣选精粹者，腊月内合者妙，他时不可合，日月交蚀不可合。如合时，须拣好日，净室焚香，志心修合。又将药末用蜡一斤半，滤去滓，白蜜一斤，共二斤半，一处溶开，和匀，微加酥油，为丸如梧桐子大。每服十丸，服至五日。如来日服药，隔宿先吃糯米一顿，粳米、白面皆可，次日空心用糯米粥饮送下。如路行人服，遇好食吃不妨，要止便止。如吃些小蒸饼，嚼烂咽。或吃干果子以助药力，不吃更妙。日后退下药来，于长流水中洗净再服。可百年不饥矣。

【功用】辟谷绝食。

【宜忌】忌盐、醋。

61332　**保命丹**

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】全蝎(焙)　蝉壳　直僵蚕(微炒)　天麻　犀角　天浆子(有子者)　白附子　南星(炮)　青黛　朱砂　川姜黄各等分　麝少许

【用法】上为末，雄猪胆汁为丸，如绿豆大。先将井水调开一丸，入鼻令嚏；次以钩藤煎汤调服。

【主治】①《直指小儿》：天钓。②《普济方》：惊风。

61333　**保命丹**

《御药院方》卷七。为原书同卷"贺兰先生解毒丸"之异名。见该条。

61334　**保命丹**

【方源】《活幼口议》卷十四。

【组成】白茯苓　朱砂(研)　白附子(炮)　牛黄(如无，以制者加用之)　天南星(炮)各一钱　全蝎(炒)半两　天麻(炒)一钱半　甘草(炙)一钱　硼砂一钱　脑子　麝各半字

【用法】上为末，和匀，薄面糊为丸，如鸡头子大。每服一丸，金银薄荷汤化下。

【功用】却惊安神，化痰定搐。

【主治】婴孩小儿急惊风候转慢惊者。

61335　**保命丹**

【方源】《普济方》卷三七二。

【异名】保命丸。

【组成】牛黄　朱砂(颗块上茅者)　羌活　木香各一分　麝香四铢　巴豆(和皮醋炙十沸，去皮，不出油使)三个　附子(火炮去皮)半个　蝎梢五十个(生薄荷四个碎切同炒，令炒干，去薄荷不用)

【用法】上先将蝎梢、附子、羌活三味为末，再将众药于乳钵内研如飞尘，以蒸饼为丸，如绿豆大。浓煎薄荷汤送下一丸。盖衣被得汗，便效。

【主治】小儿天钓，心胸痰壅，攻咽喉作呀声，发歇多惊，不得眠卧。

61336　**保命丹**

《扶寿精方》。为原书"延龄聚宝丹"之异名。见该条。

61337　**保命丹**

【方源】《解围元薮》卷三。

【组成】苦参皮　荆芥穗　羌活　蒺藜　胡麻　明天麻　风藤　元参　独活　连翘　白芷　厚朴　紫萍　牛膝各四两　苍术　乌药　藁本　麻黄　甘草　红花　苍耳子　川

芎 升麻 薄荷 半夏 牛蒡子 木瓜 僵蚕 桔梗 大黄 蒲黄 巴戟 防风 萆薢 蝉壳 牙皂 全蝎 续断 蔓荆子各三两 石斛二两 甘松 猴姜 菖蒲 草乌 贝母 木香 檀香 沉香 银柴胡 柏子仁 朱砂 乳香 没药 远志 元明粉 血竭 雄黄各一两 麝香一钱半 牛黄一钱 秋石一两五钱 黄芽二两

【用法】上为末,用甘草膏和陈米糊为丸,如梧桐子大。每服八十丸,酒送下,每日三次。

【主治】诸般风证。

【加减】手足挛痛,加葳蕤半斤,香蛇一条;阳痿,加仙灵脾六两;身浮肿,加白花蛇一条,紫萍八两;黑斑,加广陵香、地骨皮、血见愁各四两;眼赤烂,加珠粉、知母、胡黄连各四两;破音,加木通十二两,诃子六两。

61338 **保命丹**

【方源】《医统》卷三十二。

【异名】保命丸(《医学入门》卷七)。

【组成】肉苁蓉三两 皂矾一斤 红枣一斤(煮熟去核) 大麦芽(炒)一斤半 香附子一斤

【用法】先将苁蓉、皂矾二味入罐煅烟尽,和余药为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食后好酒送下,一日三次。

【主治】①《医统》:诸蛊。②《医学入门》:蜘蛛蛊胀。

61339 **保命丹**

【方源】《医学入门》卷六。

【组成】全蝎十四个 防风 南星 蝉退 僵蚕 天麻 琥珀各二钱 白附子 辰砂各一钱 麝香五分(一方加羌活)

【用法】上为末,粳米饭为丸,如皂子大,金箔十片为衣。初生儿半丸,乳汁化下;十岁以上儿二丸,钩藤、灯心煎汤或薄荷、金银煎汤化下;如天钓,加犀角、天浆子,雄猪胆汁为丸,井水调化一丸,入鼻内令嚏,次以钩藤煎汤调服。

【功用】安神化痰。

【主治】初生儿脐风撮口,夜啼,胎惊,内钓,肚腹坚硬,目窜上视,手足搐掣,角弓反张,痰涎壅盛,一切急惊及慢惊尚有阳症者。

【加减】有热,加牛黄、片脑。

61340 **保命丹**

《本草纲目》卷八。即《普济方》卷三七二“归命丹”。见该条。

61341 **保命丹**

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】天麻 郁金 全蝎(去尾)各五钱 防风 甘草各三钱 青黛三钱 白附子(炒) 僵蚕(姜汁炒) 薄荷各五钱 大半夏(炒,滚汤浸,晒干;又用姜汁浸,晒干,又炒) 南星(制同上)各一两 辰砂(飞)五钱(为衣) 麝香五分 钓藤 牛黄各二钱 蝉退 茯神 桔梗各五钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如芡实大。每服一丸,灯心汤送下。

【主治】小儿惊风发热。

【备考】方中甘草、薄荷、牛黄后原均脱“各”字,据《准绳·幼科》补。

61342 **保命丹**

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】朱砂 郁金 天麻各一钱 防风 粉草 僵蚕(炒去丝) 白附子 青黛 薄荷 南星(制同下) 半夏(用生姜汁浸二日,锉碎)各二钱 麝香少许 全蝎(去尾尖)一钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如皂角子大。每服一丸,灯心、薄荷汤送下。

【主治】惊风发热痰嗽。

61343 **保命丹**

【方源】《简明医彀》卷三。

【组成】吴茱萸(拣净)一斤(分四份煮,酒、米醋、盐水、童便各浸一宿,晒,焙干) 泽泻二两

【用法】上为末,酒煮薄面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心盐汤送下。

【主治】远年近日,小肠疝气,偏坠脐下,搐痛,以致闷乱。或阴间痒痞。

61344　保命丹

【方源】《玉案》卷六。

【组成】大蝉二只(剖开)　砂仁　胡黄连各五钱(装入缝好,外以泥裹,煅红取出)　皂角二枚(煅灰存性)　蛤粉三钱　麝香三分　使君子肉一两

【用法】上为末,以神曲打糊为丸,如粟米大。每服一钱,生姜汤送下。

【主治】诸般痞积。

61345　保命丹

【方源】《良朋汇集》卷六。

【组成】大个无油南星二两(煨)　硼砂六钱(净)　白僵蚕二两(姜汁浸炒)　茯神(去皮)六钱　蝉退(去头足翅,净)一两　白矾一两(火枯)　天龙四条(酒煮,即蜈蚣也)　麝香一钱　全蝎(去尾毒,净用)三两(糯米炒黄为度,去米)　远志(去骨,净肉)一两(用甘草一节同煮过,去甘草)　猪牙皂角二两(打碎,煎浓汁)　大粒朱砂五钱(另研,为衣)

【用法】上先将南星煨,以皂角汁淬十数次,余皂角汁留煮米糊;以前药俱为末,为丸如龙眼大,以朱砂为衣,阴干。每用一丸,以薄荷、灯心、金银环子同煎,汤浸磨化,临时以火上顿温与服。

【主治】小儿急慢惊风,痰涎壅盛,牙关紧急,角弓反张,睡中惊跳,哭泣叫喊,偏搐斜目,面青脸赤,两眼直视,手足搐搦,天钓客忤,摇头上窜,一切风痰。

61346　保命丹

【方源】《伤科补要》卷四。

【组成】巴霜一钱(去油)　黑丑一钱　大黄一钱　血竭五分　朱砂一钱　麝香二分

【用法】上为末,酒浆为丸,如绿豆大,金箔为衣。壮人服五分,虚人三分,小儿二分,俱陈酒送下。

【主治】跌打损伤。

61347　保命丹

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】川乌　草乌各二两二钱半(均用泔水浸去皮)　大黄一两　五灵脂一两　肉桂　木香　细辛　香附　延胡　三棱　莪术　柴胡　青皮　枳实　桃仁　红花　苏木　大茴　小茴　归尾　甘草　蜂房　蒲黄(生)　鹰骨　土鳖　广黄　三七各五钱　川椒二两　广皮一两　乌药七钱半　蚺蛇胆五分　血管鹅毛灰五钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如龙眼大,朱砂为衣。若病重与壮者服一丸,病轻与老弱者服半丸,陈酒和童便化下。

【功用】接骨入臼。

【主治】跌打损伤。

61348　保命丹

《良方汇录》卷下。为《兰台轨范》卷八"保命散"之异名。见该条。

61349　保命丹

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】白头地龙二十四条(童便制)　石蟹三只(酒制)　土狗十二个(葱汁制)　水蛭六条(醋制)　地鳖虫三百六十个(姜汁制)　乳香　没药　血竭各一两　天雷石(醋制七次)一两(须预制去火毒)

【用法】上为末,米糊为丸,如弹子大。每服一丸,胡桃、红花煎酒磨化送下。

【功用】定痛散血。

【主治】筋骨损伤,无分经络。

61350　保命丹

《治疗汇要》卷下。为《咽喉脉证通论》"保命丹锭子"之异名。见该条。

61351　保命散

【方源】《幼幼新书》卷五引《医方妙选》。

【异名】朱矾散(《片玉心书》卷五)。

【组成】朱砂(研细,水飞,令干)　白矾(烧灰)各一分　马牙消半两(研细)

【用法】上为细末。每服一字,取白鹅粪,以水搅取汁,调涂舌上、颔颊内。未用药时,先以手指缠乱发,揩拭舌上垢,然后使药敷之。

【功用】《医宗金鉴》:清热泻脾。

【主治】婴儿初生七日间生胎毒者，其舌上有白屑如米，连舌下有膜如石榴子大，令儿语不发，如鹅口状，名曰鹅口疮。

61352 **保命散**

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】猬皮 樗白皮各一两 槐子 黄牛角胎各半两 黑牵莽子十个

【用法】上为细末。每药末一两，加黑附（炮裂，去皮脐）半两，乳香少许。每服二钱，空心、食前煎皂角汤和酒调下。

【主治】痔瘘下血，日久不止。

61353 **保命散**

《诚书》卷八。即原书同卷“驱风膏”去真珠、铁粉、麝香，加胆星。见该条。

61354 **保命散**

【方源】《不居集》上集卷十四。

【组成】白术二钱 贝母一钱五分 桔梗 青皮 栀子 甘草各七分 当归一钱二分 白芍八分 丹皮 黄芩各一钱 桃仁七分

【用法】水煎，温服。

【主治】咯痰带血。

61355 **保命散**

【方源】《兰台轨范》卷八。

【异名】保命丹（《良方汇录》卷下）。

【组成】珍珠 牛黄各三分 琥珀五分 胆星 白附子 蝉退（炙） 天虫 茯苓 皂角 防风 茯神各二钱 天竺黄（研） 橘红 甘草 薄荷 朱砂各一钱 天麻三钱 全蝎二十个（酒洗，焙） 礞石三钱（煅） 冰片 麝香各三分

【用法】上为末，和匀。每服一二分。或用神曲糊丸，如麻子大。每服一二十丸，以钩藤一钱，薄荷三分，泡汤送下。

【主治】一切急惊、慢惊，痰涎涌塞，手足抽搐，目直神昏，夜啼昼倦，吐乳泻白，种种恶症。

61356 **保命膏**

【方源】《幼幼新书》卷二十七引张涣方。

【组成】山大戟 丁香 大黄（炮） 不灰木（烧红放冷） 甘遂各一分（以上先为细末） 朱砂 水磨雄黄（并研细，水飞）各半两 粉霜 水银（用锡结砂子）各一钱 巴豆（去皮心膜，不去油，研细）十个

【用法】上为末，用黄蜡四两，于银石器中溶搅成膏，旋旋取为丸，如黍米大。每服未周岁儿一粒，二三岁儿两粒，四五岁儿三粒，六七岁儿五粒，十岁以上七粒，新汲水送下。

【主治】小儿吐逆不定，服热药过多不能愈者。

61357 **保金丸**

【方源】《古今医鉴》卷十三引宗杏川方。

【组成】南星 半夏 白矾（生） 牙皂 巴豆（去壳，另研） 杏仁（去皮尖，另研）各等分

【用法】上为末，合一处，再研令匀，枣肉为丸，如梧桐子大。每用三丸，针挑灯上烧存性，研烂，清茶调下。

【主治】小儿痰嗽。

61358 **保金丸**

【方源】《医钞类编》卷七。

【组成】阿胶 生地 甘草 麦冬 贝母 白及 青黛 百合

【用法】炼蜜为丸服。

【主治】肺为虚火所逼，咳血，一点一丝。

61359 **保金丸**

【方源】《中药成方配本》（苏州方）。

【组成】麻黄八两 制半夏四两 川贝母四两 白术四两 茯苓四两

【用法】麻黄用梨、甘蔗、韭菜、荸荠、藕、莱菔等六种原料各一斤，生姜半斤，每种分次打汁，将麻黄拌透晒干，蒸煮三小时，晒干；将蒸煮锅中汁水仍拌入麻黄中，晒干；再配入诸药，共为细末；用白蜜十两，炼熟化水为丸，如绿豆大。每次一钱，开水吞服，一日二次。或绢包煎服三钱至五钱。

【功用】肃肺定喘。

【主治】痰饮咳嗽，气逆哮喘。

61360 **保金汤**

【方源】《不居集》上集卷十。

【组成】人参　玉竹　百合

【用法】猪肺清汤煎服。

【主治】痰嗽喘急虚劳之人,不宜用麦冬、五味子者。

【加减】咳嗽者,加枇杷叶、款冬花;食少泄泻者,加苡仁、扁豆;虚汗者,加桑叶、浮麦;见血者,加丹参、紫菀;便血者,加地榆、扁豆、白芍。

【方论选录】宏格曰:肺为娇脏,而朝百脉,一身元气所主者也。今虚劳日久,喘嗽痰多,火盛刑金,而有不利于麦冬、五味者。故以玉竹之清润,能清权衡治节之司;以人参之补阴,能益后天营卫之本;以百合之酸温,能收先天癸水之源。加以猪肺载诸药入肺,而不走他脏。三气通而三才立,则水升而火降,而痰嗽气喘自定矣。

61361　**保肤膏**

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】大蜂房一个　血余一丸　香油半斤

【用法】上药入香油内,炸枯去滓,加黄蜡二两溶化,离火待温,加大黄末二两,朝脑末一两,二味研匀,和入任用。

【主治】汤泡火烧及臁疮、秃疮。

61362　**保肤膏**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】煅石膏 31 克　白及粉 15 克　密佗僧 3 克　轻粉 3 克　枯白矾 6 克

【用法】上为细末。有脓水淋漓者,可用药粉干撒创面;慢性湿疹,可加红粉 0.6 克,研细加入,临用时以香油或凡士林调成 50%软膏外用。

【主治】慢性湿疹。

【宜忌】忌用温水或肥皂水洗涤,不宜大面积应用。

61363　**保肺丸**

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】白僵蚕(去丝嘴,炒)二两　山药半两　白茯苓(去皮)一两　紫苏叶一两　藿香(去土)一两　百部半两　黄芩一两　防风(去芦)一两　杏仁(去皮尖,麸炒)一两　百合半两　五味子(去枝梗)一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如鸡头子大。每服半丸至一丸,煎桔梗汤化下,食后临卧服。

【主治】小儿肺胃风热,痰盛咳嗽喘吐,连声不止,及久嗽不愈。

61364　**保肺丸**

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】木香五钱(麸皮汁浸三日)　当归二两　川芎二两　益母草三两　枳壳一两　冬葵子一两　广皮一两　甘草五钱

【用法】日服三钱。

【主治】妊娠口厌肥甘,忧乐不常,饮食不节,饱则即卧,贪闲久坐,血多饮溢,气壅痰生,胞胎肥厚,或偏或侧,任其横仰,腹皮宽胀,行动艰难者。

61365　**保肺丸**

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】知母(去毛)一两　黄芩一两　天门冬一两　五味子五分　紫菀七钱　贝母一两　真苏子(炒)二两　白茯苓一两　杏仁(炒,去皮尖)七分　桑白皮一两　生地黄五分　阿胶(炒)五分　人参三分　款冬花五分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服四十丸,白汤送下。

【主治】虚损劳嗽,咳血潮热。

61366　**保肺丸**

【方源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【组成】人参三钱　苏叶五两　前胡　广陈皮　枳壳　茯苓　桔梗各二两四钱　广木香三钱　葛根　半夏　甘草各二两四钱　紫菀　麻黄各三两　薄荷二两　薄荷霜三分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每丸重三钱。大人每服一丸,小儿减半,感冒咳嗽,生姜汤送下;久咳,梨汤送下。

【主治】四时感冒,伤寒发热,咳嗽日久,痰

盛气促。

61367 **保肺丹**

《寿世保元》卷六。为《回春》卷五“焊肺丹”之异名。见该条。

61368 **保肺汤**

【方源】《保婴撮要》卷六。

【组成】山药 白茯苓 紫苏叶各一钱 白僵蚕（去丝嘴，炒）二钱 藿香五分 百部六分 黄芩 防风 杏仁（去皮尖，麸炒）各一钱 百合五分 五味子一钱 桔梗一钱

【用法】上水煎，食后服。

【主治】肺胃受风热，痰盛咳嗽，喘吐不止，及治久嗽不愈。

61369 **保肺汤**

《杏苑》卷五。为《修月鲁般经》引《劳证十药神书》（见《医方类聚》卷一五〇）“保和汤”之异名。见该条。

61370 **保肺汤**

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】白及 薏苡仁 贝母 金银花 陈皮 苦桔梗 苦葶苈 甘草节

【主治】肺痈吐脓血。

【加减】初起，加防风；溃后，加生黄耆、人参。

61371 **保肺汤**

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】金银花一两 元参八钱 人参三钱 蒲公英一钱 天花粉一钱 黄芩五分 麦门冬一钱 生甘草一钱 桔梗一钱

【用法】分二次服。

【功用】去热解毒，佐以升散。

【主治】肺痈已溃或未溃。

61372 **保肺饮**

【方源】《简明医彀》卷四。

【组成】人参 麦冬 薏苡仁 百部 黄耆 桑皮 五味子 当归 芍药（酒炒） 片黄芩 百合各等分

【用法】上加生姜，煎服。

【主治】肺痿咳嗽，胸中隐痛，辟辟燥咳。

61373 **保肺饮**

【方源】《玉案》卷四。

【组成】知母 天门冬 五味子 川贝母 杏仁各一钱 天花粉 麦门冬 紫菀茸 款冬花 百合 桔梗 苏子 阿胶各八分

【用法】水煎，温服。

【主治】久患咳嗽，肺金衰弱，上气喘急，口干喉哑，痰中带血丝，或咳出鲜血，或痰如灰色，肺将成痿者。

61374 **保肺饮**

【方源】《玉案》卷四。

【组成】白茯苓 人参 金沸草 麦门冬（去心）各一钱 辽五味二十一粒 阿胶（蛤粉炒） 紫菀各二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】肺气不足，因嗽久而作喘者。

61375 **保荣汤**

【方源】《玉案》卷五。

【组成】当归 山栀（炒黑） 地榆 牡蛎各一钱 侧柏叶 川芎 赤芍 生地各一钱二分

【用法】用灯心三十茎，水煎，空心服。

【主治】妇女月经每次数日不能止，或隔几日复见微红。

61376 **保胎丸**

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】人参一两五钱 白术四两 黄芩二两 杜仲一两五钱（盐酒炒，另研） 当归二两 续断一两五钱（酒浸） 熟地黄一两（酒浸蒸） 陈皮一两 香附子一两（童便浸）

【用法】上药各为细末，糯米饭为丸，如绿豆大。每服七十丸，空心白汤送下。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：补气养血安胎。

【主治】①《摄生众妙方》：屡经堕胎，久而不育者。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：习惯性流产，虚弱贫血，生殖机能减退，腰膝无力，小腹疼痛，寒凝气滞，心烦头晕，四肢倦怠，面黄肌瘦，食欲不振。

【备考】妊娠过七个月后，不必再服。《胎产护生篇》有山药，无人参。

61377 **保胎丸**

【方源】《简明医彀》卷七。

【组成】香附子(四制) 当归身 条芩(无热减半) 白术 熟地各四两 川芎 白芍药 艾叶(醋煮) 阿胶(酒蒸) 川续断 益母草 陈皮 砂仁各一两(有热减半)

【用法】上为末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服二钱，米汤送下。

【主治】三月胎堕，气血不足，冲脉损伤。

【宜忌】宜戒怒少劳，节饮食。

61378 **保胎丸**

【方源】《摄生秘剖》卷三。

【组成】人参五钱 白术(去炒) 白茯苓各一两 甘草七钱(炙) 当归身(酒洗)一两 川芎(微炒)八钱 白芍药一两(炒) 怀地黄二两(酒煮成膏) 艾叶一两(蒸，焙) 香附(四制) 陈皮各一两 砂仁五钱 条黄芩(酒炒) 炒阿胶各一两 益母膏四两 红枣肉四两 川蜜八两

【用法】上为末，红枣肉、益母膏炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心白滚汤送下。

【主治】妇人怀孕，气血虚弱，不能荣养，面青呕吐，精神倦怠，四肢无力，或寒热往来，头晕眼花，胸膈不宽，不思饮食，恐动其胎。

61379 **保胎丸**

《仙拈集》卷三。为《回春》卷六“千金保胎丸”之异名。见该条。

61380 **保胎丸**

【方源】《达生编》卷下。

【组成】淮山药四两(炒) 杜仲三两(盐水炒) 续断二两(酒炒)

【用法】上为末，糯米糊为丸。每服三钱，米汤送下。

【主治】胎欲堕落，惯小产者。

61381 **保胎丸**

《纲目拾遗》卷三引《良方集要》。为《冯氏锦囊·杂症》卷十七“保胎神效丸”之异名。见该条。

61382 **保胎丸**

【方源】《产科心法》卷上。

【组成】杜仲八两(用糯米粥汤拌蒸，晒干，炒) 山药六两(炒，另磨，留粉二两，打糊法丸) 川断四两(盐水炒) 当归二两(酒炒)

【用法】用山药粉打糊为丸，亦可用枣肉打为丸。开水送下，不拘时候。

【功用】防止小产，使产后多乳。

【备考】有孕即合服之，服过七个月可止。

61383 **保胎丸**

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】杜仲八两 熟地 山药各六两 续断(盐炒)四两 当归(酒炒)二两

【主治】妊娠腰痛。

61384 **保胎丸**

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】杜仲一斤(切片，盐水浸七日，其水每日一换，铜锅缓火炒断丝，研细末) 黑枣一斤(以陈黄酒二斤煮极化，去皮核)

【用法】上为丸，如梧桐子大。每服三钱，清晨淡盐汤送下。如向在三月内小产者，服至六七月可止；如在五七月小产者，服至八九月可止。

【功用】保胎。

【主治】小产。

61385 **保胎丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】熟地二两五钱 砂仁二两五钱 生黄耆四两 白术(炒)四两 白芍四两 当归四两 艾炭四两 菟丝子四两 桑寄生三两 川芎三两 枳壳(炒)三两 厚朴(炙)一两 川贝母二两 芥穗一两 羌活五钱 甘草五钱 黄芩二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重二钱。每服二丸，每日二次，温开水送下。

【功用】补气养血，保产安胎。

【主治】妊娠气虚，腰痠腹痛，胎动不安，屡经小产。

61386 **保胎丸**

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】当归 生白芍 川贝各五两 枳壳(麸炒) 白术(麸炒) 生地 川芎各四两 荆芥穗 生黄耆 甘草各三两 艾炭 砂仁各二两五钱 菟丝子四两 羌活一两五钱 黄芩三两 厚朴(姜制)二两五钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每丸二钱重,每斤药丸用朱砂面三钱为衣,蜡皮或蜡纸筒封固。每次服一丸,白开水送下。

【功用】助气养血,安胎和胃。

【主治】孕妇气血两亏,屡经小产,胎动不安,腰痠腹痛,四肢痠懒,心跳气短,咳嗽头昏,呕吐恶心,不思饮食。

61387 **保胎丸**

【方源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【组成】茯苓 熟地 黄耆 艾炭 白术 白芍 当归 菟丝子各四两 桑寄生 川芎 枳壳各二两 川贝母 厚朴 荆芥穗 人参各一两 羌活 甘草各五钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每丸重二钱,蜡皮封固。每服一丸,白开水送下。

【主治】妊娠腰痠腹痛,胎动不安。

61388 **保胎方**

【方源】《医钞类编》卷十九引聂氏方。

【异名】保胎散(《验方新编》卷十)。

【组成】归身 川芎 茯苓 玉竹 续断 杜仲(炒) 黄芩(酒炒) 白术(土炒) 甘草

【用法】水煎服。

【功用】清热安胎。

【主治】孕妇出痘腰痛。

61389 **保胎饮**

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】当归 川芎 芍药 熟地 半夏 茯苓 甘草 白术 黄耆 阿胶 艾叶 地榆各七分

【用法】加生姜,水煎服。

【主治】妊娠胎动不安,腹肠疼痛,或时下血,及恶阻一切等症。

61390 **保胎散**

【方源】《平易方》卷三。

【组成】熟地八钱 山药五钱 杜仲(盐水炒) 白芍(酒炒) 黄耆(酒炙)各三钱 白术(土炒) 补骨脂(酒炒) 川断各二钱

【用法】清水煎服。

【主治】孕妇伤胎动气,下血,或常易小产者,服之可保足月分娩。

61391 **保胎散**

【方源】《平易方》卷三。

【组成】头二蚕茧黄不拘多少

【用法】以阴阳瓦煅,不可过性,为细末。每服三钱,桂元汤送下。

【功用】妊娠每饮一服,可防堕胎之患。

61392 **保胎散**

《验方新编》卷十。为《医钞类编》卷十九引聂氏方“保胎方”之异名。见该条。

61393 **保胎膏**

【方源】《全国中药成药处方集》(青岛方)。

【组成】当归十两 生地八两 白术 川断各六两 条芩十两 白芍五两 木香一两 苁蓉 黄耆各五两 益母草十两 甘草三两 龙骨十两 香油十五两

【用法】上合一处,熬膏服。

【功用】保胎。

61394 **保急丹**

【方源】《良方集腋》卷上。

【组成】真西黄一钱 冰片一钱 北细辛二钱 当门麝香一钱 闹阳花三钱 蟾酥二钱 灯心灰一两 牙皂二钱

【用法】上为极细末,瓷瓶收贮。吹鼻取嚏。

【主治】暑痧、臭毒,肚腹急痛,气闭神昏。

61395 **保活丸**

【方源】《痘疹仁端录》卷三。

【组成】猪苓 泽泻 白术 茯苓 山楂 香附 陈皮 青皮 益智 草果仁 小茴香 神曲各五钱 桂皮 木香 藿香 甘松各四钱

【用法】上以蜜一两,生姜汁一钟,炼熟为

丸，如龙眼大。每服一丸，如吐多，生姜汤送下；泻多，米饮送下；腹痛，陈皮汤送下。

【功用】温中益气。

【主治】呕吐泄泻，腹痛。

61396　**保神丸**

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】白茯苓二两　黄连二两　菖蒲一两　远志一两　朱砂半两(为衣)

【用法】上为细末，水浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，渐加至八十丸，临卧煎人参汤送下。

【功用】调和心肾，补养精神。

61397　**保神丸**

【方源】《一盘珠》卷二。

【组成】胡椒二钱半　木香二钱半　全蝎七只　巴豆霜二分半

【用法】上为末，汤浸蒸饼为丸，朱砂为衣。

【主治】胁下胀痛，大便不通。

61398　**保神丹**

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】金箔二百片　腻粉半两

【用法】上以新小铛子中，先布金箔一重，掺腻粉；又铺金箔、腻粉，如此重重铺了。用牛乳可铛子多少浸之，以慢火煎至乳尽，金箔如泥即成。便以火上逼干，研之。更入朱砂半两，麝香一分，同研令细，以水浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服三丸，空心以新汲水送下。

【功用】镇心安神。

【主治】惊邪狂妄，夜多魇梦，精神恍惚，小儿惊啼，心脏壅热。

61399　**保神丹**

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】白术半斤(去皮)　鹿茸四两(酥炙)　柏子仁四两

【用法】上为细末，用菖蒲末四两，酒蒸作薄膏，加白面四两，熬成膏子，和如硬剂，加熟蜜六钱为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温酒送下。

【功用】壮气养精，调和心肾。

61400　**保真丸**

《元和纪用经》。为原书同卷"十精丸"之异名。见该条。

61401　**保真丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十四引《庄氏家传》。

【组成】大蝙蝠一个(罐子内盛，火煅存性，候冷研细)　麝香少许

【用法】上用粳米饭为丸，如黍米大。每服三丸，熟水送下。

【功用】杀疳令肥。

【主治】小儿疳积。

61402　**保真丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】肉苁蓉(酒浸一宿，切，焙)　菟丝子(酒浸一宿，焙)　茴香　川楝子肉(炒)　威灵仙(去土净，锉)　菖蒲(九节者，锉)　五味子　破故纸(炒香)　葫芦巴(炒)　苍术(米泔浸一日，焙干)　白龙骨(生)　独活　木香各二两　牛膝(酒浸一宿，焙)　覆盆子(拣净者)　天仙子(炒香)　杜仲(去粗皮，切细，微炒去丝)　熟干地黄(洗，焙)　白姜(炮)　枸杞子　川椒(炒去汗)　草薢　赤石脂　巴戟(去心秤)　青盐(研，和药)　麝香(别研)各一两

【用法】上为细末，将别研者再同研匀，用好酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心、食前温酒或盐汤送下。

【功用】补虚羸，接真气，充实骨髓，益寿延年。

61403　**保真丸**

【方源】《普济方》卷二二六引《卫生家宝方》。

【组成】肉苁蓉(酒浸一宿)　舶上茴香(炒香)　川牛膝(酒浸)　白蒺藜(炒，捣去尖)　葫芦巴(炒香)　补骨脂(炒香)　黄耆(盐水浸)　附子(炮，去皮脐)　杜仲(去粗皮，炒断丝)　菟丝子(酒浸二宿，蒸熟，研细)　白茯苓　山茱萸　薯蓣(炒)　桂心(去粗皮)　川

楝子（肉） 南木香（湿纸裹煨）各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前盐、酒任下。

【功用】壮阳补肾，益精髓。

【主治】真气虚惫，下焦伤竭，脐腹强急，腰脚疼痛，精神困倦，面色枯槁，小肠疝气，夜梦遗精，小便滑数。

61404 保真丸

【方源】《解围元薮》卷三。

【组成】人参 川芎 草乌 川乌 白芷 当归 槐角 羌活 五加皮 独活 紫背浮萍 防风 荆芥 首乌 枳壳 连翘 风藤 乌药 杜仲 桔梗 肉桂 干姜 僵蚕 石楠藤 甘草 芍药 升麻 虎骨 花蛇 防己各一两五钱 乳香 没药 沉香各五钱 麻黄二十斤（去节）

【用法】上为末，麻黄煎膏为丸，每丸重五钱。酒磨服一丸。

【主治】麻风，半肢软瘫，麻痿疼疼，不能动止者。

【宜忌】宜避风为妙。

61405 保真丸

【方源】《墨宝斋集验方》。

【组成】牛膝十两（用黑豆三升铺锅内，九蒸九晒九露，黑豆一蒸一易，如数完，竹刀切片听用） 生地黄十二两（酒洗，用一半拌去皮砂仁、白茯苓末各五钱，蒸一昼夜，熟透捶用） 补骨脂四两（用核桃肉二两，研碎拌匀，按实，瓷器内一日炒干用） 何首乌二十两（忌铁器，同牛膝蒸之） 白茯苓六两（用牛乳二碗浸透晒干） 白茯神六两（人乳二碗浸透晒干） 当归六两（酒洗） 天门冬六两（去心） 菟丝子三两（酒浸，去壳） 麦门冬六两（去心） 柏子仁八两（汤泡七次，去油） 枸杞子六两（去蒂） 人参三两（去芦） 山药四两 杜仲四两（炒去丝）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸。

【功用】补心神，固肾精，坚筋骨，润肌肤，泽容颜，乌须发，久服益寿延年。

【加减】阳气弱而精不固者，加山萸肉四两，锁阳四两，肉苁蓉四两；如健忘者，加九节菖蒲三两，远志三两；如思虑忧伤过度，损心太甚而不能寐者，加炒熟枣仁三两。

61406 保真丸

【方源】《女科指掌》卷二。

【组成】鹿角胶八两 鹿角霜（拌炒成珠） 白茯苓（人乳拌蒸） 山萸肉各三两 北五味一两 熟地黄 川杜仲（盐水拌炒） 怀山药各三两 益智仁 远志肉（甘草汤泡） 川楝子（酒煮取肉） 巴戟肉（酒炒）各一两 沉香五钱（另为末） 补骨脂一两 胡芦巴（二味同羊肾煮，晒干）

【用法】上以肉苁蓉四两（酒洗去皮垢，切开心，有黄膜去之），酒煮烂捣，入药末，加炼蜜为丸。每服七十丸，酒送下。

【功用】男子精亏不育。

【加减】精薄者，加鳔胶六两。

【备考】方中胡芦巴用量原缺。

61407 保真丸

【方源】《纲目拾遗》卷七。

【组成】玫瑰花（取净末）一斤（去蒂摘瓣，以竹纸糊袋装之，薄摊晒干，不宜见火） 补骨脂一斤（淘净泥土，用蓍、术、苓、甘各五钱，煎汁一碗，拌晒，以汁尽晒燥，炒） 炒菟丝子一斤（用芎、归、芍、生地各五钱，煎汁去滓，以汁煮菟丝子，俟吐丝为度，晒干，炒） 胡桃仁六两（连皮捣如泥） 杜仲四两（盐水炒去丝） 韭子四两（淘净，微火炒） （一方加鱼鳔四两，或加鹿角胶、枸杞子）

【用法】上药各为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四钱，早晨空心白汤送下。

【功用】通经络，和百脉，壮腰肾，健脾胃，加饮食，健步履，固真元，除一切痼疾。

【宜忌】忌羊肉、芸苔并诸血。

61408 保真丸

【方源】《女科秘旨》卷八。

【组成】黄耆 川芎 地骨皮各六分 人

参　白术　当归　天冬　麦冬　白芍　枸杞　知母　生地各二钱　茯苓　黄柏(炒)各八分　甘草五分　五味十粒

【用法】此丸方。加大枣三个，煎服。

【主治】产后骨蒸。

61409 **保真丸**

【方源】年氏《集验良方》卷二。

【组成】鹿胶八两(炒成珠)　杜仲三两　山药三两(炒)　白茯苓二两　五味子一两　菟丝饼一两五钱(酒煮)　熟地二两　萸肉一两五钱　鹿茄茸一具(酥炙)　川牛膝一两　益智仁一两　远志肉一两(甘草水泡)　小茴一两(盐水炒)　川楝子一两(去心核)　巴戟肉一两(去油)　故纸一两　胡芦巴一两　柏子仁一两　山甲片三钱　沉香三钱　人参二两

【用法】上为细末，用肉苁蓉肉四两(洗净鳞甲白膜)、好酒二两煮成膏，同炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，温酒送下。

【主治】虚损。

61410 **保真丸**

【方源】年氏《集验良方》卷二。

【组成】补骨脂一两(酒炒，研细末)　人参一两三钱　茯苓一两　土炒白术一两五钱　炙甘草三钱(上四味以河水六碗，煎浓汁，去滓，和骨脂晒干听用)　杜仲一斤(用盐水炒断丝，为细末)　川芎八钱　当归一两五钱　酒炒白芍一两　熟地二两(上四味以水八碗，煎浓汁三碗，去滓，拌杜仲晒干)　玫瑰膏子一斤(捣烂如泥。若干花瓣只用半斤，磨末听用)　连腻皮核桃肉一斤(盐水炒，捣如泥)

【用法】上用炼蜜二斤为丸，如梧桐子大。每服一两，清晨淡盐汤送下；如吐血、骨蒸，童便送下。

【主治】气血两虚，五劳七伤，遗精白浊，脾胃虚弱，阳痿腰痛，眼花头眩，吐血骨蒸，翻胃久嗽，盗汗，月经不调。

【备考】如长服，不用人参，以玉竹一两(蜜炒)、黄耆一两(蜜炒)代之。

61411 **保真汤**

【方源】《局方》卷二(宝庆新增方)。

【组成】藁本(去芦)　川芎各四两　甘草(炒)二两　苍术(洗，锉，面炒)十六两

【用法】上为粗末。每服三钱，以水一盏半，加生姜三片，同煎至七分，去滓热服，不拘时候。

【主治】四时伤寒，不问阴阳二证。

61412 **保真汤**

【方源】《修月鲁般经》引《劳证十药神书》(见《医方类聚》卷一五〇)。

【组成】当归　人参　生地黄　熟地黄　白术　黄耆各三钱　赤茯苓　白茯苓各一钱半　天门冬　麦门冬各二钱　赤芍药　白芍药　知母　黄柏　五味子　柴胡　地骨皮各二钱　甘草　陈皮　厚朴各一钱半

【用法】上为粗末。每服以水二盏，加生姜三片，大枣五枚，莲心五枚，同煎至一盏，去滓，食前服，一日三次，与保和汤间服。

【功用】《医学入门》：补虚除热。

【主治】①《修月鲁般经》引《劳证十药神书》(见《医方类聚》)：劳证骨蒸体虚。②《东医宝鉴》：虚劳骨蒸，潮热盗汗。

【加减】惊悸，加用茯神、远志、柏子仁、酸枣仁；淋浊，加用萆薢、乌药、猪苓、泽泻；便涩，加用苦杖、木通、石苇、扁蓄；遗精，加用龙骨、牡蛎、莲须、莲心；燥热，加用滑石、石膏、青蒿、鳖甲；盗汗，加用牡蛎、浮麦、黄耆、麻黄根。

【备考】方中甘草、陈皮、厚朴原无用量，据《十药神书》(陈修园注本)补。

61413 **保真汤**

【方源】《准绳·类方》卷一。

【组成】当归　生地黄　熟地黄　黄耆(蜜水炙)　人参　白术　甘草　白茯苓各五分　天门冬(去心)　麦门冬(去心)　白芍药　黄柏(盐水炒)　知母　五味子　软柴胡　地骨皮　陈皮各一钱　莲心五分

【用法】上以水二钟，加生姜三片，大枣一

枚,煎八分,食远服。

【主治】①《准绳·类方》:劳证体虚骨蒸。②《红炉点雪》:诸虚百损,五劳七伤,骨蒸潮热,咳嗽,诸汗、诸血。

【方论选录】《法律》:按此方十八味,十全大补方中已用其九,独不用肉桂耳。然增益地黄,代川芎之上窜,尤为合宜。余用黄柏、知母、五味子滋益肾水,二冬、地骨皮清补其肺,柴胡入肝清热,陈皮助脾行滞,其意中实不欲大补也。

61414 **保真汤**

【方源】《玉案》卷四。

【组成】生地 熟地 黄耆 人参 地骨皮 白术各六分 柴胡 黄柏 橘红各五分 五味子十五粒 甘草二分 天门冬 知母 麦门冬 贝母 白茯苓各八分

【用法】水煎,食远服。

【主治】微微干嗽,骨蒸盗汗,四肢壮热,饮食少进,气虚血亏损者。

61415 **保真汤**

《证治宝鉴》卷六。为《修月鲁般经》引《劳证十药神书》(见《医方类聚》卷一五〇)"保和汤"之异名。见该条。

61416 **保真汤**

【方源】《产后编》卷下。

【组成】黄耆六分 人参二钱 白术二钱(炒) 炙草四分 川芎六分 当归二钱 天冬一钱 麦冬二钱 白芍二钱 枸杞二钱 黄连六分(炒) 黄柏六分(炒) 知母二钱 生地二钱 五味十粒 地骨皮六分

【用法】上加大枣三枚(去核),水煎服。

【主治】产后骨蒸。

61417 **保真汤**

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】川芎一钱 当归 生地 白芍各二钱 麦冬一钱 天冬一钱五分 川贝 茯苓各五分 桔梗八分 五味十粒 骨皮一钱 炙甘草四分

【用法】上加大枣二枚,水煎服。

【功用】清热止咳,润肺泻火,滋补真阴,以复其元。

【主治】产后热蒸成痨症。此由嗜欲无节,起居不时,以致真阴耗竭,虚火上炎,或蒸而热,或往来寒热,似疟非疟,或咳血咯血,自汗盗汗,或心神恍惚,梦与鬼交,或经水闭塞,身渐羸瘦。

【加减】虚,加人参一钱,黄耆六分;胃弱,加茯苓、山药各二钱,砂仁二三粒。

【宜忌】患此者,必须寡欲内养,方能有效。

61418 **保真汤**

【方源】《医醇賸义》卷三。

【组成】人参三钱 附子二钱 干河车四钱 当归三钱 五味子一钱五分 菟丝子八钱 大枣三枚 生姜三片

【用法】先服攻下之剂承气汤,俟滞气将动,后服本方。

【功用】保纳元气。

【主治】结胸失下,以致胸中大实,元气大亏。

61419 **保真饮**

【方源】《解围元薮》卷四。

【组成】精羊肉四两 蝉壳四两 麻黄(春秋用)一两五钱(夏用一两,冬用二两)

【用法】先把羊肉煮烂,取汁六七碗,入蝉壳、麻黄,再煮存四碗,旋服完,吃羊肉。取汗昏沉,一日醒后,三日皆退尽。

【主治】疠疮。

【加减】筋骨痛者,加上好点红川椒一两。

61420 **保真饮**

【方源】《玉案》卷四。

【组成】辽五味 当归 白术 酸枣仁 紫河车 石斛 玄参 沙参各一钱 紫菀 山栀(炒黑)各二钱 人参三钱

【用法】上加童便一杯,水煎服。

【主治】劳思虚损,妄泄真元,阴虚火动,痰喘气急,咳嗽吐血。

61421 **保真散**

【方源】《普济方》卷十九引《护命》。

【组成】黄芩 沉香 木香各三铢 牡丹皮(去心) 前胡(去毛) 桔梗 柴胡(去毛) 贝母(去心) 天灵盖(酥炙黄黑色) 鳖甲(醋炙黄色) 麦门冬(去心) 杏仁(去尖双仁者) 茯苓 官桂 荆芥穗各一分 麻黄四铢

【用法】上为细末。每服一钱,水一盏,煎取八分,去滓,食后服。宜先吃去肾邪方,渐吃清心脏解邪气药。若病证已传在心,即宜服此方。

【功用】去火毒。

【主治】一切男子、女人肾病传心,心受劳气,五心烦躁,唇口干焦,精神不足,恍惚健忘,少喜多嗔,口无滋味,小便忽赤忽白,忽多忽少。

【备考】须是大腑热,脉气数,有骨力,方可吃。

61422 保真膏

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】天门冬 麦门冬 远志 谷精草 生地黄 熟地黄 附子 小茴香 大茴香 羌活 木鳖子 独活各一两

【用法】上俱切成片,用香油一斤,将药入内浸三日,连药油入锅,熬药黑色,捞去药滓,放瓷罐内澄清听用。

治药方法:用大鲫鱼一尾,去鳞甲肠,洁净;次将雄黄、朱砂(为末)各五钱,硫黄(末)三两,拌匀装入鱼肚内,以绵纸包裹数层,外用面包,放入灰火内煨熟,取出晾冷,择出三味药来,将鱼刺连头去了,却将鱼肉与药同捣如泥为丸,如绿豆大,白面为衣,晒干听用。

喂鸡方法:用白雄乌骨鸡一只,饿三日,加以米泔水饮之,后将鸡粪门缝住,却将前药徐徐喂之,药尽,急将鸡杀死,取出鸡肫内连肠内择出晒干,为细末。

熬药方法:松香三两,前听用。香油三两,葱汁、酸醋各半钟。先将葱汁、醋、油熬滴水不散成珠后,下松香末,熬时渐渐入前药,片时取下晾,急下后细药末:乳香、没药、母丁香(炒)、干姜各五钱,肉桂一两,川山甲五钱(拌上炒),麝香二钱。搅匀,熬成膏药,用瓷罐盛之。

每用绢一方摊药三钱,临晚用。先将葱汁、生姜(捣烂)擦脐,热后贴药,饮好酒一二钟,次加热手熨磨一百度,阳事自然坚壮。每药一个须用一月可换。如欲精通,须去此膏。

【功用】存精通气,固本坚硬,壮筋骨,有百战之功,最不泄精。

【主治】男女下元虚冷,遗精白浊,赤白带下,子宫久冷绝孕,风湿肚疼,痞块。

61423 保真膏

【方源】《外科百效》卷一。

【组成】麻油二斤半 甘草四两 天冬(去心) 麦冬(去心) 熟地(酒浸) 生地(酒浸) 官桂 牛膝 苁蓉(酒浸) 鹿茸(酥炙) 远志(甘草汤煮去骨,酒浸) 川续断 紫梢花 木鳖子 谷精草 大附子 白果 杏仁 蛇床子 虎骨(酥炙,捶碎) 菟丝子(水酒浸)各四钱 松香四两 黄丹一斤(水飞过) 硫黄 雄黄 龙骨 赤石脂(细末)各四钱 乳香 没药 丁香 南木香(细末)各四钱 当门麝香 蟾酥 真阳起石(细末)各二钱 海狗肾一个 黄蜡六钱

【用法】用净锅一口,桑柴烧文武火,先下甘草与麻油,熬五六沸;次下天门冬等十九味粗末,熬至各味药枯焦黑,用细密绢巾滤去滓;次下松香、黄丹,以槐树条一把不住手搅药,滴水成珠不散为度;次下硫黄等细末,搅匀住火;然后下麝香、黄蜡搅匀。膏药好了,盛瓷器内,用油纸裹,浸井水中四五日出火毒用。每用药三四钱,摊绫绢上,贴腰眼二穴,一个膏药可贴得六十日。

【功用】镇玉液,保精不泄,龟旺不死,通血脉,强身体,返老还童,须发复黑,固真精,善御器,虽数次不泄,滋皮肤。

【主治】腰膝疼痛,下元虚损,四肢麻木,半

身不遂,五劳七伤,冷气攻刺。及去小肠膀胱气,二三十年劳证,远近风蛊,筋骨酸痛,阳事不举。

61424 **保救丹**

【方源】《养老奉亲》。

【组成】蛤蚧一个(如是男子患病,取雄者腰前一截用之;女子患者,取雌者腰后一截用之) 不蛀皂角二挺(涂酥炙,去黑皮并子) 干地黄一分(熟蒸如饧) 五味子一分 杏仁一分(去皮尖,用童便浸一伏时,入蜜炒黄色) 半夏一分(浆水煮三七遍) 丁香少许

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每日服五丸,食前生姜汤送下。

【主治】老人秋后多发嗽,及远年一切嗽疾,并劳嗽痰壅。

61425 **保救膏**

【方源】《圣济总录》卷一三五。

【组成】楸叶五斤 马齿苋(连根)三斤(各净洗,切,焙)

【用法】上用水五斗,慢火煮,时将柳木篦搅,至一斗许,住火放冷,滤去滓,将汁再熬合浓,以新瓷罐子盛。用时以鸡翎扫药。如疮肿痛,以软帛贴之。

【主治】诸肿毒。

61426 **保婴丸**

《寿世保元》卷八。为《广嗣纪要》卷十五"肥儿丸"之异名。见该条。

61427 **保婴丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】麻黄十六两 连翘四两 生石膏八两 滑石八两 羌活六两 天麻四两 栀子(炒)二两 细辛四两 防风四两 独活四两 甘草四两 全蝎二两 薄荷二两 白芍二两 大黄二两 荆芥二两 黄芩二两 川芎二两 桔梗二两 菊花二两 当归二两 白术(炒)二两 砂仁一两

【用法】上为细末,每十六两细末兑百草霜二两,合匀,炼蜜为丸,每丸重一钱。每服一丸,温开水送下,一日二次。

【功用】清热解表,发散风寒。

【主治】小儿感冒风寒,头疼发热,鼻流清涕,身烧体倦。

61428 **保婴丹**

【方源】《医统》卷九十一。

【组成】缠豆藤一两五钱(八月内收取毛豆梗上缠绕红黄大者,阴干) 生地黄 山楂肉 牛蒡子 辰砂各一两(水飞,研细) 黑豆三十粒 新升麻七钱五分 独活二钱 甘草 当归(酒浸) 赤芍药 黄连 桔梗各五钱 连翘七钱 苦丝瓜二条(五寸长者,隔年经霜为妙,烧灰存性用)

【用法】上药各为末,和匀,净砂糖为丸,如李核大。每服一丸,浓煎甘草汤化下。前项药须取精好者,遇春、秋二分或正月十五日修合。

【功用】小儿痘疮未出,每遇春分、秋分时服此,其痘毒能渐消散。若服三年六次,其毒尽消,痘出必稀,可保无虞。

61429 **保婴丹**

《古今医鉴》卷十四。为《痘疹心法》卷二十二"消毒保婴丹"之异名。见该条。

61430 **保婴丹**

《赤水玄珠》卷二十七。为《痘疹金镜录》卷下"稀痘保婴丹"之异名。见该条。

61431 **保婴丹**

《全国中药成药处方集》(哈尔滨方)为原书"珠珀保婴丹"之异名。见该条。

61432 **保婴汤**

《重庆堂随笔》卷上。为《韩氏医通》卷下"七味保婴汤"之异名。见该条。

61433 **保婴散**

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】蝉蜕五钱 钩藤二钱 菖蒲 生栀 天麻 黄连 川贝各五钱 薄荷二钱 橘红五钱 僵蚕 粉草各二钱 胆星四钱 牛黄一分 梅片三分 朱砂五分

【用法】上为极细末。周岁以下小儿每服一分,周岁以上酌加,最多三分,白开水送下。

【功用】清肺镇惊，解热化痰。

【主治】小儿惊痫，抽搐痰鸣，发热喘促，口唇焦裂，喉痛舌肿，热毒发斑，疹后热盛，肺火咳嗽。

【宜忌】忌五辛发物。

61434 **保惊丸**

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【组成】明天麻一两　白附子五钱　防风八钱　蝉蜕八钱　荆芥一两　胆星一两五钱　半夏(法制者)八钱　白术一两　茯苓(去皮)一两　川芎八钱　粉草四钱　僵蚕(炒)五钱　土朱五钱　羌活八钱　当归五钱　全蝎(洗，炙)三钱　牙皂(去皮筋)　人参各四钱　山药一两　雄黄三钱　麝香二钱

【用法】上为末，米糊为丸，如龙眼肉大，朱砂为衣。惊风，薄荷汤送下；冷吐泻，干姜豆蔻汤送下；热吐泻，木瓜汤送下；焦躁不宁，桃、橘叶各七片，炒葱姜煎汤送下；温疟，用一丸遍身擦过，灯心薄荷汤服一丸；夜啼，灯心柿蒂汤送下；受惊粪青，薄荷汤送下。

【主治】小儿诸惊。

61435 **保辜饮**

【方源】《卫生鸿宝》卷六。

【组成】荆芥　黄蜡　鱼鳔(炒黄色)各五钱　陈绍酒一碗(一方加艾叶三片)

【用法】隔汤煮一炷香，乘热饮之，汗出立愈。在保辜限内，连饮此方。

【主治】刑曹案牍，被殴后受破伤风。

【宜忌】百日内忌食鸡肉。

61436 **保喉片**

【方源】《中药制剂手册》。

【组成】连翘二十两　甘草三十两　麦门冬十两　党参二十两　百部一钱　元参二十两　乌梅二十两　黄香十两　云故纸二十两　诃子肉十两　僵蚕十两　桔梗二十两　天花粉十两　蟾酥二钱五分　冰片五钱　薄荷油一两　薄荷脑三钱　白糖一百九十两

【用法】取桔梗、天花粉共为细粉，取部分细粉与蟾酥共为细粉，再将其余细粉陆续配研。取连翘至僵蚕等十一味，用煮法提取二次，浓缩稠膏约四十两。取桔梗等细粉与连翘等浓缩膏搅匀，加入白糖，共为细粉，制粒压片。每服一至二片，含化，一日三至四次。

【功用】生津止咳，润肺利咽，滋阴消炎。

【主治】阴虚肺热，咽痛喉炎，声音嘶哑，咽干咳嗽。

【宜忌】孕妇忌服。

61437 **保脾饮**

【方源】《疮疡经验全书》卷六。

【组成】金钗石斛　薏苡仁　忍冬花各二钱　山药　茯苓　牡丹皮　陈皮各一钱　人参　甘草　木香各六分

【用法】上用水二大钟，加大枣二枚，煎八分服，滓再煎服。兼服戊字化毒丸。

【功用】益其正气。

【主治】杨梅疮而有脾经形症者。

61438 **保童丸**

【方源】《颅囟经》卷上。

【组成】虎睛半只　朱砂　麝香各一钱　龙脑　牛黄　巴豆　芎䓖　桔梗　枳壳　檀香　茯神　人参　当归　羌活　代赭　鹤虱　白术各半两

【用法】上为细末，入香、砂、巴豆，另匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。一岁至五岁，每日一丸；十岁每日两丸，并空心米饮送下。但稍知小儿病甚，即加药与之。

【主治】小儿诸疳，或腹内虚胀，惊痫，头发立，常咬手指；瘠疳、疳劳，臂胫细弱，行立不得，及鼻下常赤，清涕涎流不止，舌上生疮；脑疳、口疳，腹上筋脉青。

【宜忌】乳母忌生冷、油腻、炙煿、毒鱼、大蒜、米醋。

61439 **保童丸**

【方源】《颅囟经》卷上。

【组成】朱砂　牛黄　麝香　蟾酥各少许　阿魏二分

【用法】先将朱砂于净器中研如粉，入诸药共研，以蒸饼为丸。宜常服。

【主治】小儿疳痢，诸色疳，并十五种病状：一腹大，二皮肤黑黄，三骨节粗，四眼赤，五口赤，六鼻中生疮，七头发黄，八咬指甲，九爱吃土，十爱吃甜物，十一身热，十二头大，十三脐突，十四项细，十五面无光。

【宜忌】忌羊血、生冷等。

61440 保童丸

【方源】《颅囟经》卷上。

【异名】问命丸

【组成】朱砂 麝香 新蟾酥各等分

【用法】上研合成剂，为丸如麻子大，盒子内盛。用时取另一合浸一丸，以筷头点入鼻中。但小儿病甚，即与吹之。若得七喷，可以治之；五喷即甚；三两喷必死。此丸不可深着水浸，临时入水亦不畏。

【主治】小儿疳痢。

61441 保童丸

【方源】《幼幼新书》卷三十九引《婴孺》。

【组成】牛黄 夜明砂 甘草（炙） 甘遂 牡蛎 真珠 巴豆（净，者五七沸，霜）各一分 虎睛一分 芍药 黄芩 杏仁（净）各四分

【用法】上为末，炼蜜为丸，瓷器密封。每服三丸，饮送下，褥中儿米大一丸。利下觉虚，吃蒸饼煮生赤枣五六枚，葱、薤作羹。后热服炙鳖甲末，每服一钱，饮送下。

【主治】小儿诸疾。一岁以上无辜疳湿，闪癖惊痫，天行赤眼，面黄。

61442 保童丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】牛黄一分（研细） 麝香半分（研细） 虎睛一对（微炒） 真珠三分（研细） 朱砂三分（研细，水飞过） 赤芍药一分 赤茯苓二分 甘草一分（炙微赤，锉） 牡蛎一分（烧为粉） 犀角屑一分 芦荟半两（研细） 胡黄连半两 熊胆一分（研细） 杏仁半分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上为末，入研了药，更研令匀，炼蜜为丸，如绿豆大。每服三丸，以温水送下。

【主治】小儿惊热及疳气。

61443 保童丸

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】青黛（研细） 干蟾头（炙微焦黄） 黄连（去须） 芦荟（研细） 熊胆（研入）各半两 夜明砂（微炒） 蜗牛壳（微炒） 使君子 地龙（微炒） 牛黄（研细） 蝉壳（微炒）各一分 龙脑一钱（研细） 朱砂一钱（研细） 麝香一钱（研细）

【用法】上为末，入研了药令匀，以糯米饭为丸，如绿豆大。每服五丸，以粥饮送下。

【主治】小儿五疳、惊热。

61444 保童丸

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】真珠末一分 牛黄一分（研细） 麝香一分（研细） 光明砂半两（研细，水飞过） 虎睛一对（酒浸，炙令微黄） 甘遂半分（煨令微黄） 赤芍药半两 赤茯苓半两 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 甘草一分（炙微赤，锉） 巴豆五枚（去皮心，研，纸裹压去油）

【用法】上为末，都研令匀，炼蜜为丸，如麻子大。三四岁儿，每服二丸，以荆芥汤送下。

【主治】小儿尸疰，癖积惊痫，无辜，天行急黄。

61445 保童丸

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】铁粉（研）一分 鳖甲（去裙襕，醋炙）半两 虾蟆（炙）一枚 黄连（去须）半两 麝香（研）一分

【用法】上为末，米饭为丸，如绿豆大。每服二丸，空心米饮送下。

【主治】小儿惊疳。

61446 保童丸

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】胡黄连 黄连（去须） 青橘皮（汤浸去白，焙） 龙胆 芜荑仁（炒） 蝉蜕 苦楝根 五倍子 夜明砂（炒） 蜗牛（研细，新瓦上摊，阴干） 天浆子（去皮，炒）各半两 干蟾头（酥炙焦）三枚 青黛 芦荟 熊胆

雄黄　麝香　丹砂(上六味同研)各半两

【用法】上为末,面糊为丸,如黍米大。一岁儿二至三丸,二岁以上加之,食前米饮送下。

【主治】小儿惊疳瘦弱,头发作穗,面黄腹胀,脏腑不调。

61447　保童丸

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】大黄(锉,炒)一两　黄连(去须)半两　夜明砂(炒)　楝实(麸炒)各一分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如豌豆大。每服三至五丸,麝香汤送下。

【主治】小儿干疳,瘦弱萎黄。

61448　保童丸

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】丹砂(研)一分　大黄(锉,炒)　赤芍药　栀子仁各半两　知母(切,焙)　鳖甲(去裙襕,醋浸炙)各一两　人参　胡黄连各半两

【用法】上除研药外,共为细末,入丹砂同研,浸蒸饼为丸,如小绿豆大。每服五至十丸,温蜜汤或人参汤送下。

【功用】解骨热,长肌肉,益气。

【主治】小儿肌瘦,五心潮热。

61449　保童丸

【方源】《幼幼新书》卷二十三引《王氏手集》。

【组成】胡黄连　草龙胆(末,炒紫色)各半两　使君子　木香　芦荟(细研)各一钱　大麦糵半两(巴豆三七个,去皮心,同麦糵炒,令糵紫色,去巴豆不用,以糵为末)　川苦楝一分(炒紫色)

【用法】上为细末,同研令匀,用醋糊为丸,如绿豆大。每服十粒至十五粒,米饮送下,不拘时候。

【功用】消化宿滞,进食长肌,肥孩儿。

【主治】①《幼幼新书》引《王氏手集》:五疳。小儿疳腹胀。②《全国中药成药处方集》(沈阳方):小儿虫积,停食腹胀,面黄肌瘦,各种疳症。

【备考】本方改为饮剂,名"保童饮"(见《家庭治病新书》)。

61450　保童丸

【方源】《普济方》卷三七三引《卫生家宝》。

【组成】天南星一个(重一两,为末,用薄荷捣汁作饼子,阴干)　远志一两(去心)　全蝎一钱　天麻三钱半　石莲心一钱　甘草二钱(生用)　茯神一钱　朱砂二钱　麝香半分

【用法】上为末,加猪心内血七个,研在众药内,以山药打糊为丸,如鸡头子大,朱砂、麝香为衣。每服一粒,薄荷汤化下。

【主治】小儿惊风,诸痫。

61451　保童丸

【方源】《走马疳急方》。

【组成】使君子(炒黑色)　面(炒黑色)

【用法】上为末,面糊为丸。空心米饮下。

【主治】小儿五疳。

61452　保童丸

【方源】《普济方》卷三八〇引《傅氏活婴方》。

【组成】虾蟆一个(紫者,去骨烧存性)　使君子一个(烧存性,研)　芜荑仁一钱　芦荟(炮)一钱　三棱(炮)一钱　莪术(烧)一钱　陈皮一钱(去白)　槟榔二个　辰砂半钱(研)　大戟半钱　皂角(同虾蟆烧)　麝香少许　巴豆(同青皮烧)　青皮一钱(去白)　干漆半钱(烧烟尽为度)　半夏半钱(姜汁浸无白为度)　黑牵牛半钱(烧)　(一方加甘遂半钱,草果仁一钱,枳壳一钱,缩砂仁一钱)

【用法】上为细末,用无灰酒煮面糊为丸,如麻子大,以朱砂为衣。每服二十丸,淡生姜汤吞下,饭饮亦可。腹中坚硬,不食及积黄,陈皮汤送下;寒热,用桃柳条七寸煎汤送下;身肿,桑白皮汤送下;取积,五更茶清送下;风热,薄荷汤送下。

【主治】一切疳积,腹中癖块坚硬,疳劳潮热,面目手足浮肿,寒热往来,饮食减少,泄泻无常,腹内肠鸣。

【备考】方中皂角、巴豆用量原缺。

61453 **保童丸**

《普济方》卷三七九。即《圣惠》卷八十六"煞疳保童丸"。见该条。

61454 **保童丸**

【方源】《育婴秘诀》卷四。

【组成】人参 白术 甘草（炙） 苍术（泔） 厚朴（姜汁炒） 陈皮 茯苓 猪苓 泽泻 藿香 丁香 半夏曲 干姜（炒） 肉桂 白豆蔻 青皮 槟榔 肉豆蔻（面包煨） 滑石（炒） 全蝎 木香 诃子肉各等分

【用法】上为末，神曲作糊为丸，如龙眼大。每服一丸，米饮送下。

【主治】因寒伤风冷食积，肚疼吐泄呕恶。

61455 **保童丸**

《痘疹金镜录》卷一。为原书同卷"五疳消积散"之异名。见该条。

61456 **保童丸**

【方源】《幼科指掌》卷四。

【组成】白鳝头 干蟾头（各炙焦黄） 龙胆草 芦荟各二钱 黄连 胡黄连 五倍子 苦楝根皮 夜明砂 小青皮 雄黄 青黛各三钱 麝香三分

【用法】上为末，米饭为丸，如麻子大。一岁二十丸，米饮送下。

【主治】小儿疳干。

61457 **保童丸**

【方源】《幼幼集成》卷四。

【组成】人参（切，焙） 漂白术（土炒） 紫厚朴（姜炒） 真广皮（酒炒） 白云苓（炒） 结猪苓（焙） 宜泽泻（炒） 藿香叶（焙） 公丁香（捣） 法半夏（焙） 白干姜（炒） 青化桂（去粗皮） 白蔻仁（炒） 杭青皮（醋炒） 肉豆蔻（煨） 南木香（屑） 炙甘草各等分

【用法】上焙燥，为细末，神曲糊为丸；如弹子大。每服一丸，米饮化下。

【主治】因伤风冷食积，肚疼，泄泻，呕恶。

61458 **保童丹**

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】陈枳壳五对（大者，去瓤；用巴豆七粒去壳，入内，十字缚定，好醋反复煮软；去巴豆，切片，焙干，余醋留煮糊） 三棱 莪术各五钱（煨） 金箔十片 朱砂二钱（另研）

【用法】上为细末，以前醋面糊为丸，如绿豆大，朱砂为衣。小儿未及周岁一丸，以上三丸，三岁以下七丸，用薄荷、灯心、金银环同煎汤送下。如不能吞者，磨化与服。

【主治】小儿急慢惊风，痰涎咳嗽喘满，不进乳食，虫疳积热膨胀。

61459 **保童饮**

《家庭治病新书》。即《幼幼新书》卷二十三引《王氏手集》"保童丸"改为饮剂。见该条。

61460 **保痘汤**

【方源】《辨证录》卷十四。

【组成】人参一钱 白术二钱 黄耆二钱 当归二钱 麦冬二钱 陈皮五分 荆芥一钱

【功用】大补脾胃之气，佐以补血。

【主治】痘疮七八日，脾胃气弱，肝血不生，疮平浆薄，饮食少减。

【加减】如痒，加白芷三分，蝉蜕二分；如痘色白而薄，倍加参、耆，一剂而白者不白，薄者不薄矣。

61461 **保魂丸**

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】黑锡一两 铅丹半两（二味一处炒令烟绝为度） 丹砂三钱 桑螵蛸（炒） 铅白霜（研） 王瓜（焙）各一两 乌梅（大者）一枚

【用法】上为末，醋煮饭为丸，如梧桐子大。每服二丸，食后温水送下，一日三次。

【主治】风痫。

61462 **保精汤**

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】当归（酒洗） 川芎 白芍（酒炒） 生地（姜汁炒） 黄柏（酒炒） 知母（蜜炒） 黄连（姜汁炒） 栀子（童便炒） 沙参 麦门冬（去心） 干姜（炒黑减半） 牡蛎（火煅） 山茱萸（酒蒸去核）各等分

【用法】上锉一剂。水煎，空心温服。

【主治】阴虚火动,夜梦遗精,虚劳发热。

61463　**保精汤**

【方源】《不居集》上集卷十九。

【组成】芡实　山药各一两　莲肉　茯神各五钱　枣仁二钱　人参一钱

【主治】梦遗精滑。

【备考】《吴山散记》:水煎服。先将药汤饮之,后加白糖五钱拌匀,连滓同服。

61464　**保瞳丸**

《全国中药成药处方集》(杭州方)。为《中药成方配本》"眼科保瞳丸"之异名。见该条。

61465　**保孺丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】鳖甲一枚(醋煮,锉)　柴胡(去土净称,锉细)　青橘皮(去白称)各二两　使君子(去壳)一两　杏仁六两(汤浸,去皮尖,生用)

【用法】上一处拌匀,用猪肚一枚,去脂膜,入前项药在猪肚内,以针线缝合,用童便煮烂切碎,焙干,为细末,更用黄连末三两、麝香二钱同研匀,酒糊为丸,如黍米大。每服三十丸,乳食前温米饮送下。

【主治】小儿五疳羸瘦,潮热盗汗,面色萎黄,腹大股细,虽能饮食,不生肌肉。

61466　**保儿安丸**

【方源】《全国中药成药处方集》(禹县方)。

【组成】朱砂　明雄　全蝎　薄荷　明天麻　天竺黄　黄连　大黄　栀子　半夏　胆南星各一钱

【用法】上为细末，水泛为丸，朱砂为衣，如小米大。小儿一日服十二丸，三岁服六十丸。

【主治】小儿胃肠积热,惊风抽搐,夜睡不安,大便闭结。

【宜忌】小儿慢惊忌服。

61467　**保生饼子**

《准绳·疡医》卷二。为《儒门事亲》卷十五"保生锭子"之异名。见该条。

61468　**保生梃子**

《疡医大全》卷三十四。为《儒门事亲》卷十五"保生锭子"之异名。见该条。

61469　**保生锭子**

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【异名】保生饼子(《准绳·疡医》卷二)、保生梃子(《疡医大全》卷三十四)。

【组成】巴豆四十九个(另研,文武火烧热)　金脚信二钱　雄黄三钱　轻粉半匣　硇砂二钱　麝香二钱

【用法】上为末,用黄蜡一两半化开,将药和成锭子,冷水浸少时,取出,旋捏作饼子,如钱眼大。将疮头拨破,每用贴一饼子,次用神圣膏药封贴,然后服托里散。

【主治】①《儒门事亲》:疮疡痈肿。②《卫生宝鉴》:疔疮,背疽,瘰疬,一切恶疮。

【备考】《疡科选粹》有"蟾酥"。方中硇砂《外科方外奇方》作"硼砂"。

61470　**保生锭子**

【方源】《玉机微义》卷五十。

【组成】蛇含石四两(火煅醋淬十数次,研为极细末)　南星一两(先泡,细切,再炒)　白附子(去皮)一两　朱砂三钱(另研极细)　麝一钱

【用法】上为细末,用糯米粉煮作饼,捣和前药令匀,作锭子。临用以薄荷汤磨汁,服一二口。

【主治】急慢惊风。

61471　**保生锭子**

《保婴撮要》卷四。为《直指小儿》卷二"太一保生丹"之异名。见该条。

61472　**保生锭子**

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】蟾酥三钱　雄黄二钱

【用法】上为末，用青桑皮二两同捣为丸，每丸六分重，捻作锭子，朱砂为衣，阴干。如疔疮，用冷葱汤磨服八分，仍用冷葱汤漱口咽下；外用针刺开疔头，将锭子一分，填入疔内，被盖出汗，二日烂出即愈。如发背，亦用冷葱汤磨服，再磨二分敷患处，被盖出汗，

患者即愈。

【主治】疔疮发背体虚，及妇人胎前产后毒浅者。

61473 **保生锭子**

【方源】《痘疹金镜录》卷上。

【组成】胆星　白附子　辰砂（水飞）各一两　麝香二钱　天麻　防风　全蝎　羌活各五钱　蛇含石（煅七次，水飞）四两

【用法】上为末，大米糊作锭子，金箔为衣。每用半锭，薄荷汤送下。

【主治】急惊风，痰涎壅盛或抽搦。

61474 **保生锭子**

【方源】《增补内经拾遗》卷四。

【组成】人参　白术　白茯苓　白芍各一两　甘草　牛黄各二钱　全蝎二十二个（去毒）　白僵蚕二十四个　黑牵牛十六个　南星（当年者）二十个　白附子十二个　辰砂（另研）二两　代赭石（火煅，水飞）　青礞石（火煅，水飞）　蛇含石（火煅，用米醋淬四十九次）各四两

【用法】上为细末，糕糊为锭，用火烘干，瓷罐盛之。仍用好麝香同置一处熏之。所用锭印，须用象牙刻者方妙。

【主治】急慢惊风。

61475 **保和锭子**

【方源】《万氏家抄方》卷五引钱氏方。

【组成】辰砂（水飞）　人参　茯苓（去皮）　茯神（去皮木）　山药　赤石脂（煅七次，醋淬七次）　乳香各二钱半　礞石（消煅金色）一钱　牛黄　僵蚕　五灵脂　麝香各五分

【用法】上为末，糯米糊为锭。薄荷汤磨服。

【主治】小儿急慢惊风。

61476 **保命金丹**

《传信适用方》卷一。为原书同卷“大圣一粒金丹”之异名。见该条。

61477 **保命金丹**

《医学纲目》卷十。为《卫生宝鉴》卷八“至圣保命金丹”之异名。见该条。

61478 **保命集散**

【方源】方出《保命集》卷下，名见《医略六书》卷三十。

【组成】当归（炒）　芫花（炒）

【用法】上为末。每服三钱，酒调下。

【主治】①《保命集》：妇人恶物不下。②《医略六书》：恶露纯水，脉紧涩者。

【方论选录】《医略六书》：产后饮积胞门，恶血亦化为水，而恶露所下纯水，故小腹疼痛，牵连脐腹焉。当归酒炒以养其经，芫花醋炒以搜涤其水，红花酒煎以行其瘀、化其血，使积饮顿消，则水亦化血而恶露不行，何所下纯水之有不愈者，其疼痛牵引无不霍然矣。

【备考】《医略六书》本方用法：红花酒煎三钱，去滓温服。

61479 **保胎金丹**

【方源】《全国中药成药处方集》（大同方）。

【组成】生地　鳖甲　香附各四两　当归　茯苓　元胡　白薇　藁本　益母　川芎　炒艾　煅赤石脂　丹皮　白术　青蒿各二两　肉桂五钱　没药一两五钱　五味　炙草各一两　沉香六钱　人参二两　黄柏四两

【用法】白酒二斤，入锅内封口煮一小时，同前药共轧细面，炼蜜为丸重三钱，朱砂为衣，蜡皮。每次服一粒，一日二次。多服可除流产。

【主治】胎前产后诸虚症，胎漏，流产，滑胎，产后虚弱，倦怠无力，骨蒸潮热。

61480 **保童碧丹**

【方源】《普济方》卷三八〇引《傅氏活婴方》。

【组成】硫黄　芜荑仁（炒）　黄连各五钱　轻粉一钱　巴豆五粒（去油）

【用法】上为末，醋糊为丸，如粟米大。每服十丸，空心煎姜苏汤温服。

【主治】疳积疳劳，肚大虚肿。

【宜忌】忌食生冷。

61481 **保子七圣散**

【方源】《元和纪用经》。

【组成】赤白芍（各半）四分　当归四分

生大黄二分　甘草三分

【用法】上以水三升煎，去滓服。月内儿服一杏核大，三百日儿服一栗壳，一二岁儿服两栗壳，三岁以上儿加之，每日三次。若发惊及温壮，外有触冒寒邪，以去节麻黄一分，水三升煮之，去沫滓，纳正药煎，如上服之；若惊风反折，戴眼掣缩，加细辛四分，纳一料正药，增水至四升，煮取一升五合服；若中风身体强直戴眼者，加独活二分，纳一料正药，加水煎服。

【主治】小儿胎寒腹痛，乳哺不时，温壮发热，吐利不常，诸经掣缩，二十五痫，肌肤瘖疮，遇时而发作，口疮恶核，赤目黄瘦，大小变蒸。

61482　**保元八珍汤**

【方源】《救偏琐言》卷十。

【组成】人参　黄耆　甘草　当归　淮熟地　川芎　枸杞子　山楂

【用法】上加生姜二片，炒糯米百数粒，水煎服。

【主治】痘疹气血两虚，囊薄色淡，身凉体静，顶平顶陷，浆清皱软者。

61483　**保元人乳汤**

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】黄耆(炙)二钱　人参一钱　川芎八分　木香八分　当归八分　肉桂三分　甘草(炙)五分

【用法】加酒半杯同水煎，和人乳半杯温服。

【主治】痘疮起胀时，气血俱虚，顶陷色白者。

【加减】气不虚，去木香；血不虚，去当归、肉桂；气血弱甚者，加鹿茸一钱。

【方论选录】此承虚寒证之后，于行浆时更加助气血之药。气充则不虚，故用人参、黄耆、木香、甘草；血足则不寒，故用当归、川芎、肉桂、人乳；加以酒力，则胀起而不致有枯白顶陷之忧矣。

61484　**保元化毒汤**

【方源】《片玉痘疹》卷九。

【组成】人参　黄耆　甘草　归身　川芎　荆芥　大力子　官桂　防风　赤芍

【用法】水煎服。

【主治】痘疮起发后，卫气不足，平塌不起者。

61485　**保元化毒汤**

【方源】《金鉴》卷五十六。

【组成】人参　黄耆(蜜炙)　甘草(炙)　当归　南山楂　穿山甲(炒)　白芷　木香　僵蚕(炒，研)　川芎

【用法】加煨姜，水煎服。

【主治】气血虚弱，痘疮不能如期起胀，平扁顶凹，其色灰白，皮薄嫩亮，更现倦怠气乏，不渴不烦等虚证。

61486　**保元化毒汤**

【方源】《医部全录》卷四九一。

【组成】人参　黄耆　甘草　桂枝　羌活　荆芥　牛蒡　防风　连翘

【用法】水煎服。

【主治】痘疹气不足。

61487　**保元化滞汤**

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】黄耆一两　滑石末一两

【用法】用黄耆煎汤，加白砂糖五钱，冲滑石末，晚上服。

【主治】小儿痘疹五六日后，痢疾或白或红，或红白相杂，及大人初痢、久痢。

【备考】大人初痢，滑石用一两五钱，白糖一两，不用黄耆；久痢，加黄耆，滑石仍用一两五钱。

61488　**保元地黄汤**

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】黄耆八分　白术八分(炒)　白芍八分(炒)　沙参八分　当归六分　丹皮八分　白茯苓八分　熟地二钱　车前子八分

【用法】水煎服。兼服六味地黄丸。

【主治】小儿肾疳，由肝脾失调，加之先天肾水不足而成。体多瘦弱，目昏神倦，或凉或热，或时时伤风。

61489 保元托脓散

【方源】《幼科直言》卷二。

【组成】黄耆 当归 僵蚕 白芍(炒) 防风 丹皮 桔梗 陈皮 甘草 糯米

【主治】小儿痘疹火症,在六七八九日,曾用凉血解毒之药,毒气稍退,颜色少淡者。

61490 保元回浆散

【方源】《救偏琐言·备用良方》。

【组成】人参 当归 甘草 黄耆 白芍 米仁 茯苓

【用法】加生姜、大枣,水煎服。

【主治】痘疹身凉体静,浆不满足,脓囊渐阔,收靥不齐。

61491 保元快斑汤

【方源】《痘科金镜赋》卷六。

【组成】人参 黄耆(炙) 甘草(炙) 茯苓 升麻 甲片(炮)

【用法】生姜为引,酒煎服。

【主治】痘疹元气虚弱,不能运毒,斑痕不化,不能起脓成浆。

【加减】若见点时白头如瘩,元气虚弱,色不红活者,去山甲,加当归、红花。

【方论选录】方中参、耆、炙草以补元气,茯苓利渗而引参、耆之力下行,升麻升阳达表,山甲化毒追脓,姜与酒性暖而行周身,疮斑自化,浆自行矣。

61492 保元固气汤

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】黄耆(炙)三钱 人参一钱 肉桂五分 丁香三分 甘草(炙)五分

【用法】水煎服。

【功用】大壮气血,固其腠理。

【主治】痘症虚寒,腠理不密,卫气虚,起胀时痘上有小孔,不黑不白,名曰讧痘者。

61493 保元固本膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】党参 白术(炒) 鹿角 当归 香附各一两五钱 川芎 附子(炙) 独活 干姜 川椒 杜仲 鳖甲 荜茇 草果仁 白芍各一两 生耆一两五钱

【用法】用麻油三斤,将药炸枯,去滓,再熬至滴水成珠,入飞净黄丹一斤二两,再入肉桂、沉香、丁香各三钱(共为极细末,候油冷加),搅匀成坨,重四五两,候去火气,三日后方可摊贴。

【功用】脾肾双补,肾阴阳同治,兼顾先后天之本。

【主治】脾肾不足,肠胃功能失调。

61494 保元益寿丹

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】人参三钱 炒於术三钱 茯苓五钱 当归四钱 白芍二钱(炒) 干地黄四钱 陈皮一钱五分 砂仁一钱 醋柴一钱 香附二钱(炙) 桔梗二钱 杜仲四钱(炒) 桑枝四钱 谷芽四钱 薏米五钱(炒) 炙草一钱

【用法】上为极细末。每服一钱五分,老米汤调服。

【功用】补养气血,兼舒肝和胃理脾,标本并治。

【主治】气血久亏,脾元素弱,饮食不香,夜寐欠实,消化较慢,时有头晕,夜间倒饱,嘈杂作呕,精神软倦,大便常溏。

61495 保元清降汤

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】野台参五钱 生赭石八钱(轧细) 生芡实六钱 生山药六钱 生杭芍六钱 牛蒡子(炒,捣)二钱 甘草一钱半

【主治】吐衄证,其人下元虚损,中气衰惫,冲气、胃气因虚上逆,其脉弦而硬急,转似有力者。

61496 保元清降汤

【方源】《衷中参西》下册。

【组成】生赭石一两(轧细) 野台参五钱 生地黄一两 生怀山药八钱 净萸肉八钱 生龙骨六钱(捣细) 生杭芍四钱 广三七(细末)三钱(分两次)

【用法】上除三七外,水煎,用头煎、二煎送服三七末。

【主治】吐衄证，血脱气亦随脱，言语若不接续，动则作喘，脉象浮弦，重按无力。

61497　**保元寒降汤**

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生山药一两　野台参五钱　生赭石八钱(轧细)　知母六钱　大生地六钱　生杭芍四钱　牛蒡子四钱(炒，捣)　三七二钱(轧细)

【用法】上除三七外，用水煎汤，送服三七末。

【主治】吐血过多，气分虚甚，喘促咳逆，血脱而气亦将脱，其脉上盛下虚，上焦兼烦热者。

61498　**保元寒降汤**

【方源】《衷中参西》下册。

【组成】生赭石一两(轧细)　野台参五钱　生地黄一两　知母八钱　净萸肉八钱　生龙骨六钱(捣细)　生牡蛎六钱(捣细)　生杭芍四钱　广三七(细末)三钱(捣，分两次)

【用法】上除三七外，水煎，用头煎、二煎药汤送服三七末。

【主治】吐衄证，血脱气亦随脱，喘促咳逆，心中烦热，其脉上盛下虚者。

61499　**保元槐角丸**

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】槐角　当归　生地　黄芩　黄柏　侧柏叶各三钱　枳壳　地榆　荆芥　防风各二钱　黄连　川芎　生姜各一钱　乌梅三枚

【用法】用鲜荷叶汁、炼白蜜为丸。每服二三钱，以清肝达郁汤去归、菊送下。

【功用】清火疏风止血。

【主治】肠风下血，便后纯下清血，其疾如箭，肛门不肿痛，而肠中鸣响。

61500　**保内清心散**

【方源】《疮疡经验全书》卷二。

【组成】粉草　升麻　当归　川芎　黄耆　芍药　山栀　乳香　黄芩　羌活　桔梗　天花粉　青皮　白芷

【用法】水煎服。即服护心散、蜡矾丸。

【主治】井疽发于胸，状如豆大，三四日起，若不早治，必入于腹。

【宜忌】务要戒怒。

61501　**保目全睛丸**

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】白蒺藜　黄柏　元参　青葙子　黄芩　赤芍　防风　知母　犀角各五分　木贼　蝉蜕　石决明　草决明　归尾各一钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，每丸二钱重。每服一丸，白开水送下。

【功用】明目退翳，清热养血。

【主治】二目昏花，视物不清，云翳遮睛，迎风流泪，视力衰弱，头目眩晕，夜盲。

【宜忌】孕妇忌服。

61502　**保孕安胎丸**

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】生白术八两　人参四两　寄生　茯苓各三两　杜仲炭四两　大枣三两

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，每丸二钱重，蜡皮封固。每服一丸，空心生姜汤送下。

【功用】滋补强壮，养血安胎。

【主治】妊娠期内腰腿痠痛，胎漏下血，食欲不振，习惯流产，倦怠衰弱。

61503　**保生无忧散**

《女科撮要》卷下。为《医方类聚》卷二九九引《济生》“无忧散”之异名。见该条。

61504　**保生无忧散**

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】当归　川芎　白芍　人参　白术　甘草　陈皮　神曲　麦芽　紫苏　诃子　枳壳

【功用】安胎益气，令子紧小无病。

【主治】滑胎。

61505　**保生无忧散**

《医林纂要》卷八。为《增补内经拾遗》卷四“无忧散”之异名。见该条。

61506　**保生四物汤**

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】当归　川芎　白芍　熟地　黄芩

白术 人参 茯神 黄耆 甘草 紫菀 五味 桔梗 木通 香附 陈皮

【功用】养血安胎。

【主治】妊娠不语非病者。

【方论选录】是方以四物、芩、术养血凉血，清热安胎；四君、菀、桔、五味补气益肺；附、陈通利三焦；木通开益心气，而胎元无事，其声产后自复；若妄投汤药，反有伤胎之患。

61507 **保生如圣散**

【方源】《女科万金方》。

【组成】益母草二两 砂仁二钱 陈皮一钱 益智仁三钱（去皮） 当归四钱（弱者多用） 大枳壳一两 甘草六分 白芍药四钱

【用法】上分三服。每服以水二碗，煎取一碗，温服，不拘时候。

【主治】胎前误食热毒之物，伤胎不顺，妇人九个月胎，欲产期忽然肚痛，先行其水，儿不降生者。

【备考】《女科旨要》有柴胡二钱、苏叶五钱。

61508 **保生定命丹**

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】光明砂一两（研细，水飞过） 腻粉一分 金箔四十片 牛黄一分 龙脑一分 麝香一分 水银一两（煮枣肉研令星尽）

【用法】上为末，入水银更研令匀，用粟米饭为丸，如麻子大。一二岁儿每服三丸，三四岁儿每服五丸，用新汲水研破服之，不拘时候。

【主治】小儿天钓，四肢抽掣，眼目戴上，精神恍惚，皮肤干燥，身体似火，夜卧不安，心中躁烦，热渴不止。

61509 **保生救苦丹**

《疡医大全》卷三十七。为《兰室秘藏》卷下“保生救苦散”之异名。见该条。

61510 **保生救苦散**

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】保生救苦丹（《疡医大全》卷三十七）。

【组成】生寒水石不拘多少

【用法】上为细末，用油调涂，或干用贴之。

【主治】①《兰室秘藏》：火烧或热油烧烫者。②《赤水玄珠》：狗啮损伤，并刀斧伤，预防破伤风症。

61511 **保生救苦散**

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】生寒水石 大黄（火煨） 黄柏（油炒）各等分

【用法】上为细末，用油调涂，或干用此药涂之。其痛立止。

【主治】火烧，或热油烙，及脱肌肉者。

61512 **保幼化风丹**

【方源】《古今医鉴》卷十三。

【组成】南星 半夏 川乌 白附子各一两（水洗净） 郁金五钱

【用法】上为末，装入腊月黄牛胆内，阴干，百日取出，研为末。每一两加入雄黄、朱砂、硼砂、焰消各一钱，片脑、麝香各少许，共为末，炼蜜为丸，如豌豆大。灯草、薄荷汤研化下。

【功用】祛风痰，散惊热。

【主治】小儿惊风，四证八候。

【备考】小儿有热，热盛生痰，痰盛生惊，惊盛发抽。又盛则牙关紧急，而八候生焉。搐、搦、掣、颤、反、引、窜、视是也。搐者，两手伸缩；搦者，十指开、合；掣者，势如相扑；颤，头偏不正；反者，仰向后；引者，臂若开弓；窜者，目直似怒；视者，睛露不活。是谓八候也。其四证者，即惊、风、痰、热是也。

61513 **保幼化风丹**

【方源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】胆星二两 羌活 独活 天麻 芥穗 防风 川芎 淡全蝎 甘草各一两 薄荷二两 人参（去芦）一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸一钱重，每斤药用朱砂末三钱为衣，蜡皮或蜡纸筒封固。一至二岁儿每次服一丸，周岁以内酌减，白开水化服。

【功用】清热散风，止嗽化痰。

【主治】小儿感冒发热，头痛身痛，四肢抽动，痰涎壅盛。

61514　保幼化风丹

【方源】《全国中药成药处方集》（兰州方）。

【组成】胆星二钱　羌活　独活　天麻各一钱　钩藤五钱　橘络　半夏各二钱　全蝎　党参各一钱　黄芩　甘草各二钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸一钱重，朱砂为衣。小儿五岁内服一丸，三岁内服半丸，白开水送下。

【功用】解热散风，止嗽化痰。

【主治】小儿受风，咳嗽呕吐，消化不良，小便黄赤，急热惊风。

【宜忌】忌食生冷。

61515　保幼化风丹

【方源】《全国中药成药处方集》（禹县方）。

【组成】胆星　党参　明天麻　独活　全蝎　川芎　细辛　羌活　防风　荆芥　黄芩　生甘草各五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，朱砂为衣，每丸重五分。三岁服一丸，薄荷、灯心汤送下。

【主治】小儿惊风，痰涎壅盛，吐乳吐痰，咳嗽痰喘。

【宜忌】慢惊风忌用。

61516　保幼再生丹

【方源】《全国中药成药处方集》（北京方）。

【组成】防风　天麻　天竺黄　贝母　桑叶各一两二钱　胆南星　薄荷　茯苓　钩藤各一两　橘红　甘草　桔梗各八钱　僵蚕　远志各四钱　羌活六钱　活蝎二十个（上共为细粉，兑入）　琥珀八钱　犀角　羚羊角　牛黄　麝香各一钱　冰片四钱　珍珠五分

【用法】上药和匀，炼蜜为丸，每丸重五分，朱砂为衣，蜡皮封固。每服一丸，温开水送下，一日二次。小儿三岁以下者酌情递减。

【功用】解热化痰，镇惊安神。

【主治】小儿感冒，咳嗽痰盛，憎寒壮热，惊风抽搐。

61517　保幼培元丹

【方源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】藿香一两六钱　赤苓六钱　清夏四钱　柴胡八钱　苏叶八钱　木瓜六钱　白芷四钱　广皮八钱　檀香六钱　扁豆六钱　三仙二两　木通四钱　泽泻六钱　竹茹六钱　山药九钱　砂仁四钱　白术八钱（土炒）　甘草四钱　木香四钱　川连四钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重一钱，每斤药丸用朱砂三钱为衣，蜡皮封固。每次服一丸，生姜汤送下；白开水亦可。

【主治】小儿中寒中暑，腹痛呕吐泄泻，头痛身烧。

61518　保光清凉散

【方源】《全国中药成药处方集》（禹县方）。

【组成】炉甘石二两五钱　珍珠一分　硼砂四两五钱　青盐一钱五分　玄明粉二钱　朱砂五分　麝香一分　冰片二两五钱　黄丹一钱

【用法】上为细末。轻者每日二次，重者三次，点眼。

【主治】风火烂眼，暴发赤肿，眼疼眼痒，畏光羞明。

【宜忌】血亏症及孕妇忌用。

61519　保合太和丸

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】白术（去芦，炒）　当归（酒洗）各四两　茯苓（去皮）　白芍（酒炒）各二两　人参（去芦）　山药　陈皮（带白）　莲肉　半夏（姜制）　枳实（麸炒）　神曲（炒）　麦芽（炒）　山楂（去子）　香附（童便炒）　黄连（姜汁炒）　龙眼（取肉）各一两　白蔻（去壳）三钱　甘草（炙）五钱

【用法】上为细末，荷叶煎汤，下大米煮稀粥为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，食后、临卧米汤送下。

【功用】培元气、脾胃之亏，壮气而增力，代劳任事，助困而不倦，当寒而耐饥。

61520　保合太和丸

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】白术 枳实 苍术 香附 姜连 酒黄芩 麦芽 醋棱 醋莪术各一钱 木香五分 连翘 莱菔 厚朴各二钱 陈皮 半夏 茯苓 神曲 山楂各三钱

【用法】生姜汁糊为丸服。

【主治】弱人积聚。

61521 保产万全汤

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十八。

【异名】保产万金汤(《集验良方》卷二)。

【组成】人参三钱至五钱 当归(去芦)三钱 川芎一钱 桃仁十三粒(不去皮尖,捣碎) 干姜(炒焦黄)二钱 甘草(炙)六分 牛膝梢二钱 红花(酒炒)三分 肉桂(临煎方去皮,切碎)六分(冬天用八分)

【用法】上加胶枣一枚,水煎,食前温服。如产妇壮实,及无力服人参者,去参用之。

【功用】催生。

【方论选录】方用人参、当归为君,培补气血,壮其主也;少加桃仁、川芎、黑姜、炙草、酒红花,温中而散其瘀滞也;牛膝梢、桂心温行导下,使无上逆冲心之患。不惟催生神效,产后更无瘀血凝滞百病。补而兼温则不滞,温而兼补则不崩;升少降多则气得提而易下,降而兼升则瘀自去而新自归;补多泻少,邪去而元气无伤;苦少甘多,瘀逐而中和仍在。

61522 保产万全汤

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】归身 川芎 菟丝各一钱半 白芍 贝母各一钱 黄耆 荆芥穗各八分 蕲艾 厚朴各七分 羌活 生甘草各五分

【用法】加生姜三片,水三钟,未产者空心煎一钱预服,临产者随时服。

【功用】未产者能安,临产者能催。

【主治】胎前不拘月数,偶伤胎气,腰疼腹痛或血下势欲小产;交骨不开,横生逆下,或婴儿死于腹中,命在垂危。

【备考】怀孕七八个月服一二剂,临产再服一二剂,保全母子平安。

61523 保产万金汤

《集验良方》卷二。为《冯氏锦囊·杂症》卷十八"保产万全汤"之异名。见该条。

61524 保产无忧丸

【方源】《同寿录》卷三。

【组成】当归(酒洗)一两五钱 真川芎一两三钱 川羌活五钱 真蕲艾七钱 荆芥穗八分 黄耆八钱 白芍药一两三钱(炒,如冬月只用一两) 川贝母一两 紫厚朴七钱(姜汁拌炒) 枳壳六钱(麸炒) 菟丝子一两四钱(水洗净) 益母草一两五钱(忌见铁) 甘草五钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三钱,白汤送下。

【主治】难产或数日不下,或临月腰疼,步履不安,不能足月,或横生倒生,或血晕血迷或儿枕作痛,乳汁不通,或血崩漏胎。

61525 保产无忧汤

《笔花医镜》卷四。为《增补内经拾遗》卷四"无忧散"之异名。见该条。

61526 保产无忧散

《普济方》卷三五六。为《医方类聚》卷二二九引《济生》"无忧散"之异名。见该条。

61527 保产无忧散

《傅青主女科·补编》。为《增补内经拾遗》卷四"无忧散"之异名。见该条。

61528 保产无虞散

《郑氏家传女科万金方》卷三。为《增补内经拾遗》卷四"无忧散"之异名。见该条。

61529 保产四物汤

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归(酒洗) 南芎 白芍(酒炒) 熟地各一钱 白术(去芦,炒)一钱 白茯苓(去皮)一钱 陈皮八分 干姜(炒黑)五分 益母草一钱 香附米(炒)一钱 甘草(炙)三分

【用法】上锉。加生姜三片,大枣一枚,水煎,温服。

【主治】产后虚损诸病。

【加减】发热，加童便一盏同服；昏愦，加荆芥穗；口干，加麦门冬；盗汗，加黄耆（蜜炙）；不寐，加酸枣仁（炒）；恶露不行，加桃仁、红花。

61530　保产芎归汤

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】当归一两　川芎五钱　车前子（焙黄，研末）三钱

【用法】前二味水煎，入车前子末调和，随时服下。

【功用】保全孕妇易产。

【加减】冬月，加肉桂。

61531　保产远生散

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷二。

【组成】黄芩　人参　白茯苓　滑石　枳壳　甘草　大腹皮　陈皮　香附　白芍　黄杨头七个

【功用】妊娠九个月，预服易产。

【加减】春月，加川芎；体气实，加香附、陈皮、紫苏；形气虚，加人参一钱、白术；夏月，加当归、川芎、黄芩、陈皮、香附各一钱，益元散一钱半，白芷五分；冬月，不用黄芩；虚，加当归、熟地；性急，加川连；食积，加山楂；湿痰，加滑石、半夏；有热，加黄芩；食后易饥，加黄杨头；腹痛，加木香、官桂。

61532　保产神效方

《傅青主女科·补编》。为《增补内经拾遗》卷四“无忧散”之异名。见该条。

61533　保产黑神丹

【方源】《叶氏女科》卷四。

【组成】陈墨一锭（须觅顶上选烟历百十年胶性全脱者，俟天雨时用新净瓷器当空接取，是为无根水，洗净砚，男子手磨成浓汁，倾入净细大瓷盘中，晒燥刮下，研细待用。每料约用净墨粉四钱。墨汁易坏，用水勿太多，遇久雨及夏令更宜斟酌，霉雨、异雨无用）　百草霜二钱（得陈者佳，须取近山沿海人家烧各种野草者，取烟时，先扫净火门上积烟，逐日扫下，筛净研细待用。烧牛粪者最良，凡烧独种柴草者勿用，并勿误用锅煤）　天麻二钱（要透明，切时勿用水泡，研细待用）　淮小麦（面粉）二钱（逾淮安城西三十里外麦，方日间开花可用，筛净，半入药中，余半糊丸）　足赤大金箔五十页（以四十页研入药中，余俟丸成为衣）

【用法】上药先各为极细末，称准足分，再合和研匀，即将淮面粉打糊为丸，金箔为衣，晒令极干，如芡实大（每丸约重一分），外用蜡壳封护。以后所开药引，如急证猝不及购，俱用童便或白汤研送。证轻者用药一丸，重者两三丸。凡治小产后诸证，与正产同。横生倒产及一切难产，俱用黄酒或童便研送。母脏热极熏蒸，致胎死腹中，坠于脐下，其证指甲青黑，面赤舌青，四肢厥冷，口角出沫，急用童便一杯或黄酒研送，若续用冬葵子一两、怀牛膝三钱，煎汤服更妙；若一服不下，并可再服或三服。胎衣不下，用黄酒或童便研送一丸；如再不下，用凉开水调百草霜数分再送一丸，即下。产后忽然四肢发痉，口噤头摇（俗名产后惊风），用钩藤（后煎）、荆芥炭各五分，丹皮一钱，首乌藤二钱，煎汤冲入童便研送两丸（忌鱼腥）。产后七日内猝然厥冷，不省人事，并狂笑歌哭，急用童便研化，先服两丸，再用真琥珀五分（研末）先煎，生蒲黄、五灵脂、广郁金各八分，煎汤冲入童便一杯，送一丸。凡产后恶血上冲之证，并宜急用米醋一大盆，置产妇头边，淬入炭火，使醋气冲入口鼻，虽有外感亦可用。产后胸胀胁痛，咳逆气喘，汗出如油，此败血逆冲心肺，急用通草五分，桑白皮一钱，煎汤冲入米醋三匙研送（或加旋复花一钱五分，夏布包煎）。产后喉肿气喘，急如猫声，或寒战咬牙，亦败血冲入心肺，急用桑白皮一钱煎汤研送（恐桑白皮力薄，更加桃仁、杏仁各一钱作引）。产后血晕，眼目昏黑，或寒战咬牙，由败血流入五脏，积于肝中，急用红花八分煎汤，冲入童便一杯研送。产后鼻黑鼻衄，气血散乱，诸经虚热，急用桑白皮一

钱煎汤研送（或加地骨皮、茅草根各二钱）。产后言语不出，手足不遂，由毛孔开张，风寒袭入所致，或由败血冲心者，用豆淋酒研送（豆淋酒用黑大豆一合，即乌毛豆炒熟，滚酒浸半刻，去豆用酒）。产后遍身生瘢，因三四日内强力下床，致伤产穴，或怒气冲伤五脏，初起眼涩口噤者，用豆淋酒研送。产后三四日起卧不得，眼花口干，心乱不省人事者，用薄荷少许，煎汤冲入童便研送；或血气未定，过食热物，致心闷口干，发热烦满者，用红花二三分煎汤研送。产后腰痛，四肢作痛，因百脉开张，败血随气流行，散于四肢，初得时肚热腰寒者，用铁秤砣炭火烧红，淬热酒研药和入，乘热送服。产后中风口开（一作口闭），气急，半身不遂，并头痛寒热，均用童便研送。产后血崩头痛，口干，心神慌乱者，用醋炒海螵蛸一钱，紫葳花五分，煎汤研送；或恶露成块多瘀者，改用真红花五分，煎汤研送；如血崩已缓，而头痛、口干、心乱不愈者，改用生鸡子黄一个，煎清汤研送。产后腹痛难忍，按之得缓者，用酒水各半，煎酒炒白芍一钱研送；若按之痛反甚者，改用元胡索一钱，以酒水各半，煎汤研送（不饮者，酒宜减；素有肝气者，用水煎）；如痛而有块者，照后两条。产后腹中生块，不时作痛，常聚不散，因房事太早，食硬、卧冷所致者，用当归一钱，酒煎研送，并宜接服妇科回生至宝丹；若痛时有块，痛止即散者，属气分，改用青皮五分，川楝子一钱，水煎研送（不用酒煎当归）。产后因过食冷物心痛者，用茴香、真红花各五分，煎汤研送。产后数日内腹中血块攻痛，由于恶露不通，或通而甚少者，用山楂炭一钱，炒枯黑沙糖四钱，煎汤冲入童便半杯研送。产后黄肿头痛，四肢沉重，因食物触动败血，传入脾胃变化作肿，患者口枯体倦，用荆芥、槐角、棘针、真红花各三分，酒煎研送（忌鱼腥）。

【主治】小产、正产、横生倒产及一切难产、产后诸证。

61534 保安大成汤

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】人参　白术　黄耆（蜜水拌炒）各二钱　茯苓　白芍　陈皮　归身　甘草（炙）　附子　山萸肉　五味子各一钱　木香　砂仁各五分

【用法】上以水二钟，加煨姜三片（去皮），大枣三枚，煎八分，食远服。

【功用】大补不足。

【主治】溃疡。元气素虚，精神怯弱，或脓水出多，神无所主，以致睡卧昏倦，六脉虚细，足冷身凉，便溏或秘，胸膈或宽或不宽，舌虽润而少津，口虽食而少味，疮弦不紧，肉色微红。

61535 保安万灵丹

【方源】《外科正宗》卷一。

【异名】万灵丹（《济阳纲目》卷一）。

【组成】茅术八两　全蝎　石斛　当归　甘草（炙）　明天麻　川芎　羌活　荆芥　防风　麻黄　北细辛　川乌（汤泡去皮）　草乌（汤泡去皮）　何首乌各一两　明雄黄六钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每药一两分作四丸，一两作六丸，一两作九丸，分三等做成，以备年岁老壮病势缓急取用。预用朱砂六钱，研细为衣，瓷罐收贮。外证初期表证未尽者，葱白九枚煎汤一钟，将药一丸乘热化开，通口服尽，被盖出汗为效。如服后汗迟，再用葱白汤催之，后必汗如淋洗，渐渐退下，覆盖衣物，其汗自收自敛，患者自然爽快，其病如失。未成者，随即消去；已成者，随即高肿溃脓。如诸疾无表证相兼，不必发散者，只用热酒化服。服后避风，当食稀粥。

【主治】痈疽，疔毒，对口，发颐，风湿风温，湿痰流注，附骨阴疽，鹤膝风证，偏坠疝气，破伤风牙关紧闭，左瘫右痪，口眼㖞斜，半身不遂，气血瘀滞，遍身走痛，步履艰辛。

【宜忌】忌冷物、房事，孕妇勿服。

61536 保安四圣饼

【方源】《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】人参　白术　茯苓各一两　炙甘

草　南星（炮）　白附子各五钱　代赭石（煅，醋淬）一两　蛇含石（煅）二钱

【用法】上为末，端阳日粽捣为饼，计重一钱。每服一饼，吐，生姜汤送下；泻，米饮送下；惊，薄荷汤送下；疳，米泔水送下。

【主治】吐、泻、惊、疳；吐泻日久，恐传慢惊。

61537　保安白术散

《卫生宝鉴》卷十八。为《苏沈良方》卷十"白术散"之异名。见该条。

61538　保安半夏丸

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】半夏　天南星各半两　牵牛一两　大黄半两　黄柏一两半　蛤粉一两　巴豆四个　（一方无巴豆有干姜）

【用法】上为末，水泛为丸，如小豆大。每服十丸至十五丸，食后温水送下，一日三次。

【功用】补养气血，宣行荣卫。

【主治】久新诸嗽，或上逆涎喘，短气痰鸣，咽干烦渴，大小便涩滞，肺痿劳劣，心腹痞满急痛，膈气上实下虚，酒食积聚不消。

【宜忌】孕妇不可服。

61539　保安延寿方

【方源】《医方易简》卷四。

【组成】金银花三钱　生甘草二钱　黑料豆五钱　黄土五钱

【用法】水煎服。

【主治】四时瘟疫，传染时气。

【宜忌】孕妇勿服。

61540　保安妙贴散

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】透明硫黄（为末）　荞麦面各二两

【用法】上用井花水调和作饼，焙干收下。要得硫黄性和，用时再末之。加乳香少许，井水调，厚敷疮上。如干，以鸡羽蘸新水润之。如此至疮愈方歇。

【主治】痈疽发背肿毒。

61541　保安镇惊丸

【方源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】薄荷三钱　焦山楂五钱　白豆蔻二钱　车前子二钱　广陈皮一钱五分　槟榔四钱　钩藤四钱　牛黄三分　泽泻三钱　草豆蔻二钱　砂仁二钱　甘草一钱　神曲二钱　灯心一钱　胆草一钱　蝉蜕二钱　黄连一钱　天竺黄一钱　僵蚕一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重一钱，朱砂一钱四分为衣。每服一丸，白开水送下。

【主治】小儿急惊风，五积六聚，面黄肌瘦，膨闷胀饱，水泻不止。

61542　保阴生化汤

【方源】《医方简义》卷六。

【组成】川芎二钱　当归四钱　桃仁十粒　炙甘草五分　炮姜五分　穞豆皮五钱　清炙绵耆八分　琥珀五分　银胡八分

【用法】加藕节三个，水煎服。

【主治】产后盗汗。

61543　保寿太阳丹

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】硫黄（光明者，研两复时，取末）十一两　青盐四两半（研）　阳起石（别研如粉）　附子（炮裂，去皮脐）　牛膝（酒浸，切，焙）　楮实　桂（去粗皮）各三两

【用法】将四味草药为末，与前三味研约同搅，再研匀，别取干姜六两（细末），煮生姜面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心酒送下。

【功用】补下元，益精髓，去一切风冷。

61544　保赤万应散

【方源】《经验奇效良方》。

【异名】万应散。

【组成】南星一两　神曲一两五钱　巴豆霜六钱（去净毒油）　辰砂二两　硼砂五钱

【用法】上为极细末。小儿每服三四厘，多不过六厘；大人每服六七厘，多不过一分。小儿急慢惊风，急用白糖滚水调服。

【功用】宽胸膈，消乳癖，化积食。

【主治】小儿食水寒热百病，初发寒热往来，一时惊痫，或哭泣呕吐，或急躁烦闷，不

思饮食，昼夜不安，或累年痞积；以及小儿急慢惊风，痰涎壅盛，泻痢；兼治男妇老幼痰热积聚，胸膈胀满，不思饮食，三焦火盛，胃气腹痛。

61545 保赤万应散

【方源】《全国中药成药处方集》（杭州方）。

【异名】万应保赤散。

【组成】朱砂一两 胆星一两 巴豆霜三钱 六神曲一两五钱

【用法】上为细末。每次三厘至五厘，温开水送服。

【功用】下痰化积，开窍安神。

【主治】食积痰多，腹胀，小儿痫症痞痰，虫积腹痛，胃呆腹胀，大便酸臭，气急痰壅，状类惊风。

61546 保赤万应散

【方源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】雄黄六钱 犀角一钱 琥珀四钱 牛黄一钱 茯神五钱 金箔五十张 广木香五钱 远志二钱 党参一两 天竺黄五钱 全蝎四钱 沉香二钱 僵蚕四钱 甘草二钱 礞石五钱 蝉蜕四钱 菖蒲二钱 朱砂 天麻各五钱 防风四钱 麝香 冰片各三分 胆星二钱

【用法】上为细末，每包一分。每服一包，重者二包，白开水或钩藤煎汤送下。

【主治】小儿急热惊风，痰涎壅盛。

61547 保赤万应散

【方源】《全国中药成药处方集》（兰州方）。

【组成】胆星五钱 巴豆霜四钱 生神曲一两二钱 生大黄八钱 全蝎四钱 朱砂四两八钱 牛黄一钱

【用法】上为细末，每包一钱重。每服一包，白开水送服。

【功用】化痰镇惊，清热消食。

【主治】小儿食物不化，吐乳痞积，抽风发烧，多生疮疖。

【宜忌】忌生冷油腻。

61548 保赤败毒散

【方源】《治痘全书》卷十三。

【组成】升麻 干葛 紫苏 川芎 羌活 地骨皮 甘草 防风 荆芥 前胡 薄荷 牛蒡子 桔梗 枳壳 蝉退 山楂

【用法】水煎服。

【主治】痘疮初热壮甚，或风寒壅盛，致红紫斑影不起，或痘疮暴出之时，热毒之气发越，疹点隐于皮肤之中。

【加减】夏，加香薷；冬，加麻黄。

61549 保赤定惊丹

【方源】《辨证录》卷十四。

【组成】人参三两 白术半斤 茯苓三钱 半夏一两 广木香三钱 柴胡一两 槟榔五钱 荆芥（炒黑）五钱 白芍三两 山楂一两 枳壳一两 麦芽五钱 神曲一两 甘草一两 干姜一两 麦冬（去心）一两 石菖蒲五钱 薄荷叶五钱

【用法】上药各为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。凡遇急慢惊症，以人参三钱煎汤，泡开一丸送下，无不全活。

【主治】小儿惊风。

61550 保赤洗肝散

【方源】《痘疹仁端录》卷六。

【组成】川芎 当归 羌活 防风 山栀 薄荷

【用法】上为末。水煎服。

【主治】痘疹目赤肿痛，红丝绕睛。

61551 保赤紫草膏

【方源】《治痘全书》卷十四。

【组成】僵蚕 全蝎 麻黄 山甲 蝉退 蟾酥 白附子 甘草

【用法】上为末，将紫草一两熬膏，加酒、蜜炼过，匀调服。

【主治】痘疮。

61552 保肝利胆汤

【方源】《老中医临床经验选编》。

【组成】蓟茅根 60 克 鸡内金 6 克 女贞子 旱莲草 柏子仁各 12 克 生地 15 克 冬瓜皮 陈葫芦 车前子各 9 克

【功用】养肝滋阴，利水消肿。

【主治】肝硬化腹水，症见面色黧黑，脸部红丝缕缕，形体消瘦，掌赤如朱，腹胀如臌，或有鼻衄、齿衄，腹部肿块，舌质红，苔光剥，脉弦细或弦滑。

61553　保坤至圣丸

【方源】《集验良方》卷五。

【组成】香附子八两(童便、酒、醋、盐水各制一次)　当归身二两(酒浸，晒干，醋拌炒)　大熟地三两(酒洗蒸，醋炒)　川芎一两五钱(醋炒)　白芍一两五钱(酒拌炒)　延胡索二两(醋炒)　白茯苓二两(人乳拌蒸，晒)　牡丹皮一两(酒洗，晒干，醋拌炒)　白术二两(土拌，切片，麸炒)　绵黄耆一两五钱(蜜水拌炙)　粉甘草一两五钱(蜜水拌炙)

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心淡盐汤或淡醋汤送下，一日二次。

【主治】妇女经闭淋崩，产后诸虚百损，久无子嗣。

61554　保和去滞丸

【方源】《幼科发挥》卷三。

【组成】陈皮五钱　半夏曲　白茯苓　枳实(麸炒)　厚朴(姜汁炒)　槟榔各五钱　莱菔子(炒)二钱五分　木香二钱五分

【用法】上为末，神曲糊为丸，如麻子大。陈米汤送下。

【主治】小儿痢疾有积，胃弱不可重下者。

61555　保和平胃散

【方源】《伤寒大白》卷二。

【组成】小柴胡汤加竹茹　枳实　藿香　厚朴

【功用】消导和胃止呕。

【主治】呕吐有食滞。

61556　保和防毒饮

【方源】《麻疹全书》卷三。

【组成】紫草　桔梗　川芎　山楂　木通　人参　红花　生地　甘草　糯米　灯心

【用法】上加生姜，水煎服。

【功用】保和元气，活血解毒，助痘成浆，易痂易落。

【主治】血热痘疹，见点三日后，不易长大粗肌者。

【加减】便涩腹胀，加大腹皮；紫红不润，加当归、蝉退；出不快，加鼠粘子；陷塌，加黄耆；痛，加白芍；不匀，加防风；水泡，加白术、芍药；嗽，加五味、麦冬；渴，加麦冬。

【宜忌】七八日后，浆退身复壮热，禁用此方。

61557　保和益元散

【方源】《古方汇精》卷一。

【组成】糯稻一升

【用法】上炒出白花，去壳，再加生姜汁拌湿，再炒为末。每服一钱五分，白汤调下。

【主治】噤口痢。

61558　保和温胃丸

【方源】《医略六书》卷二十。

【组成】神曲三两　楂肉三两(炒)　莱菔子三两(炒)　陈皮一两半　草果一两(炒)　木香一两(研)

【用法】上为末，生姜浓汁为丸，收晒七日。每服三钱，生姜汤化开温服。

【主治】食停中脘，抑遏清阳，胸膈痞满，恶寒不止，脉沉实者。

【方论选录】方中神曲化谷食，卜子消面食，山楂化肉食，草果消寒滞，陈皮利气和胃，木香调气醒脾。姜汁丸收，姜汤化下，使食滞消化则胃气清和，而胃阳得伸，恶寒无不自罢矣。此温中消导之剂，为食滞恶寒之专方。

61559　保命人参散

【方源】《不居集》上集卷十四。

【组成】人参　白术各三钱　茯苓一钱　炙甘草五分　橘红八分　枳壳　桔梗　半夏　五味子　桑皮各七分　黄芩一钱

【主治】咯痰带血而出。

61560　保命丹锭子

【方源】《咽喉脉证通论》。

【异名】保命丹(《治疗汇要》卷下)。

【组成】麝香（拣去毛皮，干研）三钱 辰砂（明透者，水飞净）三钱 冰片（梅花大块）一钱 珍珠（研细末）一钱 琥珀一钱 山豆根一两（熬汁另用） 文蛤（洗净，煅）一两 山慈姑（洗去毛皮，净焙）二两 雄黄（鲜明大块，研净）三钱 千金子（白者，去油）一两 红毛大戟（浙江紫大戟为上，北方绵大戟不堪用。去芦根，洗净，焙干为末）一两五钱

【用法】上为末，以糯米粥和山豆根汁打糊为锭，每重一钱。病轻者一锭，重者连服二锭，磨服。

【功用】解诸毒。

【主治】咽喉、口齿新久肿痛。

61561 保命龙虎丸

【方源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】白胶香（别研） 虎骨（酥涂，炙黄） 黑牵牛 乳香（别研） 地龙（去土炒） 古老钱（火烧，醋淬七遍） 木鳖子（去壳，别研） 当归（洗，焙） 川乌头（炮，去皮脐尖） 没药（别研） 附子（炮，去皮脐） 草乌头（锉，盐炒令黄，去盐不用） 牛膝（酒浸一宿，焙干） 肉苁蓉（酒浸一宿，焙干） 巴戟（去心） 自然铜（火煅，醋淬七遍）各等分

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒或盐汤送下；妇人醋汤送下。

【主治】瘫缓，走注疼痛，风劳气冷，腰膝软弱，四肢亸曳；及从高坠下损折，口眼歪斜，久卧床枕，起止不得。

61562 保命当归汤

《原机启微·附录》。为《洁古家珍》“当归汤”之异名。见该条。

61563 保命延寿丹

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】硫黄 明雄黄 辰砂 赤石脂 紫石英 阳起石（火煅，醋淬三次）各二两

【用法】上为细末，同入阳城罐，盖顶，铁丝扎定，盐泥封固，厚一寸，阴干，掘地作坑，下埋一半，上露一半，烈火煅一日夜，寒炉取出，为细末，醋为丸，如梧桐子大。每服十粒，空心送下。童男女五粒，小儿二三粒。

【主治】痈疽，虚劳，中风，水肿，臌胀，脾泄，久痢，久疟，尸厥，两胁连心痛，梦泄遗精，女人血崩白带，童子骨蒸劳热，一切虚羸，黄黑疸，急慢惊风。

61564 保命延寿丹

【方源】《扶寿精方》。

【组成】胡桃仁 小红枣 白蜜各半斤 酥四两 苍术 甘草 厚朴（各去皮） 陈皮（去白） 生熟地黄 天麦门冬（去心） 破故纸 川芎 白芍药 白术 牛膝 香附 肉桂 五味子 半夏 枳壳 荆芥 防风 独活 白芷 细辛 麻黄 小茴香 五加皮各一两 虎胫骨（酥炙）一两 当归 白茯苓 人参 苁蓉（去甲） 枸杞子 何首乌 砂仁 干姜（煨） 杏仁 乌药 川草乌（去皮） 川椒 木香 沉香各五钱

【用法】上各制洗净，锉片，生绢袋盛，堆花烧酒一大坛，入药固封，锅内水煮三时，木棍不住手顺搅，使水周旋，取起埋地三日毕，将药晒干为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每日三十丸，黄酒送下；其药酒空心午、戌任意进一三酌。

【功用】益精润肌。

【主治】虚损风气，湿积心腹，腹胃膀胱疼痛，淋痔膈噎，肤燥疮癞，一切恶症。及妇女赤白带、癥瘕。

61565 保命延龄丸

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【组成】苣胜子（去皮，九蒸九晒） 补骨脂（酒浸一宿，焙） 牛膝（酒浸一宿，焙） 甘菊花 天门冬（去心） 菟丝子（酒浸一宿，湿杵作饼，火焙再杵） 枸杞子 人参（去芦头） 肉苁蓉（酒浸一宿，切，焙） 白茯苓（去皮） 巴戟（去心，生用） 酸枣仁 柏子仁 山药 覆盆子 五味子 楮实 天雄（炮，去皮尖） 各一两 肉桂（去粗皮）四两 生干地黄八两（切细，新瓦上炒令干）

【用法】上为细末，春夏用白沙蜜、秋冬用蒸枣肉为剂，加好胡桃十枚（去皮），同药剂于臼内捣为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至五十丸，空心、食前温盐汤送下。

【功用】安神养气，补填骨髓，起弱扶衰，润泽肌肤，聪明耳目。久服黑髭发，牢牙齿，能夜读细书，心力不倦。

61566　保命安胎汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】砂仁　香附　陈皮　紫苏　秦艽　川芎　当归　白芍　黄耆　白术　杜仲　艾叶　酒芩　童便

【主治】妊娠腹中有孕已四五月，因惊跌仆，胎动不安，已下血者。

【方论选录】惊则气逆，惊则心虚，神不守舍。惊则肝风愈炽，砂、附、陈、苏皆所以顺气也；耆、术、归、芍引以杜仲，佐以童便，皆可安心神，定心气，而固肾安胎也；艽、芎以平肝风；芩、童便凉血宁心；杜仲得艾叶则益血补肾。惊退神安，血不妄行而胎可保矣。

61567　保命拈痛散

《医统》卷六十一。为《洁古家珍》"拈痛散"之异名。见该条。

61568　保命点眼药

《保婴撮要》卷四。为《洁古家珍》"点眼药"之异名。见该条。

61569　保命胜金丹

【方源】《良朋汇集》卷四。

【组成】南香附一斤（第一次用童便浸，二次酒浸，三次盐水浸，四次醋浸。每次按春五、夏三、秋七、冬十日，取起晒干）　官拣参　川当归　赤芍药　白芍药　香白芷　川芎　延胡索　远志（去心）　白术各一两五钱　桂心　白茯苓　牡丹皮　川牛膝各二两五钱　大熟地四两五钱（酒洗，蒸）　白薇四两（去芦）　大甘草七钱五分　藁本三两

【用法】上除香附另制外，十七味俱用煮酒亦按春五、夏三、秋七、冬十日浸过，晒干为末听用。后加赤石脂、白石脂各一两，此二味用好醋浸三日，入火煅红，再淬入醋内，如此七次，焙干为末，和入药内。滴乳香、明没药各二两，真琥珀五钱，朱砂五钱（飞过），上四味用酒煮过，研成膏，和入前药内，炼蜜为丸，如弹子大，以金箔为衣，晒干，入瓷罐收贮，封固听用。凡男妇遇诸证，取药一丸，放在瓷碗内，加煮酒半碗蒸服；若女人胎前产后月子诸病，用滚水小半碗，将药用手捺碎，入碗内泡开，上用碟盖，如水冷，将碗放在锅内慢火煮热，取出碗，以银匙研细服之；如月子病，用些许醋滴在药碗内服之，若碗内药末净，再用酒涤之饮尽，令其半醉，服后稍坐片时，待身觉困倦，可卧，用衣被盖暖，使汗出通身畅快，百病退消；如女人经至而腹痛者，服此一丸，下月即不作痛；如行经前依法连服三日，任其久不生育，老必能成孕。经后第三日服药交媾，一定生男，六日行事，则生女矣。

【功用】活经益精，补虚种子。

【主治】男妇诸虚百损。女子胎前产后，血枯经闭，崩漏，赤白带下；男子遗精白浊，腰疼腿痠，精寒阳痿，咳嗽痰喘，耳鸣眼花。

【宜忌】赤白石脂、真琥珀、乳香、没药、朱砂，此六味女人可用，男人不可用。

61570　保金宣毒饮

【方源】《杂症会心录》卷下。

【组成】南沙参三钱　麦冬三钱　百合五钱　贝母三钱　笋尖五钱　糯米五钱　鲫鱼一尾

【用法】水煎服。

【主治】疮症误治，毒气入肺，诸证悉急。

61571　保肺济生丹

【方源】《医醇賸义》卷三。

【组成】天冬一钱五分　麦冬一钱五分　人参一钱　沙参四钱　五味五分　玉竹三钱　女贞子二钱　茯苓二钱　山药三钱　贝母二钱　茜草根二钱　杏仁三钱

【用法】上加藕三两（切片），煎汤代水煎药服。

【主治】肺虚而咳，肌表微热，神倦气短，不

时火升，失血咽痛者。

61572 **保肺健脾汤**

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】白术七分(炒) 白芍七分(炒) 苡仁一钱 白扁豆一钱(炒) 黄耆七分 沙参八分 陈皮六分 甘草六分 当归六分 白茯苓七分

【用法】水煎服。兼服健脾丸、八珍散。

【主治】小儿因肺经受伤，或久咳后而成肺痈，而多青白，或泄泻肚痛，或朝凉暮热；或病中服药失序，亏损脾肺。

61573 **保肺健脾汤**

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】苡仁 白术(炒) 山药 陈皮 白茯苓 白芍(炒) 当归 桑皮

【用法】水煎服。兼服健脾肥儿丸。

【主治】小儿顿咳日久，面色青白，身体瘦弱，或为药饵伤败元气者。

61574 **保肺雪梨膏**

【方源】《重订通俗伤寒论》引胡在滋方。

【组成】雪梨六十枚(压取汁二十杯) 生地 白茅根 生藕(合取汁十杯) 白萝卜 麦冬 荸荠(合取汁五杯)

【用法】上加白蜜一斤，饴糖八两，竹沥一杯，柿霜一两，熬成膏。每于饭后及临卧取汁一杯，开水冲服。

【功用】滋液润燥，化痰保肺。

【主治】肺燥干咳失血，及肺痿出血，肺痈大势已退，余热未除。

61575 **保育回生丸**

《全国中药成药处方集》(武汉方)。为《金鉴》卷四十八"回生丹"之异名。见该条。

61576 **保胃安脾汤**

【方源】《医学探骊集》卷五。

【组成】郁金三钱 延胡索四钱 紫蔻仁二钱 枳实三钱 香附米三钱 牵牛二钱 毛苍术四钱 茯苓三钱 甘草二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】黄疸。因内积郁闷之气，客于脾胃，使脾胃之气不得自如，久之其脾胃虚衰，其败坏之色先染脾胃脏腑，久之随血络液络将其黄色散布于周身，甚者其面目黄如橘色，饮食俱懒入口。

【方论选录】此方以紫蔻为君，专能通行脾胃之真气；以苍术、茯苓、甘草为臣，扶养脾胃之正气；以元胡、香附、郁金为佐，开解脾胃旁结之气；以枳实、牵牛为使，稍为推荡其浮塞。脾胃复元，黄色自脱矣。

61577 **保胃破痰丸**

【方源】《普济方》卷一五八。

【组成】天南星(生) 半夏(生) 橘红 寒水石(煅通赤) 白矾(枯) 川乌(炮，去皮脐) 白附子(生) 干姜(炮) 赤茯苓各等分

【用法】上为末，用生姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，浓生姜汤送下，不拘时候。

【主治】肺气咳嗽，痰厥头晕，呕吐涎沫，喘满气急。

61578 **保胎无忧丸**

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】党参(饭上蒸三次) 白术(蜜炙黄勿焦) 当归(酒炒)各四两 大熟地(酒蒸)六两 茯苓(乳蒸三次) 山药(乳蒸三次) 杜仲(姜汁炒断丝) 白芍(酒炒)各三两 川芎(炒黑)二两 续断(酒洗晒干)五两 子芩(酒炒) 砂仁(炒，另研细末) 甘草(蜜炙)各一两 糯米(炒)五两

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三钱，白汤送下，早晚各一次。

【功用】安胎。

【主治】七月堕胎。

61579 **保胎无忧散**

【方源】《达生编》卷下。

【组成】大熟地五钱 山萸肉二钱五分 益母草一钱 条黄芩五分 麦冬二钱五分 生地一钱五分 阿胶一钱 北五味一分

【用法】从受胎两个月服起，每日一剂，服

五十剂止。

【主治】小产诸症。

61580　保胎牛鼻丸

【方源】《中药成方配本》(苏州方)。

【组成】黄牛鼻一具　党参二两　蜜炙黄耆二两　白术一两　归身一两五钱　白芍一两五钱　熟地四两　阿胶一两　怀山药三两　川断三两　杜仲四两　黄芩七钱　炙甘草五钱　春砂仁七钱　卷心荷叶一两　蚕茧壳一两

【用法】先将黄牛鼻、荷叶、蚕茧壳等三味炙灰存性,为末候用;次将熟地捣烂,与诸药打和(阿胶除外),为细末,与前药末和匀;再将阿胶用开水烊化泛丸,如绿豆大,约成丸二十一两。每次一钱五分至二钱,开水吞服,一日二次。

【功用】补气血,安胎元。

【主治】惯易流产。

61581　保胎如圣散

【方源】《女科切要》卷三。

【组成】当归　红花　益智　白芍　益母草　甘草

【用法】水煎服。如儿不下,取鲤鱼一尾,同药再煎,加醋一杯,服乌金丸。

【主治】产妇忽然腹痛,先行其水,婴儿不降,忽误吞热物伤胎者。

61582　保胎和气饮

【方源】《济阴纲目》卷八。

【组成】枳壳四钱　厚朴　香附子各三钱　砂仁　苍术　橘红各二钱　苏叶一钱　甘草九分　小茴香一钱半

【用法】上銼,分作三服。每服用水一钟半,煎七分服。

【主治】①《济阴纲目》:胎前四五个月,身体困倦,气急发热,饮食无味,贪睡头晕等症。②《医略六书》:妊娠胀满发热,脉弦滞者。

61583　保胎和气饮

【方源】《女科切要》卷三。

【组成】藿香　厚朴　广皮　枳壳　砂仁　黄芩　桔梗　苍术　小茴　紫苏

【用法】水煎服。

【主治】妊娠二月,负重触伤胎气,头晕目眩,恶心呕吐,不思饮食。

61584　保胎神佑丸

《女科辑要》卷下。为《冯氏锦囊·杂症》卷十七"保胎神效丸"之异名。见该条。

61585　保胎神效丸

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十七。

【异名】保胎丸(《纲目拾遗》卷三引《良方集要》)、保胎神佑丸(《女科辑要》卷下)。

【组成】白茯苓二两(要色白坚重者)　真于术一两(米泔水浸一宿,去皮芦净,切片晒干,同黄土炒)　条芩(酒拌炒,须拣实心细条)　香附子(童便浸二日,炒熟)　元胡索(陈米醋拌炒)　红花(隔纸烘燥)　益母草(净叶)各一两　真没药三钱(新瓦上隔火焙去油)

【用法】上药各为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每日七丸,空心吞服,不可因其丸小加至七丸之外。孕妇胎不安者,一日可服四五次,安则照常。如遇腹痛重坠,或作胀坠,宜即服之。如受胎三五月常坠者,须先一月制服,能保足月。若见红将坠,急服此丸。

【功用】保胎。

【主治】孕妇胎不安,腹痛腰痠,或作胀坠,或三五月常坠,或见红将坠。

【宜忌】①《冯氏锦囊·杂症》:谨戒恼怒、房事及辛辣生冷之品。②《胎产心法》:忌食煎炒、辣椒、发气、闭气、糟味、冷水、冷物。

61586　保胎益母丸

【方源】《履霜集》卷二。

【组成】益母草(上截)三两　香附米二两(童便制)　熟地黄三两　归身三两　白芍三两(酒炒)　川芎二两(酒洗)　苏梗二两(忌鲤鱼)　陈皮三两　炙草二两　白茯苓二两　白术二两　条芩二两(酒炒)　莲肉二两(去皮心)

【用法】上为末,炼蜜为丸,每丸重三钱,晒

干收用。每日用一丸，研末，或热黄酒送下，或蜜汤送下；有痰者，生姜汤送下；病甚者，朝夕各一丸，以愈为度；或丸如绿豆大，每服三钱，亦可。

【主治】饮食劳倦所伤，或因外感风寒，或负重闪挫跌仆，或房事相犯，或郁怒伤肝脾，以致胎动者。

61587 保胎资生丸

【方源】《广笔记》卷二。

【异名】资生丸（原书同卷）、人参资生丸（《金鉴》卷四十）。

【组成】人参（人乳浸，饭上蒸，烘干）三两 白术三两 白茯苓（细末，水澄蒸，晒干，加人乳再蒸，晒干）一两半 广陈皮（去白，略蒸）二两 山楂肉（蒸）二两 甘草（去皮，蜜炙）五钱 怀山药（切片，炒）一两五钱 川黄连（如法炒七次）三钱 薏苡仁（炒三次）一两半 白扁豆（炒）一两半 白豆蔻仁（不可见火）三钱五分 藿香叶（不见火）五钱 莲肉（去心，炒）一两五钱 泽泻（切片，炒）三钱半 桔梗（米泔浸，去芦，蒸）五钱 芡实粉（炒黄）一两五钱 麦芽（炒，研磨取净面）一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大，每丸重二钱。用白汤或清米汤、橘皮汤、炒砂仁汤嚼化下。

【功用】①《不居集》：妇人男子，调中养胃，饥能使饱，饱不使饥。②《霍乱论》：调和脾胃，运化饮食，滋养荣卫，消除百病，可杜霍乱等患。

【主治】①《广笔记》：妊娠三月胎堕。②《成方便读》：脾胃气虚，湿热蕴结，以及小儿疳积腹胀，面黄肌瘦，久泄久痢等一切脾胃不足之症。

【方论选录】①《不居集》：此方以参、术、苓、草、莲、芡、山药、扁豆、苡仁之甘平，以补脾元；陈皮、曲、麦、豆蔻、藿、桔之辛香，以调胃气；其有湿热，以黄连清之燥之。既无参苓白术散之滞，又无香砂六君之燥，能补能运，臻于至和，名之资生，诚信不诬。②《成方便读》：欲资生者，必先助其脾胃，故以四君子补益脾胃，合之山药、莲肉、扁豆、芡实之属以协助之。但脾者喜燥而恶湿，善运而不停，故以陈皮、白蔻香燥以舒之，苓、泽、苡米淡渗以利之，楂、曲、麦芽助其消导，藿香、厚朴借以温中，桔梗以引清气上行，黄连能使湿热下降。如是则脾复其常，可以资助生气矣。

【宜忌】忌桃、李、雀、蛤、生冷。

61588 保胎清火汤

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】黄芩一钱一分 砂仁 荆芥穗 当归身 白芍 连翘 生地黄 广陈皮各一钱 川芎八分 甘草三分

【用法】上锉。以水二钟，煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】孕妇眼目翳膜红痛。

61589 保胎雄鸡汤

《温氏经验良方》。为《千金》卷二“雄鸡汤”之异名。见该条。

61590 保胎磐石丸

【方源】《女科辑要》卷下。

【组成】怀山药四两（微炒） 杜仲三两（去粗皮，净，盐水炒断丝） 川续断二两（酒炒）

【用法】上为末，糯米糊为丸，如绿豆大。每服三钱，米汤送下。凡胎欲堕者，一服即保住；惯小产者，宜常服之；或每月服数次，至惯半产之月即服之，无不保全。

【功用】保胎。

【主治】堕胎小产。

61591 保养元气膏

【方源】《景岳全书》卷六十四引邵真人方。

【组成】麻油一斤四两（加甘草二两，先熬六七滚，然后下诸药） 生地黄 熟地黄（俱酒洗） 麦门冬 肉苁蓉（酒洗） 远志肉 蛇床子（酒浸） 菟丝子（酒浸） 牛膝（酒洗） 鹿茸 川续断 虎骨 紫梢花 木鳖子 谷精草 大附子 肉桂各五钱

【用法】上熬成，以煮过松香四两、飞丹半斤收之。次下龙骨、倭硫黄、赤石脂各二钱，又

次下阳起石三钱、麝香五分、蟾酥、鸦片各一钱，又次下黄占五两，上煎成，入井中浸三四日。每用膏七八钱，红绢摊贴脐上或腰眼间，每贴五六十日再换。

【功用】助元阳，补精髓，周血脉，镇玉池，养龟存精；妇人经净之时，去膏而泄，则可成孕。

【主治】腰膝疼痛，五劳七伤，诸虚百损，半身不遂，膀胱疝气，带浊淫淋，阴痿不举。

61592　**保真广嗣丸**

【方源】《全国中药成药处方集》(杭州方)。

【组成】潞党参二两　车前子一两五钱　怀牛膝(酒浸)　天门冬各二两　石菖蒲　炒远志各一两　当归(酒洗)二两　五味子一两　山萸肉　怀山药各二两　覆盆子一两五钱　杜仲(姜汁炒)　巴戟肉各二两　赤石脂(另研)一两　地骨皮一两五钱　广木香　大生地　枸杞子各二两　川椒(微炒)一两　泽泻一两五钱　菟丝子(酒炒)　淡苁蓉各四两　大熟地　柏子仁　白茯苓各二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸。每服三至四钱，空腹淡盐汤送下；冬月温酒或开水送下。

【功用】补益气血，滋培肝肾。

【主治】男子诸虚羸瘦，精神衰弱，腰膝痠痛，阳痿乏嗣；妇人下元虚冷，久不孕育。

61593　**保真广嗣丹**

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】鹿角胶　鳔胶(各炒成珠)　熟地各三两　山药　茯苓　山萸　五味　杜仲　远志　益智仁　川楝子　巴戟　故纸　胡芦巴各二两　沉香(另为末)五钱

【用法】上为末，和匀，用苁蓉净肉二两，好酒煮，烂捣如糊，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心温酒送下。

【功用】培补元阳。

【主治】肾气虚寒，不能生育。

61594　**保真护命丹**

【方源】《普济方》卷二六五。

【组成】天麻(锉)　牛膝(去苗，锉)各四两　天仙子一升(净肉，炒黄)

【用法】上以绢袋盛，浸酒中七日七夜，取药炒干为末，用浸药酒和面糊为丸，如梧桐子大。每日二十丸，空心酒送下。

【功用】消阴。

【主治】阴气太盛，五脏昏浊，食毕困乏，虽未中年，衰老先至。

61595　**保真种子膏**

【方源】《医统》卷九十三。

【组成】真香油一斤四两　甘草一两　谷精草五钱　紫梢花　蛇床子(酒浸干)各二钱　入参　天门冬(去心)　麦门冬(去心)　生地黄(酒洗)　熟地黄(酒洗)　远志(甘草水煮，去心)　菟丝草　牛膝(酒洗)　鹿茸(酥炙去毛)　虎骨(酥炙)　川续断　木鳖子(去壳)　肉豆蔻(面包煨)　肉苁蓉(酒洗去甲)各四钱(以上一齐下)　大附子一个(制)　海狗肾一具(制)　杏仁(去皮尖)　官桂　铅粉八两(续续下，以槐条不住用手搅，滴水成珠为度)　松香一两　黄蜡五钱　雄黄　硫黄　阳起石　赤石脂各二钱(一齐下)　沉香　木香　丁香　乳香(制)　没药(制)　蟾酥　鸦片　麝各一钱(一齐下)

【用法】用新铁锅一口，以桑柴火浸熬，先下香油、甘草，同煎五七沸；次下谷精草等十七味，文火熬至焦色，滤去滓；再下附子等四味，熬焦，去滓净；再下铅粉，以槐条不住手搅，滴水成珠，方下黄蜡等六味，搅使温；方下沉香等八味，搅匀，以银罐盛之，封固，悬井中七日出火毒。用红绢丝摊贴肾俞，每个重七钱；丹田每个重四钱。贴六十日揭去，入房即孕。如丹田有毛，隔纸贴，外以软帛束缚，多行济火之法，其效甚大。

【功用】锁玉池，固精不泄，壮阳保真，温肾俞，暖丹田，子午既济，百病自除。一膏能贴六十日，金水生时，入房即孕。又贴返老还童，乌须黑发，行步如飞，延年不衰。

【主治】腰腿寒湿，风气疼痛，半身不遂，五劳七伤，下元虚冷，不成胎息。

【备考】方中杏仁、官桂用量原缺。

61596 保真种玉丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】鹿茸（去毛）一两二钱 鹿肾二具 海马八具 虎骨（炙）一两 狗肾六具 熟地八钱 肉桂（去粗皮）一两 山药一两二钱 当归一两六钱 杜仲炭一两二钱 白术（炒）一两二钱 牛膝一两二钱 枸杞一两二钱 五味子（炙）一两二钱 茯苓一两二钱 党参（去芦）三两 补骨脂（炒）二两 菟丝子二两 核桃肉二两 小茴香（炒）二两 沙苑子二两 附子八两 苁蓉八两 巴戟肉（炙）八两 龙骨（煅）一两 母丁香三两 黄耆二两 山萸肉（炙）一两二钱 甘草（炙）一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重三钱。每服一丸，温开水送下，一日二次。

【功用】滋补腰肾，添精益髓。

【主治】肾气亏虚，阳痿不兴，腰膝无力，久无子嗣。

61597 保真神应丸

【方源】《玉案》卷四。

【组成】辽五味（拣净）一斤 杜仲（姜汁炒） 阿胶 白术各二两 贝母 白茯苓 花椒目 荷叶（煅灰存性） 怀生地各四两（用柏子仁三钱、砂仁三钱，绢袋盛，加生地同煮，拣去柏子仁、砂仁）

【用法】上为末，以黑枣肉同地黄汁为丸。每服三钱，空心白滚汤送下。

【主治】男女吐血，咳嗽气喘，痰涎壅盛，骨蒸潮热，面色萎黄，日晡面炽，睡卧不宁者。

61598 保婴万灵丹

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】巴豆一钱（微炒，研末）

【用法】掺膏药上贴囟门。

【主治】小儿初生，口内两腮肿起。

61599 保婴五疳膏

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】青皮（麸炒）二钱 橘红五钱 白术（去芦，蜜水炒）一两半 白茯苓七钱半 麦门冬（去心）一两 使君子肉（锉，炒）七钱五分 山楂肉五钱 麦芽（炒）五钱 金樱子、肉（炒）各五钱 芡实仁二钱半 莲心肉（隔纸炒）五钱 甘草二钱

【用法】上为末，和匀，重七两，每次用药末一两，炼蜜四两，调和成膏。每日中晌、晚间各服一二茶匙，温水漱口。

【功用】无疾预服此药，则诸病不生。元气虚者，服半月身体健壮。

【主治】小儿五疳潮热，面黄肌瘦，烦渴，肚大青筋，手足如柴，精神困倦。

【加减】身热咳嗽，加地骨皮、百部；肚腹饱胀，大便为稀水，腹鸣作声，或因虫出不知，加槟榔二钱，木香一钱；禀受气弱，加人参二钱半。

61600 保婴艾叶汤

【方源】《永类钤方》卷二十一。

【组成】陈艾叶（炒） 当归各一两 干姜 木香 制厚朴（锉） 肉豆蔻各半两

【用法】上为末。粟米煎服。

【主治】冷痢肚痛。

61601 保婴艾叶汤

【方源】《普济方》卷三九六。

【组成】陈艾叶（炒） 当归各一两 干姜 木香 厚朴（制） 肉豆蔻各半两 草果半两 良姜 丁香各一两 甘草五分

【用法】上为末。粟米煎服。

【主治】小儿冷痢肚痛。

61602 保婴出痘方

【方源】《成方便读》卷四引《福幼编》。

【异名】保婴稀痘方（《医学集成》卷三）。

【组成】生地 当归 赤芍各二钱 金银花 红花 桃仁 荆芥穗各一钱 生甘草五分

【用法】上用水二茶杯，煎至一杯。再用小儿本人落下脐带二三寸，炭火瓦上焙干，研末入药，一日内陆续与小儿服完，次日即出痘点，三日收功，不灌脓亦不结痂。须在小儿初生十八日内服之有效。

【功用】预防痘疮。

【方论选录】方中生地、归、芍益其虚，桃仁、红花行其滞，银花、甘草解其毒，而以荆芥穗从营透表，以达之于外。然无所引之物，则深藏之胎毒何由领出？故特用本人落下之脐带，同气相求，以为导引，且脐带为生命之蒂，元气所系，其阴阳未剖之前先具此物，灵通呼吸，混合太虚，较痘苗尤为功大耳。

61603　保婴百中膏

【方源】《古今医鉴》。

【组成】沥青二斤半　威灵仙一两　蓖麻子一百二十枚（去壳，研）　黄蜡二两　乳香一两（另研）　没药一两（另研）　真麻油（夏）二两（春秋三两，冬四两）　木鳖子（去壳）二十八斤（切碎，研）

【用法】上先将沥青同威灵仙下锅熬化，以槐柳枝搅匀，须慢慢滴入水中，不粘手、拔如金丝状方可。如硬，再旋加油少许；如软，加沥青。试得如法，却下乳香、没药末，起锅在灰上，再用柳条搅数百次，又以粗布滤膏，在水盆内拔扯如金丝，频换水浸二日，却用小铫盛顿。如落马坠车，于破伤疼痛处，火上炙热，贴透骨肉为验。连换热水数次浴之，则热血聚处即消。小儿疳癖贴患处，泻痢贴肚上，咳嗽贴背心上。

【主治】小儿疳癖泻痢，咳嗽，不肯服药；及治跌扑伤损，手足肩背，并寒湿脚气，疼痛不可忍者。

61604　保婴百补丸

《痘学真传》卷七。即《痘疹金镜录》卷四“保婴百补汤”改为丸剂。见该条。

61605　保婴百补汤

【方源】《痘疹金镜录》卷四。

【组成】当归　芍药　地黄　白术　人参　茯苓　山药　甘草

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【功用】调补气血，资养脾胃。

【主治】①《痘疹金镜录》：痘疹九日浆足，无他症。②《简明医彀》：实热血热痘，八九日无他症。

【加减】气虚证，加黄耆一钱，官桂少许；有兼证当审虚实随症加减。

【方论选录】《痘学真传》：归、地、芍药以养血，参、术、茯苓、山药、甘草以补气，而补气之药俱入太阴，虽云气血兼补，实归重于脾，补脾胃则诸脏皆补，故曰百补。

【备考】本方改为丸剂，名“保婴百补丸”（见《痘学真传》）。

61606　保婴百补汤

【方源】《慈幼心书》卷五。

【组成】人参　白术　茯苓　甘草　川芎　当归　熟地　白芍　山药　桔梗　莲肉　大枣

【主治】痘疮九日浆足之后，别无他症。

【加减】气虚者，加耆、桂；有热，加芩、连、木通；有湿，加猪苓、泽泻、羌活；不易靥者，本方加敛脓散催之。

61607　保婴夺命丹

【方源】《全国中药成药处方集》（大同方）。

【组成】姜半夏　天南星各一钱半　全蝎一钱　明雄黄　天竺黄各五分　朱砂一钱　牛黄二分　川黄连一钱　僵蚕一钱半　煅礞石一钱　明天麻一钱半　琥珀　毛橘红　钩藤　锦纹大黄各一钱　麝香五厘　冰片三分　紫赤金十张　川贝母一钱半

【用法】上每一分作一丸，绵纸包，蜡固封。一岁以内婴儿分二次服；一岁以外一次服。

【主治】感受时疫，痰涎壅盛，咳嗽呕吐，手足抽搐，胸膈膨胀，憎寒壮热，天吊急惊风。

61608　保婴育生丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】银花五钱　连翘五钱　橘红五钱　贝母五钱　僵蚕（炒）三钱　竺黄三钱　天麻三钱　法半夏三钱　防风三钱　胆星三钱　钩藤三钱　焦三仙一两　黄芩四钱　甘草五钱　芥穗二钱　薄荷二钱　活蝎子十二个　桑叶五钱（上除活蝎外，为末。）　雄黄五钱　琥珀四钱　冰片二钱　麝香一钱

【用法】上和匀，炼蜜为丸，重五分，朱砂为衣，蜡皮封固。每服一丸，温开水送下，一日二次，三岁以下者酌减。

【功用】清热退烧，化痰消滞。

【主治】小儿外感风寒，停食发烧，咳嗽痰盛，急热惊风。

61609 **保婴桃红散**

【方源】《急救仙方》。

【组成】川乌 白附子各五钱（生用） 大南星 陈半夏各二钱（生用）

【用法】上锉，以井花水拌湿，瓦器中浸之，日晒夜露，春五、夏三、秋七、冬十日，一日一换新水，日足，晒干为末。以好大粒朱砂五钱，另研为细末，和如桃红色为度。急惊用薄荷、灯心、金银环同煎汤送下；慢惊用全蝎、钩藤同煎汤送下；呕泻用生姜、葱白煎汤送下；腹痛淡生姜汤送下；咳嗽米饮加醋呷下；或桑白皮煎汤送下；胎惊夜啼及觉腹中有虫，用苦楝根皮煎汤送下；伤风咳嗽，用生姜、葱白汤送下；疟疾，用生姜、葱白汤送下，后用生姜汤调末子服尤佳。

【主治】小儿急慢惊风，腹痛呕泻，胎惊夜啼，伤风咳嗽等。

61610 **保婴秘效散**

【方源】《玉案》卷六。

【组成】牛黄一钱 胆星 琥珀 珍珠各一钱五分 滑石 茯神 远志各二钱 麝香 朱砂各六分 大黄（九蒸九晒）五钱

【用法】上为末。每服四、五分，灯心汤调下。

【主治】小儿急慢惊风，或胎惊，脐风撮口，天吊夜啼。

61611 **保婴稀痘方**

【方源】《良朋汇集》卷四。

【组成】羌活 麻黄各六分 生地 黄柏 升麻 甘草 黄连 归身各四分 防风 川芎 黄芩（酒洗） 藁本 柴胡 干葛 苍术各三分 红花 细辛 苏木 陈皮 白术各二分 吴萸 连翘各一分

【用法】每逢立春、立夏、立秋、立冬前一日，用水二钟，煎八分，露一宿，次早仍温热服。

【功用】四季俱服，永不出痘；服一二次者，出痘稀。

61612 **保婴稀痘方**

《医学集成》卷三。为《成方便读》卷四引《福幼编》“保婴出痘方”之异名。见该条。

61613 **保婴槐花散**

【方源】《永类钤方》卷二十一。

【组成】荆芥穗 槐花 制枳壳 甘草各等分

【用法】上为末。蜜汤调服。

【主治】小儿因热便血。

61614 **保婴解毒丸**

【方源】《广嗣纪要》卷十五。

【组成】甘草（半生半熟） 黄连（去枝梗）各三钱 黄柏（去皮，蜜水炒）二钱 辰砂（水飞）二钱

【用法】上为细末，腊月雪水为丸，如芡实大。未满周岁者半丸，周岁者一丸，灯心煎汤化下。

【主治】胎热，胎惊，胎黄，脐风，丹瘰疮疹，一切胎毒。

【方论选录】方中甘草半生以解毒，半熟以温中；黄连解毒泄火；黄柏泻阴火；辰砂镇惊解毒。

61615 **保婴镇惊丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】大黄一两五钱 甘草一两 朱砂面三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸五分重，蜡皮或蜡纸筒封固。每次服一丸，周岁小儿酌减，白开水化服。

【功用】清热、镇惊、导滞。

【主治】小儿急热惊风，实热目赤，口疮，便燥，小便赤黄。

61616 **保婴镇惊散**

【方源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】僵蚕五钱　朱砂四钱　胆星二钱　天竺黄三钱　川贝母二钱　雄黄一钱五分　金箔十张　法夏　琥珀各二钱　甘草一钱五分

【用法】上为细末。周岁以下每服一分，周岁以上酌增，白开水送下。

【主治】小儿急热惊风，痰涎壅盛。

【宜忌】脾虚泄泻忌服。

61617　**保童肥儿丸**

【方源】《外科传薪集》。

【组成】参叶五钱　金樱子(去核)一两　山楂肉二两　麦芽一两　建莲四两　五谷虫二两　茯苓一两　芡实一两　薄橘红一两　白术二两　使君子五钱　肥知母一两　鸡内金一两　砂仁五钱　青皮一两　地骨皮一两(炙)

【用法】上为细末，莲子粉为丸，如弹子大。小儿疳积，米汤化服；肠风下血，石榴皮烧灰调服。

【功用】肥儿。

【主治】小儿疳积，肠风下血。

61618　**保长寿命椒丹**

【方源】《鸡峰》卷二十九。

【组成】辰砂一两(细研如尘)　椒(拣大粒色红者，去枝梗并合口者，不用目)一两半

【用法】上以生绢袋盛，用无灰醇浓酒浸椒袋，令酒在袋上三二分，一宿取出，空少时，入朱砂钵内滚之为丸，余者滴浸椒酒少许滚之，令朱砂尽为度，晒干。每服五十丸，加之百丸，空心酒送下。

【功用】暖水脏，降气明目，补骨髓。

【宜忌】不得用火焙，不可犯生水。

61619　**保生大佛手汤**

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】当归一两五钱　川芎一两　杜仲一两　甘草五钱　香附五钱　阿胶五钱(溶化入)　熟艾五钱

【用法】水煎成入胶，分二次服。

【功用】大补气血，行气止痛。

【主治】妇人怀孕，或从高坠下，致伤胎气，腹痛见血；或举重用力，如育蚕采桑，负梯携篮，簸谷舂米，汲水浣衣，偶不小心，便有筑磕伤胎之患，以致胎动下血不止，或胎死腹中。

【加减】如胎不死，痛不止，血仍下者，乃伤胎之外络或腰胁间血也，稍加乳香五分，没药五分，发灰一钱。

61620　**保安炙甘草方**

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】粉草(以山泉溪涧长流水一小碗，徐蘸，慢火炙，水尽为度)

【用法】上为粗末，用醇酒三碗，煎二碗，空心随意温服。

【功用】活血消毒。

【主治】痈疽漏疮。

61621　**保赤却病良方**

【方源】《集成良方三百种》卷上。

【组成】黄栀子(研末)　鸡蛋清

【用法】上与白面掺和调匀，形如浆糊状。摊敷婴孩两脚心，用布包扎，每日一换。敷后数日，脚心必现青紫色，此乃胎毒引外。

【功用】预防惊风，祛除胎毒。

【主治】小儿胎毒、惊热诸症。

61622　**保婴至宝锭子**

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷五。

【异名】至宝锭子(《幼科指掌》卷二)。

【组成】留白广陈皮一两(炒)　莱菔子(拣红润者，洗净，晒干)一两(炒)　蓬术一两(炒)　三棱一两(炒黄)　麦芽(炒熟，另磨净末)一两　厚朴一两(姜汁炒)　苍术一两(炒深黄)　香附子一两(炒)　草豆蔻(拣粗绽者)一两(炒)　鹅眼枳实(取新切而紧小者)一两(炒)　山楂肉一两五钱　神曲二两(打糊为锭)

【用法】上为细末，神曲糊为锭，每锭约重三四分。每岁磨服半锭，生姜汤磨下。

【主治】婴孩风痰发热，惊疳吐泻积滞。

61623　**保婴济痘神丹**

【方源】《古方汇精》卷四。

【组成】白豆 赤豆 绿豆各三两（俱连壳，甘草煎汁浸一宿，晒、研） 蝉蜕（去头足，净水飞） 银花 元参 生地各二两 荆芥穗 生耆各三两 人中黄一两五钱 归身一两

【用法】上为末，用胡荽一两，酒浸一宿，煎汁为丸，如黍米大，辰砂五钱为衣。每服一钱，初见点时，灯心汤送下；灌脓浆，糯米一撮煎汤送下；初见不起发，馒笼膏三厘煎汤送下。

【主治】痘疮。

61624 保元生脉固本汤

【方源】《金鉴》卷四十。

【组成】天冬 麦冬 生地 熟地 人参 黄耆 炙草 五味

【功用】固本，调脾肺肾三经之虚。

【主治】肺脾肾虚，肺痿咳血成劳者。

61625 保命延寿烧酒方

【方源】《便览》卷三。

【组成】人参 当归 白茯 乌药 杏仁 砂仁 川乌 川草乌 何首乌 五加皮 枸杞子 牛膝 杜仲 肉桂 苍术各五钱（制） 肉苁蓉 破故纸 甘草各一两 木香 枳壳 干姜 虎骨（酥炙） 香附 白芷 厚朴 陈皮 白术 川芎 麻黄 独活 羌活 川椒（去合口及目） 白芍 生地 熟地 天冬（去心） 麦冬（去心） 防风 荆芥 五味子 小茴香 细辛 沉香 白蔻各三钱 枣肉二两 真蜜一斤 核桃仁四两 真酥油半斤 天麻三钱 生姜四两

【用法】上除酥、蜜二味外，将前四十八味各精制称足，装入绢袋中，入无水高烧酒四十斤同酥、蜜入坛中，将坛口密封严固，放人大锅中，注水，桑柴文武火烧三炷香，待大锅中水冷取出，埋阴地三日，出火毒。常饮一二杯。

【功用】除万病，和缓脾胃，补养丹田，强壮筋骨，益精补髓，身体康健，耳目聪明，定五脏，安魂魄，润肌肤，和容颜，强阴壮阳。

【主治】诸虚百损及五劳七伤，左瘫右痪，口眼歪邪，半身不遂，语言謇涩，筋脉拘挛，手足顽麻，浑身疮癣，伤风，痔漏紫白，中风，风寒湿脚气，二十四般积气，痰气，膀胱疝气，十膈五噎，身体羸瘦，腰膝腿疼，四肢无力，耳聋眼花，丹田虚冷，诸般淋痛，妇人经水不调，脐腹疼痛，胁肋虚胀，面黄肌瘦，口苦舌干，饮食无味，四肢倦怠，头晕眼花，神思惊悸，夜多盗汗，时潮热，月事不匀，或多或少，或前或后，或崩漏或止，经脉不通，子宫积冷，赤白带下，或久无子嗣。

61626 保养延寿不老丹

【方源】《集验良方》卷二。

【组成】扁柏枝叶三斤（阴干） 紫河车三个 茯苓一斤半（奶拌三次）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，白汤送下。

【主治】肠红下血。

61627 保婴稀痘神验丹

【方源】《沈氏经验方》。

【异名】稀痘丹（《痘疹会通》卷四）。

【组成】麝香五厘 朱砂一钱 大蓖麻子三十六粒（去壳取肉，拣肥白者）

【用法】先将朱砂为末，次入麝香研匀，后将蓖麻子肉加入一处，共为细末，须要端阳午时，洁诚合制。用手指蘸药搽小儿头顶心、前心后心、两手心、两脚心、两肘弯、两膝弯、两腋窝共十三处。量药均搽如钱大，俱要搽到，勿使药有余剩。如小儿头发长者，将顶心头发剃去一块，务使药贴皮肤，其力方到。搽后听其自落，不可洗去。每药一料，只搽一儿，男女一样治法。搽一次出痘数粒；次年端阳午时再搽一次，止出一二粒；又次年至端午再搽一次，其痘永不出矣。

【功用】预防痘疮。

【备考】每年端午即搽一次，不可间断。如周岁小儿，再于七月七日、九月九日午时依前法搽之。

促

61628 促经汤

【方源】《医统》卷八十四。

【组成】香附子　熟地黄　白芍药　莪术　木通　苏木各八分　当归一钱　川芎　红花　甘草五分　肉桂　桃仁二十粒(去皮尖)

【用法】水一钟半,煎八分,空心温服。

【主治】月经过期不行,腰腹作痛。

【备考】方中川芎、红花、肉桂用量原缺。

信

61629　信枣丹

《全国中药成药处方集》(武汉方)。为《外科全生集》卷四"赤霜散"之异名。见该条。

61630　信枣散

【方源】《证治宝鉴》卷十。

【组成】大枣(去核)　信石　人中白　铜青末

【用法】上将信石纳入大枣内,烧存性,加人中白、铜青,研末敷。

【主治】牙疳。

61631　信效散

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】信砒一钱　黄丹二钱　千古石灰(如无,但以陈久者,炒研细)四钱　(一方有龙骨,无石灰)

【用法】上为细末,加青盐一分,麝香少许。每上抄二三粒大豆大。先洗漱净,以手指蘸药,捺上下牙齿龈,沥涎勿咽之,须臾漱净。或于蚀处再上少许。每日三四次,以频为妙。

【功用】清利头目,宽膈美食,固齿,宣通阳明气血,解金石一切毒药。

【主治】风热上客阳明之经,牙齿疳蚀,龈宣腐臭出血,色黄气腐,注闷,动摇疼痛,发作有时。

61632　信效散

《朱氏集验方》卷七引《梁氏总要方》。为《幼幼新书》卷三十引《集验方》"抵圣散"之异名。见该条。

61633　信效散

《普济方》卷六十八。为《宣明论》卷十五"麝香散"之异名。见该条。

61634　信雄丹

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】白砒二钱(须放瓦上火煅,出烟尽,否则极毒杀人)　明雄黄八钱　朱砂(水飞过,为衣)

【用法】上为细末,端午午时,用七家粽尖为丸,如绿豆大,朱砂为衣。大人五丸,小儿三丸,于发时早半日以无根水送服。

【主治】疟疾,四日疟。

【宜忌】忌茶水半日。

61635　信效锭子

【方源】《玉机微义》卷十五。

【组成】红娘子　黄丹　砒霜　鹰屎　土消　白及各一钱半　铜绿二钱半　脑子　麝香各少许

【用法】上为细末,乳汁和为锭子用。中病即止。

【主治】一切恶疮。

61636　信毒内消丹

【方源】《中医验方汇选》。

【组成】火消　白矾　甘草　绿豆各30克

【用法】上为细末。用冷开水调下或灌之。限一剂。

【主治】信石中毒。

侯

61637　侯氏黑散

【方源】《金匮》卷上。

【组成】菊花四十分　白术十分　细辛三分　茯苓三分　牡蛎三分　桔梗八分　防风十分　人参三分　矾石三分　黄芩五分　当归三分　干姜三分　芎䓖三分　桂枝三分

【用法】上为散。每服方寸匕,酒送下,每日一次,初服二十日,温酒调服。常宜冷食六十日止。药积在腹中不下也,热食即下矣,冷食自能助药力。

【功用】《全国中药成药处方集》(沈阳方):驱风除热,通经活络。

【主治】大风四肢烦重，风癫，中风瘫痪。

①《金匮》：大风四肢烦重，心中恶寒不足者。②《外台》引《古今录验》：风癫。③《全国中药成药处方集》：左瘫右痪，半身不遂，中风不语，手足拘挛，口眼歪斜，麻木不仁。

【宜忌】①《金匮》：忌一切鱼、肉、大蒜。②《外台》：忌桃、李、雀肉、胡荽、青鱼、鲊酢物。③《全国中药成药处方集》：孕妇忌服。

【方论选录】①《医方集解》：此手太阴、少阴、足厥阴药也。菊花秋生，得金水之精，能制火而平木，木平则风息，火降则热除，故以为君；防风、细辛以祛风；当归、川芎以养血；人参、白术以补气；黄芩以清肺热，桔梗以和膈气，茯苓通心气而行脾湿，姜、桂助阳分而达四肢，牡蛎、白矾酸敛涩收，又能化顽痰，加酒服者，以行药势也。②《张氏医通》：方中用菊花四十分为君，以解心下之蕴热；防、桂、辛、桔以升发腠理；参、苓、白术以实脾杜风；芎、归以润燥熄火；牡蛎、矾石，以固涩肠胃，使参术之性留积不散，助其久功；干姜、黄芩，一寒一热，寒为风之响导，热为火之反间。用温酒服者，令药性走表以开其痹也。郭雍曰：黑散本为涤除风热，方中反用牡蛎、矾石止涩之味，且令冷食，使药积腹中，然后热食，则风热痰垢与药渐而下之也。③《医方论》：此方刘宗厚与喻嘉言俱谓其风药太多，不能养血益筋骨；汪讱庵谓用此方者，取效甚多。各执一见。予谓方中四物咸备，不可谓无血药也。若中风初起表邪重者，用之尚可取效，然石膏、细辛二味，必须减去。

【备考】《外台》有"钟乳"。

顺

61638 顺二散

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】木猪苓（去皮） 泽泻 茯苓 白术 甘草（炙）各一两 桂一两半 干葛半两（炒） 杏仁一两（去皮尖双仁，炒）

【用法】上为末。每服半钱至一钱，新汲井水调服。脏脏虚，水煎服。

【主治】伏热中暑，霍乱吐泻，烦闷燥渴，小便赤涩，便血肚疼。

61639 顺元汤

【方源】《易简》。

【组成】香附子一两（炒去皮毛） 甘草一分

【用法】上为末。清米饮点服，后服神灵丹。

【功用】常服资血。

【主治】崩中漏下，失血过多，久不能止。

61640 顺元散

【方源】《博济》卷二。

【组成】乌头二两（炮，去皮脐） 附子一两（炮，去皮脐） 天南星一两（炮）

【用法】上为细末。每服入五积散用之。常法煎服。

【主治】一切气。或脾胃不和，内伤冷食，浑身疼痛，头昏无力，或痰逆，或胸膈不利，气壅，或多噎塞，饮食不可，及元气攻刺两胁疼痛；女人血海久冷，月候不匀，走注腹痛，经不行者。

61641 顺元散

【方源】《苏沈良方》卷三。

【异名】顺元煮散（《圣济总录》卷二十七）、顺气散（《普济方》卷一六二）。

【组成】乌头二两 附子（炮） 天南星各一两（炮） 木香半两

【用法】上用药一钱，五积散同煎热服。或以水七分，酒三分，煎服。

【功用】能温里外，和一切气，通血络。

【主治】伤寒阴盛，里寒脉细，手足厥冷，脾胃冷痛；或气虚痰盛，头晕失眠；或产妇气乏难产，胎死腹中。

①《苏沈良方》：内外感寒，脉迟细沉伏，手足厥冷，虚汗不止，毛发恂慄，面青呕逆，产妇陈疏难产，经三二日不生，胎死腹中，或产母气乏委顿，产道干涩。②《医方大成》：体虚痰气不顺，头目眩晕。气虚痰盛，不得眠卧，气中痰厥。③《普济方》：一切气滞血络及脾胃冷，

停痰作痛。

61642　**顺元散**

【方源】《鸡峰》卷五。

【组成】当归　厚朴　干姜各六分　人参　茯苓　半夏　川芎各四钱半　枳壳一两二钱　陈橘皮一两八钱　桔梗三两　甘草　白芷　桂各九钱　白术　白芍药三钱

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，葱白二寸，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】脾元虚弱，肌体羸瘠，食饮难消，胸膈痞闷，痰多呕逆，气刺胀满；及外感寒邪，头昏体倦，项强恶寒。

【备考】方中白术用量原缺。

61643　**顺元散**

【方源】《家庭治病新书》引《医疗药方规矩》。

【组成】制南星　木香各一钱　制川乌五分

【用法】水煎服。

【主治】中风，痰涎壅塞，卒倒气绝者。

61644　**顺中散**

【方源】《博济》卷一。

【组成】槟榔(好者)一枚　大黄半两　甘遂半两　木香半两　茴香半两　白牵牛子半两　青皮半两(汤浸去白，焙)

【用法】上为细末。每服一钱，用木香煎汤送下；或木香酒送下亦得。如作常服，茶、酒任下一字。

【功用】解毒止血。

【主治】肺脏壅热毒，则胸膈壅滞，血与气皆逆行上于肺，肺壅不利，令人吐血不止，朝夕不住，发寒热，气喘促，红物至多，频频呕吐，渐至劳劣；并治中药毒，呕逆黑血至多，不能饮食。

61645　**顺气丸**

【方源】《袖珍》卷三引《圣惠》。

【异名】气宝丸。

【组成】木香(不见火)　茴香(炒)　羌活　槟榔　木瓜　川芎　当归(酒浸)各半两　黑牵牛二两　青皮(炒)　陈皮(炒)各一两　大黄一两半　皂角(不蛀)四两　(一方木瓜)

【用法】上为末，熬皂角膏为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，食前温汤送下；或用生姜、灯心煎汤送下。

【主治】腰胁俱病，如抱一瓮，肌肤坚硬，按之如鼓，两脚肿满，不能屈伸，自头至膻中瘦脊露骨，胸膈痞塞，四肢无力；或一切气血凝滞，风毒炽盛，脚气走注作肿毒，或大便秘，脚气入腹，满闷，寒热往来，状类伤寒。

61646　**顺气丸**

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】木香二两　青橘皮(汤浸去白，焙)　人参　赤茯苓(去黑皮)　大戟(用河水煮，去皮，焙)各一两　郁李仁半两　麻仁半两(与大戟、郁李仁同别捣细，入药内)　甘遂(麸炒微烟生，覆于地上候冷，出火毒)一两　大黄(锉，炒)二两　诃黎勒皮半两

【用法】上为末，拌和，炼蜜为丸，如豌豆大。每服十丸，煎车前子汤送下，不拘时候。

【功用】通导大小便。

【主治】三焦约，不得小便。

61647　**顺气丸**

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】防己一两半　大黄二两半　犀角(炙，镑)　诃黎勒皮　牵牛子　赤茯苓(去黑皮)　葶苈(炒)　海蛤　芎劳　干地黄(焙)　木通(锉)　大戟　桑根白皮(锉)　陈橘皮(去白)　防风(去叉)　郁李仁(去皮)　木香各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空腹米饮送下。觉壅不快则加至十五丸，觉通则减至三五丸。大小便不通，即加至三十丸。

【主治】水气。

【备考】此药不独治水气，其功与防己汤相类。若患水气人，服防己汤肿既消，便服此顺气丸，气顺血滑，体气轻健，即止。患脚气人，

常合此药备急，服防己汤愈后，百日内即宜服五灵汤。

61648 顺气丸

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】木香　青橘皮(汤去白，焙干)　槟榔(锉)各半两　黑牵牛(炒)一两半　郁李仁一分　麻仁三分(别研入)

【用法】上为细末，加麻仁炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，麻仁汤送下。

【主治】风毒流注，脚膝肿满不消。

61649 顺气丸

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】巴豆十粒(去皮，分作二十片)　胡椒二十粒　丁香二十粒　青橘皮二十枚(全者，汤浸去白，每枚入巴豆半粒，胡椒、丁香各一粒，用线缠之)

【用法】上用米醋一升煮，醋尽取出，焙干为末，烂饭为丸，如粟米大。每服二丸，米饮送下。

【主治】小儿乳食不化，腹急气逆。

61650 顺气丸

【方源】《幼幼新书》卷八引《张氏家传》。

【组成】甘草(爁)　芍药(洗)　官桂(去粗皮，称)　川当归(焙)　蓬莪术　干姜(各炮)　陈橘皮(去瓤，称)　川大黄(湿纸裹煨，切片子，焙)　巴豆(去皮，用醋五升，入巴豆在银石器中，熬醋尽取出，研令细)　宣连各等分

【用法】上为末，以糯米粥为丸，如麻子大。常服三五丸至十丸，茶汤、温水任下；如要宣转，量虚实加至十丸或十五丸；食积、气积，生姜橘皮汤送下；丈夫之气，炒茴香盐汤送下；妇人血气，当归醋汤送下；胸膈不快或泻痢，生姜汤送下；小便淋沥，灯心汤送下；小儿惊积，薄荷汤送下。

【主治】小儿惊积及男子、妇人血气，脐腹疼痛。

61651 顺气丸

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】黄牵牛十两(炒，别捣，取粉六两)　木香　青橘皮　槟榔　半夏曲各一两　紫苏子半两　五灵脂一两半

【用法】上为细末，滴水为丸，如梧桐子大。每服二十丸，临卧生姜汤送下。

【功用】宽胸膈，行滞气，消痰饮，爽神气。

61652 顺气丸

《袖珍》卷一引《简易》。为《医方类聚》卷九十六引《千金月令》“大麻丸”之异名。见该条。

61653 顺气丸

【方源】《医方类聚》卷七十五引《施圆端效方》。

【组成】杏仁(去皮尖，炒)　拣桂各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。含化一丸。

【主治】咽膈痞痛，失音，不语如哑。

61654 顺气丸

【方源】《医学纲目》卷四引《得效》。

【组成】香附半斤

【用法】童便浸，晒干，粟米糊为丸。

【主治】血郁。

61655 顺气丸

【方源】《医方类聚》卷一二九引《医林方》。

【组成】牵牛半两(一半生，一半熟)　桑白皮　赤茯苓　防已　羌活　陈皮　泽泻各三钱　甜葶苈　郁李仁(汤浸，去皮)　白术各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，食后温水送下。加至微利为效。

【主治】水气。

61656 顺气丸

【方源】《普济方》卷一七二。

【组成】黑牵牛一斤

【用法】取头末，用萝卜去顶盖，剜令空，纳药末，不许纳实，盖顶纸封，蒸熟，取出药末；将萝卜擂碎，取自然汁，加白豆蔻末二三钱，为丸如梧桐子大。每服三十丸，任意加减服之。

【主治】一切积气，宿食不消。

61657 **顺气丸**

【方源】《名家方选》。

【组成】莪术　莎草根各三钱　白术二钱　生姜一钱　木香五钱

【用法】上为末，面糊为丸，白汤送下。恶苦味者代黑丸用。

【主治】积聚疝瘕。

61658 **顺气汤**

【方源】《圣济总录》卷三十六。

【组成】厚朴（去粗皮，生姜汁炙）　陈橘皮（汤浸去白，焙）　白术　半夏（汤洗七遍，焙）各一两　干姜（炮）　柴胡（去苗）　甘草（炙）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加生姜三片，大枣二枚（擘破），煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】足阳明胃疟，支满腹大；胃气虚冷，腹胁胀满，痰逆，不思饮食。

61659 **顺气汤**

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】白术二两　白茯苓（去黑皮）一两半　人参一两　甘草（微炙）三分

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，加生姜、大枣，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】胃中不和，气逆干呕，饮食不下。

61660 **顺气汤**

【方源】《济生》卷二注文引《卫生家宝》。

【异名】柿蒂汤（《济生》卷二）、丁香柿蒂散（《杂病源流犀烛》卷十七）。

【组成】柿蒂　丁香各一两。

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至七分，去滓服，不拘时候。

【主治】①《济生》引《卫生家宝》：胸满，咳逆不止。②《杂病源流犀烛》：胃寒呃逆。

【备考】本方方名，《袖珍》引作“柿蒂散”。

61661 **顺气汤**

《普济方》卷一八四。为《内外伤辨》卷上“升阳顺气汤”之异名。见该条。

61662 **顺气汤**

《普济方》卷三十五。为《圣济总录》卷四十四“温气煮散”之异名。见该条。

61663 **顺气汤**

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】苏叶一钱　半夏一钱　甘草一钱　桔梗一钱　百部五分

【主治】胸膈不利，气不顺。

61664 **顺气汤**

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】广木香三钱　乌药　甘草　枳壳各一钱　白芍五钱　炒栀子　车前子各三钱

【用法】水煎服。

【主治】痢疾。中气不顺，口中作嗳，下痢不止。

61665 **顺气汤**

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷四。

【组成】桔梗　槟榔　当归　枳壳　枳实　紫苏　青皮　陈皮　乌药　香附　防风　木通　大腹皮　赤芍　赤苓　甘草

【用法】水煎服。

【主治】产后气不调和，寒热胸饱。

61666 **顺气汤**

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】当归　杜仲　香附　沉香　茴香　元胡　肉桂　生姜

【用法】水煎服。

【主治】气滞腰痛，循环痛胀。

61667 **顺气饮**

【方源】《古今医彻》卷一。

【组成】木香五分　乌药　陈皮　枳壳（炒）　茯苓各一钱　甘草三分（炙）　柴胡五分　桔梗一钱　香附一钱（便制）　熟砂仁末一钱　姜一片

【用法】水煎服。

【主治】伤寒夹气，发热恶寒，脉沉而不快。

61668 **顺气散**

【方源】《博济》卷一。

【组成】厚朴（去粗皮，姜汁浸，炒黄）　茴

香（炒） 陈皮（浸，去瓤，焙） 苍术（米泔浸一宿，炒） 枳壳（汤浸，去瓤，麸炒黄） 川芎（炒） 桔梗 杏仁（去皮尖，炒） 白芷（炒） 甘草（炙） 麻黄（去节）各等分。

【用法】上为末，杏仁别研，一处和匀。每服二钱，加葱白三寸，生姜二片，大枣二枚，同煎至七分，热服。若手足逆冷，呕恶，有阴毒伤寒之证，急并三五服，自然回阳顺气汗出。如服了觉身热汗久未行，却并服金沸散表之。年老伤寒，不问阴阳二毒，并先服本方三两服，后服金沸散表汗。又少壮者，若是阳毒，并先表汗，后用此药。

【主治】伤寒脾胃气不和，汗前汗后，呕逆腹胀，虚气攻刺，心胁疼痛，及治咳嗽。

61669 **顺气散**

【方源】《博济》卷二。

【组成】吴茱萸（洗令净）春、夏一分，秋、冬半两 麻黄一两（去节） 人参半两 诃子半两（煨，去核称） 大黄三分 官桂一两（去皮） 厚朴一两（去皮，姜汁炙） 干姜半两（炮） 陈橘皮一两（去白） 甘草一两（炙）

【用法】上为末。每服一钱，以水一中盏，加生姜二片，大枣一个，同煎六分，通口服。如外伤风邪，即先服此药三服，次吃发汗丸散。

【功用】调顺冷气，解利伤寒。

61670 **顺气散**

【方源】《博济》卷三。

【组成】甘草四两（炙令黄） 白茯苓四两 白术八两 附子二两（炮，去皮脐） 干姜一两（炮） 陈橘皮二两半（去白）

【用法】上为末。每服一大钱，以水一盏，加荆芥少许，煎至七分，热服。

【功用】平胃调气，进饮食。

61671 **顺气散**

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【异名】顺气煮散（《圣济总录》卷四十四）。

【组成】厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 陈橘皮一两（汤浸，去瓤，焙） 白术一两 半夏一两（汤洗十四遍） 干姜半两（炮裂） 甘草半两（炙）

【用法】上为散。每服二钱，以水一中盏，加生姜五片，大枣二枚，同煎至七分，温服，不拘时候。

【主治】脾脏虚冷气，腹胁胀满，痰逆不思饮食。

61672 **顺气散**

【方源】《幼幼新书》卷二十七引《丁时发传》。

【组成】人参 藿香 丁香各一分 茯苓 干葛 甘草（炙） 天台乌药各半两 红橘皮一两

【用法】上为末。每服半钱，以水六分，加大枣一个，生姜一片，同煎取三分，温服。

【主治】小儿霍乱吐泻。

61673 **顺气散**

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】甘草 茯苓各四两 白术 厚朴各六两 干姜二两 陈橘皮三两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，煎至七分，去滓，食后温服。

【主治】气逆。

61674 **顺气散**

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】乌药十两（锉细） 麻黄（去根节）三两 枳壳三两（麸炒，去瓤） 桔梗（去芦头） 香白芷 川芎 甘草（炙） 白术 陈橘皮（去白）各五两 人参（去芦头）一两 干姜（炮）一两半

【用法】上为细末。每服三钱，以水一盏，加生姜二片，大枣一枚，煎至八分，空心、食前温服；如伤风鼻塞头痛，加葱白三寸，薄荷五叶同煎；妇人血气，加当归少许同煎。

【功用】调荣卫，进饮食，去虚风，行滞气。

【主治】男子、妇人气血衰弱，虚风攻注肌体，头面、肩背刺痛，手脚拳挛，口面㖞斜，半身不遂，头目旋晕，痰涎壅盛，语言謇涩，行步艰辛，心忪气短；客风所凑，四肢拘急，鼻塞头疼；或脾气不和，心腹刺痛，胸膈不快，少力多

困，精神不爽，不思饮食，呕逆恶心，霍乱吐泻；胎前产后，气虚百病。

61675　顺气散

【方源】《普济方》卷一九〇引《卫生家宝》。

【组成】当归一两(洗净，去芦，切细)　川芎二两(切细)　木香四两(锉细)　陈皮二钱(洗去白，焙，锉细)　大蓟(野生荆芥、红花者，干湿皆可用)

【用法】上为末。每服四钱，以水一盏，加紫苏叶，煎取七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】气弱不足，血气欲妄行，觉喉口血腥，微微咯出，唾中带些红色。

61676　顺气散

【方源】《保命集》卷下。

【组成】厚朴(姜制)一两　大黄四两　枳实二钱(炒)

【用法】上锉。每服五钱，水煎，食远服。

【功用】《杂病源流犀烛》：通大便。

【主治】消渴。热在胃而能饮食，小便黄赤。

【宜忌】宜微利，不可多利。服此药渐利，不欲多食则愈。

【备考】本方方名，《准绳·类方》引作“顺利散”。

61677　顺气散

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】槟榔十个　诃子十个(去核，生用)　沉香一分(不见火)

【用法】上㕮咀，作一服。以水二碗，加紫苏三十叶，煎至二盏，去滓，作二次服，不拘时候。

【主治】久有脚气，时上攻冲，往来不定，流传肠胃，转气雷鸣。

61678　顺气散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】四物汤加真蒲黄二钱

【用法】上四物汤如法煎，调真蒲黄末二钱服，不拘时候。如上膈虚热壅满，更煎苏子降气汤服之。

【功用】顺血令有所归。

【主治】血妄行吐血。

61679　顺气散

【方源】《医方类聚》卷八十八引《施圆端效方》。

【组成】白芍药(炒)　甘草(炒)　厚朴　干姜(二味同捣，炒焦)各二两　桔梗四两

【用法】上为细末。每服二钱，食前浓煎生姜汤调下。

【功用】和脾胃，顺气止嗽，补虚。

【主治】心腹痛。

61680　顺气散

【方源】《瑞竹堂方·补遗》。

【异名】匀气散(《普济方》卷九十七)、顺风匀气散(《奇效良方》卷二)、顺气匀风汤(《杂病源流犀烛》卷十二)。

【组成】白术(煨)四两　沉香(镑)五钱　白芷　人参(去芦)　甘草各五钱　青皮(去瓤)五钱　天台乌药(炙)一两

【用法】上㕮咀。每服五钱，水一盏半，加生姜三片，紫苏五叶，木瓜三片，大枣一枚，煎取七分，去滓，空心温服。

【主治】中风、中气，腰腿疼，半身不遂，手足不能屈伸，口眼㖞斜。

61681　顺气散

《普济方》卷一六七。为《苏沈良方》卷三“顺元散”之异名。见该条。

61682　顺气散

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】川朴一两　大黄四两　枳壳二钱　赤芍药

【主治】消中能食，小便赤。

【备考】本方赤芍药用量原缺。

61683　顺气散

【方源】《解围元薮》卷四。

【组成】苦参皮二斤　乌药　防风各四两

【用法】上为末。每服三钱，酒送下。

【主治】三十六种大风诸恶危症。

61684　顺气散

【方源】《医统》卷八十五。

【组成】陈皮一钱　枳壳　槟榔　大腹皮

各十分　紫苏茎叶八分　白术一钱　赤茯苓一钱　甘草三分　桑白皮八分　（一方有诃黎勒）

【用法】上用水一钟半，煎服。

【主治】妊娠胸膈满，气壅喘嗽，饮食不下。

61685　顺气散

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】白术　茯苓　青皮　白芷　陈皮　乌药　人参各一钱　炙草五分　香附三钱

【用法】先用苏合丸，继服此药。

【主治】昏迷痰塞，牙紧似中风，身冷无汗。

61686　顺气散

【方源】《医略六书》卷二十三。

【组成】槟榔一两　厚朴一两（制）　苍术一两（炒）　青皮一两（炒）　陈皮一两半　香附一两半（炒）　木香一两　枳壳一两（炒）　甘草五钱　砂仁一两（炒）　生姜七片

【用法】上为散。每服三钱，加薤白三枚，煎汤化下。

【主治】气郁腹痛，脉沉者。

【方论选录】湿伏气滞，妨碍肝脾三焦之气不能布护，故腹痛不止焉。苍术燥湿强脾气，槟榔破滞下逆气，厚朴散满宽中气，枳壳破滞化膈气，青皮破气平肝，甘草缓中和胃，陈皮理胃气，木香醒脾气，香附调气解郁，砂仁开胃醒脾也。加以生姜之温散，更用薤白之通阳，为散煎服，安有气不调，湿不化，腹痛不止之理乎？此调气解郁之剂，为气滞湿伏腹痛之专方。

61687　顺气散

【方源】《理瀹》。

【组成】苍术　厚朴　青皮　陈皮　缩砂仁　丁香　木香　良姜　干姜　茴香各一钱　姜三片　枣一枚

【用法】上炒熨脐腹。

【主治】脾胃虚寒，心腹刺痛、泄泻。

61688　顺气散

《医学金针》卷二。为《医方类聚》卷二十一引《济生》“八味顺气散”之异名。见该条。

61689　顺气散

【方源】《伤科要法》。

【组成】木香　甘草　沉香　桔梗　血竭各三钱　枳壳　槟榔一个　苏子二钱　莱菔子二钱

【用法】上以水二钟，加生姜三片，水煎服，不效再服。

【主治】打扑损伤，不省人事者。

【备考】方中枳壳用量原缺。

61690　顺风散

【方源】《幼科指掌》卷四。

【组成】桔梗　川芎　白芷　新会皮　枳壳　乌药　白僵蚕（焙，去砂丝）　白附子　麻黄　天南星　百部　国老

【用法】上加生姜、大枣，以河水二钟，煎五分，温服。

【主治】肺中风，胸高突起，痰壅喘急，身仰难言。

【备考】面白者可治，面赤黑痰喘者难治。

61691　顺风散

【方源】《救伤秘旨》。

【组成】大黄三钱　生地　熟地　川芎各五钱

【用法】上为末。每服三钱，空心温酒送下。

【主治】损伤后恶气上升，呕吐不止。

61692　顺正汤

【方源】《幼幼新书》卷二十七引张涣方。

【组成】白豆蔻　高良姜（微炮）　藿香叶　当归（洗，焙干）　草豆蔻（面煨，炮）　陈皮（去白，焙干）各半两　丁香一两

【用法】上为细末。每服半钱至一钱，温粥饮调下。

【功用】顺阴阳。

【主治】霍乱吐利。

61693　顺生丹

【方源】方出《中藏经·附方》，名见《医钞类编》卷十七。

【组成】朱砂半两　乳香一两

【用法】上为末，端午日以猪心血为丸，如

梧桐子大。每服一粒,乳香汤送下。

【功用】催生。

【主治】①《中藏经·附方》:难产危急及小儿斑痘不出。②《医钞类编》:产妇临盆,腰腹脐痛。

【备考】《医钞类编》:每服用当归三钱,川芎二钱,煎汤送下。

61694　**顺生丹**

《校注妇人良方》卷十七。为《局方》卷九"催生丹"之异名。见该条。

61695　**顺生散**

【方源】《元和纪用经》。

【组成】蛇皮

【用法】烧灰。每服方寸匕,酒送下。

【主治】临月催生。

61696　**顺生散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】山茵陈叶　仙灵脾叶各等分

【用法】上为细末。每服二钱,以童便并酒共半盏,温调下。

【主治】生产不正及难产者。

61697　**顺血散**

【方源】《救急选方》卷下。

【组成】当归　芎䓖　芍药　蒲黄　泽泻　枳壳　人参　大黄　沉香　茯苓各一钱　甘草三分　接骨木五钱

【用法】上锉细。每服二钱,盛入麻布袋,用沸汤冲服。

【主治】一切金疮扑损及产后血晕。

61698　**顺导汤**

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】茯苓　泽泻各五钱　肉桂三分　木瓜　龙胆草一钱　车前子三钱

【用法】水煎服。

【主治】脚气。两跗忽然红肿,因而发热,两胫俱浮作痛。

61699　**顺阴汤**

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】人参三钱　白术五钱　茯苓三钱　附子二钱　干姜一钱　青蒿二钱　白扁豆三钱

【用法】水煎,冷服。必出微汗而愈。

【主治】劳倦中暑，内伤中气，阴盛隔阳，服香藿饮反加虚火炎上，面赤身热，六脉疾数无力。

61700　**顺利散**

《准绳·类方》卷五。即《保命集》卷下"顺气散"。见该条。

61701　**顺肝丸**

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】黄连　黄芩　当归　蕤仁三十粒

【用法】上为末,炼蜜为丸服。

【主治】肝热眼赤而不痛。

【备考】方中黄连、黄芩、当归用量原缺。

61702　**顺肠粥**

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】芝麻一升　米二合

【用法】煮粥食。

【主治】妇人产后大便日久不通。

61703　**顺味丸**

《普济方》卷一五九。为《伤寒论》"理中丸"之异名。见该条。

61704　**顺肺汤**

【方源】《幼幼新书》卷十六引《医方妙选》。

【组成】半夏(汤浸七次,焙干)　紫苏叶各一两　陈橘皮(汤浸,去白)　款冬花　桂心　木香　五味子各半两

【用法】上为细末。每服一钱,以水八分,加生姜、人参各少许,煎至四分,去滓,放温服。

【主治】小儿心肺不利,咳嗽。

61705　**顺性汤**

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】黄连三钱　柴胡一钱　茯苓三钱　白芍三钱　白芥子一钱　木瓜一钱　甘草一钱

【用法】水煎服,立饮之。

【主治】厥症。两手反张，两足转逆，不可坐卧。

61706 **顺经丸**

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】当归 石膏 蜀椒 甘草 蝉退 马鸣退各二两 柏子仁 白薇 藁本 干姜 白术 白芜荑 苍耳 人参 白芍药 芎 附子各一两 食茱萸 厚朴 防风 白芷各五分 桔梗三两 泽兰九分 生犀半两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,空心温酒或米饮化下。

【功用】补虚损,调顺经血,除脏冷;临月服之壮气养胎,正顺生理,润胎;产后常服,滋养血气,和调阴阳,密腠理,实脏腑。

【主治】冲任气虚,小腹挟寒,月水不调,腹疞痛,腰腿沉重,四肢倦怠,百节痠疼,心忪恍惚,忧恶不乐,面少光泽,饮食无味;以及带下三十六疾,崩中漏下五色,子脏久冷无子,及数堕胎;兼疗产后恶露不下,余血未尽,脐腹疼痛,憎寒发热,血逆上冲,狂言目瞑;或乘虚中风,口噤不语,身体不遂,头眩身战,虚风痼冷。

61707 **顺经汤**

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】当归尾 川芎 枳壳 小茴香 柴胡 陈皮 玄胡索 白芍药 青皮 香附子 桃仁 红花 肉桂各等分

【用法】水煎,食后温服。

【功用】通经行血,止痛。

【主治】女子逆经,血灌瞳仁,满眼赤涩。

【加减】热甚,加黄连、黄芩。

61708 **顺经汤**

【方源】《审视瑶函》卷六。

【组成】当归身 川芎 柴胡 桃仁(泡去皮尖) 香附子(制) 乌药 青皮 红花 广陈皮 苏木 赤芍 玄参

【用法】上锉。白水二钟,煎至八分,去滓,加酒一杯,食远温服。

【功用】调气通血。

【主治】室女月水久停,倒行逆上冲眼,红赤生翳。

【加减】热盛,加酒炒黄连。

61709 **顺经汤**

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】当归五钱(酒洗) 大熟地五钱(九蒸) 白芍二钱(酒炒) 丹皮五钱 白茯苓三钱 沙参三钱 黑芥穗三钱

【用法】水煎服。一剂吐血止;二剂经顺;十剂不再发。

【功用】补肾调经和血。

【主治】经前腹痛吐血。

61710 **顺经汤**

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】香附 生地 茯苓 白芥子各三钱 当归一两 白芍一两 车前子二钱 神曲 甘草各一钱

【用法】水煎服。十剂自调。

【主治】妇人肝气郁结,经来断续,或前或后,无一定之期者。

61711 **顺经汤**

【方源】《续名家方选》。

【组成】紫苏一钱 大黄 桂枝 槟榔 当归 川芎 芍药 白芷 桔梗 乌药 枳壳各六分 甘草少许

【用法】水煎服。

【主治】乳痈。

61712 **顺经散**

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】吴茱萸三两(汤洗七次,炒) 麦门冬五两半(去心) 半夏二两半(汤洗七次) 当归二两(去芦头) 芎䓖二两 人参二两(去芦头) 芍药二两 牡丹皮二两 桂二两(去粗皮) 阿胶二两(碎,炒令黄燥) 甘草二两(锉,炒)

【用法】上为粗散。每服三钱匕,水一盏半,加生姜五片,煎至一盏,去滓,空心、食前热服。

【主治】妇人经水或通或止,或产后寒凝,血积成瘀。

61713 **顺经散**

【方源】《洪氏集验方》卷五。

【组成】韭子(汤浸,退取白仁,干称)一两　益智子(取仁,盐炒过)半两　琥珀半两(令研)　石苇(去毛土)一钱　白茯苓三分　狗脊(爁去毛,净)半两　石燕子(火煅,醋炒,出火毒,令研极细)半两

【用法】上为末,和匀。每服一钱,用韭菜白煎汤调下,空心、食前各一服,日午一服尤妙。

【主治】小儿十余岁,因惊之后,心气不行,小便淋沥,日及三十余次,渐觉黄瘦。

【临证举例】惊悸　予表姪十余岁时,尝游慧山,归已昏暮,遇一巨人醉卧寺门,惊悸得疾。自是之后,一日便溺五六十度,医治数月不能效,即授此方,服药未几,日减一日,初则三二十度,最后十数度,凡服两料而愈。

61714　顺荣汤

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】大黄一两(酒浸,蒸熟,锉)　当归一两　荜茇半两　鬼腰带一两　枳壳一两(去瓤,麸炒)　赤芍药半两　猪牙皂角半两(火上炙者)

【用法】上㕮咀。每服一两,纯酒二盏,煎至一盏,去滓,食前温服。

【主治】妇人血积、血块、瘕癖,腹大内有块形,筑筑作痛,久无寒热。

61715　顺胃丹

【方源】《幼幼新书》卷二十八引张涣方。

【组成】高良姜　干漆　肉桂各一两　白术(炮)　肉豆蔻仁各半两

【用法】上为细末,白面糊为丸,如黍米大。每服十粒,粟米饮送下。

【主治】小儿泻痢,虫烦腹痛。

61716　顺胃散

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】大附子一枚　生姜半斤(肥嫩者,以新布揩去土,切片,烂研,取自然汁半盏,并不得犯生水)

【用法】上以半斤硬炭熟火,用新瓦一片将火四周簇定为井子,将附子蘸姜汁置井子中,才干又蘸,以姜汁尽为度,附子去皮脐,切片,为末。每服半钱许,按手心内,遂旋以舌舐尽药末,空心服。

【主治】翻胃呕吐。

【宜忌】不得犯水。

61717　顺适汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】白芍一两　白术三钱　人参五分　白芥子一钱　当归二钱　郁金一钱　陈皮三分　甘草五分　茯苓三钱　香附一钱　川芎八分

【用法】水煎服。二剂脾胃开,四剂寒热除,十剂郁结之症尽散矣,二十剂全愈。

【主治】劳瘵。肝气不宣,木克脾胃,胸胁胀闷,饮食日减,肢瘦形凋,畏寒畏热。

61718　顺胆汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】柴胡　黄芩各二钱　白芍　车前子各五钱　茯神　泽泻　炒栀子　苍术各三钱

【用法】水煎服。四剂愈。

【主治】胆气受惊,失于疏泄,变为白浊,溺管疼痛,宛如针刺。

61719　顺胎饮

【方源】《妇科玉尺》卷二。

【组成】当归二钱　焦术一钱半　酒黄芩　滑石末　酒苏梗　酒白芍　酒洗大腹皮各八分

【用法】水煎二服,八日进一服。

【功用】顺气和中安胃,预防难产。

61720　顺胎散

【方源】《易简方便》卷六。

【组成】草果一个　元胡八分　五灵脂一钱　滑石八分

【用法】酒煎,半饥服。

【主治】胎气不顺,心痛不可忍。

61721　顺逆丸

【方源】《外台》卷十二引《范汪方》。

【组成】大黄十分　黄芩四分　厚朴四分

（炙） 干地黄四分 桂心四分 滑石四分 杏子二分 黄连四分 麦门冬四分（去心）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，食后服，一日二次。不知稍增，以知为度。

【主治】久寒积聚，气逆不能食。

【宜忌】忌食芜荑、生葱、猪肉。

61722 顺逆丹

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】白术（去油芦，土炒） 白茯苓（去皮） 陈皮 厚朴（去皮，姜炒） 泽泻各一两 猪苓八钱 苍术（米泔浸，炒）一两五钱 神曲（炒） 麦芽（炒）各七钱 砂仁三钱 木香二钱 甘草（炙）五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，滚水化下。

【功用】《全国中药成药处方集》（沈阳方）：健胃利尿。

【主治】①《鲁府禁方》：霍乱上吐下泻，伤食腹胀。②《全国中药成药处方集》（沈阳方）：霍乱转筋，吐泻不止，伤食停饮，胃肠失和，腹中绞痛，气滞不舒。

【备考】《全国中药成药处方集》有苡仁、朱砂。

61723 顺流丹

【方源】《重庆堂随笔》卷上。

【组成】当归 川芎 升麻 甘草各六两

【用法】上为粗末，于腊月八日取东流清水七大碗，煎至三大碗，去滓收药，盛新砂锅内；再选明净完体辰砂四两，盛细绢袋内，以线扎口，悬系药汁中，约离锅底一指，以桑柴慢火煮至汁尽，取起研细末，瓷瓶收藏；另用好糯米半升，淘净控干水气；再以盐卤和净黄土，干湿得所，包米为围，放炭火内，煅令通红，速即取出，冷定劈开，拣米粒色黄尽性者，亦研细末，别盛瓷瓶收藏。凡小儿一岁足者，用辰砂末、米末各一分，白蜜一茶匙，米汤半杯，醇酒半杯，其二味调匀，以茶匙徐徐喂服。未出痘者免出，已见点者必稀，陷没者即起。

【主治】痘证险逆。

61724 顺脾散

《圣济总录》卷一八一。为原书卷一一八“顺脾养肌散”之异名。见该条。

61725 顺搐散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】枳壳 钩藤（去钩） 荆芥 羌活 防风（去芦） 甘草各半两

【用法】上㕮咀。每服二钱，以水一盏，加顺切生姜三片，煎七分，温服，不拘时候。或入薄荷同煎服。

【主治】小儿惊风，男右女左搐不顺者。

61726 顺解散

【方源】《普济方》卷一五一引《杨氏家藏方》。

【组成】苍术 麻黄（去节）各等分

【用法】上㕮咀。每服二钱，以水一盏，加葱白、生姜煎，温服。

【主治】伤寒瘟疫，身体壮热，头疼项强，四肢烦疼，恶风无汗。

61727 顺解散

【方源】《百一》卷七。

【组成】苍术半斤 藁本（水浸） 桔梗 甘草 防风 独活各四两 厚朴（姜制） 陈皮各二两

【用法】上为细末。每服二钱，加生姜七片，水一盏半，煎八分，去滓温服。

【主治】伤寒，凡初受疾未分阳明表里者。

61728 顺元煮散

《圣济总录》卷二十七。为《苏沈良方》卷三“顺元散”之异名。见该条。

61729 顺气饮子

【方源】《妇人良方》卷十二。

【组成】紫苏叶 木香（炮） 人参 草豆蔻 茯苓各一两 甘草半两 大腹子一两

【用法】上㕮咀。每服三钱，以水一盏，加苎根三寸，糯米少许，煎至七分，去滓温服。

【功用】安胎。

【加减】气弱者，去大腹子。

61730　**顺气煮散**

《圣济总录》卷四十四。为《医之类聚》卷十引《简要济众方》"顺气散"之异名。见该条。

61731　**顺流紫丸**

【方源】《外台》卷八引《范汪方》。

【组成】当归　代赭各一分　茯苓　乌贼鱼骨　桂心各三分　肉苁蓉二分　藜芦五分(少熬)　巴豆六十枚(去心皮)

【用法】上为末,白蜜为丸。食前服如小豆一丸,每日二次,不知,增之;欲下,倍服之,别捣巴豆令如膏。

【主治】百病留饮宿食,心下伏痛,四肢烦疼,男子五劳七伤,妇人产有余疾。

【宜忌】忌生葱、狸肉、酢物、野猪肉、芦笋。

61732　**顺流紫丸**

【方源】《千金》卷十八。

【组成】石膏五分　代赭　乌贼骨　半夏各三分　桂心四分　巴豆七枚

【用法】上为末,炼蜜为丸,如胡豆大。平旦服一丸,加至二丸。

【主治】心腹积聚,两胁胀满,留饮痰癖,大小便不利,小腹切痛,膈气上塞。

【方论选录】《千金方衍义》:紫丸专取代赭煅赤以镇心下痰澼,配以石膏之寒而化心下结热,并取半夏涤除痰饮,乌贼清理干血,桂心分解痰血,巴豆上涌冷涎,下破寒积。服此则痰水顺流而下,故以名方。

61733　**顺气人参散**

【方源】《鸡峰》卷五。

【组成】人参　桔梗　干葛　白芷　白术各一两　干姜　甘草各半两

【用法】上为粗末。每服二钱,以水一盏,加生姜三片,葱白二寸,煎至六分,去滓温服。

【功用】温和表里,祛逐风寒。

【主治】壮热,头痛项强,腰疼,心胸气痞,咳嗽痰多,发热恶寒,咽隔不利。

61734　**顺气木香丸**

【方源】《博济》卷四。

【组成】黄芫花一两　巴豆七个(用醋半碗浸一宿,于铫内煮尽醋,炒紫色)　延胡索　秦艽　桑蛾各半两　官桂一分　木香一分

【用法】上为末,醋糊为丸,如绿豆大。每服十丸,热酒送下。

【主治】妇人血气攻刺,手足疼痛,冷痹,心腹久积,口吐冷涎,面目青黄色,发歇有时。

61735　**顺气化滞汤**

【方源】《会约》卷八。

【组成】厚朴(姜炒)一钱　陈皮　藿香　香附　乌药　砂仁(炒)各一钱二分　广香五分　白芥子(炒,研)八分　山楂　麦芽(炒)　神曲(炒)各一钱　苍术一钱

【用法】水煎,热服。

【功用】理气化食。

【主治】脾虚气滞,过食饮食,暴伤生冷,以致腹痛胀满,或呕或泻者。

【加减】感外寒者,加桂枝一钱;内寒滞痛者,加炮干姜、吴茱萸各七八分;如呕而兼痛者,加半夏一钱半,丁香四分。

61736　**顺气手拈散**

《女科秘要》卷二。为《百一》卷八"手拈散"之异名。见该条。

61737　**顺气匀风散**

《杂病源流犀烛》卷十二。为《瑞竹堂方·补遗》"顺气散"之异名。见该条。

61738　**顺气术香散**

【方源】《局方》卷三(吴直阁增诸家名方)。

【组成】丁香皮(不见火)　缩砂仁　良姜(去芦,炒)　肉桂(去粗皮)　干姜(炮)　甘草(爁)　陈皮(去白)　厚朴(去粗皮,姜汁炙)　苍术(米泔浸)　桔梗(去芦)　茴香(炒)各三两

【用法】上为细末。每服二钱,以水一盏,加生姜三片,大枣二枚,煎至八分,稍热服,不拘时候;或入盐少许,沸汤点服。

【功用】宽中顺气,和胃进食。

【主治】气不升降,呕逆恶心,胸膈痞闷,胁肋胀满;及酒食所伤,噫气吞酸,心脾刺痛,大便不调,面黄肌瘦,不思饮食;及妇人血气刺

痛，一切冷气。

61739 **顺气归脾丸**

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】陈皮 贝母 香附 乌药 当归 白术 茯神 黄耆 酸枣仁 远志 人参各一两 木香 甘草(炙)各三钱

【用法】上为末，以合欢树根皮四两，煎汤煮老米糊为丸，如梧桐子大。每服六十丸，食远白滚汤送下。

【主治】思虑伤脾，致脾气郁结，乃生肉瘤，软如绵，肿似馒，脾气虚弱，日久渐大，或微疼或不疼者。

61740 **顺气四物汤**

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归(酒洗) 川芎各一钱 赤芍 枳壳(麸炒) 乌药各八分 三棱(醋浸，炒) 莪术(醋浸，炒) 槟榔 远志(甘草水泡，去心) 青木香 砂仁各五分 青皮(去瓤) 陈皮 香附米各一钱 辰砂(另研)五分 麦门冬(去心)一钱

【用法】上锉。水煎服。

【主治】时觉心中气不下降，痞塞不通，或有积块。

61741 **顺气安胎散**

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】人参 白术(土炒) 当归(酒洗)各二钱 川芎 条芩各八分 陈皮 紫苏 炙草各四分 砂仁四分

【用法】加生姜为引，水煎服。

【主治】孕妇胎气上攻，心腹胀满作痛。

61742 **顺气导痰汤**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】导痰汤加香附 乌药 沉香 木香 磨刺

【用法】每服四钱，加生姜，水煎服。

【主治】①《医学入门》：中风，胸膈留饮，痞塞不通。②《杏苑》：狂癫惊痫。

61743 **顺气导痰汤**

【方源】《李氏医鉴》卷二。

【组成】橘红 茯苓一钱 半夏(姜制)二钱 甘草五分 胆星 木香 香附 枳实

【主治】痰结胸满，喘咳上气。

【备考】方中橘红、胆星、木香、香附、枳实用量原缺。

61744 **顺气利咽汤**

【方源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】枳壳 花粉 黄芩 乌药 陈皮各等分

【用法】引用葱白一茎，灯心一团，水二钟，煎七分，温服。

【主治】喉干燥疼痛，涎多气喘，风热积心，毒人肺中，呛食。

61745 **顺气利咽汤**

【方源】《喉科紫珍集》。

【异名】顺气利膈汤(《焦氏喉科枕秘》卷一)。

【组成】川芎 枳壳 乌药 白芷 陈皮各七分 桔梗 栀子 花粉各一钱 防风 黄芩各八分 粘子 元参各一钱二分 甘草五分

【用法】加连须葱一小枝，灯心二十寸，水二钟，煎七分，合后服。

【主治】①《喉科紫珍集》：痰壅气促，喉风肿胀，呛食难进，初宜服之。②《焦氏喉科枕秘》：风热积心，喉中干燥作疼，无痰涎而气喘者。

61746 **顺气利膈汤**

《焦氏喉科枕秘》卷一。为《喉科紫珍集》卷下“顺气利咽汤”之异名。见该条。

61747 **顺气沉附汤**

【方源】《医方大成》卷三。

【组成】大附子一只(炮)

【用法】上作二服，水一盏煎；别用水磨沉香，临熟时入药内热服。

【功用】升降诸气，暖则宣流。

61748 **顺气固胎饮**

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷三。

【组成】大腹皮 陈皮 甘草 茯苓 芍药 槟榔 木香 紫苏 川芎 砂仁 厚朴

生姜

【用法】水煎服。

【主治】妇人有胎，腹胀脐突，面浮足肿。

61749 **顺气和中汤**

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【异名】升气和中汤(《医统》卷五十三)、调中益气汤(《便览》卷一)。

【组成】黄耆一钱半　人参一钱　甘草(炙)七分　白术　陈皮　当归　白芍各五分　升麻　柴胡各三分　细辛　蔓荆子　川芎各二分

【用法】上㕮咀，作一服。以水二盏，煎至一盏，去渣，食后温服。一服减半，再服全愈。

【主治】气虚头痛。

①《卫生宝鉴》：阳虚头痛，恶风寒，气短弱而不喜食。②《玉机微义》：年高气弱，清气不能上升，头面昏闷，脉弱弦细而微。③《便览》：气血双虚头痛。

【方论选录】《卫生宝鉴》：以黄耆甘温补卫实表为君。人参甘温、当归辛温补血气，白芍酸寒收卫气而为臣。白术、陈皮、炙甘草苦甘温，养胃气，生发阳气，上实皮毛肥腠理为佐。柴胡、升麻苦平，引少阳、阳明之气上升，通百脉灌溉周身者也；川芎、蔓荆子、细辛辛温体轻浮，清利空窍为使也。

【临证举例】气虚头痛，杨参谋名德，字仲实，年六十岁，患头痛不可忍，昼夜不得眠。初医作伤寒解之，汗出痛加；复汗，头愈痛。今痛甚不得安卧，恶风寒而不喜饮食，诊甚六脉弦细而微，气短而促，语言而懒。此病年高气弱，清气不能上升头面，故昏闷，本无表邪，因发汗过多，清阳之气愈亏损，不能上荣，亦不得外固，所以头苦痛而恶风寒，气短弱而不喜食，正宜用顺气和中汤。此药升阳而补气，头痛自愈。

61750 **顺气和中汤**

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】半夏(制)六分　白茯苓七分　白术(土炒)八分　广皮(盐水浸，炒)一钱　枳实(麸炒)五分　甘草(炙)二分　香附(醋炒)一钱　山栀(姜汁炒黑)一钱　神曲(炒)六分　砂仁(炒)三分　黄连(姜汁浸，晒干，以猪胆汁拌炒)六分

【用法】上锉一剂。先以长流水入娇泥搅，澄清，取水一钟，加生姜三片，煎至七分，入竹沥、童便、姜汁，细细温服，不拘时候。

【主治】呕吐翻胃，嘈杂吞酸。

【加减】心胃痛，加姜汁三匙；气虚，加人参、黄耆各八分；血虚，加当归七分，川芎五分；恼怒或气不伸舒，加乌药五分，木香三分；胸膈饱闷，加萝卜子(炒)六分；心下嘈杂吞酸，加吴茱萸四分，倍黄连、白术；呕吐不止，加藿香七分；大便闭结，加苏子、麻仁、桃仁、杏仁，俱研如泥，每服一钱，白蜜调下。

61751 **顺气和血汤**

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】当归三钱　白术五钱　黄耆五钱　人参二钱　附子一片　天麻　南星　羌活　独活各五分　半夏一钱

【用法】水煎服。

【功用】补益气血，祛风化痰。

【主治】遍身麻木。

61752 **顺气枳壳丸**

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】枳壳(麸炒，去白)三两　益智仁　玄胡　雷丸　白豆蔻仁　木香　当归(去芦头，锉，炒)　白术　半夏(汤洗七次，切，焙干)各二两　缩砂仁四两　青皮(用汤浸去白)一两　牵牛二十两(微炒，取头末十两)　京三棱四两(煨熟，锉碎)　蓬莪术四两(煨熟，锉碎)

【用法】上为细末，用生姜半斤自然汁，同水打面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸至四十丸，诸饮皆可送下，不拘时候。如觉内伤，每服可用七八十丸至一百丸，有益无损。男子、妇人、老幼皆可服之。服一月后觉身轻为验。

【功用】宣通一切凝滞，消化宿食，清利头目，消磨积蕴痃癖，久服令人肥壮美，轻身进

饮食。

【主治】痃癖，形身瘦弱，及腿脚沉重，不任攻击者。

【宜忌】孕妇不可服。

61753 **顺气香砂饮**

【方源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】元参 山栀 粘子 木香 枳壳 赤芍 青皮 桔梗 茯苓 半夏 陈皮 砂仁 厚朴各等分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】喉肿。脾家积热，或因醉饱行房，致使气不流通，结肿于喉者。

61754 **顺气活血汤**

【方源】《伤科大成》。

【组成】苏梗一钱 厚朴一钱 枳壳一钱 砂仁五分 归尾二钱 红花五分 木香四分 炒赤芍一钱 桃仁三钱 苏木末二钱 香附一钱

【用法】水、酒各半，煎服。

【主治】损伤气滞血瘀，胸腹胀满作痛。

61755 **顺气活痰汤**

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】人参一钱 白术二钱 茯苓三钱 陈皮一钱 天花粉一钱 白芥子一钱 六曲一钱 苏子一钱 豆蔻三粒

【用法】水煎服。

【主治】气逆痰滞。

61756 **顺气养荣汤**

【方源】《易氏医案》。

【组成】当归八分 南芎六分 生地一钱二分 白芍（酒炒）一钱 陈皮六分 甘草五分 香附（醋炒）一钱 乌药五分 山栀（姜汁炒黑）五分 苏梗五分 黄芩（酒炒）八分 枳壳五分 青皮五分

【用法】水煎服。

【主治】久病不孕。

【加减】大便躁结，加黄芩、枳壳。

【临证举例】不孕症 一妇人体实，因久病不孕。众医皆为血虚，用参、耆大补半月，胸膈饱胀，食减，经下黑秽，或行或止，予治以顺气养荣汤十数剂，一月内有孕。

61757 **顺气逍遥散**

【方源】《外科集腋》卷四。

【组成】柴胡 白芍 陈皮 当归 瓜蒌 半夏 白术 茯神 人参 甘草 川芎

【用法】水煎十剂，去瓜蒌再十剂。

【主治】乳痞。由肝脾郁结而成乳中结核，形如丸卵，或痛或不痛，皮色如常。

61758 **顺气消痞丸**

【方源】《保命歌括》卷二十四。

【组成】木香五钱 益智仁二钱半 厚朴（姜汁炒） 草豆蔻二钱半 陈皮 青皮 苍术（米泔浸） 茯苓 泽泻 干姜各七钱 枳实（炒）一两 甘草 半夏各五钱 人参 当归各三钱 黄连五钱

【用法】上为细末，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】七情所伤，心下痞满，不思饮食。

61759 **顺气消滞汤**

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】陈皮二钱 半夏（姜炒）二钱 白茯苓（去皮）三钱 炒神曲二钱 丁香三分 柿蒂二个 黄连（姜炒）一分 香附二钱 白术一钱半 竹茹四钱 甘草八分

【用法】上锉。加生姜五片，水煎服。

【主治】因饱食后得气，发呃逆，连声不止者。

61760 **顺气消痰饮**

【方源】《外科十三方考》。

【组成】石燕一对（入锅，炭火煅红，醋淬七次，为末） 陈皮 半夏 茯苓各五钱 广香三钱 海藻 海带 昆布各一两 槟榔五钱 防风三钱 川芎 枳实 白芷 夏枯草各五钱 黄连 黄芩 栀子各一钱 赤芍 桔梗各三钱

【用法】水煎服，或作丸服均可。兼服金蚣丸更妙。

【功用】顺气行痰，开郁软坚。

【主治】瘰疬。

【加减】男子，加知母、黄柏各八分；女子，加当归、地黄、川芎、白芍各八分。

61761 **顺气益肝汤**

《女科证治约旨》卷三。即《傅青主女科》卷下"顺肝益气汤"。见该条。

61762 **顺气宽中散**

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】枳实(面炒) 槟榔 京三棱(煨) 蓬莪术(煨) 大麦蘖(炒) 人参(去芦头) 桑白皮(去粗皮，锉，炒)各一两 甘草(炙)七钱

【用法】上为细末。每服二分，加盐末少许，生姜二片，沸汤点服，不拘时候。

【功用】宣通气血。

【主治】阴阳不和，三焦痞膈，气行涩滞，中满不快，咽嗌噎闷，恚气奔急，肢体烦倦，不欲饮食。

61763 **顺气调经汤**

【方源】《医学探骊集》卷六。

【组成】木香三钱 延胡索三钱 香附米三钱 柴胡三钱 郁金四钱 棕榈炭三钱 黄芩四钱 万年灰三钱 枳壳三钱

【用法】水煎，温服。

【主治】气郁漏下。

【方论选录】此方专以破气为主。用木香、元胡、香附、枳壳、柴胡、郁金为之通行开导，以黄芩清其血之积热，以古灰、棕榈涩其血之妄行，其漏下自止矣。

61764 **顺气散瘀汤**

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】当归 川芎 白芍 生地 桃仁 红花 青皮 莪术 玄胡索

【用法】水煎，温服。

【主治】经水行时着气恼，以致瘀血内阻，心腹腰胁痛不可忍，脉弦急不匀。

61765 **顺气滑胎饮**

【方源】《妇科胎前产后良方注评》。

【组成】车前子五分 川芎一钱 当归一钱 茯苓六分 芍药六分 枳壳五分 滑石五分 花粉四分 香附五分 乌药五分 大腹皮(炒)五分 陈皮五分 甘草四分 黄杨木梳一个

【用法】葱须为引，黄酒煎服。

【主治】难产。

61766 **顺气聪耳汤**

【方源】《观聚方要补》卷七引《医学统旨》。

【组成】枳壳 柴胡各二钱 乌药 木通 青皮 川芎 石菖蒲各一钱 甘草五分

【用法】上锉，水煎服。

【功用】聪耳。

【主治】因脑怒而耳鸣。

【按语】方中川芎，《济阳纲目》作"川乌"。

61767 **顺气豁痰汤**

【方源】《赤水玄珠》卷三。

【组成】半夏(用白矾、生姜、皂角煮过)一钱半 茯苓 橘红 瓜蒌(去油) 贝母 黄连 桔梗 枳壳各一钱 香附(童便浸)七分 甘草四分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】因痰气滞于心胞络，而致舌痹或麻。

61768 **顺风匀气散**

《奇效良方》卷二。为《瑞竹堂方·补遗》"顺气散"之异名。见该条。

61769 **顺正集香散**

【方源】《幼幼新书》卷十引《医方妙选》。

【异名】集香散(《冯氏锦囊·杂症》卷三)。

【组成】降真香 沉香 檀香(各锉) 乳香(研) 安息香 人参(去芦头)各一两 茯神 酸枣仁各半两

【用法】上为细末。每服一钱，水八分一盏，入麝香少许，煎至五分，去滓温服。留药滓，卧室内烧之。

【主治】小儿白虎病。

61770 **顺肝益气汤**

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】人参一两 当归一两(酒洗) 苏

子一两(炒,研) 白术三钱(土炒) 茯苓二钱 熟地五钱(九蒸) 白芍三钱(酒炒) 麦冬三钱(去心) 陈皮三分 砂仁一粒(炒,研) 神曲一钱(炒)

【用法】水煎服。一剂轻,二剂平,三剂全愈。

【主治】妇人怀娠之后,肝血太燥,肝气横逆,恶心呕吐,思酸解渴,见食憎恶,困倦欲卧。

【备考】本方方名,《女科证治约旨》引作"顺气益肝汤"。

61771 **顺肝藏血丹**

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】白芍 当归 熟地各一两 荆芥(炒黑)三钱 牛膝 人参 茯苓各二钱 柴胡五分 乌药五分 泽泻一钱

【用法】水煎服。二剂即顺行。

【主治】妇人行经之前一二日,肝气逆而不顺,忽然腹痛而吐血。

61772 **顺经两安汤**

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】当归五钱(酒洗) 白芍五钱(酒炒) 大熟地五钱(九蒸) 山萸肉二钱(蒸) 人参三钱 白术五钱(土炒) 麦冬五钱(去心) 黑芥穗二钱 巴戟肉一钱(盐水浸) 升麻四分

【用法】水煎服。

【主治】妇人行经之前一日,因心肾不交,经流大肠,大便先出血者。

61773 **顺胎和气饮**

【方源】《宋氏女科》。

【组成】当归 白术 条芩 滑石 苏梗 芍药 大腹皮

【用法】水煎服。一剂服二次,八九日服一帖。

【功用】妊娠养胎。

61774 **顺胎和气饮**

【方源】《大生要旨》。

【组成】当归二钱 白术一钱五分(炒) 大腹皮八分(豆汁浸,水洗四次,净)

【用法】水煎服。

【功用】顺气和中,扶脾安胃。妊娠九月预防难产。

61775 **顺脾养肌散**

【方源】《圣济总录》卷一一八。

【异名】顺脾散(原书卷一八一)。

【组成】山芋一两 人参三两 桂(去粗皮) 白芷 甘草(炙,锉) 白术各一两 诃黎勒皮 白茯苓(去黑皮) 黄耆(锉) 木香各半两 肉豆蔻两枚(去皮)

【用法】上为末。每服一钱匕,食前茶点热服。

【主治】紧唇,及小儿唇疮未已,复被风冷所搏,疮口湿肿。

61776 **顺气五味子丸**

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】五味子(炒) 覆盆子(去蒂) 仙灵脾各一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,加至三十丸,空心、食前生姜腊茶送下。

【主治】三焦咳,腹满不欲食。

61777 **顺气白术橘香汤**

《圣济总录》卷五十四。为《博济》卷二"橘香散"之异名。见该条。

61778 **顺气消食化痰丸**

《医方集解》。即《瑞竹堂方》卷二"化痰丸"。见该条。

61779 **顺气搜风接命丹**

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】滑石 牛膝各一两五钱 大枫肉八两 荆芥一两 防风 川芎 当归 赤芍药 麻黄各五钱 黑山栀 黄芩 连翘 白术 甘草 薄荷 桔梗 全蝎 蝉蜕 羌活 独活 胡麻 葛根各六钱 石膏八钱 人参二钱五分 雄黄一钱五分 木香七分五厘 麝香五分

【用法】上为末,黄米酒煮糊为丸,如梧桐

子大。每服五十丸,酒送下。

【主治】大麻风。

皇

61780 **皇散**

【方源】《普济方》卷二七六引《卫生家宝》。

【组成】插芹(大蚌粉壳薄者,不拘个数,烧为灰,细研末,筛过)

【用法】看疮大小,用施入轻粉拌和,疮湿干掺上,疮干津唾调涂。不可近水。

【主治】臁疮、脚疮。

61781 **皇帝涂容金面方**

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷一引《医鉴》。

【组成】朱砂二钱　干胭脂一钱　官粉三钱　小脑五钱　乌梅肉五个　川芎少许

【用法】上为细末。临睡时津唾调,搽面上,天明温水洗面。美如童颜。

【功用】美容。

【备考】本方方名,《医部全录》引作"涂容金面方"。

泉

61782 **泉石散**

【方源】《普济方》卷三六三。

【组成】甘泉石　大黄　栀子仁　石决明　菊花　甘草各等分

【用法】上为末。每服半钱,食后煮狗肝汤送服。

【主治】小儿热疳雀目,青盲眼肿,并疳服生翳。

61783 **泉石散**

【方源】《普济方》卷四〇四。

【组成】井泉石(先为末,再研,水飞)　蝉壳　蛇皮　甘草各一两

【用法】上为末。每服半钱至一钱,蜜水调下。

【主治】小儿风热攻眼,及斑疮入眼。

【宜忌】忌油腻。

61784 **泉僧方**

【方源】《医统》卷七十七引《丛语》。

【组成】石榴皮根不拘多少

【用法】先吃白矾,次嚼黑豆,煮汁饮之,一二盏即吐出活虫而愈。

【主治】金蚕毒,才觉中毒。

追

61785 **追气丸**

【方源】《妇人良方》卷七引《灵苑》。

【组成】芸苔子(微炒)　桂心各一两　良姜半两

【用法】上为细末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服五丸,淡醋汤送下,不拘时候。

【功用】补血虚,破气块。

【主治】妇人血刺,小腹疼痛不可忍。

61786 **追气丸**

《普济方》卷三三五。为《圣惠》卷七十一"紫桂丸"之异名。见该条。

61787 **追风丸**

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】雀瓮内虫七枚　桑螵蛸七枚　干蝎尾一分　半夏一分　芦荟一分　天南星一分　川乌头一分(去皮脐)　大蜘蛛二枚(干者)　乌蛇肉一分

【用法】上生用为末,以熟枣瓤为丸,如大豆大。每服五丸,豆淋酒送下。更纳一丸子疮口中,上用薄纸盖之,当追风出,如吹动纸为验也。

【主治】破伤风,筋脉拘急,腰背强直,牙关急硬。

61788 **追风丸**

【方源】《圣惠》卷八十五。

【异名】追风丹(《普济方》卷三七四引《十便良方》)。

【组成】川乌头一两(炮裂,去皮脐)　干蝎一分(微炒)　白僵蚕一分(微炒)　白附子半分(炮裂)　干姜半分(炮裂,锉)　天南星半两(炮裂)

【用法】上为末，煮槐胶为丸，如黍粒大。每服五丸，以温酒送下，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：小儿急惊风甚者。②《普济方》引《十便良方》：小儿惊风，潮热至困者。

61789 **追风丸**

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】磁石（煅，醋淬十遍，研）一分　石硫黄（研）一钱　蓖麻子十五枚（去皮研）　干萵苣根三钱　芸苔子半两

【用法】上为末，临用以醋面糊为丸，手心内安之，用汤碗压。左㖞安右手，右㖞安左手。候口正即去之。

【主治】中风口㖞。

61790 **追风丸**

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】萆薢　马蔺花　骨碎补（去毛）　狗脊（去毛）各一两半　黄耆（锉）　五灵脂（炒）　枫香脂（研）　地龙（去土，炒）各一两　草乌头（生用）二两半　乳香（研）半两　没药（研）一分

【用法】上为末，米醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，加至十五丸，茶、酒任下。初服五六丸，渐加之。

【主治】风不仁，荣卫滞涩，筋脉缓纵。

61791 **追风丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】草乌头四两（去皮尖，冷水浸三宿）　苍术二两（米泔浸一宿，去粗皮，炒）　麻黄（去节）　白芷各半两　防风（去芦）　川芎各一钱半　地龙一两（去土）

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服七粒，空心临卧薄荷茶送下，一日三次。或作散剂，每服一字，冷茶调服。

【主治】诸风筋骨肢体痛，四肢不随。

【宜忌】忌热物一时辰。

61792 **追风丸**

【方源】《仙传外科集验方》。

【组成】沉香五钱（焙）　牛膝（酒浸，炒）　当归各三两（焙）　薏苡仁　白芷　川芎各二两　羌活　防风（炒）　川乌一只（炮）　赤芍（炒）　天麻（炒）　草乌（炒黄）　肉桂　干姜（炒）各一两　丁皮　乳香　没药　木香各五分　木瓜（炒）三两

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三十丸，酒送下。如脚气，用酒糊为丸，温酒送下。为末则用酒调服。

【主治】男子、妇人冷痹血气，手足顽麻，流注经络，成鼓椎风。

【宜忌】忌热食。

61793 **追风丸**

《寿世保元》卷九。为《瑞竹堂方·补遗》"追风丹"之异名。见该条。

61794 **追风丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】川乌（炙）一两　没药（醋炙）一两　木瓜一两　当归二两　续断五钱　麻黄五钱　马钱子（烫去毛）六钱　草乌（炙）一两　生杜仲一两　南红花一两　千年健五钱　独活　蕲蛇（酒炙）五钱　乳香（醋炙）一两　菟丝子一两　虎骨（油炙）一两　追地风五钱　羌活五钱　甘草五钱

【用法】上为细末，每十五两六钱细末兑麝香五分，和匀，炼蜜为丸，每丸重二钱，蜡皮封固。每服一丸，温开水或温黄酒送下。

【功用】祛风散寒，活络止痛。

【主治】风寒湿痹，腰腿疼痛，手足麻木，半身不遂。

【宜忌】孕妇忌服。

61795 **追风丹**

《普济方》卷三七四引《十便良方》。为《圣惠》卷八十五"追风丸"之异名。见该条。

61796 **追风丹**

【方源】《瑞竹堂方·补遗》。

【异名】追风丸（《寿世保元》卷九）。

【组成】何首乌　荆芥穗　苍术（米泔浸一宿，焙干）　苦参各等分。

【用法】上为细末，好肥皂角三片（去皮弦），盛子瓷器内，熬膏为丸，如梧桐子大。每

服三五十丸，空心酒、茶任下。

【主治】白癜风。

【宜忌】忌一切动风之物。

61797 追风丹

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】川芎二两 细辛六钱 半夏 桔梗 附子 薄荷叶 川乌 白附子各二两 鱼鳔 人参 朱砂(研)六钱 白花蛇 麝香四钱 南星三钱 蜈蚣四条 大蝎尾(去钩)二钱

【用法】上为末，生姜汁和剂为锭。每服一锭，温酒化下。以汗出为度。

【主治】风痫及破伤风、暗风。

【备考】本方鱼鳔、人参、白花蛇用量原缺。

61798 追风丹

【方源】《回春》卷五。

【组成】苍术(米泔浸，炒) 草乌(炮) 白芷 羌活 当归 赤芍 虎胫骨各等分

【用法】上为末。每服五七分，酒调服。为丸亦可。

【主治】腰腿脚膝疼痛。

61799 追风饼

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】防风(去芦) 羌活 海桐皮 威灵仙 石膏(生用) 抚芎各一两 细辛 苍术各一两半 草乌头(切，同苍术用盐一撮炒盐令黑) 天花粉各三两 藁本 蔓荆子 草薢 藿香叶(去土) 白芷各半两 官桂三钱(去粗皮，不见火)

【用法】上为细末，蒸饼糊和为饼子，如弹子大。每服一饼，温酒或茶清嚼下；偏正头风，薄荷茶嚼下，半饥时服；头风食后服。

【主治】三十六种风，左瘫右痪，手足不随，面口㖞斜，偏正头风。

61800 追风散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】天南星一两(炮裂) 白附子一两(炮裂) 干蝎三分(微炒) 羌活三分 防风三分(去芦头) 半夏三分(汤洗七遍去滑) 乌蛇肉一两(酒浸，炙微黄) 蛇床子三分 藁本三分 白芷三分 天麻一两 蔓荆子三分 牛黄半两(研细) 附子一两(炮裂，去皮脐) 威灵仙半两 麝香三分(研细) 麻黄一两半(去根节) 白僵蚕一两(微炒) 犀角屑三分

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】贼风，口噤昏沉，半身不遂，风毒入脏，口面㖞斜。

61801 追风散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】天雄半两(去皮脐) 桂心半两 半夏半两 川乌头半两(去皮脐) 天南星半两 密陀僧半两

【用法】上生用，为细散。每取三钱，于破伤处封疮口。其风自出，如风雨声便愈。

【主治】破伤风。

61802 追风散

【方源】方出《证类本草》卷十引《简要济众方》，名见《普济方》卷三六七。

【组成】藜芦一两(去芦头)

【用法】浓煎防风汤浴过，焙干，切，炒微褐色，为末。每服半钱，小儿减半，温水调灌。以吐风涎为效，未吐再服。

【主治】中风不省人事，牙关紧急者。

61803 追风散

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】乌头(去皮脐) 附子(去皮脐) 天南星(去脐) 白附子 白花蛇(酒浸，去皮骨，焙) 丹砂(研)各一两 蝎梢 麝香(研)各三分 腻粉(研)一分

【用法】上并生用，为细散，入研药合研匀，瓷盒收。每服半钱至一钱，豆淋酒或煎葱白酒调下。口噤者，用少药揩牙即开。

【主治】一切急风，角弓反张，四肢抽掣，牙关紧急，骨节疼痛及破伤风。

61804 追风散

【方源】《卫生总微》卷十九。

【组成】草乌头四个（二个生用，二个炮熟） 椒二十八粒

【用法】上为末。贴疮上。风毒自出。

【主治】小儿破伤风。

61805 追风散

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】蝉蜕（去土）不以多少

【用法】上为细末。掺在疮口上。毒气自散。

【主治】破伤风。

61806 追风散

【方源】《传信适用方》卷四。

【组成】全蝎一个 母丁香二个 瓜蒂七枚） 赤小豆四十九粒

【用法】上为细末。每服一字许，米饮调灌之。吐出风涎方可治，然后服天麻丸。

【主治】小儿因惊中风，角弓反张，及慢脾风。

61807 追风散

【方源】《局方》卷一（宝庆新增方）。

【异名】大追风散（《奇效良方》卷二十四）。

【组成】川乌（炮，去皮脐尖） 防风（去芦叉） 川芎（洗） 白僵蚕（去丝嘴，微炒） 荆芥（去梗） 石膏（煅，烂研） 甘草（炙）各一两 白附子（炮） 羌活（去芦，洗，锉） 全蝎（去尾针，微炒） 白芷 天南星（炮） 天麻（去芦） 地龙（去土，炙）各半两 乳香（研） 草乌（炮，去皮尖） 没药（研细） 雄黄（研细）各一分

【用法】上为细末。每服半钱，入好茶少许同调，食后及临睡服。

【功用】清头目，利咽膈，消风壅，化痰涎。

【主治】年深日近，偏正头痛；肝脏久虚，血气衰弱，风毒之气上攻头痛，头眩目晕，心忪烦热，百节痠疼，脑昏目痛，鼻塞声重，项背拘急，皮肤瘙痒，面上游风，状若虫行；一切头风；兼治妇人血风攻注，头目昏痛。

61808 追风散

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】川姜（炮制） 川椒（去目）各等分

【用法】上为细末。每用以指蘸药，随时擦牙痛处，后用盐汤漱之。

【主治】牙齿疼痛不止。

61809 追风散

【方源】《局方》卷一（续添诸局经验秘方）。

【组成】白僵蚕（去丝嘴，炒） 全蝎（微炒） 甘草（炙） 荆芥各二两 川乌（炮，去皮脐） 防风（去芦叉） 石膏（研）各四两 川芎三两 麝香（研）一两

【用法】上为细末。每服半钱，食后、临卧好茶调下。

【功用】清头目，利咽膈，消风壅，化痰涎。

【主治】年深日近，偏正头痛；肝脏久虚，血气衰弱，风毒之气上攻头痛，头眩目晕，心忪烦热，百节痠疼，脑昏目痛，鼻塞声重，项背拘急，皮肤瘙痒，面上游风，状如虫行；一切头风；兼治妇人血风攻注，头目昏痛。

61810 追风散

【方源】《瑞竹堂方》卷三。

【组成】贯众 鹤虱 荆芥穗各等分

【用法】上㕮咀。每用二钱，加川椒五十粒，用水一碗，煎至七分，去滓热漱，吐去药。立效。

【主治】诸般牙疼。

61811 追风散

【方源】《得效》卷十七。

【组成】黄丹 朴消 猪牙皂角（烧灰） 缩砂壳（灰）各五钱

【用法】上为末。每服少许，以鹅毛蘸入口中舌上下及肿处，用温水灌漱。如喉间毒已破，疮口痛者，用猪脑髓蒸熟，淡姜醋蘸吃。如病将愈身体痛，于药内加川秦艽同煎。

【主治】咽喉结肿。

61812 追风散

【方源】《医方类聚》卷二十四引《急救仙方》。

【组成】大黄六两 川蝉肚（即郁金）一两八钱 皂角刺一两

【用法】上为末。第二日始服。初服六钱，

或七钱，或五钱，入大枫油二钱半，净朴消少许，用好煮酒一碗调化，不可热，微温服，晚粥不食，直待戌时，放温水一碗于盆内，更以糖煎或蜜煎少许，安放盘中。服药了，放碗即用水盥漱毕，以蜜煎过口。切不可卧，令人伴坐良久，肚腹大痛最妙，泻十数次不妨，过毕用薄粥补之。

【主治】大风。

61813　**追风散**

【方源】《普济方》卷五十三。

【组成】藜芦　雄黄　川芎　白芷　石菖蒲　全蝎　藿香　薄荷　鹅不食草(无鹅草加龙脑少许)　苦丁香各等分　麝香少许

【用法】上为细末。吹鼻中。仍服顺气散即通。

【主治】耳聋闭塞不通。

61814　**追风散**

【方源】《普济方》卷七十三。

【组成】川乌　防风　细辛　甘草(炙)　川芎　白芷　荆芥　苍术各一两　草乌半两　薄荷　全蝎

【用法】上为末。食前清茶或酒调下。

【功用】去翳。

【主治】头风注眼，目赤烂。

【备考】方中薄荷、全蝎用量原缺。

61815　**追风散**

《普济方》卷一〇二。即《圣济总录》卷十四"镇心追风散"。见该条。

61816　**追风散**

《普济方》卷二七五。为《圣济总录》卷一三三"追水散"之异名。见该条。

61817　**追风散**

【方源】《夺效良方》卷六十四。

【组成】人参　茯苓　防风　川芎　柴胡　羌活　枳壳　桔梗　甘草各等分

【用法】上锉碎。每服二钱，水一钟，加生姜三片，煎至五分，不拘时服。

【主治】小儿感冒发热，手足拘挛。

61818　**追风散**

【方源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】淮乌　川乌　牛膝　麝香　草乌　良姜　细辛各等分

【用法】上为细末。吹患处。

【主治】舌喉风，喉下、腮颔肿痛，舌硬卷高，牙关紧急，手反，兼寒热往来，发热恶寒者。

61819　**追风散**

【方源】《焦氏喉科枕秘》卷二。

【组成】淮乌　川乌　草乌　牛膝　麝各等分

【用法】上为极细末，瓷瓶收好。用时以针刺破吹之。

【主治】牙龈内两边生痈，致舌肿大。

61820　**追风散**

【方源】《痧喉证治汇言》。

【组成】川乌　麝香　细辛　良姜　草乌各等分

【用法】上为细末。吹患处。

【主治】咽喉一切诸症。

61821　**追风散**

【方源】《梅氏验方新编》卷七。

【组成】北细辛　川乌　草乌　防风　白芷　川芎　薄荷　苍术各一钱　南星　雄黄各五分

【用法】上为极细末。热酒调敷，盖纸扎定，日换二次。先用热尿淋洗，挤出恶血，随敷此散。

【功用】追风拔毒。

【主治】疯犬刚咬。

61822　**追风散**

【方源】《秘传大麻风方》。

【组成】葶苈三分　胡麻(炒)　苦参　蒺藜(炒)　防风　花粉　全蝎各二两(醋炙黄)　僵蚕(炒)　蝉退各三两　甘草(水洗)

【用法】上为末，加轻粉一两和匀，分作十八次服，苦茶送一服。服三日后，唇口肿起，牙缝吐黑水二碗，必遍身疼痛；如痛、臭，用漱口散；服尽，必痢下五色便溺，乃脏腑根源毒气

恶水皆出。

【主治】大麻风浑身黑而不发出者。

【宜忌】虚人忌用。

【备考】痢下之物用瓦器盛之，埋于无人处。病人吃粥时，用漱口散药，吐尽毒物，方可吃粥。间人看望，须待漱口完后方可入所。吐毒物用盖桶盛之，埋人土内，须防毒气传染。方中甘草用量原缺。

61823 追风散

【方源】《秘传大麻风方》。

【组成】大力子三钱 胡麻 杞子 蔓荆子 苦参 天花粉 蒺藜 防风各三两 蝉退 全蝎 僵蚕各三两 蜈蚣三条(酒洗)

【用法】上为末。加乳香一钱一分，作十八服。每日空心服二钱，好茶送下。服三日后，唇肿。牙缝出血，遍身如刀刺。觉口臭，用漱口药。服六七日，必痢下五色粪，乃脏腑毒气根源。

【主治】白粉疯，形如白粉，肌肤如霜。

【备考】所出恶水臭物，瓦器盛之，埋无人处。患人吐出漱水，不可咽下，少顷方可吃粥，不至毒气入肠。吐时须用有盖桶盛之，埋过，勿令好人染其毒也。

61824 追风膏

【方源】《医方易简》卷六。

【组成】生黄花椒子一两 苍耳子二两 生五月艾二两 豨莶草叶二两 老姜一两 生薄荷二两 生耳艾二两 老干樟木三钱 紫苏叶二两 葱头二两(捣烂，晒干，研末) 丁香五钱 木香五钱 胡椒五钱 苍术五钱 砂仁五钱 白芨五钱 半夏五钱 豆蔻五钱 南星五钱 石菖蒲五钱 蛇床子五钱 蓖麻子五钱 羌活三钱 草薢一两

【用法】将此药加跌打草药末二两和匀，芝麻油一斤煮老，滴水成珠，即抽锅离火。先下松香片四两，洋白松香一斤，搅匀溶透，再下各药末，若软，随时稍下飞黄丹，搅至合式，然后再上炉，文武火煎滚，搅匀，滴水试，合式为好，待冷，外用油纸摊开。

【主治】男女远年瘀痛，天将风雨，周身骨节痠软。

61825 追风膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】牛膝二两 桃仁二两 麻黄二两 当归二两 生草乌二两 良姜二两 独活二两 肉桂二两 赤芍二两 海风藤二两 红花二两 威灵仙二两 大戟二两 天麻二两 羌活二两 生山甲二两 细辛二两 乌药二两 蛇退五钱 苏木一两 蜈蚣五钱 生地一两 熟地一两 生川乌五钱 川断一两 白芷二两 五加皮五钱

【用法】上切，用香油一百九十二两，文武火炸枯，去滓过滤，炼至滴水成珠，再入黄丹七十二两成膏，取出放入冷水中出火毒后，加热溶化，另兑细料丁香一钱，没药三钱，雄黄三钱，檀香三钱，血竭三钱，麝香一钱，乳香三钱，冰片一钱(研细和匀)。每大张重一两，小张五钱。微火化开，贴患处。

【功用】舒筋活血，追风散寒。

【主治】筋骨疼痛，四肢麻木，行步艰难，腰膝无力。

【宜忌】《天津市固有成方统一配本》：孕妇忌贴腰腹部。

61826 追水散

【方源】《圣济总录》卷一三三。

【异名】追风散(《普济方》卷二七五)。

【组成】真炭灰四两 豮猪胆一枚 蛤粉二两

【用法】上细罗灰。以纸一幅铺地上，摊灰可两指厚，取猪胆汁倾灰上，经宿，取湿着灰晒干，入蛤粉同研匀。每用少许掺疮上。如疮口合者，以针挑破掺之，水即出。

【主治】水毒入诸疮，肿痛不止。

61827 追龙丸

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】斑蝥(炒干，研极细末)60 克

【用法】先用糯米粽捣烂成糯米浆。另将斑蝥末放石臼内，逐次加入糯米浆，捣至适可

做丸为度，捻成荞麦子大小丸药（比芥菜子略大）晒干备用。每日服一丸，开水吞服（不可嚼碎），不可多服。服丸后如发小便刺痛、尿闭或尿血等情况，应立即停服，并服生鸡蛋清可解。

【功用】内消肿核。

【主治】痰核，瘰瘤，阴疽，无名肿毒。

【宜忌】有泌尿系统病者禁服。

61828　**追虫丸**

【方源】《普济方》卷二三九。

【组成】雷丸一两　白芜荑一两(炒)　槟榔一两　使君子(肉)半两　白术半两　黑牵牛(头末)一两　大黄(锦纹者)一两半　当归一两

【用法】上为末，不可见火，用面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，小儿七丸或三丸，痨证，桃柳头汤五更送下；小儿空心沙糖汤送下；诸杂病，生姜汤送下。

【主治】痨证及诸杂病。

61829　**追虫丸**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】大黄　黑丑各一两　山楂　莪术各六钱　槟榔　大腹子各四钱　雷丸　沙糖各三钱　木香二钱　皂角一钱

【用法】上为末。沸汤调服。

【功用】追虫。

【主治】诸虫。

【备考】本方方名，据剂型当作“追虫散”。

61830　**追虫丸**

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】干漆五钱(炒去烟)　雄黄二钱五分　巴豆霜一钱

【用法】上为末，面糊为丸，如黍米大。每服十二三丸，带子苦楝根皮煎汤送下。

【主治】虫咬心痛。

61831　**追虫丸**

【方源】《回春》卷四。

【组成】木香　槟榔　芜荑　锡灰各一钱　史君子(肉)二钱　大黄二钱　牵牛(末)一两

【用法】先将皂角与楝树根皮浓煎二大碗，煎熬成膏，和前药末为丸，如梧桐子大，将沉香为衣，后又将雷丸末为衣。每服五十丸，空心沙糖水送下。

【功用】追取虫积。

【主治】肠胃湿热所生诸虫。

61832　**追虫丸**

【方源】《准绳·类方》卷八。

【组成】黑牵牛(取头末)　槟榔各八两　雷丸(醋炙)　南木香各二两

【用法】上为末，茵陈二两，大皂角、苦楝皮各一两，煎浓汁为丸，如绿豆大。大人每服四钱，小儿三钱或二钱，或一钱半，五更用沙糖水吞下。待追去恶毒虫积二三次，方以粥补之。

【主治】一切虫积。

61833　**追虫丸**

【方源】《幼科折衷》卷下。

【组成】槟榔　芜荑　雷丸　定粉　鹤虱　史君子肉

【用法】上为末，水泛为丸。内服。

【主治】蛔虫。

61834　**追虫丸**

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】黑丑　槟榔　雷丸　南木香　史君子　苦楝根皮各等分

【用法】上为末，以苦楝皮煎汤为丸，如梧桐子大。每服二三钱，食前服。

【主治】虫积腹痛。

61835　**追虫丸**

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷五。

【组成】苦楝根皮　贯众　木香　桃仁(去皮尖，炒)　芜荑(炒)　槟榔各一钱　当归　鹤虱(炒)各一钱五分　轻粉一角　干蟾(去头，酥炙)　黄连(炒)各一钱　史君子(肉)二十五粒

【用法】上为细丸。肉汁汤送下。

【主治】小儿疳积。

61836　**追虫丸**

【方源】《医学心悟》卷四。

【组成】大黄（酒拌，三蒸三晒）一两 木香五钱 槟榔一两 芜荑（去梗）一两 白雷丸一两 白术（陈土炒）七钱 陈皮七钱 神曲（炒）五钱 枳实（面炒）三钱五分

【用法】上为末，用苦楝根皮，猪牙皂角各二两，浓煎汁一碗，和前药为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心沙糖水送下。

【主治】湿热虫痛，贯心伤人。

【加减】大便不实者，除大黄。

61837 **追虫丸**

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】大黄一两 续随子 槟榔 牵牛 大戟各五钱 芫花一钱 麝香五分

【用法】上为末，面糊为丸，如龙眼核大。每服一丸，酒送下。

【主治】妇人经来下白虫，形似鸡肠，满肚疼痛。

61838 **追虫丹**

《济阳纲目》卷六十六。为《医学入门》卷七“追病丹”之异名。见该条。

61839 **追虫丹**

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】甘草 枳壳 雷丸各一钱 黄连 百部 槟榔各二钱 人参 使君子肉各三钱 白术五钱

【用法】水煎服。

【功用】补脾胃，除虫。

【主治】虫积于内，脾胃虚弱，面黄体瘦，善食易饥，不食则痛，一旦大泻，连虫而下，如团如结，血裹脓包。

61840 **追虫串**

【方源】《串雅补》卷二。

【组成】黑白丑 槟榔 广木香（少许） 枳壳 生军（炒） 蓝布灰

【用法】柳叶汤送下。如要取螺蛳积，干漆灰为引。

【功用】追取虫积。

61841 **追虫散**

【方源】《回春》卷七。

【组成】使君子（用肉）二钱（用壳五分） 槟榔一钱

【用法】上锉一剂。水煎，食远服。

【主治】小儿虫积腹疼，口中出清水者。

61842 **追虫散**

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】槟榔

【用法】上为细末。每月初旬，先将炙香猪肉一块，嚼咽其津，勿食其肉，候虫上胸中，如箭攻钻然，用石榴东引根煎汤，调服三钱。其虫消杀。

【主治】寸白虫所苦，心腹痛，恶心。

61843 **追虫散**

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】苦楝根皮四两 川楝子一两 槟榔一两 黑丑二两 使君子肉四钱 蓬术六钱 牙皂三钱 秦艽六钱 三棱六钱 芜荑三钱

【用法】上为细末。砂仁汤调服。

【主治】虫证。恶心、呕清水及蛔虫，胃中作痛，得食即止。

61844 **追虫散**

【方源】《痘学真传》卷七。

【组成】鹤虱五钱 雷丸三钱 黑牵牛八钱 大黄一两二钱 木香二钱

【用法】上为末。空心用黑糖油二三匙，淡姜一片，泡汤调服，每岁约用三分。宜先补脾胃，继用此药以攻之，攻后再须补之。

【主治】痘后饮食失调，变生虫积者。

【方论选录】鹤虱、雷丸以杀虫；牵牛、大黄以逐水去积；木香调和胃气。

61845 **追虫散**

【方源】《春脚集》卷四。

【组成】黑丑（取头末）一两五钱 白丑（取头末）一两 槟榔一两五钱 鹤虱一两 雷丸一两 使君子（去皮，切片）三十个

【用法】上为细末。每服五钱，五更以沙糖和水调服。至日中时，其虫必以大便而出。隔

五日再照法服一次，其根永断。凡服此药，要在上半个月虫头向上方效。

【主治】大人、小儿纵食瓜果生冷之物，以致胃寒生虫，肚痛，面黄肌瘦，唇生白点，发作时叫号疼楚，食下即吐，或呕涎沫，甚则晕厥，凡食甜物其病立发者。

61846　**追疔汤**

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】羌活　独活　青皮　防风　黄连　赤芍　细辛　甘草节　蝉退　僵蚕　独脚莲各五分

【用法】上将泽兰叶、金银花、金钱重楼各一钱，生姜擂酒或擂水，入酒热服；然后用生姜十片，水、酒各半，煎前药热服。衣覆取汗。

【主治】疔疮。

【加减】有脓，加首乌、白芷；取利，加青木香、大黄；在脚，加木瓜；病减后，加大黄二钱以去余毒。

61847　**追疔散**

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】患者耳垢　齿垢　手足指甲屑

【用法】和匀如豆大，放茶匙内，灯火上炙少许作丸，将银簪挑开疔头抹入，外用绵纸一层浸湿覆之。

【主治】一切恶疔、须疔、红丝疔、白面疔。

61848　**追命丹**　《御药院方》卷十。为《济生》卷八“狗宝丸”之异名。见该条。

61849　**追命丹**　《袖珍》卷三。为《杂类名方》“夺命丹”之异名。见该条。

61850　**追命散**

【方源】《续本事》卷二。

【组成】川大黄(实者)　皂角刺各半斤　川郁金五两

【用法】上为细末。每服三大钱，用真大枫油人无灰酒温调药末，临睡时服。

【主治】大风。

61851　**追命散**

【方源】《卫生家宝》卷七。

【组成】半两钱四五十文(火煅通赤，淬酽醋中不计次数，于醋底淘取淬下碎铜末研之，粗碍乳锤者去之，别以水淘，澄取如粉者，纸上渗干)二钱一字　巴豆(去皮壳心膜)三钱半(用酸浆水一盏，煮至水欲尽，焙干，研如泥)　大黄(绵纹紧实者)八钱(用小便浸七日，每日一换，日足，湿纸裹煨熟，薄切，焙干为末)三钱半　羊胫炭(即炭中圆细紧实如羊胫骨者，取三四寸，却作十余段，别以着炭同烧通红，淬入醇酒中，如是七遍，烘干为末)半两

【用法】上合和为散，于瓷罐于实筑，腊纸密封，收高处。每一服一字至半钱，浓煎当归酒和小便调下。伤折即全用酒，多饮不妨；若产妇血未定，及素饮酒人，即少借酒力行药，多以童便下之可也。

【主治】妇人血瘕积聚疼痛，渐至经候隔绝消失、痨瘵；产妇危恶变证，胎死上冲，闷运欲绝，及产后血晕；打扑伤损，筋断骨折及破伤风。诸证人气已死，但心头尚暖者。

61852　**追疟饮**

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】何首乌一两(制)　当归　甘草　半夏　青皮　陈皮　柴胡各三钱

【用法】上用井水，河水各一钟，煎一钟，滓再煎一钟，同露一宿，次早温服一钟，饭后食远再服一钟。

【功用】截疟。

【主治】凡血气未衰，屡散邪之后疟有不止者。

61853　**追毒丸**

【方源】《圣济总录》卷一三八。

【组成】巴豆(去皮心膜)十四枚　白丁香二十一枚　豆豉二十一粒　屁盘虫七枚

【用法】上为细末，滴水为丸，如雀粪大。放入疮内，追汁尽即止。

【功用】蚀恶肉。

【主治】痈疽已溃。

61854　**追毒丸**

【方源】《医学纲目》卷十九引丹溪方。

【组成】海浮石（烧赤，醋焠七次）半两 乳香 没药各一钱 巴豆四十九粒 川乌一两

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。若患二三日服十丸，五六日服十四丸，随病上下服之。先吃冷酒半盏或一盏，又用冷酒吞下。如呕，吞之不妨，出药后再依上法服之。病人大便不动，再用三丸。如疔，看得端的爪破，用头垢留患处，后服药。

【主治】疔疮。

61855 追毒丸

《准绳·疡医》卷一。为《百一》卷十七"神仙解毒万病丸"之异名。见该条。

61856 追毒丸

【方源】《准绳·疡医》卷二。

【组成】虾蟆粪二分 蔗虫 雄黄 黄丹各一分

【用法】上为末，水为丸，如米大。将疮拨开头，入药在内，以膏药贴之。

【主治】疔疮发背。

61857 追毒丸

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】青竹蛇 防风 穿山甲（炮） 羌活 猪牙皂各三钱 全蝎二对 当门子 蟾酥各三分 瓜儿竭 乳香（去油） 孩儿茶 没药（去油） 明雄黄 白砒（肉制） 大朱砂 茜草 雷公藤各五分 甘草 当归尾各八分 蜈蚣三条 金银花五钱

【用法】上为极细末。大人每服三分至五分，小儿一分至二、三分，无灰酒调服。令醉自消。

【主治】一切痈疽。

【备考】本方方名，据剂型，当作"追毒散"。

61858 追毒丸

《疡医大全》卷二十三。为《良朋汇集》卷五"追毒化管作脓丸"之异名。见该条。

61859 追毒丹

【方源】《济生》卷六。

【组成】巴豆七粒（去皮心，不去油，研如泥） 白丁香一钱 雄黄 黄丹各二钱 轻粉一钱

【用法】上研和，加白面三钱，滴水为丸，如麦粒状。针破疮纳之，上覆以乳香，追出脓血毒物。治漏疮四壁死肌，亦以此法追毒，小者一粒，大者加粒数用之。治疽疮黑陷者，先用狗宝丸治，次以乌龙膏收肿散毒，去赤晕，及用针刀开疮，纳之使溃。

【主治】漏疮，痈疽黑陷，及痈疽丁疮、附骨疽。

【备考】加蟾酥尤效。

61860 追毒丹

【方源】《外科集验方》卷上。

【组成】蟾酥一钱（干用，老酒化） 蜈蚣（酒浸，炙干黄） 硇砂一钱 白丁香一钱（无此味加巴豆） 巴豆七粒（去壳，不去油） 雄黄二钱 轻粉一钱 朱砂二钱（为衣，如无，黄丹亦可）

【用法】上为细末，面糊为丸，或酒糊为丸，如麦粒大。疔疮，纳人针破疮口内，用水沉膏贴之，后用膏药及生肌药追出脓血毒物。如黑陷漏疮，亦用此药追毒，小者用一粒，大者加用之。病轻者不必用针，只以手指甲爬动，于疮顶上安此药，水沉膏贴之，其疮即时红肿为度。

【功用】取黄去疔头，追脓毒，去死肌败肉，生新肉。

【主治】疔疮，漏疮。

61861 追毒丹

《丹溪心法附余》卷二十四。为原书同卷"太乙神丹"之异名。见该条。

61862 追毒丹

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】明雄精 马牙消各一两 当门子 麝香三钱 白龙脑一钱

【用法】上药精选上品，五月五日正午时，同研至无声，晶瓶收藏，黄腊封口，勿走泄香味。临用以骨簪略润津唾，蘸点大眼角（即目内眦），男左女右，闭目静坐片时，伤处自流毒

水，痛止肿消。每月只点二次，不宜过多。

【主治】蛇伤，狗咬。

【宜忌】忌食赤豆百日，并勿渡水。

61863 **追毒饮**

【方源】《圣济总录》卷六十。

【组成】狗脊(去毛)一两 白芥子一钱 甘草一分

【用法】上锉细。用酒一升，煎取半升，去滓，分温二服。利下为度。

【主治】酒疸，遍身发黄。

61864 **追毒饮**

【方源】《玉案》卷六。

【组成】归尾 川芎各八分 荆芥 干葛 乌药 独活 赤芍各六分 白芷 升麻各四分 羌活 甘草节 防风 枳壳 红花 苏木各七分

【用法】上以水二钟，煎八分，食远服。

【主治】一切内外疔疮。

61865 **追毒饼**

【方源】《得效》卷十九。

【组成】极好信石半钱 雄黄 雌黄 大朱砂各一钱 轻粉少许

【用法】上为细末，糯米糊为丸，如麦粒大。若疮口闭合生脓，将药入内，仍以膏药贴之。

【主治】诸般恶疮，因针开了口后又闭合生脓，胀痛不可忍。

61866 **追毒散**

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】螺儿青 拣甘草各一两 白矾二钱半

【用法】上为细末。每服一钱，新汲水调下，立止。

【主治】生疮发闷，吐逆霍乱。

61867 **追毒散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】甘草 干沙糖 糯米粉各等分

【用法】上为细末。净洗疮口，干掺。恶水出尽为度。上药数遍，有死肉即追出。后用前红玉散干掺疮口，次用万金膏贴之。

【功用】追死肉恶水。

【主治】一切恶疮。

61868 **追毒散**

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】五灵脂 川乌头(炮) 白干姜(炮)各一两 并盐 全蝎各半两 吊灵根三两 无心草二两

【用法】上为细末。每用药少许，津唾调涂患处。

【功用】追毒排脓。

【主治】诸疮。

61869 **追毒散**

【方源】《外科精义》卷下引成子玉方。

【组成】五灵脂 川乌头(炮) 白干姜(炮)各一两 全蝎五钱

【用法】上为细末。用少许掺疮口中；深者纸捻蘸药纳入疮口内，以膏贴之。或水浸蒸饼令浸透，搦去水，和药令匀，捻作锭子，每用纳入疮口中。

【主治】一切恶疮，脓水不快者。

【备考】本方制成锭剂，名“追毒锭子”。

61870 **追毒散**

【方源】《普济方》卷二七五。

【组成】巴豆半两(去皮) 雄黄三钱 豆粉三钱

【用法】上为细末。量疮贴之。

【功用】追毒，去死肉。

【主治】一切恶疮。

61871 **追毒散**

【方源】《普济方》卷二七八。

【组成】草乌头(去皮脐，生，捣为细末)一两 蚌粉五钱

【用法】上拌匀。视疮疖大小，临时用新汲水调，摊纸上贴之。

【主治】一切热肿，欲结疮疖，焮赤疼痛。

61872 **追毒散**

【方源】《普济方》卷二八三。

【异名】四调膏。

【组成】滑石 寒水石 黄连 大黄

【用法】上为细末。用朴硝调，敷疮上肿处。

【主治】一切痈疽疮疖。

61873 追毒散

【方源】《活人心统》卷三。

【组成】川山甲（炒） 川归 大黄各三钱 玄明粉 僵蚕 乳香 没药各一钱五分 白芷二钱

【用法】上以水二钟，煎七分，食远服，渣再煎服。

【主治】一切痈疽、便毒初起。

61874 追毒散

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】贯众 鹤虱 荆芥 细辛 蜂房各等分

【用法】上为粗末。每用三钱，加川椒五十粒，水一钟，煎七分，乘热漱之。

【主治】诸般牙疼。

61875 追毒散

【方源】《便览》卷四。

【组成】人参 黄耆 厚朴 甘草 防风 柴胡 川芎 羌活 桔梗 枳壳 乌药 归身 芍药 白芷

【用法】水煎，空心服。

【主治】骑马痈。

61876 追毒散

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】当归尾 赤芍 白芷 金银花 天花粉各一钱 白僵蚕（炒）六枚 木别子十个 川山甲二片 大黄三钱 芒消二钱（一方加五灵脂更妙，一方加射干，去芒消）

【用法】上锉一剂。好酒煎，露一宿，五更热服。厚盖发汗，利一二行即愈。其消、黄待群药煎将熟方入，再二沸用之。

【主治】便毒。

61877 追毒散

【方源】《济阳纲目》卷一〇七。

【组成】雄黄 人言 硼砂 轻粉 寒水石 龙骨各等分

【用法】上为细末。疮口贴之。

【主治】一切痔，不问年深日久，及冷痔。

61878 追毒散

【方源】《医钞类编》卷五引《集验方》。

【组成】黄耆 半夏（洗） 炙草 当归 陈皮（去白）一两 熟地 白芍 枳实（炒） 麻黄（去节）各二两 桂心三两

【用法】每八钱，加生姜七片，大枣三枚，水煎服。

【主治】三阴合并脚气。

【备考】方中黄耆、半夏、炙草、当归原量原缺。

61879 追毒散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】五灵脂 川乌头（炮） 僵蚕各一两 全蝎五钱

【用法】上为末。掺之。

【主治】一切恶疮，脓水不收。

61880 追毒膏

【方源】《博济》卷五。

【异名】神妙追毒煎（《圣济总录》卷一二七）。

【组成】丁香七个 麝香一钱 莨菪五十粒 雄鼠粪七粒（两头尖者，以麦麸两匙同炒，候麸黑黄，去麸用） 斑蝥三个（去翅足，以糯米炒令黄，去米用） 槲皮三斤（去粗皮，捶碎，细锉，以水二斗，煎取四升，滤过重熬，候成膏，然后入诸项药）

【用法】上为末。候槲皮煎温和，乃入诸药，搅令匀，贮于瓷器内。每服三匙，空心以温酒一盏调下，服定更以清温酒下之。便仰卧，须臾即吐出。若病根年深者，如虾蟆衣、鱼肠相似，近者若蚬肉。吐后以温水漱口，粟米淡粥补之，无粟米亦可。

【主治】瘰疬。

【宜忌】忌一切毒物月余。

61881 追毒膏

【方源】《普济方》卷五十五。

【组成】白矾 雄黄各半两

【用法】上为细末，以香油调和成膏。每用

一皂子大，塞耳中，虫出即止。

【主治】百虫入耳不出。

61882　**追毒膏**

【方源】《回春》卷八。

【组成】乳香五分　没药一钱　儿茶二钱　血竭一分　青木香一钱　广木香五分　芙蓉叶四两　白及四两

【用法】上为细末，匀在一处。临用时看疮大小，以生蜜调涂患处，以绵纸附之。不过三五次即消。

【主治】诸般恶疮及无名肿毒。

61883　**追疮散**

【方源】《外科传薪集》。

【组成】大黄　石膏　黄柏　蛇床子各五钱　硫黄七分　明矾二钱　樟冰八分　金炉底三分　椒目二分

【用法】上为细末。用桐油调搽。

【主治】一切疮痍疥癞。

【备考】或加苦参、人中黄。

61884　**追涎散**

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】石绿　腊茶各等分

【用法】用薄荷酒调下，灌人喉中。吐涎即止。

【主治】喉闭。

61885　**追脓散**

【方源】《圣济总录》卷一三八。

【组成】湿生虫五十枚（瓦上焙干）　小麦五十粒　麝香（研）半钱匕

【用法】上为末。每用一字，纳在疮内。

【主治】痈肿疖毒，出脓疼痛。

61886　**追脓散**

【方源】《普济方》卷二八四。

【组成】乳香半两（研）　巴豆十个（去壳，微去油）　雄黄半两（研）

【用法】上为细末。每用少许，贴在软处。

【功用】促疮溃烂，脓水干快。

【主治】痈疽未破。

61887　**追病丹**

【方源】《医学入门》卷七。

【异名】追虫丹（《济阳纲目》卷六十六）。

【组成】使君子皮二两　干漆（焙）一两　贯众五钱　雄黄一钱　硫黄　信石各三分

【用法】上为末，分作六服，候每早思食之时，思肉则用肉，思鸡则用鸡，煮熟切碎，入小茴末三分，拌和，先食肉少许，后以煮肉汁入药末，调匀服之。随睡即虫被毒，或利或吐出虫。用药之时，勿令患者知之。

【主治】瘵病咳血吐痰，思食无厌者。

61888　**追祟丹**

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】大黄五钱　枳实三钱　丹皮一两　红花半斤　附子二钱　当归尾一两　人参五钱　牛膝五钱　麝香一钱　龟甲一两　半夏三钱　南星三钱　桃仁十四粒

【用法】水煎服。一剂而胎破矣，不须二剂，泻出恶物之后，单用当归三两，红花一两，水煎服。连用四剂，自庆安然。

【功用】去败血，生新血。

【主治】妇人怀妊终年不产，面色黄瘦，腹如斗大，肌肤消削，常至二三年未生者，此名鬼胎。

61889　**追痛丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】川苦楝四十个（作四片，巴豆去皮四十九粒，麸半升，同炒至赤色，只用苦楝，去巴豆、麸不用）　茴香一两（淘去沙，炒香）

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前温酒或盐汤送下。

【主治】小肠气痛不可忍。

61890　**追痛散**

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】芸苔子　菴蔄子　橘核各等分

【用法】上为细末。每服一大钱，酒一盏，煎至七分，空腹热服，每日三次。

【主治】腰疼不可忍。

61891　**追魂丹**

《普济方》卷二五四引《圣惠》。为《金匮》卷

下“三物备急丸”之异名。见该条。

61892 **追魂丹**

【方源】《医方类聚》卷一七九引《经验秘方》。

【组成】乳香　粉霜　没药　蝎梢　蟾酥　花蕊石各三钱　轻粉一钱半　蜈蚣两对(微火炙)　白矾(飞过)　铜绿　寒水石(烧红)　血竭各一两　脑子三钱　麝香二钱　朱砂四钱　蜗牛二十个(去壳,研为泥)

【用法】上将前药一处为丸,如绿豆大,朱砂为衣。每服一丸,先用带须葱三根嚼细,入手心,放药一丸于葱内裹药,热酒吞下。厚被盖,汗出为效。

【主治】疔疮。

【宜忌】忌冷水,不许见风吹。

61893 **追魂丹**

【方源】《医方类聚》卷一七九引《经验秘方》。

【组成】蟾酥　轻粉各半钱　枯白矾　铜绿　寒水石(烧)　血竭各一钱　麝香一字　朱砂四钱(水飞)　蜗牛二十个(别研如泥)

【用法】上为细末,用蜗牛泥为丸,如不就,加酒少许为丸,如小绿豆大。每服一丸,先嚼生葱白三寸至烂,吐出置手心,裹药,用热酒一大盏送下,须臾连饮二盏,汗出为度,不拘时候。

【主治】疔疮,发背,脑疽,一切恶疮。

61894 **追魂丹**

【方源】《普济方》卷二七六。

【组成】南硼砂　砒霜　荜澄茄　轻粉　朱砂　粉霜(另研)　芒消各一钱　蜈蚣一对　飞廉一对　水马四十九个　片脑一钱

【用法】上为细末,蟾汁为剂,用竹刀切如黄米大,不得用手和。每服一丸,温酒送下。

【功用】走彻恶疮,托里。

【主治】疮肿七十二证。

【宜忌】忌食米汤、荤腥、鱼腻、冷物等。

61895 **追魂丹**

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】人参一两　茯神五钱　山药一两　附子一分　甘草一钱　生枣仁一两

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒,误吐、误汗、误下,而身热未退,死症俱现者。

61896 **追魂汤**

《三因》卷七。为《金匮》卷下“还魂汤”之异名。见该条。

61897 **追魂汤**

《普济方》卷二三七。为《千金》卷二十五“还魂汤”之异名。见该条。

61898 **追魂散**

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】五灵脂三两(杵碎,以水浸,搅匀,先倾去上黑浊者,后去下沙石者,取中间细者,于灰盆中纸上浥干用)

【用法】上为末。每服三钱匕,酒一盏,煎二沸服,继服续命汤。

【主治】瘫痪。

61899 **追魂散**

【方源】《幼幼新书》卷二十二引《吉氏家传》。

【组成】白丁香　轻粉　官桂(去皮)各三钱

【用法】上为末。冷水调下半钱,睡时服。来日取下所伤物,用异功散煎紫苏、冬瓜汤调下,三服和气。

【主治】果积。

61900 **追管丸**

《医方易简》卷九。为《良朋汇集》卷五“追毒化管作脓丸”之异名。见该条。

61901 **追风毒散**

《普济方》卷二四一。即《直指》卷四“追风毒锉散”。见该条。

61902 **追风饼子**

【方源】《普济方》卷九十一引《海上名方》。

【异名】二生散。

【组成】附子一枚(去皮脐)　天南星一枚各重八钱(以上并生用)

【用法】上为末，用生姜研自然汁和作饼子。每服一饼，以水一盏半，加生姜二十片，同煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【功用】去痰，逐风邪。

【主治】卒中风，语涩痰盛，四肢不举，恍惚志意不定；及体虚有风，受虚湿，身如在空中。

61903　追生仙方

【方源】《摄生众妙方》卷十。

【组成】赤蓖麻子仁十枚　屋内倒挂龙三钱

【用法】上为末，和丸如黄豆大。每服七丸，空心温酒送下。

【功用】临产催生。

61904　追毒挺子

【方源】《医方类聚》卷一九二引《新效方》。

【异名】追毒锭子(《疮疡经验全书》卷九)。

【组成】甘遂　续随子　大戟　五倍子各二两　麝香三钱　山茨菇三钱

【用法】上为末，糯米粥杵成挺子。纴努肉根下。努肉即脱。

【功用】蚀努肉。

【主治】努肉坚硬不痛者。

61905　追毒锭子

《外科精义》卷十九。即原书同卷“追毒散”制成锭剂。见该条。

61906　追毒锭子

《疮疡经验全书》卷九。为《医方类聚》卷一九二引《新效方》“追毒挺子”之异名。见该条。

61907　追脓锭子

【方源】《元戎》卷十。

【组成】雄黄二钱　巴豆一钱半　轻粉一钱半。

【用法】上为细末，油和作饼子，生面亦得。

【功用】追脓。

【主治】《准绳·疡医》：脓内溃不出。

61908　追风白丸子

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】蜈蚣(赤足者，姜汁浸一宿)　白花蛇项肉(酒浸一宿，炙)　乳香(研)　麝香(研)　附子(生用)各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如萝卜子大。用薄荷熟水研下一丸至五丸或十丸。要出汗，以桃柳汤浴后，热米饮投之，汗出愈。

【主治】破伤风，寒热烦闷，状似伤寒。

61909　追风如圣散

【方源】《准绳·类方》卷一引《医学统旨》。

【异名】如圣散(《丹溪心法附余》卷四)、金刀如圣散(《遵生八笺》卷十八)。

【组成】川乌　草乌　苍术各四两　金钗石斛一两　川芎　白芷　细辛　当归　防风　麻黄　荆芥　何首乌　全蝎　天麻　藁本各五钱　甘草三两　人参三钱　两头尖二钱

【用法】上为细末。每服半钱匕，临卧茶清下；温酒亦可。不许多饮酒。服后忌一切热物饮食一时，恐动药力。亦可敷贴。

【主治】男妇诸般风证，左瘫右痪，半身不遂，口眼歪斜，腰腿疼痛，手足顽麻，语言謇涩、行步艰难；遍身疮癣，上攻头目，耳内蝉鸣，痰涎不利、皮肤搔痒；偏正头风，无问新旧；及破伤风、角弓反张，蛇犬咬伤，金刃所伤，血出不止。

61910　追风如圣散

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】细辛　防风　川乌　薄荷　草乌　川芎　白芷　苍术各一两　雄黄四钱

【用法】上为末。温酒调敷伤处，以纸盖扎，早、晚换二次。

【功用】拔毒。

【主治】疯犬咬伤。

61911　追风应痛丸

【方源】《局方》卷一(续添诸局经验秘方)。

【组成】威灵仙　狗脊(去毛)各四两　何首乌　川乌(炮，去皮脐)各六两　乳香(研)一两　五灵脂(酒浸，淘去沙石)五两半

【用法】上为末，酒糊为丸。每服十五丸，加至二十丸，食前麝香温酒吞下；只温酒亦得。

【功用】轻身体，壮筋骨，通经活络，除湿祛风。

【主治】一切风疾，左瘫右痪，半身不遂，口眼㖞斜，牙关紧急，语言謇涩，筋脉挛急，百骨节痛，上攻下注，游走不定，腰痛沉重，耳鸣重听，脚膝缓弱，不得曲伸，步履艰难，遍身麻痹，皮肤顽厚；及妇人血风攻注，身体疼痛，面浮肌瘦，口苦舌干，头旋目眩，昏困多睡；或皮肤瘙痒，瘾疹生疮；暗风夹脑，偏正头疼。

【宜忌】孕妇不可服。

61912 追风败毒汤

【方源】《镐京直指》。

【组成】全蝎一钱五分（洗淡） 白僵蚕三钱 防风二钱 地龙三钱（炒） 穿山甲三钱（炒） 钩藤三钱（后下） 羌活二钱 川草乌二钱（制，各半） 川芎一钱 桑枝三尺

【用法】水煎服。

【功用】追风败毒。

【主治】风毒上乘，头颈膺腋俱肿，兼手抽搐。

61913 追风毒锉散

【方源】《直指》卷四。

【组成】羌活一两 鸡心槟榔 防风 桑白皮（炒）各半两 郁李仁（炒） 大黄（生）各一分

【用法】上锉散。每服三钱，加黑豆百粒，水煎服。

【功用】疏泄风毒。

【主治】①《直指》：脚气热多证，及便毒热证，大便秘结。②《直指小儿》：小儿中风，内外皆热。

【加减】热甚，大便秘，更加大黄。

【备考】本方方名，《普济方》引作“追风毒散”。

61914 追风活络丹

《全国中药成药处方集》（哈尔滨方）。为《惠直堂方》卷四“活络丸”之异名。见该条。

61915 追风祛痰丸

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】防风 天麻 僵蚕 白附子各三两 全蝎（去毒） 木香各半两 朱砂七钱半 猪牙皂（炒）一两 白矾半两 半夏六两

【用法】上为细末，生姜糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，食远、临卧用淡姜汤或薄荷汤送下。

【主治】诸风痫暗风。

【备考】《回春》有南星。

61916 追风逐湿膏

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】豨莶草 麻黄 川乌 草乌 风藤 半夏 南星 羌活 蓖麻子（打碎） 桂枝各三两 独活 细辛 当归 白芷 苍术 大黄各二两

【用法】上药各切咀片，用葱汁、生姜汁各二碗拌药，先浸一宿，次日用香油半斤，同药入锅内，慢火煎至葱、姜汁将干不爆时，油方与药相煎，滓枯为度；细绢滤清，每油一斤，下飞过炒丹十两为准配用；再将前油入锅内煎滚，以油滴水成珠不散方下黄丹，徐徐搅入，其膏已成；再下松香净末一斤四两，再同熬化，取下锅来，以盆顿稳，再下乳香、木香、胡椒、轻粉各末二两，白芥子细末四两，渐入搅匀，倾入钵内盛贮。渐用热汤顿化，绫缎摊贴。七日后，诸病可痊，百发百中。

【主治】风寒暑湿相伤，以致骨节疼痛，筋挛不能步履，或麻木湿痹。

61917 追风逐湿膏

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】两圣膏一斤 木香 胡椒各一两 白芥子二两

【用法】上为末，入膏内搅匀。摊贴患处。

【主治】骨节疼痛，湿痹麻木，筋挛。

【备考】西圣膏，即原书“家传西圣膏。”

61918 追风消毒饮

【方源】《青囊全集》卷下。

【组成】防风一钱五分 银花一钱五分 草节五分 桔梗一钱 射干一钱五分 苦参二钱 蚤休一两 羚羊角二钱 犀角一钱 虎骨一钱五分 羌活一钱 白芷二钱五分 黄芩一钱五分

【用法】野黄菊为引,水煎服。

【主治】疔疮,心肝火毒甚,发狂大热者。

61919　**追风消毒散**

【方源】《普济方》卷二七九。

【组成】附子(去尖皮脐,锉)　石硫黄(研)　天南星(生)各半两

【用法】上为细末。醋调,涂向肿处,干即易之。

【主治】毒肿。

61920　**追风通气散**

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【异名】追风通圣散(《简明医彀》卷八)。

【组成】赤芍　木通　白芷　何首乌　枳壳　茴香　乌药　当归　甘草

【用法】酒、水同煎服。

【功用】大能顺气匀血,扶植胃本,不伤元气,荡涤邪秽,自然通顺,不生变证。

【主治】痈疽,发背,流注,肿毒,脑疽,打破伤折,疝气,血瘕,脚气,诸气痞塞,块痛,腰痛,一切痰饮为患。

【加减】痈疽,胃寒生痰,加半夏以健脾化痰;郁热而成风痰,加桔梗,并用生姜水酒煎服;发背,因服寒凉之药,过伤脾胃,饮食少进,颜色憔悴,肌肉不生,去木通,少用当归,倍厚朴、陈皮;流注,加独活;脑发、背发,去木通;打破伤折在头上,去木通,加川芎、陈皮;经年腰痛,加萆薢、玄胡索,酒煎服;脚气,加槟榔、木瓜、穿山甲,水煎服;痰饮为患,或喘,或咳,或晕,头痛睛疼,遍身拘急,骨节痹疼,胸背、颈项、腋膀、腰腿、手足凝结肿硬,或痛或不痛,按之无血潮,虽或微红,亦淡薄不热,坚如石,破之无脓,或有薄血,或清水,或如乳汁,又有坏肉如破絮,又如瘰疬,在皮肉之间,如鸡卵可移动,软活不硬,破之亦无脓血,针口弩肉突出,惟觉咽喉痰实结塞,作寒作热,加南星、半夏;肿毒坚硬不穿,加川芎、独活、麻黄,连须葱煎,热服。

61921　**追风通圣散**

《简明医彀》卷八。为《古今医鉴》卷十五“追风通气散”之异名。见该条。

61922　**追风解毒汤**

【方源】《古今医鉴》卷十五引两川叔传方。

【组成】连翘　黄芩　栀子　黄柏　防风　荆芥　羌活　独活　全蝎　僵蚕　蒺藜　金银花　威灵仙　归尾　赤芍　甘草各等分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】血风疮,并湿热生霉,其形如钉,高起寸许者。

61923　**追虫打鳖散**

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】黑丑四两　槟榔四两　雷丸一两　木香一两　甘草一两

【用法】上为末。大人每服四钱,小儿三钱或二钱,或一钱五分,量人虚实,空心服,沙糖调下。待去恶积虫二三次,方服稀粥汤。

【主治】①《活人心统》:肠内有虫者。②《济阳纲目》:血鳖。

【备考】本方原名追虫打鳖丸,与剂型不符,据《济阳纲目》改。

61924　**追虫至宝丹**

【方源】《玉案》卷四。

【组成】大黄四两　雷丸　槟榔　广木香　玄胡索　山楂各二两　贯众(去土)　黑丑(半生半熟)　三棱(醋炒)　使君子肉各一两五钱　蛇含石(煅,醋淬五次)一两

【用法】上为末,甘草煎水为丸。每服三钱,五更时白滚汤送下。

【主治】五脏诸虫,面黄肤瘦,四肢尫羸,肚腹膨胀,饮食减少,虫咬心痛,癥瘕积块。

61925　**追虫利积丸**

【方源】《良朋汇集》卷二。

【组成】使君子肉　牵牛各一两　槟榔五钱　芜荑仁　雷丸　乌梅肉　木香各三钱

【用法】上为细末,以白沙糖为丸,如芡实大。每服一丸,滚水送下。

【主治】积聚。

61926　**追虫取积丸**

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】黑牵牛一斤（取头末四两） 槟榔六两（取头末四两） 巴豆二两（去壳） 大皂角（半寸长）二十锭

【用法】上用水三碗，将巴豆、皂角入锅内，煮之一碗，去滓，将水和前药末为丸，如梧桐子大，晒干；用水一碗洒之，再晒干；又水洒之，又晒光亮如水晶相似。每服三钱，四更时调沙糖送下，如不行，饮热水一口催之，行十一二次。

【功用】有虫取虫，有积取积。

【宜忌】忌口五七日为妙。

61927 追虫取积丸

【方源】《串雅补》卷二。

【组成】广木香 鸡心槟榔 芜荑 锅灰各一两 生大黄三两 生黑丑头末十两 使君子肉二两

【用法】上为末，将牙皂一两五钱，向南楝树根皮二两，水煎浓汁为丸，如绿豆大，沉香为衣。每服三四十丸，空心沙糖汤送下。

【主治】虫积心痛。

61928 追虫取积散

【方源】《古今医鉴》卷十三引周佐溪方。

【组成】雷丸 锡灰 槟榔 芜荑仁 木香 大黄（煨） 黑丑 使君子 鹤虱各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸。或蜜或砂糖水调服，每服二三匙。

【主治】小儿虫积、食积、热积、气积，或肚大青筋，腹胀而痛。

61929 追虫取积散

【方源】《回春》卷四。

【组成】槟榔（末）二钱 黑丑（头末）二钱 陈皮（末）八分 木香（末）五分

【用法】上为末，研匀。每服五钱，小者三钱，砂糖汤送下，五更服。泻三四次，以米汤补之。

【主治】诸虫。

【宜忌】忌鱼腥、油腻之物三五日。

61930 追疔夺命丹

《赤水玄珠》卷二十九。为《急救仙方》卷二“追疔夺命汤”之异名。见该条。

61931 追疔夺命汤

【方源】《急救仙方》卷二。

【异名】追疔夺命丹（《赤水玄珠》卷二十九）。

【组成】羌活 独活 青皮 防风（多用） 黄连 赤芍药 细辛 甘草节 蝉蜕 僵蚕 脚连 加河车 泽兰 金银花

【用法】上㕮咀。每服五钱，先将一服加泽兰叶、金银花各一钱，生姜十钱，同药擂烂，好酒调热服之；如不饮酒者，水煎加少酒服尤妙。然后用酒、水各一盏半，生姜十片煎，热服。以衣被盖覆，汗出为度。病退减后，再以前药加大黄二钱煎，热服，或利一两次，以去余毒为妙。

【功用】内消肿毒。

【主治】①《急救仙方》：疔疮。②《秘传外科方》：痈疽发背。

【加减】有脓，加何首乌、白芷；取利，加青木香、大黄、栀子、牵牛；在脚，加木瓜；呕逆恶心，加乳香、绿豆粉，甘草汤送下，又用紫河车、老姜、米醋一同调下；心烦呕，名伏暑，用朱砂五苓散；呕逆，加母丁香、石莲，同前药煎服；又不止，用不换金正气散，或加人参、木香煎服；呕不止，手足冷，名吃水，用黄连香薷饮香消暑丸；手足冷，加宣木瓜、牵牛；心烦，加麦门冬、赤芍、栀子、灯草；潮热，加北柴胡、黄芩、淡竹青、丝茅根；眼花，加朱砂、雄黄、麝香少许；腹胀，加薏苡仁、寒水石；自利，加白术、茯苓、肉豆蔻、罂粟壳；腹痛不止，加南木香、乳香；喘嗽，加知母、贝母、白砂蜜少许；头痛，加川芎、白芷、葱白；痛不止，用萝卜子、川芎、葱白，擂碎，敷太阳穴；痰涎多，用生艾尾叶、米醋，擂取汁，漱去痰；咽喉痛，用山豆根、凌霄梗、栀子、淡竹叶、艾叶、灯草，水煎漱；大便闭，加姜制赤芍药、麸炒枳壳、大腹皮；小便闭，加赤芍药、赤茯苓、木通、车前子、灯草；尿血出，加生地黄、车前子；鼻出血，加野红花、地黄、藕节、姜皮；疮不痛，顶不起，灸三壮，更

不痛，不治；骨蒸，加丝茅根；无脉，服二十四味流气饮。

61932　追疔夺命汤

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】羌活　独活　青皮　防风(倍用)　黄连　天花粉　赤芍　细辛　蝉蜕　僵蚕　桔梗　金银花　归梢　川芎　白芷　连翘　山栀仁　甘草节　(一方加泽兰一钱)

【用法】上加生姜十片，葱白三茎，水煎，热服。以衣覆之，出汗为妙。外用飞丹、白矾火上熬和碾末，鸡子清调敷之。

【功用】消肿。

【主治】疔疮。

【加减】在脚，加木瓜、薏苡仁。

61933　追疔夺命汤

【方源】《疡科选粹》卷三。

【组成】蝉退四分　青皮七分　泽兰叶五分　防风八分　黄连一钱　细辛八分　何首乌一钱　羌活一钱　僵蚕一钱　藕节一钱　紫河车(即金线重楼)七分

【用法】上加生姜、葱白，水煎，临卧入酒一杯服之。衣覆取汗。

【主治】疔疮。

【加减】如大便秘结，加大黄一钱。

61934　追命再造散

《普济方》卷一一〇。为《圣济总录》卷十八“千金散”之异名。见该条。

61935　追命再造散

《医统》卷十二。为《圣济总录》卷十八“通神散”之异名。见该条。

61936　追毒五香丸

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】丁香　木香　沉香　乳香　没药　血竭各二钱　巴豆(去皮，净仁)三钱

【用法】上为末，然后入巴豆，同研极细，重罗过，以瓷器盛之，黄蜡塞口。临用时以生蜜调一丸，如小黄豆大，新汲井水送下。行三次，疮即愈。又看疮势大小，药之多寡，若疮日久势大，药丸不过黄豆大；若疮势渐起，则丸药但如小豆大即可；若病势已急，口禁不能开，但得药下无不愈，乃用一大丸，作二三五小丸灌之。此药旋用旋丸，不可预丸，积久而无用矣。

【主治】发背疔疮。

61937　追毒乌金散

【方源】《普济方》卷二七二。

【组成】巴豆半两　寒食面一两

【用法】上用水和面作饼子，将巴豆包定，休教透气，以文武火烧深黑色，为细末。量疮口干贴之。

【功用】追毒溃脓。

【主治】疮内恶肉。

61938　追毒保嗣丹

《保赤存真》卷十。为原书同卷“窜毒丸”之异名。见该条。

61939　追毒信效丸

【方源】《施圆端效方》引武安杜巨川方(见《医方类聚》卷一九二)。

【组成】明信砒　铅丹各半钱　绿豆粉一钱

【用法】上为末，化蜡一钱一字，油五点，为丸如大麦大。纴疮内，先用温浆水洗了纴药，后上白玉膏(寒水石焙作粉便是也)。

【功用】活血回疮。

【主治】诸恶疮疽，肿毒闷痛。

61940　追毒神异汤

【方源】《医统》卷八十。

【组成】辰砂一钱　血竭一钱　麝香一字(共研末)　大黄半两　大甘草半两

【用法】上分一半为末，一半咀，河水一盏煎，临卧调末药服，滓再煎服。

【主治】瘰疬热盛，脉有力者。

61941　追毒斑蝥膏

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【组成】斑蝥二枚(去翅足及头，炒)　巴豆二十枚(去皮心，浆水煮)　松脂三分

【用法】上先研前二味为粉，次入松脂熔化，搅令匀，作饼。热贴在瘰疬上，药力尽别

换。以愈为度。

【主治】小儿瘰疬结核，久不愈。

61942 追毒溃脓散

【方源】《外科百效》卷三。

【组成】白芷二钱 川山甲二钱（土炒成珠） 石乳香一钱（焙，炙） 没药一钱（焙，炙） 白僵蚕一钱五分（炒，去皮） 甘草一钱半 大黄四钱 皂角刺一钱（炒）

【用法】上为极细末。用当归四钱（锉碎），将半酒、半水三盏同煎，调前药末，空心通口尽服。如当归酒不足，加好酒调服。以利脓血三五次为度，利后用粥补即止服。

【主治】发背已成或未成者。

【宜忌】药后忌用油腻、生冷、煎炒及诸发物。且慎勿行动劳碌，须静坐六七日。

61943 追脓化毒散

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】穿山甲 当归 大黄各三钱 玄明粉 僵蚕 乳香 没药各一钱半 白芷二钱

【用法】水煎服。

【主治】一切痈疽瘰疬、便毒，痰火胸紧初起。

61944 追尸虫白兔丸

【方源】《医统》卷七十八引《青囊》。

【组成】白兔粪（中秋夜取）四十丸 硇砂五分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸，甘草五钱（生，捶碎），水一盏，揉取浓汁；若患人瘦弱，即用炙过甘草，五更空心服。预戒患人不得心躁，冷服不妨，小愈两日，再服下虫药，一次为妙。

【主治】尸虫。

61945 追风除湿围药

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】多年陈小粉四两（炒焦色） 干姜一两 官桂一两 五倍一两 白芷一两 龟版（醋炙）二两 当归一两 防风一两 白及三两 乌药一两 乳香一两

【用法】上为细末，用老姜汁、酽醋各半，葱汁一分，蜜少许，火上熬热调药，乘通手搽四向，空中出毒，时用余汁热润之，以助药力。

【主治】鹤膝风。

61946 追疔飞龙夺命丹

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】辰砂 雄黄 蟾酥 蜈蚣（炙） 枯矾各一钱 轻粉二分 麝香五分 冰片二分

【用法】上为末，蜒蚰捣膏为丸，如大豆大，辰砂为衣。如遇疔疮恶症，用葱白二根同此丹五丸嚼烂，热酒送下。以衣覆患处，出汗为妙，其酒随量饮之。

【主治】疔疮。

61947 追毒万应针头丸

【方源】《疡科选粹》卷三。

【组成】麝香二钱 血竭 蟾酥 轻粉 硇砂各三钱 全蝎 蜈蚣各一对（全用） 片脑一钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如黍米大。疮头用针挑破，微有血出，以药一粒，放进眼上，用绵纸盖之，周围以津唾粘定。不一时愈。

【主治】①《疡科选粹》：一切脑背恶疮欲死。②《杂病源流犀烛》：左右太阳穴痈疽。

61948 追毒化管作脓丸

【方源】《良朋汇集》卷五。

【异名】追毒丸（《疡医大全》卷二十三）、追管丸（《医方易简》卷九）。

【组成】胡黄连一两（姜汁炒） 刺猬皮一两（火炙黄色） 麝香三分

【用法】上为细末，煮白米饭为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心白滚水送下。服过二十日后再服后方。

【主治】痔漏。

61949 追魂复还夺命丹

【方源】《青囊全集》卷上。

【组成】山羊血三钱 丹参三钱 红花一钱五分 生地三钱 三棱一钱五分 田三七一钱 莪术一钱 丹皮一钱五分 桃仁七粒

（去皮尖） 蝎尖五钱 茜根一钱 乌臼一钱

【用法】酒兑童便送下，马尿和白糖兑服尤妙。

【主治】瘀血凝滞在腹，作痛欲死。

61950 追风补肾十漏大金丹

【方源】《济阳纲目》卷九十五。

【组成】当归 麦门冬 破故纸 肉苁蓉 山药 白茯苓 枳壳 白芷 杏仁各二两 人参 生地黄 小茴香 鹿茸 大附子 川乌 木香 青木香 砂仁 厚朴 青皮 陈皮 乌药 肉豆蔻 天麻 乳香 没药各一两 熟地黄 大茴香 枳实各三两 香附 松节各四两 丁香 硇砂各五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大，金箔为衣。每服一丸，空心酒化下。

【主治】痔漏。

禹

61951 禹水汤

【方源】《名家方选》。

【异名】敦阜剂。

【组成】赤小豆一钱二分 大麦（炒）五分 地肤子七分（炒，阴干） 猪苓 泽泻 茯苓各四分（炒） 牵牛子一分（炒）

【用法】上合四钱八分为一剂，为细末。以水三合，煮取二合，日三夜二服。

【功用】平和而能疏通。

【主治】水肿。

61952 禹水汤

【方源】《观聚方要补》卷二。

【组成】赤小豆二十五钱 槟榔 泽泻各十五钱 猪苓 麦蘖各二十钱 神曲 木瓜 木通各十钱

【用法】上炒焦，水煎服。

【主治】①《观聚方要补》：水气肿满。②《家庭治病新书》：湿热腰重，肢重，小便不利者。

61953 禹功丸

【方源】《续名家方选》。

【组成】商陆四钱 芒消 芫花 吴茱萸各三钱 甘遂二钱

【用法】上面糊为丸，如梧桐子大。每晚数十丸，饮送下。

【主治】一切水肿，及脚气肿满者。

61954 禹功散

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】黑牵牛（头末）四两 茴香一两（炒） （或加木香一两）

【用法】上为细末。以生姜自然汁调一二钱，临卧服。

【功用】《景岳全书》引子和：泻水。

【主治】产后瘀血不行，脐腹疼痛；阳证水肿，寒湿水疝、癞疝，属实证者。

①《儒门事亲》：妇人大产后，败血恶物所致脐腹腰痛，赤白带下或出白物如脂。②《得效》：卒暴昏愦，不知人事，牙关紧硬，药不下咽。③《丹溪心法》：阳水肿，若病可下而气实者。④《普济方》：癞疝。⑤《古今医鉴》：寒湿外袭，使内过劳，寒疝囊冷，结硬如石，阴茎不举，或控引睾丸而痛。⑥《张氏医通》：阳水便秘，脉实，初起元气未伤者。⑦《医方集解》：寒湿水疝，阴囊肿胀，大小便不利。

【方论选录】：①《医方集解》：此足少阴、太阳药也。牵牛辛烈，能达右肾命门，走精隧，行水泄湿，兼通大肠风秘、气秘；茴香辛热温散，能暖丹田，祛小肠冷气，同入下焦以泄阴邪也。②《古方选注》：禹功者，脾湿肿胀肉坚，攻之如神禹决水。牵牛苦热，入脾泻湿，欲其下走大肠，当从舶茴辛香引之，从戊入丙至壬，开通阳道，走泄湿邪，决之使下，一泻无余，而水土得平。

【宜忌】《医方论》：此方峻猛，不可轻用。

【备考】《得效》用生姜自然汁调药少许灌之鼻中。

61955 禹功散

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】陈皮 半夏（姜制） 赤茯苓 猪苓 泽泻 白术（炒） 木通各一钱 条芩八

分 升麻三分 甘草三分 山栀子(炒)一钱

【用法】上锉一剂。以水二钟，煎至一钟，不拘时服。少时，以鸡翎探吐之，得解而止。

【主治】①《寿世保元》：小便不通，百法不能奏效者。②《一盘珠》：膀胱有热，小便不通。

【备考】此方妙在吐，譬如滴水之器，闭其上窍则不沥，拔之则水通流泄矣。

61956 **禹功散**

【方源】《李氏医鉴》卷三。

【组成】黑牵牛四两 茴香一两 荔枝核

【用法】上为末。每服一钱，姜汁调下。

【主治】寒湿水疝，阴囊肿胀，大小便不利。

【加减】或加木香一两。

【方论】方中牵牛辛烈，能达右肾命门，走精隧行水泄湿，兼通大肠风秘；茴香辛热温散，能暖丹田，祛小肠冷气，同入下焦以泄阴邪；荔核似睾丸，故治癫疝卵肿，有述类象形之义。

【备考】方中荔枝核用量原缺。

61957 **禹应丸**

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】槟榔一钱六分 商陆 金毛狗脊 贯众各四分 三棱 莪术(醋煮)各八分 青木香 西木香各四分 雷丸(醋煮)二分半 南木香二分 大黄(酒浸) 黑丑(半生半炒，取头末) 枳壳各一钱六分 茵陈八分 丁香 芦荟各一分 皂角一钱六分 阿胶二分

【用法】水泛为丸。每服五钱，五更清茶送下。

【主治】一切虫病积块，水肿臌胀，痰盛酒痢。

61958 **禹治汤**

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】白术一两 茯苓一两 薏仁一两 车前子三钱

【用法】水煎服。

【功用】利气去淋。

【主治】感湿气而成淋者，其人下身重，尿管不痛，所流者清水而非白浊。

【方论选录】此方利水而不耗气，分水而不生火，胜于五苓散实多。盖五苓散有猪苓、泽泻，未免过于疏决；肉桂大热，未免过于熏蒸，不若此方不热不寒，能补能利之为妙也。大约服此汤至十剂，凡有湿症无不尽消，不止淋病之速愈也。

61959 **禹绩汤**

【方源】《产科发蒙》卷三。

【组成】西瓜皮 赤小豆(冬瓜内蒸，晒干)各二大合 冬瓜子 西瓜子 猪苓 茯苓各一中合 大腹皮 冬瓜皮各一大合半 海金砂一小合

【用法】上以水一盏半，煮取一盏，温服，每日二次。

【主治】遍身肿满，皮肤光泽如莹，小便不利，诸药不能疗者。

61960 **禹粮丸**

《赤水玄珠》卷二十六。为《圣惠》卷三十六“禹余粮丸”之异名。见该条。

61961 **禹粮丸**

【方源】《秘传大麻风方》。

【组成】余粮石二斤半 好醋八斤

【用法】同煮醋干为度。

【主治】五劳七伤，气胀胞满；黄病，四肢无力；女子赤白带；干血劳证；久疟痞块。

61962 **禹粮汤**

【方源】《镐京直指》。

【组成】熟地 禹余粮 五味子

【主治】痢久伤阴，下陷将脱。

61963 **禹翼汤**

【方源】《产科发蒙》卷三。

【组成】桑白二大合 防己一大合半 茯苓 猪苓各一中合 黑豆一大合 泽兰一大合半

【用法】上以水一盏半，煮取一盏，温服，每日二三次。

【主治】产后肿满，皮肤无光泽，肿稍硬者。

【加减】若气不和，加紫苏一大合。

61964 **禹余粮丸**

【方源】《千金》卷四。

【组成】禹余粮 乌贼骨 吴茱萸 桂心 蜀椒各二两半 当归 白术 细辛 干地黄 人参 芍药 芎䓖 前胡各一两六铢 干姜三两 矾石六铢 白薇 紫菀 黄芩各十八铢 䗪虫一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心酒或饮送下，每日二次，不知，则加之。

【主治】妇人产后积冷坚癖。

【方论选录】《千金方衍义》：此与鳖甲丸第二方主治相类，彼用白芷，此用白薇；彼用僵蚕，此用前胡；彼用石脂，此用矾石；彼用丹参，此用紫菀；彼用白术，此用甘草；彼用鳖甲，此用䗪虫；彼用鹿茸，此用人参，药虽变易，而功用仿佛。惟彼用附子以助鹿茸、姜、桂之雄，此用黄芩分椒、姜、细辛之悍，泾渭攸分，于此稍异。

61965 禹余粮丸

【方源】《千金》卷四。

【组成】禹余粮五两 白马蹄十两 龙骨三两 鹿茸二两 乌贼鱼骨一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每晚服二十丸，以酒送下，一日二次。以知为度。

【主治】①《千金》：崩中赤白不绝，困笃。②《圣济总录》：妇人经血日夜不绝，烦闷困绝。

【方论选录】《千金方衍义》：《千金》治崩漏多用血肉之味。此用马蹄、鹿茸、龙骨、乌贼，皆止中寓散之意，禹余粮则专子固脱，惟久崩困笃者宜之。若瘀血固结，少腹坚满者，则又未可轻试也。

61966 禹余粮丸

【方源】《圣惠》卷三十六。

【异名】禹余粮散(《圣济总录》卷一一四)、禹粮丸(《赤水玄珠》卷二十六。

【组成】禹余粮一分(烧，醋淬七遍) 乌贼鱼骨一分 龙骨一分 釜底墨一分 伏龙肝一分 附子一枚(去皮脐；生用)

【用法】上为末，以绵裹如皂荚子大，纳耳中，日再易之。如不愈者，内有虫也。

【主治】①《圣惠》：聤耳，有脓水塞耳。②《圣济总录》：耳聋有脓。

【备考】本方方名，《普济方》引作“附子散”。

61967 禹余粮丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】禹余粮二两(烧，醋淬七遍) 川乌头一两(炮裂，去皮脐) 莨菪子二两(水淘去浮者，水煮令芽出，曝干，炒令黄黑色)

【用法】上为末，用糯米饭为丸，如小豆大。每服五丸，食前以粥饮送下。

【主治】冷痢不愈。

61968 禹余粮丸

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】禹余粮三两(烧，醋淬七遍) 鹿角胶三分(捣碎，炒令黄燥) 紫石英一两(细研，水飞过) 续断一两 熟干地黄一两 赤石脂一两 芎䓖一两 干姜(炮裂，锉) 黄耆(锉) 艾叶(微炒) 柏叶(微炒) 当归(锉，微炒) 人参(去芦头) 白茯苓各半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】妇人久冷，月水不断，面色萎黄，四肢瘦弱，心神虚烦，饮食不多。

61969 禹余粮丸

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】禹余粮二两(烧，醋淬七遍) 白芍药一两 桑鹅一两半(微炙) 黄连一两(去须) 艾叶(微炒)一两 芎䓖三分 当归二两(锉，微炒) 川大黄二两(锉碎，微炒) 生干地黄二两 白龙骨二两 阿胶一两(捣碎，炒令黄燥)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以温酒送下。不拘时候。

【主治】妇人带下五色，脐腹疞痛，渐加黄瘦，不能饮食，四肢少力。

61970 禹余粮丸

【方源】《圣惠》卷七十三。

【异名】吴茱萸丸（《杨氏家藏方》卷十五）。

【组成】禹余粮一两（烧，醋淬七遍） 白石脂一两 鳖甲一两（涂醋，炙微黄，去裙襕） 当归一两（锉，微炒） 狗脊一两（去毛） 白芍药一分 白术一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 桑寄生一两 柏叶一两（微炒） 干姜一两（炮裂，锉） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟） 吴茱萸半两（汤浸七遍，焙干，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以热酒送下。

【主治】①《圣惠》：妇人久赤白带下，脐腹冷连腰痛，面色黄瘦，不思饮食。②《局方》：妇人带下久虚，胞络伤败，月水不调，渐成崩漏，气血虚竭，面黄体瘦，脐腹里急，腰膝疼重，肢体烦痛，心忪头眩，手足寒热。

61971 **禹余粮丸**

【方源】《圣惠》卷七十三。

【异名】白石脂丸（《杨氏家藏方》卷九）。

【组成】禹余粮一两（烧，醋淬七遍） 白石脂一两 龙骨一两 芎䓖三分 当归三分（锉，微炒） 桂心一两 附子三分（炮裂，去皮脐） 黄耆一两（锉） 白芷半两 熟干地黄一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】①《圣惠》：妇人崩中，下五色不止，令人黄瘦，心烦不食。②《杨氏家藏方》：带下久虚，胞中绝伤，月水不断，积日成崩，气血虚竭，肢体黄瘦，脐腹急胀，心忪头晕，不欲饮食。

61972 **禹余粮丸**

【方源】《圣惠》卷七十三。

【异名】紫石英丸（《本事》卷十）。

【组成】禹余粮一两（烧，醋淬七遍） 龙骨一两 紫石英一两（细研，水飞过） 人参半两（去芦头） 桂心半两 川乌头（炮裂，去皮脐） 泽泻一两 桑寄生一两 川椒一两去目及闭口者，微炒去汗） 石斛一两（去根，锉） 当归一两（锉，微炒） 杜仲一两（去皱皮，炙微黄，锉） 肉苁蓉一两（酒浸一宿，微锉，去皱皮，炙干） 远志半两（去心） 五味子半两 牡蛎一两（烧为粉） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二丸，晚食前以热酒送下。

【功用】①《本事》和其阴阳，调其气血，使不相乘，以平为福。②《御药院方》：滋补本气。

【主治】①《圣惠》：妇人劳损，因成崩中，不可禁止，积日不断，故成漏下，致五脏空虚，肉色黄瘦。②《本事》：妇人病月经乍多乍少，或前或后，时发疼痛。

61973 **禹余粮丸**

【方源】《普济方》卷二一一引《指南方》。

【组成】禹余粮 赤石脂 干姜各一两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下。

【主治】热痢。

61974 **禹余粮丸**

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】禹余粮（煅赤，醋淬七遍） 白龙骨（煅） 赤石脂各一两 牡蛎（煅赤）三两 艾叶（醋煮一时辰，焙） 乌头（炮裂，去皮脐） 防风（去叉） 芎䓖 熟干地黄（焙） 白茯苓（去黑皮）各一两 人参三分

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸至三十丸，空心、食前温酒或醋汤送下。

【主治】妇人血脏虚损，月水不断，面色萎黄，四肢少力，脐腹疞痛。

61975 **禹余粮丸**

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】禹余粮（煅，醋淬七遍）二两 木贼（锉，炒）半两 干姜（炮） 龙骨 附子（炮裂，去皮脐）各一两 白芷 当归（切，焙） 芎䓖各半两

【用法】上为末，煮面糊为丸，如梧桐子大。

每服三十丸，食前温酒送下。

【主治】妊娠胎动腹痛，下血不止。

61976　**禹余粮丸**

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】禹余粮　石脂　干姜　附子各等分

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】下焦痢。

61977　**禹余粮丸**

【方源】《三因》卷十四。

【异名】神仙万金丸(《百一》卷十二)、神授万金丹(《医方类聚》卷一二七引《澹寮》)、万金丹(《得效》卷九)、针砂丸、蛇含石丸(《兰台轨范》卷五)。

【组成】蛇黄(大者)三两(以新铁铫盛入，炭火中烧蛇黄与铫子一般通赤，用钳取铫子出，便倾蛇黄入酽醋二升中，候冷，取出研极细则止，即含石)　禹余粮三两　真针砂五两(先以水淘净，控干，更以铫子炒干，入禹余粮一处，用米醋二升，就铫内煮醋干为度，却用铫并药人炭火中，烧通赤，倾药净，砖地上候冷，研无声即止)

以三物为主，其次量人虚实，入下项药：羌活　木香(煨)　茯苓　川芎　牛膝(酒浸)　白豆蔻(炮)　土茴香(炒)　蓬术(炮)　桂心　干姜(炮)　青皮(去瓤)　京三棱(炮)　白蒺藜　附子(炮)　当归(酒浸一宿)各半两(虚人老人全用半两，实壮入减之)

【用法】上为细末，拌极匀，以汤浸蒸饼，捩去水和药，丸如梧桐子大。食前温酒、白汤送下三十丸至五十丸，每日三服。兼以温和调补气血药助之。

【功用】①《百一》：逐阴固阳，扶危正命。②《法律》：暖水脏。

【主治】水肿胀满，小便不利，上气喘促，腹有积块。

①《三因》：十种水气，凡脚膝肿，上气喘满，小便不利。②《丹溪心法》：中满气胀，喘满，及水气胀。③《兰台轨范》：有形之积块。

【宜忌】①《三因》：切须忌盐。②《中药成方配本》：孕妇忌服。

61978　**禹余粮丸**

【方源】《医方类聚》卷一四二引《济生》。

【组成】禹余粮石(煅)　赤石脂(煅)　龙骨　荜茇　诃子(面裹煨)　干姜(炮)　肉豆蔻(面裹煨)　附子(炮)各等分

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，食前米饮送下。

【主治】肠胃虚寒，滑泄不禁。

61979　**禹余粮丸**

【方源】《普济方》卷三二二引《医学集成》。

【组成】桑寄生　柏叶(微炒)　当归(去芦，微炒)　厚朴(去粗皮，姜汁炒)　干姜　白术　鳖甲(醋浸，去裙，炒黄)　附子(炮，去皮脐)各一两　禹余粮(烧，醋淬七次，细研)　扁豆各五钱(炒)

【用法】上锉散。每服三钱，以水一盏半，加生姜三片、红枣二枚煎，温服。

【主治】妇人带下久虚，胞络伤败，月水不调，渐成崩漏，气血虚弱，面黄肌瘦，脐腹里急，腰膝疼重，肢体烦痛，心忪头眩，手足寒热，不思饮食。

【加减】止泻，加黑豆；止痢，加粟壳(蜜炒)。

【备考】本方方名，据剂型，当作“禹余粮散”。

61980　**禹余粮丸**

【方源】《普济方》卷三二一。

【组成】禹余粮不拘多少

【用法】上为末，以面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，木通汤送下。

【主治】便血及痒痛。

61981　**禹余粮丸**

【方源】《普济方》卷三三二。

【组成】生地黄一两　禹余粮　白术　芍药　当归　续断各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。

每服三十丸，米饮送下。未知，加至五十丸。

【主治】月水乍多乍少，或前或后。

【加减】月水偏少者，加当归、芍药各一两；偏多者，倍续断、地黄；绝产者，加苁蓉一两；腹痛者，加蒲黄、芒消各半两。

61982 **禹余粮汤**

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】禹余粮（煅，醋淬） 大麻仁各二两 干姜（炮）一两 黄连（去须）半两 白术一两 枣十枚（焙，取肉） 桑根白皮（锉）二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至五分，去滓，食后温服，每日三次。

【主治】喉痹，若胃中虚，有饥状，少气不足以息，四逆泄注，腹胀喜噫，食则欲呕，泄癖溏下，口干，四肢重，好怒，不欲闻人声，诊其脉，右手关上阴阳俱虚者，脾胃虚也。

61983 **禹余粮汤**

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】禹余粮（煅，淬七遍） 白僵蚕（去黑者，微炒） 乌贼鱼骨（去甲皮）各一两 龙骨（碎，研） 桂（去粗皮） 灶下黄土（无灰者） 石韦（去毛） 干姜（炮） 滑石（研） 赤芍药 半夏（浆水浸一宿，生绢袋子揉洗去滑，切开，生姜汁炒黄） 代赭（丁头者，研）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加生姜三片，煎至六分，去滓，食前温服，一日三次。

【主治】妇人胞胎寒冷，绝产无子。

61984 **禹余粮汤**

【方源】《产孕集》卷下。

【组成】禹余粮五钱 白术 干姜各二钱 党参一两 茯苓三钱 陈皮 川芎䓖各一钱 炙甘草 木香各一钱

【用法】分二服。

【主治】产后泄痢甚者。

61985 **禹余粮饮**

《圣济总录》卷十四。为《外台》卷十五引《深师方》"五邪汤"之异名。见该条。

61986 **禹余粮饮**

【方源】《圣济总录》卷一二七。

【组成】禹余粮粉（研）一两（分作两帖） 甘草一两（半生半炙，捶碎） 腻粉（研）半分（分作两帖）

【用法】上先将甘草半两，以水一升，煮取半升，调禹余粮末并腻粉各一帖，空心顿服。当泻下恶物，未愈再服，泻后以薤粥补之。

【主治】瘰疬。

61987 **禹余粮散**

【方源】《圣惠》卷四。

【组成】禹余粮一两半（烧，醋淬三遍） 白芍药一两半 石膏一两半 牡蛎一两半（烧为粉） 秦艽一两半（去苗） 桂心 防风（去芦头） 远志（去心） 独活 甘草（炙微赤，锉） 人参（去芦头） 麦门冬（去心，焙） 菖蒲 茯神 铁粉（细研） 朱砂（细研如粉） 雄黄（细研如粉）各一两 蛇蜕皮一尺（烧为灰）

【用法】上为细散。每服一钱，以麦门冬汤调下，不拘时候。

【主治】心脏风邪气，神思不安，悲啼歌笑，志意不定，精神恍惚。

61988 **禹余粮散**

【方源】《圣惠》卷七十三。

【异名】伏龙肝散（《三因》卷十八）、赤石脂禹余粮汤（《女科切要》卷三）。

【组成】禹余粮（烧，醋淬七遍） 赤石脂 牡蛎（烧为粉） 桂心 乌贼鱼骨（烧灰） 伏龙肝各一两

【用法】上为细散。每于食前以温酒调下二钱。

【主治】①《圣惠》：妇人漏下久不止，使人无子。②《三因》：气血劳伤，冲任脉虚，经血非时，忽然崩下，或如豆汁，或成血片，或五色相杂，或赤白相兼，脐腹冷痛，经久未止，令人黄瘦，口干，饮食减少，四肢无力，虚烦惊悸，使人无力。

61989 **禹余粮散**

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】禹余粮一两(烧,醋淬七遍)　桂心三两　芎䓖一两　当归一两(锉,微炒)　乌贼鱼骨一两(烧灰)　附子(炮裂,去皮脐)　白矾二两(烧令汁尽)

【用法】上为细散。每服二钱,食前以热酒调下。

【主治】妇人白崩久不止。

61990　**禹余粮散**

【方源】《圣惠》卷七十三。

【组成】禹余粮一两(烧,醋淬七遍)　甘草二两(炙微赤,锉)　赤石脂二两　龙骨二两　附子一两(炮裂,去皮脐)　芎䓖三分　熟干地黄一钱　白芍药三两　干姜半两(炮裂,锉)　当归一两(锉,微炒)　桂心半两

【用法】上为细散。每服二钱,食前以粥饮调下。

【主治】妇人崩中漏下不止,渐加羸瘦,四肢烦痛。

61991　**禹余粮散**

《圣济总录》卷一一四。为《圣惠》卷三十六"禹余粮丸"之异名。见该条。

61992　**禹余粮散**

《圣济总录》卷一五二。为《圣惠》卷七十三"阿胶散"之异名。见该条。

61993　**禹余粮散**

【方源】《产乳备要》。

【组成】禹余粮(醋淬)　伏龙肝　赤石脂　白龙骨　牡蛎　乌鱼骨　桂(去皮)　浮石各等分

【用法】上为末。每服三钱,食前煎乌梅汤调下。

【主治】气血伤,冲任虚损,崩伤带漏,久而不止,或下如豆汁,或成片如干,或五色相杂,或赤白相兼,脐腹冷痛,面体萎黄,心忪悸动,发热多汗,四肢困倦,饮食减少。

【加减】白带多,加牡蛎、龙骨、乌鱼骨;赤带多,加赤石脂、禹粮;黄带多,加伏龙肝、桂心,随病加治。

61994　**禹余粮散**

【方源】《医方类聚》卷二十三引《经验秘方》。

【组成】禹余粮(生用)　防风(去芦)　官桂(去粗皮)　白芍药　远志　独活　人参　石膏(生用)　牡蛎(生用)　秦艽各一两　防己　石菖蒲　雄黄　茯神　蛇蜕　白术各五钱

【用法】上㕮咀。每服四钱,水一钟,煎至半钟,温服,不拘时候。

【主治】痫疾。

【宜忌】忌猪、羊、虾、蟹、海味等物。

61995　**禹余粮散**

【方源】《普济方》卷三三一。

【组成】禹余粮(醋煅)　地榆　阿胶　赤石脂　紫金皮　茴香　侧柏各等分

【用法】上为末。每服二钱,米饮调下。

【主治】心燥,四肢疲疼,所下五色,腰脚脐中紧痛。

鬼

61996　**鬼见愁**

【方源】《卫生总微》卷十六。

【组成】代赭石(用丁头五粒,火煅,醋淬十次,研极细)　朱砂(透明块子)半钱(水飞)　砒霜皂子大

【用法】上用湿纸七重同裹,慢火内煨至纸干,取出顿地上出火毒,次入脑、麝各半字,金箔五片,同研为细末。每用一字,于发日早以麻油一滴调药,敷鼻尖上。

【主治】乳奶婴小患疟,无计可治者。

61997　**鬼代丹**

【方源】《宣明论》卷十五。

【异名】神让散(《普济方》三〇五引《德生堂方》)。

【组成】无名异(研)　没药(研)　乳香(研)　自然铜(醋淬,研)　地龙(去土)　木鳖子(去壳)各等分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。温酒

送下一丸。

【功用】打着不痛。

61998 鬼代丹

《普济方》卷三〇五。为《医方类聚》卷一九一引《医林方》"鬼代散"之异名。见该条。

61999 鬼代丹

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】乳香 没药 自然铜 无名异 骨碎补 地龙 土鳖虫各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。临刑用好老酒化一丸。如不打，吃葱即解；吃素者，甘草汤解。

【功用】临刑拷打不痛。

62000 鬼代散

【方源】《医方类聚》卷一九一引《医林方》。

【异名】鬼代丹（《普济方》卷三〇五）。

【组成】地龙（去土，炒）

【用法】上为细末。每服三钱，温酒调下。后用黄蜡为丸，如梧桐子大，每服三十丸，细嚼，以温酒一盏送服。手握生葱白三五根，临决时吃了生葱后，打不疼。

【主治】杖疮，打着不疼。

62001 鬼仙丹

【方源】《疑难急症简方》。

【组成】莲须 芡实 石莲子各十两（研末） 金樱子三斤

【用法】上将金樱子熬成膏，搅上三味末为丸。每服三五十丸，空心盐水送下。

【主治】男子嗜欲太过，精血不固而多热。

62002 鬼头顶

【方源】《串雅补》卷一。

【组成】白信五钱（用豆腐一大方块，中挖一池，放信于池内，以原豆腐盖好，煮一炷香，去腐用信） 雄黄五钱 陀僧五钱 生半夏一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。每服六丸，姜汤送下。壮者七丸，弱者四五丸。

【主治】四日两头疟，哮病。

62003 鬼臼丸

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】鬼臼一两（去毛） 雄黄一两（细研，水飞过） 龙脑一钱（细研） 麝香一钱（细研） 朱砂半两（细研，水飞过） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，以人参汤送下，不拘时候。

【主治】时气瘴疫。

62004 鬼臼丸

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】鬼臼半两（去须） 川升麻三分 麝香一钱 柴胡一两（去苗）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，以暖酒送下，一日三次，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：一切劳疾，飞尸，鬼疰等。②《圣济总录》：小儿尸疰劳瘦，或时寒热。

62005 鬼臼丸

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】鬼臼 常山 甘草（炙，锉） 绿豆粉各一两 鳖甲（醋炙，去裙襕）三分 雄黑豆二百五十粒（汤浸，去皮，焙） 砒霜半两（研，生使）

【用法】上为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大，丹砂为衣。每服一丸，日未出面东，用桃心七枚，同新汲水送下。

【主治】鬼疟。

62006 鬼臼汁

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】生鬼臼一两

【用法】上捣绞取汁一小盏，服之即愈。如无生鬼臼，即用干者为末，每服二钱匕，新汲水调下，不拘时候。宜先烙口中黑脉，次烙百会穴，又烙玉泉、足阳明、章门、心俞、下廉，不愈宜服。

【主治】黑黄。病人身面黑黄，口唇两颊上有青脉起，或出于口角，脉息沉细，吃食不妨，身如土色。

62007 鬼臼浆

【方源】《圣济总录》卷一四九。

【组成】鬼臼叶一把

【用法】上细锉,以苦酒渍之,捣绞取汁一升。顿服,每日三次。

【主治】射工中人,寒热。

62008　鬼针散

【方源】方出《千金》卷二十二,名见《普济方》卷三〇〇。

【组成】鬼针草苗　鼠粘草根

【用法】捣鬼针草苗汁及鼠粘草根,和腊月猪脂敷之。

【主治】割甲侵肉不愈。

62009　鬼胆丸

【方源】《医方类聚》卷一三〇引《烟霞圣效方》。

【组成】皂角四两(去皮子)　巴豆二十个(好者,去皮心油,生用,研碎)

【用法】上为细末,研浓墨水为丸,如皂角子大。每服三丸,临卧浆水送下。大便显出积物为效。

【主治】远年日近诸般积物。

62010　鬼哭丹

【方源】《中藏经》卷下。

【组成】川乌十四个(生)　朱砂一两　乳香一分

【用法】上为末,以醋一盏,加五灵脂末一两,煮面糊为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每服七丸,男子温酒送下;女子醋汤送下。

【主治】腹中诸痛,气血凝滞,饮食未消,阴阳痞隔,寒热相乘,抟而为痛。

62011　鬼哭丹

【方源】《普济方》卷一九七引《本事》。

【组成】人言一钱(研末)　新绿豆一两(为末)

【用法】上搅匀,以无根水搜为一丸,如皂荚子大,却将黄丹为衣,阴干;小儿丸如绿豆大。临发日五更,用桃、柳枝露水送下。

【主治】疟疾不问一日一发、间日一发或三日者,多寒少寒,多热少热,头疼,渴欲饮冷者。

【宜忌】忌热物半日。

62012　鬼哭丹

【方源】《普济方》卷一六三引《经验良方》。

【异名】豉破丸。

【组成】白信石一钱(白砒霜者良,不用黑者)　寒水石四钱

【用法】上药各为细末,取端午日三五家粽角,极薄切,用建盏盛粽一过,用寒水石铺一过,却信石铺之,此后再用粽角,以前法铺之。如铺尽,仍将粽子盖却;用淡豉、冷水微浸取浓汁,滴于盏内,炼成丸,如粟米大。大人只服五丸,五岁后只三丸,周岁以上只一丸,疟疾未发前,五更东流水送下;水齁,盐蒴烧灰,调沸汤,候冷吞下;食齁,茶蒴烧灰,调沸汤,冷吞下,或冷腊茶清吞下;老齁,用半夏五粒,生姜一大块,同擂自然汁吞下,永远不发。

【主治】齁鮈,疟疾。

62013　鬼哭丹

【方源】《丹溪心法附余》卷六。

【组成】常山一斤(醋浸,春五、夏三、秋七、冬十日)　槟榔各四两　半夏　贝母各二两

【用法】上为末,用鸡子清和面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,隔夜、临睡冷酒吞服,次日早再进一服。

【主治】疟,二三日一发者。

62014　鬼哭丹

《本草纲目》卷八。即方出《外台》卷三十六引刘涓子方,名见《普济方》卷一九七引《圣惠》"鬼哭散"。见该条。

62015　鬼哭饮

《医方大成》卷十引汤氏方。为《幼幼新书》卷十七引茅先生方"鬼哭散"之异名。见该条。

62016　鬼哭散

【方源】方出《外台》卷三十六引刘涓于方,名见《普济方》卷一九七引《圣惠》。

【组成】黄丹半钱匕

【用法】以蜜水和服。若冷,以酒和服之。

【主治】①《外台》引刘涓于方:小儿疟。②《奇效良方》:瘅疟但热不寒。

【备考】本方方名《本草纲目》引作“鬼哭丹”。

62017 **鬼哭散**

【方源】《幼幼新书》卷十七引茅先生方。

【异名】鬼哭饮（《医方大成》卷十引《汤氏方》）。

【组成】常山 大腹皮 白茯苓 鳖甲（醋炙） 甘草（炙）各等分

【用法】上鳖甲、甘草修事，外三味不得见火，为末。每服三钱，用水一盏，冬取桃、柳枝各二七寸，同煎至五分，临发时服。喀吐出涎不妨。

【功用】《准绳·幼科》：止疟疾。

【主治】①《幼幼新书》引茅先生方：小儿脾寒疟疾。②《医方大成》引汤氏方：疟疾久不愈者。

62018 **鬼哭散**

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】人参（去芦头）半两 常山一两 茯苓（去皮）一两 甘草一两（生用） 肉桂（去粗皮）一两

【用法】上为细末。每服四钱，用无灰酒八分一盏，冷调下，当发日空心服。

【主治】一切寒热疟疾。

62019 **鬼箭丸**

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】鬼箭羽一两 川芒消一两 柴胡一两（去苗） 水蛭一分（炒微黄） 虻虫一分（炒令微黄，去翅足） 川大黄三分（锉，微炒） 赤茯苓三分 干漆半两（捣碎，炒令烟出） 川椒一分（去目及闭口者，微炒去汗） 甜葶苈一两（隔纸炒令紫色） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 牡丹三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温酒送下。

【主治】妇人脉不通，手足心热，腹满喘急，不欲睡卧，心神烦闷。

62020 **鬼箭丸**

【方源】《传家秘宝》。

【组成】鬼箭羽 芍药各二分 白术三分（炒） 当归（洗过，锉，焙） 桂心 甘草各二分 牡丹皮三分 川大黄四分 干地黄三分 虻虫三分（炒） 蒲黄一分半（炒） 乌梅肉 人参三分

【用法】上为细末。每服二钱，以水二盏，加生姜，煎至六分后，再人酒三分，重煎三二沸，去生姜服之，空心服之后，更吃酒投之。

【主治】妇人血脉不通，欲变成劳，寒热不调，不思饮食，肌肤消瘦，心腹刺痛，手足沉重。

【备考】方中乌梅肉用量原缺。本方方名，据剂型，当作“鬼箭汤”。

62021 **鬼箭丸**

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】鬼箭羽 赤芍药 乌梅肉 牛膝 白薇 白术各三分 当归 桂心 甘草各二分 牡丹皮 干地黄 人参各三分 川大黄四分 虻虫 蒲黄各一分 朴消五分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。初服十丸，加至二十丸，酒送下。

【主治】妇人血脉不通，欲变成劳，寒热不调，不思饮食，肤肤消瘦，心腹刺痛，手足沉重。

62022 **鬼箭汤**

【方源】《圣济总录》卷十一

【组成】鬼箭 白蔹 白术 矾石（熬令汁枯） 甘草（锉，炙）各一两 防风（去叉）二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，加粟米粉二钱匕，同煎至七分，去滓，食后温服，兼用粉身。

【主治】风疹。

62023 **鬼箭汤**

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】鬼箭羽（如鸡子大）一块 甘草一尺（炙，锉） 麻黄（去根节煎，抹去沫，焙干）四两 石膏（如鸡卵）一块

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏

半,煎至八分,去滓,空心、临卧各一服。

【主治】风入心腹挛急。

【宜忌】慎外风。

62024　**鬼箭汤**

【方源】《圣济总录》卷一六六。

【组成】鬼箭羽五两(锉碎)

【用法】上为粗末。每服二钱匕,以水一盏,煎七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后乳汁不下,或汁少。

62025　**鬼箭散**

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】鬼箭羽三两　瞿麦一两　葵子一两　石韦一两(去毛)　滑石三两　木通一两(锉)　榆白皮二两(锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】脬转,不得小便。

62026　**鬼箭散**

【方源】《圣惠》卷六十九。

【异名】鬼箭羽散(《普济方》卷三一七)。

【组成】鬼箭羽一两　白蒺藜一两(微炒,去刺)　桂心半两　麻黄一两(去根节)　赤箭三分　独活三分　芎䓖三分　薏苡仁三分　蛇床子半两　枳壳三分(麸炒微黄,去瓤)　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妇人血游风,遍身瘙痒不止。

62027　**鬼箭散**

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】鬼箭羽一两　琥珀一两　牛李子一两　当归一两(锉碎,微炒)　穿山甲一两(涂醋炙令黄)　桂心一两　桃仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)　川大黄一两(锉碎,微炒)

【用法】上为细散。每服二钱,食前以温酒调下。

【主治】妇人积聚气,心腹胀痛,经络滞涩,四肢疼闷,坐卧不安。

62028　**鬼箭散**

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】鬼箭羽半两　赤芍药半两　川大黄半两(微炒)　桂心半两　鳖甲半两(涂醋炙令黄,去裙襕)　当归半两(锉,微炒)　牛膝半两(去苗)　琥珀一两(细研)　土瓜根半两　水蛭一分(炒微黄)　川朴消一两　虎杖三分　桃仁三分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)　虻虫一分(炒微黄)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至五分,去滓,食前温服。

【主治】妇人月水久不通,经数年以来,羸瘦少食,诸方不效者。

62029　**鬼哭饮子**

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】槟榔二个(一生一熟)　鳖甲半两(涂醋,炙令微黄,去裙襕)　甘草一截(如病人中指长)　桃仁七粒(去皮尖)　杏仁七粒(去皮尖)　青蒿一握(长二寸)　阿魏少许　东南桃柳枝各七茎(长三寸,和心用)

【用法】上以童便一大盏半,煎取一盏,去滓,食前分温二服。以吐利出恶物为度。

【主治】传尸劳,不时冷热羸瘦。

【宜忌】忌苋菜。

62030　**鬼哭饮子**

【方源】《博济》卷一。

【组成】阿魏一分(使童便磨一处)　东引桃枝(小者,捶碎)一大握　甘草(大者)三寸(捶碎)　青蒿一大握(如用其子,只用一两半)　槟榔一两(为末)　葱白二寸(连根)

【用法】上用童便二升,浸桃枝、甘草、青蒿、葱白一宿,来日五更初煎取六合,去滓,然后入阿魏更煎两沸,分为二服。每服临吃时入槟榔末半两同煎。如觉心头恶心,必吐,吐后更进第二服。如服前一服后心头安稳,即须进第二服,必然通转,当下,必见恶物。服时仍不得令人与患者面对,恐恶虫飞入人口鼻内。患者春吃二服,秋吃三服,每年五服,劳虫并尽,即去病根。

【主治】一切劳。

【宜忌】忌猫、狗见。

62031 **鬼哭饮子**

【方源】《医统》卷七十八引《青囊》。

【组成】天灵盖（酥炙黄色） 鳖甲（醋炙黄色） 柴胡二钱半 木香一钱二分 桃仁二十二枚（另研） 鼓心（醋炙黄） 青蒿半握 阿魏一钱 贯众二钱半 安息香 甘草各一钱

【用法】上㕮咀，为粗末，先以童便二升隔夜浸露，至四更时煎至八分，去滓，分作三服。每服调后散子一帖，五更初温服，即稳卧片时，又进一服，至日出时觉腹中欲利；如未利，又进一服，已利勿服。服后利下恶物并虫，能传注后人，必置之烈火，或油煎之，以绝后患。

【功用】取传尸虫。

【备考】散子方：槟榔二钱半，辰砂一钱二分，麝香一钱（另研），蜈蚣一条（姜汁浸），乌鸡屎（先将鸡五日前用火麻子喂之，五日后则用其粪）。为细末，作三帖，各入前煎汤内服。方中天灵盖、鳖甲用量原缺。

62032 **鬼督邮丸**

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】鬼督邮（末） 安息香各一两（酒浸，细研，滤去滓，慢火煎成膏）

【用法】上先将安息香煎成膏，拌前药为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心煎吴茱萸醋汤送下。

【主治】恶注心痛闷绝。

62033 **鬼箭羽丸**

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】鬼箭羽一两 鬼臼一两（去毛） 赤小豆半分（炒熟） 朱砂半两（细研，水飞过） 雄黄半两（细研，水飞过）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如豇豆大。如已患者，手掌中水调一丸，涂于口鼻上，又予空腹温水下一丸；如未染疾者，但涂口鼻，兼以皂囊盛一丸系肘后，亦宜时烧一丸。

【功用】①《圣惠》：辟除毒气。②《普济方》：避伤寒瘟疫瘴疠，令不相染。

【主治】时气瘴疫。

【宜忌】忌羊血。

【备考】本方方名，《普济方》引作“赤小豆丸”。

62034 **鬼箭羽丸**

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】鬼箭羽 水蛭（熬） 细辛（去苗叶）各三分 桃仁（去皮尖双仁，炒，别研） 当归（切，焙） 芎䓖各一两 大黄（锉，炒） 牛膝（酒浸，焙）各一两一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，渐加至二十丸，空腹酒送下。

【主治】月水不通，腰腹疼痛。

62035 **鬼箭羽汤**

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】鬼箭羽 桃仁（去皮尖双仁，炒）各一两 干姜（炮）一分 甘草（炙，锉）半分 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 当归（切，焙） 桂（去粗皮） 芎䓖各半两

【用法】上锉细，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，煎至八分，去滓温服。

【主治】心疼中恶，绕脐刺痛，自出汗。

62036 **鬼箭羽汤**

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】鬼箭羽一两 桃仁（汤浸，去皮尖双仁）六十枚（炒） 芍药二两 鬼臼（削去皮，微炒）一两 陈橘皮（汤浸，去白，焙）二两 当归（切，焙） 桂（去粗皮） 柴胡（去苗）各一两 大黄（锉碎，醋炒）一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜一分（拍破），同煎至一盏，去滓，加麝香末一字匕，丹砂末、朴消末各半钱匕，再煎一沸，温服，每日二次，以快利为度。

【主治】心腹疠痛，或暴得恶注，疠刺欲死者。

62037 **鬼箭羽汤**

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】鬼箭羽 木香 当归（切，焙） 黄

苓(去黑心)　桂(去粗皮)　芎䓖　白术各一两　芍药一两一分　大黄(锉,炒)　桃仁(汤浸,去皮尖双仁,麸炒)四十九枚　土瓜根　刘寄奴各一两　虻虫四十九枚(去翅足,糯米同炒,米熟去米)

【用法】上为粗末。每服三钱匕,以水一盏,加生姜五片,煎至七分,去滓,下槟榔、朴消末各半钱匕,更煎一沸,温服。

【主治】室女月水不通,肌肤不泽,日觉瘦瘁,滑血。

62038　**鬼箭羽汤**

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】鬼箭羽　当归(切,炒)　白术(锉,炒)　桂(去粗皮)各二两　细辛(去苗叶)一两半　生干地黄(焙)一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,以水、酒各半盏,煎七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后血气不散,攻心腹刺痛,胀满气喘。

62039　**鬼箭羽汤**

《圣济总录》卷一七七。为《圣惠》卷八十三"鬼箭羽散"之异名。见该条。

62040　**鬼箭羽散**

【方源】方出《千金》卷二十一,名见《普济方》卷一九一。

【组成】丹参　鬼箭羽　白术　独活各五两　秦艽　猪苓各三两　知母　海藻　茯苓　桂心各二两

【用法】上㕮咀,以酒三斗,浸五日。每服五合,每日三次,任性量力渐加之。岁久服之,乃可得力耳。愈后可长服。

【功用】微除风湿,利小便,消水谷。

【主治】终身水肿,腹大,四肢细,腹坚如石,小劳即苦足胫肿,小饮食便气急。

62041　**鬼箭羽散**

【方源】《圣惠》卷二十四。

【组成】鬼箭羽一两　白蔹一两　白蒺藜一两(微炒,去刺)　白矾一两(烧令汁尽)　防风二两(去芦头)　甘草一两(炙微赤,锉)

【用法】上为细散。以粟米粉五合拭身,后以温酒调下二钱,不拘时候。

【主治】风瘾疹,累医不效者。

62042　**鬼箭羽散**

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】鬼箭羽　桃仁(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)　赤芍药　鬼臼(去须)　陈橘皮(汤浸,去白瓤,焙)　当归(锉,微炒)　桂心　柴胡(去苗)　朱砂(细研)各一两　川大黄二两(锉碎,微炒)

【用法】上为细散,入朱砂,研令匀。每服一钱,以温酒调下,不拘时候。

【主治】恶疰心痛或疠刺,腹胁肩背痛无常处。

62043　**鬼箭羽散**

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】鬼箭羽一两　川大黄一两(锉碎,微炒)　木香半两　桂心三分　当归三分(锉,微炒)　桃仁三分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)　赤芍药三分　牛膝一两(去苗)　鳖甲一两(涂醋炙令黄,去裙襕)　延胡索三分　益母草半两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】产后月水不通,脐腹时痛,四肢烦疼,不欲饮食,渐加瘦弱。

62044　**鬼箭羽散**

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】鬼箭羽一两半　当归一两(锉,微炒)　益母草一两

【用法】上为细散。以童便半盏、酒半盏相和,暖过,调下二钱,不拘时候。

【主治】产后血运,闷绝欲死。

62045　**鬼箭羽散**

【方源】《圣惠》卷八十三。

【异名】鬼箭羽汤(《圣济总录》卷一七七)。

【组成】鬼箭羽一分　真珠末一分　桃仁(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)　川大黄一两(锉,微炒)　羚羊角屑　桔梗(去芦头)　川

朴消 川升麻 赤芍药 柴胡(去苗) 黄芩各半两

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一中盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿中恶，心坚强，卒痛欲困。

【备考】《圣济总录》有鬼臼。

62046 鬼箭羽散

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】鬼箭羽一分(为细末) 砒霜(研)一钱 五灵脂(研)一两

【用法】上为细散。每服半钱匕，临发时冷茶清调下。

【主治】鬼疟，寒热日发。

62047 鬼箭羽散

《普济方》卷三一七。为《圣惠》卷六十九"鬼箭散"之异名。见该条。

62048 鬼疟神效丸

【方源】《医统》卷三十七。

【组成】砒霜 朱砂 乳香各半两 麝香 阿魏 安息香 绿豆粉 猢狲头骨

【用法】上药各为末，蒸饼为丸，如梧桐子大。发前男左女右手把一丸便卧。一伏时便愈。

【主治】鬼疟。

【备考】方中麝香、阿魏、安息香、绿豆粉、猢狲头骨用量原缺。

62049 鬼箭羽十味丸

【方源】《外台》卷五引《许仁则方》。

【组成】细辛四两 橘皮四两 鬼箭羽(折看之如金黄色者)二两 白术五两 桂心四两 地骨皮四两 蜀漆二两 甘草三两(炙) 当归五两 丁香三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。初服十五丸，稍加至三十丸，煮乌梅饮下之，每日二次。经三五日后，若觉热甚，每服药后良久，任吃三两口粥饮压之。

【主治】疟疾经用吐利后，其源尚在，如更吐利，又虑尪羸者。

【宜忌】忌海藻、菘菜、桃、李、雀肉、生葱。

衍

62050 衍庆丸

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】当归(酒洗) 肉苁蓉(酒洗) 山药(乳拌蒸) 枸杞各四两(酒蒸) 鱼胶一斤(麸炒) 核桃肉十两(去皮，捣烂) 补骨脂一斤(米泔水加盐浸，春二、夏一、冬五日) 菟丝子八两(酒浸一宿，煮吐丝) 熟地四两(酒洗) 吴茱萸三两(酒蒸，炒) 覆盆子四两(酒浸) 人参五钱(黄耆煎汤浸透，晒干)

【用法】上炼蜜为丸。空心淡盐汤送下，初服一钱，次服一钱五分，三服二钱，四服二钱五分，五服三钱。初服禁房事三七日，便觉药力有效，至三月后，用酒送下三钱，即可得孕。

【功用】①《惠直堂方》：男子久服身体康健，饮食加进。②《全国中药成药处方集》：补益身体，强精种子。

【主治】①《惠直堂方》：兼治偏坠疝气。②《全国中药成药处方集》：身体衰弱，精气不足，肾虚寒冷，偏坠疝气。

【宜忌】忌食猪、鸡、鹅、鸭等血，并君达菜。

【备考】方中鱼胶，《全国中药成药处方集》(沈阳方)作"阿胶"。

须

62051 须问汤

【方源】《遵生八笺》卷十一引东坡居士方。

【组成】拔云二钱 干姜二钱(干用) 枣一升(干用，去核) 白盐二两(炒黄) 甘草一两(炙，去皮) 丁香 木香各半钱 陈皮约量(去白)

【用法】上同捣，煎服或点服。

【功用】到老容颜红白。

62052 须问汤

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】白豆蔻仁 缩砂仁各四两 丁香二两 甘草三两(炙) 白盐三两(炒)

【用法】上除丁香外，同炒熟，以一瓷盒子

入药一半铺底，下丁香，又以一半盖头，淹一宿取出，为细末。每服一钱，沸汤点服。

【主治】中酒痰逆。

盆

62053　盆消丸

【方源】《圣济总录》卷一七五。

【组成】盆消　马牙消　甜消　铅白霜　丹砂　续随子　青黛　白矾(烧汁尽)　腻粉各一钱　龙脑　麝香各一字

【用法】上为细末，粳米饭为丸。每服一丸，三岁以上如鸡头子大，二岁以下如梧桐子大，三两个月儿如小豆大，并用茶汤化下。

【主治】小儿哽气，咳嗽痰热。

食

62054　食膏

【方源】《博济》卷三。

【组成】井盐五钱(无，以青盐代之)　诃子一个(去核)　黄连(去须)五钱　乌贼鱼骨二钱半(去甲)　黄丹三两(水飞)

【用法】上为细末，用好蜜十两　熬去白沫，滤净，入前药末子银铜器内，用文武火慢熬，用槐、柳条搅成膏，紫色为度，用净瓷器盛贮，于地内埋一伏时，去其火毒，取出。每用豆大一块，温水化开，洗眼。

【主治】眼目昏花。

62055　食气汤

《普济方》卷一七一。即《百一》卷十五“养气汤”。见该条。

62056　食肉膏

【方源】《鬼遗》卷五。

【组成】松脂五两　雄黄(别研)　雌黄　野葛皮各二两　猪脂一斤　漆头芦茹三两　巴豆一百枚(去皮膜心)

【用法】上七味，先煎松脂，水气尽，下诸药，微火煎三上下，膏成；绞去滓，纳雄、雌二黄搅调。以膏著兑头、纳疮内，日易六七，勿肉兼新，故初用病更肿赤，但用如节度，恶肉尽止，勿使过也。

【主治】痈疽有恶肉者。

【备考】本方方名，《医心方》引作“食恶肉膏”。

62057　食后丸

【方源】《脚气治法总要》卷下。

【组成】前胡　黄芩　防风　犀角屑　蔓荆子　栀子仁　人参　车前子　麦门冬(去心)各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后温浆水送下。

【主治】寻常脚气欲发，先大便秘涩，腹中气满，两胁妨闷，不思饮食，小便赤黄，肉多蠕动，痰涎不利，烦热缓弱。

62058　食郁汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十八。

【组成】苍术　厚朴　川芎　陈皮　神曲　山栀　枳壳　炙草　香附　砂仁

【主治】食郁。酸嗳腹满，不能食，黄疸，鼓胀痞块，脉紧实。

62059　食前丸

【方源】《脚气治法总要》卷下。

【组成】木香　白茯苓(去皮)　羚羊角屑各八两　熟地黄十二两　桂(去皮)　旋复花各四两　楮实十二两　薏苡仁八两　槟榔八两　大黄一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心酒送下。

【功用】预防脚气发动，疏散荣卫气血，风气通行。

62060　食盐丸

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【异名】羊粪膏(《普济方》卷五十三)。

【组成】食盐　杏仁(去皮尖双仁，炒)各一分

【用法】上药烂捣，以纯乌羊屎新湿者和丸，如枣核大。塞耳中，勿令风入，干即易之，至七日、二七日，耳中有声渐入，即以苇管长二寸纳耳中，四畔以面封之，勿令气出，以薄

面饼子裹筒头上。以艾炷灸三壮，耳内即有干黑脓出，须挑却。还依前法，一日两度，以后常用乱发塞之。

【主治】耳聋。

62061 食盐丸

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】食盐（研） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒，别研） 当归（切，焙） 干姜（炮） 皂荚（去皮子，酥炙）各二两 附子（炮裂，去皮脐）一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心陈米饮送下。

【主治】肠风泻血，面色萎黄，累服药不愈者。

62062 食盐汤

【方源】《医部全录》卷三二五。

【组成】食盐一两（用湿草纸裹，煨红，取出用）

【用法】上以河水二碗，砂锅入煨盐，煎五七沸，放温，顿饮之，少倾探吐。仓卒用之最妙。

【主治】咳逆，并一切痰证。

62063 食茱萸丸

《普济方》卷二〇五。为《外台》卷八引《古今录验》“五噎丸”之异名。见该条。

62064 食茱萸丸

《普济方》卷二四八。为原书同卷“续命散”之异名。见该条。

62065 食恶肉散

【方源】《鬼遗》卷四。

【组成】藜芦一分半 真珠一分半 石硫黄 雄黄 麝香各三分 马齿矾石（熬） 漆头芦茹各三分

【用法】上药治下筛，粉疮上；亦可为膏，和敷疮上。

【主治】痈疽有恶肉者。

62066 食恶肉散

《鬼遗》卷四。为《肘后方》卷五“食肉雄黄散”之异名。见该条。

62067 食恶肉散

【方源】《千金》卷二十二。

【组成】硫黄 马齿矾 漆头蔺茹 丹砂 麝香 雄黄 雌黄 白矾各二分

【用法】上为末，敷之。

【功用】腐蚀恶肉。

【主治】痈肿恶肉不尽者。

62068 食恶肉散

【方源】《圣惠》卷六十四。

【组成】硫黄（细研） 马齿苋 白矾（烧令汁尽） 蔺茹 丹参各半两

【用法】上为细散。涂敷恶肉上。

【主治】疮疡恶肉。

62069 食恶肉膏

【方源】《千金》卷二十二。

【组成】大黄 芎䓖 莽草 真珠 雌黄 附子（生用）各一两 白蔹 矾石 黄芩 蔺茹各二两 雄黄半两

【用法】上㕮咀。以猪脂一升半，煎六沸，去滓，纳蔺茹、矾石末，搅调敷疮中，恶肉尽乃止。

【功用】《普济方》：去恶肉。

【主治】《普济方》：痈疽及发背、诸恶疮。

62070 食恶肉膏

《医心方》卷十五。即《鬼遗》卷五“食肉膏”。见该条。

62071 食肉膏龙膏

【方源】《鬼遗》卷四。

【组成】白矾二两（火炼，末之） 熟梅二升（去核） 盐三合 大钱二十七枚

【用法】上四味于铜器中，猛火投之，摩灭成末，乃和猪脂，捣一千杵。以涂疮上。甚痛勿怪，此膏蚀恶肉尽，复看可敷蛇衔膏涂之，令善肉复生。

【主治】痈疽。

62072 食肉雄黄散

【方源】《肘后方》卷五。

【异名】食恶肉散（《鬼遗》卷四）。

【组成】雄黄六分 蔺茹 矾石各二分

【用法】上为末。撒疮中，一日二次。

【主治】恶疮。

62073 食郁越鞠丸

【方源】《医方考》卷三。

【组成】山楂　神曲　砂仁　香附(童便制)　苍术(米泔浸七日)　抚芎　栀子

【主治】食郁噎膈者。

【方论选录】食不自膈也,或由气塞,或由火郁,然后停食而作食膈。故用香附、苍术、抚芎以顺气,栀子以泻火,山楂、神曲、砂仁以消食。

62074 食柏圣饼子

【方源】《鸡峰》卷二十五。

【组成】大豆　大枣各一升　白茯苓　贯众　甘草各二两半

【用法】上除枣肉外,为末,后以枣肉和匀,如干,入少煮枣水和之,捻作饼子,如钱大,每一饼子分作四口,十余日外分作六口,余分作八口,百日或经岁则不必服药。如在路人家远,有饮食未及,只服药一两饼子,饥亦止;及临卧服一两饼,能缩小便。

【功用】消草毒,和脾胃,止饥,缩小便。

【宜忌】服药后不可饮煎汤,只饮冷水。

62075 食药二仙丸

《普济方》卷二十二。即《百一》卷二"三棱丸"。见该条。

62076 食药三棱丸

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】陈仓米四两(拣净,以新好色巴豆二十一粒,剥去壳,慢火同炒,候米香熟黄色、巴豆黑,去巴豆)　橘红四两(去白)　乌梅肉半两(炒干)　缩砂仁一两　神曲三两(作末,煮糊)

【用法】上为细末,用神曲糊为丸,如绿豆大。每服二十丸,生姜汤送下。

【功用】化饮食积聚。

62077 食积万应散

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】黑丑炭　粉甘草　白丑炭各一两　贡朱砂二钱　川黄连三钱　血琥珀　大黄炭各二钱　槟榔片一两　梅片五分　黄芩一两

【用法】上为极细末。五岁以下每服三分,三岁以下每服二分,一岁以下每服一分,五个月以下每服五厘,白开水送下。

【功用】清热,消食,除痞。

【主治】食积乳积,腹痛发热,吐乳便白,烦热惊痫,咳嗽气促,心神不安,睡露白睛,手足颤动。

【宜忌】忌生冷硬物。

62078 食积痞胀散

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】槟榔一两　川朴一两　山楂二两　胡索一两　莱菔子二两　建曲二两　麦芽三两　归尾二两　三棱一两五钱　干姜一两五钱　莪术一两五钱　鸡内金一两五钱

【用法】晒干为末。每服三钱,早晨开水送下。

【主治】食积痞胀。

62079 食积腹胀丸

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】槟榔一两　枳实一两五钱　川朴一两五钱　元胡索一两　山楂三两　莱菔子三两　归尾二两　麦芽三两　建曲二两　木香一两　青皮二两　三棱二两　莪术二两　干姜二两　鸡内金二两

【用法】晒干为末,水泛为丸。每服三钱,早晨开水送下。

【主治】食积腹胀。

独

62080 独凡丸

【方源】《医方易简》卷二。

【组成】好明矾不拘多少

【用法】用旧瓦阴阳合定,黄泥封固两头,以文武火炼干,白米饮为丸,每丸重二三钱,朱砂为衣。每服一丸,赤痢,甘草汤送下;白痢,生姜汤送下;赤白相兼者,甘草、生姜汤送下。

【主治】痢疾。

62081 独乌膏

【方源】《鲁府禁方》卷二。
【组成】川乌一两(为末)
【用法】醋调如膏，涂于脑顶角太阳、风府处。须臾痛止。
【主治】风寒头痛，服药不效者。

62082 独归酒
【方源】《医学集成》卷一。
【组成】当归三两
【用法】上加桂枝、独活、乳香、没药，泡酒常服。
【主治】血不营经，身痛，无别病者。

62083 独叶丹
【方源】《杂病源流犀烛》卷二十八。
【组成】桃叶二十片
【用法】上杵烂，塞粪门内。
【主治】痔中生虫，蚀啮痛痒。

62084 独白散
【方源】《医林纂要》卷十。
【组成】白及(研末)
【用法】上为散服。
【功用】敛正气，散瘀血。
【主治】跌打损骨节，伤脏腑，积瘀血。

62085 独圣丸
【方源】《证类本草》卷十引《经验后方》。
【组成】川乌头一个
【用法】柴灰火烧烟欲尽，取出放地上，盏子合盖良久，为细末，用酒蜡为丸，如大麻子大。每服三丸，空心送下；赤痢，用黄连、甘草、黑豆煎汤，放冷吞下；如白痢，用甘草、黑豆煎汤，放冷吞下；如腹泻及肚痛，以水吞下。
【主治】赤白痢及腹泻肚痛。
【宜忌】忌热物。

62086 独圣丸
《普济方》卷二〇九。为《百一》卷六"独神丸"之异名。见该条。

62087 独圣丸
【方源】《普济方》卷三八四。
【组成】黄连一钱
【用法】上以水一盏，煎数沸，服下。即省人事。
【主治】小儿惊眩，不省人事。

62088 独圣丸
【方源】《良朋汇集》卷三。
【组成】马前子不拘多少
【用法】以滚水煮去皮，香油炸紫色为度，研末，每两加甘草二钱，糯米糊为丸，如粟米大。每服三四分，诸疮，槐花汤送下；眼疾，白菊花汤送下；瘫痪，五加皮、牛膝汤送下，多服；上焦火，赤眼肿痛，喉闭，口疮，噎食反胃，虚火劳疫，痰饮，一切热病，俱用茶清送下；流火，葡萄汤送下；小儿痞疳症，使君子汤送下；腿痛，牛膝、杜仲、破故纸汤送下；男女吐血，水磨京墨送下；流痰火遍身走痛，生牛膝捣汁，黄酒送下，出汗；大便下血，槐花、枯矾煎汤送下；疟疾，雄黄、甘草煎汤送下，出汗；风湿遍身走痛，发红黑斑点，肿毒，连须葱白、生姜、黄酒煎汤送服；红痢，甘草汤送服；白痢，生姜汤送服；吹乳，通草酒煎服；虫症，山楂、石膏煎汤送服；两胁膨胀，烧酒送服；解药毒，用芥菜叶根捣汁冷服，冬天用甘草服可解。
【主治】诸疮，眼疾，瘫痪，上焦火，赤眼肿痛，喉闭，口疮，噎食反胃，虚火劳疫，痰饮，流火，小儿痞疳症，腿痛，吐血，流痰火遍身走痛，大便下血，疟疾，风湿遍身走痛，发红黑斑点，肿毒，赤白痢，吹乳，虫症，两胁膨胀，药毒。
【宜忌】忌葱、醋、花、柳。

62089 独圣丸
【方源】《医学心悟》卷五。
【组成】五灵脂(去土，炒烟尽)
【用法】上为末，醋为丸，如绿豆大。每服一二钱，淡醋水送下；清酒亦得。虚人以补药相间而用。
【功用】《笔花医镜》：去瘀积。
【主治】瘀血凝积，瘀血不去，新血不得归经，以致暴崩下血者。

62090 独圣丸

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】荆芥(连穗)

【用法】上为末,用生地黄自然汁熬膏为丸,如梧桐子大。每服三钱,茶、酒任下。

【主治】疥疮愈后年年发者。

【宜忌】忌鱼蟹。

62091　独圣丹

【方源】《古今医鉴》卷十四。

【组成】丝瓜(老者,近蒂取)三寸

【用法】于砂瓶内固济,桑柴火烧存性,为末,以如数配砂糖捣成饼。时时与吃。尽为佳。

【主治】小儿痘疹。

62092　独圣汤

【方源】《圣济总录》卷七十。

【组成】黄芩(去黑心)五两

【用法】上锉细,如麻豆大。每服七钱匕,以水二盏,煎至一盏,去滓温服。

【主治】血妄行,或衄或衊。

62093　独圣汤

《三因》卷十四。为《本事》卷六"国老膏"之异名。见该条。

62094　独圣汤

【方源】《妇人良方》卷二十引京师祝景助教方。

【组成】贯众(状如刺猬者)一个(全用,不锉断,只揉去毛花萼)

【用法】用好醋蘸湿,慢火炙令香熟,候冷,为细末。每服二钱,空心、食前米饮调下。

【主治】产后亡血过多,心腹彻痛,然后血下,久而不止,及赤白带下,年深诸药不能疗者。

62095　独圣汤

《医学纲目》卷二十二。即《妇人良方》卷二十"独圣散"。见该条。

62096　独圣汤

【方源】《普济方》卷三五三。

【组成】麦门冬　乌梅(去核)各等分

【用法】上㕮咀。用水一碗,煎至八分,露一宿,清晨服之。

【主治】烦热。

62097　独圣汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】楂肉一斤(研末)

【用法】每次二两,煎汤服。

【主治】小儿下红积,及产妇血痢。

62098　独圣汤

《叶氏女科》卷二。为《杨氏家藏方》卷十六"安胎散"之异名。见该条。

62099　独圣散

【方源】方出《金匮》卷下,名见《得效》卷六。

【组成】盐一升　水三升

【用法】上二味,煮令盐消,分三次服。当吐出食便愈。

【主治】食食生冷,食多不消,心腹胀痛,烦满短气。

①《金匮》:贪食,食多不消,心腹坚满痛。②《肘后》:霍乱,心腹胀痛,烦满短气,未得吐下。③《得效》:脾胃不足,过食瓜果,心腹坚胀,痛闷不安。

62100　独圣散

【方源】《普济方》卷一八九引《肘后方》。

【组成】糯米(微炒黄)

【用法】上为末。每服二钱,新汲水调下。

【主治】鼻衄不止。

62101　独圣散

【方源】方出《证类本草》卷七引《经验后方》,名见《妇人良方》卷一。

【异名】独胜散(《朱氏集验方》卷十)。

【组成】防风(去芦头,炙赤色)。

【用法】上为末。每服二钱,以面糊、酒调下,更以面糊酒投之。极验。

【主治】①《证类本草》引《经验后方》:崩中。②《校注妇人良方》:肝经有风,血崩。

62102　独圣散

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】苏枋木不拘多少

【用法】上为细散。每服三钱匕,酒调服。

【主治】破伤风。

62103 **独圣散**

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】晚桑叶（微焙）不拘多少

【用法】上为细散。每服三钱匕，冷腊茶调如膏，入麝香少许，夜卧含化咽津，只一服止。后用补肺药。

【主治】吐血。

62104 **独圣散**

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】枫香脂不拘多少

【用法】上为细散。每服一钱匕，煎人参、糯米饮调下，不拘时候。

【主治】虚劳咯血、吐血不止。

62105 **独圣散**

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【组成】黄蜀葵花（炒）一两

【用法】上为细散。每服一钱匕，食前米饮调下。

【主治】沙石淋。

62106 **独圣散**

【方源】《圣济总录》卷一一五。

【组成】灵磁石（有窍子如针眼者）

【用法】上为细散。每服一钱匕，冷水调下。

【主治】汗后耳聋。

62107 **独圣散**

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】黄土（如石者）半两（烧令紫色，细研为末）

【用法】以腻粉一钱匕，药末二钱半拌匀。临卧温酒调下。

【主治】年深痔疾不愈。

62108 **独圣散**

【方源】《景岳全书》卷六十三引钱氏方。

【组成】川山甲（取前足嘴上者，烧存性）

【用法】上为末。每服四五分，以木香汤入少酒服之；紫草汤亦可。

【主治】①《景岳全书》引钱氏方：痘疮倒靥陷伏。②《杨氏家藏方》：小儿疮疱黑陷，或变紫色。

62109 **独圣散**

【方源】《永乐大典》卷一〇三三引《王氏手集》。

【组成】赤芍药

【用法】上为末。食后藕汁入蜜少许调下；桔梗煎汤调下亦得。

【主治】小儿吐血、嗽血，及衄血、下血。

62110 **独圣散**

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】醉芩 生地 川断 白芍 川芎 艾 牡蛎 伏龙肝 当归 黄耆 地榆 甘草 陈皮 熟地

【主治】产后劳伤，经血虚损，或分娩时血去不尽，在于腹中脏腑挟于宿冷，冷则血欲行而或阻，恶露淋沥不绝者。

【方论选录】是方芎、归、芍、生地、熟地、艾、断以补血，黄耆、陈皮、甘草以补气，伏龙肝之温，牡蛎之涩，地榆、醉芩之凉，以止淋沥。产后经血虚损而致者，服之有效。若脏腑挟宿冷者，榆、芩二味恐不宜入。

62111 **独圣散**

《杨氏家藏方》卷十六。为《千金》卷三“独活紫汤”之异名。见该条。

62112 **独圣散**

【方源】《保命集》卷中。

【组成】瓜蒂一两

【用法】上锉，如麻豆大，炒令黄色，为细末。每服三钱，茶一钱，酸齑汁一盏调下。先令病人隔夜不食，服药不吐，再用热韭水投之。

【主治】诸风隔疾，诸痫痰涎，津液涌溢，杂病亦然。

【加减】风痫病者，加全蝎半钱（微炒）；如有虫者，加狗油五七点，雄黄末一钱，甚者加芫花末半钱，立吐其虫出；如湿肿满者，加赤小豆末一钱。

【宜忌】此不可常用，大要辨其虚实。吐罢可服降火利气安神定志之剂。

62113　**独圣散**

【方源】《医学纲目》卷四引子和方。

【组成】砒不拘多少

【用法】上为细末。每服一字，以新水调下，斡开牙关灌之。

【功用】吐痰。

【宜忌】寻常勿用。

62114　**独圣散**

【方源】《妇人良方》卷二十。

【组成】当归

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，煎至七分，温服。

【主治】①《妇人良方》：产后腹痛。②《济阴纲目》：产后血虚腹痛。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作"独圣汤"。

62115　**独圣散**

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】北地蒺藜不拘多少(阴干)

【用法】上为细末。每用刷牙，以热浆水漱牙；外用粗末，熬浆水刷牙。

【主治】一切牙痛风疳。

62116　**独圣散**

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】生白矾

【用法】上为细末。芝麻油调，扫疮破处，不拘时候。

【主治】汤泡破，火烧破，疮毒疼痛。

62117　**独圣散**

《准绳·疡医》卷三引《简易》。为《证类本草》卷十九引《简要济众方》"独胜散"之异名。见该条。

62118　**独圣散**

【方源】《外科精要》卷下。

【异名】独胜散(《外科理例》卷二)。

【组成】香附子(姜汁淹一宿，焙干，研碎)

【用法】每服二钱，白汤调服。

【主治】疮初作，气滞血凝。

【方论选录】本方气味辛散，宜施于形体充实，气郁血凝者。若血虚气弱，阴虚发热者，又当随症制宜，不可以例施也。

62119　**独圣散**

【方源】《直指小儿》卷五。

【异名】独神散(《痘疹金镜录》卷下)。

【组成】穿山甲(汤洗净，炒令焦黄)

【用法】上为末。每服半钱，入麝香少许，南木香煎汤调下；或紫草煎汤，入红酒少许调下。

【主治】①《直指小儿》：痘疹陷入。②《普济方》：疹疮陷入不发，黑色而气欲绝。

62120　**独圣散**

【方源】《内经拾遗》卷二。

【组成】香橼大者一枚，小者二枚(炭火中烧灰存性)

【用法】上为细末。空心酒送下。

【主治】寒疝疼痛。

62121　**独圣散**

【方源】《卫生宝鉴》卷五。

【组成】浮小麦不拘多少(文武火炒令焦)

【用法】上为细末。每服二钱，米饮汤调下。频服为佳。

【主治】盗汗及虚汗不止。

62122　**独圣散**

【方源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】蔓荆子不拘多少

【用法】上为末。每服二钱，食前浓煎葱白汤调下，一日三次。

【主治】妊娠小便不通。

62123　**独圣散**

【方源】《医方类聚》卷八十五引《澹寮》。

【组成】乌梅(烧存性，灰)

【用法】上为末。每服一大钱，空心米饮调下。

【主治】①《医方类聚》引《澹寮》：诸证下血。②《普济方》：大便下血不止，久痢下肠垢，及酒痢。

62124　**独圣散**

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】大北南星（锉开，白者为佳）不拘多少

【用法】上为末。一钱或二钱，醋、蜜调涂囟门上，中间留一小指大不涂，及敷男左女右足心。并以立效饮温蜜水调，点舌上，令其自化尤佳。

【主治】鹅口证。婴孩满口白屑，或如粟谷，糜烂作痛，不能乳食，昼夜烦啼。

62125 独圣散

《得效》卷六。为方出《金匮》卷下，名见《三因》卷十一"盐汤"之异名。见该条。

62126 独圣散

《丹溪心法》卷五。为《幼幼新书》卷十八引茅先生方"独胜散"之异名。见该条。

62127 独圣散

【方源】《普济方》卷三二九引《仁存方》。

【组成】良姜

【用法】上为末。每服三钱，空心、食前浓煎艾汤调下。

【主治】妇人血崩，脐下冷痛。

【加减】老妇人，加大椒一两；脐下冷痛，加五灵脂二两，作丸子服。

62128 独圣散

【方源】《普济方》卷一六三。

【异名】必效散。

【组成】诃子（大者）

【用法】上为末。每服一钱，糯米饮调下。

【功用】定喘。

62129 独圣散

《普济方》卷一八九。即《朱氏集验方》卷七"独胜散"。见该条。

62130 独圣散

《普济方》卷二四二。即《朱氏集验方》卷一"独胜散"。见该条。

62131 独圣散

【方源】《普济方》卷二五一。

【组成】多年壁土 （一方用川白土）

【用法】热汤泡，搅之令浊，少顷，乘热去滓取饮，不醒人事者灌之。

【功用】解附子、河豚、乌头等一切毒药，并解丹毒。

62132 独圣散

《普济方》卷二九六。为《魏氏家藏方》卷七"枯药"之异名。见该条。

62133 独圣散

【方源】《普济方》卷三四二。

【异名】小安胎饮。

【组成】枳壳 缩砂各三两

【用法】上以熨斗盛，炒，去壳，为末。如胎动，热酒调下；不饮酒，煎艾盐汤调服，米饮亦可。仍用罩胎散调服，间服安胎饮。一方去膜炒。

【功用】令子不落，护胎。

【主治】妊娠时气，身大热；或妊娠从高坠下，触动胎气，腹痛下血；兼治崩漏。

62134 独圣散

【方源】《普济方》卷三九〇。

【组成】当归（近尾）半节

【用法】上为末。每服半钱，酒调下，婴儿夜啼，乳汁调下少许。

【主治】小儿头痛，心痛，或夜啼。

62135 独圣散

《普济方》卷三九〇。为方出《千金》卷二十一，名见《普济方》卷二八六"蛇蜕散"之异名。见该条。

62136 独圣散

《袖珍》卷四。即《卫生宝鉴》卷十八"独胜散"。见该条。

62137 独圣散

【方源】《解围元薮》卷三。

【组成】蓖麻子肉二两（碎者不用） 黄连二两

【用法】同贮瓶内，加水浸之，春五、夏三、秋七、冬九日取出，每晨朝东南方，以瓶中水一钟，吞蓖麻一粒，渐加至四五粒，若微泄无妨。如手指、足趾节间肿痛，诸病即愈。

【主治】鼓槌风，手指挛，瘸足，趾肿烂脱落，腿肘曲折，肿痛难忍。

【宜忌】戒食动风辛辣毒物。

62138 **独圣散**

【方源】《医统》卷九。

【组成】蝉退(净)五钱

【用法】上为末。用好酒一盏,煎滚服之。

【主治】破伤风,五七日未愈,以至角弓反张,牙关紧急者。

62139 **独圣散**

【方源】《医统》卷八十五。

【组成】砂仁不拘多少(带皮同炒,勿令焦黑,去皮取仁)

【用法】上为末。熟酒调服;不饮酒者,米汤调下。

【功用】《简明医彀》:安胎易产。

【主治】妊娠有所伤触,激动胎元,腹痛下血。

62140 **独圣散**

【方源】《痘疹全书》卷上。

【组成】苦参

【用法】上为细末。吹喉间。

【主治】痘疹,喉痹咽痛。

62141 **独圣散**

【方源】《准绳·类方》卷五。

【组成】瓜蒂　郁金各等分

【用法】上为细末。每服一钱或二钱,韭汁调下,用鸡翎探吐。后服愈风饼子。

【主治】眩晕。

62142 **独圣散**

《景岳全书》卷六十一。为《杨氏家藏方》卷十六"安胎散"之异名。见该条。

62143 **独圣散**

【方源】《医方集解》。

【组成】白及

【用法】上为末。每服二钱,临卧糯米汤调下。

【主治】多年咳嗽,肺痿,咯血红痰。

【方论选录】此手太阴药也。人之五脏,惟肺叶坏烂者可以复生。白及苦辛收涩,得秋金之令,能补肺止血,故治肺损红痰。又能蚀败疽死肌,为去腐生新之圣药。

62144 **独圣散**

《麻科活人》卷二。为《准绳·幼科》卷六"柽叶散"之异名。见该条。

62145 **独圣散**

【方源】《金鉴》卷三十。

【组成】南山楂肉(炒)一两

【用法】水煎,用童便沙糖和服。

【主治】产后心腹绞痛欲死,或血迷心窍,不省人事。

【方论选录】山楂不惟消食健脾,功能破瘀止儿枕痛;更益以沙糖之甘,逐恶而不伤脾;童便之咸,入胞而不凉下。相得相须,功力甚伟。

62146 **独圣散**

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】净嫩香片十斤

【用法】将桑柴灰滤汁一缸,用汁煮片香一百沸,倾入清水缸内,拔去苦水,俟坚硬方止,复用灰汁约煮十余次,以苦涩之味尽为度,阴干,研成极细末。每日服七八钱,茶水或粥调下。

【主治】大麻风。

【宜忌】切戒房劳及一切动气生湿有毒之物。

62147 **独圣散**

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】川乌(重八钱者)一枚

【用法】上为末。每服二钱,用葱头七个,酒一碗,煎浓服。或服一钱,先用洗浴药方洗浴,然后服药,取汗。

【主治】鼓槌风。

【宜忌】避风。

【备考】洗浴药方:防风、马鞭草、苦参、金银花、荆芥、遍地香、紫苏、天花粉、泽兰,煎汤洗浴,务须四围周密,不可透风要紧。

62148 **独圣散**

【方源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】水龙骨(炒干)

【用法】上为末。麻油调敷。

【主治】臁疮,妇人裙边疮。

62149 **独圣散**

【方源】《疡科纲要》卷下。

【组成】急性子

【用法】上为末。和入五温丹中,热陈酒调敷患处,外用温煦薄贴盖之,或调入温煦薄贴,作厚膏药贴。

【功用】消坚肿,定痠痛阴寒之症。

62150 **独圣膏**

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】牛皮胶不拘多少(锉碎)

【用法】加少水,熬令稀稠得所如膏,摊在纸上,贴患处。次用软白布二条,子酽米醋内煮令热,更互滤出于胶纸上,乘热蒸熨。若疮痒时,乃是药攻其病,须是忍痒,不住蒸熨,直候脓出将尽,即浓煎贯众汤,放温,洗去胶纸。次日若疮中尚有脓出,再如前法追令脓出尽。连数日蒸熨不妨,疮干为度,次用红玉散。

【主治】发背。

62151 **独圣膏**

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】炉甘石(煅)

【用法】以猪骨髓油调搽。先以防风、荆芥、银花、甘草汤洗净,后敷药。

【主治】臁疮。

62152 **独芎散**

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】大芎䓖不拘多少(锉,新瓦慢火炒令紫色,熟)

【用法】上为细末。每服二钱,以水一盏,入木贼草(去根节,锉细)一撮许,同煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】血崩久不止,百药不效者。

62153 **独行丸**

《景岳全书》卷五十五引易老方。为《金匮》卷下"三物备急丸"之异名。见该条。

62154 **独行丸**

《丹溪心法》卷五。即《云岐子保命集》卷下"独行散"改为丸剂。见该条。

62155 **独行散**

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【异名】独得散(《良方汇选》卷上)。

【组成】五灵脂(半生半炒)二两

【用法】上为细末。每服二钱,温酒调下;口噤者,拗开口灌之。

【主治】①《云岐子保命集》:产后血晕,昏迷不省,冲心闷绝。②《丹溪心法》:妇人产后血冲心动,及男子血气心腹痛。

【宜忌】《丹溪心法》:有孕者忌服。

【备考】本方改为丸剂,名"独行丸"(见《丹溪心法》)。

62156 **独行散**

【方源】《得效》卷十三。

【组成】槐花(炒香熟)

【用法】二更后床上仰卧,随意服。

【主治】失音,咯血。

62157 **独行散**

《本草纲目》卷十四。为《妇人良方》卷十九引华佗方"愈风散"之异名。见该条。

62158 **独羊饭**

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】鲜羊蹄根叶一斤

【用法】煮烂食之。

【主治】肠痔下血。

62159 **独连丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】鸡爪黄连(去须)四两(米醋一升,于研钵内熬尽,取出晒干)

【用法】上为细末,米醋煮面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,温开水送下,不拘时候。

【主治】消渴。

62160 **独连丸**

《普济方》卷一七七引《神效方》。为《活人书》卷十八"酒蒸黄连丸"之异名。见该条。

62161 **独连丸**

【方源】《普济方》卷二一五。

【异名】大脏丸(《赤水玄珠》卷九)、脏连丸

（《医学六要·治法汇》卷一）。

【组成】黄连末四两（或五两）

【用法】于猪大肠头内煮熟，去肠，将药末用糕并米饮汤为丸，如梧桐子大。空心米汤送下。

【主治】①《普济方》：血淋下血。②《赤水玄珠》：肠风下血及痔疾。

【备考】《赤水玄珠》本方用法：每服百丸。

62162　**独步散**

【方源】《本草纲目》卷十四引《方外奇方》。

【组成】香附米（醋浸略炒，为末）　高良姜（酒洗七次，略炒，为末）

【用法】上各封收。用时和匀，以热米汤加生姜汁一匙，盐一捻，调下。

【主治】心脾气痛，胃脘有滞，胸膛软处一点痛，因气及寒起，或致终身。

【加减】因寒者，加生姜二钱，附子一钱；因气者，加附子二钱，生姜一钱；因气与寒者，各等分。

62163　**独步散**

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】紫色香附三钱

【用法】上为末。热黄酒送下。

【主治】心腹暴痛不可忍。

62164　**独附方**

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】附子（童便制）五钱

【用法】以水一钟，加灯心七根，水煎服。

【主治】痘疮寒战。

62165　**独附散**

《普济方》卷六十一。为《朱氏集验方》卷九“独附煎”之异名。见该条。

62166　**独附散**

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】附子一个（炮，去皮脐）

【用法】上为末。三岁每服一小钱，以水半盏，加生姜汁一蚬壳，大枣半枚，煎三分以下，水中顿冷，饥服。

【主治】小儿吐泻气脱，四肢冷，肚疼眼慢。

62167　**独附煎**

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【异名】独附散（《普济方》卷六十一）。

【组成】附子一支（切成片）

【用法】蜜炙黄，咽甘味送下。

【主治】①《朱氏集验方》：脏寒咽闭，六脉微弱。②《普济方》：喉痹。

62168　**独妙丹**

【方源】《梅氏验方新编》卷二。

【组成】毛脚芹（捣烂）

【用法】涂臂大肉上，男左女右，用蚬子壳盖定，以帛扎牢。起小泡即愈。

【主治】黄疸。

【宜忌】忌食发物大荤一月。

62169　**独妙丹**

【方源】《梅氏验方新编》卷二。

【组成】茵陈蒿

【用法】或作菜，或作羹，或蒸米麦饭，日日食之。或用鲜者细切，干者研末，煮生姜汤食之。

【主治】黄疸。

62170　**独妙散**

【方源】方出《奇方类编》卷下，名见《仙拈集》卷三。

【组成】生螃蟹壳

【用法】瓦上焙焦，为末。每服二钱，黄酒冲服。以消为度。

【主治】乳岩，乳中初起一粒如豆，渐至如蛋，七八年必破，破则难治。

62171　**独枣丹**

【方源】《慈幼新书》卷七。

【组成】干红枣一枚　雄黄（米大）一块（入枣肉内烧存性，研末）

【用法】米泔煎汤，入盐少许，漱口，用本方擦之。

【主治】麻疹后，牙龈溃烂，肉腐出血。

62172　**独枣汤**

【方源】《直指》卷十五。

【组成】大好枣一枚（擘开）　轻粉半钱

【用法】上将轻粉放大枣内，以麻线扎缚，慢火煮熟，嚼细，以枣汁送下。

【主治】①《直指》：大便积日不通。②《普济方》：大便秘结，积热不通。

62173 **独虎散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】五倍子不拘多少（炒令黄裂）

【用法】上㕮咀。每用二两，以水五碗，煎汤乘热熏，候通手淋洗，拭干，次用二白散汤，须旋旋乘热添用。

【主治】痔疾。

62174 **独虎散**

【方源】《直指》卷十四。

【组成】五倍子半两（末） 井水三碗

【用法】入瓷瓶内慢火煎半，续人朴消、荆芥穗各一钱，乘热熏洗，仍以五倍子末敷之。

【主治】脱肛不收。

62175 **独参丸**

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】苦参不拘多少

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，薄荷汤送下。

【主治】狂邪发作无时，披头大叫，不避水火。

62176 **独参汤**

《内经拾遗》卷一。为《百一》卷七“破证夺命丹”之异名。见该条。

62177 **独参汤**

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《劳证十药神书》。

【异名】人参汤（《十药神书》周杨俊注）。

【组成】大人参二两（去芦）

【用法】上㕮咀。以水二盏，加大枣五枚，煎至一盏，细呷之。服后熟睡一觉，后服诸药除根。

【功用】劳证止血后，用此药补之。

【主治】大汗大下之后，及吐血、血崩、血晕诸症。

【宜忌】咳嗽去之。

【方论选录】陈修园：失血之后，脏阴太虚，阴虚则不能维阳，阳亦随脱，故用人参二两，任专力大，可以顷刻奏功。但人参虽有补虚之功，而咳嗽者忌之。乘此大血甫止之际，咳嗽未作，急急饮之。若得熟睡一夜，则血从心脏而生。

62178 **独参汤**

【方源】《校注妇人良方》卷三。

【组成】好人参二两或三、四两 炮姜五钱。

【用法】水煎，徐徐服。如不应，急加炮附子。

【主治】元气虚弱，恶寒发热，或作渴烦躁，痰喘气促；或气虚卒中，不语口噤；或痰涎上涌，手足逆冷；或难产，产后不省，喘息。

62179 **独参汤**

【方源】《保婴撮要》卷十七。

【组成】好人参一两 生姜五片 大枣五枚

【用法】上以水二钟，煎八分，徐徐温服，婴儿乳母亦服。

【主治】①《保婴撮要》：阳气虚弱，痘疮不起发，不红活，或脓清不满，或结痂迟缓，或痘疮色白，或嫩软不固，或脓水不干，或时作痒，或畏风寒。②《外科枢要》：失血或脓水出多，血气俱虚，恶寒发热，作渴烦躁。

62180 **独参汤**

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】人参三两 附子三分

【用法】煎汤灌之。

【主治】久痢之后，下多亡阴，阴虚而阳暴绝，一旦昏仆，手撒眼瞪，小便自遗，汗大出不止，喉作拽锯之声。

62181 **独参汤**

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】白花蛇（焙干，为末）

【用法】上以人参煎汤调服。

【功用】止痒。

【主治】痘痒塌陷。

62182　**独参汤**

【方源】《医钞类编》卷十三。

【组成】人参不拘多少　炒米　煨姜　红枣

【用法】浓煎服。

【功用】急救元阳。

【主治】大惊卒恐,气虚气脱。

62183　**独参汤**

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】高丽参

【用法】浓煎,加姜汁、竹沥冲服。

【主治】喉证,亢阳飞越,痰如拽锯。

62184　**独珍膏**

【方源】《朱氏集验方》卷十二。

【组成】五倍子不拘多少(瓦上焙干)

【用法】上为细末,入数点麻油,冷水调涂。

【主治】软硬疖,诸热毒疱疮。

62185　**独柱汤**

《内经拾遗》卷一。为《百一》卷七"破证夺命丹"之异名。见该条。

62186　**独香汤**

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】南木香不拘多少

【用法】上为细末,瓜蒌子煎汤调下。

【主治】气中。目不开,四肢不收,昏沉。

【备考】本方方名,《医方类聚》引作"独香散"。

62187　**独香散**

《医方类聚》卷八十八。即《朱氏集验方》卷一"独香汤"。见该条。

62188　**独胜丸**

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】黄柏八两(人乳拌匀,酒浸晒干,再用盐水炒褐色,去皮)

【用法】上为末,水糊为丸,如梧桐子大。每服一百丸,空心盐汤送下。

【主治】耳鸣,耳聋。

62189　**独胜丹**

【方源】《玉钥》卷上。

【异名】独胜散(《喉证指南》卷四)。

【组成】白茄蒂不拘多少　冰片少许

【用法】阴干,瓦上炙燥,为细末,加冰片少许,收固。吹患处。

【主治】一切牙疳,穿腮破唇。

62190　**独胜汤**

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】附子大者一枚(炮裂,去皮脐)

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盏,加生姜三片,大枣一枚(擘),同煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后气虚,头痛不可忍。

62191　**独胜散**

【方源】《普济方》卷一七七引《肘后方》。

【组成】萝卜(出子者)三枚

【用法】洗净薄切,晒干为末。每服二钱,食后、夜卧煎猪肉澄清调下,一日三次。

【主治】消渴。

62192　**独胜散**

【方源】《证类本草》卷十九引《简要济众方》。

【异名】独圣散(《准绳·疡医》卷三引《简易》)、白丁香散(《外科精义》卷十九)、白丁散(《东医宝鉴·外形篇》卷三引《医鉴》)。

【组成】白丁香半两

【用法】上为散。每服一钱匕,温酒调下,不拘时候。

【功用】《外科精义》:下乳汁,通血脉。

【主治】①《证类本草》引《简要济众方》:吹乳。②《外科精义》:吹乳初觉,身热头痛寒热,胸乳肿硬。

62193　**独胜散**

【方源】《圣济总录》卷八十一。

【组成】绿豆粉三两

【用法】银石器内慢火炒令黑色,研为细散。水调成膏,摊绢帛上,贴痛处。后服趁痛丸。

【功用】止疼痛。

【主治】脚气。

62194 **独胜散**

【方源】《幼幼新书》卷十八引茅先生方。

【异名】独圣散(《丹溪心法》卷五)、牛蒡僵蚕散(《普济方》卷四〇三)、牛蚕散(《医学入门》卷八)。

【组成】牛蒡子半两　白僵蚕一分

【用法】上为末。每服一大钱,水六分盏,加紫草二七寸,同煎四分,连进三服,其痘便出。

【主治】①《幼幼新书》引茅先生方:小儿发疹痘。疮疹与伤寒类,头痛憎寒壮热,疑似痫。②《丹溪心法》:小儿发疮,早微热,晚大热,目黄胁动,手冷,发甚如惊者。

62195 **独胜散**

【方源】《普济方》卷九十三引《海上名方》。

【组成】蓬莪术(醋煮)不拘多少

【用法】上为细末。每服二钱,温酒送下,每日三至五次,不拘时候。服三日后,再用淋渫药。

【主治】瘫痪,不经针灸者。

62196 **独胜散**

【方源】《普济方》卷二十引《家藏经验方》。

【组成】生姜不拘多少

【用法】和皮切作片,拌生面,令片上沾粘饱足,晒,或焙令干,称五两,加炙甘草半两,和匀,为细末。白汤调下,不拘时候。频服有效。

【主治】脾寒气滞,疼痛不堪,胸膈痞闷,呕哕恶心,不思饮食。

62197 **独胜散**

【方源】《普济方》卷二九九引《简易》。

【组成】缩砂仁不拘多少　(一方用壳)

【用法】火煅为末。掺疮处。

【主治】口疮。

62198 **独胜散**

【方源】《直指》卷二十五。

【组成】大甘草节(以真麻油浸,年岁愈多愈妙)

【用法】取甘草嚼,或水煎服。

【功用】解药毒、蛊毒、虫蛇诸毒。

62199 **独胜散**

【方源】《朱氏集验方》卷四引大理孙评事传方。

【组成】川独活(用巴豆炒,去巴豆)

【用法】上为细末。煮精猪肉蘸药服。

【主治】水气肿胀。

62200 **独胜散**

【方源】《朱氏集验方》卷七引广西计议何清方。

【组成】镜面草(又名螺靥草)

【用法】水洗擂烂,入酒、滤去滓,取汁服。

【主治】鼻衄。

【备考】本方方名,《普济方》引作"独圣散"。

62201 **独胜散**

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】平胃散加紫苏梗

【用法】上为细末。同煎,通口服。

【主治】干湿脚气。

【备考】本方方名,《普济方》引作"独圣散"。

62202 **独胜散**

《朱氏集验方》卷十。为方出《证类本草》卷七引《经验后方》,名见《妇人良方》卷一"独圣散"之异名。见该条。

62203 **独胜散**

【方源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】黄葵子四十粒

【用法】或墨或朱砂为衣。无灰酒送下。

【主治】难产。

【备考】本方方名,《袖珍》引作"独圣散"。

62204 **独胜散**

《普济方》卷一一二。为《圣惠》卷二十二"葱白熨方"之异名。见该条。

62205 **独胜散**

【方源】《普济方》卷二七八。

【组成】川芎五钱

【用法】上为细末。捣萝卜汁调服。

【主治】腿上赤肿疼痛,渐次移下。

62206　独胜散

【方源】《普济方》卷三八七。

【组成】天花粉不拘多少

【用法】上为细末。每服一钱，蜜汤调下，不拘时候。

【主治】小儿久嗽，咯唾鲜血。

62207　独胜散

《外科理例》卷二。为《外科精要》卷下"独圣散"之异名。见该条。

62208　独胜散

《解围元薮》卷三。为原书同卷"神守散"之异名。见该条。

62209　独胜散

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】五倍子

【用法】上为末。津唾调，填满脐中，以绢帛缚定。一宿即止。或加枯矾末尤妙。

【主治】自汗盗汗。

62210　独胜散

【方源】《金鉴》卷六十四。

【组成】芥菜花一味（研细）

【用法】醋调敷患处。

【功用】止痒消肿。

【主治】①《金鉴》：钮扣风。②《疡科遗编》：瘰疬。

62211　独胜散

【方源】《集验良方》卷一。

【组成】土牛膝　臭花娘根（粗者）各一两许

【用法】勿经水，勿犯铁器，折断，捣自然汁，加米醋少许，蘸鸡翅毛上，频搅喉中，取出毒涎，以通其气，然后吹入应用之药。

【主治】烂喉痧，缠喉风，锁喉，双乳蛾。

62212　独胜散

《喉证指南》卷四。为《玉钥》卷上"独胜丹"之异名。见该条。

62213　独胜膏

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】独蒜

【用法】六月捣膏，日中晒热，于遇冬所发处擦之，一日三次。

【主治】冻风冻跟，冻耳，每逢冬寒则发。

【宜忌】忌下汤水。

62214　独胜膏

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】蓖麻仁十四粒（去壳）

【用法】捣如泥，涂两足心，立刻即下，急洗去；不去，子肠即出。如出，仍以此膏涂顶心，肠即缩回，急去之。

【功用】催生。

【主治】难产胎死，胞衣不下。

62215　独炼硫

【方源】《疡科纲要》卷下。

【组成】明净硫黄

【用法】入铁锅，文火熔化，倾入盐卤中，凝定取出，再熔再淬数十次，俟硫色深紫为度，为细末。熬鸡子黄成油调敷。先须洗涤净，挹干敷药，每日一洗，再敷。

【主治】疥疮湿疮痒者。

62216　独活丸

【方源】《圣惠》卷三十四。

【组成】独活　防风（去芦头）　芎䓖　细辛　当归　沉香　生干地黄各一两　鸡舌香　零陵香　川升麻　甘草（炙微赤，锉）各半两

【用法】上为末，以蜡化为丸，如豇豆大。绵裹常含一丸，咽津。

【主治】牙齿历蠹，齿根暗黑。

【备考】方中生干地黄，《圣济总录》作"黄芩"。

62217　独活丸

【方源】《圣惠》卷六十五。

【组成】独活二两　苍耳子二两　羌活一两　五味子一两　菟丝子一两（酒浸三日，晒干，别捣）　山茱萸一两　防风一两（去芦头）　白花蛇肉一两（酥炒令黄）　黄耆一两（锉）　白蒺藜二两（微炒，去刺）

【用法】上为末，白粱米饭为丸，如梧桐子

大。每服三十丸，空心及晚卧时以温酒送下；枣汤送下亦得。

【主治】风毒攻皮肤，生疮癣，顽麻不知痛痒。

62218 **独活丸**

【方源】《博济》卷三。

【组成】独活　川芎　甘菊各一两　干蝎一分（炒）　防风一两　半夏（汤洗去滑，作饼子，炙）二两

【用法】上为末，以半夏末用生姜自然汁一大盏煮膏为丸，如豌豆大。每服七丸至十丸，荆芥、薄荷汤送下。

【功用】利膈化痰。

【主治】风毒气上攻，头目疼痛，昏眩不快。

62219 **独活丸**

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】独活（去芦头）　黄耆（锉）各二两　桂（去粗皮）　巴戟天（去心）各一两半　南木香　人参　枳壳（去瓤，麸炒）　泽泻　白茯苓（去黑皮）　龙齿各三分　天雄（炮裂，去皮脐）　白蒺藜（炒，去角）各一两　芍药（炒）半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，荆芥酒送下。

【主治】脾脏中风，四肢缓弱，志意恍惚。

62220 **独活丸**

【方源】《圣济总录》卷十一。

【异名】枳实丸。

【组成】独活（去芦头）　天门冬（去心，焙）　防风（去叉）　蒺藜子（炒，去角）　桔梗（去芦头，炒）各一两一分　薏苡仁（炒）　黄连（去须）各一两　桂（去粗皮）半两　枳实（去瓤，麸炒）一两半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、临卧菊花汤送下。

【主治】风瘾疹，瘖瘟肿起，时痒时痛；风热，头面身体，瘙痒瘾疹。

62221 **独活丸**

【方源】《圣济总录》卷十四。

【组成】独活（去芦头）三分　防风（去叉）　白茯苓（去黑皮）各半两　阿胶（炙令燥）　石膏（碎研）各三分　玳瑁（镑）一两　人参一两半　甘草（炙，锉）半两　天南星（炮）一两　细辛（去苗叶）半两　丹砂（研）二两　白僵蚕（炒）半两　丁香一分　琥珀（捣，研）一两　牛黄（研）　麝香（研）各一分　天麻　龙脑（研）各半两

【用法】上为末，再同研匀，别用安息香二两半（捣碎），以酒一升，研滤去滓，于银器内慢火熬成膏，和前药为丸，如鸡头子大。每服一丸，甚者加一丸，细嚼，薄荷茶送下，不拘时候。

【主治】风惊邪及一切风，肢节不利，筋脉拘急，头目旋痛，恍惚心忪。

62222 **独活丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】独活（去芦头）二两　旋复花（去土）半两　牵牛子（微炒）半两　天南星（炮）半两　藁本（去苗土）半两　天麻二两　芎䓖二两　细辛（去苗叶）半两　菊花一两

【用法】上为细末，生姜汁煮糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后荆芥汤送下。

【主治】肝脏受风，胸膈痰饮，头目俱痛，渐生翳障。

62223 **独活丸**

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】独活（去芦头）　防风（去叉）　黄芩（去黑心）　零陵香　芎䓖　细辛（去苗叶）　当归（切，焙）各半两　沉香（锉）　鸡舌香　升麻　甘草（炙，锉）各一两

【用法】上为末，熔蜡为丸，如小豆大。用绵裹一粒，于痛处含化咽津，消尽即再用。

【主治】齿䶥龈肿，脓出疼痛。

62224 **独活丸**

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】独活（去芦头，为末）半两　黄蜡五两（于银器中熔成汁）　生姜半斤（取自然汁）

【用法】上先以生姜汁入蜡中同熬，候生姜汁尽为度，次入独活末令匀，为丸如梧桐子大。每服四十丸，以浓陈米饮送下，空心、临卧服。

【主治】肠风泻血不止。

62225　**独活丸**

【方源】《普济方》卷一一六引《治风经验方》。

【组成】独活　防风　五加皮　白菊花　丹参各十分　木香　槟榔五分　薏苡仁十二分　黑参五分　大黄三分（炒）　生干地黄八分　磁石（烧红，入醋淬五七次，捣研，飞）五分

【用法】上为末，入磁石拌匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，加至三十丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】风退后，但手足重，运动不稳者。

【加减】寒则加桂枝八分，而不得用大黄。

【备考】方中木香用量原缺。

62226　**独活丹**

《三因》卷二。为《外台》卷十四引《古今录验》"独活汤"之异名。见该条。

62227　**独活汤**

【方源】《外台》卷十七引《集验方》。

【组成】独活三两　生姜六两　干地黄五两　芍药四两　防风三两　桂心三两　栝楼三两　甘草二两（炙）　麻黄二两（去节）　干葛三两

【用法】上切。以水八升，酒二升，煎取三升，分三次服。不愈，重作。

【主治】风湿客于腰，令人腰痛。

【宜忌】忌海藻、生葱、菘菜、芜荑。

62228　**独活汤**

【方源】《医心方》卷二十三引《产经》。

【组成】独活　当归　常陆　白术各二两

【用法】上以水一斗，煮取四升服。覆取汗。

【主治】产后诸风，肿气百病。

62229　**独活汤**

【方源】《医心方》卷二十三引《产经》。

【异名】独活散（《圣惠》卷六十九）。

【组成】独活三两　防风二两　干姜二两　桂心二两　甘草二两　当归二两

【用法】上以清酒三升，水七升，合煮取二升半，分三次服。

【主治】①《医心方》引《产经》：产后中风口噤。②《圣惠》：妇人中风，口噤不识人。

62230　**独活汤**

【方源】《医心方》卷二十三引《产经》。

【组成】羌独活三两　葛根三两　甘草二两（炙）　麻黄一两　桂心三两　生姜六两　芍药三两　干地黄二两　（一方无芍药）

【用法】上以清酒二升，水八升，煮三升，分五次服。

【主治】产后中柔风，身体疼痛。

62231　**独活汤**

【方源】《外台》卷十四引《古今录验》。

【异名】桂心散（《普济方》卷九十四）。

【组成】独活四两　生葛根半斤　芍药三两　防风二两　半夏一斤（洗）　桂心五两　当归　附子（炮）　甘草（炙）各二两　生姜十两　（一方去半夏，用麻黄三两）

【用法】上切。以水一斗五升，煮取三升，每服一升，一日三次。

【主治】①《外台》引《古今录验》：中风，半身不遂，口不能语。②《圣济总录》：风䄂曳，肢体不能收摄。

【宜忌】忌羊肉、饧、生葱、海藻、菘菜、猪肉、冷水等。

62232　**独活汤**

【方源】《外台》卷十四引《古今录验》。

【异名】独活丹（《三因》卷二）。

【组成】独活四两　生姜六两　甘草（炙）　桂心　生葛根　芍药　栝楼各二两

【用法】上㕮咀。以水五升，煮取三升。每服一升，一日三次。

【主治】①《外台》引《古今录验》：风懿不能言，四肢不收，手足䄂曳。②《张氏医通》：风懿。奄忽不知人，咽中闭塞不能言。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱。

62233 **独活汤**

【方源】《千金》卷三。

【异名】独活散(《圣惠》卷七十八)。

【组成】独活五两 防风 秦艽 桂心 白术 甘草 当归 附子各二两 葛根三两 生姜五两 防已一两

【用法】上㕮咀。以水一斗二升，煮取三升，去滓，分三次服。

【主治】①《千金》：产后中风，口噤不能言。②《圣惠》：产后角弓反张，手足硬强，顽痹不仁。

62234 **独活汤**

【方源】《千金》卷三。

【组成】独活 当归 桂心 芍药 生姜各三两 甘草二两 大枣二十枚

【用法】上㕮咀。以水八升，煮取三升，去滓，分三次服，服后相去如人行十里久再进之。

【主治】产后腹痛，引腰背拘急痛。

62235 **独活汤**

《千金》卷七。为《外台》卷十四注文引《范注方》"独活葛根汤"之异名。见该条。

62236 **独活汤**

【方源】《千金》卷七。

【组成】独活四两 当归 防风 茯苓 芍药、黄耆 葛根 人参 甘草各三两 大豆一升 附子一枚 干姜三两

【用法】上㕮咀。以水一斗，清酒二升，合煮取三升，分三次服。

【主治】①《千金》：脚痹。②《张氏医通》：脚痹冷痛，不可屈伸。

【备考】《圣济总录》有桂，无葛根。

62237 **独活汤**

【方源】《外台》卷十九引《崔氏方》。

【组成】独活三两 生石斛三两 白术一两 防风一两半 茯苓四两 白前一两 羚羊角二两(屑) 芎䓖二两 桑根白皮二两 黄芩三两 附子一两(炮) 生姜三两 桂心一两 防已一两

【用法】上切。以水九升，煮取二升五合，去滓，分三次服，相去十里久再服。隔四日一剂，宜服二剂佳。

【主治】脚气。

【宜忌】慎生冷、酢滑、猪、鱼、蒜、桃、李、雀肉、生葱。

62238 **独活汤**

【方源】《千金翼》卷十七。

【组成】独活 桂心 半夏(洗)各四两 麻黄(去节) 芎䓖 人参 茯苓各二两 八角附子一枚(炮，去皮) 大枣十二枚(擘) 防风 芍药 当归 黄耆 干姜 甘草(炙)各三两

【用法】上㕮咀。以水一斗五升，酒二升，煮取三升半，分为五次服。

【主治】脚气风疼，痹不仁，脚中沉重，行止不随，气上。

62239 **独活汤**

【方源】《经效产宝》卷中。

【异名】独活干姜汤(《普济方》卷三五〇)。

【组成】独活四分 干姜六分 甘草二分 生姜六分

【用法】上以水二大升，煎取一大升，分为两服。

【主治】①《经效产宝》：产后中风，口噤，不任大小。②《普济方》：产后中风，身体强直，角弓反张，重者名为蓐风。

62240 **独活汤**

【方源】《幼幼新书》卷十一引《婴孺》。

【组成】独活 麻黄(去节) 人参各二分 大黄四分

【用法】上以水二升，煮麻黄，减三合，去沫，纳诸药，煎九合，分三次服。

【主治】小儿痫，手足掣瘲，十指颤，舌强。

62241 **独活汤**

【方源】《脚气治法总要》卷下。

【组成】独活 丹参 细辛 五加皮 牛膝(酒浸) 川芎 白僵蚕(汤洗，焙干，面炒)

各半两　桑白皮一两半(锉)　炙麻黄(去节)一两　甘草(炙)三分　杏仁(去皮尖,面炒)三分

【用法】上为散。每服三钱,以水一盏半,煎至七分,去滓温服。

【主治】脚气。腿膝疼痛,乍肿乍瘦,缓弱不能行,喘满气逆。

62242　独活汤

《证类本草》卷六。即《外台》卷三十四引《小品方》:"一物独活汤"。见该条。

62243　独活汤

【方源】《圣济总录》卷五。

【异名】防风独活汤(《普济方》卷九十六)。

【组成】独活(去芦头)三两　防风(去叉)　芎䓖　白茯苓(去黑皮)　当归(切,焙)　葛根　桂(去粗皮)各二两　麻黄(去根节,先煎掠去沫,焙)三两　附子(炮裂,去皮脐)　细辛(去苗叶)　甘草(炙)各一两

【用法】上锉,如麻豆大。每服五钱匕,以水一盏半,加生姜五片,煎至八分,去滓,空心、日午、夜卧温服。

【主治】①《圣济总录》:风中五脏,奄忽不能言,四肢垂曳,皮肉痛痹,痛痒不知。②《普济方》:偏风。半身不遂,肌肉偏枯。

【加减】若初得病自汗,减麻黄;宿有滞气,加吴茱萸(汤洗七遍,炒)二两,厚朴(去粗皮,姜汁炙)一两;干呕,加附子(炮裂,去脐皮)一两;哕,加陈橘皮(汤浸,去白)二两;若胸中吸吸少气,加大枣(去核)十二枚;心下惊悸,加茯苓(去黑皮)一两;若热,去生姜,加葛根。

62244　独活汤

《圣济总录》卷五。为《圣惠》卷五"独活散"之异名。见该条。

62245　独活汤

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】独活(去芦头)　生葛根(去皮,细锉,如麻豆大)各二两　甘草(炙)一两半　桂(去粗皮)　芍药各一两

【用法】上五味,将四味为粗末,与葛根拌匀。每服五钱匕,水一盏半,加生姜五片,煎至八分,去滓温服,日三夜一。

【主治】①《圣济总录》:风癔。舌强不语,昏冒不知人,喉中作声。②《普济方》:四肢不收,手足亸曳。

62246　独活汤

【方源】《圣济总录》卷九。

【组成】独活(去芦头)二两　芍药二两　远志(去心)一两半　薏苡仁(炒)半升　甘草(炙,锉)二两　麻黄(去节,煎掠去沫,焙)一两　丹参二两　陈橘皮(汤浸,去白,焙)一两半　熟干地黄(焙)三两　桂(去粗皮)一两　甘菊花半升(未开者良,微炒)　人参　防风(去叉)　茯神(去木)　山茱萸　天门冬(去心,焙)　厚朴(去粗皮,生姜汁炙,锉)　牛膝(去苗,酒浸,切,焙)　五加皮(锉)　羚羊角(镑)　麦门冬(去心,焙)　山芋　白术　秦艽(去苗土)　黄耆(锉)　芎䓖各二两　附子(炮裂,去皮脐)一两半　石膏三两　升麻二两　防己二两　地骨皮二两　石斛(去根)二两

【用法】上锉如麻豆大。每用十钱匕,以水三盏,加生姜十片,煎取一盏半,去滓,分温二服,空心、临卧各一次。取微有汗,慎外风。若心中热者,每日平旦、临卧服此汤,午时服荆沥汤。

【主治】偏风。半身不随,肌肉偏枯。

62247　独活汤

《圣济总录》卷九。为《千金》卷八"独活煮散"之异名。见该条。

62248　独活汤

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】独活(去芦头)一分　黄耆(锉)半两　防风(去叉)　茯神(去木)　桂(去粗皮)　白鲜皮　羚羊角(镑)各一分　酸枣仁(炒)半两　桃仁(去皮尖双仁,炒)一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,以水一盏半,煎至一盏,去滓温服,空心、日午、夜卧各

一次。

【主治】风腰脚，疼痛不可忍，足胫痛痹。

62249 独活汤

【方源】《圣济总录》卷十一。

【组成】独活（去芦头） 防风（去叉） 赤茯苓（去黑皮） 防己 赤芍药 桂（去粗皮）各二两 芎䓖 当归（切，焙） 白术各一两半 人参 秦艽（去苗土） 麻黄（去根节） 细辛（去苗叶）各半两 甘草（炙）一两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜一枣大（拍碎），大枣二枚（擘破），同煎取七分，去滓温服，日二次，夜一次。

【主治】风腲腿。四肢不收，身面浮肿，筋骨怠惰，皮肤不仁。

62250 独活汤

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】独活（去芦头） 羌活（去芦头） 防风（去叉） 柴胡（去苗） 白术 甘草（炙，锉） 麻黄（去根节，煎掠去沫，焙干）各一两 甘菊花半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，加荆芥五穗，同煎取七分，去滓，食后温服。

【主治】风热上攻，头面生疮及肿痛。

62251 独活汤

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】独活（去芦头） 人参 白茯苓（去黑皮） 当归（切，焙）各二两 桂（去粗皮） 远志（去心） 熟干地黄（焙） 防风（去叉）各一两半 细辛（去苗叶） 甘草（炙）各一两

【用法】上细锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎取八分，去滓温服，一日二次，不拘时候。

【主治】风厥。肩背痛，惊惕不安，善噫多欠。

62252 独活汤

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】独活（去芦头） 茯神（去木）各半两 甘草（炙） 当归（酒洒，切，焙） 牡蛎（煅） 白术 附子（炮裂，去皮脐） 肉苁蓉（酒浸，切，焙）各一两 黄耆（薄切）一两半 防风（去叉） 远志（去心）三分 人参二两半

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，以水一盏半，加生姜三片，大枣一枚（去核），煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】风头眩，仆倒屋转，呕吐痰涎，恶闻人声。

【备考】方中防风用量原缺。

62253 独活汤

【方源】《圣济总录》卷三十三。

【组成】独活（去芦头）一两 防风（去叉）三分 五加皮二分 附子（炮裂，去皮脐）二两 芍药一两 干姜（炮裂）一两 桂（去粗皮）一两 牛膝（去苗，酒浸，切，焙）一两 杜仲（去粗皮，炙，锉）一两 五味子（炒）三分

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，用水一盏半，煎至七分，去滓，食前温服。

【主治】伤寒后，风虚邪气流注，腰胯冷疼，脚膝无力。

62254 独活汤

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】独活（去芦头） 萆薢 细辛（去苗叶） 人参 牛膝（去苗，切，酒浸，焙） 酸枣仁（微炒） 附子（炮裂，去皮脐） 羚羊角（镑） 赤芍药 黄芩（去黑心） 茵芋（去粗茎） 麻黄（去根节，煎掠去沫，焙） 防己 桂（去粗皮） 甘草（微炙，锉）各一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，以水一盏，加生姜三片，大枣三枚（擘破），煎至五分，去滓，入竹沥一合，煎两沸温服，不拘时候。

【主治】肝气虚弱，风邪外袭，搏于筋脉，流入经络，筋脉抽掣疼痛。

62255 独活汤

【方源】《圣济总录》卷四十二。

【组成】独活（去芦头） 甘菊花（择） 蔓荆实 芎䓖各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏，

加酸枣仁、恶实各五十粒(研碎),同煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】肝风筋脉拘急,背膊劳倦,及头昏项颈紧急疼痛。

62256　独活汤

【方源】《圣济总录》卷五十七。

【组成】独活(去芦头)　人参　白茯苓(去黑皮)　吴茱萸(水浸一宿,炒)　甘草(炙,锉)　干姜(炮裂)　陈橘皮(汤浸去白,焙)　黄耆(锉)　桂(去粗皮)　芍药　芎䓖　防风(去叉)各一两　当归(切,焙)二两

【用法】上为粗末。每服以水二盏,用羊肉二两,先煮至一盏,去肉,下药末三钱匕,加生姜一分(切),大枣二枚(劈破),煎至七分,去滓温服,每日三次。

【主治】心腹冷痛。

62257　独活汤　《圣济总录》卷八十二。为《外台》卷十八引崔氏方"独活犀角汤"之异名。见该条。

62258　独活汤

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】独活(去芦头)　赤茯苓(去黑皮)　麻黄(去根节,炒)　陈橘皮(汤浸去白,炒)各一两半　半夏(汤浸去滑,炒干)三两　槟榔(锉)　射干　桂(去粗皮)　防葵(生用)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,用水一盏,加生姜半分(拍破),同煎至七分,去滓温服。若小便利兼汗即愈。如无防葵,用龙骨代之。

【主治】先有风证,后患脚气,心闷愦愦,惊悸不安,食即呕吐胀满。

62259　独活汤

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】独活(去芦头)一两　麻黄(去根节)　甘草(炙)各半两　桂(去粗皮)　葛根　芍药　栝楼根　防风(去叉)各三分　杜仲(去粗皮,炒)　附子(炮裂,去皮脐)各一两　杏仁(去皮尖,别研)半两　熟干地黄(切,焙)二两

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,以水一盏,煎至六分,去滓,空心、日午、夜卧温服。

【主治】腰痛牵引背脊,不可俯仰;腰脚疼痹不仁,无力。

62260　独活汤

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】独活(去芦头)三分　麻黄(去根节)一两　细辛(去苗叶)半两　丹参　牛膝(酒浸,切,焙)　萆薢　黄耆　桂(去粗皮)各三分　防风(去叉)　附子(炮裂,去皮脐)　赤茯苓(去黑皮)　羚羊角(镑)各一两　当归(切,焙)　芎䓖各半两　赤芍药三分

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,以水一盏,煎七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】腰脚连骨疼痛,摇转不能。

62261　独活汤

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】独活(去芦头)　当归(切,焙)　杏仁(汤浸,去皮尖双仁,炒)　藁本(去苗土)　生干地黄(焙)各一分　甘草(锉,炙)　细辛(去苗叶)各半两

【用法】上为粗末。每用三钱匕,以水一盏,煎十分沸,热漱冷吐。

【主治】风疳。

62262　独活汤　《圣济总录》卷一五〇。为《圣惠》卷二十一"独活散"之异名。见该条。

62263　独活汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】独活(去芦头)一两半　白鲜皮半两　羌活(去芦头)　人参各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,以水七分,酒三分,同煎七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后中风,或虚汗多,困乏,体热头痛。

62264　独活汤

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】独活(去芦头)一两半　枳壳(去瓤,麸炒)　芎䓖　当归(切,焙)各一两　竹沥(半碗)　细辛(去苗叶)　桂(去粗皮)各半

两 防风（去叉） 蔓荆实各一两半

【用法】上将八味为粗末。每服三钱匕，以水一盏半，煎至一盏，加竹沥一合，再煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后中风，口面㖞斜，语涩，筋脉拘急。

62265 独活汤

《圣济总录》卷一六二。为《千金》卷八"独活寄生汤"之异名。见该条。

62266 独活汤

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】独活（去芦头）一两半 当归（锉，炒） 防风（去叉）各三分 麻黄（去根节，煎掠去沫，焙）一两 附子（炮裂，去皮脐）一枚 细辛（去苗叶）半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水、酒共一盏半，同煎一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后中风，角弓反张，口噤发痉。

62267 独活汤

《圣济总录》卷一七四。为《圣惠》卷八十三"独活散"之异名。见该条。

62268 独活汤

【方源】《全生指迷方》卷二。

【组成】独活半两（锉） 荆芥穗一两

【用法】上以水三盏，煎荆芥汁至一大盏，再入独活，煎一半，去滓温服。

【主治】风痓。风客经脉，忽然牙关紧急，手足瘈疭，目直视。

62269 独活汤

【方源】《全生指迷方》卷三。

【组成】独活一两 细辛（去苗）一分 僵蚕（炒）半两 牡丹皮三分 防己半两 紫菀（去苗）一分

【用法】上为散。每服五钱，以水二盏，煎至一盏，去滓温服。

【主治】痫症。阴阳失度，气血相并，素无疾而暴得癫疭，发讫即如常，经隔月日又复如前。

62270 独活汤

《妇人良方》卷十九引《指迷方》。为《千金》卷三"独活紫汤"之异名。见该条。

62271 独活汤

【方源】《本事》卷一。

【组成】独活（黄色如鬼眼者，去芦，洗，焙，称） 羌活（去芦） 防风（去钗股） 人参（去芦） 前胡（去苗，净洗） 细辛（华阴者，去叶） 五味子（拣） 沙参 白茯苓（去皮） 半夏曲 酸枣仁（微炒，去皮，研） 甘草各一两（炙）

【用法】上为粗末。每服四大钱，以水一盏半，加生姜三片，乌梅半个，同煎至八分，去滓服，不拘时候。

【主治】肝经因虚，内受风邪，卧则魂散而不守，状若惊悸。

【方论选录】《本事方释义》：此驱风养正之方也。独活气味苦辛甘平，气味俱薄，浮而升阳也，入足厥阴、少阴，引经之风药，故以之为君；防风气味辛甘温，入手足太阳之风药；细辛气味辛温，气厚于味，阳也，入足厥阴、少阴，引经之药；枣仁气味苦平，入手少阴；前胡气味苦平、微寒，阳中之阴，降也，入手足太阴、阳明之风药，其功长于下气；半夏气味苦辛微温，沉而降，阴中阳也，入足阳明，除痰散逆；五味子气味酸苦咸微温，收敛散逆之气，入足少阴；沙参气味甘苦微寒，能补五脏之阴，入足厥阴；羌活之气味与独活同，入足太阳兼能利水；甘草气味甘平，兼通入十二经络，诸味得之，皆能缓其性，乃君子之品也；茯苓气味甘平淡渗，入足阳明，能引诸药达于至阴之处；人参气味甘微温，入足阳明，能补五脏之阳，使身中正气大旺，外邪不能侵犯矣。

62272 独活汤

【方源】《妇人良方》卷三。

【组成】川独活 羌活 人参 防风 当归 北细辛 茯神（去木） 半夏 桂心 白薇 远志（去心） 菖蒲（去毛） 川芎各半两 甘草三分

【用法】上㕮咀。每服五钱，以水一盏半，加

生姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇女风虚昏愦不自觉知，手足瘛疭，坐卧不能，或发寒热，血虚不能服发汗药，及中风自汗。

【方论选录】《医方集解》：此手少阴、足厥阴药也。肝属风木而主筋，故瘛疭为肝邪。肝欲散，急食辛以散之。二活、防风祛风，细辛、桂心温经，半夏除痰，芎、归辛散风而温和血，血和则风散，辛以散之，即辛以补之也。心为肝子，肝移热于心则昏愦，故以人参补心气，菖蒲开心窍，茯神、远志安心神；白薇咸寒，退热而治厥，使风静火息，血活神宁，而瘛疭自已矣。

62273　**独活汤**

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】小独活汤(《杏苑》卷六)。

【组成】炙甘草二钱　羌活　防风　独活　大黄(煨)　泽泻　肉桂各三钱　当归梢　连翘各五钱　酒汉防己　酒黄柏各一两　桃仁三十个

【用法】上㕮咀。每服五钱，以酒半盏，水一大盏半，煎至一盏，去滓热服。

【主治】因劳役，腰痛如折，沉重如山。

62274　**独活汤**

【方源】《直指》卷四。

【组成】独活　麻黄(去节)　熟附子　生干姜　川芎　牛膝　白芍药　白茯苓　黄耆(蜜炙)　人参　杜仲(姜制，炒)　甘草(炙)　辣桂　当归　白术　木香各等分

【用法】上为粗末。每服三钱，加生姜五片，大枣二枚，同煎，吞活血应痛丸。

【主治】①《景岳全书》：脚气阳虚寒胜，经气不行，顽肿不用。②《保命歌括》：肾风冷，脚气痠疼，及久痢登厕，风冷入子肠胃，以致两脚细小，成鼓槌风，而痢又不止者。

【备考】方中独活，原作"羌活"，与方名不符，据《医统》改。

62275　**独活汤**

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】羌活　独活各一分　槟榔　天麻　麻黄(去节)　甘草(炙)各半分

【用法】上锉散。每服半钱，水煎服。于内加南星末蜜调，可贴囟用。

【功用】发散风邪。

【主治】胎惊。

62276　**独活汤**

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】独活　麻黄(去节)　川芎各一钱　大黄(焙)　甘草(炒)各半钱

【用法】上锉散。每服三字，加生姜三片，水煎服。

【功用】解通表里。

【主治】小儿风痫。

62277　**独活汤**

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】川独活(黄色如兔眼者佳)半两　当归(酒洗)　白术　黄耆(蜜水涂炙)　薄桂(去粗皮)　川牛膝(酒洗)各二钱半　甘草(炙)三钱

【用法】上㕮咀。每服二钱，以水一盏，加生姜二片，薤白一根，煎七分，空心热服，或不拘时候。

【主治】惊瘫，鹤膝；及中风湿，日久致腰背手足疼痛，昼轻夜重；及四肢痿痹不仁。

62278　**独活汤**

【方源】《云歧子保命集》卷下。

【组成】防风　独活　旋覆花　当归各七分

【用法】上锉细。每服七钱，加生姜，同煎服。

【主治】伤寒汗下后，头痛目眩者。

62279　**独活汤**

《普济方》卷二十一。即《圣惠》卷二十六"独活散"。见该条。

62280　**独活汤**

【方源】《普济方》卷一五四。

【组成】独活四两　葛根　桂枝　芍药　防风　甘草　干姜各二两

【用法】上㕮咀。以水一斗，先煮葛根，减三升，去上沫，纳诸药，煮取二升，去滓，温服一升。覆取微汗。若病只宜消散者，服汤则无汗而解。

【主治】卫不和，胸背相引而痛者。

【加减】若咽痛而渴，加栝楼二两；或咳或呕者，加半夏二两；恶热药者，去干姜；面赤龈痛者，加鸡苏，水增二升。

62281 独活汤

《普济方》卷三五〇。为原书同卷"荆芥汤"之异名。见该条。

62282 独活汤

【方源】《普济方》卷三七七。

【组成】独活 麻黄(去节) 川芎各二钱 大黄(焙) 天麻 防风 北细辛各二钱 甘草一钱 荆芥穗一钱

【用法】上锉。加生姜，水煎服。

【功用】解表通里。

【主治】小儿风痫内热。

62283 独活汤

【方源】《准绳·女科》卷二。

【组成】独活(去芦) 桑寄生 牛膝(酒浸) 秦艽(去芦) 赤茯苓(去皮) 桂心 防风(去芦) 附子(炮，去皮脐) 当归(炒，去芦) 生干地黄各一两 杜仲(锉，炒去丝) 细辛(去苗) 芎䓖 赤芍药各七钱半 甘草(炙)半两

【用法】上㕮咀。每服八钱，以水一中盏半，煎至一大盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人风痹，手足不随，身体疼痛，言语謇涩，筋脉拘急。

62284 独活汤

【方源】《幼科折衷》卷下。

【组成】当归 白术 黄耆 薄桂 牛膝 独活 甘草

【主治】小儿鹤膝风。

62285 独活汤

【方源】《痘疹仁端录》卷十。

【组成】羌活 防风 荆芥 牛膝 柴胡 何首乌

【用法】水煎服。

【主治】痘浆收敛，而手足红肿发毒。

62286 独活汤

【方源】《伤寒大白》卷四。

【组成】独活 防风 柴胡 葛根 广皮 甘草

【主治】伤寒足冷。

【加减】身痛，加羌活；胸满，加枳壳；呕恶，加半夏、厚朴、白豆蔻、川黄连。

62287 独活汤

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】独活 桑寄生 防风 秦艽 威灵仙 牛膝 茯苓各一钱 桂心五分 细辛 甘草(炙)各三分 当归 金毛狗脊各二钱

【用法】上加生姜二片，水煎服。

【主治】肾虚兼受风寒湿气，腰冷如冰，喜得热手熨，脉沉迟或紧。

62288 独活汤

《医略六书》卷二十一。为《御药院方》卷九"独活散"之异名。见该条。

62289 独活汤

【方源】《疡医大全》卷二十六。

【组成】独活 防风 荆芥 赤芍 陈皮 半夏 厚朴 苏叶 (或加钩藤钩)

【用法】水煎服。

【主治】妇女脚气，感风寒而发，遍身腰腿痠疼。

62290 独活汤

【方源】《马培之医案》。

【组成】独活 防风 苍术 黄柏 当归 秦艽 防己 萆薢 赤芍 川牛膝

【主治】鹤膝风因风寒湿，初起肿痛寒热者。

62291 独活汤

【方源】《马培之医案》。

【组成】独活一钱 秦艽五钱 炙没药八分 怀牛膝一钱半 五加皮一钱半 当归一钱半 丹参一钱半 巴戟肉一钱半 川续断

一钱半　狗脊三钱　广木香四分　红枣三个　桑枝三钱

【主治】寒客肾与膀胱之经,腰脊痛引股腿。

62292　**独活饮**

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】独活(去芦头)一两　葛根(锉)　甘草(炙)各半两

【用法】上为粗末。每服四钱匕,以水一盏半,加生姜半分(切),煎取七分,去滓热服。口噤服药不下,斡口开灌之,日夜四五服。

【主治】中风口噤不语,不知人,饮食不下。

62293　**独活饮**

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】独活(去芦头)　杜仲(去粗皮,切,炒)　牛膝(去苗,酒浸,焙)　桂(去粗皮)　细辛(去苗叶)　芎䓖　附子(炮裂,去皮脐)　芍药　当归(切,焙)　秦艽(去苗土)　麻黄(去根节)各一两

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,以水一盏,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后中风偏枯,半身不收,麻痹不仁。

62294　**独活酒**

【方源】《肘后方》卷三。

【组成】独活五两　附子五两(生用,切)

【用法】以酒一斗渍,经三宿服,从一合始,以微痹为度。

【主治】①《肘后方》:脚气微觉疼痹,或两胫小满,或行起忽弱,或小腹不仁,或时冷时热。②《圣济总录》:脚气久虚,脉沉细缓弱。

62295　**独活酒**

【方源】《外台》卷十九引《苏恭方》。

【组成】独活　生姜　石斛各六两　牛膝　丹参　萆薢　侧子(炮)　茯苓各四两　防风　薏苡仁　山茱萸　桂心　白术　天雄(炮)　芎䓖　秦艽　当归　人参各六两　甘菊花二两　生地黄八两

【用法】上切,绢袋贮,以酒二斗五升,渍四日。温服三四合,每日二次。

【主治】十月以后,腰脚屈弱,兼头眩气满。

【加减】头风患冷者,加椒二两,取汗。

62296　**独活酒**

【方源】《千金》卷三。

【组成】独活一斤　桂心三两　秦艽五两

【用法】上㕮咀,以酒一斗半,渍三日。饮五合,稍加至一升,不能多饮,随性服。

【主治】①《千金》:产后中风。②《普济方》:产后中风,言语謇涩,腰强直。

62297　**独活酒**

【方源】《千金》卷八。

【组成】独活　石南各四两　防风三两　附子　乌头　天雄　茵芋各二两

【用法】上㕮咀,以酒二斗,渍七日。服半合,每日三次。以知为度。

【主治】诸风痹。

62298　**独活酒**

【方源】《幼幼新书》卷十二引《婴孺》。

【组成】独活　甘草　木防己各四分　干姜　细辛各五分　鸱头二个　桂心二两　铁粉一两　人参七分

【用法】上入绢袋中,以酒四升半,浸五夜。初服半合,每日二次。

【主治】少小风痫,屡经发动。

62299　**独活酒**

《圣济总录》卷六。为《千金》卷三"独活紫汤"之异名。见该条。

62300　**独活酒**

【方源】《圣济总录》卷九。

【异名】金牙酒(原书卷十一)。

【组成】独活(去芦头)一斤　金牙　细辛(去苗叶)　地肤子　莽草　熟干地黄(切,焙)　蒴藋根　防风(去叉)　附子(炮裂,去皮脐)　续断　蜀椒(去目并闭口,炒出汗)各四两

【用法】上除金牙外,并细锉,盛以绢囊,清酒五升渍之,密泥器口,夏三宿,冬五宿,酒成。温服二合,每日三次,渐增之。其金牙为

末，别以练囊盛，纳大囊中。

【主治】肉苛。肌肉不仁，遍身痹重。风不仁，不能行步。

62301 **独活酒**

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】独活(去芦头) 山茱萸 天门冬(去心，焙) 黄耆 甘菊花 防风(去叉) 天雄(炮裂，去皮脐) 侧子(炮裂，去皮脐) 防己 白术 赤茯苓(去黑皮) 牛膝 枸杞子(焙)各三两 磁石(生捣研)九两 生姜(切)五两 贯众(锉，挼去黄末)二两 生地黄七两

【用法】上㕮咀，如麻豆，生绢袋盛，以无灰酒五斗，浸七日开封。初饮三两合，渐加，常令酒力相接。

【主治】脚气痰壅，头痛喘闷，胸膈心背痛。

62302 **独活酒**

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】独活(去芦头)半两 杜仲(去粗皮)一两 当归(切，焙) 芎䓖 熟干地黄(焙)各一两半 丹参一两

【用法】上锉细，用好酒五升，于净瓶内浸，密封，重汤煮两时许，取出候冷。旋暖饮之，不拘时候，常令微醉。

【主治】①《圣济总录》：风湿腰痛，痹痹。②《普济方》：腰脚冷痹不仁，疼痛。

62303 **独活酒**

【方源】《圣济总录》卷一二〇。

【组成】独活(去芦头) 莽草(切) 细辛(去苗叶) 防风(去叉)各半两 附子一枚(生，去皮脐)

【用法】上锉细，以酒一升半，煎至一升，热漱冷吐。

【主治】风牙齿疼痛。

62304 **独活酒**

《普济方》卷三五〇。为《圣惠》卷七十八"独活散"之异名。见该条。

62305 **独活散**

【方源】《外台》卷十五引《古今录验》。

【异名】独活白术散(《圣济总录》卷十六)。

【组成】独活四分 白术十二分 防风八分 细辛 人参 干姜各四分 蜀天雄(炮) 桂心各一分 栝楼六分

【用法】上为细末。每服半方寸匕，早晨以清酒送下，一日二次。

【主治】①《外台》引《古今录验》：风眩厥逆，身体疼痛，百节不随，目眩心乱，反侧若癫，发作无常。②《圣济总录》：风眩厥逆，身体疼痛，骨节沉重，目痛心乱。

【宜忌】忌桃、李、雀肉、猪肉、冷水、生菜、生葱等物。

62306 **独活散**

【方源】方出《圣惠》卷三，名见《普济方》卷八十九。

【组成】独活一两 羚羊角屑一两 麻黄一两半(去根节) 桂心一两 当归一两(锉，微炒) 五加皮一两 附子一两(炮裂，去皮脐) 甘草半两(炙微赤，锉) 荆芥半两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肝中风，筋脉拘急，肢节疼痛，起卧艰难。

【宜忌】忌猪肉、毒鱼。

62307 **独活散**

【方源】《圣惠》卷五。

【异名】独活汤(《圣济总录》卷五)、防风散(《校注妇人良方》卷三)。

【组成】独活一两 茯神三分 防风三分(去芦头) 羚羊角屑三分 附子三分(炮裂，去皮脐) 人参三分(去芦头) 前胡三分(去芦头) 沙参三分(去芦头) 旋覆花三分 黄耆三分(锉) 半夏三分(汤洗七遍去滑) 甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾脏中风，胸膈痰涎，言语不利，翕翕发热，智意昏浊。

62308 **独活散**

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】独活一两　细辛一两　附子一两(炮裂,去皮脐)　甘菊花一两　麻黄一两(去根节)　木通一两(锉)　五味子一两　赤茯苓一两　紫菀一两(洗去苗土)　桂心一两　白术一两　芎䓖一两　桑根白皮一两(锉)　甘草一两(炙微赤,锉)　杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】肺脏中风冷,头疼项强,背痛鼻干,心闷,语声不出,胸中少气,四肢无力疼痛。

62309　**独活散**

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】独活一两　蔓荆子半两　人参一两(去芦头)　黄芩三分　玄参三分　秦艽三分(去苗)　沙参三分(去芦头)　枳壳三分(麸炒微黄,去瓤)　羚羊角屑三分　白鲜皮三分　防风三分(去芦头)　甘菊花三分

【用法】上为细散。每服一钱,以温浆水调下,不拘时候。

【主治】肺脏风毒,鼻塞,面痒生疮。

62310　**独活散**

【方源】《圣惠》卷七。

【异名】附子独活汤(《圣济总录》卷二十)。

【组成】独活一两　附子一两(炮裂,去皮脐)　防风半两(去芦头)　芎䓖半两　丹参半两　萆薢半两(锉)　菖蒲半两　天麻一两　桂心一两　黄耆半两(锉)　当归一两(锉,微炒)　细辛半两　山茱萸半两　白术半两　甘菊花半两　牛膝半两(去苗)　枳壳半两(麸炒微黄,去瓤)　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】①《圣惠》:肾脏中风,腰脊疼痛,不得俯仰,两脚冷痹,缓弱不遂,头昏耳聋,语音浑浊,四肢沉重。②《明医杂著》:肾脏中风,肌色黎黑,骨节疫痛,多汗恶风,身体沉重。

62311　**独活散**

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】独活一两　防风三分(去芦头)　五加皮三分　附子一两(炮裂,去皮脐)　赤芍药一两　干姜半两(炮裂,锉)　桂心一两半　牛膝一两(去苗)　五味子三分　杜仲一两半(去粗皮,炙微黄,锉)　石斛一两(去根)　沉香一两

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,加生姜半分,煎至五分,去滓,食前温服。

【主治】伤寒后,肾脏风虚,脚膝疼痛少力,不能步行。

62312　**独活散**

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】独活一两　防风一两(去芦头)　桂心半两　秦艽一两(去苗)　荆芥穗一两　白术一两　甘草半两(炙微赤,锉)　葛根一两(锉)　附子一两(炮裂,去皮脐)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】中风,失音不语,四肢强直。

62313　**独活散**

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】独活二两　黑豆一合(锉,炒熟)　天南星半两(炮裂)　生姜半两　防风一两(去芦头)

【用法】上锉细。以清酒五大盏,煎取三大盏,入于瓶中,密盖良久,去滓放温,拗开口,灌半中盏,频频服之,不拘时候。

【主治】中风,口噤不开,筋脉拘急,疼痛。

62314　**独活散**

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】独活二两　桂心二两　防风一两(去芦头)　当归一两(锉,微炒)　赤芍药一两半　附子一两(炮裂,去皮脐)　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】中风不得语,身体拘急疼痛。

62315　**独活散**

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】独活三分 汉防己一两 秦艽三分（去苗） 黄耆半两（锉） 赤芍药半两 人参半两（去芦头） 茯神半两 白术半两 芎䓖半两 远志半两（去心） 石膏一两 川升麻半两 防风三分（去芦头） 丹参半两 甘草半两（炙微赤，锉） 天门冬半两（去心） 薏苡仁半两 羚羊角屑三分 五加皮半两 生干地黄三分 麻黄一两（去根节） 地骨皮半两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风痱。心热烦闷，四肢不仁。

62316 独活散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】独活一两 羌活一两 芎䓖三分 桂心三分 赤茯苓一两 附子一两（炮裂，去皮脐） 羚羊角屑三分 白僵蚕一两（微炒） 天麻一两 麻黄一两（去根节） 丹参三分 干蝎一两（微炒）

【用法】上为细散。每服二钱，以薄荷热酒调下，不拘时候。

【主治】中风。口面㖞斜，手脚不遂，风入脏腑，昏闷不语，腰脊如解，难以俯仰，骨痹冷痛，心惊不定。

62317 独活散

【方源】《圣惠》卷十九。

【组成】独活三分 萆薢一两 防风一两（去芦头） 细辛一两 人参一两（去芦头） 干姜一两（炮裂，锉） 天雄一两（炮裂，去皮脐） 丹参一两 牛膝一两（去苗）

【用法】上为细散。每服二钱，以温酒调下，不拘时候。

【主治】风痹。身体不举，常多无力。

62318 独活散

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】独活一两 防风一两（去芦头） 桂心一两 汉防已半两 白术半两 麻黄一两（去根节） 人参半两（去芦头） 羚羊角屑半两 细辛半两 茵芋半两 附子一两（炮裂，去皮脐） 秦艽半两（去苗） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分，去滓，加竹沥一合，更煎三二沸，温服，不拘时候。

【主治】卒中风。忽倒闷绝，口噤不语，气厥不识人，闭目不开，针灸不知痛处。

62319 独活散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】独活二两 赤茯苓一两 汉防己一两 芎䓖一两 赤芍药一两 麻黄一两半（去根节） 牛膝一两（去苗） 当归一两（锉，微炒） 附子二两（炮裂，去皮脐） 甘草半两（炙微赤，锉） 萆薢一两（锉） 桂心二两 茵芋一两 防风一两（去芦头） 羚羊角屑一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】偏风。手足不遂，肌肉顽痹。

【宜忌】忌食生冷、油腻、猪、鱼、鸡、狗肉。

62320 独活散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【异名】独活汤（《圣济总录》卷一五〇）。

【组成】独活半两 附子三分（炮裂，去皮脐） 防风半两（去芦头） 麻黄三分（去根节） 桂心半两 芎䓖半两 薏苡仁一两 赤茯苓三分 牛膝三分（去苗） 人参半两（去芦头） 白术半两 茵芋半两 海桐皮半两（锉） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：风，身体疼痛，腰背拘急。②《圣济总录》：妇人血风攻注，脚膝虚肿，或上焦不利。

【宜忌】忌生冷、油腻、毒鱼、滑物。

62321 独活散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】独活一两　白僵蚕三分(微炒)　干蝎半两(微炒)　附子一两(炮裂,去皮脐)　防风三分(去芦头)　芎䓖一两　当归三分　麻黄一两(去根节)　桂心一两　赤芍药三分　天麻一两　细辛三分

【用法】上为细散。每服一钱,以温酒调下,不拘时候。

【主治】破伤风,四肢不收,口中沫出,及中贼风。

62322　独活散

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】独活一两　石斛一两(去根,锉)　海桐皮一两(锉)　防风一两(去芦头)　当归一两　附子一两(炮裂,去皮脐)　羚羊角屑一两　芎䓖一两　牛膝一两(去苗)　五加皮一两　仙灵脾一两　桂心一两　汉防己一两

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】①《圣惠》:风毒攻两脚,软弱无力,行立艰难。②《普济方》:中风,半身不遂,身体筋脉挛急,肝心壅滞。

【宜忌】忌生冷、油腻、毒鱼、滑物。

62323　独活散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】独活二两　白芍药一两　白术一两　葛根一两(锉)　白茯苓一两　防风一两(去芦头)　茵芋一两　细辛一两　甘草一两(炙微赤,锉)　汉防己一两　芎䓖一两　酸枣仁一两　桂心一两　人参一两(去芦头)　五加皮二两　麻黄二两(去根节)　川乌头一两(炮裂,去皮脐)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,煎至五分,去滓,入竹沥一合,更煎一二沸,稍热服,不拘时候。

【主治】卒中恶风,口噤不能言,四肢亸曳,缓弱疼痛,风经五藏,恍惚,恚怒无常。

62324　独活散

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】独活一两　桂心一两　芎䓖一两　麻黄一两(去根节)　防风一两(去芦头)　白术一两　赤芍药一两　细辛一两　附子一两(炮裂,去皮脐)　枳壳半两(麸炒微黄,去瓤)　杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】柔风。肌肉软弱,身体疼痛,四肢不仁。

62325　独活散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】独活半两　枳壳一两(麸炒微黄,去瓤)　芎䓖一两　防风三分(去芦头)　当归一两(锉,微炒)　细辛一两　桂心半两　赤箭半两　羚羊角屑半两

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,入竹沥半合,更煎一二沸,温服,不拘时候。

【主治】中风。偏枯不遂,口眼不正,语涩,四肢拘急。

【宜忌】忌生冷、油腻、猪鸡肉。

62326　独活散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】独活三分　附子三分(炮裂,去皮脐)　防风半两(去芦头)　麻黄三分(去根节)　当归半两(锉,微炒)　薏苡仁三分　桂心半两　赤茯苓三分　牛膝三分(去苗)　茵芋半两　天麻半两　海桐皮半两(锉)　赤芍药半两　槟榔半两　萆薢半两(锉)　枳壳半两(麸炒微黄,去瓤)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,食前稍热服。

【主治】①《圣惠》:腰退风。肌肤虚满,四肢不收,骨节疼痛,腰脚缓弱无力。②《普济方》:风毒脚气痹挛,骨节疼痛。

62327　独活散

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】独活一两半　枳壳一两(麸炒微

黄，去瓤） 芎䓖一两 防风一两半（去芦头） 当归一两（锉，微炒） 细辛三分 桂心三分 羚羊角屑三分 桑根白皮三分（锉） 薏苡仁一两 酸枣仁一两（微炒）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓，加竹沥半合相和，温服，不拘时候。

【主治】中风。口眼不正，语涩，四肢拘挛。

62328 **独活散**

【方源】《圣惠》卷二十六。

【组成】独活二两 当归一两半 白茯苓一两半 干姜一两（炮裂，锉） 人参一两（去芦头） 黄耆一两（锉） 防风一两（去芦头） 桂心半两 附子半两（炮裂，去皮脐） 甘草半两（炙微赤，锉） 麻黄一两（去根节） 牛膝一两（去苗）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一大盏，加大豆半合，煎至五分，去滓，食前温服。

【主治】肉极。皮肤不通，表实里虚，外不得泄，腰脚疼痛。

【备考】本方方名，《普济方》引作"独活汤"。

62329 **独活散**

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】独活一两 人参一两（去芦头） 附子二两半（炮裂，去皮脐） 薏苡仁一两 桂心二两 防风一两（去芦头） 赤芍药三分 当归三分 赤茯苓三分 山茱萸三分 汉防已半两 甘草半两（炙微赤，锉） 狗脊三分 熟干地黄一两 牛膝一两（去苗） 芎䓖三分 石斛一两（去根） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】虚劳，痿痹不遂，筋脉急痛。

62330 **独活散**

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】独活 防风（去芦头） 羚羊角屑 酸枣仁（微炒） 茯神各一两 细辛 甘菊花 蔓荆子 决明子 前胡（去芦头） 桑根白皮（锉）各三分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】眼偏视。风邪攻肝，牵射瞳人，致目不正。

【宜忌】忌毒鱼肉。

62331 **独活散**

【方源】《圣惠》卷三十六。

【组成】独活三分 川升麻三分 沉香三分 桑寄生三分 连翘三分 犀角屑三分 汉防已三分 川大黄三分（锉碎，微炒） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《圣惠》：唇上生恶核肿，脾胃风热壅滞。②《简明医彀》：唇生恶核，脾胃热壅，唇燥生疮。

62332 **独活散**

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】独活三分 汉防已半两 犀角屑半两 石膏一两 川升麻三分 黄芩三分 防风半两（去芦头） 甘草半两（生用）

【用法】上为散。每服半两，以水一中盏，煎至五分，去滓，加竹沥半合，温服，一日三四次。

【主治】乳石发动，生痈赤肿，毒气攻注，筋脉拘急，言语謇涩，心神烦躁。

62333 **独活散**

【方源】《圣惠》卷四十一。

【组成】独活一两半 续断一两 杜仲一两（去粗皮，炙微黄，锉） 桂心一两 防风一两（去芦头） 芎䓖一两半 牛膝一两（去苗） 细辛一两 秦艽一两（去苗） 赤茯苓一两 海桐皮一两（锉） 当归一两（锉，微炒） 赤芍药一两 熟干地黄二两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食前温服。

【主治】肾气虚弱,卧冷湿地或当风所致腰痛强直,不能俯仰。

62334 独活散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】独活一两　黄耆半两(锉)　防风三分(去芦头)　白鲜皮半两　茯神一两　芎䓖半两　羚羊角屑半两　桂心三分　酸枣仁一两(微炒)　当归半两(锉,微炒)　附子一两(炮裂,去皮脐)

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,食前稍热服。

【主治】肾脏风湿腰痛,连腿膝,顽痹不能运动。

62335 独活散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】独活三分　附子一两(炮裂,去皮脐)　杜仲一两(去粗皮,炙微黄,锉)　细辛半两　熟干地黄三分　当归半两(锉,微炒)　白茯苓半两　桂心一两　牛膝一两(去苗)　侧子一两(炮裂,去皮脐)　防风半两(去芦头)　白芍药半两

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】肾气虚衰,腰脚冷痹,风麻不仁。

62336 独活散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】独活二分　麻黄半两(去根节)　细辛半两　丹参三分　牛膝三分(去苗)　萆薢三分(锉)　黄耆三分(锉)　桂心三分　防风一两(去芦头)　犀角屑一两　赤芍药三分　羚羊角屑一两　当归半两(锉,微炒)　芎䓖半两　赤茯苓一两

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,煎至五分,后入酒二合,更煎三二沸,去滓,食前温服。

【主治】风毒,腰脚骨节疼痛。

62337 独活散

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】独活一两　牛膝二两(去苗)　附子一两(炮裂,去皮脐)　芎䓖三分　桂心三分　赤芍药三分　当归三分(锉,微炒)　桃仁半两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】冷滞,风气攻刺,腰胯疼痛。

62338 独活散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】独活一两　丹参半两　附子半两(炮裂,去皮脐)　细辛半两　五加皮半两　牛膝半两(去苗)　芎䓖半两　白僵蚕半两(微炒)　桑根白皮一两半(锉)　麻黄一两(去根,锉)　杏仁三分(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】脚气。皮肉顽痹,筋骨疼痛,脚膝缓弱,行立不得。

62339 独活散

【方源】方出《圣惠》卷四十五,名见《普济方》卷二四三。

【组成】独活一两　枳壳一两(麸炒微黄,去瓤)　天门冬一两(去心)　黄耆一两(锉)　甘菊花一两　防风一两(去芦头)　侧子一两(炮裂,去皮脐)　汉防己一两　槟榔一两　赤茯苓一两　牛膝一两(去苗)　天雄一两(炮裂,去皮脐)　生干地黄一两　半夏二分(汤洗七遍去滑)　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】脚气。缓弱顽痹,痰壅气满,心胸闷乱,不欲饮食。

62340 独活散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】独活一两　川升麻一两　羚羊角屑一两　麻黄一两(去根节)　防风一两(去芦头)　桂心半两　附子三分(炮裂,去皮脐)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,煎至五分,去滓,加竹沥一合,更煎一二沸,温

服，不拘时候。

【主治】风毒脚气发盛，四肢皮肤及小腹顽痹不仁，言语謇涩，或至失音，心神昏愦。

62341 独活散

【方源】《圣惠》卷四十五。

【组成】独活一两 桂心三分 半夏三分（汤洗七遍去滑） 人参三分（去芦头） 麻黄一两（去根节） 赤茯苓一两 芎䓖一两 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 附子一两（炮裂，去皮脐） 防风一两（去芦头） 赤芍药三分 当归一两 酸枣仁一两（微炒） 槟榔一两半 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】脚气。风毒疼痛，皮肤不仁，脚膝沉重，行立不随。

62342 独活散

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】独活一两 麻黄一两（去根节） 犀角屑半两 秦艽半两（去苗） 桑根白皮半两（锉） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脊禁黄。腰背急硬，口噤不语，喘息气粗，眼中出血，心神恍惚，状如中风。

62343 独活散

【方源】《圣惠》卷六十四。

【组成】独活一两 木香一两 射干一两 连翘一两 甘草一两（生，锉） 桑寄生一两 川升麻一两 沉香一两 川大黄一两（生用）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，加竹沥半合，更煎一二沸，放温服之，一日三次，得快利为度。

【主治】恶核风结肿毒，四肢烦热拘急。

62344 独活散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】独活一两 桂心一两 防风一两（去芦头） 当归一两（锉，微炒） 赤芍药半两 附子半两（炮裂，去皮脐） 麻黄一两（去根节） 羚羊角屑半两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一盏，加生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人中风偏枯，言语謇涩，肢节无力。

62345 独活散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】独活一两 桑寄生一两 杜仲三分（去粗皮，炙微黄，锉） 牛膝一两（去苗） 细辛三分 秦艽一两（去苗） 赤茯苓一两 桂心一两 防风一两（去芦头） 芎䓖三分 附子一两（炮裂，去皮脐） 当归一两（锉，微炒） 甘草半两（炙微赤，锉） 赤芍药三分 生干地黄一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人风痹，手足不随，身体疼痛，言语謇涩，筋脉挛急。

62346 独活散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】独活一两 羚羊角屑三分 桂心三分 当归三分（锉，微炒） 黄芩三分 附子一两（炮裂，去皮脐） 麻黄一两（去根节） 防风三分（去芦头） 细辛三分

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人中风，筋脉拘急，腰背反张，状如角弓，言语謇涩。

62347 独活散 《圣惠》卷六十九。为《医心方》卷二十三引《产经》"独活汤"之异名。见该条。

62348 独活散

【方源】《圣惠》卷六十九。

【组成】独活一两 白术三分 防风二分（去芦头） 细辛三分 人参三分（去芦头） 石膏二两 半夏半两（汤洗七遍去滑） 赤芍药半两 甘草半两（炙微赤，锉） 芎䓖三分 荆芥三分

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,加生姜半分,薄荷七叶,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妇人风眩,头痛呕逆,身体时痛,情思昏闷。

62349　**独活散**

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】独活一两　赤箭一两　麻黄一两(去根节)　乌犀角屑三分　羌活三分　防风三两(去芦头)　天蓼木三两　白附子三分　汉防己半两　桂心半两　芎䓖半两　白僵蚕半两　阿胶一两(捣碎,炒令黄燥)　龙齿一两(研入)

【用法】上为细散,入研了药令匀。每服三钱,薄荷汤调下,不拘时候。

【主治】妊娠因洗头中风,身体强硬,牙关紧急,失音不语。

62350　**独活散**

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】独活一两　防风一两(去芦头)　葛根半两(锉)　羚羊角屑三分　赤箭一两　当归三分　酸枣仁三分(微炒)　芎䓖半两　秦艽半两(去苗)　麻黄一两(去根,锉)　五加皮半两　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】妊娠中风,腰背强直,或时反张,名为风痉。

62351　**独活散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】独活一两半　麻黄一两(去根节)　甘草半两(炙微赤,锉)　芎䓖　桂心　天麻　当归(锉,微炒)　生干地黄　五加皮　防风(去芦头)　侧子(炮裂,去皮脐)各一两

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后中风,若背项强,四肢拘急,不得转动。

62352　**独活散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】独活二两　防风二两(去芦头)　附子半两(炮裂,去皮脐)　桂心一两　甘草一两(炙微赤,锉)　当归一两(锉,微炒)　麻黄一两(去根节)　细辛半两

【用法】上为粗散。每服四钱,以水、酒各半中盏,煎至六分,去滓,拗开口灌之,不拘时候。

【主治】产后中风,口噤肩强直,四肢拘急。

62353　**独活散**

《圣惠》卷七十八。为《千金》卷三“独活汤”之异名。见该条。

62354　**独活散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】独活一两　麻黄一两(去根节)　防风一两(去芦头)　石膏二两　芎䓖　蔓荆子　桂心　赤芍药　犀角屑　茯神　甘草(炙微赤,锉)　甘菊花　人参(去芦头)　羚羊角屑　枳壳(麸炒微黄,去瓤)各半两

【用法】上为粗散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后中风恍惚,语涩,心胸不利,头目疼痛,四肢壮热。

62355　**独活散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【异名】独活酒(《普济方》卷三五〇)。

【组成】独活一两　天麻一两　防风一两(去芦头)　桂心半两　麻黄三分(去根节)　附子三分(炮裂,去皮脐)　当归半两(锉,微炒)　赤芍药三分　荆芥半两　羚羊角屑三分　芎䓖半两　蔓荆子半两

【用法】上为粗散。每服四钱,以水、酒各半中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】产后中风,睡卧不安,筋脉四肢挛急或强直。

62356　**独活散**

【方源】《圣惠》卷八十三。

【异名】独活汤(《圣济总录》卷一七四)。

【组成】独活一两　黄耆一两(锉)　防风

三分(去芦头) 白鲜皮三分 茯神一两 羚羊角屑三分 桂心半两 酸枣仁一两 甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓服之。

【主治】小儿中风,四肢拘挛,心神烦乱,不得睡。

62357 **独活散**

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【组成】独活一两 甘菊花一两 蔓荆子一两 芎䓖一两

【用法】上为散。每服二钱,水一中盏,加酸枣仁、鼠粘子各五十粒(研碎),同煎至七分,并滓服,不拘时候。

【主治】肝脏实,目赤昏涩,热泪不止,筋脉拘急,背膊劳倦及头昏项颈紧急疼痛。

62358 **独活散**

【方源】《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》。

【组成】独活 防风 防己 秦艽 黄耆 芍药 人参 白术 茯神 芎䓖 远志 升麻 石斛 牛膝 丹参 羚羊角屑 甘草 厚朴 天门冬 五加皮 桂心 黄芩 地骨皮各半两 橘皮 麻黄 干地黄各一两半 槟榔 藁本 杜仲 乌犀角各一两 薏苡仁半升 石膏三两

【用法】上药各细切,和匀,为粗散。每服四钱,以水一盏半,加生姜半分,同煎至八分,滤去滓,一日二次。若或觉心中热烦,以竹沥代水煮之,临煎药,加生姜一味,斟酌用之。

【功用】除余风。

【主治】风痱,服防风散愈后用之。

62359 **独活散**

【方源】《普济方》卷九十八引《护命》。

【组成】独活(去芦头) 阿魏(面少许,和如薄饼子,火上焙干,捣为末)各一钱 桂(去粗皮) 大黄(锉,炒) 牛膝(去苗,锉) 羌活(去芦头) 鳖甲(醋炙) 当归(切,焙) 干蝎(炒) 黄耆(锉) 芎䓖 赤茯苓(去黑皮) 木香 麻黄(去根节) 蔓荆子 半夏(洗去滑)各一分 吴茱萸(炒)一钱半 荆芥穗二钱 虎骨(酥炙)四钱 芫花一两 狼毒(捶碎,以醋三升,同芫花子石器内煮干)半两 白花蛇(酒浸,去骨,炙干,仍用酒温,又干,如是者二十余次,捣)一两 麝香少许(研) 牵牛子

【用法】上将芫花、狼毒二味别作一处为末,牵牛子、半夏二味亦别作一处为末,其余众药共作一处为末。每服芫花、狼毒末半钱,半夏、牵牛子末一钱,众药末一钱半,计三钱,共作一服,临卧葱白汤调下。

【主治】走注风,两足疼痛肿起,忽偏在一足痛,行履不得,其痛处游走不定,忽上项,头目昏乱,忽走在右手,忽走在左手,忽在一手指头上,忽在一脚趾头上,只有一点痛,痛不可忍,其游走痛处一点常赤色,甚则遍身有赤色,或攻项背,或把腰膊,或注脚下,或攻胸胁,腿骨与胫骨俱小,惟有膝头粗肿;亦治白虎风,甚则下青粪。

【备考】吃此药后,或痛处在指甲下或在脚指甲下,破出得恶血,或在鼻中出得恶血,其病方可除根。方中牵牛子用量原缺。

62360 **独活散**

【方源】《活人书》卷十七。

【组成】羌活(去芦头) 独活(去芦头) 人参 细辛(去灰土,华阴者佳) 白茯苓(去皮) 枳壳(去心,麸炒通黄) 防风(去芦) 黄芩(细坚者) 麻黄(沸汤泡三次,焙干称) 甘草(细锉,炒赤) 蔓荆子 甘菊花各一两 石膏(水飞过)二两

【用法】上为末。每服三钱,以水一盏,加生姜三片,薄荷四五叶,同煎至七分,去滓,微热呷。

【主治】伤风温疟。

【加减】如年高者,以川芎代黄芩。

62361 **独活散** 《圣济总录》卷九。为《圣惠》卷十九"天麻散"之异名。见该条。

62362 **独活散**

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】独活(去芦头)一两半　玄参一两　生犀角屑二两　升麻三两　恶实根(锉)半两　豉二合　生干地黄(锉)半两

【用法】上为散。每服三钱匕，空腹煎米饮调下，一日二次。

【主治】历节风。

62363　独活散

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】独活(去芦头)三分　雄黄(研)半两　青黛(研)一分　麻黄(去节，先煎，掠去沫，焙干)半两　水银一分(与丹砂、雄黄点醋同研，以水银星子尽为度)　阿魏(生，研)一分　雷丸(炮)　丹砂(研)　滑石(捣，研)各半两　石胆(研)　牛黄(研)　紫石英(研)各一分　斑蝥四十枚(与糯米同炒，去翅足，米不用)　芫青四十枚(与糯米同炒熟，走翅足，米不用)

【用法】上为细散。每服一钱匕，空心温酒调下，晚更服。当有虫从小便中出，或当日，或三四日至十日方出。

【功用】出五虫。

【主治】大风癞。

【宜忌】不得饱食。

62364　独活散

【方源】《圣济总录》卷二十。

【组成】独活(去芦头)三两　附子(炮裂，去皮脐)　薏苡仁　苍耳　防风(去叉)　蔓荆实　芎䓖　细辛(去苗叶)　秦艽(去苗土)　菖蒲各二两

【用法】上为细散。每服一钱匕，空腹以温酒调下，一日二次。

【主治】筋痹。肢体拘急，不得伸展。

62365　独活散

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】独活(去芦头)　附子(炮裂，去皮脐)各一两　牵牛子二两(微炒)

【用法】上为散。每服二钱匕，炒葱酒调下，温蜜汤亦得，一日三次，不拘时候。以利为度。

【主治】①《圣济总录》：脚气，两胫疼痛肿满，时发寒热，或大便不利，毒气上攻。②《普济方》：干脚气，两胫渐细，疼痛。

62366　独活散

【方源】《圣济总录》卷一三七。

【组成】独活半两　附子(炮裂，去皮脐)一两

【用法】上为散。以酒调和如糊，先用皂荚水洗癣上，然后涂之，每日二次。

【主治】一切癣。

62367　独活散

【方源】《幼幼新书》卷十一引张涣方。

【组成】独活　羌活　川升麻(锉细)　酸枣仁(拣净)　人参(去芦头)各一两　琥珀　川大黄(锉细，微炒)各半两

【用法】上为细末。每服一钱，以水一小盏，入金、银、薄荷各少许，放温服，不拘时候。

【功用】祛风截痫。

62368　独活散

【方源】《本事》卷一。

【组成】川独活(黄色如兔眼者，去芦洗，焙干称)　白术　白茯苓(去皮)　秦艽(洗，去芦)　蒺藜(洗)　柏子仁(研)　甘草(炙)各一两　犀角(镑)　川椒(去目并合口，微火炒，地上出汗)　熟干地黄(酒洒，九蒸九晒，焙干称)　枳实(汤浸，洗去瓤，薄切，麸炒)　白芷(不见火)　官桂(去粗皮，不见火)各半两　人参(去芦)一分

【用法】上为细末。每服二钱，以水一盏，加生姜三片，大枣一个，同煎至七分服，不拘时候。

【主治】①《本事》：中风。②《普济方》：一切风。

【方论选录】《本事方释义》：独活气味苦辛甘平，入足厥阴、少阴；白术气味甘温微苦，入足太阴、阳明；茯苓气味甘平淡渗，入足阳明；蒺藜气味甘平，入手、足太阴；秦艽气味苦平，入手、足阳明，兼入肝胆；柏子仁气味苦辛微温，入足厥阴；甘草气味甘平，入足太阳；犀角

气味苦酸咸寒，入足厥阴、手少阴；川椒气味辛温，入手、足太阴及命门；熟地黄气味甘寒微苦，入足少阴；枳实气味苦寒，入足太阴；白芷气味辛温，入手、足阳明，为引经之药；官桂气味辛温，入足厥阴；人参气味甘温，入足阳明。即惊恐亦七情所伤之病，致脏腑偏胜不平，故用补五脏之药，护持正气，虽用独活为主，再佐以辛温苦寒之品，使偏胜者得以和平，客病何由得入哉。

62369 **独活散**

【方源】《三因》卷二。

【组成】独活 地骨皮 细辛 芎䓖 菊花 防风（去叉） 甘草（炙）各等分

【用法】上为末。每服三钱，水一盏半，煎至一盏，去滓，取六分清汁，入少竹沥，再煎，食后温服，一日二次。

【主治】气虚感风，或惊恐相乘，肝胆受邪，使上气不守正位，致头招摇，手足颤掉，渐成目昏。

62370 **独活散**

【方源】《杨氏家藏方》卷二。

【组成】川芎 独活（去芦头） 防风（去芦头） 藁本（去土） 旋覆花 蔓荆子 细辛（去叶土）各一两 石膏（研） 甘草（炙）各半两

【用法】上为细末。每服二钱，以水一大盏，加生姜三片，煎至七分，食后热服。

【功用】消风化痰。

【主治】中风头目眩晕，颤振无热，肢厥身痛。

①《杨氏家藏方》：头目旋晕。②《普济方》：风头眩，手足厥逆，身体疼痛，心乱反侧如癫，发歇无恒。③《证治宝鉴》：心肝俱虚，中风颤振无热者。

62371 **独活散**

【方源】《医方类聚》卷一七四引《简易》。

【组成】独活 黄芩 莽草 当归 川芎 大黄 赤芍药各一两

【用法】上为散。分作二次，先用猪蹄，以水二升，煮令蹄熟，去蹄入药，再煎十余沸，去滓，乘热洗疮。

【主治】一切痈疽。

62372 **独活散**

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】独活五两 川椒三两 草乌半斤 麻黄三两 防风二两 杉木节一两 荆芥一小把 葱一握

【用法】煎汤熏蒸，通得手，即用葱藾汤洗，以久为度，更先服小续命汤。

【主治】因卧湿地而致行履费力。

62373 **独活散**

【方源】《御药院方》卷九。

【异名】独活汤（《医略六书》卷二十一）。

【组成】川芎 独活 羌活 防风各半两 华细辛二钱 荆芥 鄄薄荷 生地黄各三钱

【用法】上为粗末。每服三钱，以水一盏，煎至八分，去滓，食后温服，一日三次。

【功用】清头目，发散风热。

【主治】①《御药院方》：阳明经不利，邪毒攻注，牙齿龈肉虚浮宣露袒下，动摇发痛；及偏正头痛，渐渐攻注眼目，或发疼痛，视物不明。②《口齿类要》：风毒牙痛，或牙龈肿痛。

【方论选录】《医略六书》：贼风伤经，袭入齿缝而伤风恶风，牙疼走注且吸风痛甚，可知病全在经而脏气未伤焉。独活去少阴伏风，羌活散太阳游风，荆芥疏风理血，防风散风行气，川芎活血行血中之气，生地滋阴壮肾中之水，细辛散浮热，薄荷清口齿。为散水煎，使风邪解散，则经气清和而齿无疼痛之患，何吸风更甚之有？此疏散调营之剂，为齿痛吸风疼甚之专方。

62374 **独活散**

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】独活二两（去土） 华细辛根一两（去土）

【用法】上为粗末。每用五钱，以水二盏，加荆芥一穗，同煎至一盏，去滓，热漱冷吐，不拘

时候。

【主治】牙痛不可忍，诸药不效者。

【宜忌】宜先用丁香散擦后，用此药漱三二次。

62375　**独活散**

《普济方》卷五十三。为《圣济总录》卷一一四"独活煮散"之异名。见该条。

62376　**独活散**

《普济方》卷八十九。即《圣济总录》卷五"羌活散"。见该条。

62377　**独活散**

【方源】《普济方》卷二四三。

【组成】绿豆粉三两

【用法】于银石器内慢火炒令黑色，再为细散。用井水调成膏，摊绢帛上，随痛处贴之，并服趁痛丸。

【功用】止疼痛。

【主治】脚气。

62378　**独活散**

《普济方》卷二四五。为《圣惠》卷四十五"升麻散"之异名。见该条。

62379　**独活散**

【方源】《准绳·类方》卷八。

【组成】羌活　防风　川芎　独活　石膏　荆芥　升麻　干葛　生地黄　细辛　白芷　赤芍药　黄芩　甘草

【用法】加薄荷，水煎服。

【主治】风毒攻蛀，齿龈肿痛。

62380　**独活散**

【方源】《证治宝鉴》卷十。

【组成】独活　防风　藁本　蔓荆子　羌活　薄荷　生地　细辛　川芎　甘草

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】牙根肿痛，延及两腮。

62381　**独活散**

【方源】《诚书》卷八。

【组成】独活　麻黄(去节)　川芎　天麻(煨)　防风　细辛　荆芥穗各一钱　甘草(炙)　熟大黄各五分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】小儿狂癫痉痓。

62382　**独活散**

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】独活一两半(盐水炒)　白芍一两半(炒)　防风一两半(盐水炒)　当归三两　远志一两半　生地五两　龙齿三两(煅)　茯神二两(去木)　人参一两五钱　炙草一两五钱

【用法】上为散。每服三钱，银器煎汤，去滓温服。

【主治】产后风邪乘虚袭伤营阴，心神失养，心血心气俱馁，惊悸不安，脉浮虚微数。

【方论选录】方中独活开经气，防风散风邪，生地壮水以滋心血，当归养血以营心经，白芍敛阴和血以宁心，远志通肾交心以保心，人参扶元补心气，龙齿定魄安神志，茯神定神志，炙草缓中州以益胃气。为散，银汁煎，使风邪外解则血气内充，而心神得养，心气自雄。

62383　**独活散**

《医部全录》卷二二三。为《校注妇人良方》卷三"独活细辛散"之异名。见该条。

62384　**独活散**

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十。

【组成】独活　升麻　川断　地黄各五钱　桂皮一钱

【用法】上为末。每服二钱，白汤调下，一日二次。

【主治】忽吐衄下血，甚而九窍皆血。

62385　**独活膏**

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】羌活　独活　丹参　葱白各半两　豆蔻一两

【用法】上药入菜油内，觉油香，更入黄蜡，候蜡熔成膏即是。用时先洗疮，拭干敷药。

【主治】疥癣。

62386　**独将丸**

【方源】《同寿录》卷四。

【组成】黄蜡不拘多少

【用法】溶化为丸。好酒吞服。

【主治】肿毒不破头。

62387 **独姜汤**

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】生姜自然汁一小盏

【用法】温服。

【主治】痰厥不省，语音不出。

62388 **独神丸**

【方源】《百一》卷六。

【异名】独圣丸（《普济方》卷二〇九）。

【组成】罂粟壳（去瓤蒂）不拘多少

【用法】用米醋一碗蘸炙，以醋多为妙，候焦黄，为细末，炼蜜为丸，如小弹子大。每服一丸，以水一盏，加生姜三片，煎至七分送下。

【主治】①《百一》：痢疾。②《普济方》：一切赤白痢，不问新久，百药不效者。

62389 **独神丹**

【方源】《回春》卷二。

【组成】淮安陈曲一块

【用法】将四面削去各一指厚，用中心的打碎，砂锅内炒去湿气，为细末，用福建黑糖等分，入石臼内捣匀，再用生姜汁熬熟，旋添入内，捣如泥，为丸如弹子大，收贮瓷器内。每服细嚼十丸，病在上者，晚上用黄酒送下；病在下者，五更用牛膝煎酒送下；如全身有病，早晚如上送下。

【主治】中风瘫痪疼痛，手足挛拳。

62390 **独神汤**

【方源】《良朋汇集》卷一。

【组成】黑豆一合

【用法】炒焦，以酒淬入，热饮微醉。盖被汗出即去。

【主治】一切感冒。

62391 **独神饮**

【方源】《疡科选粹》卷三。

【组成】青艾叶

【用法】取汁，灌入喉中，立愈。

【主治】咽喉肿痛。

62392 **独神散**

【方源】《古今医鉴》卷十三。

【组成】全蝎七个（去蝎尾，每个用中一节，共七节，火烤干）

【用法】上为细末。乳汁送下。小儿头上微汗出即愈。

【主治】小儿脐风。

62393 **独神散**

《痘疹金镜录》卷下。为《直指小儿》卷五“独圣散”之异名。见该条。

62394 **独神散**

【方源】《疡科选粹》卷三。

【组成】章漆树皮（一名接骨木，一名继骨肉，一名野黄杨）

【用法】上为细末，好酒调服。素日饮水者，以生姜少许，研细和匀服。未成即消，已成即溃。

【主治】肺痈。

62395 **独神散**

【方源】《医方易简》卷二。

【组成】白及一两（用甜酒酿浸）

【用法】放屋上露一夜，晒一日，焙干为末。每用五钱，装入黑猪蹄壳内，水煮，临服冲酒少许，不用盐。

【主治】赤白带浊。

62396 **独桂汤**

【方源】《直指》卷六。

【组成】辣桂（去粗皮）

【用法】上锉细，每服二钱，水煎，食前服；或为末，紫苏煎汤，乘热调下。

【主治】风冷入脾，逆气上攻，腹痛。

62397 **独栗丸**

【方源】《圣济总录》卷八十五。

【组成】栗不拘多少（取肉，焙干）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至五十丸，空心、日午温酒送下。

【主治】腰脚沉重，劳伤痛，脚气。

62398 **独栗膏**

《普济方》卷三〇四。即《圣济总录》卷一四〇

"独栗涂方"。见该条。

62399　**独效散**

【方源】方出《千金》卷二十四，名见《普济方》卷二五三。

【组成】人屎尖七枚

【用法】烧作火色，置水中研之，顿服。服已，温覆取汗。

【功用】解百毒及时气热病之毒。

【主治】诸热毒或蛊毒，鼻中及口中出血。

62400　**独效散**

【方源】《永乐大典》卷一〇三七引《全婴方》。

【组成】柏枝(研细)

【用法】涂患处。又涂白矾汁，频频拭之。

【主治】小儿诸丹，毒赤流肿。

62401　**独效散**

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】光明沥青不拘多少

【用法】上为细末。每服一钱，先以冷米醋调成膏，复用热米醋调开服，不拘时候。

【主治】冷伤心脾，疼不可忍。

62402　**独梅汤**

【方源】《医门八法》卷二。

【组成】大乌梅五个(去骨)

【用法】煎汤，白糖五钱，冲服。

【主治】噤口痢。痢而兼呕，饮食不能入腹，由阴亏血少，肝燥克脾者。

62403　**独菊汤**

【方源】《疡科选粹》卷五。

【组成】孩儿菊五钱

【用法】上以河水入砂罐内煮二十滚，取于小盆内，先熏后洗，如此五六次。其肿自消。

【主治】痔疮。

62404　**独黄散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】硫黄(研细)

【用法】上以茄蒂蘸药少许，擦良久，以温汤洗去。

【主治】紫癜风。

62405　**独黄散**

【方源】《方症会要》卷三。

【组成】大黄(酒炒)

【用法】上为末。每服三钱，茶酒调下。服下立愈。

【主治】眩晕不可当。

【宜忌】虚者不可轻用。

62406　**独得散**

《良方汇选》卷上。为《云岐子保命集》卷下"独行散"之异名。见该条。

62407　**独脚顶**

【方源】《串雅补》卷一。

【组成】番木鳖

【用法】清水煮胀，去皮，晒干，将酒坛黄泥杵碎，筛细，拌木鳖，烈火炒松，勿令太焦，筛去黄泥，将木鳖为细末，或面糊为丸，如芥子大。临睡避风，清汤或老酒送下一分至三分。

【主治】风痹瘫痪，湿痰走注，遍身骨节疼痛，类风不仁。

62408　**独脚顶**

《串雅补》卷一。为原书同卷"小凤门顶"之异名。见该条。

62409　**独脚虎**

【方源】《疡科选粹》卷二。

【组成】蜀葵花子

【用法】新汲水生吞一粒。须臾即破，如要头多，服三四粒。

【主治】痈疽无头。

62410　**独蒜丸**

【方源】《奇效良方》卷十二。

【组成】大蒜不拘多少

【用法】于五月五日将大蒜捣烂，次入矾红，拌匀为丸，如龙眼大。每服一丸，大蒜汤嚼下。

【功用】截脾寒。

【主治】脾疟。

62411　**独蝉散**

《疡科选粹》卷五。为《直指》卷三"秘传独圣散"之异名。见该条。

62412 独醒汤

【方源】方出《圣惠》卷三十九，名见《证类本草》卷二十三引《经验后方》。

【组成】柑子皮二两（洗，焙干）

【用法】上为细散。遇酒醉不醒，抄三钱，以水一中盏，煎三五沸，或入少盐花，如茶旋呷。未效更服。

【功用】解酒毒。

【主治】醉酒后昏闷烦满。

62413 独勝散

【方源】《产科发蒙》卷三。

【组成】莲房不拘多少（烧存性）

【用法】上为细末。每服一二钱，白汤送下。

【主治】产后崩漏，经血不止及诸血。

62414 独蟾丸

【方源】《医学正传》卷六引《疮疡集验》。

【组成】活蟾（即大壮虾蟆，通身有块垒者，大者重五六两）不拘几个

【用法】捉住后脚，以大桑叶或油单纸包掩其头，用铁钉一个，括取眉间白汁，溅于叶上，凝结如湿真粉，就丸如绿豆大，悬当风处阴干。如患疔肿者，以一二丸置舌尖上，仰卧片时，其苦水满口，咽下。或以铍针刺开疔肿头上，纳药一丸于中，外以薄皮纸贴护之，勿令药脱落。

【主治】疔肿，背痈及一切痈肿初起时。

62415 独圣饼子

【方源】《圣济总录》卷五十。

【组成】蛤蚧一对（雌雄头尾全者，洗净，用法酒和蜜涂，炙熟） 人参（紫团参）一株（如人形良）

【用法】上为末，熔蜡四两，滤去滓，和药末，作六饼子。用糯米作薄粥一盏，投药一饼，空心趁热细细呷之。

【主治】肺气咳嗽，面肿，四肢浮。

62416 独角莲膏

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】独角莲 皂角刺 白芷 防己 银花 连翘 生南星 刺猬皮 山甲片 当归 海桐皮 苏木 海带 大麻仁 豨莶草各45克 干蟾3个 乳香 没药各35克 血余45克

【用法】用麻油6升，入大铁锅内，投入干蟾以上各药，熬枯去滓，再用强火熬至滴水成珠，离火，投入章丹（冬天约2.5千克，夏天约3千克），用铁棒急调，油渐变成黑色，最后将冷凝时，加入后药末，调和成膏。用厚纸摊成大、中、小三号厚薄不同的膏药，用时烘烊，贴患处。

【功用】提脓拔毒，消肿轻坚。

【主治】痈肿，毛囊炎，瘢痕疙瘩，神经性皮炎。

62417 独活饮子

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】独活一两（锉） 竹沥二合 生地黄汁二合

【用法】以水一大盏，煎独活至六分，去滓，下竹沥、地黄汁，搅匀，更煎一二沸，分二次温服。

【主治】妊娠中风，口面喎斜，语涩舌不转。

62418 独活饮子

【方源】《活幼口议》卷十八。

【组成】天麻 木香 独活 防风各一钱 麝香少许（研细末，和入）

【用法】上为末。每服一钱匕，小者半钱，麦门冬熟水调下。

【主治】肾疳臭息。

62419 独活浸酒

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】独活一两 桂心一两 防风一两（去芦头） 附子一两（炮裂，去皮脐） 大麻仁二合 牛膝一两 川椒二两（去目及闭口者，微炒去汗） 天蓼木二两（锉）

【用法】上锉细，以生绢袋盛，以酒一斗，密封头，浸三日后开。每日食前及临卧时暖酒一中盏饮之。以药力尽为度。

【主治】中风，偏枯不遂，骨节冷痛。

62420 独活浸酒

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】独活(去芦头) 生干地黄(焙)各三两 生黑豆皮一大升 海桐皮二两 生恶实根一斤 桂(去粗皮)一两 大麻子仁一升(炒)

【用法】上锉,如黑豆大,以生绢袋盛,用无灰酒三斗,同纳瓷瓮中浸之,冬七日,夏三日,春秋五日。不限早、晚,随意饮之,常令有酒气,酒尽更添,药无味再做。

【主治】①《圣济总录》:岭南脚气发动,地气郁蒸,热毒风盛,脾肺常有虚热。②《普济方》:岭南热毒风盛,湿气郁蒸,脚气发动劳,脾肺常有虚热,心神烦闷,脚膝疼痛。

62421 **独活煮散**

【方源】《千金》卷八。

【异名】独活汤(《圣济总录》卷九)。

【组成】独活八两 芎䓖 芍药 茯苓 防风 防己 葛根各一两 当归 人参 桂心 羚羊角 石膏 麦门冬各四两 磁石十两 甘草三两 白术三两

【用法】上药各切如豆。分二十四份,每份加生姜、生地黄(切)一升、杏仁二七枚,以水二升,煮取七合,日晚或夜中服之,每日一次,间日再服。

【主治】①《千金》:风痱。②《圣济总录》:风痱。肢体缓弱,言语謇涩,冒昧不识人。

62422 **独活煮散**

【方源】《圣济总录》卷一一四。

【异名】独活散(《普济方》卷五十三)。

【组成】独活(去芦头)一两

【用法】上为散。每服二钱匕,以水、酒各半盏,煎至七分,去滓,空心服。时用水浸椒,煮令热,以布裹熨之。

【主治】风聋。

62423 **独活煮散**

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】独活(去芦头)一两 当归(切,焙)三分 赤芍药(炒)半两 芎䓖 秦艽(去苗土) 桂(去粗皮) 生干地黄(焙)各三分 黑豆二合

【用法】上㕮咀,如麻豆大。每服五钱匕,以水一盏半,加生姜三片,同煎至八分,去滓温服,一日二次。

【主治】产后中风。

62424 **独活紫汤**

【方源】《千金》卷三。

【异名】独活酒(《圣济总录》卷六)、大豆紫汤(《三因》卷七)、独圣散(《杨氏家藏方》卷十六)、独活汤(《妇人良方》卷十九引《指迷方》)、独活紫酒(《医方类聚》卷二三一引《胎产救急方》)、豆淋独活酒(《医方类聚》卷二三八引《经验方》)、大豆子酒(《明医指掌》卷九)、大豆紫酒(《医钞类编》卷十七)。

【组成】独活一斤 大豆五升 酒一斗三升

【用法】先以酒渍独活二宿,若急需,微火煮之,令减三升,去滓,别熬大豆极焦,使烟出,以独活酒沃之,去豆服一升,日三夜二。

【功用】①《千金》:补肾。②《三因》:去风,消血结。

【主治】①《千金》:产后百日,中风痉,口噤不开,血气痛,劳伤。②《三因》:中风头眩,恶风自汗,吐冷水,产后百病,中风痱,痉,背强,口噤直视,烦热。

【方论选录】《千金方衍义》:独活专去风毒,加于大豆紫汤中,制其苦燥之性,深得刚柔兼济之妙用。终嫌燥血,须百日外用之。若新产暴虚,恐非所宜。

62425 **独活紫酒**

《医方类聚》卷二三一引《胎产救急方》。为《千金》卷三"独活紫汤"之异名。见该条。

62426 **独栗涂方**

【方源】《圣济总录》卷一四〇。

【组成】独颗栗不拘多少

【用法】嚼烂涂之,裹以帛。

【主治】恶刺。

【备考】本方方名,《普济方》引作"独栗膏"。

62427 **独头蒜涂方**

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】独头蒜

【用法】去壳，入油少许，同研如泥，涂敷肿上，每日三次。

【主治】气攻肿痛，坐卧不得。

62428 **独圣安胎散**

《种痘新书》卷十二。为《杨氏家藏方》卷十六“安胎散”之异名。见该条。

62429 **独圣还睛丸**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】苦葶苈半斤（净，去尘土）

【用法】用木杵臼捣烂如饧糖，取醋、粟米饭，纳净布巾中，干捩，去水尽，少少入臼中，与药同捣，令可丸，即丸如绿豆大。每服十丸，早、晚、食后以温水送下。

【主治】眼胎赤，兼生翳膜，疼痛。

62430 **独圣青金丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十六引《灵苑方》。

【组成】川巴豆三两（净肉）　硫黄二两（不研。二味同用生绢袋盛，悬于瓷罐中，不得着底，以水煮三日三夜，如水竭即旋添，熟汤取出，弃硫黄，只用巴豆，去皮心）　独活　柴胡　桔梗　干姜（炮）　防风各一两（生）　青黛三两

【用法】上为细末，以水煮面糊为丸，如绿豆大。每服一丸至二丸，食伤虚肿，橘皮汤送下；霍乱吐泻及赤痢，甘草汤送下；白痢，干姜汤送下；赤白痢，干姜、甘草汤送下；水泻，冷水送下；小便不通，灯心汤送下；大便不通，米饮送下；妇人血气，当归酒送下；元气虚，炒茴香酒送下；腰痛，茱萸汤送下；小儿疳积，米饮送下；气疾，橘皮汤送下；气块癥癖，热酒送下；伤寒头痛，甘草汤送下，临卧时服。如脏腑实热，临时更加减丸数。

【主治】小儿疳积。

62431 **独圣黑龙丸**

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】草乌头（炮，去皮）半斤　墨二两　白僵蚕（生）　甘松（去土）　零陵香各半两　半夏（汤洗去滑，焙干）　莎草根（炒，去毛）　白附子（生）　白芷　麻黄（去根节）　芍药各一两半　天南星（生）　乌头（炮裂，去皮脐）各二两　藿香叶一两　山芋一两

【用法】上为末，以法酒二升，米醋一升，面二两，熬糊为丸，如弹子大。每服半丸，薄荷茶化下；酒化下亦得。

【主治】一切风气走注四肢，百骨节疼痛，及闪肭肢节。

62432 **独味麻黄汤**

《痘治理辨》。为《圣惠》卷五十九“麻黄汤”之异名。见该条。

62433 **独乳延生丸**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】茯苓一斤（打碎）

【用法】用牛乳数斤，人乳更妙，在铜器内慢煎，随煎随搅，俟稠，以茯苓收之，晒干，磨细，糯米汤为丸。每服二三十丸，白汤送下。

【主治】痨症。

62434 **独活二妙丸**

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】独活　黄柏

【主治】外感湿热伤于太阳，筋挛，左脉洪数。

【备考】原书治上证，须与羌活冲和汤或四味舒筋汤合用。

62435 **独活干姜汤**

《普济方》卷三五〇。为《经效产宝》卷中“独活汤”之异名。见该条。

62436 **独活白术散**

《圣济总录》卷十六。为《外台》卷十五引《古今录验》“独活散”之异名。见该条。

62437 **独活当归汤**

【方源】方出《千金》卷三引《小品方》，名见《普济方》卷三五〇。

【异名】当归独活汤（《医略六书》卷三十）。

【组成】独活八两　当归四两

【用法】上㕮咀。以酒八升，煮取四升，去

滓，分四服，日三夜一，取微汗。

【主治】①《千金》引《小品方》：产后中柔风，举体疼痛，自汗出。②《医略六书》：产后中风，脉弦涩。

【方论选录】《医略六书》：产后血虚亏乏，风邪袭入经中，营血不能灌溉，故肢体不仁，疼痛不止。当归养血以荣经脉，独活祛邪以除痹痛。水、酒合煎，使荣气内充，风邪外解，而经脉清和，营血溉注，焉有肢体不仁，疼痛不愈乎？

62438 独活防风汤

【方源】《云岐子保命集》卷十三。

【组成】麻黄（去节） 防风 独活各一两 桂心 羚羊角屑 升麻 甘草 酸枣仁 秦艽各半两 川芎 当归 杏仁（制）各七分

【用法】上㕮咀。每服四钱，加生姜四片，竹沥一合，水煎服。

【主治】妊娠中风，角弓反张，口噤语涩，谓之风痉，亦名子痫。

62439 独活防风汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十二。

【组成】桂枝 独活 防风各一两 芍药三两 甘草半两

【用法】每服一两，水煎，温服。

【主治】柔痉。

62440 独活防风散

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】独活（去芦头） 防风（去叉）各二两 牛膝（去苗）一两半 当归（切，焙） 芍药 秦艽（去苗土） 白术各一两

【用法】上为散。每服三钱匕，空心豆淋酒调下，一日三次。

【主治】产后柔风。

62441 独活红花汤

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【异名】丝六（《痧症全书》卷下）、二十二号履象方（《杂病源流犀烛》卷二十一）。

【组成】独活 红花 桃仁（去皮尖） 蒲黄 玄明粉 白疾藜（炒，为末） 乌药各一钱 香附三分 枳壳七分

【用法】水二钟，煎七分，微温服。

【主治】痧胀因于血郁。

62442 独活苍术汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】独活 苍术 防风 细辛 川芎 甘草

【主治】少阴寒湿腰痛。

【加减】寒甚，加生姜、桂。

62443 独活败毒散

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】独活 木通 柴胡 黄芩 桔梗 枳壳 甘草 钩藤 广皮 苏梗

【主治】外感胁痛。

62444 独活细辛汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】独活 细辛 川芎 秦艽 生地 羌活 防风 甘草

【主治】少阴经头痛。

【加减】有风，加荆芥，倍防风；有寒，加麻黄、桂枝；有暑，加黄芩、石膏；有湿，加苍术、白芷；有燥，加石膏、竹叶；火旺，加知母、黄柏。

62445 独活细辛散

【方源】《校注妇人良方》卷三。

【异名】独活散（《医部全录》卷二二三）。

【组成】独活 细辛 附子（炮，去皮脐） 甘菊花 麻黄（去芦） 白芷 五味子（杵，炒） 紫菀茸 赤茯苓 肉桂 白术 川芎 桑白皮 杏仁（麸炒，去皮） 防风各一钱 甘草（炙）半钱

【用法】水煎服。

【主治】肺脏中风，胸满短气，冒闷汗出，嘘吸颤掉，声嘶体重，四肢痿弱，其脉浮，昼愈夜甚，偃卧冒闷，或头痛项强，背痛鼻干，心闷语謇，胸中少气，四肢疼痛。

62446 独活秦艽汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】独活 秦艽 防风 川芎 苍术

【用法】水煎服。

【主治】少阴经风湿腰痛，引脊内廉者。

62447 独活消痰饮

【方源】《治痘全书》卷十四。

【组成】独活五分 陈皮四分 桔梗七分 贝母五分 甘草三分 白芍六分 杏仁四分 元参三分 石菖蒲五分

【用法】水煎服。

【主治】痘靥后呛喉，谵语。

62448 独活消痰饮

【方源】《疡医大全》卷三十三。

【组成】半夏 天南星 干葛 羌活 木通 甘草各等分

【用法】水煎服。

【主治】痘疹。

62449 独活通经汤

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】桑寄生五钱 秦艽三钱 独活 川芎各二钱 香附三钱 姜黄二钱 焦艾三钱 防风二钱

【用法】水煎，温服。

【功用】祛风散寒行滞。

【主治】风寒搏击，月经数月不行，面青，四肢作痛，关节不利，少腹冷痛，恶风怕冷，腰痠背寒，或有头痛，或胸闷泛嘔，舌淡口和，苔白而润，脉浮紧。

62450 独活黄耆汤

【方源】《幼幼新书》卷十三引张涣方。

【组成】独活 绵黄耆 酸枣仁各一两 羚羊角（屑） 桑根白皮（锉） 肉桂 麻黄（去根节，称） 川芎各半两

【用法】上为细末。每服一大钱，以水一盏，加生姜、薄荷各三片，煎至五分，去滓，放温热服。

【主治】小儿中风拘挛。

62451 独活寄生丸

《全国中药成药处方集》（武汉方）。即《千金》卷八“独活寄生汤”改为丸剂。见该条。

62452 独活寄生汤

【方源】《千金》卷八。

【异名】独活汤（《圣济总录》卷一六二）、万金汤（《朱氏集验方》卷一）。

【组成】独活三两 寄生 杜仲 牛膝 细辛 秦艽 茯苓 桂心 防风 芎䓖 人参 甘草 当归 芍药 干地黄各二两

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分三服，温身勿冷。服汤，取蒴藋叶火燎，厚安席上，热眠上，冷复燎之。冬月取根，春取茎，熬，卧之佳。

【功用】①《千金》：除风消血。②《方剂学》：祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血。

【主治】痹证日久，肝肾两亏，气血不足，腰膝疼痛，肢节屈伸不利，或麻木不仁，畏寒喜温，心悸气短，舌淡苔白，脉象细弱。

①《千金》：腰背痛，因肾气虚弱，卧冷湿地，当风所得，不时速治，流入脚膝，为偏枯冷痹，缓弱痛重，腰痛挛脚重痹；新产便患腹痛，不得转动，腰脚挛痛，不得屈伸，痹弱。②《普济方》引《简易方》：风湿搏于腰背，气血凝滞，连引疼痛。③《普济方》引《如宜方》：历节走注，彻骨节疼痛，风湿气毒。④《保婴撮要》：鹤膝风，气血虚弱，四肢颈项等处肿，不问肿溃，日久不敛。⑤《外科理例》：风湿流气，有毒自手足起，遍身作痛，颈项结核如贯珠。⑥《医方集解》：肝肾虚热，风湿内攻，腰膝作痛，冷痹无力，屈伸不便。

【加减】喜虚下利者，除干地黄。

【方论选录】①《医方集解》：此足少阴、厥阴药也。独活、细辛入少阴，通血脉，偕秦艽、防风疏经升阳以祛风；桑寄生益气血，祛风湿，偕杜仲、牛膝健骨强筋而固下；芎、归、芍、地所以活血而补阴；参、桂、苓、草所以益气而补阳。辛温以散之，甘温以补之，使血气足而风湿除，则肝肾强而痹痛愈矣。②《千金方衍义》：风性上行，得湿沾滞，则留着于下，而为腰脚痹重，非独活、寄生无以疗之。辛、防、秦艽，独活之助，牛膝、杜仲，寄生之佐，桂、苓、参、甘以补其气，芎䓖、芍、地以滋其血，血气

旺而痹着开矣。③《成方便读》:熟地、牛膝、杜仲、寄生补肝益肾,壮骨强筋;归、芍、川芎和营养血,所谓治风先治血,血行风自灭也;参、苓、甘草,益气扶脾,又所谓祛邪先补正,正旺则邪自除也;然病因肝肾先虚,其邪必乘虚深入,故以独活、细辛之入肾经,能搜伏风,使之外出;桂心能入肝肾血分而祛寒;秦艽、防风、为风药卒徒,周行肌表,且又风能胜湿。

【备考】本方改为丸剂,名"独活寄生丸"(见《全国中药成药处方集》)。

62453　独活寄生汤

【方源】《鸡峰》卷四。

【组成】独活　寄生　细辛　杜仲　牛膝　防风　芎　桂　熟地黄各等分

【用法】上为细末。每服三钱,以水一大盏,煎至六分,去滓温服,一日二次。服讫温身,勿令冷也。取蒴藋菜火燎,厚安置床上,热卧之上,冷复燎之。冬月取根,春取茎,熬热卧之。诸处风湿亦用此方。

【功用】除风消血。

【主治】肾气虚弱,卧冷湿地,当风所得,腰背痛,不速治,喜流入脚膝为偏枯,冷痹缓弱,痛重,或腰胁痛,脚气偏重,毒湿多风。素无风或久履湿冷,或足汗脱履,或洗足当风,湿毒内攻,足胫两腿缓纵挛痛,或皮肉紫破有疮。

62454　独活寄生汤

【方源】《得效》卷三。

【组成】独活二两半　真桑寄生(无则用川续断代)　杜仲(切,炒断丝)　北细辛　白芍药　桂心　芎䓖　防风(去芦)　甘草　人参　熟地黄(洗)　大当归各二两

【用法】上锉散。每服四钱,水二盏煎,空心服。

【功用】除风活血,解风寒暑湿之毒。

【主治】风伤肾经,腰痛如掣,久不治,流入脚膝,为偏枯冷痹缓弱之患;及新产腰脚挛疼,历节风湿,脚气;产后血虚生风,手足抽掣,筋脉挛急,时发搐搦,半身不遂;或因劳役太早,风邪乘间而入。

【加减】痛甚,加黑牵牛少许(炒熟,研);有痰,间服加味寿星丸。

62455　独活寄生汤

【方源】《慎斋遗书》卷七。

【组成】白芍　杜仲　归身　防风　白芷　人参　细辛　桂心　熟地　牛膝　川芎　寄生　甘草各一两　独活三两

【用法】加生姜,水煎服。

【主治】鹤膝风,痛甚,因于风者,并主痛风。

62456　独活寄生汤

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】熟地五钱,独活一钱半　当归三钱　官桂一钱半　白芍一钱半(酒炒)　川芎一钱　茯苓三钱　杜仲三钱(酒炒)　牛膝三钱(酒炒)　桑寄生三钱(酒炒)

【用法】水煎,去滓温服。

【主治】产后脚气疼痛,脉虚涩弦浮者。

【方论选录】产后血室空虚,邪气陷伏而下注于脚,故脚弱疼痛,谓之脚气。熟地补血以荣肝肾,独活疏邪以宣通经络,当归养血荣经,白芍敛阴和血,川芎行血中之气,官桂散营中之寒,茯苓渗湿和脾,杜仲强腰补肾,寄生祛痹强腰脚,牛膝下行壮筋骨。水煎温服,使血气内充,则筋脉滋荣而寒邪自散。

62457　独活寄生汤

【方源】《医医偶录》卷一。

【组成】独活　桑寄生　防风　秦艽　威灵仙　牛膝　茯苓各一钱　桂心五分　细辛　炙草各三分　当归　金毛狗脊各二钱

【主治】产后腰痛,上连脊背,下连腿膝。

62458　独活寄生汤

【方源】《妇科胎前产后良方注评》。

【组成】独活八分　桑寄生八分　牛膝八分　木瓜　薏米八分　秦艽六分　续断八分　当归尾八分　生地六分　茯苓八分　芍药(炒)五分　焦杜仲八分　甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】产后腿脚无力,不能动履。

62459 **独活续命汤**

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】麻黄（去根节）一两 人参（去芦头）一两 黄芩一两 芍药一两 芎䓖一两 甘草（锉，炙）一两 防己半两 杏仁（去皮，炒黄，细切）一两 桂一两 防风（去芦头）一两半 附子（炮，去皮脐，细切）三两 白花蛇肉三钱 独活三钱 干蝎三钱

【用法】上为粗末。每服三钱匕，以水一盏半，加生姜五片，煎取一盏，去滓，食前稍热服。久病风人，每遇天色阴晦，节候变更，宜先服之，以防瘖瘂。

【主治】卒暴中风，不省人事，渐觉半身不遂，口眼㖞斜，手足战掉，语言謇涩，肢体麻痹，神情昏乱，头目眩重，痰涎并多，筋脉拘挛，不能屈伸，骨节烦痛，不得转侧；及诸风，脚气缓弱。

62460 **独活续断汤**

【方源】《外台》卷十七引《古今录验》。

【组成】独活二两 续断二两 杜仲二两 桂心二两 防风二两 芎䓖三两 牛膝二两 细辛二两 秦艽三两 茯苓三两 人参二两 当归二两 芍药二两（白者） 干地黄三两 甘草三两（炙）

【用法】上切。以水一斗，煮取三升，分三服。温将息，勿取冷，宜用蒴藋叶火燎，厚安床上，及热卧上，冷即易之，冬日取根，捣用，事须熬之。

【主治】肾气虚弱，卧冷湿地，当风所得，腰痛，不时愈，久久流入脚膝，冷痹，痛弱重滞，或偏枯，腰脚疼挛，脚重急痛。

【宜忌】忌芜荑、生葱、生菜、海藻、菘菜、酢物。

62461 **独活葛根汤**

【方源】《外台》卷十四注文引《范汪方》。

【异名】独活汤（《千金》卷七）。

【组成】独活 桂心 干地黄 葛根 芍药各三两 生姜六两 麻黄（去节） 甘草（炙）各二两

【用法】上切。以清酒三升，水五升，煮取三升，温服五合，一日三次。

【主治】①《外台》引《古今录验》：中柔风，身体疼痛，四肢缓弱欲不随，产后中柔风。②《千金》：恶风毒气，脚弱无力，顽痹，四肢不仁，失音不能言，毒气冲心。

【宜忌】忌生葱、芜荑、海藻、菘菜。

【备考】方中独活，原作羌活，据《千金》改。

62462 **独活犀角汤**

【方源】《外台》卷十八引《崔氏方》。

【异名】独活汤（《圣济总录》卷八十二）。

【组成】独活三两 犀角二两（屑） 石斛二两（先煮） 丹参二两 侧子一两（炮） 防风二两 防己二两 芎䓖二两 生姜三两 当归二两 芍药三两 茯苓四两 桂心一两半 甘草二两（炙）

【用法】上切。以水一斗，煮取二升七合，去滓，分三服，相去十里久再服。服讫任卧，不须取汗，凡服二三剂，隔五日一服。初服此药，觉腹内气散，两脚有力，行动无妨，或可即停。可常服香豉酒，灸三里穴、绝骨各三百壮。

【主治】脚气毒冲心，变成水，身体遍肿，闷绝欲死者。

62463 **独活解噤膏**

【方源】《外台》卷二十二引《删繁方》。

【组成】独活 芎䓖各三两 天雄一两（炮） 防风一两 蜀椒二合 莽草十叶 细辛 桂心各一两 苦李根皮三两 猪肪二升

【用法】上㕮咀，绵裹，以苦酒一升，淹渍一宿，以猪肪微火煎之，去滓膏成，凝。以绵裹少许，口含于舌下压之，每日换三次。

【主治】小肠腑寒，舌本缩，口噤唇青。

62464 **独蒜涂脐方**

【方源】《圣济总录》卷九十五。

【异名】独蒜通便方（《景岳全书》卷六十）。

【组成】独颗大蒜一枚 栀子仁三七枚 盐花少许

【用法】上捣烂，摊纸上。贴脐。良久即通；未通，涂阴囊上。

【主治】小便不通。

62465 **独蒜通便方**

《景岳全书》卷六十。为《圣济总录》卷九十五"独蒜涂脐方"之异名。见该条。

62466 **独效苦丁香散**

【方源】方出《永类钤方》卷十三，名见《普济方》卷十八。

【组成】苦丁香(即甜瓜蒂)半两

【用法】上为末。每服一钱，井花水调满一盏服之。得大吐之后，熟睡，勿惊之，自是遂安。凡吐能令人眼翻，吐时令闭双目，或不省人事，则令人以手密掩之。吐不止，以生麝香少许，温汤调解之。

【主治】惊忧之极，痰犯心包，忽患心疾，癫狂不止。

饼

62467 **饼金散**

【方源】《普济方》卷二九四。

【组成】砒霜一两　砒黄脚一两　巴豆半两(去皮，出油)　木鳖子一两(去皮，研如泥)

【用法】上为细末，入石脑油和一块，用纸二十四重裹药，瓷盒内盛，入地二尺埋，两个月取出，阴干；再入轻粉一钱，雄黄半钱，粉霜二两，乳香一钱，没药三钱，蟾酥一钱，同前药研为细末。先于疮子顶上灸三炷，唾调涂之；上用纸封三重，每日上，次日洗去药。

【功用】枯瘤子。

胚

62468 **胚矾散**

【方源】《普济方》卷五十五引《海上方》。

【组成】白矾胚　乌贼骨各一钱　麝香少许

【用法】上为末。吹入耳内，次用绵杖缴脓汁。

【主治】耳中脓出。

胆

62469 **胆贝散**

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】川贝母　生石膏各三钱　花粉七分　芒消八分

【用法】上药各为细末，用雄猪胆一枚，调匀风干，研细末。吹喉。

【主治】咽喉乳蛾，一切喉症。

62470 **胆连丸**

《普济方》卷三八〇引《傅氏活婴方》。为《医方大成》引《汤氏方》(见《医方类聚》卷二五五)"芦荟丸"之异名。见该条。

62471 **胆连丸**

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】干绿豆粉四两　黄连(细末)四钱

【用法】上二味盛于盅内，用猿猪胆四个，取汁入末内，加麦面和匀为丸，如绿豆大。每日十五丸，盐汤送下；服三日，再不必服。如口疮，噙一丸，一日即愈。

【主治】火眼，口疮。

62472 **胆矾丸**

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】石胆矾(研)　芦荟(研)各半两　龙脑(研)　麝香(研)各一钱　丹砂(研)　胡黄连末各一分　黄连末一两(用豮猪胆一枚，入末在内，以好醋煮十余沸取出，挂候干，研为末)

【用法】上为细末，醋煮面糊为丸，如绿豆大。每服十丸，早晨、临卧温米饮送下。

【主治】小儿脾积气，肌瘦。

62473 **胆矾丸**

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】胆矾一钱(真者，为粗末)　绿矾(真者)二两　大枣十四个(去核)　好醋一升(上药同煎，熬令枣烂和后药)　使君子二两(去壳)　枳实(去瓤，炒)三两　黄连　诃黎勒(去核，并为粗末)各一两　巴豆二十七枚(去皮，破之。上五味同炒令黑，约三分干，入

后药） 夜明砂一两 虾蟆（烧灰存性）一两 苦楝根皮（末）半两

【用法】后三物再同炒，候干，同前四物杵罗为末；却同前膏和，入臼中，杵千下；如未成，更旋入熟枣肉，亦不可多，恐服之难化；太稠即入温水，可丸即丸，如绿豆大。每服二三十丸，米饮、温水送下，不拘时候。

【功用】消癖进食，止泻和胃，追虫。

【主治】小儿疳病。

62474 **胆矾丸**

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】胆矾一斤（泥裹，烧通赤） 皂子一升（煮去皮，焙干） 白鸡冠花一斤 京三棱四两

【用法】上为细末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，米饮送下。

【主治】肠痔。

62475 **胆矾丸**

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】土马鬃（烧存性） 石马鬃（烧存性） 半夏各一两 生姜二两 胡桃十个 真胆矾半两 川五倍子一两

【用法】上为末，和作一块，绢袋子盛，如弹子大。热酒、水各少许浸药绞汁，淋洗头发。

【主治】男子年少而鬓发斑白。

62476 **胆矾丸**

《卫生宝鉴》卷十四。为《本事》卷三“紫金丹”之异名。见该条。

62477 **胆矾散**

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】胆矾（飞） 乳香（研） 铅丹（飞）各一钱

【用法】上为细散。每用纸捻子点少许贴患处。如肉紫烂臭，药到便红。

【主治】小儿走马疳。

62478 **胆矾散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】胆矾一两（火煅白色） 龙骨半两（五色者） 白石脂半两 黄丹二钱（火飞） 蛇蜕一条（全者，烧灰别研） 麝香半钱（别研）

【用法】上药除蛇蜕、麝香末外，余为细末，同蛇蜕、麝香末和匀。先用葱椒汤洗净，揾干，次用药少许，干掺疮口；如疮口小，用纸捻子点药纴入疮口内，一日三次。

【主治】附骨漏疮，焮红疼痛，侵溃，脓水不绝，久不生肌。

62479 **胆矾散**

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】胆矾一两（入坩锅子内，烈火煅令白色，出火毒一宿） 麝香一字（别研）

【用法】上为细末。先用葱盐汤洗患处，揾干，敷药少许。

【主治】嵌甲。

62480 **胆矾散**

【方源】《直指》卷二十一。

【组成】鸭嘴胆矾半钱 全蝎二个

【用法】上为末。以鸡翎蘸药，入喉中，须臾破开声出；次用生青荷研细，井水调下，候吐出毒涎即愈，未吐再服。

【主治】酒面热甚，咽喉肿结闭塞。

62481 **胆矾散**

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】胆矾一钱（飞过） 硇砂二钱

【用法】上为细末。点疮肿处。立穿，穿则合疮口药。

【主治】咽喉疮。

62482 **胆矾散**

【方源】《普济方》卷六十七。

【组成】生肌散一两 芦甘石三钱 胆矾半钱

【用法】上为末。贴之。

【主治】牙疳。

62483 **胆矾散**

【方源】《医方类聚》卷七十五引《经验秘方》。

【组成】鸭嘴胆矾 米醋

【用法】将鸭嘴胆矾研末，用箸头卷少绵

子，先于米醋中蘸湿，次蘸药末，令人擘患人口开，将箸头药点人喉中肿处，其脓血即时吐出；如不能开口者，用生姜一块如栗子大，剜一小孔，入巴豆肉一粒于内，以小油小半盏，安砂盆中，将姜磨尽，灌姜油于喉，即时吐出脓血，其效尤速。

【主治】喉闭，脓血胀塞喉中，语声不得，命在须臾。

62484　**胆矾散**

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】雄鹅胆二个　黄柏末五分　百草霜五分　青鱼胆(枯矾收)五个　刺毛窠一两(烧存性。内有虫者)

【用法】上为末。吹喉。

【主治】喉癣，喉风。

62485　**胆矾散**

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】胡黄连五分　胆矾　儿茶各五厘

【用法】上为末。敷患处。

【主治】牙疳。

62486　**胆草散**

【方源】《种痘新书》卷九。

【组成】胆草　甘草　蒺藜　白芷　防风　黄连　虫退　木贼　栀子

【主治】痘疹，羞明障翳。

62487　**胆星丸**

【方源】《直指小儿》卷一。

【组成】牛胆南星半两　朱砂　防风各二钱　麝一字

【用法】上药用腊月黄牛胆汁和南星末作饼子，挂当风处四十九日，和药末研细，浸牛胆皮汤为丸，如梧桐子大。每服一丸，井花水调下。

【功用】镇心压惊，利痰解热。

【主治】小儿惊热。

62488　**胆星丸**

【方源】《理瀹》。

【组成】陈胆星一两五钱　犀角　羚角各一两　生龙齿七钱　白芥子五钱　辰砂一钱

【用法】陈米汤为丸，金箔为衣。临用以一丸搽胸背，并敷脐。

【主治】小儿痰迷不醒，口流涎沫，手足拘挛。

62489　**胆星汤**

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】陈胆星　广橘红　苏子　钩藤　甘草　菖蒲

【主治】外感中风，痰涎壅盛。

【加减】里热甚，加山栀、黄连；肝胆热，加青黛、海石。

62490　**胆星汤**

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】陈胆星　柴胡　黄芩　陈皮　甘草　青黛　海石

【主治】胆火成痰，四肢痿软。

62491　**胆蛔汤**

【方源】《临证医案医方》。

【组成】槟榔15克　苦楝根皮6克　使君子9克(炒香)　炒榧子9克　乌梅3克　木香3克　炒枳实3克

【功用】驱蛔，解痉，止痛。

【主治】胆道蛔虫病。右上腹阵发性剧痛，大汗淋漓，面色苍白，屈膝体位。

【备考】本方用量为6～10岁儿童用量。

62492　**胆麝散**

【方源】《疡科选粹》卷五。

【组成】熊胆二分　麝香半分　黄连三钱

【用法】上为细末。先用花椒、艾叶、防风、荆芥汤洗净，水调药末，敷患处。

【主治】痔疮。

62493　**胆矾锭子**

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】白矾二钱　雄黄　蟾酥　胆矾　乳香各一钱

【用法】上为细末，用水化皮胶为锭子。擦患处。

【主治】蝎螫疼痛。

62494　**胆归糖煎散**

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】龙胆草　细辛　当归　防风各二两

【用法】用沙糖一小块同煎服。

【主治】血灌瞳神，目暴赤疼痛，或生翳膜。

62495 **胆汁二连膏**

【方源】《眼病的辨证论治》。

【组成】川连1克　胡黄连1克　牛胆汁50毫升　精制蜂蜜5毫升

【用法】先将川黄连洗净，晒干后为粗末，加蒸馏水适量，煎二次，集二次煎出液放冷后，滤纸滤过；滤出液盛于蒸发皿中，加入牛胆汁、净蜂蜜，混和均匀后，在重汤锅上蒸发至全量为50毫升，测量酸碱度（pH值），酌加硼砂、硼酸、精制食盐、冰片，使之成中性，以减少点眼时的刺激性。

【主治】暴风客热，天行赤眼，赤脉传睛。

62496 **胆草一物汤**

【方源】《简明医彀》卷二。

【组成】龙胆草

【用法】水煎服。

【主治】阳狂。

62497 **胆星天竺丸**

【方源】《痘疹传心录》卷十八。

【组成】胆星一两　半夏　白附各五钱　天竺黄三钱　天麻、防风各二钱　辰砂一钱

【用法】上为末，甘草膏为丸，如芡实大。每服一丸，薄荷汤化下。

【主治】①《痘疹传心录》：小儿不寐，脾肺气虚有痰者。②《准绳·幼科》：小儿痰涎壅盛，喘嗽不休。

62498 **胆道驱蛔汤**

【方源】《新急腹症学》。

【组成】槟榔一两　使君子八钱　苦楝皮五钱　川朴三钱　元胡五钱　木香五钱　大黄五钱

【功效】利胆驱虫。

【主治】胆道蛔虫病蛔滞型。症见发热，不思饮食，腹痛拒按，大便秘结，小便短赤，脉象弦滑或滑数，舌苔黄腻或黄燥。

62499 **胆道排石汤Ⅰ号**

【方源】《新急腹症学》引青岛市立医院方。

【组成】柴胡四钱　郁金四钱　香附四钱　金钱草一两　木香六钱　枳壳四钱　大黄一两

【主治】胆道系统感染及胆石症气郁型。

62500 **胆道排石汤Ⅰ号**

【方源】《新急腹症学》引遵义医学院方。

【组成】枳壳三钱　木香六钱　大黄五钱　枳实五钱　茵陈十钱　黄芩三钱　银花三钱　芒消三钱

【主治】胆系感染，胆石症湿热型。

62501 **胆道排石汤Ⅱ号**

【方源】《新急腹症学》引青岛市立医院方。

【组成】双花　连翘　金钱草　茵陈　郁金各一两　木香六钱　黄芩　枳实各四钱　大黄一两　芒消二钱

【主治】胆道系统感染、胆石症湿热性或脓毒型。

62502 **胆道排石汤Ⅱ号**

【方源】《新急腹症学》引遵义医学院方。

【组成】黄连二钱　黄芩三钱　枳壳三钱　木香三钱　大黄二钱

【主治】胆系感染、胆石症湿热型。

62503 **胆道排石汤Ⅲ号**

【方源】《新急腹症学》引遵义医学院方。

【组成】枳壳三钱　青皮三钱　木香三钱　黄芩三钱　柴胡三钱　茵陈十钱　陈皮二钱　白术四钱

【主治】胆系感染、胆石症气郁型。

62504 **胆道排石汤Ⅳ号**

【方源】《新急腹症学》引遵义医学院方。

【组成】枳壳三钱　木香四钱　黄芩三钱　虎杖五钱

【主治】胆系感染、胆石症湿热型。

62505 **胆道排石汤Ⅴ号**

【方源】《新急腹症学》引遵义医学院方。

【组成】枳壳三钱　木香三钱　川楝子三

钱　黄芩三钱　金钱草十钱　大黄二钱

【主治】胆系感染、胆道蛔虫病、胆石症气郁型。

62506 **胆道排石汤Ⅵ号**

【方源】《新急腹症学》引遵义医学院方。

【组成】枳壳五钱　木香五钱　延胡五钱　栀子四钱　虎杖十钱　金钱草十钱　大黄五钱

【主治】胆系感染、胆石症湿热型。

胜

62507 **胜丸子**

【方源】《幼幼新书》卷三十一引《谭氏殊圣方》。

【异名】胜金丸。

【组成】胡黄连(末)半钱　芦荟　脑　麝各一字　牛黄半字(四味并研)

【用法】上为末，以熊胆为丸，如豆大。每服三五丸，生米泔汁研下。

【主治】①《幼幼新书》引《谭氏殊圣方》：小儿虫咬痛攒心，昼夜连声忍不禁。②《幼幼新书》引《朱氏家传》：因惊过发痫，但或受风热，积未洗除，心脏积热壅毒，虽设汤散疗治，日久不退，至热过涎生，膈上壅塞，心胸气乱交横，变生痫疾，其候发来一日数次，变候转频吐泻，气弱未曾补治。

【宜忌】忌一切毒物。

62508 **胜风汤**

【方源】《疡医大全》卷十一引《何氏济生》。

【组成】白术(土炒)五分　柴胡七分　枳壳(炒)　羌活　白芷　川芎　独活　防风　前胡　薄荷　桔梗各四分　荆芥　甘草各三分　黄芩六分　杏仁(去皮尖，炒)三分

【用法】水煎服。赤肿作痛，生地酒浸，捣烂，厚涂眼上。

【主治】风热上攻，白珠赤甚，暴肿痛甚者。

【加减】烂弦眼，加蝉蜕(去足翅)、僵蚕(炒)各六分。

62509 **胜水汤**

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】茯苓一两　车前子三钱　人参三钱　远志一钱　甘草三分　菖蒲一钱　柴胡一钱　白术一两　陈皮五分　半夏一钱

【用法】水煎服。

【功用】补心生胃，散痰利水。

【主治】水气攻心，终日吐痰，少用茶水则心下坚筑，短气恶水。

62510 **胜玉散**

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】角蒿(五月采者，去根，九蒸九晒，为末)　胡麻(九蒸九晒，为末)

【用法】上二味，每一料用角蒿末一斤、胡麻末半斤，更入乳香一两，别研为细末，都拌匀。每服一钱或二钱匕，茶、酒任下。

【主治】恶风，诸风。

62511 **胜玉膏**

《医林改错》卷下。为原书同卷“玉龙膏”之异名。见该条。

62512 **胜邪汤**

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】甘草　柴胡各一钱　当归　白芍各五钱　枳壳五分　白术三钱　附子一分　人参二钱

【用法】水煎服。

【功用】补正祛邪。

【主治】正虚热衰而厥。

62513 **胜冰丹**

【方源】《局方》卷六(续添诸局经验秘方)。

【组成】白药子一两半　山豆根　红内消　黄药子　甘草(炙)　黄连各二两　麝香(研)　龙脑(研)各二钱

【用法】上为末，用建盏盛，于饭上蒸，候冷，次入脑、麝，令匀，炼蜜为丸，如鸡头大。每用一丸，含化。又用津唾于指甲上，磨少许，点赤眼。

【主治】三焦壅盛，上冲头目，赤热疼痛，口舌生疮，咽喉不利，咽热有碍，神思昏闷。

62514 **胜冰散**

【方源】《洪氏集验方》卷二。

【组成】茵陈半两（焙） 防风半两（焙） 滑石一两（别研细） 当归半两（焙） 地龙半两（研） 乳香半两（别研） 螺青一两（研） 马牙消半两（研，各取末）

【用法】上药都拌匀，用新汲水调涂肿处，不可令稀，时时涂之，勿使至干。

【主治】肿毒发背，一切痈疽，四边赤肿日增。

62515 胜军丸

【方源】《沈鲐翁医验随笔》。

【组成】川雅连五钱 奎砂仁五钱 上雄精三钱 广木香五钱 广郁金五钱 生明矾五钱 人中黄三钱 檀香 降香各三钱 生姜粉三钱 真獭肝二钱 石菖蒲三钱 焦山楂四钱 公丁香三钱 生香附五钱 鬼箭羽四钱

【用法】上为细末，用银花二两，防风七钱，藿梗七钱，净黄土二两，四味浓煎汁，露清为丸，朱砂为衣，如梧桐子大。轻者服一钱半，重者三钱，小儿减半。

【主治】兵凶饥馑后，饮水不洁，触受秽浊，腹痛呕吐泄泻，四肢厥逆。

62516 胜阴丹

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】柴胡 羌活 枯白矾 甘松 升麻各二分 川乌头 大椒 三奈子以上各五分 蒜七分 破故纸八分（与蒜同煮，焙干称） 全蝎三个 麝香少许

【用法】上为细末，加入坐药龙盐膏三钱内，炼蜜为丸，如弹子大。绵裹留系在外，纳丸药阴户内，日易之。

【主治】冬后一月，微有地泥冰泮，其白带再来，阴户中寒。

62517 胜红丸

【方源】《永类钤方》卷十二引《简易》。

【组成】陈皮 青皮 三棱 莪术（二味同醋煮） 干姜（炮） 良姜（炒）各一两 香附子（净炒）二两 （一方加神曲、麦芽）

【用法】上为末。醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，姜汤送下。

【主治】①《永类钤方》引《简易》：脾积气滞，胸胁满闷，气促不安，呕吐清水，丈夫酒积，女人脾血积气，小儿食积。②《医方类聚》引《简易》：酒积不食，干呕不止，背胛连心痛，及两乳痛；妇人诸般血癥气瘕；小儿骨瘦面黄，肚胀气急，不嗜饮食，渐成脾劳。

62518 胜红丸

【方源】《瑞竹堂方》卷一。

【组成】三棱（醋炙） 广术（醋炙） 青皮（去瓤，炒） 陈皮（去白） 干姜（炮） 良姜 枳实（去瓤，炒） 白术（煨） 萝卜子（炒，别研）各一两 香附子二两（炒，去毛）

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，姜汤或木香汤、陈皮汤送下，不拘时候。

【功用】消食快气，美进饮食。

【主治】心腹痞满。

62519 胜红丸

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷五。

【组成】三棱 蓬术（各酒浸拌） 良姜 青皮 陈皮各一斤 香附（醋煮） 山楂 神曲 干姜各二斤

【用法】上为末，醋糊为丸。每服五十丸，如痛泻，姜汤送下；不痛不泻，开水送下。

【主治】日久腹满呕吐，每遇食厚物即发者。

62520 胜红丸

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】陈皮 青皮 莪术 三棱 炮姜 良姜各五钱 香附一两 枳实 姜连各五钱

【用法】醋糊为丸服。

【主治】酒积、血积、食积。

62521 胜红丸

【方源】《叶氏女科》卷二

【组成】红花子（研，去油）十粒 百草霜一钱

【用法】上为末，粳米糊为丸。葱汤送下。

大黄以除风燥；如阴寒证，为寒结秘而大便不通者，以《局方》半硫丸，或加炮附子、干姜煎成，候冰冷服之。

【方论选录】黄耆护皮毛，实腠理，活血气，实表补元气，乃疮家之圣药也；人参补肺气；升麻、真漏芦、葛根三味俱足阳明经药；甘草能调中，和诸药，泻火益胃；连翘走十二经，凡疮中之药不可无者，能散血结与气聚，此疮家之神药也；牡丹皮去肠胃中留滞宿血；生地黄、熟地黄，诸经中和血、生血、凉血药也；白芍药其味酸，其气寒，能补中益气；肉桂大辛热，能散结聚；柴胡功同连翘；昆布味咸，咸能软坚也；麦芽能消食健胃；黄连治烦闷。

【备考】方中柴胡用量原缺。

62527 胜灵丹

《外科医镜》。为《重庆堂随笔》卷下"骊珠散"之异名。见该条。

62528 胜妙散

【方源】《普济方》卷四十六引《卫生宝鉴》。

【组成】苍术四两（泔水浸一宿） 草乌二两半（灰炮） 白芍药一两 何首乌一两 川芎半两 白芷一分 羌活一钱 防风一分 独活一分 藿香半两 地龙一两（去土）

【用法】上为细末。每服一二钱，薄荷茶送下。

【功用】发散外邪。

【主治】头风。暴感风寒。

62529 胜金丸

【方源】《周鼆传授济急方论》。

【组成】泽兰四两 当归 芍药 芜荑 甘草 芎䓖各六分 干姜 桂心各三分半 石膏 桔梗 细辛 茱萸 柏子仁 防风 厚朴 乌头 白薇 枳壳 南椒 金钗石斛 石额 蒲黄 茯苓各三分 白术 白芷 人参 藁本 青木香各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每有所患，热酒研一丸。若死胎不下，胎衣在腹，以炒盐酒研服，未退再服。

【主治】产后血晕，血气及滞血不散，便成癥瘕兼泻，面色黄肿，呕逆恶心，头痛目眩，口吐清水，四肢萎弱，五脏虚怯，常日睡多，吃食减少，渐觉羸瘦，年久变为痨疾。

【宜忌】忌腥腻、热面、豉汁、生葱、冷水、果子等。

【备考】方中石额，《普济方》作"石燕"。

62530 胜金丸

【方源】《幼幼新书》卷三十一引《玉诀》。

【组成】龙骨 远志 牡蛎灰 川大黄各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服三五丸，米饮送下，一日三次。

【主治】胎肿，疝气。

62531 胜金丸

【方源】方出《圣惠》卷五十二，名见《圣济总录》卷三十五。

【异名】灵应丹（《普济方》卷二〇〇引《广南卫生方》）。

【组成】寒水石三分（细研） 砒霜一两（细研）

【用法】上以厚纸两重，糊粘于铫子底，将砒安中，次以寒水石盖上，以匙紧按，将一瓷盏子盖，又以糊纸数重粘四畔缝，不得通气，以竹柴火烧，令下面纸尽，上面纸黄焦为候；待冷再研，于地上出火毒良久，以粟饭为丸，如麻子大。发前以冷醋汤下五丸；如年深者，先以五丸将热茶送下，吐却痰后，再以冷醋汤送下三丸。

【主治】①《圣惠》：久患劳疟瘴等。②《圣济总录》：积年心痛。

【宜忌】忌食热物。

【备考】《圣济总录》本法用法：兼治积年心痛，发时冷姜醋汤下七丸。《普济方》：一法更别丸小者一等，俟小儿服之，以飞过辰砂为衣，候干入瓷盒中盛，于发日早，冷腊茶清下一丸。

62532 胜金丸

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】水银二两 硫黄一两（以上二味同

结成砂子,细研)　棕榈皮一两(烧灰)　干漆一两(捣碎,炒令烟出)　鲤鱼鳞一两(烧灰)　自然铜一两(细研)　狗胆一枚(干者)　麒麟竭一两　当归一两(锉,微炒)　延胡索半两　水蛭一分(炒令微黄)　虻虫一分(微炒令黄,去翅足)　乌蛇一两(酒浸,去皮骨,炙微黄)　桂心半两　乱发一两(烧灰)　没药半两

【用法】上为末,都拌匀,以酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服十丸,以热酒调下,不拘时候。

【主治】妇人久积瘀血在腹内,疼痛不可忍。

62533　胜金丸

【方源】《博济》卷二。

【组成】芫花　大戟　甘遂　牵牛　荆三棱　干漆　青皮　陈皮(去白)　巴豆各半两　硇砂　胆矾各一分

【用法】上除硇砂、胆矾外,余并用生姜半斤捣碎,入好醋一升浸一宿,取出姜不用,控干,焙令干,为末;醋化硇砂并胆矾,煮面糊为丸,如豌豆大。消酒食及常服,茶、酒任下三五丸;妇人心气痛,醋汤下;水气及一切气肿并痢疾,生姜酒下;一切气不和,生姜汤下。

【功用】化积滞,消酒食。

【主治】①《博济》:一切气不和及女人血气肿。②《圣济总录》:脾胃虚寒,宿食不消。

【备考】《圣济总录》有蓬莪术(煨,锉)。

62534　胜金丸

【方源】《博济》卷二。

【组成】小栀子　川乌头各等分

【用法】上药并生为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服十五丸,炒生姜汤送下;如小肠气痛,炒茴香葱酒送下二十丸。

【主治】冷热气不和,不思饮食,或腹痛疠刺。

62535　胜金丸

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】干漆(炒烟尽)半两　桂(去粗皮)　京三棱(生用)各一两

【用法】上为细末,面糊为丸,如梧桐子大。每服一丸,用新绵灰一钱匕,热酒调送下。如有块,即下赤黄水或下血,临卧再服一丸。

【主治】心气痛。

62536　胜金丸

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】贯众　白僵蚕(炒)　芜荑　干漆(炒烟尽)　槟榔(锉)　桂(去粗皮)各一两　厚朴(去粗皮,姜汁炙透)　雷丸各一两半

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五丸,空心、食前温浆水送下。初服三五日,取下诸虫乃效。若虫多,即服药十日以上方验。

【主治】虫动,心痛不可忍。

62537　胜金丸

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【异名】胜金黄连丸(《鸡峰》卷十四)。

【组成】黄连(去须)五两　龙骨四两　草豆蔻(去皮)　赤芍药　当归(切,焙)　干姜(炮)　地榆　橡实各三两　干桑叶　木香各二两　赤石脂　代赭(煅赤,研)各四两

【用法】上为细末,醋煮面糊为丸,如梧桐子大。每服二十丸至三十丸,煎艾醋汤送下,空心、食前服。

【主治】脏寒下痢,脐腹撮痛,肠鸣胀满,里急后重,不思饮食,日渐羸瘦。

62538　胜金丸

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】铜绿　白矾各等分

【用法】上二味以炭火烧令烟尽为度,细研如粉,用沙糖为丸,如豌豆大,于南粉末内滚过。每用二丸,热汤半盏浸化洗眼,如冷更暖,洗三五次。

【主治】风毒眼痒痛,连睑赤烂并暴赤眼。

62539　胜金丸

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】雌黄半两(研)　白矾一两(研)　麝香一大钱(研)

【用法】上药都拌匀,酽醋半盏,银石器中

慢火熬至一半，倾乳钵内研匀，再倾入铫内熬成膏，更入麝香少许(研)，更入蒸饼心少许为丸，如绿豆大。每服十丸，夜卧温浆水送下。仍用一丸手心中浆水化开，涂痔上。三年者，三五服愈。

【主治】痔疾。

62540 胜金丸

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】干漆(炒烟尽) 乌头(炮裂，去皮脐) 狼毒 京三棱(锉碎，炒黄)各一两 紫葳(即凌霄花) 没药 麒麟竭 槟榔各半两(八味同为末) 硇砂(别研如粉)一分 巴豆二七枚(去皮心膜，研出油) 大黄(单捣为末)一两 芫花(单捣为末)半两

【用法】上十二味，先以醋二升熬大黄、芫花二味末，次下巴豆、硇砂同熬令稠；其余八味同为末，用熬者膏和剂；如干硬，更少入炼熟蜜同和剂令得所，为丸如绿豆大。每服七丸至十丸，当归酒调下。

【主治】妇人血积，心腹㽲痛气刺，少腹攻筑，或经候不行，肢节烦疼，痰逆癖块。

62541 胜金丸

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】龙胆 定粉(研) 黄连(去须) 乌梅肉(炒)各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如麻子大。每服十丸，米泔送下。

【主治】小儿疳虫痛。

62542 胜金丸

【方源】方出《阎氏小儿方论》，名见《卫生总微》卷十一。

【组成】黄柏(去皮)半两 赤芍药四钱

【用法】上同为细末，饭为丸，如麻子大。每服一二十丸，食前米饮送下，大者加丸数。

【主治】小儿热痢下血。

【备考】本方方名，《准绳·幼科》引作"黄柏丸"。

62543 胜金丸

【方源】《幼幼新书》卷三十一引《吉氏家传》。

【组成】川楝子(去核，取肉) 续随子肉七十个(去皮) 轻粉一钱

【用法】上为末，稀面糊为丸。每服七丸至十丸，葱白、薄荷汤送下。

【主治】小儿疝气偏坠。

62544 胜金丸

《幼幼新书》卷三十一引《谭氏殊圣方》。为原书同卷"胜丸子"之异名。见该条。

62545 胜金丸

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】肥皂角五寸 马屁勃一分 干枇杷叶三片 厚朴半分 半夏一分 葶苈子半分 甘草 百部各一分 人参半分 吴术 紫菀各一分 青皮四片 scattering蜂窠一分 白茅半分 茯苓 石菖蒲 木通 贝母 百合 杏仁 熟地黄 甘松 麦门冬各一分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，含化，不拘时候。

【主治】肺虚劳，咳嗽不出声者。

62546 胜金丸

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】胡椒十粒

【用法】以新水送下。

【主治】吐不止。

62547 胜金丸

【方源】《本事》卷一。

【异名】朱砂丸(《普济方》卷八十八引《简易》)。

【组成】猪牙皂角二两(捶碎，水一升，同生薄荷一处捣取汁，慢火熬成膏) 生薄荷半斤 瓜蒂末一两 藜芦末一两 朱砂半两

【用法】上将朱砂末一分与二味末研匀，用膏子搜和丸，如龙眼大，以余朱砂为衣。温酒化一丸，甚者二丸。以吐为度，得吐即省，不省者不可治。

【功用】《中风斠诠》：取吐痰涎。

【主治】中风忽然昏醉，形体昏闷，四肢不收，风涎潮于上膈，气闭不通。

【宜忌】《玉机微义》:诸亡血虚家不可用此。

【方论选录】《本事方释义》:薄荷气味辛凉,入手太阴、足厥阴;朱砂气味苦温,入手少阴;瓜蒂气味苦寒,入手阳明;藜芦气味辛温,入手阳明;猪牙皂角气味辛温开窍,入手太阴。中风而致神昏肢痿,气闭不宣,卒暴生涎,声如引锯,非宣通不能效验,即吐法亦宣通之意也。

【备考】《医方类聚》引《医林方》:如吐不止,以葱白汤止之。

62548　胜金丸

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】鸡子一枚　去皮巴豆一粒　腻粉一钱　麝香少许

【用法】上以鸡子一枚,打一眼子,如豆大;入去皮巴豆一粒,腻粉一钱在内,以五十重纸裹于饭甑内蒸三次;取鸡子肉同药研,更入麝香少许细匀,添少糊为丸,如黍米大。食后、临卧温汤送下二三丸。

【主治】小儿疳气瘦弱,腹胀下利白脓,久而不瘥。

62549　胜金丸

【方源】《宣明论》卷三。

【组成】白僵蚕　细辛　天南星　皂角(炙黄)　川乌头(生)　乌蛇(真者,好酒浸,去骨)　白矾(枯)　桔梗　威灵仙　何首乌　草乌头各半两　荆芥穗　川芎各二两

【用法】上为末,酒面糊为丸,如梧桐子大。每服十丸,食后温酒调下。

【主治】痫病。风热惊骇,不时旋运潮搐,口吐痰沫,忽然倒地,不省人事。

62550　胜金丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】贯众　萆薢各等分

【用法】上为细末,醋煮面糊为丸,如梧桐子大。每服四十丸,空心、食前熟水送下。或入麝香少许作散子,每服二钱,煎阿胶汤调下,或酒调亦得。出秽脓血,生肌为效。

【主治】诸般痔疾。

【备考】本方改为散剂,名"胜金散",(见《普济方》)。

62551　胜金丸

【方源】《局方》卷八(宝庆新增方)。

【异名】胜金丹(《医学入门》卷七)。

【组成】槟榔四两　常山(酒浸,蒸,焙)一斤

【用法】上为末,水面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,于发前一日晚,临卧用冷酒吞下便睡,不得吃热物、茶汤之类;至四更尽,再用冷酒吞下十五丸。一方用川常山十六两为末,鸡卵十五只取清为丸,服饵如前法。

【功用】《济阳纲目》:截疟。

【主治】外邪客于脏腑,生冷之物内伤脾胃所致之一切疟病,发作有时,或先寒后热,或先热后寒,或寒多热少,或寒少热多,或但热不寒,或但寒不热,或连日并发,或间日而发,或发后三五日再发,寒则肢体颤掉,热则举身如火,头痛恶心,烦渴引饮,气息喘急,口苦咽干,背膂酸疼,肠鸣腹痛,或痰聚胸中,烦满欲呕。

【宜忌】①《局方》(宝庆新增方):忌食一切热羹汤、粥食,午间可食温粥,至晚方可食热。忌一切生冷、鱼腥等物。②《证治要诀及类方》:忌油腻。

【备考】本方方名,《证治要诀及类方》引作"截疟丹"。《医学入门》本方用法:醋糊丸,绿豆大。每服三十丸,隔夜临卧冷酒送下,次早再进一服;血虚,当归煎汤送下;气虚,人参煎汤送下;痰多,贝母煎汤送下。

62552　胜金丸

【方源】《魏氏家藏方》卷四。

【组成】鹿茸(爁去毛,切片,酥炙青为度)　白茯苓(去皮)　桑螵蛸(酒浸一宿,瓦上焙)　龙骨(煅,别研)　川当归(去芦,酒浸)　熟干地黄(洗)各一两　附子一只(八九钱者,炮,去皮脐)

【用法】上为细末,以肉苁蓉三两,洗净切

片子，用酒一升煮干，研作膏，为丸如梧桐子大。每服三十丸，食后酒、盐汤任下；妇人醋汤送下。

【主治】诸虚不足，小便白浊；妇人子宫久冷。

62553 胜金丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】补骨脂（炒） 杜仲（去粗皮，姜制，去丝） 延胡索（炒） 牛膝（去芦，酒浸）各一两 当归（去芦，洗）三分

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，细嚼，胡桃酒送下，食前服。

【主治】腰疼。

62554 胜金丸

【方源】《妇人良方》卷二。

【异名】不换金丸（原书同卷页）、女金丹（《韩氏医通》卷下）、不换金丹（《景岳全书》卷六十一引《大典》）。

【组成】白芍药 藁本 石脂 川芎（不见火） 牡丹皮 当归 白茯苓 人参 白薇 白芷 桂心 延胡索 白术 没药 甘草（炙）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，空心、食前温酒化下，初产了并用热醋汤化下。

【功用】安胎催生。

【主治】妇人久虚无子，产前产后一切病患；男子下虚无力，积年血风，脚手麻痹，半身不遂；赤白带下，血如山崩；产后腹中结痛，吐逆心痛；子死腹中，绕脐痛；气满烦闷，失盖汗不出；月水不通，四肢浮肿无力；血劳虚劳，小便不禁；中风不语，口噤；产后痢疾，消渴，眼前见鬼，迷运，败血上冲，寒热头痛，面色萎黄，淋涩诸疾，血下无度，血痢不止，欲食无味；产后伤寒，虚烦劳闷；产后血癖，羸瘦。

【备考】本方加沉香，名胜金丹（见《景岳全书》卷六十一引《大典》）。

62555 胜金丸

【方源】《普济方》卷三三一引《得效》。

【组成】当归（去尾） 白芍药 鹿茸（燎去毛，酒炙） 鳖甲 川芎 白术 大艾（炒） 侧柏叶 赤石脂（醋煅） 川白芷 乌贼鱼骨各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如龙眼大。每服一丸，空心盐酒送下；或败棕烧灰调酒送下。

【主治】妇人浑身壮热，头疼，脐下疠痛，下淡红水。

62556 胜金丸

【方源】《普济方》卷二〇七。

【组成】当归二两（用吴茱萸一两炒香熟，去茱萸不用，只用当归） 黄连三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下。

【主治】泻久痢。

62557 胜金丸

【方源】《普济方》卷三八七。

【组成】砒霜一分 黄丹一分

【用法】上以砒霜研细，入丹同研；用鲫鱼一个，去肠肚，入砒霜在内，以纸七重裹湿，将黄泥固济，候干，煅红取出；再研细，露星一宿。

【主治】小儿齁𪖌，肺气喘急，变成龟胸。

62558 胜金丸

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】常山四两（好酒浸一宿，晒干） 槟榔二两 苍术二两（米泔浸一宿 晒干） 草果二两

【用法】上为细末，将前所浸常山余酒煮糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，未发前一日，临卧时冷酒送下即卧，不可言语；直至鸡鸣时，再进七十丸。

【主治】一切寒热疟疾，胸膈停痰。

【宜忌】忌食生冷、热物及鸡、鱼、麸、面之类。

62559 胜金丸

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】大黄　皮消　甘草各一两

【用法】上为细末。每服三钱　蜜一茶匙，空心滚水调下。加减服之。大便下脓血效矣。

【主治】一切痞块，积气发热。

【备考】本方方名，据剂型，当作“胜金散”。

62560　胜金丸

【方源】《医家心法》。

【组成】三棱(醋炒)　莪术(醋炒)　高良姜　人参　陈皮　黄连(酒炒)各三钱

【用法】神曲为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心白滚汤送下。

【主治】咸哮，醋哮。

62561　胜金丸

【方源】《医略六书》卷二十七。

【组成】熟地五两　人参一两半　白术一两(炒)　茯苓一两半　当归三两　白芍一两半(酒炒)　川芎一两　桂心一两半　香附二两(酒炒)　白薇一两(酒炒)　延胡一两半(酒炒)　炙草五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三五钱，温酒送下。

【主治】经迟不孕，脉虚者。

【方论选录】熟地补血，以滋冲任；当归养血，以营经脉；川芎行血海；白芍敛阴血；人参扶元补气，兼通血脉；白术健脾统血，鼓运脾元；茯苓渗湿，以清血室；炙甘草缓中，以益胃气；延胡化血滞，力擅通经；香附解气郁，专主调经；桂心补火暖血；白薇降泄益阴。蜜以丸之，酒以行之，使血气内充，寒滞解散，而经气温暖，腹痛无不自退，岂有经迟不孕之患乎？

62562　胜金丹

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】雌黄二两(兼子者，炒令紫色，细研如粉)　黄丹二两(炒令紫色)

【用法】以人乳拌匀，湿饭甑上蒸一炊久，乳腐为丸，如绿豆大。每服三丸，以金银汤送下，当泻出病根；若病多年，每日空心服三丸至五丸。

【主治】风邪惊痫，心神迷闷，毒风气，鬼疰心痛。

62563　胜金丹

【方源】《博济》卷四。

【组成】大黄三两(用米醋浸两宿，以竹刀子细切，于甑上蒸九度，研为糊)　地龙(去土，醋内炒过)半两　芫花一分(醋炒令黄色，于银器内炒，不得犯铁器)　蓬莪术半两(炮)　川芎半两　当归半两　蒲黄　延胡索半两(于银器内炒)　杜牛膝半两　官桂(去皮)　赤芍药各半两　干地黄半两(以醋微炒)　刘寄奴一分(略炒)

【用法】上为末，倾入大黄膏内，搜为丸，如鸡豆大。每日早晨、临卧用温酒化下一丸；如产后有疾，以炒生姜酒化下一丸；产后，只用温酒化下一丸。

【主治】妇人血海虚冷，脐腹冷疼，肌肉黄瘦，饮食进退，时多困倦，四肢发烦，产前产后诸疾。

【宜忌】月数未多，莫服此药。

62564　胜金丹

【方源】《百一》卷十八。

【组成】牡丹皮　川藁本　人参　川当归　白茯苓　赤石脂(别研)　香白芷　官桂　白薇　京芎　玄胡索　白芍药　白术(米泔浸一宿)各一两　甘草(炙)　沉香(不见火)　没药(别研)各半两

【用法】上件药材皆用温水洗净，捣罗为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一粒，空心温酒送下。妊娠临月服五、六粒即易产；久无子息服二十粒，当月有子。

【功用】安胎催生。

【主治】妇人月水湛浊不通，久无嗣息，血癖气痛，四肢浮肿，呕逆心疼，虚烦劳闷，面色萎黄，崩漏带下，寒热蒸劳，头疼齿痛，血下无度，淋沥诸疾；产后胎结疼痛，伤寒烦渴，泻痢血晕，血劳筋挛，痰盛头疼，败血上冲，血刺泄泻，咳嗽喘急，咯血，血块起伏，气痞气膈，血作腰痛，小便不禁，子死腹中，失盖汗不出，血

风，脚手痹顽，积年血风，半身不遂，凡产后诸疾并皆治之。

62565 胜金丹

【方源】《卫生宝鉴》卷八。

【组成】青薄荷半两 猪牙皂角二两（同薄荷以水二升挼取汁尽，用银石器内慢火熬成膏） 瓜蒂末一两 朱砂（研）一两（留少许为衣） 粉霜半两（研） 洛粉一钱（水银重粉是）

【用法】上四味研匀，入前膏内，人臼内杵三二千杵，为丸如樱桃大，以朱砂为衣。每服一丸，酒磨下；急即研细，酒调灌之。瘫中前如觉有症状，每于四孟月服一丸自愈。有病方可服。

【功用】吐利风涎。

【主治】中风涎潮，卒中不语。

62566 胜金丹

【方源】《卫生宝鉴》卷十八。

【组成】百齿霜（今梳上发之垢也）不以多少

【用法】无根水为丸，如梧桐子大。每服三丸，倒流水送下。食后令病左乳左卧，右乳右卧，温覆出汗。

【主治】妇人吹奶。

【备考】倒流水法：取水倾屋上流下是。

62567 胜金丹

【方源】《袖珍》卷一。

【组成】干姜（末） 黄蜡各等分

【用法】银石器化蜡，入姜末拌匀，为丸如芥子大。每服七丸至二七丸，白痢，酒送下；赤痢，井水送下。

【主治】赤白痢。

62568 胜金丹

【方源】《医方类聚》卷二一二引《仙传济阴方》。

【组成】黑豆一升（炒熟去皮） 香附子末四两半 干姜（炮） 生干地黄各一两

【用法】酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒或米饮送下。

【主治】产后一切诸疾。

62569 胜金丹

《景岳全书》卷六十一引《大典》。即《妇人良方》卷二"胜金丸"加沉香。见该条。

62570 胜金丹

【方源】《保婴撮要》卷十六。

【组成】茄子（通黄极大者）

【用法】上切如指厚，新瓦上焙干，为末。每服二钱，临卧酒调服。一夜消尽，无痕迹。

【主治】肌肤伤损，青肿。

62571 胜金丹

《医学入门》卷七。为《局方》卷八（宝庆新增方）"胜金丸"之异名。见该条。

62572 胜金丹

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】朱砂三两（研） 雌黄一两五钱 硫黄五钱

【用法】二黄研如泥，用桑柴灰淋汁于锅中，投二黄化熔，入朱末同熬化搅匀，再入灰汁，旋添旋煮，三日三夜；药在锅内有泣声，刮起取药，入铁鼎内，以文武火逼干阴气，方加鼎楔，盐泥固济，如法用炭火三十斤，煅至火剩三四斤即止，待冷开看，药成一片在底，凿取如白银，研如粉；用甘草、余甘子二味，同药砂锅内煮一日，出火毒，取起研，同米饭为丸，如绿豆大。每服三丸至五丸，空心冷椒汤送下。服五钱即愈。

【主治】一切风疾，半身不遂，日不收敛，身转不得。

【宜忌】忌羊血。

62573 胜金丹

【方源】《准绳·女科》卷四。

【组成】败兔毫笔头一枚

【用法】上烧灰，研细。捣生藕汁一盏送下。若产母虚弱及素有冷疾者，恐藕冷动气，即于重汤内暖过服。立产。

【主治】难产。

62574 胜金丹

【方源】《准绳·疡医》卷一。

【组成】麝香　白砒(制)各五分　蟾酥一钱　雄黄　辰砂　乳香　没药　血竭各一钱五分　全蝎(泡,炙)　天龙(去头足,炙)　穿山甲(炙)各三钱　僵蚕(炙,去丝)五钱

【用法】上为细末,都拌匀。每服三分,赤沙糖调葱头酒送下。取汗为度。

【主治】疔毒肿痛。

62575　胜金丹

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】麝香三钱　血竭三两　古石灰二两　海螵蛸一两　自然铜(末,醋浸,烧七次)一钱　乳香一两　没药一两　花蕊石三钱　冰片一钱　樟脑一两　土狗子十个　地虱(干者)一钱　土鳖(干者)一钱　人参一两　象皮三钱　琥珀一钱　儿茶一两　紫石英二两　三七根(末)一两　木耳炭一两　生甘草(末)五钱

【用法】上药都拌匀,以罐盛之。每用全体神膏一个,用胜金丹末三钱,掺在膏药上贴之。重则用膏药二个。

【功用】接骨。

【主治】《伤科汇纂》:诸般伤损肿痛。

62576　胜金丹

【方源】《张氏医通》卷十四。

【组成】白砒一钱　绿豆三百六十粒(水浸去壳,同白砒研如泥,阴干)　肥栀子四十枚(去壳,晒干,勿见火,为末)　雄黄　雌黄(俱水飞)各一钱　急性子(即白凤仙子,去皮,研)二钱

【用法】上为极细末,都拌匀,瓷罐收藏。每服七八分,强人至一钱,临服入西牛黄五七厘,冰片三五厘,细细研匀,入糕饼内食之。一方加珍珠(腐内煮,研)、琥珀、狗宝各一钱,分作二十服,临服亦如上方,入西牛黄五厘,冰片三厘,上好白面一两五钱,将面匀作二分,先将一半入白糖霜一钱,半拌药为馅,再入白糖一钱半,裹外作饼,熯熟与食,食后姜汤过口,少顷即上吐下泻而愈;不吐,以肥皂肉一钱,擂水灌吐,吐后锈钉磨水,频进六七次,以镇其神。

【功用】《类证治裁》:涌吐兼利。

【主治】痴病,狂怒叫号。

【宜忌】失心风癫、悲愁不语、元气虚人禁用。大忌烧酒。

【备考】本方方名,《丸散膏丹集成》引作"胜金散"。

62577　胜金丹

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】香附一斤(四制:童便、酒、盐、醋浸,春七、夏三、秋八、冬十日,炒)　人参一两五钱　白薇四两(去芦)　赤芍一两五钱　白芍一两五钱　当归一两五钱　白芷一两五钱　川芎一两五钱　熟地四两五钱　藁本三两　白茯苓　丹皮　牛膝　杜仲各二两五钱　甘草七钱五分

【用法】上药俱用好酒浸,春五、夏三、秋七、冬十日,淘洗净,晒干为末;再用白石脂一两,赤石脂一两,醋浸三日,煅红、醋淬七次,烘干,研末,入前药末和匀;再用乳香、没药各一两,朱砂、琥珀各五钱,将四味用好酒研成膏,和前药炼蜜为丸,如弹子大,金箔为衣。每服一丸,酒送下。如妇人行经腹痛,于经前五日服之,不过三日即愈;如素未受孕,服药数月即孕。

【功用】和经益精,补诸虚,种子。

【主治】胎前产后,月经不调,淋浊,赤白带下,血枯不孕,小产难产,血晕血瘀,停胞死胎。

62578　胜金丹

【方源】《串雅内篇》卷二。

【组成】血竭　乳香　没药各三钱　地龙十条　自然铜一两　无名异五钱　木鳖子五个

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。临用,好酒化下一丸;如不打,用红花、苏木煎汤送下。

【功用】《串雅内篇选注》:活血祛瘀,消肿止痛,生肌长肉。

【主治】夹打损伤。

【方论选录】《串雅内篇选注》：血竭、乳香、没药行气活血，散瘀止痛，敛疮生肌；地龙清热活络；自然铜散血止痛，续伤；无名异燥湿行瘀，消肿止痛；木鳖子消肿止痛生肌；红花通络；苏木去瘀。

62579 **胜金丹**

【方源】《同寿录》卷三。

【组成】川乌（去皮）一两　草乌五钱（去皮，俱用醋煮，去麻辣为度，焙干听用）　当归（酒洗）　生熟地　白芍　大茴（去核）　苍术　粉甘草　血竭　香附（四制）各一两　木香（不见火）　何首乌（九制）　白术　桔梗　防风　天麻　荆芥穗　白芷　两头尖　金毛狗脊（去毛净）　川芎　细辛各五钱　人参二两七钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一钱，汤、酒任下。

【主治】胎前产后一切女科诸症。

62580 **胜金丹**

【方源】《妇科玉尺》卷三。

【组成】人参　白芍　赤芍　川芎　丹皮各一两半　肉桂　茯苓　牛膝各二两半　当归　白薇各四两　藁本三两（以上药合一处，酒浸一日，井水淘出，焙末）　四制香附末一斤　熟地四两（打和一处）　赤石脂　白石脂各二两　乳香　没药各一两　琥珀　朱砂各五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，金箔为衣。酒送下。汗出愈。兼治子宫虚冷不育，服二十丸即孕。

【功用】下死胎。

【主治】虚劳妇人临产，子宫虚冷不育，积年手足麻痹，半身不遂，崩带、产后等疾。男子五劳七伤。

62581 **胜金丹**

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】香附十六两　当归一两半　赤芍一两半　白芷一两半　川芎一两半　人参一两　延胡索一两半　远志一两半　白术一两半　桂心二两半　丹皮二两半　茯苓二两半　川牛膝二两半　熟地黄四两半　白薇四两　甘草七钱五分　藁本二两　盔沉香一两　乳香　没药　赤石脂　白石脂各一两　琥珀五钱　朱砂五钱

【用法】上为细末　炼蜜为丸，二钱重。每服一丸，白开水送下。

【功用】养血调经，开郁祛寒。

【主治】妇人经血不调，经行障碍，经血紫黑，崩中带下，子宫寒冷不受孕，死胎不下，产后血亏，经前腹痛，经后腰疼，中气不足，头晕心烦，四肢倦怠，咳嗽发热，膨闷胀满，一切血虚、气滞、经带疾患。

62582 **胜金丹**

【方源】《全国中药成药处方集》（抚顺方）。

【组成】香附十二两　熟地四两　赤石脂一两　白术四两　赤芍一两半　琥珀五钱　白薇一两　甘草五钱　海沉一两　乳香一两　朱砂　玄胡各五钱　藁本二两　广边桂二两　云苓二两　白芍二两　当归一两半　川牛膝一两　没药一两　白石脂一两　红人参一两　远志一两半　川芎一两半　丹皮一两　白芷二两

【用法】上为细末　炼蜜为丸，二钱重，蜡皮封。每服一丸，白水送下。

【功用】补血调经。

【主治】血崩漏血，赤白带下，月经不调，赶前差后，虚寒腹痛，久不孕育，颜面萎黄，腰膝疼痛。

【宜忌】孕妇、干血痨及瘀血实证者均忌服之。

62583 **胜金汤**

【方源】《卫生家宝产科备要》卷六。

【组成】地黄汁二分（生）　生姜汁一分（生）

【用法】上用童子小便一分，同煎十余沸。温服。才产了便服。

【功用】去恶血，止血晕。

【主治】产后恶血攻心,令人眼生黑花,心闷欲绝,恶心头旋头昏,多涕唾,身如在舟车中。

【宜忌】地黄、生姜须是净洁砂盆内研取自然汁,切不可犯生水。

62584 胜金散

【方源】方出《证类本草》卷九引孙用和,名见《圣济总录》卷二十六。

【组成】郁金五个(大者) 牛黄一皂荚子大(别细研)

【用法】上为散。每服用醋浆水一盏同煎三沸,温服。

【主治】阳毒入胃,下血频,疼痛不可忍。

62585 胜金散

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】荆芥穗 薄荷叶各四两 木贼(去节)二两 蛇蜕二条(微炙)

【用法】上为散。每服二钱匕,食后茶清送下,一日三次。

【主治】脑风头痛,鼻息不通,或流清涕,多嚏不已。

62586 胜金散

【方源】《圣济总录》卷九十八。

【异名】郁金散(《普济方》卷二一六)。

【组成】甘草(炙,锉) 滑石(碎) 郁金各半两

【用法】上为散。每服一钱匕,温水送下,一日三次。

【主治】①《圣济总录》:沙石淋。②《普济方》:卒小便淋涩不通。

62587 胜金散

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】戎盐一两 青黛半钱

【用法】上同研匀。每服半钱匕或一字,用小竹筒吹入喉咽,咽津。

【主治】咽喉卒肿,喉痹。

62588 胜金散

【方源】《圣济总录》卷一二七。

【组成】斑蝥半两(去头翅,麸炒) 豆黄末(炒)一合 糯米末(炒)一合 甘草一中指节许(半生半炙) 腻粉(研)一分

【用法】上为散,都拌匀。空心以米饮送下五钱匕。当吐泻,下恶物,煮糯米粥补之。

【主治】热毒风毒,结成瘰疬。

62589 胜金散

【方源】《圣济总录》卷一三三。

【组成】黄连一两半(半炒,半生用) 郁金(生用)半两 天南星一枚 紫钩藤 白蔹 白及各一分 腻粉少许

【用法】上为散。每用时先浓煎葱椒汤淋洗,去疮皮,拭干,次以津唾调药散敷,或用纸花子盖之亦得;如疮湿,即干掺。

【主治】下注并恶疮,多年不效者。

62590 胜金散

【方源】《幼幼新书》卷二十四引《吉氏家传》。

【组成】丁香 生犀各半两 川楝子 芜荑 芦荟各一钱

【用法】上为末。每服半钱,陈米饮送下。

【主治】疳积有虫。

62591 胜金散

【方源】《产育宝庆集》。

【异名】麝香散(《朱氏集验方》卷十)。

【组成】麝香一钱 盐豉一两(用旧青布裹了烧,令通红,急以乳槌研碎为末)

【用法】上为末。取秤锤烧红,以酒淬之,调下药一钱。

【功用】①《产育宝庆集》:逐败血。②《赤水玄珠》:催生。

【主治】难产,横生,逆生。

62592 胜金散

【方源】《卫生总微》卷三。

【组成】雄黄一钱(水飞) 白附子半钱 甘草半两(炙) 芍药半两(水煮十沸,焙干) 南星半两(炮) 荆芥穗一分

【用法】上为末。每服半钱,水一小盏,入薄荷三叶,煎至五分盏,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿潮热温壮。

62593 胜金散

【方源】《永类钤方》卷十八引《全婴方》。

【组成】吴茱萸(酒浸) 净陈皮 川芎 干姜(炮) 生姜(切,焙)各一钱半 甘草(炙) 厚朴(姜制,炒)各三钱

【用法】上为细末。每服三钱,陈米饮送下;入盐煎服妙。

【主治】妊妇因食伤胎,传于脾胃,气虚冷逼,小腹胀痛,或腰重,大便秘。

62594 胜金散

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】当归(洗,焙) 延胡索 五灵脂(去砂石)各一两

【用法】上为细末。每服三钱,水一盏,酒三分,同煎至八分,食前温服。

【主治】腹胁胀满,心腹作痛。

62595 胜金散

【方源】《传信适用方》卷二。

【组成】老生姜十两(切作如钱薄,摊箕内,令水缩;次用砒霜一钱重,细研,拌姜钱令匀,留少许砒放熔银甘砂锅子内,砒拌生姜于上,按令紧,用新瓦一片盖锅口,烈炭火煅令烟尽,倾于碗内,盏子合定存性,要成黑炭,不可白却) 荜拨二钱 全蝎二钱(去肚内肠屎并毒) 华阴细辛二钱(味辛如椒者) 胡椒二钱

【用法】上四味焙干,姜炭亦为细末,都拌匀。每用手指点少许如黑豆大,揩牙龈上。闭口,候有涎沫即吐去,立效。

【主治】肾热上蒸,牙龈浮肿,牙齿疼痛,或肾元虚冷,牙齿摇动,或赤肿痛,风牙虫牙。

62596 胜金散

《医方类聚》卷一三九引《简易》。即《苏沈良方》卷六“四神散”。见该条。

62597 胜金散

【方源】《直指》卷六。

【组成】桂枝 延胡索(炒) 五灵脂 当归各等分

【用法】上为末。每服三钱,水一盏,酒三分同煎,食前服。

【主治】心下痛。

62598 胜金散

《朱氏集验方》卷十。为原书同卷“小黑神散”之异名。见该条。

62599 胜金散

【方源】《卫生宝鉴》卷十九。

【组成】石膏 黄芩一两

【用法】上为末。先擦了绛玉散后,不拘多少覆之。

【主治】小儿头上并身上湿疳,时复痒痛,皮肤湿烂久不愈。

【备考】方中石膏用量原缺。

62600 胜金散

【方源】《得效》卷十四。

【组成】王不留行 酸浆(死胎倍用) 茺蔚子 白蒺藜(去刺) 五灵脂(行血宜生用)各等分

【用法】上为散。每服三钱。水一盏半,入白花刘寄奴子一撮同煎,温服。

【功用】逐败血。

【主治】难产,横逆,子死腹中。

62601 胜金散

【方源】《得效》卷十七。

【组成】郁金三两 大朱砂 南雄黄(其色胜如朱砂者妙)各五钱 麝香 干胭脂 绿豆粉各二钱半 白矾(半生半枯) 光粉各五钱

【用法】上为末。薄荷汁同研少许调服。

【主治】咽喉肿痛,气急。

【加减】有孕者,不可用麝;若痰盛者,如煎药内所用不应,于中略加胆矾少许,或吐无妨。

62602 胜金散

【方源】《普济方》卷七十三引《德生堂方》。

【组成】铜青二钱 炉甘石(浸三五次,烧红,童便浸妙) 青盐一钱 金脚蜈蚣一条全蝎七个(去毒) 轻粉半钱 麝香少许

【用法】上为末。每用少许,温水调敷眼,一

日三次。三日即愈。

【主治】赤眼烂弦，痒痛流泪。

【备考】方中炉甘石用量原缺。

62603 **胜金散**

《普济方》卷三八一引《经验良方》。为《朱氏集验方》卷十一"肉枣丸"之异名。见该条。

62604 **胜金散**

【方源】《医方类聚》卷二十四引《烟霞圣效方》。

【组成】斑蝥头　蝎梢尾　草乌头(尖)　黑附子(底)各等分

【用法】上为细末。每服一字，新水送下。汗出为效。

【主治】一切破伤风。

62605 **胜金散**

【方源】《医方类聚》卷二一七引《医林方》。

【组成】甘草　大黄　石膏各等分

【用法】上为细末。酒调三钱服之。临卧先服乌金散，次二服紫金散，次三服胜金散，三药服罢，到了天明，取下二三十年积物为效，后服紫金丹补。

【主治】妇人二三十年积块痃癖。

62606 **胜金散**

【方源】《普济方》卷二九六。

【组成】草乌一个　白姜一指大

【用法】上为末。每用半钱，病人津唾调，涂在黑瘤上，自然脱落，遂用洗药。

【主治】诸痔。

62607 **胜金散**

《普济方》卷二九六。即《杨氏家藏方》卷十三"胜金丸"改为散剂。见该条。

62608 **胜金散**

【方源】《普济方》卷二九九。

【组成】黄柏四两　甘草(炙)二两　密陀僧(研)二两　青黛二两

【用法】上为细末，都拌匀。如疮湿，则干贴；疮干，则以蜜水调涂；头上甜疮，油调涂；口疮，干贴，有涎而吐，误咽不妨。

【主治】一切身体头面湿流黄水等疮，久不愈者。

62609 **胜金散**

【方源】《普济方》卷三六八。

【组成】天南星一两　白附子半两　雄黄二钱

【用法】上为末。每服一钱，水一盏，葱白三寸，同煎三分，作三度，予一匙服。

【主治】小儿伤寒热惊风，麻豆疮疹潮热。

62610 **胜金散**

【方源】《奇效良方》卷十五。

【组成】天台乌药(细锉，酒浸一宿，微炒)　茴香(炒)　青皮(去白)　良姜各一两

【用法】上为细末。每服二钱，空心用温酒调服，妇人用姜煎童子小便调服。

【功用】止痛。

【主治】五脏气，一切冷气、血气、肥气、息贲气、痞气、奔豚气、伏梁气疾，抢心切痛不可忍，似板筑定，冷汗喘急，不语欲绝。

62611 **胜金散**

【方源】《外科经验方》。

【组成】黄连　黄柏　轻粉　银朱　孩儿茶各五分　冰片一分

【用法】上为细末，香油调搽。

【主治】下疳溃烂或疼痛。

62612 **胜金散**

【方源】《保命歌括》卷三十。

【组成】桂心　玄胡索　五灵脂　蒲黄各等分

【用法】上为细末。每服三钱，用水一盏，当归一钱，酒三分，同煎七分，调服。

【主治】心下有血急痛。

62613 **胜金散**

【方源】《赤水玄珠》卷二十九。

【组成】铁锈(炒)

【用法】上为末。每服四钱或三五六钱，用蓖水滚过，停冷调服。不吐为佳。

【主治】疔疮。

【备考】服苍耳散出汗后不散，用本方。

62614 **胜金散**

【方源】《疡科选粹》卷五。

【组成】牡蛎（厚头）

【用法】上药生为末。每服二钱，靛花研酒调下，一日三次。已溃者，以绿矾散敷之。

【主治】甲疽。

62615 胜金散

【方源】《济阳纲目》卷七十二。

【组成】五灵脂（水淘，炒）一两 玄胡索 桂枝 当归（酒洗） 香附（炒）各七钱 没药 草果各五钱

【用法】上为细末。每服三钱，食前温酒调服。

【主治】猝心脾痛。

62616 胜金散

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】夏枯草 香附（末） 夏桑叶各等分

【用法】上为末。每服三钱，麦冬汤调下。

【主治】眼流冷泪，乌珠痛及羞明怕日。

62617 胜金散

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】人参三七

【用法】研极细末，涂患处；湿者干掺。

【功用】消肿息痛。

【主治】①《外科全生集》：溃烂并刀斧伤。②《青囊秘传》：吐衄。

【备考】《青囊秘传》本方用法：调服。

62618 胜金散

【方源】《盘珠集》卷下。

【组成】陈皮 吴茱萸 骨碎补 砂仁 甘草（炙）

【用法】上为散。每服二钱，盐汤送下。

【功用】温中下气。

【主治】遍身两胁刺痛胀满。胃气虚冷，下逼小肠，症若奔豚，大便秘涩，两胁虚鸣，腰重如山。

62619 胜金散

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】降香五钱 归须一两 地鳖虫五钱

【用法】上为细末。酒调服。

【功用】消瘀降气。

【主治】遍身疼痛。

62620 胜金散

【方源】《麻疹备要方论》。

【组成】青黛 明矾 雄黄 文蛤 皂荚 栀子 血余 冰片

【用法】上为细末，瓷瓶收贮。临用以米泔温洗净后敷之。

【主治】麻疹没后牙疳，口鼻坏烂。

62621 胜金散

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】防风 荆芥 薄荷 归尾 杏仁 川连 明矾 朴消各等分

【用法】水煎。乘热熏洗。内服柴胡解毒汤，外点风衣散。

【主治】一切风热火眼。

62622 胜金散

《丸散膏丹集成》。即《张氏医通》卷十四“胜金丹”。见该条。

62623 胜金散

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】西红花 琥珀 青皮 朱砂 赤芍 川芎 连翘 地丁 豨莶草 白芷各二钱 乳香 没药各一钱五分 全当归 汉三七 双花 川断 公英各三钱 血竭花一钱

【用法】上为极细末。大人每服一钱，小儿减半，黄酒送下。

【功用】散瘀活血，消肿止痛。

【主治】打伤创伤拧伤，聚筋折骨，关节脱臼，骨膜脓疡，骨膜内积血瘀血，日久不散，发变溃脓。

【宜忌】孕妇忌服。

62624 胜金锭

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】人言 雄黄 硇砂 轻粉 麝香

【用法】上为末，用黄蜡熔化，和药成膏子，水浸少时取出，同时捏饼子，如钱眼大。用羊

骨针拨开疮口，放药在内，用膏药贴之，仍用蟾酥丸。

【主治】火疔，气疔。

62625 **胜金煎**

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】牛黄　昆布　海藻各二两半　牵牛二两　桂一两(冷者加作二两)　甜葶苈三两　椒目一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前米饮送下，每日三次；渐加至四五十丸，每日三四次。以水利为效。寻常些小发动，觉气促痰盛，夜卧不安，数服见效。

【主治】大腹水气，背刺，喘急，息不能通。

62626 **胜金膏**

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】黄连(去须)　蛀栗子(去壳)　甘草根(锉)　黄蜀葵花　龙骨各半两　白及一分

【用法】上为细末，取榆窠上红虫三两半，候干，同为末；更入粉霜三钱同研匀；每用药三钱匕，入腻粉少许，取鸡清调，摊帛上。先以口温浆水洗净，揾干贴之，隔日易。

【主治】瘰疬瘘疮久不愈。

62627 **胜金膏**

【方源】《宣明论》卷十。

【组成】巴豆皮　楮实叶(同烧存性)各等分

【用法】上为末，熔蜡为丸，如绿豆大。每服五丸，煎甘草汤送下。脉微小者，立止。

【主治】一切泄泻痢不已，胃脉洪浮，反多日不已者。

【备考】同书四库本本方用法：每服三四丸，米饮汤送下。主治一切泄泻痢不已，胃脉浮滑，赤白疼痛不已者。

62628 **胜金膏**

【方源】《施圆端效方》引臻和尚方(见《医方类聚》卷一九二)。

【组成】川山甲一两　白胶香　当归(切)　没药　乳香　血竭各半两(研)　南星　黄柏各一两半(炒)　黄丹一斤　清油二斤半　木鳖二两(捶碎)　赤芍药三两半　青柳枝(四指长)十茎

【用法】上将前七味与油以文武火熬，候柳枝黑色住火，绵滤去滓，滴水中不散，入后五味搅令匀，候冷为丸，如弹子大，油纸裹盛，瓷器内收。

【主治】恶疮疼肿，恶疖。

62629 **胜金膏**

【方源】《普济方》卷三一五。

【组成】艾四两　当归须　白芷　牛膝　黄耆　木鳖子　皂荚刺　蓖麻　防风　桑白皮　白僵蚕　川续断　延胡索　官桂(去皮)　黄连　降真　独活　赤芍药　川芎　细辛　南星　巴豆(去壳)三十枚　桔梗　蓬莪术　牡丹皮　白鲜皮　狗脊　天麻　蔓荆子　接骨木　蛇床　木香　威灵仙　白及　白蔹　杜仲　骨碎补　羌活　萆薢　破故纸　漏芦　海桐皮　五加皮　薏苡仁　荆芥各五钱　槐柳条(向南者)　桃枝(向东北枝)

以上各味并锉碎，用香油浸，春五、夏三、秋七、冬十日；然后用慢火将前药子铫内温火热，不可用火骤，如此三日三夜；次用文武火煎沸，用柳槐枝搅，看白芷黄色为度。

黄蜡四两　松香五斤　芸香二斤半　姜汁　连根葱汁　陈米醋各一大盏　香油三斤(四时用)

以上先用松香、芸香于锅内熬化，滤去滓后，将葱姜汁并陈米醋各一盏，并五十味药油四时用，春、秋、冬用多，夏用少，自宜斟酌。

降真香　五灵脂　自然铜(醋淬七次，白色为度)　无名异　雄黄(明净)五钱　乳香一两　没药　黄丹(火飞)　全蝎　血竭　琥珀　麝香三钱半　露蜂房(烧灰)　虎骨(醋炙黄)　穿山甲(火煅焦黄)五斤　败龟版(醋炙黄)五钱

【用法】上十六味为细末，同前药在锅内慢火化，不住手搅，待松、芸香匀后，下各味末药，除麝香、黄丹，又下乳香、没药，急搅匀，滴

水中试老嫩，然后倾入水中，手扯百余遍，盛在瓷器内，出火气，三日方用。

【主治】筋寒骨痛，坠堕闪肭打损，血结聚，伤筋骨碎，中风入脑，头痛湿痹，骨节酸痛，四肢邪气不仁，百节拘挛，不能屈伸，腰脚软弱，冷嗽气促，咳逆牙疼，腹痛冷气，腰脊痛疼，寒湿脚气，游风走气，膝腿脚酸疼。

【备考】方中槐柳条、桃枝、降真香、五灵脂、自然铜、无名异、没药、黄丹、全蝎、血竭、琥珀、露蜂房、虎骨用量原缺。

62630 **胜金膏**

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】阿胶（明者）三五片　冰片半分　麝香半分

【用法】将阿胶用水煎浓成膏，候冷下片、麝，取起，以罐盛之。每用时，用手蘸膏抹倒睫睑上。

【主治】拳毛倒睫。

62631 **胜金膏**

【方源】《良朋汇集》卷五。

【组成】黄连三钱　芦甘石（投黄汁煅七次）　滑石各二钱　轻粉二钱　麝三分　白丁香二分

【用法】炼蜜为丸，如手指大。用时取乳汁调药入热汤，泡洗眼。

【主治】小儿斑痘眼疾。

62632 **胜疟饮**

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】平胃散一两　藿香叶四十片　枣子十二两　槟榔一枚

【用法】上㕮咀。水一碗半，煎至一碗，临发前连并服。

【主治】疟疾。

62633 **胜夏丹**

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】白术二钱　茯苓二钱　陈皮三分　人参五分　北五味子三分　熟地五钱　山茱萸二钱　神曲三分　白芥子一钱　山药三钱　芡实三钱　炒枣仁一钱

【用法】水煎服。每日一剂，服十剂，精神焕发矣；再服十剂，身体健旺。

【功用】健脾开胃，醒脾胃之气，生心肾之津。

【主治】肾水亏乏，时值夏令便觉身体昏倦，四肢无力，朝朝思睡，全无精神，脚痠腿软。

62634 **胜疳散**

【方源】《施圆端效方》引《必效方》（见《医方类聚》卷一九二）。

【组成】黄柏（去浮）　黄连（拣净）　诃子（去核）　密陀僧各三钱　轻粉　人中白　麝香各半字

【用法】上为细末，都拌匀。用温浆水洗疮了干贴；或油润了贴亦得。

【主治】一切下阴疳疮。

62635 **胜烟筒**

【方源】《囊秘喉书》卷下。

【组成】蓖麻子仁二粒　巴豆肉二粒　麝香少许

【用法】上为末，火纸卷。烧，熏吸鼻中。牙关立开。

【主治】喉闭不通。

62636 **胜骏丸**

【方源】《三因》卷三。

【组成】附子一枚（炮，去皮脐）　当归（酒浸一宿）　天麻（酒浸）　牛膝（酒浸）　酸枣仁（炒）　熟地黄（酒浸）　防风（去叉）各二两　木瓜四两　乳香半两（别研）　麝香一分（别研）　全蝎（去毒）　木香　没药（别研）　羌活　甘草（炙）各一两

【用法】上为细末，用生地黄三斤净洗，研烂如泥，入无灰酒四升，煮烂如膏，以前药匀和，杵令坚，每两作十丸。每服一丸，细嚼，临睡酒送下。地黄春、夏极多，遇冬或无地黄，只炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，盐汤温酒送下。

【功用】①《三因》：益真气，壮筋骨，黑髭须，滑皮肤。②《寿亲养老》：散一切风。

【主治】①《三因》:元气不足,真气虚弱,及诸虚寒湿气进袭,手足拳挛,脚趾连脚面拘急,走注疼痛,筋脉不伸,行步不随,一切足弱鹤膝诸风。②《饲鹤亭集方》:手足麻木。

【加减】槟榔、草薢、肉苁蓉(酒浸)、破故纸(炒)、巴戟(去木)各添一两,内熟地黄、当归各减一两尤妙。

【方论选录】如服此药五七日或半月,见效甚速,行步如飞,千里可至,乃名胜骏。

【备考】《外科正宗》有苍术。

62637 胜雪散

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【异名】胜雪膏(《婴童百问》卷八)。

【组成】片白脑子 铅白粉各半字

【用法】上用好酒少许研成膏子。涂之。

【主治】垂肠、翻花、鼠奶等痔,热痛不可忍,或已成疮。

62638 胜雪膏

《婴童百问》卷八。为《杨氏家藏方》卷十三“胜雪散”之异名。见该条。

62639 胜雪膏

【方源】《准绳·幼科》卷九。

【组成】片脑 风化消各半字

【用法】上药用好酒少许研成膏子。涂之。

【主治】随肠、翻花、鼠奶等痔,热痛不可忍,或已成疮。

62640 胜偏丸

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】人参三两 白术五两 茯苓三两 熟地五两 山茱萸四两 砂仁五钱 当归八两 白芍五两 黄耆五两 麦冬三两 北五味三两 陈皮五钱 神曲一两

【用法】上药各为末,炼蜜为丸。每日早、晚各服五钱。

【功用】补气,补血,补精。

62641 胜湿丸

【方源】《济阴纲目》卷三。

【组成】苍术(盐炒) 白芍药 滑石(炒)各一两 椿根皮(炒)一两 干姜(煨)二钱 地榆五钱 枳壳(炒) 甘草各三钱

【用法】上为末,粥为丸,如梧桐子大。空心米饮送下一百丸。

【主治】因湿热胜而下赤白带。

【方论选录】①《济阴纲目》汪淇笺释:此方加苍术以燥中宫,地榆以温下部,枳壳宽气于上,滑石利湿于下,干姜从而燥湿也。②《医略六书》:湿热内滞,血气俱伤,故赤白带下,淫溢不止焉。苍术燥湿强脾,以清带脉;白芍敛阴和血,以安冲任;枳壳灰破滞化气;滑石末清热渗湿;地榆涩血,以止赤带;椿皮涩脱,以固带脉;炮姜温胃守中;甘草缓中和胃也。粥以丸之,饮以下之,使滞气调而湿热化,则清气和而血气各有所归,何赤白带之淫溢不止乎?

62642 胜湿丹

【方源】《活人方》卷一。

【组成】苍术四两 羌活二两 防风二两 川芎一两 厚朴一两 陈皮一两 藁本五钱 独活五钱 桂枝三钱 甘草三钱

【用法】上为末。每服二三钱,空心姜汤调服。

【主治】外感风湿、寒湿、湿热之邪,面目浮肿,肢沉着不能转侧,关节疼痛,脉濡自汗。

62643 胜湿丹

【方源】《内外验方秘传》。

【组成】煅甘石二两 川连(末)六钱 生石膏四两

【用法】研至无声。

【主治】臁疮久不收口,并手搭背、足搭背及鸦疮。

62644 胜湿汤

《东医宝鉴·杂病篇》卷三。即《济生》卷三“渗湿汤”。见该条。

62645 胜湿汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十一。

【组成】羌活 苍术 防风 猪苓 泽泻 黄柏 黄连 甘草

【功用】《杂病源流犀烛》:除湿。

【主治】风湿，夏月身重如山。

62646 胜湿汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷七。

【组成】苍术　厚朴　半夏各钱半　藿香　陈皮各七分半　甘草五分　生姜七片　大枣二枚

【主治】①《杂病源流犀烛》：湿邪。胃家湿滞多唾。②《类证治裁》：湿邪搏阳，汗出头额。

62647 胜湿汤

《医级》卷七。为《内外伤辨》卷中“羌活胜湿汤”之异名。见该条。

62648 胜七香丸

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】青皮（去瓤）　陈皮（去白）　香附子（去毛，炒）　制半夏（汤泡七次）各二两

【用法】上为细末；用陈米半升，巴豆半两（去皮壳），同炒，陈米黄熟为度，候冷，去巴豆不用，同前药为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，姜汤送下，不拘时候。

【功用】消饮化滞。

62649 胜三七散

【方源】《济阳纲目》卷八十七。

【组成】五倍子（炒枯，用青布包，脚下踏扁）　白矾（枯过）各等分

【用法】上为细末。撒患处，包裹。

【功用】止血定痛。

【主治】刀斧跌磕，一切伤损。

62650 胜火神丹

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】熟地三两　麦冬三两　玄参六两　山茱萸一两

【用法】煎二碗服。

【主治】发狂。

62651 胜金元散

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】白薇半两　人参　藁本　蒲黄　川乌头　丹参各三分　吴茱萸　柏子仁　防风　厚朴　细辛各二分　桂心　干姜各一两一分　当归　芎藭各一两三分　生干地黄八两　泽兰二两一分

上除桂心外，同杵，以马尾罗子筛为粗末，重炒褐色勿焦，候冷，再杵为细末，入桂心末拌和匀，后分为两处；候合成，后药取一半，入在此药中；却将此药一半，入在后药中，丸子如后：

延胡索　五味子　白芷　白术　石菖蒲各三分　茯苓　桔梗　卷柏　川椒各一两　黄耆一两　白芜荑　甘草　白芍药各一两三分　石膏一两

【用法】上药除石膏外同杵，以马尾罗子筛为粗末，重炒令褐色，候冷，依前再杵为细末，入石膏拌匀；亦分作两处，将一半换前药相和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。如有病证，每服用温酒调前散三钱，下此丸三十丸；常服二钱，下此丸二十丸。

【功用】安胎，悦怿颜色。

【主治】风劳气冷，伤寒咳嗽呕逆，寒热不定，四肢遍身疮痒，血海不调，血脏虚惫，赤白带下，血运血崩，瘀血流入四肢，头痛恶心，血癥积滞，漏下，过期不产。丈夫肾脏虚风。

【备考】妇人室女病至垂死，服之无不见效。若服丸子，不可无散子；服散子，不可无丸子。

62652 胜金饼子

【方源】《幼幼新书》卷二十二引《吉氏家传》。

【组成】粉霜　延胡索　巴豆霜各半钱　轻粉一钱　朱砂一块（皂子大）　石燕一个

【用法】上为末，冷水为饼子，如梧桐子大。每服一丸，皂子汤送下。

【主治】虚中积。

62653 胜金饼子

【方源】《卫生总微》卷七。

【组成】大黄半两　枳壳（去瓤，麸炒黄，净）一两

【用法】上为细末，炼蜜和剂，捏作饼子，如小钱大。结胸者，用芒消半钱，同生姜水化半饼或一饼服之；痞气者，煎陈皮汤化下，不拘

时候。

【主治】伤寒结胸气痞。

62654　胜金黑膏

【方源】《普济方》卷三一三。

【组成】当归　蓬术　玄参　肉桂　生地黄　续断　赤芍药　香白芷　大黄　槐枝　柳枝　香油　黄丹各等分

【用法】上㕮咀，浸三日，熬热去滓；再熬，用柳枝搅，下丹，滴水中不散为度。

【主治】痈疽发背，诸般恶毒疮疖。

62655　胜湿饼子

【方源】《医学正传》卷四。

【组成】黑丑一两(取头末五钱)　白丑一两(取头末五钱)　甘遂(连珠者)五钱

【用法】上为极细末；外用荞麦面一两半，连药末都拌匀，水调，捏作饼子，如折三钱大，放饭上蒸熟。每服一饼，空心嚼，茶清送下，以利为度；未利，又服一饼。

【主治】远年脚气，足胫肿如瓜瓠者。

【宜忌】忌甘草、菘菜、生冷、油腻、鱼腥等物。

62656　胜妙寸金散

《圣济总录》卷一五九。为《证类本草》卷十七引《胜金方》"圣妙寸金散"之异名。见该条。

62657　胜金余粮丸

【方源】《活人方》卷四。

【组成】余粮石(煅，净)六两　绿矾(煅红)四两　当归身(酒焙)三两　广陈皮三两　浮麦(炒)三两　川椒(出汗)二两　六安茶(焙)二两　砂仁(炒)二两　黑枣肉(去皮)三两

【用法】上为细末，即用枣肉捣烂，加熟蜜为丸，如梧桐子大。每早空心陈米汤或百沸汤送下一钱。

【主治】心胃疼，面黄肌瘦，白淫淋带，湿汗浮肿，二便不调。

62658　胜金桃仁膏

【方源】《卫生总微》卷十七。

【组成】桃仁

【用法】上药杵，去皮尖，为膏。敷之。

【主治】卵癞肿大。

62659　胜金透关散

【方源】《普济方》卷五十四引《卫生家宝》。

【组成】川乌头一个(炮，去皮脐，一方草乌用尖)　华阴细辛各二钱　胆矾半钱　活鼠一个(系定，热汤浸死，破喉开，取胆，真红色者是)

【用法】上为末，用鼠胆调和匀，再焙令干，研细，却入麝香半字，用鹅毛管吹入耳中；吹时口含茶清，候少时。十日内见效。

【主治】多年久患耳聋不可治者。

62660　胜金理中丸

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】肉桂　海螵蛸　白芥子　白胡椒各一两

【用法】神曲姜汁打和为丸。每服二钱，开水送下。

【主治】痰火哮喘，声如曳锯，无论新久。

【备考】绂按：冷哮最妙。

62661　胜金黄连丸

《鸡峰》卷十四。为《圣济总录》卷七十八"胜金丸"之异名。见该条。

62662　胜金黄连丸

【方源】《本草纲目》卷十三。

【组成】宣连不限多少

【用法】上药捶碎，以新汲水一大碗，浸六十日，绵滤取汁，入原碗内，重汤上熬之，不住搅之，候干，即穿地坑子可深一尺，以瓦铺底，将熟艾四两坐在瓦上，以火燃之，以药碗覆上，四畔泥封，开孔出烟尽，取刮下，为丸如小豆大。每服十丸，用甜竹叶汤送下。

【主治】眼目诸病。

62663　胜湿平胃散

【方源】《保命歌括》卷十一。

【组成】平胃散四两　羌活　防己(炒)　黄柏各五钱　薄荷一两

【用法】上为末。每用二钱，酒调服。

【主治】湿郁病。

62664　胜湿清火汤

【方源】《医醇賸义》卷二。

【组成】茅术 白术各一钱五分 茯苓二钱 苡仁八钱 石斛三钱 石膏五钱 知母一钱 猪苓一钱 泽泻一钱五分

【用法】加荷叶一角，水煎服。

【主治】积湿化热，湿火相乘，渴饮舌白。

62665 胜寒延嗣丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】人参六两 白术 黄耆 菟丝子 巴戟天 鹿角胶 淫羊藿各八两 附子一个(用生甘草三钱煮汤一碗，泡透切片，微炒熟) 茯苓 炒枣仁各四两 山药六两 远志 肉桂各二两 炙甘草一两 广木香五钱 肉苁蓉一大枚

【用法】上药各为末，炼蜜为丸。每日早、晚各服三钱。服两月，精熟而孕矣。

【功用】助命门之火，益心包之焰。

【主治】男子精寒，难受胎。

胖

62666 胖儿丹

《外科十三方考》。为原书"袪虫散"之异名。见该条。

脉

62667 脉溢汤

【方源】《医碥》卷一。

【组成】人参 黄耆 当归 茯神 麦冬 石莲 朱砂 姜汁 生地

【主治】心极虚有火，血汗(又名脉溢)，血自毛孔中出。

胎

62668 胎元饮

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参随宜 当归 杜仲 芍药各二钱 熟地二三钱 白术一钱半 炙甘草一钱 陈皮七分(无滞者不必用)

【用法】水二钟，煎七分，食远服。或间日，或二三日，常服一二剂。

【主治】①《景岳全书》：妇人冲任失守，胎元不安不固。②《会约》：气血两虚而胎不安者，六脉微弱，神昏气倦，一切不足之证。

【加减】如下元不固而多遗浊者，加山药、补骨脂、五味之类；如气分虚甚者，倍白术，加黄耆，但耆、术气浮，能滞胃口，倘胸膈有饱闷不快者，须慎用之；如虚而兼寒多呕者，加炮姜七八分或一二钱；如虚而兼热者，加黄芩一钱五分，或加生地二钱，去杜仲；如阴虚小腹作痛，加枸杞二钱；如多怒气逆者，加香附无妨，或砂仁亦妙；如有所触而动血者，加川续断、阿胶各一二钱；如呕吐不止，加半夏一二钱、生姜三五片。

62669 胎元散

【方源】《准绳·幼科》卷五。

【组成】胎元(焙干)

【用法】上为末，加麝香少许。每服三五分，酒调服。

【主治】血气俱虚，痘不起，发不红润。

62670 胎元散

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】将出小鸡蛋十个(先收瓦罐煨熟，方下蛋在内炙燥，研) 山甲(末)一钱 蝉蜕一钱 僵蚕五分 人牙五分 连翘五分 牛蒡一钱

【用法】上为末，都拌匀。每服三四分，至七分止，酒浆送下。临时用肥母鸡一只，去毛肠，入铜锁内，入甑蒸熟，滴下油调前药，酒浆过口。

【功用】发浆。

【主治】痘不起发，不灌浆。

【加减】如小儿虚者，加参末一分，耆、术半分。

62671 胎发散

【方源】《万氏家钞方》卷三。

【组成】胎发(煅灰存性)一钱 硼砂(煅过)七分 胆矾三分

【用法】上为极细末。以棉花裹箸头，沾米

醋，拈药末点疮上过宿；次日用射干磨米醋漱过，再点，如此点过二三次。疮愈后，尚未除根，常以通瘸叶捣汁漱之，以茶柏散吹之。或用黄花地丁煎汤、或用金星草捣汁、或用吉祥草根捣汁漱俱可。

【主治】诸般喉症。

62672 胎动汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】生地二钱　当归一钱　白芍八分　黄芩八分　白术一钱　木通八分　杜仲八分　续断八分

【用法】水煎服。

【主治】胎动。

62673 胎兔丸

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】胎兔(去毛，洗净，用阴阳瓦焙干为末)一两一钱　蔓荆子(去膜，晒干为末)　菊花(去梗叶，晒干为末)各一两

【用法】上末共为一处，炼真川蜜为丸。白滚汤化下。

【主治】小儿痘后余毒攻，或一目，或两目，黑珠凸出，翳膜瞒睛，红赤肿痛，眵泪交作。

【方论选录】兔，《礼记》谓之明眎，言其目不瞬而瞭然也。目得金气之全，性寒而解胎中热毒，能泻肝热，方用胎兔为君者，取二兽之精血所成，可以解胎毒也；草木之性难以取效，故借血气之属耳。臣以蔓荆微寒，取其能凉诸经之血，且能搜治肝风及太阳头疼目痛，目赤泪出，利九窍而明目，性又轻浮上行而散。更佐之以菊花者，取菊得金水之精英，补益金水二脏也。夫补水可以制火，益金可以平木，木平则风自息，火降则热自除。

62674 胎毒散

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】五倍子三钱(焙黄)　白芷三钱　花椒三钱(炒，去子)　枯矾一钱

【用法】上为细末。香油调搽，湿则干敷。

【主治】胎毒，小儿初生浑身湿烂。

62675 胎骨散

【方源】《疡科选粹》卷七。

【组成】胎骨灰二两　黄麻灰　红花各一两　乳香五钱　没药五钱　血竭五钱　牛黄五分　胎发灰五钱　自然铜(醋煅七次)　杏仁(去皮尖)　桃仁(去皮尖)各二钱

【用法】上药各为细末。每责十板，用二钱好酒送下。

【主治】初杖。

62676 胎积丸

【方源】《卫生总微》卷一。

【组成】白丁香二十一个　轻粉半钱　滑石半钱　乳香半钱　巴豆三十个(针串灯上，烧焦微存性)

【用法】上为末，面糊为丸，如黍米大。每服一二丸，看虚实大小与服，用柳心七个煎汤放温送下。连一二服，粪下恶物是效。亦令乳母服和气药调养饲儿。若儿服药后吐不止，大便不通，面黑气喘者死。

【主治】小儿血癖。

62677 胎产金丹

【方源】《胎产心法》卷中。

【组成】当归(酒洗)　丹皮(水洗，晒干，勿见火)　蕲艾(醋煮)　延胡索(酒拌，炒干)　川芎　益母草(取上半截，童便浸，晒干)　青蒿(人多内热者更宜，不用亦可)　白薇(洗净，人乳拌)　人参　赤石脂(火煅，水飞亦可)　白茯苓　川藁本(洗净)　白术(土炒)各二两　生地(酒洗，煮不犯铁器)　鳖甲(醋炙)各四两　香附四两(醋、酒、盐、童便各浸一两)　桂心　没药(去油)　粉草(酒炒)各一两二钱　北五味一两(去梗，焙)　沉香六钱

【用法】上为细末；再用新鲜头次男胎紫河车一具，长流水浸半日，洗净；黑铅打成大铅罐一个，将河车放在铅罐内，再将黄柏四两放在河车下，加白酒酿二斤，清水二碗，灌满铅罐，仍以铅化封口；再以铁锅盛水，将铅罐悬在锅内，煮两日夜为度，取出捣烂，和入药内，拌匀，晒干，再研为末，炼蜜为丸，如弹子大，

每丸重三钱五分，水飞朱砂为衣，再以黄蜡为皮，如蜡丸式收贮。妇人临产，米汤化服一丸，助精神气力，分娩顺利；产下，童便好酒服一丸，神清体健，再无崩晕之患；产后，每日服一丸，服过五日，气血完固，自无他病；行经后，川芎当归汤服一丸，服之三日，必然有孕；苦于小产者，胎动欲产，白滚汤服一丸，睡半日，其胎自安，每月常服二三丸，保全足月分娩无忧；产后血崩，童便好酒服一丸，即止；产后血晕者，当归川芎汤服一丸，即醒；产后惊风，防风汤服一丸，即解；儿枕痛者，山楂黑沙糖汤服一丸，即止；胞衣不下，干姜炒黑煎汤服一丸，即下；产后虚怯者，川芎当归汤每日服一丸，十丸痊愈；凡产后诸证，俱加好酒童便服。

【功用】培补气血，安胎调经，益精种子。

①《胎产心法》：种子安胎。②《北京市中药成方选集》：补气养血。③《全国中药成药处方集》：散寒，助精壮气。④《中药制剂手册》：调经。

【主治】①《胎产心法》：妇人经水不调，诸虚百损，及胎前产后诸证，苦于小产，胎动欲产，产后血崩、血晕，惊风，儿枕痛，胞衣不下，产后虚怯。②《全国中药成药处方集》：临经腹痛，腰痠带多，面黄肢倦，子宫虚寒，难于受孕。脾胃虚弱，胎前漏血，腰腿痠痛，四肢浮肿，气血双亏，作冷作烧，不思饮食，自汗盗汗，骨蒸潮热。肚腹疼痛。

【宜忌】《全国中药成药处方集》：忌食生冷；忌生气。

62678 胎产金丹

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】当归 川芎 白芍 人参 赤石脂 白术 茯苓 桂心 藁本 白薇 白芷 丹皮 玄胡 没药 甘草各一两

【用法】除石脂、没药另研外，其余皆以醇酒浸三七日，烘干为末，称十五两；外用香附米以水浸三日，略炒为末，称十五两，和匀，重罗筛过，炼蜜为丸，如弹子大，瓷器收贮。经闭成疾，麻木疼痛，头昏脚肿，血淋白带，滚汤送下；不受孕，服至一月即受孕；胎不安者，俱用滚汤送下；受孕即服不辍，保全足月分娩无忧；临产，清米汤调服一丸，自然顺利，难产者倍用；产下，童便好酒调服一丸，自无崩晕之症；血崩，童便滚水送下；血晕，当归川芎煎汤送下；产后儿枕痛，山楂黑糖煎汤送下；胞衣不下，干姜煎汤送下；呕吐，淡姜汤送下。病轻者调服一丸；重者调服二三丸。

【功用】《全国中药成药处方集》：调经养血，助气安胎。

【主治】①《仙拈集》：妇女经闭成疾，麻木疼痛，头昏脚肿，血淋白带，不受孕，胎不安，难产，产后血崩、血晕，儿枕痛，胞衣不下，呕吐。②《全国中药成药处方集》：胎漏下血，胸腹胀满，腿痠腿痛，四肢浮肿，作冷作烧，不思饮食。

【备考】《全国中药成药处方集》有党参、乳香，无人参。

62679 胎产金丹

【方源】《集验良方》卷五。

【组成】生地四两（酒洗，煮烂，不犯器） 白薇二两 延胡（酒炒）二两 桂心一两 藁本二两 粉草一两二钱（酒炒） 赤石脂二两（炒） 川芎二两 沉香六钱 没药（去油）一两 益母草二两 鳖甲（醋炙）四两 五味子一两（焙） 青蒿四两（童便浸） 蕲艾（醋炙）二两 丹皮二两 香附（醋、酒、盐、童便各浸一两）四两

【用法】上为细末；再用新鲜紫河车一具，长流水浸半日，洗净；黑铅打成大铅罐一个，将河车放在铅罐罐内，再将黄柏四两，放在河车下，加白酒酿二斤，清水二碗，灌满铅罐，仍以铅化封口，再以铁锅盛水，将铅罐悬在砂锅内，煮两日夜为度，取出捣烂，和入药内拌匀，晒干，再研为末，炼蜜为丸，如弹子大，每丸重二钱五分，水飞朱砂为衣，黄蜡为皮。

【功用】安胎种子，调经养血。

【主治】妇人诸虚百损并胎前产后一切病症。

62680　胎产金丹

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】党参二两五钱　生地　香附　鳖甲各四两　白术　白薇　当归　川芎　丹皮　黄芩　玄胡　蕲艾　青蒿　乳香　赤石脂　益母草各二两　茯苓　五味　血琥珀　藁本各一两　安桂　白芍　甘草各一两五钱　沉香五钱

【用法】上为末，都拌匀，炼蜜为丸，每重二钱，辰砂为衣，蜡封口。

【主治】妇人胎前产后诸恙百病及子宫寒冷，艰于受孕，红白淋带疼痛，经停参前落后，行经腹痛，腰痠无力。

62681　胎产金丹

【方源】《中药成方配本》。

【组成】党参六两　炙黄耆五两　炒于术六两　茯苓六两　炙甘草四两　熟地二十两　炒白芍四两　炒当归八两　炒川芎二两　炒川断三两　炒杜仲三两　炒淮山药二两　炒萸肉三两　盐水炒菟丝子三两　紫河车五两　蛤粉炒阿胶四两　杞子二两　炒丹皮二两　盐水炒黄柏二两　炒椿根皮三两　炙乌贼骨三两　沉香一两　肉桂一两　炮姜炭一两　炒荆芥二两五钱　炒艾叶三两　制没药二两　制香附五两　桑寄生四两　藁本二两　白薇三两　赤石脂十两　益母草五两

【用法】先将熟地捣烂，与诸药打和，晒干为末，用白蜜七十二两炼熟，打和为丸，分做八百丸，每丸约干重二钱。每用一丸，开水化服。

【功用】补气养血，安胎保产。

【主治】妇女月经不调，赤白带下，胎前产后诸症。

62682　胎产金丹

【方源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【组成】当归　茯苓　人参　白术　白薇　炒杜仲　蕲艾　藁本　赤石脂　川芎各二两　川断三两　生地四两　阿胶　香附各四两　条芩一两五钱　沉香六钱　甘草一两　五味子一两　炒杭芍二两　没药一两二钱　菟丝子四两

【用法】鲜河车一具，用竹签挑去筋膜，洗净，用无灰酒煮烂，黄柏二两放在锅底，将前药共捣如泥，晒干，共为细粉，炼蜜为丸，重二钱，朱砂为衣，蜡皮封固。每服一至二丸，白开水送下。

【主治】妇女红白淋带，月经不调，腰腹作痛，习惯性流产，胎前产后诸症。

62683　胎元七味丸

【方源】《增订医方易简》卷九。

【组成】胎元三个(即男子脐带，瓦上焙干，存性)　陈棕七钱(数十年者佳，烧灰存性)　京牛黄三分　槐角子五钱(肥大者，瓦上焙干，存性)　刺猬皮三钱(醋炙)　象皮四钱(醋炙)　地榆三钱(晒干)

【用法】上为细末，酥油为丸，如蚕子大。若不能为丸，加糯米糊少许即成。每服七丸，空心白滚水送下。三日化管止痛，七日平满，血清脓止，十日除根。

【功用】化管除根，止痛。

【主治】痔漏，脓血通肠。

62684　胎产四物汤

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】白芍(酒炒)一钱　川芎七分　枳壳(麸炒)七分　陈皮八分　莪术(醋炒)六分　香附(炒)一钱　大腹皮　当归各一钱　紫苏七分　甘草三分

【用法】上锉。加生姜三片，葱白三根，水煎，空心服。

【功用】令人胎滑易产，去败血。

【主治】胎前产后，腰胯疼痛。

【宜忌】忌生冷。

62685　胎热地黄汤

《幼科证治大全》。为《医方大成》引汤氏方(见《医方类聚》卷二四六)“生地黄汤”之异名。见该条。

急

62686 急风丹

《局方》卷十（宝庆新增方）。为原书卷一（宝庆新增方）“急风散”之异名。见该条。

62687 急风散

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】草乌头不拘多少（用酽醋煮十余沸，漉出晒干，如此十遍为度）

【用法】上为细散。每服一字，温酒调下。

【主治】破伤风，腰背反折，项强直，牙关紧急。

62688 急风散

【方源】《圣济总录》卷八。

【组成】附子一枚（炮裂，去皮脐） 乌头二枚（炮裂，去皮脐） 天南星一枚（炮） 藿香（去梗） 防风（去叉） 白芷各半两 干蝎（全者，去土，炒） 白附子（炮）各一分

【用法】上为细散。每服半钱匕，豆淋温酒调下，并二服，未愈再服。

【主治】中风，身如角弓反张状。

62689 急风散

【方源】《幼幼新书》卷五引张涣方。

【组成】蛇蜕皮（微炒） 干蝎梢 钩藤各一分（以上捣罗为细末） 朱砂一分（细研，水飞） 好麝香 牛黄各半钱（并研极细）

【用法】上药都拌匀，再研为细末。每服一字，取竹沥一二点同乳汁调下。

【主治】撮口。

62690 急风散

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】白附子四枚（大者，去尖，生用） 全蝎（去毒）五枚（炙） 天南星一个（锉，炙深黄色） 半夏十个（汤洗七次，去滑尽） 天麻一分 腻粉半钱

【用法】上为细末。每以一钱分四服，薄荷酒调下。

【主治】中风瘾困不省。

62691 急风散

【方源】《洪氏集验方》卷五。

【组成】青胆矾（成片好者）

【用法】每用少许，研细。新水调少许咽之。吐痰为妙。大人亦治。

【主治】小儿喉闭，咽痛。

62692 急风散

【方源】《局方》卷八（吴直阁增诸家名方）。

【组成】丹砂一两 草乌头三两（一半生用，一半以火烧存性，于米醋内淬令冷） 麝香（研） 生乌豆（同草乌一处为末）各一分

【用法】上为细末，都拌匀。破伤风，以酒一小盏调服半钱；如出箭头，先用酒一盏调服半钱，却以药贴箭疮上。

【功用】①《局方》（吴直阁增诸家名方）：出箭头。②《医统》：止血定痛。

【主治】①《局方》（吴直阁诸家名方）：久新诸疮，破伤中风，项强背直，腰为反折，口噤不语，手足抽掣，眼目上视，喉中沸声。②《普济方》：年深日远，偏正头痛，肝脏久虚，血气衰弱，风毒之气上攻，头眩目晕，心忪烦热，百节痠痛，脑昏目痛，鼻塞身重，皮肤瘙痒，面上游风，状若虫行，及一切头风，妇人血风攻疰。

【备考】方中生乌豆，《普济方》引作“生乌头”，《杂病源流犀烛》作“生黑丑”。

62693 急风散

【方源】《局方》卷一（宝庆新增方）。

【异名】急风丹〔原书卷十（宝庆新增方）〕。

【组成】生川乌（炮，去皮脐） 辰砂（研，飞）各二两 生南星（洗，去皮）四两

【用法】上为细末。每用酒调，涂痛处。小儿伤风，鼻塞清涕，酒调，涂囟门上，不可服之。

【主治】偏正头痛，夹脑风，太阳穴痛，坐卧不安。小儿伤风，鼻塞清涕。

62694 急风散

【方源】《直指》卷三。

【组成】朱砂一字 轻粉一点 巴豆（去油如霜）些儿 全蝎一枚 蝉壳二枚（去土）

【用法】上为末，都拌匀。大人尽剂，用薄荷

泡汤调下;小儿分半,用乳汁调下。

【功用】吐痰,泻毒物。

62695 **急风膏**

【方源】《幼幼新书》卷九引张涣方。

【组成】好朱砂半两(细研,水飞,焙干) 天浆子(炒,为末) 干全蝎(为末)各二七个 腻粉一钱 青黛一钱(别研)

【用法】上药都拌匀,入脑子半钱,研细,用软饭和成膏。如皂子大,每服一粒,煎人参荆芥汤化下。

【功用】①《幼幼新书》:截急惊风,利胸膈。②《卫生总微》:清心神,截欲发已发惊痫。

62696 **急白汤**

【方源】方出《中医临证撮要》,名见《古今名方》。

【组成】金银花15克 连翘15克 犀角粉1.5克(冲服) 射干6克 板蓝根9克 天花粉15克 京赤芍9克 粉丹皮9克 生山栀6克 焦山栀6克 干芦根30克 淡竹叶15克

【功用】清热解毒,凉营止血。

【主治】急性白血病,寒热头痛,胸烦作恶,夜寐不安,神昏谵语,出汗口干,咽痛红肿,口鼻出血,舌苔黄腻,或糙,或干而焦黑,舌尖红,脉洪数或滑大。

【加减】抽风,加忍冬藤15克,嫩钩藤12克,羚羊粉2.4克(冲服);心烦,加胡黄连3克,黑玄参9克;皮肤血点,加丝瓜络15克,白茅根15克;尿血便血,加小蓟15克,生地榆15克,小生地12克;口腔咽喉腐烂,加青黛2.4克,轻马勃4.5克,人中黄6克,人中白6克。

62697 **急构饮**

【方源】《观聚方要补》卷十。

【组成】积雪草 蕺菜(并生用) 青黛

【用法】上先杵积雪草、蕺菜,绞取汁各半合,人青黛五分拌匀。数灌之。

【主治】惊风,瘀毒冲胸上窜,搐搦不已。

【加减】加牛黄亦良。

62698 **急济饮**

【方源】《玉案》卷四。

【组成】小蓟(捣汁) 童便 磨墨汁 藕汁各半钟 沉香(磨)一钱

【用法】作二次缓缓呷下。

【主治】吐血如泉之甚。

62699 **急消汤**

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】忍冬藤二两 茜草三钱 紫花地丁30g 甘菊花三钱 贝母二钱 黄柏一钱 天花粉三钱 桔梗三钱 生甘草三钱

【用法】水煎服。

【功效】消初起之阳毒。

【主治】发背。

62700 **急黄丸**

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】大黄半两(生,锉) 朴消一分(别研)

【用法】上用水二大盏,渍大黄一宿,次旦煎至一盏,去滓,下朴消搅令匀。分三次温服,不拘时候。快利即愈。

【主治】伤寒热毒所加,猝然心中满,气喘急,发热心战。

62701 **急救丸**

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【异名】霍乱急救丸(原书抚顺方)。

【组成】人中黄三两(一方用甘草一两) 天竺黄二两 麝香一钱 白僵蚕 防风 全蝎 荆芥各一两

【用法】上为极细末,水为小丸,朱砂为衣。每服五分,小儿减半,姜汤送下。

【功用】解热镇痛,消暑镇痉。

【主治】夏日中暑,头痛身热,恶寒发热,上吐下泻,四肢厥冷,腹中绞痛,周身抽搐,瘟疫发斑,小儿痘疹,红白痢疾,惊风。

【宜忌】忌食生冷、油腻之物;孕妇忌服。

62702 **急救丹**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】苍术(炒)十两 橘皮八两 五加

皮八两 厚朴(炙)八两 闹羊花八两 茯苓十六两 槟榔十两 细辛四两 百草霜四两 猪牙皂十二两 藿香十二两 灯心草炭十六两(共研为细粉,过罗) 雄黄粉四两 朱砂粉四两 冰片四两 麝香四两 牛黄三两二钱

【用法】上为细末,都拌匀,瓶装重二分。每服二分,温开水送下。外用闻入鼻内少许。

【功用】①《北京市中药成方选集》:祛暑解毒,通关开窍。②《全国中药成药处方集》:避瘴气,解浊秽。

【主治】①《北京市中药成方选集》:中寒中暑,感冒秽浊,昏迷气闭,四肢厥冷,呕吐恶心,腹痛作泄。②《中药制剂手册》:痈疽疮疖。

【宜忌】孕妇忌服。

62703 **急救汤**

【方源】《诚书》卷六。

【组成】猴狲粪(山中者良,家畜者不用)不拘多少

【用法】煎汤喂之。

【主治】脐风。

62704 **急救散**

【方源】《伤科汇纂》卷七引周鹤仙方。

【组成】当归尾(酒洗) 自然铜(醋制七次) 桃仁(去尖) 红花各七钱 陈麻皮三钱 土鳖虫(酒洗,浸,焙)五钱 骨碎补(酒蒸) 大黄各二钱 乳香(去油) 没药(去油) 老鹰骨 血竭 朱砂 雄黄 麝香各五分

【用法】上为极细末,收贮勿泄气。如遇跌死打死,尚有微气者,用酒调二厘,入口即活;如骨折瘀血攻心,用药八厘,酒灌之,其伤自愈。

【主治】跌打损伤。

62705 **急惊丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】天竺黄一两 天麻一两 僵蚕(炒)一两 钩藤一两 薄荷一两 茯苓二两 胆星八钱 朱砂五钱 犀角(粉)一钱 羚羊(粉)一钱 冰片一钱 牛黄五分 麝香五分

【用法】上为细末,过罗,炼蜜为丸,重五分,金衣三十六开,蜡皮封固。每服一丸,一日二次,温开水送下,周岁内小儿酌减。

【功用】清热镇惊,化痰祛风。

【主治】小儿急热惊风,目直天吊,痰涎气促,四肢抽搐。

62706 **急惊散**

《仙拈集》卷三。为《医便》卷四"仙传救急惊神方"之异名。见该条。

62707 **急喉丹**

【方源】《万氏家抄方》卷三。

【组成】山豆根 姜蚕(炒) 蚤休各一两 连翘 玄参 防风 射干各七钱 白芷五钱 冰片三分

【用法】上为极细末,糯米粉糊和成锭,铜绿二钱为衣。水磨服。

【主治】单蛾、双蛾、重舌。

62708 **急痛煎**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】陈皮 香附 吴萸 良姜 石菖蒲各等分

【用法】水一碗,煎七分,碗内先滴香油三五点,将药淋热服。

【主治】真急心疼。

62709 **急提盆散**

【方源】《阴证略例》。

【异名】提盆散、霹雳箭(《袖珍》卷五)。

【组成】草乌头不拘多少(生用)

【用法】上为极细末。用葱一枝,肥者削去须,头圆,上有葱汁,湿蘸之,任谷道中。

【主治】杂病非阴候者,大便数日不通。

【宜忌】非数日不通不用。

62710 **急风一字散**

【方源】《普济方》卷一一三。

【组成】雄黄二钱五分,天南星五钱 川芎五钱 全蝎一钱五分 白附子二钱五分 白芷五钱 川乌头二钱五分 辰砂一钱 麝香少许

【用法】上为末。每服半钱，温酒调下。

【主治】破伤风。

【宜忌】忌热物片时。

62711 **急性子洗剂**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】石菖蒲9克 艾叶15克 生川乌9克 独活15克 急性子9克 麻黄9克 桂枝9克 羌活9克 透骨草9克

【用法】水煎，熏洗。

【主治】鸡眼。

62712 **急治木通汤**

【方源】《蒿崖尊生》卷十三。

【组成】木通 滑石各五分 牵牛头末二钱五分

【用法】加灯心、葱白，水煎服。

【主治】便不通，腹痛不可忍。

62713 **急救三阴汤**

【方源】《证因方论集要》卷四引黄锦芳方。

【组成】熟地 附子 肉桂 人参 白术(土炒) 甘草(炙) 五味子

【用法】水煎服。

【主治】气虚脱肛，胸腹气胀。

【方论选录】本方所治之证，若不用附子、肉桂、熟地，不能以固下焦之肾而收脱肛；不用人参、五味，不能以收上焦气散如雾；不用白术、甘草，不能以固中焦之脾而使上下接引，所谓增二不能，缺一不可。

62714 **急救回生丹**

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】朱砂(顶高者)一钱五分 冰片三分 薄荷冰二分 粉甘草一钱(细末)

【用法】上为细末。分作三次服，开水送下，约半小时服一次。若吐剧者，宜于甫吐后急服之；若于将吐时服之，恐药未暇展布即吐出。服后温覆得汗即愈。服一次即得汗者，后二次仍宜服之；若服完一剂未全愈者，可接续再服一剂。若其吐泻已久，气息奄奄，有将脱之势，但服此药恐不能挽回，宜接服急救回阳汤。

【主治】霍乱吐泻转筋，诸般痧症暴病，头目眩晕，咽喉肿痛，赤痢腹疼，急性淋证。

【宜忌】《全国中药成药处方集》：体弱者及孕妇忌服。

【方论选录】朱砂能解心中窜入之毒，且又重坠，善止呕吐，俾服药后不致吐出；此方中冰片，宜用樟脑炼成者，因樟脑之性，原善振兴心脏，通活周身血脉，尤善消除毒菌，特其味稍劣，炼之为冰片，味较清馥，且经炼而其力又易上升至脑，以清脑中之毒也；薄荷冰善解虎列拉(即霍乱)之毒，且其味辛烈香窜，无窍不通，无微不至，周身之毒皆能扫除，矧与冰片又同具发表之性，服之能作汗解，使内蕴之邪由汗透出，且与冰片皆性热用凉，无论症之因凉因热，投之皆宜也；粉甘草最善解毒，又能调和中宫，以止吐泻，且又能调和冰片、薄荷冰之气味，使人服之不致过于苛辣也。

【临证举例】霍乱脱证 辽宁寇姓媪，年过六旬，孟秋下旬染霍乱，经医数人调治两日，病势垂危。其证从前吐泻交作，至此吐泻全无，奄奄一息，昏昏似睡，肢体甚凉，六脉全无，询之略能言语，唯觉心中发热难受。处方：镜面朱砂一钱半，粉甘草一钱(细面)，冰片三分，薄荷冰二分，共研细末，分作三次服。病急者四十分钟服一次，病缓者一点钟服一次，开水送下。复诊：将药末分三次服完，心热与难受皆愈强半。

62715 **急救回阳汤**

【方源】《医林改错》卷下。

【组成】党参八钱 附子八钱(大片) 干姜四钱 白术四钱 甘草三钱 桃仁二钱(研) 红花二钱

【用法】水煎服。莫畏病人大渴饮冷不敢用。

【功用】《医林改错评注》：回阳救逆，活血化瘀。

【主治】吐泻转筋，身凉汗多。

【方论选录】《医林改错评注》：方中用大量的参、附、姜、草(四逆汤加人参)回阳救逆，白

术健脾补中，以助回阳之力；因阳气虚易致血瘀，故佐桃仁、红花通气血之路，阳气更易回复。

【备考】本方方名，《湿温时疫治疗法》引作"新加附子理中汤"。

62716 **急救回阳汤**

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】潞党参八钱　生山药一两　生杭芍五钱　山萸肉八钱（去净核）　炙甘草三钱　赭石四钱（研细）　朱砂五分（研细）

【用法】先用童便半钟燉热，送下朱砂，继服汤药。服此汤后，若身温脉出，觉心中发热有烦躁之意者，宜急滋其阴分，若玄参、生芍药之类，加甘草以和之，煎一大剂，分数次温饮下。

【功用】交心肾，和阴阳。

【主治】霍乱吐泻已极，精神昏昏，气息奄奄，至危之候。

【方论选录】病势至此，其从前之因凉因热皆不暇深究，唯急宜重用人参以回阳；山药、芍药以滋阴；山萸肉以敛肝气之脱；炙甘草以和中气之漓，此急救回阳汤之所以必需也。用赭石者，不但取其能止呕吐，俾所服之药不致吐出，诚以吐泻已久，阴阳将离，赭石色赤入心，能协同人参助心气下降；而方中山药，又能温固下焦，滋补真阴，协同人参以回肾气之下趋，使之上行也；用朱砂且又送以童便者，又以此时百脉闭塞，系心脏为毒气所伤，将熄其鼓动之机，故用朱砂直入心以解毒，又引以童便使毒气从尿道泻出，而童便之性又能启发肾中之阳上达，以应心脏也。是此汤为回阳之剂，实则交心肾，和阴阳之剂也。

62717 **急救回春散**

【方源】《古方汇精》卷四。

【组成】远志　白僵蚕　制附子　天麻　干姜　朱砂各八分　白芥子　制胆星　黑甘草各一钱　冰片一分　西黄五厘

【用法】上为极细末，都拌匀。每服二分，用金银器并党参、白术各一钱，真橘红五分，煎汤送下，三服取效。

【主治】小儿慢惊、慢脾风证。

62718 **急救阴阳汤**

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】人参二两　黄耆三两　当归一两　熟地二两　甘草三钱　白术二两

【用法】水煎服。一剂而腹痛顿止，身热亦解，汗亦尽止矣。

【主治】冬月伤寒，阴阳两亡，大汗而热未解，腹又痛不可按。

【方论选录】此方用参、耆以补气，使阳回于阴之内；用当归、熟地以补血，使阴摄于阳之中；用白术、甘草和其肠胃，而通其腰脐，使阴阳两归于气海、关元，则亡者不亡，而绝者不绝也。倘认是阳症变阴，纯用温热之剂，加入肉桂、干姜、附子之类，虽亦能回阳于顷刻，然内无阴气，阳回而阴不能摄，亦旋得而旋失矣。

62719 **急救绿豆丸**

【方源】《痘疹会通》。

【组成】绿豆半斤　车前子　大麦冬　灯草　甘草各二两

【用法】上为细末，水为丸，如绿豆大，朱砂五钱为衣。每服一钱，阴阳水送下，或温茶亦可；赤痢，用红糖调下；白痢，用白糖调下；赤白痢，用红白糖调下。

【主治】夏月中暑受热，腹痛肚疼，霍乱转筋，羊毛疔，绞肠痧，痢疾。

62720 **急救稀涎散**

《附广肘后方》卷三。为《证类本草》卷十四引《孙尚药方》"救急稀涎散"之异名。见该条。

62721 **急救痧气丸**

【方源】《春脚集》卷三。

【异名】截痧丹。

【组成】真茅山苍术（米泔水浸三日，炒，研末）　真干蟾酥　腰面雄黄（另研细）　丁香（另研细）　枯骨广木香（微烘，勿炒，另研细）　飞滑石（另研细）　辰砂（水飞过，另研细）各一两二钱　麝香三分（要取真原麝黄香佳）

【用法】将诸药末和匀，再碾千余下，以烧酒浸烊蟾酥捣为丸，如芥菜子大。凡修合完备，于太阳旺时晒热，盛大碗内，上盖瓦盘，乘热摇颠，丸色发亮，用瓶盛贮备用，勿令泄气。每服三丸，阴阳水送下。痧重者加二丸。

62722 急救寒厥汤

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参三钱　白术一钱　附子一钱　肉桂一钱　吴茱萸一钱

【用法】水煎服。

【主治】厥症。

62723 急喉一匙金

【方源】《良朋汇集》卷三。

【组成】山豆根皮

【用法】醋浸。每服一匙，咽下。痰退立消。

【主治】咽喉肿痛。

62724 急痧至宝丹

【方源】《良方集腋》卷上。

【组成】蟾酥三钱(活蛤蟆，取下晒干，临用切片，烧酒化开)　西黄三分(研)　茅术四钱(土炒焦)　丁香二钱(研细)　朱砂一钱五分(水飞净)　木香二钱(研细)　雄黄三钱(水飞净)　沉香二钱(研细)　麝香一钱(拣净)

【用法】上件药先期各为极细末，都拌匀，同蟾酥加糯米粽尖五个，捣千余下，为丸，如椒子大，晒干，盛于瓷盖碗内；再用朱砂一钱五分，烧酒调涂碗内，盖好，摇一二千下，则光亮，收贮瓷瓶内。每服三丸，轻者一丸，重者五丸，泉水送下；或口内含化，津液咽下。

【功用】止痛。

【主治】霍乱吐泻，腹痛昏聩；及一切痧气、暑气、瘴气、途行触秽，中暑热，绞肠痧。

【宜忌】孕妇少服。服药后停烟、茶、酒、饭两时。

62725 急慢惊风丸

【方源】《全国中药成药处方集》(福州方)。

【组成】茯苓二两　黑胡连一两　酒大黄　川黄连各八钱　原麝香三分　牛黄二钱　天麻五钱　全蝉蜕一钱　羚羊角四钱　梅片一钱五分　朱砂五钱　川贝一两　天竺黄　法夏　葶苈　僵虫各五钱　灯心灰三钱　金礞石四钱

【用法】上为细末，竹沥汁为丸，赤金为衣。

【主治】小儿惊风，气促，咳嗽不宣，或牙关紧闭。

62726 急慢惊风丸

【方源】《全国中药成药处方集》(呼和浩特方)。

【组成】竺黄　天虫　天麻各一两　胆星八钱　钩藤一两　茯神二两　薄荷　防风各一两　朱砂　麝香　犀角　羚羊　牛黄　冰片各四钱

【用法】炼蜜为大丸，重五分，滴金衣，蜡皮封固。

【主治】急慢惊风。

【加减】慢惊风，加老山人参一两。

62727 急痧加宝平安散

【方源】《济急丹方》卷上。

【组成】牛黄三两(研)　珍珠(腐肉煮，研)四分　大冰片一钱　当门子一钱　枯矾五分　荜拨三分　雄黄二钱　朱砂三钱　青盐三分　明矾一钱　火消一钱　真佛面金五十页

【用法】上药各为极细末，用瓷瓶收贮，勿令出气。搐鼻取嚏，即时可解；其至危者，以凉水送下少许。

【主治】痧症。中暑毒重，头眩气闭，眼黑口噤，或饱胀呕吐。

亭

62728 亭长散

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】亭长六枚(去头足翅，糯米拌炒令黄色)　川大黄半两(锉碎，微炒)　细辛半两　桂心一分　鲮鲤甲一两(炙令黄)　枫树甲虫粪三指撮

【用法】上为散。每服一钱，空心温酒调下，晚食前再服。

【主治】蝼蛄瘘。

62729 亭脂丸

【方源】方出《瑞竹堂方》卷二，名见《普济方》卷二四二。

【组成】川乌一两（好者，生用） 无名异二两（研） 石亭脂一两（生用，研）

【用法】上为细末，用葱白捣烂，取自然汁为丸，如梧桐子大。每服一钱，空心生葱、淡茶送下，一日一次。

【主治】风湿脚气。

度

62730 度世丹

【方源】《遵生八笺》卷十七。

【组成】枸杞子 甘菊花（去萼用） 远志（用头，捶破，取去心） 车前子 生地黄（用干者，去芦） 巴戟 覆盆子 白术 肉苁蓉（择有肉者，酒浸七日） 石菖蒲（细小九节者） 续断 菟丝子（酒浸七昼夜，晒干，炒令黄色为度） 牛膝（去芦，用酒浸七日） 细辛（去苗） 何首乌 地骨皮（去土）各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。

【功用】安神志，定魂魄，顺五脏，和六腑，添智慧，乌髭须，通脉络，除劳损，续绝补败，驻悦颜色，滋润肌肤，聪明耳目，强健四肢，延年益智。

【主治】瘫痪痛楚，久在床枕，或有恶疾，肢体不安，行步艰辛，饮食少进，或寤寐不安，或痛连筋骨。

【宜忌】戒嗜欲。

【方论选录】枸杞子是荧之精，益血海，足筋骨，补气安神；甘菊花是木之精，服之聪明耳目，去寒湿手软，利九窍，通三焦；远志治胃膈痞闷，去忧郁，润肌肤，壮筋骨；车前子是镇星之精，益胃，安魂魄，驻颜，去夜惊妄想；生地黄是太阴之精，开心神，去邪，养脾胃荣卫之神；巴戟是黄金之精，去心疾，补血海，轻身延年；覆盆子是神水之精，助阳轻身，安五脏之神；白术是太阳之精，能正气吐逆，消食化痰湿，养荣卫；肉苁蓉入小肠，补下元；石菖蒲能升智慧，添神明，暖下元，补虚减小便；牛膝治湿脚气腰膝疼痛；细辛疗百病，顺气益血海；续断治五劳七伤；何首乌性湿无毒。

62731 度瘴散

【方源】《肘后方》卷二。

【组成】麻黄 椒各五分 乌头三分 细辛 术 防风 桔梗 桂 干姜各一分

【用法】上为末。平旦酒调服一盏匕。

【功用】辟山瘴恶气。

【主治】疫疠。

62732 度瘴散

《外台》卷一引《崔氏方》。为《千金》卷九“度瘴发汗青散”之异名。见该条。

62733 度瘴散

【方源】《千金翼》卷十。

【组成】麻黄（去节） 升麻 附子（炮，去皮） 白术各一两 细辛 干姜 防己 防风 桂心 乌头（炮，去皮） 蜀椒（汗） 桔梗各二分

【用法】上为散，密贮之。山中所在有瘴气之处，旦空腹饮服一钱匕，覆取汗。病重稍加之。

【主治】瘴气。

62734 度瘴散

《外台》卷一。为《千金》卷九引崔文行方“解散”之异名。见该条。

62735 度瘴发汗青散

【方源】《千金》卷九。

【异名】度瘴散（《外台》卷一引《崔氏方》）。

【组成】麻黄二两半 桔梗 细辛 吴茱萸 防风 白术各一两 乌头 干姜 蜀椒 桂心各一两六铢

【用法】上为末。温酒调服方寸匕，温覆取汗，汗出，止；若不得汗，汗少不解，复服如法；若得汗足，如故头痛发热，此为内实，当服玦豉丸或翟氏丸；如得便头重者，可以二大豆许纳鼻孔中，觉燥，涕出，一日可三四度，必愈。

【主治】伤寒，赤色，恶寒发热，头痛项强，

体疼。兼辟时行病。

【宜忌】《外台》:忌猪肉、生葱、生菜、桃李、雀肉等。

【方论选录】《千金方衍义》:度瘴青散乃治山岚瘴气之方,虽用麻黄、辛、防、桔透表发汗,全赖乌、桂、椒、姜、萸、术温中散邪,专为面赤戴阳而设。设服之不应,头疼发热如故,此必内有实邪固结,又为阳明病面合赤色,急须驶豉丸迅扫中外,不当以面赤为虚阳上泛而致扼腕也。

疬

62736 **疬子膏**

【方源】《扶寿精方》。

【组成】乳香　没药　大黄各二钱半　赤石脂二钱　孩儿茶三分　轻粉二分　冰片半分(另研)

【用法】上为细末,先以菜油二两煎滚,次入黄蜡一两熔化,入药末搅匀,起火,方入冰片再搅,瓷器收贮。先以花椒汤洗疮,随疮大小用油纸敷贴。

【主治】疬脓溃者。

62737 **疬串膏**

【方源】《同寿录》卷四。

【组成】雄猪胆七枚(切不可用瘟猪胆及母猪胆)

【用法】将上药倾入铜勺内,微火熬成膏,出火毒。以抿子脚挑涂疮口内,用布盖之。

【主治】疬串,不论新久溃烂。

62738 **疬疮痰核噙药**

【方源】《疡医大全》卷十八。

【组成】昆布(酒洗)　海藻(酒洗)　大黄(酒拌,蒸三次)　白僵蚕(姜汁拌炒)　真青黛(水飞)　胆南星　连翘各二两　桔梗　柴胡　瓜蒌仁　川黄连(酒炒)　片黄芩(酒炒)　橘红各一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如芡实大。不拘日夜噙之。

【主治】疬疮痰核。

疥

62739 **疥灵丹**

【方源】《扶寿精方》。

【组成】苦参(刮净,锉片,糯米泔浸一日,又换浸一日,取出晒干)二两　白蒺藜子(炒,杵去刺)一两　白芷一两　山栀(连壳用,炒)　枳壳(面炒)　羌活　当归　连翘各七钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。空心、临卧荆芥汤送下五十丸。

【主治】疥疮。

【备考】方中白蒺藜子,《回春》作"白鲜皮"。

62740 **疥灵丹**

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】大风子肉一两五钱　油核桃仁二十个　杏仁二两　川椒(末)五钱　木鳖子肉一两五钱　水银五钱　樟脑七钱　枯矾五钱　猪脂油一块

【用法】上药共捣千杵如泥,听用。须搔破搽之。

【主治】五疥八癣,经久不愈者。

62741 **疥灵丹**

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】花椒　枯矾　硫黄各等分

【用法】上为末。香油调搽,若棉油、柏油更好,蘸末火烤,频搽即愈;或倾成锭,用油磨搽更便。

【主治】疥。

62742 **疥灵丹**

【方源】《外科方外奇方》卷三。

【组成】硫黄　水银各一钱　油核桃肉一两　生猪板油一两

【用法】上药共捣如泥。闻嗅及擦患处。

【主治】疥疮。

62743 **疥药膏**

《全国中药成药处方集》(抚顺方)。为原书"疥疮膏"之异名。见该条。

62744 **疥疮药**

【主治】疥癣。

62752 **疥癣膏**

【方源】《经验良方》。

【组成】硫黄十八钱 硇砂二钱 家猪脂三十二钱

【用法】上炼和。涂患部。

【主治】疥癣,痔漏。

62753 **疥癣膏**

【方源】《汉药神效方》引《疡科秘录》。

【组成】中黄 硫黄

【用法】外用。顷刻间痛痒即止。

【主治】疥癣之大发,焮冲牵红线,痛甚剧者,或夏月暑夜痒甚不能安睡者。

【备考】中黄为胡麻油一升,黄蜡二十两,郁金(末)二两,黄柏(末)一两二钱,先煮胡麻油、黄蜡,待沫消后,用麻布滤过,加郁金末、黄柏末搅匀。

62754 **疥疮搽药**

【方源】《外科方外奇方》卷三。

【组成】白薇三钱 白芷二钱 炒花椒二钱 细茶叶二钱 寒水石二钱 大黄五钱 明矾五钱 蛇床子一钱 雄黄一钱 百部二钱 潮脑一钱

【用法】上为细末,用生腊猪油和匀捣烂。擦之。

【主治】疥疮。

62755 **疥药一扫光**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】胡桃仁一两 大风子肉一两 水银(炙)一钱 红砒一钱五分

【用法】上捣成细泥,每丸二钱重。每用一丸,擦心口处。

【功用】祛风除湿,杀虫止痒。

【主治】干疥,浓泡疥,湿疥,刺痒难受。

【宜忌】①《北京市中药成方选集》:切勿入口。②《全国中药成药处方集》(天津方):忌鱼腥、发物。

【备考】《全国中药成药处方集》(天津方)本方用法:每日一次,用布包裹在火上烤热,在胸口前轻轻擦之,擦至第五日的时候,隔一日,第七日再如前法擦之,俟前胸口处起小疮如小米粒状则痊愈。

62756 **疥药一扫光**

【方源】《全国中药成药处方集》(济南方)。

【组成】大风子仁五钱 核桃肉五钱 水银一钱

【用法】上捣细泥为丸,每付六丸,装纸匣。每用一丸擦心口,连用六日。

【主治】疥疮。

【宜忌】忌刺激性等物。不可入口。

62757 **疥药神效散**

【方源】《普济方》卷二七九引《德生堂方》。

【组成】槟榔一两 全蝎半两 蛇床子一两 倭硫黄一两半 (一方有荆芥末三钱)

【用法】上化开硫黄,入荆芥穗末,滚数沸;候冷,再加轻粉二钱,再为末,加板油半两;上药为细末,先将小油滚过,候冷调药搽疮上。仍以两手搓药闻气。

【主治】干湿脓窠,诸肿疥癣。

【备考】《奇效良方》本方用法:上化开硫黄,入荆芥末三钱,滚数沸,候冷,加轻粉二钱,冷再为末,加山奈半两妙,上为细末。先将小油滚过,候冷调上药,擦疮上。

62758 **疥疮一扫光**

【方源】《慈幼新书》卷十一。

【组成】水银一钱五分 乳香 没药 硫黄 樟脑 花椒各五分 蛇床子(炒)二钱五分 大风子(净肉)五钱

【用法】烛油调敷。

【主治】疥疮。

62759 **疥疮大风膏**

【方源】《医灯续焰》卷十三。

【组成】大风子二两(去壳) 枯矾四两 蛇脱(烧存性) 樟脑 蜂窠(烧存性)各三分 水银五分(用锡死之) 柏油烛四两

【用法】风子诸药为末,入烛油,次入水银捣匀。涂擦。

【主治】一切干湿疥疮并脓窠烂疮。

62760 **疥疮剪草散**

【方源】《外科方外奇方》卷三。

【组成】蛇床子三钱 寒水石二钱 芫荑二钱 剪草一钱 吴茱萸 枯矾 黄柏各一钱 苍术五分 厚朴五分 明雄黄五分 轻粉一钱

【用法】上为末。香油调敷。

【主治】癣疥。

疮

62761 **疮疖汤**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】生地15克 甘草9克 白蔹9克 土茯苓15克 入地金牛6克 甘菊9克 苦参6克 土兔冬6克 地肤子9克

【用法】水煎，内服。

【主治】疮疖。

62762 **疮毒化毒散**

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】乳香 没药 赤芍 花粉 川军 元连 甘草 绿豆面 白芷各三钱 贝母六钱 冰片五分 雄黄八分

【用法】上为极细末，后兑冰片、雄黄，再共为细末调匀，贮瓷瓶内。周岁小儿每服一分至五分，周岁以上者，每服五分至一钱，白开水送下。

【功用】解毒活血，透达经络壅塞，退热消肿，宣通气血凝滞。

【主治】痈毒热疖，焮肿痛疼；小儿胎毒，头疮秃疮；斑疹余毒，流脓流水；项肿腮肿，溃破流脓；耳疮耳底流脓水；各种血毒流脓；风火毒，血风疮。

62763 **疮药如神膏**

【方源】《普济方》卷二七九。

【组成】黄芩 黄柏 黄连 当归须 川芎 白芷 玄参 僵蚕 防风 斑蝥十枚 全蝎十枚 紫草 荆芥 蛇床子 花椒 槟榔 巴豆十粒

【用法】上㕮咀，入香油半碗浸药，春、秋五日，夏三冬七日，熬黑色为度；再下乌桕油一小碗，半寸断柳槐条一握，用槐柳枝条搅令匀；滤净，再下硫黄、雄黄、黄丹、轻粉，随多少再下明矾，一钱为率；先用乳香研细下，急搅匀。候冷，只将油敷疮。

【主治】疥疮。

【备考】方中黄芩、黄柏、黄连、当归须、川芎、白芷、玄参、僵蚕、防风、紫草、荆芥、蛇床子、花椒、槟榔用量原缺。

62764 **疮药消风散**

【方源】《普济方》卷二七二。

【组成】葱白十茎(细捣) 猪油(去膜，捣) 白矾 轻粉 水银各等分

【用法】上为末。调敷之。

【主治】疮。

62765 **疮药槟榔散**

【方源】《普济方》卷二七二。

【组成】槟榔 海桐皮 藜芦 菖蒲各一两 蔺茹二两 百部一两 鸡肠草二两 剪草一两 贯众一两 蛇床子二两 山栀子 芮草各一两

【用法】上㕮咀，同一处微火炒至焦黄色为度，为细末。用香油调，搽疮上，次入雄黄、白胶香为妙。

【主治】疮。

62766 **疮科保安丸**

【方源】《全国中药成药处方集》(呼和浩特方)。

【组成】银花二两 贝母五钱 归尾五钱 红花五钱 乳香三钱 没药三钱 生耆四钱 熟地四钱 麻黄二钱 防风三钱 花粉五钱 赤芍三钱 白芷三钱 牛膝四钱 地龙三钱 山甲三钱 石决明三钱 血竭三钱 雄黄五钱

【用法】每料兑麝香、冰片，炼蜜为大丸，重二钱，朱衣蜡皮。

【主治】疮疡。

62767 **疮科流气饮**

《外科发挥》卷五。为《玉机微义》卷十五“十

六味流气饮"之异名。见该条。

62768 **疮科蛤蟆丸**

【方源】《全国中药成药处方集》(福州方)。

【组成】防风二两　当归二两　薄荷二两　白芍二两　大黄二两　石膏二两　麻黄二两　连翘二两　芒消二两　甘草十二两　枯芩四两　桔梗四两　栀子二两　大风肉二两　荆芥一两二钱　苍术二两　滑石十二两　川芎二两　川连四两　百草霜二两　蛤蟆一百头

【用法】上为细末,水为丸。

【主治】一切顽疮疥癣,风毒湿痹。

62769 **疮痈消毒饮**

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】防风　荆芥　独活　连翘　花粉　红花　银花　黄芩　牛蒡子　甘草　何首乌

【主治】痘疹后余毒不散,身热不除,或生痈疽者。

【加减】胸腹,加瓜蒌;手臂,加桑枝;足腿,加牛膝;在上部,加桔梗;头面,加川芎;巅顶,加藁本;背脊,加羌活。

62770 **疮不收口熏条**

【方源】《外科十三方考》。

【组成】朱砂三钱　雄黄三分　银朱三钱　大风子三枚　木鳖子三钱

【用法】先将大风子、木鳖子二物捣碎,乃入前三味拌匀,以纸铺,卷成筒,约长二寸许即成。用时先将疮痂抓破,然后点燃熏之,后五六日间再熏一次。疮即收口痊愈。

【主治】疮不收口。

62771 **疮方通神乳香膏**

【方源】《普济方》卷三一四。

【组成】乳香　没药　血竭　黄丹　木鳖子二两　腻粉三钱　乌鱼骨二两　不灰木四两　五灵脂二两　海桐皮二两　沥青四两　蜡一两　麝香二钱　油八两(熬用)

【用法】上先将清油、木鳖子、不灰木等药熬香热;次下沥清,熬数十沸去滓;次入黄丹,槐柳条搅,滴水中不散;再下乳香、没药、血竭、麝香、腻粉一处搅匀。

【主治】疮疡。

【备考】方中乳香、没药、血竭、黄丹用量原缺。

62772 **疮肿风湿筋痛膏药**

【方源】《疡医大全》卷七引《济生》。

【组成】桐油八两　嫩松香(白者)一斤　西朱(上好者,研)　黄丹(飞,炒)各四两　葱汁　姜汁各一茶钟　乳香(去油,研)　没药(去油,研)各一两　百草霜一升五合(筛)

【用法】上煎桐油四五滚,下松香;又十数滚,下葱汁;再三五滚,下西朱;再四五滚,下黄丹;离火,再下乳、没,再下百草霜搅匀,收藏。任摊贴。

【主治】疮肿,风湿筋痛。

疯

62773 **疯油膏**

【方源】《中医外科学讲义》。

【组成】轻粉一钱半　东丹一钱　飞辰砂一钱

【用法】上为细末,先以麻油四两煎微滚,入黄蜡一两再煎,以无黄沫为度,取起离火,再将药末渐渐投入,调匀成膏。涂擦患处。

【功用】润燥,杀虫,止痒。

【主治】鹅掌风,牛皮癣,慢性湿疹等皮肤皲裂,干燥作痒。

62774 **疯损膏**

【方源】《外科百效》卷一。

【组成】三角枫　珍珠藤　墨斗草各三斤　水胡椒草十斤

【用法】上药共洗净,捣烂,取自然汁同姜汁半斤、好醋二碗、鲜米泔二碗、黄丹末、陀僧末一两同煎成膏。任用。

【功用】拔毒追脓。

【主治】痈毒恶疮,软疖瘰疬,肩背诸损,腹中痞块及疟疾。

62775 **疯气药酒**

【方源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】钻地风 宣木瓜 汉防己 秦艽 野桑梗 川羌活 粒红花 千年健 当归各四钱 南枣二十枚 冰糖二两 陈酒四斤

【用法】用大瓦瓶一只，将药连酒浸入瓶内，封口，隔水煮滚，点一炷香，候香缓缓再滚，香尽药好。每日清晨，随量饮之；如不见效，再服一剂。即愈。

【主治】疯气。

62776 疯气膏药

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】川乌八两 闹洋花八两 川山甲四两 草乌八两 血余四两

【用法】上药用香油三斤，春秋浸七日，冬十日，夏三日，用槐柳条不住手搅，火熬枯油至黑色，用棕滤去滓，净油听用；每药油六两，下松香一斤（其松香先日熔化，滤去滓物，待冷打碎，用葱、姜汤拌，晒干），共熬滴水成珠，倒入水缸内，拔去火毒，将瓷物盛了，用清水浸之。用时，先用鸽粪、麦麸炒干，将热醋调敷患处，候干，再去前药，贴膏药。

【主治】疯气。

【宜忌】贴时勿见火焙。

62777 疯气膏药

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】乱头发（洗净，晒干）半斤 地骨皮一两 寻风藤一两 当归一两 黄蜡二两 五加皮四两 防风一两 黄柏（去皮）四两 独活一两 木鳖子（去壳）一两 姜汁半斤 葱汁半斤

先将松香二斤下锅熬化，将棕二斤滤去滓，将清水浸之；然后将麻油二斤下锅熬，就下前粗药、葱姜汁入内，武火熬，各药将枯，再加端午日采百草入内共熬枯，将棕滤去药滓；再将锅抹净，复下药油入锅内，慢火熬，再下松香、黄蜡，滴水成珠，然后下百草霜半斤，细下入锅，收水气（将百草霜预先研极细，筛去粗者，然后下入药油内），候膏成住火，慢下细药。

孩儿茶五钱 樟脑一钱 乳香（箬去油，碾）一两（研） 没药（箬去油，研）一两 龙骨三钱 轻粉三钱 血竭一两 麝香五分

【用法】上为极细末，俟住火，将冷方渐下，不住手搅匀，将冷水浸之，听用。

【主治】疯气。

恒

62778 恒山丸

【方源】《医心方》卷十四引《深师方》。

【组成】大黄一两（一方二两） 附子一两（炮） 恒山三两 龙骨一两

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。平旦服七丸，未发中间复服七丸，临发服七丸。若不断，至后日复发，更服如此法。

【主治】诸疟。

62779 恒山丸

【方源】《千金》卷十。

【异名】祛邪丸（《活人书》卷十七）、麻黄丸（《圣济总录》卷三十四）。

【组成】恒山 知母 甘草 大黄各十八铢 麻黄一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。未食服五丸，每日二次，不知渐增。以愈为度。

【主治】①《千金》：痎疟。②《圣济总录》：瘅疟。

62780 恒山丸

【方源】《千金》卷十。

【组成】恒山三两 甘草半两 知母 鳖甲各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。未发前酒调服十丸，临发时一服，正发时一服。

【主治】脾热为疟，或渴或不渴，热气内伤不泄，令人病寒腹中痛，肠中鸣，汗出。

【宜忌】《外台》：忌生葱、生菜、海藻、菘菜、入苋等。

【方论选录】《千金方衍义》：五脏之疟，皆在于经。其主治之用，总以恒山、蜀漆为破的之金鞭；其热在于肝，令人颜色苍苍，又须乌

梅、鳖甲引以收耗散之阴;热在于脾,令人腹痛肠鸣,又须甘草为引以滋燥竭之土。

【备考】本方方名,《外台》引作"常山丸"。

62781 恒山丸

【方源】《千金》卷十一。

【组成】恒山 蜀漆 白薇 桂心 鲍甲 白术 附子 鳖甲 䗪虫 贝齿各一两半 蜚虻六铢

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五丸,以米汁送服,一日三次。

【主治】胁下邪气积聚,往来寒热如温疟。

【方论选录】《千金方衍义》:此沉寒固结,虽用恒山、蜀漆、二甲、䗪、虻、贝齿削坚破瘀之剂,不得附、桂辛温,无以动之;白薇功专开泄旺气,力除寒热洗洗,发作有时;白术生能逐湿散血,并助诸药破积之力也。

62782 恒山丸

【方源】《圣惠》卷五十二。

【异名】常山丸(《普济方》卷一九八引《经效济世方》)。

【组成】恒山一两(锉) 甘草半两(炙微赤,锉) 知母一两 豉一合 鳖甲一两(涂醋炙令黄,去裙襕) 麝香一分(细研)

【用法】上为末,入麝香研匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,未发前以温酒调服,临发再服。

【主治】热气内伤不泄所致脾疟,肠中热痛,外寒,肠中鸣,转汗出。

62783 恒山丸

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】恒山半两 野狸头骨一分 虎头骨一分 猢狲头骨一分 天灵盖一分 绿豆(末)三分 臭黄一分(细研) 安息香二分 朱砂一分(细研) 雌黄一分(细研) 砒霜三分 乳香一分 阿魏一分 白芥子二分

【用法】上药并生为末,用软饭和捣三二百杵,为丸如梧桐子大。未发时,以绛囊盛,子中指上系一丸,男左女右。三日如不住,以熟水送服一丸。

【主治】寒疟,阳虚阴盛,内外俱寒,四肢颤掉。

【宜忌】有娠妇人及小儿不得服。忌食热物。

【备考】本方方名,《幼幼新书》引作"常山丸"。

62784 恒山丸

【方源】方出《圣惠》卷五十二,名见《普济方》卷一九九。

【组成】恒山一两(锉) 桃仁六十枚(汤浸,去皮尖双仁,别捣为膏) 豉一合(炒干)

【用法】上为末,以鸡子白生用为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空腹以桃符汤送下,欲发时又服三十丸。

【主治】山瘴疟。

62785 恒山丸

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】恒山一两半 白蜜一合 鸡子白二枚

【用法】上件药相和于铫子内,以慢火熬令可丸,即为丸,如梧桐子大。每服二十丸,空腹以粥饮送下,晚食前再服,过时不发,任自吃食。

【主治】一切疟。

62786 恒山丸

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】恒山一两(末) 白蜡半两 鸡子一枚

【用法】上敲鸡子,去黄用清,与恒山末拌匀;于瓷碗中熔蜡,都拌和,以绵幕碗口,坐甑中蒸三遍,取出为丸,如麻子大。每服五丸,以粥饮送下。当吐即愈。

【主治】小儿疟疾。

62787 恒山丸

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】恒山半两 川大黄半两(锉碎,微炒) 甘草半两(炙微赤,锉) 麝香半两(钱)(细研)

【用法】上为末,研入麝香令匀,炼蜜为丸,

如梧桐子大。每临发前以暖水送下二丸，三岁以下即服一丸。

【主治】小儿疟疾，发时壮热憎寒，面色青黄，饮食不下。

62788 恒山丸

《普济方》卷三二四。即《千金》卷四“辽东都尉所上丸”。见该条。

62789 恒山汤

【方源】《医心方》卷十四引《范汪方》。

【组成】恒山六分 甘草四分 知母三分 麻黄三分 大黄四分

【用法】上切。以水五升，煮取二升，分三服，至发时令尽。

【主治】疟，痰实不消。

62790 恒山汤

【方源】方出《医心方》卷十四引《小品方》，名见《千金》卷五。

【异名】常山饮（《圣济总录》卷三十四）。

【组成】小麦一升 淡竹叶一虎口 恒山三两

【用法】上药以水五升宿渍，明旦煮取三升半，分三次服完。

【功用】断痰疟。

【主治】《千金》：小儿温疟。

【方论选录】《千金方衍义》：恒山专涤内蕴之痰，为截疟之峻味；小麦、竹叶专清胃中烦热也。

【备考】本方方名，《外台》引作“常山汤”。

62791 恒山汤

【方源】《医心方》卷十四引《古今录验》。

【组成】恒山二两 甘草一两 大黄二分 桂心六铢

【用法】上切。以恒山酒渍一夜；诸药以酒三升，水二升，煮取七合，顿服。下、吐，愈。

【主治】疟疾十岁、二十岁。

62792 恒山汤

【方源】《千金》卷十。

【组成】恒山三两 乌梅三七枚 香豉八合 竹叶（切）一升 葱白一握

【用法】上㕮咀。以水九升，煮取三升。分三服，至发令尽。

【主治】肾热发为疟，令人凄凄然腰脊痛，宛转大便难，目眴眴然，身掉不定，手足寒。

【宜忌】《外台》：忌生葱、生菜等。

【备考】本方方名，《外台》引作“常山汤”。

62793 恒山汤

【方源】《千金》卷十。

【异名】常山秫米汤（《圣济总录》卷三十六）、秫米汤（《普济方》卷一九八）、秫米常山甘草汤（《痎疟论疏》）。

【组成】恒山三两 秫米二百二十粒 甘草半两

【用法】上㕮咀。以水七升，煮取三升，分三服，至发时令三服尽。

【主治】肺热痰聚胸中，来去不定，转为疟，其状令人心寒，寒甚则发热，热间则善惊，如有所见者。

【宜忌】《外台》：忌生葱、生菜、海藻、菘菜等。

【方论选录】《千金方衍义》：五脏之疟皆在于经，总以恒山、蜀漆为破的之金锌；热在于脾，令人腹痛肠鸣，又须甘草为引，以滋燥竭之土；热在于肺，令人痰聚胸中，来去不定，又须秫米为引，以护伤残之气。

【备考】本方方名，《外台》引作“常山汤”。

62794 恒山汤

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】恒山一分 甘草一分（生用） 蜀漆半分 犀角屑半分

【用法】上锉细。以水一大盏，煎至五分，去滓，不拘时候顿服。须臾当吐为效。

【主治】伤寒结胸，烦满，喘息稍急，汤饮不下。

62795 恒山汤

【方源】《鸡峰》卷九。

【组成】柴胡八两 恒山 芒消 大黄各十二两 黄芩 龙胆 茵陈 秦艽各六两 栀子十四个

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，煎至六分，去滓，温服，不拘时候。

【主治】急黄，酒黄，心黄，劳黄，气喘欲发。

62796　**恒山汤**

《普济方》卷一九七。即《全生指迷方》卷二“常山汤”。见该条。

62797　**恒山汤**

《普济方》卷一九八。即方出《肘后方》卷三，名见《外台》卷五“常山汤”。见该条。

62798　**恒山饮**

《普济方》卷三九〇。为《医方大成》引张氏方(见《医方类聚》卷二四五)“常山饮”之异名。见该条。

62799　**恒山酒**

《普济方》卷一九七。为《圣惠》卷五十二“恒山饮子”之异名。见该条。

62800　**恒山散**

【方源】方出《千金翼》卷十九，名见《圣惠》卷四十。

【组成】常山一两　云母粉二两

【用法】上为散。每服一方寸匕，热汤送服。吐之，止；吐不尽，更服。

【主治】痰饮头痛，往来寒热。

62801　**恒山散**

【方源】《医心方》卷十四引《效验方》。

【组成】恒山五分　干漆四分　牡蛎二分　杏子仁二分

【用法】上药治下筛。每服方寸匕，酒调服，一日三次。

【主治】三十年疟。

62802　**恒山散**

【方源】《圣惠》卷九。

【异名】常山汤(《圣济总录》卷二十一)。

【组成】恒山三分　甘草三分(生用)　鳖甲三分(涂醋炙令黄，去裙襕)　石膏三分　柴胡三分(去苗)　知母三分

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入淡竹叶十片，煎至六分，去滓，温服之，不拘时候。当吐顽涎，后即服和气治中汤。

【主治】伤寒四日，太阴初受病。

62803　**恒山散**

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】恒山一两(锉)　柴胡一两(去苗)　栀子仁一两　石膏二两　乌梅肉三七枚(微炒)　甘草一两(炙微赤，锉)　蜀漆二两　鳖甲二两(涂醋炙令黄，去裙襕)

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入竹叶二七片，豉五十粒，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】心疟，令人心烦，渴欲得饮水，寒热不歇，乍来乍去，不思饮食。

62804　**恒山散**

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】恒山一两　乌梅肉一两(二七枚，捣)　香豉一合　葱白一握　桃仁半两(汤浸，去皮尖，麸炒微黄)

【用法】上锉细。都以水二大盏，煎至一盏半，去滓，分为三服，于欲发时前服尽。

【主治】肾热为疟，令人悽悽，腰脊痛，宛转大便难，忽然手足寒。

62805　**恒山散**

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】恒山半两　朱砂一分(细研)　乌梅肉半两(生用)

【用法】上为散，入朱砂研匀。每服一钱，于发前以醋汤调下。以吐为度。

【主治】痰实疟，发歇寒热不定。

62806　**恒山散**

【方源】《圣惠》卷五十五。

【组成】恒山一两　茵陈一两　赤茯苓一两　知母一两　鳖甲一两(涂醋炙令微黄，去裙襕)　甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入豉四十九粒，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】疟黄。

62807　**恒山散**

【方源】《圣惠》卷七十四。

【异名】常山汤(《中藏经》卷八)。

【组成】恒山一两 甘草半两（炙微赤） 黄芩半两 乌梅十四枚（微炒） 石膏一两（捣碎）

【用法】上锉细。以酒一大盏，水一大盏相和，浸一宿，平旦煎至一盏，去滓，分为二服。

【主治】妊娠疟疾。

62808 **恒山散**

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】恒山半两 川大黄半两 桂心一分 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓，未发前温服，得吐利为度；如未吐利，再服。

【主治】小儿疟疾，痰壅烦闷。

【备考】本方方名，《幼幼新书》引作"常山散"。

62809 **恒山散**

《普济方》卷一九七引《杨氏家藏方》。为方出《肘后方》卷三，名见《千金》卷七"恒山甘草汤"之异名。见该条。

62810 **恒山散**

【方源】《普济方》卷一九七引《经效济世方》。

【组成】真恒山 干青蒿 乌梅 赤芍药 甘草（炙）各等分

【用法】上为末。每服五钱，水一盏半，煎至八分，去滓，露一宿，于发日五更服，如虚日温过。

【主治】疟疾。

62811 **恒山饮子**

【方源】《圣惠》卷五十二。

【异名】常山酒（《圣济总录》卷三十五）、恒山酒（《普济方》卷一九七）。

【组成】恒山三分 乌梅肉七枚（微炒） 豉心半两 桃枝一握 鳖甲三分（涂醋炙令黄，去裙襕） 虎头骨三分（涂酥炙令黄） 柳枝一握 干枣三枚 生姜半两 桃仁二七枚（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄）

【用法】上锉细。以酒四大盏浸一宿，明旦煎取两盏，去滓，空心分为三服。

【主治】劳疟，四肢羸瘦，不思饮食。

62812 **恒山乌梅汤**

【方源】《普济方》卷一九七引《肘后方》。

【异名】常山乌梅汤（《外台》卷五引《深师方》）。

【组成】乌梅 桂心 芫花 半夏 恒山各半两 豉五合（绵裹） （一方无半夏、恒山）

【用法】上切。以酒三升，水四升合煮，取二升，分三服。必得吐。

【功用】催吐痰涎。

【主治】疟，膈痰不得吐。

【宜忌】忌生葱、羊肉、饧、生菜。

62813 **恒山甘草汤**

【方源】方出《肘后方》卷三，名见《千金》卷七。

【异名】恒山散（《普济方》卷一九七引《杨氏家藏方》）、常山散（《儒门事亲》卷十二）。

【组成】常山二两 甘草一两半

【用法】合以水六升，煮取二升，分再服。当快吐仍断，勿饮食。

【主治】①《肘后方》：寒热诸疟，发作无常，心下烦热。②《千金》：风毒脚气，寒热日再三发。

【宜忌】《普济方》：忌海藻、菘菜、生葱、生菜。

【方论选录】《千金方衍义》：恒山善去浊湿痰垢，甘草解毒和中，毒湿蠲除而脚弱自愈，乌有寒热之患乎？

【备考】本方方名，《外台》引作"常山甘草汤"。

62814 **恒山橘皮散**

《普济方》卷一九八。为《圣济总录卷》三十六"橘皮散"之异名。见该条。

62815 **恒山鳖甲散**

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】恒山 鳖甲各八分 乌梅二十个 甘草八分 犀角六分 桃仁三七个 知母

石膏三分

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，竹叶二片，同煎至六分，去滓服之。

【主治】痰鬼瘴疟。

【备考】方中知母用量原缺。

62816　**恒田退斑汤**

【方源】《痘疹仁端录》卷十三。

【组成】石膏五钱　青黛五钱　红花五钱

【用法】上为末。紫草汤送下。

【主治】痘后发斑。

闻

62817　**闻香散**

【方源】《普济方》卷二七二。

【组成】硫黄　蛇床子　黄连　黄柏　轻粉　大椒各等分

【用法】上为细末。以芝麻油调，搽疮上，将手鼻内闻香。

【主治】一切疮。

炼

62818　**炼石丹**

【方源】《痧症全书》卷下。

【组成】千年石(即陈石灰，水飞)一两　松根石(即真琥珀)三钱　水骨石(即白滑石，水飞)二钱

【用法】水为丸，或神曲糊为丸，表热烦躁者，青黛为衣；眩晕心闷者，朱砂为衣。每服二钱，垂头芦粟汤送下。

【主治】痧胀。

62819　**炼石散**

【方源】《疮疡经验全书》卷二。

【组成】鹿角(烧灰)八两　白蔹三两　粗厉黄石二斤

【用法】上用好醋五升，先烧石通红，淬醋中，再烧再淬，醋尽方止，为末；加二味末，将剩下醋调如泥。涂上消软，灸处亦涂之。

【主治】胸面部疽毒坚如石碗者，其色不变。

62820　**炼阴丹**

【方源】《鸡峰》卷十二。

【异名】安息香丸(《瑞竹堂方》卷二)。

【组成】玄胡索　海藻　昆布　青橘皮　胡芦巴　茴香　川楝肉　马蔺花(醋炒)各一两　木香半两　大戟(醋炙)　阿魏　硇砂　安息香各一分　酒　醋各一分

【用法】先将阿魏以下入酒、醋内熬成膏，放冷，入麝香一钱，再搅匀，和前药为丸，如绿豆大。每服五、七、十丸，空心烧绵灰酒送下。

【主治】足少阴凝涩气，下坠肿胀，卵核偏，如石游走，疼痛不定。

62821　**炼阴丹**

《普济方》卷二四九。为《圣济总录》卷九十四“延胡索丸”之异名。见该条。

62822　**炼青丸**

《圣济总录》卷一七六。为《博济》卷四“烧青丸”之异名。见该条。

62823　**炼毒丹**

【方源】《疡医大全》卷十六引《刘氏秘方》。

【组成】熟石膏一两　白砒二钱

【用法】上为末，都拌匀，用面包好，火煅烟尽为度，又乳极细。每次用一钱，以滚水冲，用筷子急搅，澄清，候温，取上面清水漱之，先微痛，再换，第二次漱之。即生皮痊愈。

【主治】走马牙疳。

62824　**炼砂丹**

【方源】《普济方》卷十八引《指南方》。

【组成】辰砂　天仙子(择净)各一两

【用法】上以水一碗，银器内煮，令天仙子芽出，去天仙子不用；将辰砂研令极细，滴水炼蜜为丸，如豌豆大。每服一丸，空心入参汤送下。

【主治】心狂。

62825　**炼盐散**

【方源】方出《直指》卷十，名见《袖珍》卷三。

【组成】雪白盐(入瓷瓶内筑十分实，以瓦盖顶，黄泥涂封，火煅一日，取出放阴地上一

夜，用密器收） 白茯苓 山药（炒）各一两

【用法】上为末，入盐一两研和；用沸汤浸枣取肉，研，夹炼蜜再为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心枣汤送下。

【主治】①《直指》：漏精白浊。②《医方类聚》引《寿域神方》：思虑太过，心肾虚损，真阳不固，溺有余沥，小便白浊，梦寐频泄。

62826 **炼真丸**

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】大腹子七两（童便浸，切） 茅山苍术（去皮，泔浸，麻油炒） 人参 茯苓各三两 厚黄柏三两（童便、乳汁、盐水各制一两） 鹿茸（大者）一对（酥炙） 大茴香（去子）一两 淫羊藿（去刺，羊脂拌，炒） 泽泻 蛇床子（酒炒） 白莲须（酒洗） 沉香（另末，勿见火） 五味子各一两 金铃子（即川楝子，酒煮，去皮核）三两 凤眼草一两（即樗树叶中有子一粒，形如凤眼，故名；如无，樗根皮代之）

【用法】上为末，用干山药末调糊代蜜为丸。空心盐汤送下三四钱，临卧温酒再服二钱。

【主治】高年体丰痰盛，饱饫肥甘，恣情房室，上盛下虚，及髓脏中多著酒湿，精气不纯，不能生子。

【方论选录】①《张氏医通》：炼真者，煅炼精气，使之纯粹也。故方中专以大腹佐黄柏、茅术，涤除身中素蕴湿热，则香、茸、茴香不致反助浊湿痰气，何虑年高艰嗣哉？②《古方选注》：炼真者，炼本身之精气神，不为阴邪所蔽，常使虚灵不昧，以复天真也。统论方义，似仅能去湿热、通阳道而已，然细绎其配合之理，却有斡旋造化之妙。盖膏粱之湿，伤及肾阴，非苍术不能胜其湿；膏粱之热，扰动阴火，非黄柏不能制其热，二者涤身中素蕴之湿热也。茯苓上渗水饮；泽泻下通水道，二者引未蓄之湿热，旋从小便而出也。蛇床子燥阴湿，益阳事；淫羊藿起阴痿，兴绝阳，二者通命门之真火以生气也。白莲须清心通肾，交媾水火，会合木金；五味子收五脏之阴，功专摄金气以生真水，二者兼顾精气神，以寓生生不息之机也。沉香入肾壮阳暖精；大茴香开上下之经气，内接丹田，二者芳香走窜，诸药虽具补泻之功，借其芳香乃能入也。人参升举五脏之阳，鹿茸督率奇经之阳，二者宣发真阳以迎合精气神也。金铃子泄气分之热，引相火下行；凤眼草清血中之热，使真阴内守，二者为诸药之向导也。独以大腹子为君者，非但取其迅坠诸药至于下极之功，且佐术、苓、泽泻、黄柏、金铃等扫除清道，不致茸、茴、蛇、藿反助素蕴之湿热，亦种玉之一则也。

62827 **炼雄丹**

【方源】《医级》卷八。

【组成】雄黄一斤（水煮七次） 菖蒲一两六钱

【用法】上为末，水法修合。每服五分，白汤送下。端午节修合尤佳。

【主治】疟疾，痢疾，暑湿诸候。

62828 **炼雄丹**

【方源】《霍乱论》卷下。

【组成】极明雄黄一分（研极细） 提净牙消六分

【用法】上为细末，同入铜勺内，微火熔化，都拌匀，俟如水时，急滤清者于碗内，粗滓不用，俟其凝定收藏。

【主治】暑秽痧邪直犯包络，神明闭塞，昏愦如尸；及霍乱初定，余热未清，骤尔神昏，如醉如痴，身不厥冷，脉至模糊。

【备考】《感证辑要》本方用法：用时以木通一钱，通草三钱，腊雪水一碗煎汁去滓，再入腊雪水九碗与药汁和匀；每次用药水一碗磨入犀角汁三分，挑入炼雄三厘。能于三日内服尽十碗药水，必有清痰吐出数碗而愈。

62829 **炼石补天**

【方源】《喉科种福》卷四。

【组成】制乳香一钱 赤石脂三钱 制没药一钱 北细辛一分 人中白二钱 白马粪二钱 象皮一钱 人中黄二钱 血竭二钱

上冰片一分　朱砂一钱

【用法】上为末。吹之。

【主治】咽痛微嗽，口烧而不渴，足心如烙，阴燥，喉久烂者。

【宜忌】杨梅毒喉禁用。

【加减】痒，加荆芥一钱。

62830　炼钟乳散

《外台》卷三十七。即《千金》卷二十七"钟乳散"。见该条。

炮

62831　炮肾散

【方源】《奇效良方》卷四十。

【组成】巴戟(去心，麸炒)　甘遂(炒黄)　木香　苦葶苈(炒)　沉香(锉)　泽泻各一分　腻粉一钱　槟榔(一枚生，一枚炮)　陈皮(去白)　芫花(醋拌炒)　麦蘖各半两

【用法】上为末。每服二钱，用猪腰子一枚，以竹刀割开，去筋膜，切作三片，掺药末在内，用湿纸裹，慢火煨令香熟；先煮葱白三茎令熟，细切，将葱白与粟米同煮粥一碗。先食粥一半，方食腰子，药后再食粥令尽，临卧时服。至五更大小便下赤黄恶物是效。

【主治】水气肿满。

62832　炮附子丸

【方源】《得效》卷四。

【组成】附子(炮，去皮脐)二两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大，就湿以大黄末五钱为衣。每服十丸，加至二十丸，用姜汤送下。

【主治】胃脘有热，胃中有寒，呕吐不止。

烂

62833　烂金丸

【方源】《三因》卷十。

【组成】大猪肚一个　黄连三两　蜜　生姜各二两(研)

先将猪肚净洗，复以葱、面、醋、椒等洗，控干；用药同水酒入银石器内煮半日，漉出黄连，洗去蜜酒令尽，锉，研为细末，再用酒调成膏，入先洗猪肚内，缝定，入银石器内水煮烂，研为膏，搜下项药：

人参二两　黄耆四两　五味子　山药　山茱萸　杜仲(去皮，锉，姜汁淹，炒丝断)　石斛　车前子　鳖甲(醋炙)　熟地黄　新莲肉(去皮)　当归各二两　槐角子(炒)　白茯苓　磁石(煅碎)各一两　川芎一两　沉香半两(不焙)　麝香一钱(别研入)　菟丝子(酒浸湿，研)五两　(一法有白术二两　阳起石一两)

【用法】上为末，用猪肚膏搜和得所，膏少则添熟蜜，杵数千下，为丸如梧桐子大。每服五十丸，食前温酒、糯米汤任下。

【功用】补精血，益诸虚，解劳倦，去骨节间热，宁心强志，安神定魄，固脏腑，进饮食，免生疮疡。

【宜忌】热中消渴止后宜服之。

62834　烂泥丸

【方源】《梅氏验方新编》卷七。

【组成】生大蒜一枚(如有独蒜更妙)

【用法】选多人行走地土上，用口唾沫将蒜在地上磨烂，即以蒜泥涂敷在患处；如已见头，即留出头，涂敷四围。

【主治】一切无名肿毒或痛或痒。

62835　烂弦散

【方源】《全国中药成药处方集》(禹县方)。

【组成】炉甘石一两　黄连一钱　黄柏一钱　蔓荆子一钱　菊花一钱

【用法】将上药熬水冲甘石，澄清，干后以艾叶七十个熏之，装瓶内。香油调搽，抹眼患处。

【主治】烂弦风，红眼眶。

【宜忌】翳障眼忌用。

62836　烂积丸

【方源】《饲鹤亭集方》引海藏。

【组成】芦荟一钱五分　天竺黄三钱　穿山甲(面炒)三钱　白信(煅)七分　巴霜(去油)六钱　硼砂一钱　硇砂一钱

【用法】上为细末，黄蜡一两四钱熔化为丸，如绿豆大。每服五丸，温酒送下。

【功用】烂积。

【主治】湿热之物蕴积肠胃日久生虫，裹血聚气，胸腹胀痛，面黄肌瘦，食少神倦，溲涩便溏。

【宜忌】忌葱、韭发物。

62837 **烂积丸**

【方源】《医门八法》卷二。

【组成】二丑八两 生大黄八两 熟大黄八两 青皮 山楂 三棱 莪术 莱菔子各四两

【用法】上为丸，红面为衣。

【主治】伤食。

62838 **烂积丸**

【方源】《蠢子医》卷二。

【组成】大黄 二丑各一斤 君子肉二两 山甲一两 滑石二斤 皂角一斤 卜子（莱菔子）一斤

【用法】荞麦面为丸。

【功用】烂积。

62839 **烂积丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】三棱（炒）四十八两 莪术（炙）九十六两 山楂一百四十四两 槟榔四十八两 橘皮一百四十四两 黑牵牛（炒）二百四十两 青皮（炒）九十六两 枳实（炒）一百四十四两 大黄二百四十两

【用法】上为细末，冷开水为小丸，红曲为衣（每十六两小丸上红曲二两）。每服二钱，小儿减半，一日二次，温开水送下。

【功用】①《北京市中药成方选集》：消积化滞。②《全国中药成药处方集》：杀虫。

【主治】①《北京市中药成方选集》：食滞积聚，胸满痞闷，腹痛坚硬。②《中药制剂手册》：虫积腹痛，嘈杂吞酸，大便秘结。

【宜忌】孕妇忌服。

62840 **烂积丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（天津方）。

【组成】大黄 炒二丑 三棱（醋制） 枳实（麸炒） 莪术（醋制）各一斤

【用法】上为细末，凉开水为小丸，每斤丸药用红曲面二两上衣，三钱重装袋。每次服一袋，小儿酌减，白开水送下。

【功用】清理肠胃，消积化滞。

【主治】停食停水，消化不良，胸闷胀满，肚腹疼痛，恶心倒饱，大便不通，以及食积奶积，痞积痞积。

【宜忌】孕妇及体虚者勿服。

62841 **烂积丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（大同方）。

【组成】二丑八两 槟榔 大黄 三棱 莪术 五灵脂 枳实 厚朴 麦芽 山楂 神曲 干姜各三两 广木香五钱

【用法】上为小丸。每服二钱。

【功用】消积健脾。

62842 **烂积丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（禹县方）。

【组成】大黄 黑白丑 熟大黄 槟榔 青皮 三棱 莪术 甘草 山楂 麦芽 神曲 黑栀子 白术 当归各半斤

【用法】上为细末，水为丸，红曲为衣。每服二钱，白开水送下；十岁每服一钱。

【主治】诸般积聚，食积不消，胸满腹胀，大便燥结。

【宜忌】虚弱症及孕妇忌用。

62843 **烂积丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（吉林方）。

【组成】二丑 三棱 莪术 大黄 槟榔各二两六钱七分

【用法】上为极细末，水为小丸，如梧桐子大，红曲为衣。每服二钱，每日二次，早、晚空心服之。七岁至十二岁，每服一钱；四岁至六岁，每服五分；周岁至三岁者，每服三分，白开水送下。

【功用】消食化滞，攻泄宿积，利大便，开脾郁。

【主治】五积六聚，胸中痞痛，胃脘腹胀，食

噎气塞，咯气吞酸，胃积嘈杂，二便闭结，饮食不下。

【宜忌】虚寒之人及孕妇禁服；忌食辛辣生冷。

62844 **烂眼煎**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】胆矾　防风　独活　僵蚕　桑皮各一钱

【用法】上药用水一碗，放锅内，用纸盖好，蒸一炷香久，取出露一宿。洗之。

【主治】赤红烂眼。

62845 **烂腿膏**

【方源】《沈氏经验方》卷上。

【组成】甘石四两　白蜡十两　黄蜡十两　花椒一两五钱　密陀僧一两　麻油四十八两

【用法】先以麻油、花椒二味同煎至花椒焦黑，捞去，再熬至滚，人各味搅极匀，至滴水成珠不散，离火略冷，用厚皮纸裁成长方，于锅中拖之，线穿，候干。用时贴二日，翻转再贴。

【主治】里外臁疮，血风蚁窠。

62846 **烂翳散**

【方源】《秘传眼科龙木论》卷三。

【组成】朱砂　石决明　珍珠(末)各半两　曾青　硇砂　龙脑各一分

【用法】上为细末。每至干，点眼内。宜钩割熨烙后点之，服细辛散。

【主治】因他病后生翳外障，初患之时，或即赤烂潮生，翳目侵睛，盖定瞳仁，即无所见；翳心若不赤黄，犹见光明。

62847 **烂喉痧散**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】熟石膏二分　人中黄(煅)二分　煅月石二分　煅儿茶二分　薄荷二分　朱砂二分　冰片二分　麝香五厘　濂珠五厘　琥珀五厘　牛黄五厘

【用法】上为细末。吹口。

【主治】烂喉痧。

62848 **烂腿夹纸膏**

【方源】《外科方外奇方》卷二。

【组成】梅片四分　煅甘石一两二钱　轻粉五钱　白占三两五钱　菜油一斤(夏天用)

【用法】先将菜油煎滚，再入白占化开，再将药三味同煎。

【主治】烂腿。

洁

62849 **洁白丸**

【方源】《中国药典》一部。

【组成】诃子(煨)370克　寒水石(平制)210克　翼首草85克　五灵脂膏178克　土木香26克　石榴子26克　木瓜26克　沉香19克　丁香20克　石灰华13克　红花6克　肉豆蔻13克　草豆蔻13克　草果仁13克

【用法】上十四味，除五灵脂膏外，余粉碎成细粉，过筛，混匀，加五灵脂膏，炼蜜370克及适量水，泛丸，干燥，打光，即得，每丸重0.8克。每服一丸，一日二至三次，嚼碎，吞服。

【功用】健脾和胃，止痛止吐，分清泌浊。

【主治】胸腹胀满，胃脘疼痛，消化不良，呕吐泄泻，小便不利。

62850 **洁宫汤**

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】沙参四钱　茯神二钱　远志五分(甘草水炒)　归身　麦冬二钱　贝母二钱　橘红一钱　半夏一钱　白术一钱　砂仁一钱　姜三片

【主治】心移于小肠之咳，其状咳而失气，气与咳俱失。

62851 **洁发威仙油**

【方源】《永乐大典》卷八八四引《山居备用》。

【组成】威灵仙十茎　侧柏叶二枝　牙皂三茎　黑牵牛二十粒　黄柏皮一片(手指大)

【用法】上细锉，以绢囊盛，纳瓮中，入真麻油浸成。如鬓发毡结，不堪梳理者，速取一掬涂。立见梳解。

【功用】除垢腻,洁鬓长发,胜苓香、百药煎之类。

洪

62852 洪宝丹

【方源】《外科集验方》。

【异名】金丹、寸金、四黄散、一黄散、破血丹、黄药(原书同卷)、济阴丹(《正体类要》卷下)、抑阳散(《保婴摄要》卷十五)、截血膏(《准绳·疡医》卷六)、洪宝膏(《寿世保元》卷九)、少林截血丹(《理瀹》)、红宝丹(《外科证治全书》卷五)。

【组成】天花粉三两 姜黄一两 白芷一两 赤芍药二两

【用法】上为末,茶、酒、汤为使,随证热涂。若病势大热,可用热茶调敷;如证稍温,则用酒调;若用以撮胀,可用三分姜汁、七分茶调;凡疮口破处,肉硬不消者,疮口被风所袭也,此方中加独活以祛风,用热酒调;年少血壮之人,衰老血败之士,如有溅血,无药可止,血尽人亡,若在手足,可用茶调敷手足上下尺余远;若在胸背腰腹,则全体敷之;治金疮重者,筋断脉绝,血尽人亡。如要断血,须用绳及绢袋缚住人手臂,却以此方从手臂上,用茶调敷住血路,然后却用断血药掺口,却不可使内补及四物等药;凡金疮在头面上者,血不止,急用此方,茶调团围敷颈上截血,疮口边亦用此敷,军中方掺口。重十日,轻者三日效;凡金疮着水,肉翻花者,可用薤汁调此方敷疮口两旁,以火微炙之;或用旱稻杆烟熏之,疮口水出即愈,如无水出即是风袭,可用南星茶调敷之即愈;治妇人产后,或经绝血行逆上,心不能主,或吐血、鼻衄、舌衄,可以此方用井花水调敷颈上,生艾汁调亦妙,其血立止,然后服药以绝原;此方用药调涂热毒,恐随干随痛,赤肿不退,当用鸡子清调敷,诸热毒难干妙;汤火疮同;打破伤损在胸膈上者,药通血不下,可用绿豆水调此药末吞之,即吐出而安。

【功用】化血为水,凉肌生肉,去死肌烂肉,破血退肿。

【主治】诸般热证痈肿之毒,金疮之证;妇人产后,或经绝血行逆上,心不能主,或吐血、舌衄。

【宜忌】此方药性无他,遇凉效少,遇热效多,故非十分阳证不可轻用,恐或凝寒,治疗费力。若夫金疮出血,非此不可,乃第一药,余外但可为前二药之佐使尔,当审之审之。

【加减】凡疮口破处,肉硬不消者,疮口被风所袭也,此方中加独活以去风,用热酒调;如又不消,则风毒已深,肌肉结实,又加紫荆皮,有必消之理矣。

62853 洪宝丹

【方源】《回春》卷八。

【组成】天花粉三两 白芷二两 赤芍二两 郁金一两

【用法】上为末。热毒用茶调,冷用酒调,涂患处;衄血不止,冷水调涂颈项上,此药最绝血路。

【功用】败血消肿。

【主治】一切肿痛,及汤烫火烧,金疮打扑,血出不止。

62854 洪宝丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】大黄十两 黄柏 姜黄 白芷 陈皮各五两 甘草五两 花粉二两 白蔹 石膏各十五两

【用法】晒,磨为末。白蜜或醋随症选用调敷。

【主治】一切痈疽,红肿热痛。

62855 洪宝膏

《寿世保元》卷九。为《仙传外科集验方》"洪宝丹"之异名。见该条。

62856 洪氏大红丸

【方源】《一盘珠》卷八。

【组成】天麻(姜水炒) 姜虫(姜水炒) 竺黄 白附(姜水炒) 胆星(九套者佳) 全虫(水洗净,去足,焙干) 明雄黄各三钱 白术(土炒) 茯神(去皮者) 志肉(去骨,甘草

水炒)　甘草　黄耆(蜜炒)各五钱　好辰砂二钱(为末,水飞过)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,金箔为衣,每丸重八分。生姜水送下。

【主治】小儿病后体虚微热,及慢脾等症。

62857　**洪氏肥儿丸**

【方源】《一盘珠》卷八。

【组成】白术(土炒)　白芍(酒炒)　白苓(去皮)　苡仁　山药　芡实各五钱　人参　肉蔻(捶去油,先以面裹煨熟)　砂仁(微炒)　广香(不见火)　楂肉(醋炒)　吴神曲(醋炒)　苍术　陈皮　川朴　炙草各二钱半

【主治】小儿吐泻后常服。

洞

62858　**洞天膏**

《内外科百病验方大全》。为《外科全生集》卷四"洞天鲜草膏"之异名。见该条。

62859　**洞当饮**

【方源】《产论》。

【组成】柴胡　黄芩　黄连　茯苓　半夏　生姜　青皮各五分　甘草一分　芍药一钱

【用法】以水二合半,煮取一合半服。

【主治】吐血、衄血,或卒然胸痛。

62860　**洞阳丹**

【方源】《鸡峰》卷十三。

【组成】附子　天雄　乌头各一两

【用法】上为末,入钟乳粉一两,同研匀,酒糊为丸,如梧桐子大,朱砂为衣。每服一二丸,空心温酒送下。

【功用】补真气,去风冷,通血脉。

62861　**洞阳丹**

【方源】《济生》卷四。

【组成】附子(炮,去皮脐)　钟乳粉各二两　天雄(炮,去皮)三两　川乌(炮,去皮)四两　阳起石(火煅)一两　火砂一两(别研细)

【用法】上为细末,酒煮神曲糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心温酒、盐汤任下。

【主治】阳虚阴盛,手足厥冷,暴吐大下,脉细羸瘦,伤寒阴证,悉皆治之。

【备考】本方方名,《医统》引作"复阳丹"。

62862　**洞庭汤**

【方源】《鸡峰》卷二十五。

【组成】橘子一斤(和皮称)　甘草　生姜　盐各四两

【用法】上药一处捣烂作饼子,火上焙干为末。每服二钱,白汤点服。

【功用】和气。

62863　**洞庭汤**

【方源】《传信适用方》卷四。

【组成】陈皮四两　檀香半两　甘草一两

【用法】上为细末。入盐点服。

【功用】解诸毒,救危死。

62864　**洞然汤**

【方源】《古今医鉴》卷九。

【组成】归尾　川芎　赤芍　黄连　黄芩　黄柏　栀子　连翘　薄荷　防风　荆芥　独活　前胡　菊花　木通　车前子　甘草　灯草七根

【用法】水煎,食后服。

【主治】一切眼病。

62865　**洞虚丹**

【方源】《解围元薮》卷三。

【组成】藁本　天麻　川芎　细辛各一两五钱　牛膝　羌活各三两　大枫子四两　蝉壳　胡麻　防风　独活　僵蚕　荆芥　苏木　风藤　石膏　蒺藜　山栀　芍药　菖蒲　石蚕　黄芩　连翘　草乌　紫萍　升麻　红花　麻黄　白芷　石斛　当归　威灵仙各二两

【用法】上为末,面糊为丸,如梧桐子大。每服一百丸,用羊踯躅草根一斤四两,打碎,以酒二十斤煮去滓,取一杯送下。

【主治】恶风,麻木走注抽痛。

【宜忌】忌食盐物。

62866　**洞天嫩膏**

《内外科百病验方大全》。为《外科全生集》卷四"洞天鲜草膏"之异名。见该条。

62867　**洞见碧霄**

【方源】方出《医统》卷九十五，名见《审视瑶函》卷五。

【组成】鹰眼睛

【用法】和乳汁研之，注眼中，一日三次。三日见碧霄中物。

【功用】明目。

62868 洞阳金丹

【方源】《鸡峰》卷二十九。

【组成】朱砂五两

【用法】用砂盒子一个，于底内铺枸杞根皮末一钱，又注蜜半两，上铺金箔，方入朱砂；上又盖金箔，上又注蜜半两，蜜上盖枸杞根皮末二钱许，多亦不妨，按令实，蜜和赤石脂末固盒子缝，务要严密，次用盐纸泥固济盒子一指厚，放干，置平地上，用醋拌细灰拥盒，拍作塚子，用木炭一秤簇起发顶，火煅之；俟火尽经宿，取出盒子，去泥开盒，其朱砂如铁色，生黄土内埋一宿，出火毒了，研令极细，用枣肉或糯米煮粥糊为丸，每两作四十粒，阴干。每服一二粒至三粒，空心熟水送下。

【功用】常服养神，安魂魄，通血脉，止渴；久服轻身延年，令人不惧寒暑，除去万病。

【主治】真阳不足，五脏气虚。

62869 洞天救苦丹

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】有子蜂窠　鼠矢（尖者）　青皮　楝树子（立冬后者佳）各等分

【用法】研细末。每服三钱，陈酒送服，服后要隔两日再服。

【主治】①《外科全生集》：瘰疬延烂至肩胸胁下，不堪之极者。②《验方新编》：乳痈、乳癌及瘰疬破烂。

62870 洞天酥香膏

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】酒当归　酒熟地　杜仲　制苁蓉　炙黄耆　酒天冬　麦冬　五味子　高丽参　怀牛膝　鹿茸　甜杏仁　蛇床子　酒川断　紫霄花　盐菟丝　虎胫骨　谷精草　制香附　酒生地　制远志　制山甲　木鳖子　男子头发（洗净）各五钱　大蛤蚧一对

上药如法炮制，锉碎，用香麻油二斤四两，同药入铜锅内，桑枝火熬枯净去滓，再熬至滴水成珠，候热尽，入后香料：

水飞松香四两　花龙骨三钱　母丁香三钱　当门子三钱　水飞黄丹一两　赤石脂三钱　制乳没各三钱　摇桂五钱　腰黄三钱　沉香三钱　倭硫黄三钱　大土膏三钱　木香三钱　蟾酥三钱　阳起石三钱

【用法】上研极细末，用桑、槐、柳条不住手搅匀，盛瓷罐内，浸井水中，或天水缸中七日夜，出尽火气方可用，剪红缎摊膏，计重二钱，衰弱倍之。摊膏时，将铜器或瓷杯取滚水化糯米糊涂缎为妙。贴脐上或命门，药七十天一换。

【功用】通十二经血脉，固本全形，返老还童。

【主治】五劳七伤，淋泻痞证，元虚气喘，瘫痪。

62871 洞天鲜草膏

【方源】《外科全生集》卷四。

【异名】洞天膏　洞天嫩膏（《内外科百病验方大全》）。

【组成】壮年头发一斤　活牛蒡　甘菊　苍耳根叶　金银藤　马鞭草　仙人对坐草各鲜草一斤　白芷　甘草　五灵脂　当归各半斤

【用法】先用壮年头发一斤，菜油三斤，入锅熬发枯浮，去滓听用；以活牛蒡、甘菊、苍耳根叶、金银藤、马鞭草、仙人对坐草，各鲜草十斤，入菜油十斤，熬至草枯沥出，再以白芷、甘草、五灵脂、当归各半斤，入锅熬至药枯出滓；俟油冷，将前头发熬过之油并入，共见过斤两；每油一斤，用当日炒透黄丹七两，入于油内搅匀再熬，熬至滴水成珠，以两指取膏为丸，而丸不粘指为度；离火俟退火气，以油纸摊膏。如做嫩膏者，每斤油内入黄丹四两熬黑，收起听用。贴患处。

【主治】①《外科全生集》：一切热毒痈疖。②《内外科百病验方大全》：乳疖、乳痈，痄腮及小儿游风丹毒。

洗

62872　洗刀散

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】防风　连翘　羌活　独活　草决明　蔓荆子　木贼　玄参各一两　当归　荆芥　滑石　薄荷　麻黄　白术　赤芍药　大黄各五钱　黄芩　川芎　栀子　桔梗　石膏　芒消　蝉蜕　白菊花　蒺藜各四钱　甘草　细辛各三钱

【用法】加生姜同煎，食后服。再用清凉洗眼之药。

【主治】风热弦烂，眼目赤肿，内外障翳，羞明怕日，倒睫出泪，两睑赤烂，红筋瘀血。

62873　洗风散

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】荆芥四两　苦参四两　防风(去芦头)　川芎　当归(洗，焙)　白蒺藜　香白芷　地榆　地骨皮　黄柏各二两

【用法】上吹咀，每用五钱，水三升，煎三五沸，通手淋渫患处。

【主治】风热毒气攻注，遍身疮疥，瘾疹疼痛。

62874　洗风散

【方源】《女科百问》。

【组成】茺蔚草　晚蚕沙　赤小豆　黑牵牛　白芷　藁本　僵蚕　白附子　草乌头　白蔹　蔓荆子各等分

【用法】上为末。每用一钱，澡面。

【主治】面上游风，或瘾疹，或风刺，或黑皯。

62875　洗风散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】防风(去芦头)　荆芥穗　吴白芷　川芎　蔓荆子(去白)　威灵仙(去土)　何首乌　白茯苓(去皮)各一两　苦参　白牵牛各半斤

【用法】上为粗末。每用药末三两，好浆水三升，煎五七沸，去滓。洗面，每日早、晚二次。

【主治】一切风毒，头面生疮。

62876　洗心汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】白术　当归　大黄　赤芍　荆芥　甘草　薄荷各一钱五分

【用法】水煎，空心服。

【主治】心经积热，邪气上攻，眼涩睛痛。

62877　洗心汤

【方源】《审视瑶函》卷六。

【组成】黄连　生地黄各一钱半　木通　炒栀仁各一钱　甘草三分　当归尾　菊花各一钱二分

【用法】上锉散。白水二钟，煎至八分，去滓温服。

【主治】心经积热，四眦赤涩。

【宜忌】发于秋者宜服。

62878　洗心汤

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】人参一两　茯神一两　半夏五钱　陈皮三钱　神曲三钱　甘草一钱　附子一钱　菖蒲一钱　生枣仁一两

【用法】水煮半碗，灌之。必熟睡，听其自醒，切不可惊醒，反至难愈也。

【功效】开郁逐痰，健胃通气。

【主治】呆病。

62879　洗心汤

【方源】《麻科活人》卷四。

【组成】防风　荆芥　黄芩　木通　大黄　连翘　生地黄　归尾　赤芍　甘草　(一本无赤芍，有黄连)

【用法】灯心为引，水煎服。

【主治】心热，白珠满口，二便不通。

【加减】有潮热，加柴胡、羌活(一本加黄连、骨皮、玄参、黄柏、栀仁)。

62880　洗心汤

【方源】《眼科撮要》。

【组成】黄耆(蜜炙) 甘草 当归 防风 升麻 荆芥 白芷各等分

【用法】水煎服。

【主治】目有白花如絮。

62881 洗心散

【方源】《局方》卷六。

【异名】七宝洗心散(《医方类聚》卷一二五引《简易》)。

【组成】白术一两半 麻黄(和节) 当归(去苗洗) 荆芥穗 芍药 甘草(爁) 大黄(面裹,煨,去面,切,焙)各六两

【用法】上为细末。每服二钱,水一盏,入生姜、薄荷各少许,同煎至七分,温服;如小儿麸豆疮疹欲发,先狂语多渴,及惊风积热,可服一钱,并临卧服;如大人五脏壅实,欲要溏转,加至四五钱,乘热服之。

【主治】风壅壮热,头目昏痛,肩背拘急,肢节烦疼,热气上冲,口苦唇焦,咽喉肿痛,痰涎壅滞,涕唾稠粘,心神烦躁,眼涩睛疼;及寒壅不调,鼻塞身重,咽干多渴,五心烦热,小便赤涩,大便秘滞,并宜服之。

62882 洗心散

【方源】《卫生总微》卷十八。

【组成】大黄一两(煨) 荆芥穗一两半 甘草半两(生) 麻黄一两(去根不去节)

【用法】上为细末。每服半钱,或一字,蜜水调下。

【主治】心脏邪热,目赤肿痛。

62883 洗心散

【方源】《普济方》卷十八引《如宜方》。

【组成】白术一两半 麻黄 当归 芍药 甘草各三两 木香(煨) 荆芥穗 大黄(面裹煨)各六两

【用法】上为末,生姜薄荷汤,加神砂末调服。

【主治】心热语乱,烦渴,眼涩,口苦唇焦。

62884 洗心散

【方源】《普济方》卷三六一。

【组成】荆芥 甘草 防风 羌活 苦梗 黄芩 赤芍药 白芷 大黄 山栀子 山药 川芎 赤茯苓 麻黄各等分

【用法】上为末。每服一钱,灯心、麦门冬煎汤点服。

【主治】小儿变蒸,潮热焦啼,烦躁,口舌生疮,眼赤热痛。

62885 洗心散

【方源】《普济方》卷三九二。

【组成】甘草一钱(生) 麦门冬一分半(洗净) 皂角半两(入沙糖涂酥炙后于盆下盖,良久出火毒方用)

【用法】上为末。每服二钱,水一盏,煎至八分,作五服,时时吃。

【主治】小儿乳食伤心,壮热,喘息不调,咳逆多睡。

62886 洗心散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】荆芥 薄荷 连翘 麻黄 赤芍药 栀子 黄连 大黄各一两

【用法】每服五钱,水煎服。

【主治】患眼生翳,如珠垂帘遮睛者。

62887 洗心散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】大黄 赤芍药 荆芥 黄连 当归 连翘 薄荷 甘草

【主治】眼痛而体热者。

62888 洗心散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】大黄 赤芍药 当归 甘草 荆芥 麻黄 栀子各一两

【用法】水煎服。

【主治】目赤,左赤传右者。

62889 洗心散

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】大黄(炒) 黄芩 栀子 甘草 黄柏 木通 菊花 赤芍药 防风 荆芥

【主治】眼目肿痛难开,涩泪。

62890 洗心散

【方源】《痘疹心法》卷二十三。

【组成】当归　生地黄　木通　黄连　麻黄　大黄　薄荷叶各等分

【用法】上锉细。水一盏，加灯心为引，煎七分，去滓温服。

【主治】口舌生疮。

62891　**洗心散**

【方源】《医统》卷二十一。

【组成】当归　芍药　白术各一钱　防风　荆芥　麻黄　大黄　甘草各七分

【用法】水二盏，加生姜二片，煎八分，不拘时温服。

【主治】风热痰滞，心经积热，口苦唇燥，眼涩，大便涩，小便赤。

62892　**洗心散**

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】黄连　生地黄各一钱　菊花　当归各八分　木通　栀子各七分　甘草四分

【用法】水二盏，煎一盏，食后温服。

【主治】心经积热，目眦赤涩痛泪。

62893　**洗心散**

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】白术　甘草　当归　荆芥　生地　大黄　麻黄　赤芍　薄荷叶　生姜

【主治】小儿鹅口及口疮。

62894　**洗心散**

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】大黄　赤芍药　桔梗　玄参　黄连　荆芥穗　知母　防风　黄芩　当归尾各等分

【用法】上为细末。每服三钱，食后茶清调下。

【主治】火疳症。生于睥眦气轮，初起如粟疮榴子一颗，小而圆，或带横长而圆，状如豆，次后渐大，痛者多，不痛者少。

62895　**洗心散**

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】当归　防风　薄荷　荆芥　麻黄　甘草　赤芍　白术　大黄(酒蒸，久晒)各等分

【用法】上为末。每服三钱，白汤调下。

【主治】外障，痛如针刺。

62896　**洗心散**

【方源】《麻科活人》卷四引《麻科秘本》。

【组成】当归　生地黄　木通　黄连　大黄　薄荷叶　麻黄茸各等分

【用法】灯心为引，水煎服。

【主治】口舌生疮。

62897　**洗心散**

【方源】《麻科活人》卷四引朱氏方。

【组成】生地黄　枯黄芩　麦冬　归尾　知母　薄荷叶　甘草

【用法】鲜藕节、侧柏叶为引，水煎服。

【主治】心经有热，口舌生疮。

【加减】甚者，加黄连。

62898　**洗心散**

【方源】《异授眼科》。

【组成】赤芍　甘草　荆芥　生地黄　木通　黄连　薄荷　当归

【用法】水煎，食后服。

【主治】肝热传于心经，积热上攻，眼弦涩，睛疼，热盛风多。

62899　**洗心散**

【方源】《异授眼科》。

【组成】生地　薄荷　荆芥　防风　羌活　山栀　黄连　黄芩　北柴胡　石膏　甘草　川芎　菊花　龙胆草　淡竹叶各等分

【用法】上为末。

【主治】目大角赤痛。

62900　**洗伤药**

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】荆芥　土当归　生葱

【用法】煎浓汤，熏洗伤处。

【主治】打扑伤损，折骨出臼，又金疮破伤等症。

62901　**洗肌散**

【方源】《普济方》卷二八七。

【组成】青木香　白蔹　槟榔　贯众　荆芥

【用法】水煎，以药夹黄葱洗之。

【主治】痈溃后，脓水未干者。

62902 **洗阴散**

【方源】《名家方选》。

【组成】五倍子　明矾　芒消　小麦　葱白各等分

【用法】水煎，屡洗阴门。

【主治】产后阴门肿痛者。

62903 **洗阴煎**

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】蛇床　五倍　明矾　花椒　葱白各五钱

【用法】煎汤洗之。

【主治】妇人阴痒生疮。

62904 **洗杖药**

【方源】《金鉴》卷七十五。

【组成】陈皮　透骨草　南星　天门冬　地骨皮　天灵盖各五钱　象皮(切碎)一两

【用法】水煎浸洗，一日二三次。

【主治】夹伤。

62905 **洗足汤**

【方源】《回春》卷五。

【组成】川椒一两　独活　羌活　木瓜各五钱　白芷三钱　荆芥穗一两

【用法】上锉。用水一壶，煎至半壶，倾出，去滓，于避风处温浴，洗后拭干，仍用花椒炒热，绢包裹熨患处，或炒盐亦可熨之。

【主治】脚气。

62906 **洗肝汤**

【方源】《圣济总录》卷四十一。

【组成】柴胡(去苗)　鳖甲(醋炙，去裙襕)各二两　赤茯苓(去黑皮)一两半　桔梗　槟榔(锉)　桂(去粗皮)　甘草(炙，锉)　五味子　陈橘皮(汤浸，去白，焙)　人参各一两　白术一两半　半夏(汤浸七遍去滑)三分

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，人生姜五片，煎至六分，食前去滓温服。

【主治】肝实，两胁胀满气急，眼昏。

62907 **洗肝汤**

【方源】《圣济总录》卷一零二。

【异名】洗肝散(《银海精微》卷下)。

【组成】人参　赤茯苓(去黑皮)　山栀子仁　黄芩(去黑心)　菊花　地骨皮　芎䓖　柴胡(去苗)　桔梗(炒)各一两　黄连(去须)　甘草(炙，锉)各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入苦竹叶七片，煎至七分，食后临卧温服。

【主治】肝实眼。

62908 **洗肝汤**

【方源】《秘传眼科龙木论》卷二。

【组成】大黄　车前子　黑参　黄芩　细辛　茺蔚子各二两

【用法】上为末。以水一盏，散五分，入黑豆三七粒，煎至五分，去黑豆，空心下一服，临卧一服。

【主治】肝虚，雀目，内障。

62909 **洗肝饮**

《玉案》卷三。为《局方》卷七引《吴直阁增诸家名方》"洗肝散"之异名。见该条。

62910 **洗肝散**

【方源】《普济方》卷一五三引《圣惠》。

【组成】羚羊角屑　子芩　羌活　柴胡(去苗)　川大黄(锉碎，微炒)　防风(去芦头)　栀子仁　甘菊花　黄连(去须)　犀角屑　甘草(炙微赤，锉)各半两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入淡竹叶三七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】热病，热毒攻眼肿痛。

62911 **洗肝散**

【方源】《史载之方》卷下。

【组成】天麻半两(酒浸一宿，湿纸裹煨)　白僵蚕(去口去丝)　天南星(炮)各一分　川芎二钱　黄耆　薏苡仁　白芍药各半两　白蒺藜(去刺)四分　甘菊　甘草(炙)　人参各三分　木香一钱半　沉香(煎时磨少许)

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，薄荷二叶，磨沉香少许，同煎药之时，取七分，去滓

服,一日二三次。

【主治】肝肾气虚,外应目不荣。

62912 **洗肝散**

【方源】《幼幼新书》卷三十三引《灵苑方》。

【组成】白蒺黎一两半(微炒,去角) 羌活 防风(去芦头)各半两 甘草一分(炙) 马牙消二两(细研)

【用法】上为细末。每服二钱,用温热水调下,食后临卧时服。小儿及年少气实者,只用牙消一味为末,每服一钱。小儿一字,熟水调下。若是暴翳,不过两服便落。

【主治】①《幼幼新书》引《灵苑方》:翳膜。②《三因》:肝热,赤脉贯睛,涩痛,冲风泪下;兼治热血攻心。

62913 **洗肝散**

【方源】《幼幼新书》卷三十三引汉东王先生方。

【组成】芍药 防风各一分 羌活 大黄(湿纸裹,煨) 甘草(炙)各半分

【用法】上为末。每服婴孩一字,二三岁半钱至一钱,水一药注或半银盏,灯心、黑豆各少许,同煎十数沸,食后服之。

【主治】小儿目赤肿痛。

62914 **洗肝散**

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】大黄二钱 黄芩三钱

【用法】水煎,食前服。

【主治】脏火太过,蕴热攻目,或翳障疼痛。

62915 **洗肝散**

【方源】《续本事》卷四。

【组成】大黄 甘草 黄芩 赤芍药 甘松各三钱 干葛 当归 熟地黄 山栀子仁各半两

【用法】上为细末。每服二大钱,第二次米泔调。

【主治】眼疾。

62916 **洗肝散**

【方源】《续本事》卷四。

【组成】黄芩 甘草各半两 菊花 人参各一两

【用法】上为细末。每服一钱,热水调下。

【主治】风痛眼。

62917 **洗肝散**

【方源】《局方》卷七(吴直阁增诸家名方)。

【异名】洗肝饮(《玉案》卷三)。

【组成】当归(去芦) 薄荷(去梗) 羌活(去芦) 防风(去芦) 山栀子仁 甘草(炙) 大黄(煨) 川芎各二两

【用法】上为末。每服二钱,食后冷水或熟水调下,一日三次。

【主治】①《局方》(吴直阁增诸家名方):风毒上攻,暴作赤目,肿痛难开,隐涩眵泪,昏暗羞明,或生翳膜。②《杏苑》:痰盛咳嗽,肺气不利。

【方论选录】《成方便读》:方中羌活、防风大开太阳之表,使邪从外解;薄荷能清利头目,轻宣上焦,以助羌、防之不逮,于是表邪自无容留之地;栀子专清上焦之火,能屈曲下行,导火邪从小便而出;大黄泻实火从大便而出,于是里邪亦无留着矣;甘草缓其急,而和其诸药;归、芎和血养肝,以善其后耳。②《眼科阐微》:川芎、当归入肝经,养肝血;肝主乎风,防风、羌活、薄荷,皆风药也;肝者火之母,一火动则五火俱煽而动,栀子、甘草所以清肝火也。诸药皆涤荡之品,故曰洗肝散。

【备考】《金鉴》本方有谷精草,无大黄。《医学集成》有石膏、木通,无羌活。

62918 **洗肝散**

【方源】《医方类聚》卷六十七引《修月鲁般经》。

【组成】大黄三两(去皮炒) 甘菊二两 枸杞二两 瞿麦二两 槟榔半两 扁蓄半两 荆芥半两 茴香半两 麦糵半两 香附子半两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五六十丸,食前茶汤任下。

【主治】双目不明。

62919 **洗肝散**

【方源】《普济方》卷八十五。

【组成】川芎 木贼 石决明 甘草 地龙皮 甘菊花 川椒 苍术 谷精草 黄连 地骨皮 蝉壳 黄芩 草决明各等分

【用法】上为细末。食前茶清调服。

【主治】一切眼患，不睹光明。

62920 洗肝散

【方源】《普济方》卷三六四。

【组成】人参一钱 荆芥穗半钱 生地黄一钱（酒浸） 当归一钱 甘草二钱 赤芍药一钱 大黄半钱（煨） 茯神一钱 大泽草半钱

【用法】上为末。每服半钱，清米泔调下。

【主治】眼生翳膜，视物难明，或寻常赤痛。

62921 洗肝散

《银海精微》卷下。为《圣济总录》卷一〇二"洗肝汤"之异名。见该条。

62922 洗肝散

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】川当归 羌活 薄荷 栀子 芎䓖 生地黄 防风 大黄 龙胆草 甘草各等分

【用法】上为末。每服三钱，白汤调服。

【主治】风毒上攻，暴作目肿，痛涩难开，眵泪不绝。

62923 洗肝散

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】川芎 当归尾 赤芍药 防风 生地黄 白蒺藜 木贼 蝉蜕 羌活 薄荷 苏木 菊花 红花各五钱 甘草三钱

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一盏半，松丝十余根，煎服。

【主治】花翳。

62924 洗肝散

【方源】《眼科全书》卷五。

【组成】当归 川芎 栀子 防风 羌活 薄荷 甘草 大黄 滑石

【用法】上为细末。每服二钱，温汤泡下。

【主治】硬睑硬睛外障。胞、睑、睛、珠俱木，痛涩，难开运，睛睑坚硬。

62925 洗肝散

【方源】《种痘新书》卷九。

【组成】川芎 归尾 羌活 防风 薄荷 栀子 赤芍 红花 菊花 胆草 甘草

【用法】饭后服。

【主治】痘后余毒上攻于目，红肿而不能开者。

【加减】眼痛，加蔓荆子、石膏、谷精草、绿豆；有翳膜，加虫蜕、白蒺藜、木贼、石决明、蒙花；大便热结者，加大黄、黄连、牛子；小便短赤者，加车前、木通、滑石；目红赤者，加生地、丹皮。

62926 洗肝散

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】川芎 归尾 防风 羌活 薄荷 栀子 甘草 胆草 白芍各等分

【用法】水煎，饭后服。

【主治】痘毒攻眼，红肿遮睛。

【加减】睛痛昏暗，加石膏、谷精草、绿豆皮；有翳膜，加虫蜕、白蒺藜、木贼；热实便秘而羞明畏火者，加炒芩、炒连、大黄、车前。

62927 洗肝散

【方源】《奇方类编》卷上。

【组成】当归一钱 川芎八分 生地一钱 赤芍一钱 羌活一钱 防风一钱 薄荷七分 白芷八分 生大黄二钱

【用法】水煎服。

【主治】眼目暴肿，痛不可忍。

62928 洗肝散

【方源】《金鉴》卷七十七。

【组成】车前子一钱 柴胡一钱五分 黄芩一钱 细辛五分 黑参一钱 茺蔚子二钱

【用法】上为粗末。以水二盏，黑豆三七粒，煎至一盏，去黑豆，空心温服。

【主治】雀目内障。

62929 洗肝散

【方源】《异授眼科》。

【组成】赤芍 细辛 远志 防风 桔梗

甘草　人参　羚羊角　黄芩各等分

【用法】水煎服。

【主治】目有乌睛突出而痛者。

62930　**洗身散**

【方源】《名家方选》。

【组成】枳实　陈皮　红花　牛蒡子各四钱　黑豆三钱　桃枝　桑枝各长一尺五寸

【用法】以水三升，煮取一升五合，洗遍身。

【主治】痘疮陷伏不起，或隐在皮肤中者。

62931　**洗轮散**

【方源】《普济方》卷七十三引《仁存方》。

【组成】黄连十文　槐花少许

【用法】上为细末。入轻粉十文拌匀，以生男儿乳汁和之，用小盏盛于甑上蒸，候饭蒸熟，取帛裹药，于眼上拭三两次即效；干拭之，屡验。

【主治】烂睑眼。

62932　**洗明散**

【方源】《普济方》卷七十七。

【组成】蛤粉(腻者)　木贼各四两　苍术一斤半(泔浸七日，去皮，切，焙干)

【用法】上为末。每服一钱，以茶、酒调下。

【主治】眼目涩痛。

62933　**洗肺散**

【方源】《医方类聚》卷一一九引《袖珍》。

【组成】黄芩三钱　半夏三钱　天门冬(去心)　麦门冬(去心)　五味子各一钱半　甘草半钱　杏仁(去皮尖)一钱

【用法】上㕮咀，作一服。水二钟，生姜五片，煎至一钟，去滓，食后通口服，滓再煎服。

【主治】咳嗽痰盛，肺气不利。

【备考】《便览》有桑白皮，无麦冬。

62934　**洗疠方**

【方源】方出《直指》卷二十四，名见《景岳全书》卷六十四。

【组成】苦参　荆芥　防风　白芷　独活　羌活　藁本各一两　洛阳花四两(用烧酒一斤浸一宿，酒不用)

【用法】上㕮咀。匀作三次，煎水洗，汗出为度。

【主治】大麻风。

62935　**洗毒汤**

【方源】《普济方》卷三〇一引《外科精要》。

【组成】苦参　防风　甘草　露蜂房各等分

【用法】上㕮咀。水煮浓汁，洗疮肿痛。

【主治】蚀疮。

62936　**洗毒汤**

【方源】《回春》卷八。

【组成】地肤子(即扫帚子)半升

【用法】煎汤频浴。数次渐愈。

【主治】一切恶疮疥癞。

62937　**洗毒散**

【方源】《普济方》卷二七五。

【组成】麻黄　地骨皮　蛇床子　地丁各等分

【用法】上为粗末。每用五钱，水三大盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】一切恶疮，多时不效，风寒久冷。

62938　**洗毒散**

【方源】《丹溪心法附余》卷十六。

【组成】蛇床子　地骨皮　麻黄　荆芥　防风　枯矾各三钱

【用法】用水三碗，加葱白三根，煎至二碗，无风处洗。

【主治】诸般恶疮，风湿阴蚀疮。

【备考】《东医宝鉴》有大蓟。《医学入门》有紫花地丁。

62939　**洗药方**

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】当归　独活　白芷　甘草各二钱　葱白五个

【用法】用水三碗，煎至药烂，滤清，以绢帛蘸汤，挹净疮上，随揉贴红黑二膏盖之。洗时切忌风寒为要。

【功用】长肉生肌。

【主治】痈疽诸毒，已溃流脓；或治背疮轻易者，以代猪蹄汤用。

62940 洗药方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】蔓荆子三钱 荆芥二钱 蒺藜二钱 冬桑叶二钱 秦皮一钱

【用法】煎汤，乘热洗。

【功用】疏散风热，清肝明目。

【主治】外感风热，风火目痛。

【方论选录】本方桑叶苦微寒，尤长疏散风热以明目，其与黑芝麻伍名桑麻丸，则治肝阴不足肝火偏亢之昏花；秦皮苦涩寒，人多识其治泻痢之功效，其疗肝热目赤肿痛亦验；蔓荆子、白蒺藜亦有散风明目作用；荆芥则理血解毒，于血蕴热毒目赤咽痛较好。

62941 洗药方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】白芷一钱五分 蝉衣一钱 藁本一钱五分 苦梗二钱 薄荷一钱 橘络一钱

【用法】水煎，熏洗。

【功用】轻清扬上，消风热，止头痛。

【主治】头目昏胀疼痛。

62942 洗药方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】霜桑叶一钱五分 防风一钱五分 薄荷一钱 天麻一钱 青连翘一钱五分 银花一钱 石膏三钱（生） 川椒六分

【用法】水煎，洗之。

【功用】清热祛风。

【主治】风热头痛。

62943 洗药方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】香白芷二钱 防风一钱五分 葛根一钱五分 天麻一钱 金银花二钱 石膏三钱（生） 川椒一钱 乳香一钱（研）

【用法】水煎，洗之。

【功用】祛风除湿，清热定痛。

【主治】前额头痛。

62944 洗药方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】宣木瓜三钱 秦艽二钱 防风二钱 防己二钱 伸筋草二钱 白芷二钱

【用法】用水熬透，洗之。

【功用】祛风，除湿，舒筋。

【主治】筋骨痛。

62945 洗药方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】宣木瓜三钱 杜仲三钱（炒） 牛膝三钱 秦艽三钱 汉防己三钱 钩藤二钱 茅术三钱（生） 桑枝四钱

【用法】兑烧酒一盅，用水熬透，洗患处。

【主治】腰腿疼痛。

62946 洗药方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】南红花二钱 桃仁二钱（研） 归尾一钱 防风一钱 桂枝尖一钱五分 菊花二钱 银花一钱五分 草梢八分

【用法】水煎，淋洗。

【功用】清热解毒，活血化瘀。

【主治】腰腿痹痛。

62947 洗药水

《杂病源流犀烛》卷三十。为《奇效良方》卷五十六“洗药荆叶散”之异名。见该条。

62948 洗面药

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】洗面散（《扶寿精方》）。

【组成】皂角三斤（去皮弦子，另捣） 好升麻八两 楮实子五两 白及一两（细锉） 甘松七钱 缩砂（连皮） 白丁香（腊月收） 三柰子各五分 绿豆八合（拣净另捣） 糯米一升二合

【用法】上为细末。洗面。

【功用】去皮肤燥痒，去垢腻，润泽肌肤。

【主治】面有䵟黯，或生疮，或生痤疿及粉刺之类。

【备考】《医学入门》有白芷、天花粉。

62949 洗面散

《扶寿精方》。为《兰室秘藏》卷下“洗面药”之异名。见该条。

62950 洗香丸

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】孩儿茶一两一钱三分　上好细茶一两　砂仁一两三钱　白豆蔻三钱三分　沉香七分　片脑二分　麝香五分

【用法】上为细末，甘草膏为丸，如豌豆大。每用一丸，噙化。

【主治】口臭口干，口舌生疮。

62951　**洗疥药**

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】防风　荆芥　白矾　马鞭草　苦参　花椒　野菊花

【用法】水煎，频洗。

【主治】疥疮。

62952　**洗疮汤**

【方源】《千金翼》卷十五。

【组成】黄连　黄芩　苦参各八两

【用法】上切。以水三斗，煮取一斗，去滓，极冷乃洗疮，一日三次。

【主治】疮。

62953　**洗疮药**

【方源】《奇效良方》卷五十四。

【组成】贯众　川芎　茵陈　地骨皮　荆芥　独活　防风　地扁蓄　甘草各二钱　当归三钱

【用法】上㕮咀。水三碗，煎三沸，去滓，通手洗之。

【主治】诸般恶疮。

62954　**洗浴散**

【方源】《补要袖珍小儿》卷三。

【组成】菖蒲三两五钱　防风(去芦头)二两五钱　荆芥二两　石膏　梅根各一两

【用法】上为粗末。每用三匙，水二碗，煎五七沸，适寒温，浴儿，先洗面，后浴身体，避风处佳。

【功用】截小儿风痫。

62955　**洗痔汤**

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】川楝　黄连　瓦松　花椒　葱根　艾叶各等分

【用法】水煎，倾入盆内，用青布一块展洗疮上。

【主治】下疳疮。

62956　**洗痂散**

【方源】《天花精言》卷六。

【组成】玄参　滑石　绿豆粉　松罗茶各等分

【用法】上为细末。绢包扑之。脱利异常。

【主治】痘证，热在肌表，痂落不快者。

62957　**洗痂膏**

【方源】《天花精言》卷六。

【组成】生猪牙槽骨髓一具　紫草末少许

【用法】调为膏。外涂患处。

【主治】痘中发际之痂及一切堆厚强硬者。

62958　**洗眼方**

【方源】《外台》卷二十一引《集验方》。

【组成】蕤核仁二十枚(碎)　苦竹叶一把　细辛半两

【用法】上三味，以水三升，煮取半升以洗眼，一日三五次。

【主治】目赤痛。

62959　**洗眼方**

【方源】《便览》卷一。

【组成】归尾　黄连各一钱　赤芍　防风各五分　杏仁四个　铜绿一分

【用法】用水半碗，乳汁少许，入药泡，连碗入滚水内，顿热洗。

【主治】目赤暴发作，云翳瘀痛不可忍者。

62960　**洗眼方**

【方源】《准绳·幼科》卷一。

【组成】黄连　秦皮　灯心　大枣各等分

【用法】上用竹筒煎汤，洗眼。

【主治】婴孩胎受热毒，生下两目不开。

62961　**洗眼方**

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】桑条

【用法】于二三月间采嫩者，晒干，净器内烧过，令火自灭成白灰，细研。每用三钱，入瓷器或银器中，以沸汤泡打转，候澄，倾清者，入

于别器内更澄,以新棉滤过极清者。置重汤内令热,开眼淋洗,逐日一次。

【主治】内外障翳膜赤脉昏涩。

62962 **洗眼方**

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】秦皮 杏仁 黄连 甘草 防风 当归须各等分 滑石少许

【用法】上为末。水一盏,煎至半盏,去滓,时时带温洗。

【功用】止痛去风。

【主治】昏膜。

62963 **洗眼方**

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】铜绿半斤 炉甘石一斤 黄连 黄芩 黄柏各等分

【用法】将前二味同研细末,罗过,将后三味浓煎,调末为丸。临时用冷水浸开洗之。

【功用】止痛祛风。

【主治】昏膜。

62964 **洗眼方**

【方源】《广笔记》卷三。

【组成】皮消一两 杏仁(去皮尖) 铜绿 明矾各三分 侧柏叶三钱 甘菊花三钱 桑白皮五钱

【用法】河水五碗,煎至二大碗,置铜盆内,洗眼及眉棱骨、两大阳,涕出即爽然矣。日夜不拘次数。一服冬可半月,夏十日。

【主治】内障,外障,暴赤眼,眵泪,昏花,翳膜。

62965 **洗眼汤**

【方源】《千金》卷六。

【组成】秦皮 黄柏 决明子 黄连 黄芩 蕤仁各十八铢 栀子仁七枚 大枣五枚

【用法】上㕮咀。以水二升浸,煮取六合,澄清,仰卧洗目,每日一次。

【主治】热上出攻,目生障翳,目热痛,汁出。

【宜忌】忌猪肉。

62966 **洗眼汤**

【方源】《千金》卷六。

【组成】甘竹叶二七枚 乌梅三枚 古钱三枚

【用法】以水二升,渍药半日,东向灶煮二沸,三上三下,得二合,临欲眠,注目眦。

【主治】目赤痛。

62967 **洗眼汤**

【方源】《外台》卷二十一引《必效方》。

【异名】主眼汤(《普济方》卷八十一)。

【组成】秦皮 黄柏皮 蕤仁各三分 细辛二分 茺蔚子三分 黄连四分 古铜钱七文

【用法】上切。以水二升,煮取八合,平旦洗目。

【功用】去热气。

【主治】漠漠视物不见,并翳。

【宜忌】忌生菜。

62968 **洗眼汤**

【方源】《证类本草》卷七引《本草图经》。

【组成】当归 芍药 黄连各等分

【用法】停细切。以雪水或甜水煎浓汁,乘热洗,冷即再温洗。

【功用】益眼目。

【主治】风毒赤目、花翳等。

【方论选录】凡眼目之病,皆以血脉凝滞使然,故以行血药合黄连治之,血得热即行,故乘热洗之,用者无不神效。

62969 **洗眼汤**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【异名】竹叶汤(《圣济总录》卷一一〇)。

【组成】苦竹叶 黄连(去须) 黄柏 栀子仁各一两 蕤仁半两(汤浸,去赤皮)

【用法】上锉细。以水三大盏,煎至一盏半,去滓,澄清,温温洗眼,每日五七次。

【主治】眼热毒,睑肿垂遮睛。

62970 **洗眼汤**

【方源】《秘传眼科龙木论》卷五。

【组成】秦皮 甘草 细辛 黄芩各一两 防风一两半

【用法】上为末。以水一盏，散三钱，煎至一盏半，热洗，一日二次。

【主治】天行后赤眼外障。

62971 **洗眼汤**

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】芒消一钱　黄连　当归须　薄荷　白芍药　荆芥　防风各三分

【用法】用滚汤一钟泡透，乘热洗眼。

【主治】眼目红疼。

62972 **洗眼汤**

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】甘菊　玉竹各一钱　大黄　山栀　细辛　竹叶　苏叶各五分　甘草　青盐各三分

【用法】水煎，乘热洗眼。

【加减】有障，加蝉蜕。

62973 **洗眼汤**

【方源】《济众新编》卷三。

【组成】胆矾　白矾　当归　黄连　杏仁　防风　红花各二分

【用法】频频煎洗。

【主治】风热赤肿多泪。

62974 **洗眼药**

【方源】《保命集》卷下。

【异名】重明膏(《普济方》卷八引《瑞竹堂方》)、紫金膏(《袖珍》卷三引《瑞竹堂方》)。

【组成】诃子二两　黄丹四两　蜜八两　柳枝四十寸

【用法】以河水二碗，熬至半碗，用一钱热水化洗之，石器内熬。

【功用】明目。

62975 **洗眼药**

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】韶粉　防风　马牙消　饼子铜青

【用法】上为细末。每用一字，温汤调洗，不拘时候。

【主治】眼病。

62976 **洗眼散**

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】冬青叶　侧柏叶　甘草　细辛　黄芩　防风　荆芥　薄荷

【用法】上药一帖一两，煎浓熏洗，一日三次。

【主治】天行赤眼外障。

62977 **洗痔方**

【方源】《济阳纲目》卷九十五。

【组成】朝东马齿苋　刘寄奴

【用法】浓煎汤，熏，待温却，用手洗，拭干。

【主治】痔疮轻者。

【加减】重者，加大青叶梗(干者一半)同煎。

62978 **洗痔汤**

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】枳壳五钱　朴消三钱五分　薄荷五钱　干莲房　荆芥各一两

【用法】上㕮咀。煎汤乘热熏，温则淋洗痔处。

【主治】痔疾疼痛。

62979 **洗痔汤**

【方源】《绛囊撮要》。

【组成】枳壳　天名精(一名地菘)各二两

【用法】以河水三瓢，煎数滚，先熏后洗。甚者三次即愈。

【功用】止痛消肿。

【主治】肛门肿痛，下坠，无论新久。

62980 **洗痔膏**

【方源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】槐花　明矾(或用胆矾)各一斤

【用法】先将槐花用河水熬取浓汁，滤清，复入净锅内，投矾于内熬至极稠，瓷罐收贮。每用少许，入开水内化开洗之。其痛立止。

【功用】洗痔疮，用刀剪不疼不痛。

【主治】痔疮。

62981 **洗脾饮**

【方源】《异授眼科》。

【组成】当归　天花粉　赤芍　黄芩　穿山甲(炒)　金银花　羌活　白芷　连翘各等分

【用法】水煎将好，加大黄、芒消一二钱即起，食后服。

【主治】胞肿赤痛。

62982 **洗痘汤**

【方源】《痘学真传》卷七。

【组成】羌活 茵陈 防风 白芷 荆芥 苦参各等分

【用法】煎汤，如九朝后，暑天秽气不堪，将轻绢蘸汤，揩腐处，卧席亦将此汤时时净涤。

【功用】洗痘疮去秽。

62983 **洗搨汤**

【方源】《外台》卷三十四引《崔氏方》。

【异名】洗搨干草汤（《普济方》卷三二六）、洗搨散（《准绳·疡医》卷四）。

【组成】甘草（炙） 干漆各一两（熬） 黄芩 干地黄 芍药 当归各二两 鳖甲五两（炙）

【用法】上切。以水七升，煮取半，去滓，以绵帛纳汤中，以搨疮处，良久即易，一日二次。

【主治】阴蚀。

62984 **洗搨散**

《准绳·疡医》卷四。为《外台》卷三十四引《崔氏方》"洗搨汤"之异名。见该条。

62985 **洗搨散**

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】五倍子 花椒 蛇床子 苦参 白矾 葱各等分

【用法】水煎，熏洗。

【主治】妇人阴蚀疮，阴户中有细虫，其痒不可当，食人脏腑即死，令人发寒热，与劳症相似。

62986 **洗腿方**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】酒归尾三钱 青枫藤三钱 宣木瓜三钱 炒赤芍三钱 透骨草三钱 防风一钱半

【用法】水煎，熏洗。

【主治】肩背四肢疼痛。

62987 **洗瘴散**

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】田茶菊 七层楼 铁梗子 鸡屎子

【用法】水煎上碗，入盐少许泡，去滓，洗眼。

【主治】瘴眼及眼泡赤肿，翳膜遮睛。

62988 **洗翳散**

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】赤梗酸枇草

【用法】捣烂，沸汤泡，滤清，洗眼。

【主治】瘴眼及眼泡赤肿，翳膜遮睛。

62989 **洗癣酊**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】土荆皮 3 克 百部 3 克 槟榔 3 克 川椒 3 克 斑蝥 4 个 醋 200 毫升

【用法】上药浸一天，早晨用此浸灰指甲，再用皮可净药水（成药。内含柳酸，安息香酸）涂后，用纱布包；晚上只浸洗癣酊，纱布包。连续七天，指甲即脱落。如有化脓溃烂，涂消治龙药膏（成药）。

【主治】灰指甲。

62990 **洗髓丹**

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】净轻粉二钱（炒至光色减去三分之二，研细。盖此药炒之则烈性少缓，若炒之过度，又恐无力，火候宜中，用其大片即净轻粉） 净红粉一钱（研细，须多带紫黑片者用之，方有效验） 露蜂房如拳大者一个（大者可用一半，小者可用两个。炮至半黑半黄色，研细，炮时须用物按之着锅） 核桃十个（去皮，捣碎，炮至半黑半黄色，研细，纸包数层，压去其油，盖油多即不好为丸用）

【用法】用熟枣为丸，如黄豆粒大，晒干，分三次服之。服时，须清晨空心开水送下，至午后方可饮食。服后，口含柳棍，有痰涎即吐出，愈多吐愈好。睡时将柳棍横含，两端各系一绳，两绳之端结于脑后，防睡觉掉落，又须将柳棍勤换，即将药服完仍须如此，必待不吐痰涎时方可不含柳棍。其药日服一次，若恶心太

甚者，可间日一服。制此药时，须自经手，将轻粉、红粉称极准，其称当以库称为定法，轻粉须称准后再炒。

【主治】杨梅疮毒蔓延周身，或上至顶，或下至足，或深入骨髓，无论陈、新、轻、剧，服之皆有奇效。三四日间疮痂即脱落。

62991 **洗大风方**

【方源】《回春》卷八。

【组成】地骨皮　苦参　荆芥　细辛　防风　苍耳子

【用法】上锉片。水煎，熏洗遍身，血出为效。如洗，务要宽汤浸洗良久方佳，多洗数次为妙。

【主治】疠风。

62992 **洗心饮子**

【方源】《普济方》卷一七九引《广南摄生》。

【组成】甘草　芍药　山栀　杏仁（去尖研入）各等分。

【用法】上为散。每服三钱，水二盏，煎至八分，饭后温服。

【主治】胃热渴。

62993 **洗目神散**

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】黄连一钱　花椒七粒　明矾三分　荆芥五分　生姜一片

【用法】水煎半碗，乘热洗之。

【主治】火眼。

62994 **洗肝饮子**

【方源】《幼幼新书》卷二十五引《吉氏家传》。

【组成】青葙子　钩藤　柴胡　山栀子　甘草（炙）　紫菀　石膏各等分

【用法】每服三钱，水二升，煎至六合，徐徐服之。

【主治】一切疳眼，目昏暗。

62995 **洗肺饮子**

【方源】《永乐大典》卷八〇二〇引《经验普济本事方》。

【组成】鳖甲（醋浸，炙）一两半　甘草（炙）一两　柴胡一两二钱　槟榔三钱　生姜五钱（切）　川大黄八钱　葱白五茎（切）　豆豉一百粒　生地黄一两（切）

【用法】上为散。每服二两，童子小便一升，同煎七分去滓，食前，分三次，一日服。

【主治】时疾寒热，虚劳骨蒸。

62996 **洗面沤子**

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】茅香　藿香　陵零香　朝脑（以上为细末，小袋盛之）　加梨核　红枣　亨糖量加

【用法】小瓷罐盛，滚黄酒浸之，旋添旋用。洗面。

【功用】莹肌润面。

62997 **洗眼仙水**

【方源】《疡医大全》卷十一引《阮氏秘方》。

【组成】胆矾（先研细）　连翘　防风　荆芥　红花各三钱　铜绿　明矾　皮消　归尾　甘菊　赤芍各五钱　杏仁（研）　桃仁各四十粒（研）

【用法】共入坛内，用烧滚河水、井水各五斤，冲入药内，重汤煮大半炷香，将坛半段埋在土内盖好。每次用药水一酒杯，以软绢蘸洗。

【主治】一切风火眼，远年近日眼疾。

62998 **洗眼蚕茧**

【方源】《天津市固有成方统一配本》。

【组成】黄连三钱　菊花三钱　金银花三钱　当归尾三钱　防风三钱　红花二钱　荆芥穗二钱　胆矾二钱　蕤仁二钱　蝉蜕二钱　蜀椒五分　冰片二分

【用法】冰片单包，将黄连等十一味共轧为粗末，将冰片置乳钵内研细，再与黄连等粗末陆续配研和匀过罗。分装：先用白纸包成鸡心形，再用丝棉包严，用绳扎紧。将药用新针刺数孔，以开水一杯浸药，乘热先熏，后用药棉蘸药水擦洗。洗眼器皿要保持清洁。

【功用】散风清热，明目退翳。

【主治】暴发火眼，眼边赤烂，眼睑肿痛，迎

风流血，羞明畏光，视物昏蒙，目眦涩痒。

62999 洗痔神方

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】曲曲菜 小虫卧单 马齿菜 猪牙草 花椒 槐条 茄根

【用法】煎水，先熏后洗，后用珍珠（煅）一钱，琥珀一钱，片脑二钱，为末，搽上。

【主治】痔漏。

63000 洗下疳疮药

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】黄连 黄柏 当归 白芷 独活 防风 朴消 荆芥各等分 铜钱五十文 乌梅五个 盐一匙

【用法】煎温汤。一日洗五七次。洗后用木香、槟榔、黄连、铜青、轻粉、枯矾、螵蛸各等分，麝香少许，为末，至夜敷上。

【主治】下疳。

63001 洗手荣筋方

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】桂枝尖二钱 赤芍二钱 没药一钱五分 乳香一钱 宣木瓜三钱 秦艽二钱 丝瓜一钱 甲珠二钱 天仙藤三钱

【用法】水煎，洗之。

【功用】通络化瘀，温寒止痛。

【主治】风湿性痹痛。

【方论选录】方中桂枝用尖，取其上行手臂；配以丝瓜、天仙藤等药以通经络；乳、没定痛。中医认为肝主筋，疏肝养肝即可荣筋，方中取芍药、木瓜、甲珠敛肝补肝调肝，立方可谓周全。本方趁热外洗，更可活血舒筋。

63002 洗方汤泡散

【方源】《得效》卷十六。

【异名】汤泡散（《普济方》卷七十一）。

【组成】当归尾 赤芍药 黄连（去须） 杏仁各五钱 铜青二钱 薄荷叶三钱 防风五钱

【用法】上锉散。每用二钱，极沸汤泡，乘热先熏后洗，冷则再暖用，一日二三次。

【主治】肝虚风热攻眼，赤肿羞明，渐生翳障。

63003 洗方拔毒汤

【方源】《准绳·疡医》卷三。

【组成】防风 荆芥 羌活 独活 细辛 藁本 川芎 白芷 大黄 苦参 当归 赤芍药 威灵仙 玄参 何首乌 黄柏 甘草 蜂房 甘松 藿香 苍术 石菖蒲 零陵香 枸杞子

【用法】加葱白、川椒，煎水热洗，又用绵布二帖煮热蒸熨。

【主治】瘰疬百杂疮肿。

63004 洗心凉血汤

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】当归 赤芍 生地 黄连 菊花 木通 枯芩 栀子各五分 甘草四分

【用法】水煎，热服。眼痛极红者，用二三剂。

【主治】时行赤眼症。

【宜忌】此降火之剂，壮盛者服。

【加减】皮肿，加大黄。

63005 洗发菊花散

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】甘菊花二两 蔓荆子 干柏叶 川芎 桑根白皮（去粗皮，生用） 白芷 细辛（去苗） 旱莲草（根、茎、花、叶）各一两

【用法】上为粗末。每用药二两，浆水三大碗，煎至两大碗，去滓，沐发。

【主治】头发脱落。

63006 洗红烂眼方

【方源】《便览》卷一。

【组成】当归 黄连 杏仁 铜绿 皮消 净碱各等分

【用法】上药水泡，青布蘸洗。

【主治】红烂眼。

63007 洗杨梅疮方

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】土地骨皮 荆芥 苦参 细辛各五钱

【用法】煎汤，先蒸，后洗。遍身出汗为效。

如洗务要汤宽，浸洗良久方佳。

【主治】杨梅疮。

63008　**洗肝干蓝饮**

【方源】《外台》卷二十一引《删繁方》。

【异名】洗肝干蓝煎(《千金》卷六)。

【组成】干蓝(切)　车前子　苦竹叶(切)各三升　秦皮三两　细辛　决明子　蕤仁　山栀子　升麻　芍药各三两

【用法】上切。以水二斗，煮干兰，取一斗，去滓，取清八升煮药，取一升，下芒消三两沸，去滓，分再服。

【主治】肝热不止，冲眼，为眦赤脉、息肉，闭痛不开，但热势彭彭不歇，及目睛黄。

【宜忌】忌生菜。

63009　**洗肝干蓝煎**

《千金》卷六。为《外台》卷二十一引《删繁方》"洗肝干蓝饮"之异名。见该条。

63010　**洗肝明目散**

【方源】《痘疹心法》卷二十三。

【组成】当归　川芎　羌活　防风　山栀仁　龙胆草　柴胡　木贼　密蒙花各等分

【用法】上为末。每服一钱，以糖水调下。

【主治】痘后目疾。

63011　**洗肝明目散**

【方源】《回春》卷五。

【组成】当归尾　川芎　赤芍　生地黄　黄连　黄芩　栀子　石膏　连翘　防风　荆芥　薄荷　羌活　蔓荆子　菊花　白蒺藜　草决明　桔梗　甘草各等分

【用法】上锉一剂。水煎，食后服。

【主治】一切风热赤肿疼痛。

【加减】如痛不可忍，加光圆小川乌(火煨)，痛不甚不用；如有翳障，加蒺藜、木贼，去芍药；风热肝火甚，加胆草、柴胡，去薄荷；大便实，加大黄、川芎、桔梗。

63012　**洗肝前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】前胡(去芦头)　升麻　枳壳(去瓤，麸炒)各二两　决明子(炒)　防风(去叉)车前子各一两　甘菊花　黄连(去须)各半两细辛(去苗叶)　苦参各三两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至七分，去滓，投芒消末半钱匕，食后临卧温服。

【主治】目睛疼痛如脱。

63013　**洗肝柴胡散**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】柴胡二两半(去苗)　川升麻一两　黄芩一两　决明子二两　羚羊角屑一两　川大黄一两(锉碎，微炒)　石膏二两　地骨皮一两　甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食后温服。

【主治】眼暴赤。

63014　**洗肠犀角散**

【方源】《秘传外科方》引《李防御五痔方》。

【组成】骨碎补　川山甲二两(蛤粉炒)　玄胡索半两(生)　甘草根

【用法】上为细末。每服半钱，茶调，空心服之。

【主治】痔疮。

63015　**洗齿白芷散**

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【异名】白芷散(《普济方》卷七十)。

【组成】白芷　白蔹　莎草根(去毛)　白石英(研)　细辛(去苗叶)　芎䓖各等分

【用法】上为散。常用揩齿。

【主治】齿黄黑。

63016　**洗面玉容方**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】甘松　三柰　香薷　白芷　白及白敛　防风　藁本　白僵蚕　白附子　天花粉　零陵香　绿豆粉　肥皂(煨)各等分

【用法】上为细末。每早洗面。

【功用】馨香，美颜色，除斑黑点。

63017　**洗面玉容丸**

《饲鹤亭集方》。为《外科正宗》卷四"玉容丸"之异名。见该条。

63018 洗面玉容散

【方源】《便览》卷四。

【组成】藁本一两半　三柰一两　朝脑三钱　甘松一两　滑石一两　天花粉一两　白檀一两　零零香一两　糯米一合　皂角末二两　绿豆粉一两

【用法】上为极细末。洗面。

【功用】解诸毒，美容。

63019 洗面如玉膏

【方源】《同寿录》卷四。

【组成】丁香一钱　白芷二钱　麝香一钱

【用法】上为末。烧酒调入器内，熬成膏。每日用少许洗面。

【功用】令人颜色如玉。

63020 洗面香皂丸

【方源】《同寿录》卷四。

【组成】甘松　藁本　香附　茯苓　细辛　三柰　茅香　川芎　白丁香　白芷　明胶　白及　白蔹各一两　牵牛（炒）　瓜蒌根　楮实　冰片各五钱　肥皂一斤半（煮去皮）　绿豆一升（略炒）

【用法】上为细末，肥皂肉捣膏，绿豆粉和为丸；如干，加肥皂汁，捣二千下，为丸如弹子大，阴干，瓷器收藏。洗面时将丸擦手上洗面，后擦面上。不可经水，一丸可用一月。

【功用】洗面护肤。

63021 洗药二参汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】丹参　苦参各四两　蛇床子（生）三两

【用法】水一斗，煎七升，去滓熏洗。

【主治】痞瘟。

63022 洗药外应散

【方源】《奇效良方》卷三十九。

【组成】羌活　独活　樟叶　石楠叶　藿香　藁本　大蓼　紫荆皮　杉木　白芷　荆芥　紫苏叶　苦参各一两　花椒半两

【用法】上用水一斗，葱一握，煎至七分，置盆内，令病者以足用厚衣盖覆，熏蒸痛处；候温热可下手，令他人淋洗。

【主治】脚气。

63023 洗药荆叶散

【方源】《奇效良方》卷五十六。

【异名】洗药水（《杂病源流犀烛》卷三十）。

【组成】顽荆叶一两　白芷　细辛（去苗）　蔓荆子　桂心　川芎　丁皮　防风（去芦）　羌活各半两

【用法】上作一服。入盐半匙，连根葱五茎，浆水五升，煎取三升，去滓，通手淋洗痛处，冷即再易，避风处洗之。

【主治】从高坠下，及一切伤折筋骨，瘀血结聚疼痛。

63024 洗药神效散

【方源】《外科精要》卷二。

【异名】神消散（《朱氏集验方》卷十）。

【组成】蛇床子二两　朴消一两

【用法】每用五钱，水二碗，煎数沸，洗净拭干，掺后散。

【功用】合疮口。

【主治】《赤水玄珠》：痈疽溃烂臭秽。

63025 洗药猪蹄汤

【方源】《医方类聚》卷一七四引《外科精要》。

【组成】藁本（去苗）　川当归（去芦）　杜独活（去芦）　茵草　黄连（去须）　蔷薇根　狼牙草　甘草　大黄　芍药各二两

【用法】上为粗末，先用豮猪前蹄一只，煮取浓汁，澄去滓、肉与上面油花；每用药末半两，蹄汁一碗，葱白一根，汉椒二十余粒，同煎三五沸，去滓，通手洗，软帛挹干，贴膏药。

【功用】去败肉，生新肉。

【主治】痈疽破后。

63026 洗浴大黄汤

【方源】《圣惠》卷九十。

【异名】大黄汤（《普济方》卷四〇八）。

【组成】川大黄二两　苦参二两　蛇床子四两　赤芍药三两　黄连三两（去须）　黄芩三两　黄柏五两　菝葜一片

【用法】上锉细，和匀。每用三两，以水五升，煮三十沸，去滓，看冷热，洗浴疮上。

【主治】小儿头面身体生疮。

63027　洗浴石膏汤

【方源】《普济方》卷三七八。

【组成】石膏五两　菖蒲二两　雷丸三两

【用法】上捣碎，以水煮取三升，适寒温，浴儿，并洗头面。

【主治】小儿欲发痫，壮热如火。

63028　洗浴苦参汤

【方源】《圣惠》卷九十。

【异名】苦参汤(《普济方》卷四〇七)。

【组成】苦参半两　丹参半两　苦楝根半两　防风半两(去芦头)　蒴藋根三两

【用法】上锉细，和匀。以水一斗，煎至五升，滤去滓，于密室中洗浴儿，以故帛拭干。

【主治】小儿疥及诸般疮。

63029　洗浴菖蒲汤

【方源】《御药院方》卷十一。

【组成】菖蒲三两(一寸九节者)　防风　荆芥穗各二两　石膏　梅根各一两

【用法】上为粗末。每用五匙，水三碗，煎三五沸，适寒温，浴儿，先洗头面，次浴身体。

【功用】散风截痫。

【主治】小儿诸疾。

63030　洗眼三黄汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【异名】栀子汤(《圣济总录》卷一〇五)。

【组成】黄柏(去粗皮)　黄连(去须)各一两半　栀子仁七枚

【用法】上㕮咀，如麻豆大。以淡浆水二升，煎取六合，去滓，微温，少少洗 眼。

【主治】眼痛赤微肿，眦烂多眵。

63031　洗眼三黄汤

《圣济总录》卷一〇五。为原书同卷“栀子汤”之异名。见该条。

63032　洗眼升麻汤

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】升麻三分　秦皮(去粗皮，锉)　黄连(去须)　蕤蕤各一两

【用法】上为粗末，作三次用。每次以水一升，煎取半升，绵滤去滓，洗眼。

【主治】时气病后，毒气攻目赤烂。

63033　洗眼玉明散

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】秦艽(刮，锉作片子，温水中浴四十九遍，捣二千杵)　白滑石(打碎)　青盐(二味同研如粉)各等分

【用法】上为末。每用一字，热汤浸，放温洗眼，切避风少时。

【主治】眼多泪，碜痛。

63034　洗眼石胆散

【方源】《圣济总录》卷一一三。

【异名】石胆散(《普济方》卷八十三)。

【组成】石胆(煅令白，去火毒)　滑石(研)各一两　秦皮半两(为末)　腻粉二钱匕

【用法】上为末。每用一字，汤浸候温，闭目洗两眦头。以冷为度。

【主治】眼忽结肿。

63035　洗眼光明汤

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】桑园老桑皮

【用法】烧灰，用水熬至七分，澄清去滓，洗一周年，眼明如童子。洗眼日期于后：正月初八、二月初十、三月初五、四月初八、五月初八、六月初七、七月初七、八月初三、九月初十、十月初九、十一月初十、十二月二十二日。

【主治】眼目昏暗。

63036　洗眼光明膏

【方源】《普济方》卷三六三。

【组成】炉甘石(用火煅十次，每次却用黄连水浸后方煅)　当归一两　桑白皮　龙胆草二两　七里光(洗净多为妙。又名黄花演)　生地黄(净洗)一两　国丹三钱(飞)　乳香少许　麝香少许

【用法】先用七里光、龙胆草、当归、生地黄四味，以长流水三升，熬至半升，用绵绢滤过，却以蜜三两亦用绢滤过，慢火熬令成膏，再入

国丹等药，取出半冷，乃放麝香少许搅匀，加封裹，埋新土中出火毒，候三日始用。

【主治】冷热诸风眼疾。

63037 **洗眼竹叶汤**

【方源】《圣惠》卷十六。

【组成】竹叶一百片 秦皮三分 防风三分 甘菊花三分 葳蕤三分 蕤仁三分 甘草一分（生用）

【用法】上锉细。以水二大盏，煎取一盏，以绵滤去滓，避风处洗眼，一日三五次。

【主治】时气目赤碜痛，及痒不忍。

63038 **洗眼决明汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】决明子 柴胡（去苗） 秦皮 防风（去叉） 蛇含草各一两 生干地黄二两

【用法】上锉细。每用一两，以水三盏，煎取二盏，去滓，再用绵滤过，每暖适温热洗讫。避风即愈。

【主治】坠睛，视物失明。

63039 **洗眼汤泡散**

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】当归稍 赤芍药 黄连 杏仁

【用法】上为细末。用水汤泡洗，每日二次。

【主治】时眼，热眼。

63040 **洗眼防风汤**

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】秦皮 黄连（去须） 细辛（去苗叶）各二两 黄柏半两 青盐一两

【用法】上锉令匀。每用一两，以水三盏，煎取一盏半，绵滤去滓，乘热通手洗眼了，避风，一日三次，再暖洗之。

【主治】眼睑肿硬痒痛。

63041 **洗眼红枣儿**

【方源】《审视瑶函》卷六。

【异名】洗眼枣儿药（《何氏济生论》）。

【组成】皮消一斤 上好红枣儿一斤 黄连末三分

【用法】皮消滚水泡化，澄清去滓，红枣儿去核，入消汁内浸一日，取出晒干，又浸，如此数次，以汁尽为度；将枣儿一个，装黄连末三分，小者二分，将枣仍旧合之，勿令泄气。用时取枣一个，投白滚汤泡之，不时洗眼。

【主治】烂弦风眼，不论年久。

63042 **洗眼连竹汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】黄连（去须） 竹叶各一分 秦皮一分半 蛇蜕皮半分

【用法】上锉细。用水一升半，煎取五合，绵滤去滓，夜卧时白绢点药汁洗眼。

【主治】风毒攻眼，暴赤涩痛。

63043 **洗眼枣儿药**

《何氏济生论》卷六。为《审视瑶函》卷六“洗眼红枣儿”之异名。见该条。

63044 **洗眼明睛散**

【方源】《续本事》卷四。

【组成】马牙消一两 青矾少许

【用法】上为末，用水调，文武火煎干，出火毒一宿；次用蔓荆子、防风（二味为极细末）各三钱，再入前二味同拌匀。每用一字，用百沸汤洗。

【主治】气毒赤肿热痛眼。

63045 **洗眼金丝膏**

《审视瑶函》卷三。为《局方》卷七（《续添诸局经验秘方》）“洗眼紫金膏”之异名。见该条。

63046 **洗眼栀子汤**

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】栀子仁半两 黄柏半两 黄芩半两 蕤仁一分 黄连半两 秦皮半两（锉） 决明子半两（微炒） 大枣五枚

【用法】上锉细。都以水二大盏，煎取一大盏。以绵滤去滓，避风处，看冷暖，洗眼，一日三五次。

【主治】热病，热毒气攻眼，生赤肿翳膜，疼痛，怕见光明。

63047 **洗眼柏皮汤**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】柏白皮 黄柏 蕤仁各一两 黄连三分（去须） 苦竹叶二握

【用法】上锉细。以水三升,煎取二升,去滓,稍热淋洗,冷即重暖用之。

【主治】眼赤烂,痒痛不止。

63048 **洗眼荆芥散**

【方源】《普济方》卷八十六引《余居士选奇方》。

【组成】荆芥五文 黄连五文 杏仁三文 铅山白墡土三文

【用法】上锉。煎汤洗之。立明。

【主治】一切眼疾。

63049 **洗眼秦皮汤**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【异名】秦皮汤洗眼方。

【组成】秦皮一两 蕤仁一两 甘草一两半 细辛一两 栀子仁一两 苦竹叶二握 印成盐一分

【用法】上为散。以水三升,煎取一升,去滓,稍热洗目,不拘次数,冷即重暖用之。

【主治】眼赤烂及眼痒急赤涩。

【备考】本方方名,《普济方》引作"秦皮散"、"秦皮洗眼汤"。

63050 **洗眼秦皮汤**

【方源】方出《圣惠》卷三十二,名见《圣济总录》卷一一〇。

【异名】防风汤(《普济方》卷八十四)。

【组成】秦皮一两(去苗) 防风一两(去芦头) 甘菊花三分 竹叶白四十片 蕤仁七枚(汤浸,去赤皮,研) 栀子仁三分 葳蕤一两

【用法】上锉细。以水三大盏,煎取一盏半,绵滤去滓,每暖三合,洗眼,一日二三次。洗了避风。

【主治】眼赤肿痛。

63051 **洗眼秦皮汤**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【异名】秦皮汤(《普济方》卷七十五)。

【组成】秦皮二两 黄连二两(去须) 蕤仁一两(去赤皮,研) 淡竹叶一握 古钱十文

【用法】上锉细。以水三大盏,和钱煮取一大盏,去滓,适寒温,洗之,一日二三次。

【主治】风毒冲眼。

63052 **洗眼秦皮汤**

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】秦皮一两(去粗皮) 桑根白皮一两 玄参半两 葳蕤一两 川大黄半两 竹叶二两 栀子仁半两 青盐半两(未成汤下)

【用法】上粗锉。以水二大盏,煎至一盏半,入盐,滤去滓,微热淋洗,冷即再暖洗之。

【主治】眼白睛肿起,赤碜痛痒。

63053 **洗眼秦皮汤**

【方源】《圣济总录》卷三十二。

【组成】秦皮一两 竹叶一握 防风(去叉) 菊花 萎蕤各半两 蕤仁(去壳,研)一分 甘草(生用)三分

【用法】上为粗末。即用水二升,煎取一升,绵滤去滓,放温洗眼,不拘时候。

【主治】伤寒后热气上冲,目生疮翳。

63054 **洗眼秦皮汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇四。

【组成】秦皮(锉) 蕤仁(去皮) 黄连(去须) 山栀子仁各半两 黄柏一两(锉) 大枣五枚(去核)

【用法】上为粗末。以水四升,煎取二升,滤去滓,微热数洗之,冷则重暖,余滓可重煎洗。

【主治】眼暴赤,及积年睑烂不差,涩痛,睛上有白膜。

63055 **洗眼秦皮汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】秦皮(去粗皮,锉) 黄连(去须)各一两半 栀子仁 大黄(锉,炒) 细辛(去苗叶) 蛇含草 苦竹叶 盐各一两

【用法】上锉细。于臼中捣令碎烂,如眼赤及痛,每用五钱匕,以水二盏,煎取一盏,滤去滓,频频洗眼。

【主治】时气病后,目赤痛不开,昏暗。

63056 **洗眼通光散**

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【异名】通光散(《普济方》卷七十八)。

【组成】栝楼一枚 猪胰子 桑条子十两

【用法】用栝楼一枚，割下顶盖，取瓤并子，同猪胰子捣匀，却入在栝楼内，用原盖盖之，坐净土上，取桑条子十两，约长四五寸，簇栝楼上，用炭火烧，扇之烟尽，将成灰，即住扇，冷和灰通研极细。每用二钱匕，沸汤浸，澄清去脚洗之。

【主治】攀睛翳膜，昏涩，风毒肿痛。

63057 **洗眼黄连汤**

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】黄连一两 甘草一两（生用） 黄柏二两 秦皮一两 秦艽一两（去苗）

【用法】上锉细，都以水二大盏，煎至一大盏，温温洗眼，一日三五次。

【主治】热病毒气攻眼，赤肿疼痛。

63058 **洗眼黄连汤**

【方源】方出《圣惠》卷三十二，名见《普济方》卷七十四。

【组成】黄连一两（去须） 秦皮一两 大枣七枚

【用法】上锉。用水二大盏，煎至一盏，去滓，放温，洗眼，一日三次。

【主治】眼赤肿疼痛不可忍。

63059 **洗眼黄连汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】黄连（去须） 秦皮（去粗皮） 黄连（去粗皮）各一两 蕤仁三分 干枣十枚

【用法】上㕮咀，如麻豆大，拌匀。每用一两半，以水四盏，煎至二盏半，去滓，稍热抄洗，冷即重暖，一日三次。

【主治】风毒冲眼赤肿，睛欲突出。

63060 **洗眼黄连散**

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】当归 赤芍 黄连 黄柏各等分

【用法】上锉细。以雪水或甜水浓煎汁，热洗。

【主治】一切风毒赤目。

63061 **洗眼黄柏汤**

【方源】《圣惠》卷十八。

【组成】黄柏半两 黄连半两 当归半两 甘草半两（生用） 灯心三束 黄芩半两 杏仁一分（汤浸，去皮尖双仁，生用） 蕤仁一分 大枣五枚

【用法】上锉细。都以水三大盏，煎取一大盏半，以绵滤去滓，看冷暖，避风处洗眼，一日三五次。

【主治】热病毒气攻两眼，赤肿疼痛。

63062 **洗眼紫金膏**

【方源】《局方》卷七（续添诸局经验秘方）。

【异名】洗眼金丝膏（《审视瑶函》卷三）。

【组成】朱砂（别研） 乳香（别研） 硼砂（别研） 赤芍药 当归（洗，焙）各一分 雄黄（研，飞）二钱 麝香（别研） 半钱 黄连（去须）半两

【用法】上为细末，入研药拌匀，再擂，炼蜜搜和为丸，如皂荚子大。每次用一丸，安净盏内，以沸汤泡开，于无风处洗，药冷闭目少时，候三二时，再煨令热，依前洗，一贴可洗三五次。

【主治】远年近日翳膜遮障，攀睛胬肉，昏暗泪多，瞻视不明，或风气攻注，睑生风粟，或连眶赤烂，怕日羞明，隐涩难开，并能治之。

【宜忌】不得犯铜铁器内洗；如暴赤眼肿者，不可洗之。

63063 **洗眼紫金膏**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】炉甘石（煅）四两 硼砂（煅）二钱 没药（炙）一钱 章丹四两 朱砂二钱 海螵蛸（去硬壳）二钱 乳香（炙）一钱 硇砂（炙）六分 冰片六分 麝香六分

【用法】上为极细末，炼老蜜为饼，重三分。每用二个，温开水溶化洗之。

【功用】清热消肿，退翳。

【主治】暴发火眼，外障云翳，眼睑赤烂。

63064 **洗眼槐枝汤**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】槐枝一大握 柳枝（青嫩如小指大者）一大握（长三寸，切） 青钱三十文 青盐半分 生朴消一分 醋淡得所浆水三升

【用法】上药于铜器中以慢火煎，不得令火急，常微沸如鱼眼，又别以槐柳枝如箸长十数茎，以线缠，用搅药，两头俱便，看色变，复换新者，待浆水色如绿苔，减半，即澄滤，于瓷器中盛，候微温洗眼，不限时节用之。

【主治】眼风赤磣涩，生赤脉及膜，热泪出不止。

【宜忌】避风。

63065　洗眼蕤仁汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【异名】蕤仁汤(《普济方》卷七十四)、玄参汤(《普济方》卷八十四)、菊花散(《普济方》卷八十四)。

【组成】蕤仁(去皮)　秦皮(去粗皮)　防风(去叉)各一两　甘菊花(择)半分　竹叶二握(切)　山栀子仁　萎蕤各半两

【用法】上锉，如麻豆大。以水五盏，煎至两盏半，去滓热淋，如冷，燉暖再洗。痛止即住。

【主治】目热赤痛磣涩。

【宜忌】煎药不得犯铁器。

63066　洗痔诃子散

【方源】《普济方》卷二九五。

【组成】诃子　甘草　大黄　荆芥　白芷　山柰子　藿香　防风各等分

【用法】煎汤，洗患处。

【主治】诸痔。

63067　洗痔极效方

【方源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】葱白十个　瓦花一两　马牙苋五钱　皮消五钱　五倍子五钱　槐花五钱　茄根五个　花椒五钱

【用法】煎汤频洗。

【主治】痔疮。

63068　洗痔国老汤

【方源】《疮疡经验全书》卷七。

【组成】荆芥一两　甘草一两　藿香五钱

【用法】煎汤温洗。

【主治】痔漏。

【宜忌】外痔不用。

63069　洗痔金花散

【方源】《秘传外科方》引《李防御五痔方》。

【组成】无名异半钱　黄柏一两　黄连半两(生)　乌黑豆半升

【用法】上为末。温洗了，用海蛤散敷之。

【主治】痔漏。

63070　洗痔肿痛方

【方源】《外科正宗》卷八。

【组成】鱼腥草　苦楝根　朴消　马齿苋　瓦松花各一两

【用法】水五大碗，煎三碗，先熏后洗。

【主治】诸痔肿痛。

63071　洗痔枳壳汤

【方源】《外科正宗》卷八。

【组成】枳壳二两　癞虾蟆草(一名荔枝草，四季常有，面青背白麻纹累累者是)二两

【用法】河水三大碗，同上二味煎数滚，先熏后洗，良久再将汤煎热熏洗。甚者三次即消。

【主治】痔疮肿痛，肛门下坠，无论新久。

63072　洗痔黄消汤

【方源】《疡医大全》卷二十三。

【组成】大黄二两　朴消一两

【用法】加水十二碗煮大黄，煎至八碗，再入朴消，略滚，倾桶内熏洗之。

【主治】痔疮肿痛。

63073　洗痔漏神方

【方源】《回春》卷四。

【组成】花椒　艾叶　葱白　五倍子　皮消　马齿苋　茄根各等分

【用法】上锉。水煎，先熏后洗。当时痛止，指日可愈。

【主治】痔漏。

63074　洗搨干草汤

《普济方》卷三二六。为《外台》卷三十四引《崔氏方》"洗搨汤"之异名。见该条。

63075　洗暴赤眼汤

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】当归　黄连各一钱　赤芍　防风

各五分 杏仁四枚

【用法】用水半盏，入人乳汁少许浸药，蒸过，澄清点洗。

【主治】暴赤眼。

63076 洗眼生地黄汤

【方源】《圣济总录》卷一八一。

【组成】生干地黄二两 决明子 黄芩（去黑心） 竹叶各一两 芍药半两

【用法】上锉细。以水二升，煮五六沸，去滓，澄清洗眼，一日三次。

【主治】小儿眼赤痛不开。

63077 洗肝胆车前子散

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【异名】车前散（《圣济总录》卷一一〇）、车前子散（《普济方》卷七十三）。

【组成】车前子二两 石决明（炒）一两半 蕤仁（去皮）一两半 龙胆半两 青葙子一两 地肤子半两 前胡（去芦头）三分 菊花 甘草（炙）各半两 栀子仁一两

【用法】上为散。每服三钱匕，空心以粟米饮调下，食后、临卧再服。

【主治】目昏赤痛，倒睫赤眼，疼痛不开。

活

63078 活儿丹

【方源】《辨证录》卷十四。

【组成】人参三钱 白术一钱 甘草一分 茯苓二钱 陈皮一分 巴戟天一钱 白芍一钱 柴胡二分 当归五分 山楂五分 神曲三分

【用法】水煎服。

【功用】健脾开胃，平肝解郁。

【主治】小儿惊、疳、吐、泻。

63079 活儿汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】白芍三钱 茯苓五钱 人参二钱 白术三钱 栀子五分 麦芽五分 枳壳三分 半夏五分 甘草一分 神曲五分

【用法】水煎服。

【功用】平肝气，扶脾胃。

【主治】小儿吐泻后，口噤不出声，手脚挛急搐搦，系脾胃虚寒之痉病者。

63080 活心丸

【方源】广州白云山制药总厂。

【组成】人参 牛黄 熊胆 珍珠 灵芝 红花 附子 蟾酥 麝香 冰片等

【用法】将上药分别粉碎过筛，混匀，制成浓缩丸剂。口服，每次 1～2 粒，一日一至三次，或遵医嘱。

【功用】活血化瘀，强心运气。具有抗心肌缺血，改善微循环，缓解心绞痛，提高心功能等作用。

【主治】冠心病及其他心脏病引起的心绞痛，心肌缺血，心功能不全。

63081 活心丹

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】人参一两 黄连三钱 菖蒲一钱 麦芽 生枣仁各五钱 南星一钱 附子三分 良姜五分 生姜十片

【用法】水煎，灌服。

【主治】冬月伤寒，至十二日之后忽然厥发，发则如死人一样，但心中大热，其四肢如冰。

63082 活龙散

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】活地龙四条（洗净，研烂，入姜汁少许，蜜一匙，薄荷汁少许）

【用法】新汲水调和，徐徐灌尽，渐次凉快，未效再服。自然汗出而解。

【主治】阳毒，累经药下不通，结胸硬痛；或稍通而复再结，喘促热燥狂乱。

【加减】若热炽者，加片脑少许。

63083 活圣散

【方源】《良朋汇集》卷一。

【组成】甜瓜蒂

【用法】上为末。每服五分，重者服一钱，温水送下即吐；如不吐再服。倘吐不止，用开水解，或葱汤，加麝香（研）少许更好。

【主治】痰迷心窍，癫狂昏迷，惊痫。

【加减】若有虫吐出者，加雄黄一钱。

63084 **活母丹**

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】当归　人参各一两　川芎五钱　柴胡三分　肉桂一钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人新产之后，亡血过多而成痉，症见忽然手足牵搐，口眼㖞斜，头摇项强，甚则角弓反张。

63085 **活血丸**

【方源】《圣济总录》卷一四五。

【组成】桑枝(东南引，鸡子大粗者，细锉)一斗(纳锅中，入米醋，炒黑存性，为末)　雄黑豆三升(入米醋，炒焦存性，为末)　栗子四百枚(连皮烧，入米醋内浸，再烧再入醋内，存性为末)　乳香半两(细研)

【用法】上为末，以醋煮糯米粥和捣千杵，为丸如弹子大，阴干，勿见日，后用米醋磨好香墨为衣，候干，以布袋盛挂当风处。每服一丸，与乳香酒同煎令化温服，服讫向痛处卧，一日二次。疼痛自止。

【主治】腕折。

63086 **活血丸**

【方源】《医方类聚》卷一九〇引《修月鲁般经》。

【组成】生地黄四两　熟地黄四两　当归　黄连各一两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食远盐汤送下。

【主治】瘰疬疮。

63087 **活血丸**

《普济方》卷三一〇。为《得效》卷十八"活血丹"之异名。见该条。

63088 **活血丸**

【方源】《中医伤科学》

【组成】土鳖虫5份　血竭3份　西红花1份　乳香3份　没药3份　牛膝2份　白芷2份　儿茶2份　骨碎补2份　杜仲3份　续断3份　赤木3份　当归5份　生地3份　川芎2份　自然铜2份　桃仁2份　大黄2份　马前子2份　朱砂1份　冰片2份　蜜糖适量

【功用】活血去瘀，消肿止痛。

【用法】共为细末，炼蜜为丸，每丸5g。每服一丸，一日二至三次。

【主治】骨折及其他损伤的初中期，瘀肿疼痛。

63089 **活血丹**

【方源】《理伤续断方》。

【组成】荆芥二两半　枫香一两(别研)　檀香一两(不见火)　降真节一两　草乌二两(酒煮)　山桂(去粗皮)　当归(酒浸一时)　苍术(米汁浸，春五、夏三、秋七、冬十日；炒干)　川羌活(去芦)　白及(面裹煨，晒干)　乌豆(以糯米炒黄为度)　地龙(去土)各半两　滴青一钱半(别研)　射香半两(别研)　川芎半两(热汤洗三次)　五灵脂一两半(用灯心别研)　乳香一两(别研)　没药一两(别研)　川乌(酒炮)　骨碎补(去毛，炒)　川牛膝(酒浸一时)　细辛(去苗)　花桑木(烧灰存性)　白芷(不蛀者)　赤芍药(酒浸)　川牵牛(石灰炒)　南星(以石灰炒黄色为度)　自然铜(煅，酒淬，别研)　大栗间各半两　木鳖二十个(去油壳)

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如弹子大。入臼杵三十余下，团成块，称一两，分作三丸，候丸尽，分作三分，一分阴干，一分晒干半时久，一分焙半时久，却三分打和一处，令阴阳相合，候药上塵气为度，然后刷去塵，用黑漆光为度。每服半丸，用无灰酒磨化，微煎三五沸，温服，不拘时候。

【主治】跌仆伤损，折骨断筋，疼痛浮肿，腹有瘀血，灌注四肢，烦闷不安；痈疽发背，肌肉坏烂；诸般风疾，左瘫右痪，手足顽麻，妇人血气风发动。

【宜忌】孕妇勿服。

63090 **活血丹**

《全生指迷方》卷二。为《普济方》卷九十七引《指南方》“鸡峰活血丹”之异名。见该条。

63091 **活血丹**

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】川乌一两 乳香一钱半（另研） 草乌一两 地龙一两 天南星一两 没药三钱半（另研） 牛膝一两 木瓜一两

【用法】上为细末，入研药，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、日午冷酒送下；或荆芥汤、清茶亦得。

【主治】妇人脾血久冷，诸般风邪湿毒之气，留滞经络，流注脚手，筋脉拳挛，或发赤肿，行步艰辛，腰腿沉重，脚心吊痛，及上冲胁腹膨胀，胸膈痞闷，不思饮食，冲心闷乱，及一切痛风走注，浑身疼痛。

63092 **活血丹**

《卫生宝鉴》卷十八。为《鸡峰》卷十五“小活血丹”之异名。见该条。

63093 **活血丹**

【方源】《准绳·类方》卷四引《元戎》。

【组成】熟地黄三两 当归 白术 白芍药 续断 人参各一两

【用法】酒糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸。

【主治】痹痛。

63094 **活血丹**

【方源】《永类钤方》卷二十二引彭氏家传方。

【组成】青桑灰一斤（好醋杀火） 大栗间（焙） 骨碎补（制，焙） 南星（生姜汁浸一宿，焙） 赤芍药（焙） 白芍药（焙） 牛膝（洗，焙） 川乌（炮） 雄黑豆各一两六钱 自然铜（醋淬） 木鳖子肉（切，和面炒赤）各八钱 净细辛一两（焙） 没药四钱（另研） 乳香六钱（另研） 白胶香三钱 血竭六钱（或番降节代）

【用法】上为末，糯米粉醋煮糊丸，杵千下，众手丸，缓则发裂；大丸重六钱（湿），中丸三钱（湿），候干，以漆搽手上，将两三丸挪漆为衣收用。以纱葛袋收挂净处，经久不坏。每服半丸，无灰酒磨化，渐煎三五沸，温服，不拘时候。

【主治】打扑伤损，折骨碎筋，瘀血肿痛烦闷；风痰瘫痪顽痹；妇人血风，产后败血，浮肿，血气疠痛，风劳发动，四肢痠痛。

【宜忌】孕妇勿服。

63095 **活血丹**

【方源】《得效》卷十八。

【异名】活血丸（《普济方》卷三一〇）。

【组成】干地黄（酒煮）二两 当归（煨） 白芍药 续断（盐水炒） 白术（煨） 川芎（醋炒）各一两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温酒送下。

【功用】活血宽筋。

【主治】血脉不和，筋急，行步不利。

63096 **活血丹**

【方源】《解围元薮》卷四。

【组成】木香 乳香各一两 麝香 皂角各三钱 大风子四两

【用法】上为末，饭为丸，如芡实大。每服五十丸，茶送下，加至七八十丸。

【主治】筋骨痛甚。

63097 **活血丹**

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】青桑炭一斤 当归 牛膝 川芎 赤芍药 熟地 黑豆（酒煮） 何首乌 南星（制） 白芷 老松节（烧） 杜仲（制） 破故纸 羌活 独活 苍术（制） 防风 荆芥 骨碎补 桔梗 栗间 续断 草乌（醋煮，炒） 川乌（炮） 肉桂 木鳖子（炒） 角回 地龙（去土） 白蔹 白及（煨） 细辛 降真香 檀香 松香 枫香 五灵脂 京墨（煅） 血竭 乳香 没药各二两

【用法】上为末，醋煮秫米糊为丸，如弹子大。晒干，以生漆抹手上，挪漆为衣，阴干。却以布袋盛挂于风处，经久不坏，亦不失药味。每服用当归酒磨下。

【主治】打扑伤损,动筋折骨,跌堕斫磕,刀斧等伤;诸般风疾,左瘫右痪,手足顽麻;妇人血风,浑身疼痛,冷痺。

【宜忌】若金刃出血,不可用之。

【加减】伤筋折骨,加自然铜(煅,醋淬)二两。

63098　活血丹

【方源】《疡医大全》卷三十六。

【组成】土鳖虫(酒浸死,晒干)　五加皮　刘寄奴花头　桃仁(去皮尖)　山楂各四两　大黄(陈酒煮干)八两　延胡索(醋煮)　蓬莪术(醋炒)　牡丹皮　当归(酒洗)　牛膝(酒洗)　红花各三两　香附(童便浸,炒)三两　三棱(醋炒)　降香节　凌霄花　苏木　青皮　枳实　赤芍药　威灵仙　槟榔　川芎各二两　乳香(去油)　没药(去油)各一两

【用法】上为细末。每服二钱,壮者三钱,陈酒调服,核桃肉四五枚过口。

【主治】跌打损伤。

63099　活血丹

《观聚方要补》卷二。为《普济方》卷二四一"活络汤"之异名。见该条。

63100　活血汤

【方源】《中国医学大辞典》引《全生指迷方》。

【组成】红花三分　蔓荆子　细辛各五分　生地黄(夏月加之)　熟地黄各一钱　藁本　川芎各一钱五分　防风　羌活　独活　甘草(炙)　柴胡(去苗)　当归身(酒洗)　葛根各二钱　白芍药(炒)　升麻各三钱

【用法】上㕮咀。每服五钱,清水二盏,煎至一盏,去滓,食前稍热服。

【功用】补血养血,生血益阳。

【主治】发热,自汗,盗汗,目𥈣𥈣,头晕口干,四肢无力;妇女崩漏太多,昏冒不省。

63101　活血汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】归尾　赤芍　桃仁(去皮)　官桂各五分　玄胡索　乌药　香附　枳壳(去瓤)各一钱　红花五分　牡丹皮　川芎各七分　木香五分(另磨)　甘草二分

【用法】上锉一剂。加生姜一片,水煎服。

【主治】死血、血结之腹痛。

【备考】方中乌药,《济阳纲目》作"青皮"。

63102　活血汤

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】当归　赤芍药　红花　丹皮　川芎　泽泻　郁金　木通　秦艽

【主治】血痹,半身不遂。

63103　活血汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】当归　赤芍药　丹皮　红花

【用法】煎汤服。

【主治】血虚劳伤之血痹症。

63104　活血汤

【方源】《叶氏女科》卷二。

【组成】熟地黄　当归　川芎　白芍(炒)各三钱　生地黄八分　黄柏(酒炒)　麦冬(去心)　山栀仁(炒)各五分　生姜三片　大枣二枚

【用法】水煎服。

【主治】妊娠血少,三焦火盛之消渴。

63105　活血汤

【方源】《痘疹会通》卷三。

【组成】归尾　生地　赤芍　苏木　甘草　牡丹皮　山楂　柴胡　黄芩　黄连　红花　知母　连翘

【用法】童便煎浓服。

【主治】黑痘,似煤炭,血不红活。

63106　活血汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】当归尾9克　桃仁9克　红花9克　泽兰9克　益母草12克　丹参30克　白芍9克　柴胡6克　香附9克　广陈皮9克　牛膝9克　甘草3克

【用法】水煎服。

【功用】活血理气。

【主治】闭经(气滞血瘀型)。月经数月不

行，小腹硬痛，乳房胀痛，脉沉涩，舌质紫，苔白。

【方论选录】方用当归尾、桃仁、红花、泽兰、丹参、益母草活血去瘀通经；柴胡、白芍、香附、广陈皮舒肝理气；牛膝活血祛瘀，引血下行。

63107 **活血汤**

【方源】《跌打损伤方》。

【组成】生地 红花 当归各一钱 槐花一钱八分 木通 地骨皮 陈皮 青皮 香附一钱 乌药 白芷各一钱 甘草

【用法】加砂仁末，酒、水煎服。

【主治】跌打损伤。

【备考】方中甘草用量原缺。

63108 **活血饮**

【方源】《赤水玄珠》卷七。

【组成】滑石一钱五分 桃仁一钱 红花五分 桔梗五分 粉草四分 瓜蒌二钱 丹皮八分 茜草八分 贝母八分 柴胡五分 香附曲五分

【用法】水煎服；或作末以韭菜汁拌为丸服。

【主治】怒气积血在胸胁，咳嗽年久不愈，每咳则隐隐而痛。

63109 **活血酒**

【方源】《中医外伤科学》。

【组成】乳香 没药 血竭各 15 克 贝母 9 克 羌活 15 克 木香 6 克 厚朴 9 克 川乌 草乌 白及各 3 克 麝香 1.5 克 紫荆皮 24 克 香附 15 克 小茴香 9 克 甲珠 15 克 自然铜 木瓜各 15 克 肉桂 6 克 当归 24 克 独活 续断 虎骨 川芎各 15 克

【用法】高粱酒浸成药酒。

【功用】舒筋活血。

【主治】扭挫伤之后期。

63110 **活血酒**

【方源】《中医正骨经验概述》。

【组成】活血散五钱 白酒一斤

【用法】将活血散泡于白酒中，七至十天即成，日久益佳。外用以棉花蘸活血酒于患部擦摩，至局部充血最佳；内服每日一至二次，每次三至五钱。

【功用】通经活血。

【主治】陈旧性扭挫伤，寒湿性腰腿痛。

63111 **活血散**

【方源】《活人书》卷二十一。

【异名】小活血散（《医学入门》卷八）、止痛活血散（《医方考》卷六）。

【组成】白芍药一钱

【用法】上药用酒调和；止痛用温热水调下。

【功用】活血止痛。

【主治】①《活人书》：疹子或出不快。②《小儿痘疹》：痘疹血虚血热，已出未尽，烦躁不宁，腹痛。

63112 **活血散**

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】蝙蝠（炙干）一枚 当归（切，焙） 骨碎补（去毛） 桂（去粗皮） 补骨脂（微炒）各半两 大黄（锉，炒）二两

【用法】上为散。每服三钱匕，空心温酒调下；薄荷醋汤送下亦得。

【主治】伤损瘀血在内，攻注刺痛。

63113 **活血散**

【方源】《产乳备要》。

【组成】当归 川芎 白芍药 柴胡各四两 肉桂（去粗皮）二两

【用法】上为粗末。每服五六钱，水一盏半，煎至七分，去滓，食后稍热服。

【主治】冲任气虚，经事不调，或多或少，或前或后。

【备考】方中柴胡，《御药院方》卷十作“延胡”。

63114 **活血散**

【方源】《卫济宝书》卷下。

【组成】金星草五叶 川芎 羌活各一分 人参半两 甘草二分

【用法】上为末。每服二钱，温水调下，一日三次，如大肿赤疼痛，用麦冬五钱捣烂热调令清，以鹅毛刷在瘭肿瘷上。

【主治】痈疡脓出不快，肢体闷痛，寒热无时，口苦舌干，不思饮食。

63115 活血散

【方源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】白花蛇五两(头紧细者)　草乌头十两　川乌头五两　防风二两半

【用法】上四味，同煮香熟为度，滤出，先去防风不用；次将白花蛇(去皮骨)炙干；次将草乌头(去皮脐，焙)取五两；又次将川乌头(去皮脐)取二两半外；别入草乌头(生，去尖)五两，又入川乌(生，去皮脐)二两半，一处为细末；再入血竭一两(别研)，麝香半钱(别研)，和匀，临服药时，先于食后将真大风油一钱并麝香少许，用清茶或酒调服；续将活血散每服一字，浓煎贯众汤点茶清调下。更量疾势加减服。

【主治】大风疾，诸风，浑身顽麻搔痒成疮。

【宜忌】切忌鸡肉。

63116 活血散

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【异名】如圣散(《普济方》卷四〇三)。

【组成】赤芍药

【用法】上为细末。每服一钱，煎葡萄酒调下，不拘时候。

【主治】疮疹已出不快。

63117 活血散

【方源】《医方类聚》卷一九二引《施圆端效方》。

【组成】苦葶苈

【用法】上为细末。用好油调匀，扫死肉上。

【功用】活血软坚。

【主治】恶疮死肉肿硬。

63118 活血散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】当归(酒洗)　生干地黄(酒洗)　川芎　红花　赤芍药　苏木各半两　甘草三钱

【用法】上㕮咀。每服二钱，水一盏，煎七分，温服，不拘时候。

【主治】破血伤风。

63119 活血散

【方源】《得效》卷十八。

【组成】绿豆粉

【用法】于新铁铫内炒令真紫色，新汲水调令成稠膏。厚敷损处，须数遍贴满，以纸花将杉木皮一片缚定。

【主治】打扑伤损手足。

63120 活血散

【方源】《明医杂著》卷六。

【组成】白芍药一两(酒炒)　紫草茸一钱半

【用法】上为末。每服一匙，糯米汤调下。

【主治】痘疹已出未尽，烦躁不宁，肚腹疼痛。

63121 活血散

【方源】《痘疹心法》卷二十二。

【异名】芎归汤。

【组成】当归　川芎各等分

【用法】上为细末。每服一钱，红花汤调下。

【主治】痘疮出得稠密，血弱，色不润泽而干者。

63122 活血散

【方源】《医学入门》卷八。

【异名】血竭活血散(《痘疹仁端录》卷十四)。

【组成】赤芍　归尾　红花　紫草各五钱　木香二钱　血竭一钱

【用法】上为末。每服二钱。痘色淡白，酒调下；热极血焦不红活，紫草煎酒送下。

【主治】痘色淡白，或热极血焦不红活。

【方论选录】①《痘学真传》：当归、赤芍、血竭、红花皆行血之品，紫草凉解郁毒，木香、川芎流走气血。②《成方切用》：气贵利而不贵滞，血贵活而不贵凝。木香、川芎调其气滞，赤芍、归尾、紫草、红花、血竭理其血凝。

【备考】《赤水玄珠》有川芎。

63123 **活血散**

【方源】方出《医学入门》卷八，名见《杂病源流犀烛》卷三十。

【组成】黄耆 当归 川芎 白芷 续断 鹿茸 黄芩 细辛 干姜 附子 芍药各二两

【用法】上为末。先饮酒，次服药五钱匕，日三服。

【主治】枪伤，腹裂肠出者。

63124 **活血散**

【方源】《痘疹传心录》卷十八。

【组成】当归 红花 桃仁 甘草 柴胡 大黄 生地 蒲黄

【用法】水煎服。

【主治】扑堕伤损。

63125 **活血散**

【方源】《外科启玄》卷十二。

【异名】茜根活血汤（《痘疹仁端录》卷十四）。

【组成】白芍药一两 茜根五钱（酒洗）

【用法】上㕮咀，水酒煎服之。

【主治】痘根窠红散而不附者。

63126 **活血散**

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】当归 白芍 熟地 川芎 苍术 黄柏 秦艽 木瓜

【主治】内伤霍乱转筋。

63127 **活血散**

【方源】《中医正骨经验概述》。

【组成】乳香五钱 没药五钱 血竭（生）五钱 贝母三钱 羌活五钱 南木香二钱 厚朴三钱 川乌（制）一钱 草乌（制）一钱 白芷（生）八钱 麝香五分 紫荆皮（生）八钱 生香附五钱 炒小茴三钱 甲珠五钱 煅自然铜五钱 独活五钱 续断五钱 虎骨五钱 川芎五钱 木瓜五钱 上安桂（去皮）三钱 当归（酒洗）八钱

【用法】上为细末。开水冲调呈糊状，外敷，视伤状而酌量，一般扭挫伤用二至五钱。内服：药末五钱，配白酒一斤备用。

【功用】止血舒筋，活血散瘀，理气镇痛。

【主治】久伤不愈，经血不和，创伤出血，伤后肿胀，疼痛瘀血。

【宜忌】上焦有热，出现口干舌燥者不宜用。

63128 **活血煎**

【方源】《秘传眼科龙目论》卷十。

【组成】当归一两 地黄 川芎 香白芷 羌活各五钱 乳香 没药各一钱（另研）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，薄荷荆芥汤送下；或茶清亦可。

【主治】肝虚目赤，赤灌大眦而肿。

63129 **活血膏**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】轻粉四钱 红粉一钱 乳香面四钱 没药面四钱 儿茶面二钱 血竭面四钱 黄丹二两 蜂蜡二两 头发二钱 蛇蜕二钱 香油八两 麝香二分 冰片一钱

【用法】先将轻粉、红粉、乳香、没药、儿茶、血竭等六味共研为细粉过罗；麝香、冰片研为极细粉，和匀，将香油放入勺内，加热熬开，入蛇蜕，头发二味，炸枯去滓过滤后，徐徐撒入黄丹及蜂蜡，不停搅拌，候呈黑色，再兑入轻粉等六味细粉，搅拌均匀，离火片刻，另将麝香、冰片细粉兑入和匀，倾入冷水盆中去火毒，收成软膏，每盒重五钱。敷于患处。

【功用】活血化瘀，消肿止痛。

【主治】跌打损伤，痈疽疮疖，已破未破，红肿高大，日久溃烂，久不收口。

63130 **活龟丸**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】江湖大乌龟一个（先用柴火烧热地，以罩盖龟，地热逼出臭屁，待屁尽，以秆绳通身包缚，外用黄泥封固，炭火中煨熟，捞起剥净，取肉研如泥，其壳用牛骨髓涂炙五七次，沁透酥干，为末） 黄连一两（九蒸九晒） 归尾三钱三分

【用法】上为末，和前龟肉捣为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，白汤送下。

【功用】扶衰益弱，补阴壮阳。

【主治】肠风，痔漏。

63131 活虎丹

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】蝎虎一个(剪去四足爪，连血研细) 朱砂 片脑 麝香各少许(研细)

【用法】先用古礞石散控下痰涎，次用薄荷煎汤调前药，作一服化下。

【功用】补气血，安心神。

【主治】久年惊痫，癫狂。

63132 活肾丸

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】苍术一两 黄柏 枸杞子 滑石各七钱 南星 半夏 山楂 白芷 神曲各五钱 昆布 吴萸各三钱

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【主治】木肾，不痛者。

【加减】如热，加山栀；寒，加附子；气，加香附、玄胡索；血，加桃心；气块，加姜黄、莪术。

63133 活命丹

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【异名】活命饮(《杂症会心录》卷上)。

【组成】锅饭焦(研粉) 人参三钱

【用法】水煎人参，先用一钟送饭焦二三匙，后渐渐加多，以引胃气。

【主治】伤寒后，误服峻消药，不思谷者。

【宜忌】煎人参不可用药锅，恐闻药发呕。

63134 活命丹

《麻科活人》卷四。为原书同卷“活命饮”之异名。见该条。

63135 活命汤

【方源】《杂症会心录》卷上。

【组成】人参一钱或三钱 炙甘草一钱 制附子一钱 炮姜一钱

【用法】加炒陈米一撮，水煎浓，徐徐饮之，随吐随饮。

【主治】暴吐欲绝。

63136 活命饮

【方源】《圣济总录》卷三十九。

【异名】活命散(《奇效良方》卷二十)。

【组成】盐一合 生姜半两 甘草(炙)一分 葛根半两 丁香七粒

【用法】上锉，如麻豆大，用童子小便一盏半，煎至一盏，去滓，分温二服。

【主治】脾元虚损，霍乱不吐泻，腹胀如鼓，心胸痰壅。

63137 活命饮

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】甘草节 赤芍 白芷 天花粉 贝母 乳香各一钱 防风七分 归尾 皂角刺 陈皮各一钱半 金银花三钱 没药五分 大黄五钱 穿山甲三片

【用法】用好酒瓦罐煎，密封罐口，勿令泄气，煎熟，随疮上下饮之。服后再饮酒二三杯，侧卧而睡。

【功用】排脓，止痛，消毒。

【主治】一切痈毒疮疡。

【宜忌】忌酸物、铁器。已溃者忌服。

【加减】如在背，皂刺为君；在腹，白芷为君；在四肢，金银花为君；在胸，加瓜蒌仁二钱；疔疮，加紫河车草根三钱；便调者，宜去大黄。

63138 活命饮

《观聚方要补》卷八引《外科纂要》。为原书同卷引《皆效方》“化毒为水内托散”之异名。见该条。

63139 活命饮

【方源】《麻科活人》卷四。

【异名】活命丹。

【组成】当归 独活 杜仲 秦艽 细辛 白茯苓 桑寄生 上肉桂 熟地黄 北防风 川芎 黄耆 甘草 人参

【用法】水煎服。

【主治】麻出即收，忽尔作毒，毒将出或毒出后。

63140 活命饮

《杂症会心录》卷上。为《嵩崖尊生》卷十四"活命丹"之异名。见该条。

63141 活命饮

【方源】《良方合璧》卷下。

【组成】当归尾一钱五分　红花一钱　皂角刺一钱　沉香一钱　石决明一钱　羌活一钱　穿山甲一钱　连翘一钱（去心）　威灵仙一钱　花粉一钱五分　滴乳香一钱（去油）　没药一钱（去油）　金银花二钱　白芷一钱　甘草节一钱　防风一钱　苏木一钱

【用法】陈酒一杯，水煎服。

【功用】散风行瘀，活血解毒，消肿定痛，消痈溃脓。

【主治】痈疽发背，对口脑疽，瘰疬痰核，疔疮恶毒，湿痰流注，无名肿毒，大小疮疖，内痈。

63142 活命散

【方源】《普济方》卷二〇二引《护命方》。

【组成】防风　羌活　独活　干姜　细辛各一分　草豆蔻　肉豆蔻　川芎各半两　官桂　吴茱萸　干木瓜各一两

【用法】上为末。每服五钱，浓煎木瓜汤，空心调下，和滓吃。

【主治】上吐下泻，霍乱不止，面色青黑，命欲临死。

63143 活命散

《奇效良方》卷二十。为《圣济总录》卷三十九"活命饮"之异名。见该条。

63144 活胃散

【方源】《全国中药成药处方集》（天津、兰州方）。

【组成】五灵脂（醋炒）二钱　白胡椒四分　西红花一钱　公丁香　广木香各四分　枳壳（麸炒）二钱　雄黄面　净巴豆霜各四分

【用法】上为细末，每包二分重，每袋装六包。每次服一包，以舌舐药粉咽下，服后一小时再饮水为佳，一日两次。

【功用】去胃寒，助消化，止痉利便。

【主治】胸膈胀满，胃部时作疼痛，呕吐嘈杂，不思饮食，大便秘结。

【宜忌】孕妇忌服。

63145 活神丹

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】羌活　玄参　当归　熟地各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心白汤送下。

【主治】大风病，血虚者。

63146 活络丸

【方源】《医方类聚》卷二一二引《仙传济阴方》。

【组成】川乌半两　草乌半两　赤小豆一两　地龙一两　大蒜（不煨）

【用法】上为末，酒煮糊为丸。熟酒送下。

【主治】手足疼痛。

63147 活络丸

【方源】《惠直堂方》卷四。

【组成】川牛黄一分　辰砂五分　蜈蚣一大条（炙）　全蝎（全者）三个（酒洗，炒）　麝香少许　胆矾三分　巴豆五粒（水一碗煮干）　僵蚕五条（水洗，炒）　轻粉三分　焰硝二分

【用法】上为细末，用牙皂煎汤，糯米粉打成糊为丸，如绿豆大。每服七丸，葱白煎汤送下。以利为度。

【主治】小儿脐风撮口，急慢惊风，痰胶满口，牙关紧急，角弓反张。

63148 活络丹

【方源】《局方》卷一（吴直阁增诸家名方）。

【异名】小活络丹〔《全国中药成药处方集》（上海方）〕、追风活络丹〔《全国中药成药处方集》（哈尔滨方）〕、小活络丸〔《中医大辞典·方剂分册》〕。

【组成】川乌（炮，去皮脐）　草乌（炮，去皮脐）　地龙（去土）　天南星（炮）各六两　乳香（研）　没药（研）各二两二钱

【用法】上为细末，入研药和匀，酒面糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、日午冷酒送下；荆芥汤送下亦可。

【主治】①《局方》:丈夫元脏气虚,妇人脾血久冷,诸般风邪湿毒之气,留滞经络,流注脚手,筋脉挛拳,或发赤肿,行步艰辛,腰腿沉重,脚心吊痛,及上冲腹胁膨胀,胸膈痞闷,不思饮食,冲心闷乱,及一切痛风走注,浑身疼痛。②《丸散膏丹集成》:跌打损伤,瘀血停滞之疼痛。

【方论选录】①《济阳纲目》:胆南星之辛烈,所以燥湿痰;二乌辛热,所以散寒湿;蚯蚓湿土所生,用之者何?《易》曰:方以类聚,欲其引星、乌直达湿痰所聚之处,所谓同气相求也。亦《内经》佐以所利,和以所宜之意。风邪注于肢节,久久则血脉凝聚不行,故用乳香、没药以消瘀血。②《成方便读》:川乌、草乌,直达病所,通行经络,散风邪,逐寒湿;而胆星即随其所到之处,建祛风豁痰之功;乳、没之芳香通络,活血行瘀;蚯蚓之蠕动善穿,用为引导;用酒丸酒下,虽欲其缓,而仍欲其行也。

63149　活络丹

【方源】《鸡峰》卷二十五。

【组成】穿山甲半两　白芷　细辛　藁本　白僵蚕　石膏　藿香　木鳖子　骨碎补　荆芥　天麻　天南星　干蝎各一两　大赭石二两　羊踯躅　麻黄各一两半　草乌头(春十二两,冬一斤,秋夏各半斤)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服嚼一丸,荆芥汤送下,不拘时候。

【功用】去风活血,止骨节疼痛。

63150　活络丹

【方源】《普济方》卷一一六引《卫生家宝》。

【组成】五灵脂　破故纸　赤芍药　川乌头　草乌头(二乌并锉碎,用葱切作片子,同和匀,碗合一宿取出,不用葱)　山栀子(去壳)　黑牵牛　白牵牛　何首乌各二两　土朱四两

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服五七丸,打扑伤损,用苏木酒送下;脚气,用木瓜酒送下;腰疼,用核桃酒送下;常服,温酒、盐汤送下。

【主治】跌打损伤,脚气,腰疼,一切风疾疼痛。

63151　活络丹

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】真木瓜(去心)　牛膝(去芦)　肉苁蓉　天麻　黄耆(蜜炙)　大当归(去芦)各二两(上药用好酒浸三日,取出焙干)　川附子(炮,去皮脐)　虎骨(炙黄)　川萆薢　毛狗脊　没药(别研)一两　乳香(别研)半两

【用法】上为细末,用酒打面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心、食前煎木瓜汤或盐酒送下;或用小续命汤送下尤妙。

【主治】风湿相搏,遂致筋脉拘挛,足胫疼痛,浑身倦怠。

63152　活络丹

【方源】《急救仙方》卷六。

【组成】胡芦巴四两(以二两用海金沙四两同炒令赤色,又以二两用巴豆四两同炒令赤色)　苍耳草四两(焙干)　左缠藤四两(连叶焙干用)

【用法】上为末。以好酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服三四十丸,用生酒吞下,病在腰半饥服,病在膝脚,空心服。

【主治】腰脚诸疾。

63153　活络丹

【方源】《普济方》卷九十三。

【组成】萆薢四两　川乌五钱(去皮脐,切四块)　金毛狗脊四两(切作片,去毛)　苍术五钱(去皮,切作片,炒)　破故纸(拣,炒)五钱　杜仲五钱(细切,姜汁浸,炒去丝)　仙灵脾(切)　吴茱萸(炒)　续断各五钱(切)　小茴香(炒)　独活(切)各一两　薏苡仁三两　猪牙皂角(去皮丝,切作一寸)二两

【用法】上作一处,用好酒三升,于瓷瓶内浸一宿,次日以文武火煮至约酒汁一升,擦出焙干,为细末,用煮药酒拌面糊为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,空心温酒或盐汤送下,与七乌丸相间服。

【主治】男子、妇人瘫痪，筋挛骨疼，腰膝疼痛，口眼喎斜，言语謇涩，目晦耳聋，头风，心气痛。

【宜忌】孕妇不可服。

63154 活络丹

《医统》卷十一。为《得效》卷三“活络汤”之异名。见该条。

63155 活络丹

【方源】《医便》卷五。

【组成】牛黄二钱五分 片脑一钱五分 麝香五钱 人参一两 犀角五钱 白花蛇二两 乌梢蛇二两 黑附子一两 乌药一两 白豆蔻一两 青皮一两 白茯苓一两 香附一两 当归一两五钱 骨碎补一两 麻黄二两 川芎二两 两头尖二两 白术一两 羌活二两 防风二两 全蝎二两 天麻二两 玄参二两 威灵仙一两半 白芷二两 草豆蔻二两 血竭七钱半 黄芩二两 黄连二两 地龙五钱 大黄二两 熟地黄二两 木香二两(陆的) 沉香一两(陆的) 丁香一两 乳香一两 没药一两 安息香一两 细辛一两半 干葛一两半 赤芍药一两 姜蚕一两 天竹黄一两 龟版一两 虎骨一两 藿香二两 甘草二两 朱砂一两 官桂二两 松香五钱 何首乌二两 金箔四百张 酥油一两 黄蜡四十斤，蜜糖十一斤

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大，金箔为衣。每服一丸，茶酒服之；病在上，食后服，病在下，食前服；以四物服之尤妙。年过四十，当预服十数丸，至老不生风疾。

【功用】清心明目，宽膈活络，宣通气血。

【主治】风湿诸痹，肩背腰膝，筋骨疼痛，口眼喎斜，半身不遂，行步艰难，筋脉拘挛，一切风疾。

63156 活络丹

《赤水玄珠》卷十一。为《普济方》卷二四一“活络汤”之异名。见该条。

63157 活络丹

【方源】《何氏济生论》卷一。

【组成】川当归 川续断 川杜仲 牛蒡子

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心开水送下。

【主治】半身不遂。

63158 活络丹

【方源】《活人方》卷一。

【组成】何首乌(生熟各半)四两 香附(酒浸，炒)四两 当归三两 天麻三两 南星(姜汁制)二两 橘红三两 枳壳二两(炒) 延胡(酒炒)二两 抚芎一两 羌活一两五钱 独活一两 红花一两五钱 秦艽一两 乳香五钱(出汗) 没药五钱(出汗)

【用法】炼蜜为丸，如弹子大，重三钱。每服一丸，空心淡姜汤，临卧陈酒化服。

【主治】湿痰及风热流滞经络，以致口眼喎斜，手足搐搦，筋脉不舒，半身不遂，肢体疼痛。

63159 活络丹

【方源】《伤科汇纂》卷七。

【组成】川乌 草乌 南星 半夏 胆星 地龙(灰酒洗，煅)

【用法】上为细末，为丸，如梧桐子大。每服七丸。

【主治】湿痰死血在手足间，有一二点痛，年久不愈者。

63160 活络丹

《北京市中药成方选集》。为《奇效良方》卷二“大神效活络丹”之异名。见该条。

63161 活络丹

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】蕲蛇肉 乌蛇肉 灵仙 制草 天麻 全蝎 制首乌 制龟版 麻黄 贯众 甘草 羌活 藿香 乌药 黄连 熟地 广木香 熟军 沉香各二两 细辛 赤芍 制没药 公丁香 制乳香 炒僵蚕 制南星 青皮(醋炒) 骨碎补 白蔻 制附子 黄芩 香附(酒制) 玄参(去芦) 白术(麸炒)各一两 防风二两五钱 血竭七钱 制松香 地龙各五钱 葛根 制虎骨 当归各一两五钱

肉桂(去粗皮)二两　人参(去芦)三两　竹节香附二两(上药共为细粉)　犀角粉五钱　麝香五钱　牛黄一钱五分　冰片一钱五分　安息香一两

【用法】上为细末，和匀，炼蜜为丸，一钱重，蜡皮或蜡纸筒封固。每服一丸，白开水送下。

【功用】舒筋活络，去风散寒，镇痉止痛。

【主治】四肢麻木，腰腿疼痛，半身不遂，言语不清，手足拘挛。

【宜忌】孕妇忌服。

63162　**活络丹**

【方源】《全国中药成药处方集》(兰州方)。

【组成】祁蛇肉　虎骨　苓块　草蔻　白蔻　羌活　毛姜　首乌　酒军　灵仙　乌蛇肉　玄参　地龙　细辛　乌药　天麻　青皮　黄连　乳香　没药　白附子　蝎子　黄芩　赤芍　麻黄　当归　元桂　葛根　酒地　僵蚕　香附子　甘草　桂枝　杜仲　川芎　白芷　防风　龟版　藿香　白术　广木香　血竭花　天竺黄　公丁香　油松节　川牛膝　梅片各五钱　麝香二钱　犀角二钱　丽参三钱　朱砂五钱　盘沉香五钱　牛黄二钱　安息香五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，一钱重，蜡皮封固。每服一丸，白开水送服，每天二次。

【功用】舒肝活血，除湿化痰。

【主治】风湿麻痹，四肢麻木，腰腿疼痛，筋骨疼痛，痰热炽盛，卒然昏迷。

【宜忌】孕妇忌服。

63163　**活络汤**

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】五加皮　续断(酒浸)　白芍药　当归(去芦，酒浸)　白术(炒)各一两　官桂(去粗皮，不见火)　甘草(炙)各半两　附子二钱(炮，去皮脐)

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，生姜五片，枣子一枚，煎至八分，去滓，入酒少许，食前服。

【主治】血虚气短，面目浮肿，四肢乏力。

63164　**活络汤**

【方源】《得效》卷三。

【异名】活络丹(《医统》卷十一)、活络饮(《景岳全书》卷五十四)。

【组成】白术(薄切)一两　当归(净洗，薄切，干称)　独活(净洗)，羌活(净洗　去芦切，干秤)　甘草(炙)　川芎各半两

【用法】上锉散。每服三大钱，水一钟半，生姜五片，慢火煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】风湿痹痛，诸药不效者。

63165　**活络汤**

【方源】《普济方》卷二四一。

【异名】活络丹(《赤水玄珠》卷十一)、活血丹(《观聚方要补》卷二)。

【组成】白术六钱(净者)　杜仲六钱(去粗皮量，制，炒去丝了)　牛膝半两(去根，酒浸，焙干)　附子半两(炮，去皮脐了)　甘草二钱半(炙)　人参二钱半(洗，去芦)　官桂二钱半(去粗皮了)　川姜七钱半(炮)　当归一两二钱半(洗去土，酒浸一宿，焙干了)

【用法】上为细末。每服半两，水二盏，煎至八分，去滓，温热服。病在上者，食后服；病在下者，食前服。

【主治】寒湿脚气，筋骨手足一切疼痛。

63166　**活络汤**

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷五。

【组成】陈皮　半夏　白术　苍术　香附　南星　黄芩(酒炒)　麻黄　当归　威灵仙　荆芥　甘草　生姜

【用法】水煎服。

【主治】湿热痰邪流络，臂痛。

63167　**活络汤**

【方源】《女科指南》。

【组成】茯苓　半夏　陈皮　甘草　苍术　白术　南星　黄芩　香附　当归　羌活　灵仙

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】风痰湿热，臂痛。

63168 活络饮

【方源】《玉案》卷四。

【组成】当归 川芎 白芍(酒炒) 半夏(姜矾制) 南星 桑寄生 秦艽 生地 苍术(炒)各一钱五分

【用法】水煎，临服加酒一杯。

【主治】肢节疼痛。

63169 活络饮

《景岳全书》卷五十四。为《得效》卷三"活络汤"之异名。见该条。

63170 活络饮

【方源】《古方汇精》卷一。

【组成】淮牛膝 明天麻各一钱 防风八分 红花四分 生赤首乌 制赤首乌 生黄耆 熟黄耆 制杜仲 丹参各一钱五分 独支当归四钱 法制半夏三钱 桂枝五分

【用法】水煎，加虎胶八分为引，淡酒一杯顿化，和服。

【主治】偏痹症，痰涎或吐或下，人事渐醒者。

63171 活络膏

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】牵牛二钱五分 独活二钱五分 麻黄二钱五分 蝉蜕二钱五分 杜仲二钱五分 大戟二钱五分 白芷二钱五分 木鳖子二钱五分 桃仁二钱五分 山甲二钱五分 黄连二钱五分 巴豆二钱五分 川芎二钱五分 五倍子二钱五分 枳壳二钱五分 大麻子二钱五分 诃子二钱五分 防风二钱五分 甘遂二钱五分 全蝎二钱五分 南星二钱五分 当归二钱五分 官桂二钱五分 细辛二钱五分 青皮二钱五分 羌活二钱五分 皂角二钱五分 黄柏二钱五分 射干二钱五分 三棱三钱 莪术三钱 芫花三钱 川乌三钱 附子三钱 厚朴三钱 香附三钱 地龙三钱 生地三钱五分 大黄三钱五分 槟榔三钱五分 玄参三钱五分 川断三钱五分 申姜三钱五分 陀僧七钱 马钱子六钱 蛇退一钱五分 蜈蚣一钱

上药酌予碎断，用香油七十两炸枯，去滓过滤，炼至滴水成珠，入黄丹二十七两，搅匀成膏，取出浸入冷水中去火毒后，加热溶化，兑入下列各药：

血竭二钱五分 乳香二钱五分 没药二钱五分 赤石脂二钱五分 木香二钱五分 沉香二钱五分 硼砂二钱五分 龙骨四钱五分 轻粉一钱五分 寒水石一钱五分 丁香一钱五分 朱砂一钱五分 地龙三钱 麝香八分。

【用法】上为细末，过罗，搅匀，摊贴，每大张油重六钱，小张四钱五分。微火化开，贴患处。

【功用】散风止痛，舒筋通络。

【主治】腰腿疼痛，筋脉拘挛，风寒麻木。

63172 活络膏

【方源】《全国中药成药处方集》(北京方)。

【组成】穿山甲(生) 五倍子 防风 当归 羌活 独活 白芷 黄连 枳壳 官桂 猪牙皂 木鳖子 全蝎 细辛 黄柏 桃仁 川芎 诃子 天南星(生) 青皮 杜仲各二钱五分 三棱 莪术 川乌(生) 川附片 厚朴 香附 地龙肉各三钱 大黄 槟榔 续断 骨碎补各三钱五分 蜈蚣二条 马钱子十四个(生) 蛇蜕一钱五分 木香二钱五分 乌蛇肉三钱 威灵仙五钱 天麻 刘寄奴 红花各三钱 首乌藤 海风藤各五钱 土鳖虫二钱

【用法】上药用香油四百八十两炸枯，去滓，炼至滴水成珠；入黄丹二百两，搅匀成膏；每六十四两膏油兑：血竭、乳香、没药、沉香各二钱五分，公丁香一钱五分，麝香一钱，搅匀。微火化开，摊贴患处。

【功用】活络化瘀。

【主治】跌打损伤，闪腰岔气，百节疼痛，足膝痿软。

【宜忌】孕妇忌贴。

63173 活脓散

【方源】《卫济宝书》卷下。

【组成】天麻一两(酒浸)　穿山甲三分(醋炙)　草薢半两　羌活一分　甘草三分

【用法】上为末。每服二钱,酒调下,不拘时候。

【主治】疮毒热痛,肢节疼痛,食少无味。

63174　活脓散

【方源】《普济方》卷二九二引《鲍氏方》。

【组成】防风　当归　人参　川芎各半两　金星草五叶　羌活　甘草各三钱

【用法】上为散。每服二钱,以酒送下,一日二次。

【主治】瘰疬出脓不快,肢节烦疼,寒热口干。

63175　活脾丸

《魏氏家藏方》卷十。即《幼幼新书》卷十引《吉氏家传》"活脾散"改为丸剂。见该条。

63176　活脾散

【方源】《幼幼新书》卷十引茅先生方。

【组成】羊粪三十一个(焙)　丁香一百粒　胡椒五十粒

【用法】上为末。每服半钱,用六十年东日照处壁土煎汤调下。

【主治】小儿慢脾惊风。

63177　活脾散

【方源】《幼幼新书》卷十引《吉氏家传》。

【组成】天南星(去皮)　半夏　白附子各等分

【用法】上为末。每服半钱或一钱,小者一字,用冬瓜子七粒,薄荷一片,酒少许或入水少许,同煎服。

【主治】小儿脾困成慢惊风。

【备考】本方改为丸剂,名"活脾丸"。(见《魏氏家藏方》)。

63178　活痰丸

【方源】《医方易简》卷二。

【组成】半夏(制)二两　白芥子二两　干姜(炒黄)一两　猪苓二两　炙甘草五钱　陈皮四两　(切碎,用盐三钱入水中浸一宿,晒干)

【用法】上为末。水浸蒸饼为丸,如绿豆大。开水送下。

【主治】痰饮水气,停蓄胸胁,吞酸呕逆者。

63179　活魂丹

【方源】《医学正传》卷六引丹溪方。

【组成】血竭　乳香　没药　铜绿　枯白矾　黄丹　穿山甲(煨胖)一钱　轻粉　蟾酥各五分　麝香少许

【用法】上为细末。用蜗牛捣膏为丸,如绿豆大。每服一丸,重者二丸,用葱白一寸嚼烂裹药,热酒送下,食前服。

【主治】①《医学正传》引丹溪:一切恶疮。②《东医宝鉴·杂病篇》:杨梅、天泡疮溃烂,喉穿鼻崩,脓血淋漓。

63180　活鳖煎

【方源】《普济方》卷二二八引《指迷方》。

【组成】附子(去皮脐)　白术　当归　人参　枳壳　桃仁　杏仁各半两　三棱　陈橘皮　白芷　茯苓　甘草　秦艽　柴胡　桑白皮　阿胶　麻黄　官桂各半两　槟榔　豆蔻各一个

【用法】上锉细。用大鳖一枚,汤中燖过,折去头尾肠肚,却入药在腹内,将甲合定,以麻皮缠湿纸裹七重,盐泥固济,令四面厚薄匀,用瓮一口入砻糠三斗,在瓮内放鳖在中间,再用砻糠三斗盖之,四畔发一伏时,次日取出候气冷,取出打破,开鳖并肉及药作三处焙燥,再捣为细末。每服二钱,温酒调下。如咳甚,饮酒不得者,以酒糊为丸,如梧桐子大;每服三十丸,米饮送下,空心服。

【主治】虚劳咳嗽喘急,唾如浓涕,渐渐瘦弱。

【宜忌】忌雀、鸽、苋菜、鱼腥、海味等。

63181　活鳖煎

【方源】《鸡峰》卷十。

【组成】活鳖一个(重半斤者,以河水养五日,用童便、法酒各五升,乌梅五个,捶碎,桃、柳枝各锉一合,共用新绵包子慢火同煮令鳖死,便减耗一半,取出绵包子,将鳖去甲肠肚,

细切研烂，再熬约得至半，碗埳盖盛，将甲骨炙令焦黄色，入后药） 人参 琥珀 木香 柴胡 枳实 杏仁 黄耆 恒山 安息香 附子 当归 桂 羌活 知母 茯苓 乌梅肉各等分。

【用法】上为细末。将鳖甲膏加杵千下为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前、临卧用温酒送下。

【主治】先因吐血，止而后嗽中出血如线，引胁下时痛，日渐羸瘦。

63182 活血饮子

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】当归 菖蒲各等分。

【用法】上为细末。每服一钱，酒调下。

【主治】妇人血气冲心。

63183 活命仙丹

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】木鳖子三个（切片） 斑蝥七个（陈土炒，去头足） 米一撮（炒） 大黄五钱 刘寄奴五钱 茯苓五钱 麝香一分

【用法】上药各为细末，和匀。每服三钱，黄酒调下。

【主治】癫狗咬伤。

【宜忌】服药切忌色欲，须二月不行房，并忌发物。

【方论选录】是方用木鳖、斑蝥者，以狗最畏二物也；木鳖大凉，又能泻出热毒，得大黄以迅扫之，则热毒难留；刘寄奴善能逐血，尤走水窍，佐茯苓利水更速，引毒气从小便而出也；麝香虽亦走窍，然用之不过制斑蝥、木鳖，使之以毒攻毒耳。中有妙理，非漫然而用之也。

63184 活命金丹

【方源】《医学启源》卷中。

【组成】川芎 甘草 板兰根 葛根各一两 龙脑二钱 麝香二钱（研） 牛黄（研）五分 生犀 桂各三钱 珠子粉半两 川大黄二两半 甜消一两 辰砂四钱（一半为衣） 青黛三钱 薄荷五钱

【用法】上为细末，炼蜜同水浸蒸饼糊为剂，每一两作十丸，别入朱砂为衣，就湿以真金箔四十叶为衣，瓷器内收贮，多年不坏。如风毒，茶清送下；解毒药，新冷水化下；余热劳病及小儿惊热，薄荷汤化下。

【主治】风中脏，不语，半身不遂，肢节顽痹，痰涎上潮，咽嗌不利，饮食不下，牙关紧禁。及解一切药毒，发热腹胀，大小便不利，胸膈痞满，上实下虚，气闭面赤，汗后余热不退，劳病。

【备考】方中川芎、葛根，《御药院方》作贯众、干姜。

63185 活命神方

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】当门子 新江子仁（去油） 真大泥冰片 麻黄各一钱 细辛 山豆根各五分 真西牛黄六分 月石末 老姜汁（澄粉）各三分

【用法】各取净末。遇症用芦管吹之。

【主治】喉风喉痹，单蛾双蛾。

【宜忌】阴虚喉痛者不可用。

63186 活命神丹

【方源】《喉科紫珍集》卷上。

【组成】真正当门子麝香一钱 月石（净末）三分 真正大泥冰片头 山豆根（净末）五分 真道地蟾蜍（不见火，晒，研，净末）一钱 老生姜（取汁澄粉）三分 新江子仁（去净油）一钱 大干地龙（去泥）二条

【用法】上药照方拣选道地，逐一研极细末，秤准，制，合匀，瓷瓶收贮，蜡口封固。临时用小红枣一枚，去蒂去核，入药黄豆大。但取核，只开近蒂半截，免走药性。将枣开蒂孔一头，塞入鼻中，令病人闭口目，避风，少顷即能得涎嚏，或出脓，以银花、甘草汤漱之，喉中便觉通快。俟鼻内热时，即将药枣拿去。病甚者，再换药枣一枚，无不立效。凡左蛾塞左，右蛾塞右，双蛾，左右先后塞之。唯喉风喉痹，男左女右塞之。

【主治】喉风喉痹，双单喉蛾。

【宜忌】虚人、孕妇及阴虚喉痛不可用。

63187　**活命神丹**

【方源】《千金珍秘方选》。

【组成】当门子一钱　冰片一钱　蟾酥一钱　巴豆(去油)一钱　硼砂三分　山豆根五分　老姜粉(绞汁晒干)一钱

【用法】上药各为极细末，拌匀，瓶贮，勿令泄气。临用时用红枣一枚去核，取药如黄豆大一粒，嵌入枣内，塞鼻，男左女右，令病者闭口目，避风片时，即能得嚏，喉中即松；如有黄水滴出喉，以金银花、甘草泡汤漱口。病甚者再换一粒，无不神效。

【主治】一切喉症。

【宜忌】阴虚者忌用。

63188　**活络油膏**

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】红花　没药　白芷各二两　当归八两　白附子一两　钩藤四两　紫草　栀子各二两　黄药子一两　甘草　刘寄奴　丹皮　梅片各二两　生地八两　制乳香　露蜂房各二两　大黄四两　白药子一两

【用法】上药置大铁锅内，再放入麻油九斤，用文火将药炸透存性，过滤去滓，再入锅内武火烧熬，放黄蜡三斤，梅片二两，用木棍调和装盒。用手指蘸药搽患处。

【功用】活血通络。

【主治】伤筋结块，或损伤后期软组织硬化或粘连。

63189　**活调敷散**

【方源】《普济方》卷二八九。

【组成】乳香　没药　白芷　白蔹　南星　赤小豆　天花粉　芙蓉叶　黄连　贝母　寒水石　地榆　黄蜀葵叶(或花或子)　白及　百合

【用法】上为末。调敷，疮上留口。

【主治】疮疽，发背。

【加减】如疮肿硬而厚，按之方痛，加草乌尖、狼毒、蜜、醋调敷。

【备考】先用箍药。

63190　**活水无忧散**

【方源】《女科万金方》。

【异名】活水推生无忧散(《郑氏家传女科万金方》卷二)、活命无忧散(《女科旨要》卷二)。

【组成】益母草二两　急性子(即金凤子)　当归各四钱　陈枳壳一两　生地黄　白芍药　苏叶各二钱　甘草八分　肉桂　川芎　陈艾各一钱　生鲤鱼一个

【用法】上为散，分作二服。每服用水三碗，煎至二碗，临服之时加入好醋一匙，每一碗和调乌金丸一丸服。如其死胎不落，急取无根水煎药滓，连服二服，救其性命。

【主治】怀胎十月已满，或因恣情内伤，或因患潮热之疾，又兼胎前多食热毒之物，瘀血相搏，七情怒气所伤，临产横逆，枪忙不谨，辙使稳婆取时，触死胎儿在腹，不能医治者。

【备考】《郑氏家传女科万金方》有秦艽、陈皮。

63191　**活水止虱丹**

【方源】《串雅内编》卷四。

【组成】熟地三两　山茱萸三两　杜仲一两　白术五钱　防己一钱　豨莶草三钱

【用法】服二剂。虱尽即愈。

【主治】背脊裂开一缝，出虱千余，乃肾中有风，得阳气吹之，不觉破裂而虱现。

63192　**活血止疼汤**

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】当归四钱　赤芍三钱　生地三钱　寸冬三钱　知母三钱　黄柏三钱　软蒺藜三钱　香附三钱　红花二钱　夏枯草三钱　黄连二钱　甘草一钱　田三七五分

【用法】前十二味水煎，再将田三七为末冲服。

【功用】活血止痛。

【主治】赤丝附睛。两眼大小眦发生赤丝，侵至风轮，睑内生红泡如米，常觉隐涩羞明，见光流泪。

【临证举例】赤丝附睛　滑县冯学义，因奔

波劳心过度，加以酒色无节，以致欲火上冲，大眦赤丝突起，隐涩瘦疼，寸尺虚数，关部略见微细。此乃肾水不足，而心火有余，上冲于脑，以致赤丝突起，侵害瞳神。先略刺攒竹，瞳子髎，再服活血止疼汤，外点黄连膏，月余而始愈。

63193 **活血止痛汤**

【方源】《伤科大成》。

【组成】当归 苏木末 落得打各二钱 川芎六分 红花五分 乳香 没药 三七 炒赤芍药 陈皮各一钱 地鳖虫 紫荆藤各三钱

【用法】水、酒各半煎服。

【功血】活血止痛。

【主治】损伤瘀血，红肿疼痛。

63194 **活血止痛汤**

《杂病源流犀烛》卷三十。为原书同卷“乳香定痛散”之异名。见该条。

63195 **活血止痛饮**

【方源】《跌打损伤方》。

【组成】归身一钱 生地 青皮 门冬 羌活 川断 红花 苏木一钱 陈皮七分 防风七分 枳实七分 甘草三分 川芎 白芍八分 加皮一钱 乳香一钱 没药一钱

【用法】加灯心二根，水、酒煎服。

【功用】活血止痛。

【主治】跌打损伤。

63196 **活血止痛散**

【方源】《跌打损伤方》。

【组成】当归 羌活 独活 荆芥 川芎 桃仁各八分 木通 乌药 川断 陈皮 五加皮 红花 防风 苏木 乳香 没药 甘草各三分

【用法】上为末。每服三钱。

【功用】活血止痛。

【主治】跌打损伤。

63197 **活血止痛散**

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】乳香 没药 赤芍 白芷 川芎各一两 当归 生地黄 牡丹皮各二两 甘草五钱

【用法】上为末。每服三钱，温酒入童便调下。

【功用】活血止痛。

【主治】打扑损伤，落马坠车，一切疼痛。

63198 **活血止痛散**

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】土鳖虫十两 当归二十两 乳香（醋炙）四两 自然铜（煅，醋淬）六两 三七四两

【用法】上为细末，每八两八钱细粉兑研冰片二钱。每服五分，一日二次，温黄酒或温开水冲服。

【功用】活血散瘀，消肿止痛。

【主治】跌打损伤，瘀血肿痛。

63199 **活血止痛膏**

【方源】《常用中成药》。

【组成】辣椒 干姜 生川乌 独活 甘松 樟脑 冰片 丁香

【用法】橡皮膏剂，敷贴患处。

【功用】祛风散寒，活血止痛。

【主治】扭伤、挫伤，风湿骨痛，腰背痠痛。

63200 **活血化坚汤**

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】防风 赤芍 归尾 天花粉 金银花 贝母 川芎 皂角刺 桔梗各一钱 僵蚕 厚朴 五灵脂 陈皮 甘草 乳香 白芷梢各五分

【用法】水二钟，煎八分，临服用酒一小杯，食后服。

【主治】一切瘰疬、瘿瘤、痰核，初起未溃脓者。

63201 **活血化痰汤**

【方源】《便览》卷三。

【组成】白术（炒） 当归（酒制） 白芍（炒）各五钱 牡丹皮一钱二分 贝母 麦冬 枸杞子各一钱 黄芩（炒）八分 甘草（炒）二分 青皮四分 桃仁（炒，去皮尖） 山栀（炒

黑）　桔梗各一钱

【用法】水煎服。

【功用】活血化痰。

【主治】痰中见血。

63202　**活血化痰汤**

【方源】《回春》卷六。

【组成】当归　川芎　白芍　生地黄　陈皮　半夏(姜炒)　白茯苓(去皮)　甘草各等分

【用法】上锉一剂,加生姜三片,水煎服。

【功用】活血化痰、调经。

【主治】经水过期而来,色淡,痰多者。

63203　**活血化痰汤**

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】陈皮　半夏　白茯苓　甘草　大腹皮　枳壳　木香　玄胡　归尾　黄芩

【主治】青筋。恶寒发热,状似风寒,但胸腹作痛,遍身发麻,或唇口作麻。此因郁怒伤肝,木邪贼土,触动湿痰,气逆而血亦逆,故令痛胀欲死,脉来洪数。

63204　**活血风寒膏**

【方源】《上海市药品标准》。

【组成】肉桂　血竭　乳香　没药　丁香　樟脑　儿茶　川乌　草乌　附子　当归　川芎　桃仁　赤芍　杜仲　补骨脂　续断　菟丝子　威灵仙　白蔹　细辛　远志　陈皮　香附　白术　穿山甲　木香　枳壳　青皮　青风藤　大风子　僵蚕　天麻　蛇床子　小茴香　川楝子　乌药　甘草　怀牛膝　羌活　黄柏　广丹　麻油

【用法】制成膏剂。贴患处。

【功用】祛风散寒,舒筋活血,止痛。

【主治】跌扑损伤,肿痛,以及风寒湿痹,腰腿痠痛。

63205　**活血四物汤**

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】当归　川芎　芍药　生地各一钱半　桃仁九个　红花一钱　苏木八分　连翘　黄连　防风　甘草各六分

【用法】水煎服。

【主治】疥疮经久不愈。

63206　**活血四物汤**

【方源】《会约》卷七。

【组成】当归身尾四五钱　川芎二钱　白芍　生地　桃仁(去皮)　牛膝　延胡(酒炒)各一钱二分　红花(酒炒)　肉桂各一钱二分

【用法】水煎,空心服。

【主治】跌扑伤筋,血气凝滞腰痛。

【加减】如痛甚者,加乳香(去油)、没药(去油)各一钱,外用酒糟、葱、姜捣烂,炒热罨之;如血逆之甚,大便闭结者,加大黄(酒炒)三四钱。

63207　**活血行经汤**

【方源】《玉案》卷五。

【组成】大附子　官桂各一钱五分　厚朴　香附　桃仁　红花　山楂　当归各二钱

【用法】加生姜五片,水煎服。

【主治】因坐冷水而得寒气,以致经闭。

63208　**活血壮筋丹**

【方源】《全国中药成药处方集》(禹县方)。

【组成】制川乌八两　川牛膝一两六钱　地龙　桂枝　苦参　全蝎　土鳖各八钱　制乳香　制没药各四钱　血竭一两

【用法】上为细末,水为丸,血竭为衣。每服六粒,空心服,男用白酒,女用黄酒送下。

【功用】活血壮筋。

【主治】筋骨疼痛,周身麻木,半身不遂;口眼歪斜,左瘫右痪。

【宜忌】孕妇、火热症忌用;小儿不用。

63209　**活血红花汤**

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】红花　苏木　山栀　黄柏　黄芩　桂皮　芍药　川芎　白芷　桃仁　甘草　当归　乳香　没药

【用法】用酒二大钟煎熟,次入童便一钟,再煎数沸,次入乳、没,一滚就起,服之。

【主治】棒疮。

63210　**活血住痛散**

【方源】《救伤秘旨》。

【组成】白芷 山甲 小茴 甘草各三钱 当归 川芎各二钱 独活 羌活各一钱五分 木瓜 肉桂 淮乌各一钱 草乌 麝香各三分

【用法】上为细末。作一次，姜、酒调服。

【功用】活血行气，止痛。

【主治】跌打损伤，骨折疼痛。

63211 活血应痛丸

【方源】《局方》卷一（绍兴续添方）。

【异名】活血定痛丸（《奇效良方》卷三十九）。

【组成】狗脊（去皮）四斤 苍术（米泔浸一宿，去皮）六斤 香附子（去毛，炒）七斤半 陈皮（洗，去蒂）五斤半 没药（别研）十二两 威灵仙（洗）二斤 草乌头一斤半（半炮）

【用法】上为细末，用酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五粒至二十粒，温酒或熟水任下，不拘时候。

【功用】活血脉，壮筋骨，宣流气脉。

【主治】风湿客于肾经，血脉凝滞，腰腿重疼，不能转侧，皮肤不仁，遍身麻木；上攻头面虚肿，耳内常鸣；下注脚膝，重痛少力，行履艰难；项背拘挛，不得舒畅。

【宜忌】久服忌桃、李、雀、鸽、诸血物。

63212 活血补气汤

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】当归八钱 川芎三钱 白芍四钱 黄耆五钱 防风三钱 白芷三钱 二花四钱 寸冬三钱 酒黄芩三钱 菊花三钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【功用】活血补气。

【主治】产后病目症（继发性点状角膜炎）。两眼微红，头晕羞明，风轮之上星翳四起，视物昏蒙。

【临证举例】产后病目症 濮阳李某某，女二十九岁。产后忽觉头晕目赤，酸涩羞明，视物不清。按其脉，六脉细数；视其目，二目微红。此乃虚火上攻头目，以致头晕目赤，视物昏花。先将攒竹、瞳子髎刺之，再服活血补气汤，三四剂即可。

63213 活血驱风散

【方源】《直指》卷十九。

【异名】治血驱风散（《普济方》卷三〇一）、活血祛风散（《杂病源流犀烛》卷二十八）。

【组成】当归 川芎 白芷 华阴细辛 白蒺藜（炒去刺） 桃仁（浸，去皮，焙） 白芍药 半夏（制） 块润 五灵脂 甘草各三钱 苍术（炒） 杜仲（姜汁炙，炒去丝） 辣桂 天麻 薏苡 橘红 槟榔 厚朴（制） 枳壳（制）

【用法】上锉细。每服三钱，水一盏半，加生姜一钱五分，大枣二枚，煎七分，滤清，暖热，入乳香末少许，食前服。

【主治】肝肾风毒，肾囊湿痒，脚下疮癣。

【加减】有热证，去乳香，加黑豆，煎服。

63214 活血和气饮

【方源】《杂病源流犀烛》卷三十。

【组成】川芎三钱 青皮二钱 炙草 白芍 滑石各一钱 丹皮五分 桃仁七粒（去皮尖，研）

【用法】水煎服。

【主治】跌扑，瘀血在内。

63215 活血定痛丸

《奇效良方》卷三十九。为《局方》卷一（绍兴续添方）“活血应痛丸”之异名。见该条。

63216 活血定痛汤

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】红花 乳香各三钱

【用法】水、酒煎，加童便服。

【主治】血出作痛。

63217 活血养肝汤

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】知母肉三钱 当归四钱 川芎二钱 玉竹三钱 胡黄连三钱 寸冬三钱 夏枯草三钱 菊花二钱 香附三钱 木贼二钱 石斛三钱 甘草一钱 田三七五分（另为末，

冲服)

【用法】水煎服。

【功用】活血养肝。

【主治】花翳白陷症。两眼微红,风轮塌陷,白膜叠生,状如雪花,痠疼隐涩,热泪常流。

【临证举例】花翳白陷症　王廷宾之女,19岁。初患月经不调,行经腹疼,经后忽觉二目微疼,视物昏蒙,隔日头疼,热泪下流,白膜隐隐,遂往张先生处调治。每日挑拨点药,终未服药,月余头疼虽止,昏蒙加倍,饮食减少,辞医返里,就诊于余。视其目,睛光低落,白膜深沉,六脉虚脱,惟太阴为甚,此乃脾蕴湿热,肝血亏乏。余先略刺巨髎、上星,内服活血养肝汤,外点消炉散。月余白膜微退,自顾有余。又改服养荣平肝汤,再轮刺攒竹、鱼腰、临泣,半年始愈。

63218　活血祛风汤

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】归尾9克　赤芍9克　桃仁9克　红花9克　荆芥9克　蝉衣6克　白蒺藜9克　甘草6克

【功用】活血祛瘀,和营消风。

【主治】慢性荨麻疹,皮肤瘙痒。

63219　活血祛风散

《杂病源流犀烛》卷二十八。为《直指》卷十九"活血驱风散"之异名。见该条。

63220　活血祛风膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】防风二两　蔓荆子一两　当归三两　生耆二两　桂枝三两　川抚芎二两　薄荷一两　陈皮一两　白附子面五钱(后入)　樟脑面五钱(后入)　牡丹皮一两　杭芍一两　鸡血藤膏五钱

【用法】用香油四斤,将药炸枯,滤去滓,熬至滴水成珠,入樟丹二斤,再入面药,老嫩合宜。

【主治】口眼抽筋。

【方论选录】本方取《千金》小续命汤和东垣当归补血汤合方化裁而成。小续命汤本为治风通用之剂,古今风方多由此来。慈禧虽患口眼抽搐之痼疾,但并无伤寒之表症,故减去麻黄、杏仁、芍药;推究其病原,虽为风中经络,亦营血久虚之故,本"治风先治血,血行风自灭"之法,于方中增入黄耆、当归、鸡血藤膏等味,以生血养血;再加薄荷、陈皮等轻清之药,消风驱湿,则活血祛风之力颇大。方中樟脑一味,芳香辛窜,辟秽化浊,据近代药理研究,对皮肤粘膜局部有轻度刺激作用,可以改善局部血液循环,用之或许对面风之疾有助。

63221　活血祛瘀汤

【方源】《临证医案医方》。

【组成】丹参30克　当归9克　赤芍9克　鸡血藤15克　桃仁6克　玄胡9克　郁金9克　三七3克(研)　香附9克　枳壳6克　广木香6克　甘草3克

【功用】活血,化瘀,止疼。

【主治】慢性肝炎(血瘀型),肝区刺痛,痛处不移,舌质紫,脉细涩。

63222　活血除风汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】当归四钱　川芎二钱　赤芍三钱　生地三钱　寸冬三钱　茺蔚子五钱　羌活三钱　银花三钱　木贼二钱　僵蚕二钱(炒)胡黄连三钱　枳椇子三钱　甘草一钱　薄荷二钱

【用法】水煎服。

【功用】活血除风。

【主治】垂帘障症。从风轮上边生出白膜一块,下侵瞳神,大小眦略赤,不痠疼流泪,只觉昏涩羞明。

【临证举例】垂帘障症　泰安梅冬景,18岁。嗜于烟酒,伤及脑髓,以致白膜下垂,而瞳神微露下边。先经某医院治疗,月余稍轻。后又就诊于余,按其脉,六浮滑,惟太阴弦长,是知肝血不足,而肺气有余所致也。先轮流刺上星、强间,攒竹,内服活血除风汤,三月余始轻。以后目有赤丝不退,再用化针散常常洗之,年余始愈。

63223 **活血破瘀汤**

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】黑玄参五钱 丹皮三钱 枯草三钱 香附三钱 当归四钱 川芎三钱 胡黄连三钱 蒺藜三钱（炒） 白芍三钱 谷精草二钱 木贼三钱 甘草一钱 田三七五分（为末）

【用法】水煎服。

【功用】活血破瘀。

【主治】聚星障症（星状角膜炎）。风轮生出白点，如秤星状，两眼赤涩羞明。

【临证举例】聚星障症 本县张某某，女，三十五岁，素患此症。初期如米，一点二点，甚至四五点，昏酸流泪，怕日羞明，治遍遐迩，百方罔效，自料难愈。迨其后，百病皆出，形容憔悴，饮食减少，变症即生。余赴濮路经其庄，邀余诊治。视其目，满目如星；按其脉，六脉沉数，惟关尺为甚。此乃肾水积热，肝木失养，而无根虚火，上冲于目。以致满目白膜如星，昏涩酸疼，怕日羞明等症状。先将头维、目窗、承泣略刺，再服活血破瘀汤，连服七剂，视其目，白膜已散，睛光已露。

63224 **活血逐瘀汤**

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】丹参五钱至一两 乌药二至四钱 白僵蚕二至四钱 三棱三至五钱 莪术三至五钱 白芥子三至五钱 厚朴二至四钱 橘红三至五钱 土贝母三至五钱 沉香五分至一钱

【功用】活血逐瘀，软坚内消。

【主治】腹部包块（癥瘕），乳房纤维瘤（乳气疽），体表小肿物或寒性脓肿，关节肿胀（鹤膝风）等。

63225 **活血消炎丸**

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】乳香（醋炙）六两 没药（醋炙）六两 菖蒲膏（干）七钱五分 黄米（蒸熟）三两

【用法】上为细末，兑研牛黄一钱五分，捣烂为丸，如绿豆大。每服一钱，温黄酒或温开水送下，一日二次。

【功用】解毒散痈，消坚化结。

【主治】痈疽，疖肿，疮毒。

63226 **活血润肠丸**

《丹溪心法》卷二。为《兰室秘藏》卷下“活血润燥丸”之异名。见该条。

63227 **活血润肠丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（呼和浩特方）。

【组成】全归 杏仁 生地 枳壳 麻仁各半斤

【用法】上为细末。蜜小丸。

【功用】活血润肠。

【主治】大便时时燥结。

63228 **活血润燥丸**

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】活血润肠丸（《丹溪心法》卷二）。

【组成】当归梢一钱 防风三钱 大黄（湿纸裹煨） 羌活各一两 皂角仁（烧存性，去皮）一两五钱 桃仁二两（研如泥） 麻仁二两五钱（研如泥）

【用法】上除麻仁、桃仁另研如泥外，为极细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，以瓷器盛之，纸封无令见风。每服五十丸，白汤送下三两，服后须以苏麻子粥，每日早晚食之。大便日久不能结燥也。

【功用】活血疏风，润燥通便。

【主治】大便风秘，血秘，常常燥结。

【方证选录】《医方集解》：此手足阳阴药也。归尾、桃仁润燥活血，羌活搜风散邪，大黄破结通幽，麻仁滑肠利窍，血和风疏，肠胃得润则自然通利矣；皂角得湿则滑，湿滑则燥结自除。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·内景篇》引作“疏风润肠丸”。

63229 **活血润燥丸**

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】当归（酒洗）二两 怀生地黄一两 怀熟地黄一两 火麻仁一两五钱 枳壳（麸

炒)七钱　杏仁(去皮)五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心温水送下。

【主治】大便闭结。

63230　活血益气汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】黄耆八钱　党参五钱　当归四钱　川芎二钱　白芍三钱　白术三钱(炒)柴胡二钱　枸杞三钱　荆子三钱　升麻三钱　荆皮一钱半　甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】皮急紧小症(睑裂变小)之初期。两眼微红，不疼不痒，抽涩昏瘦而无强视力。

【临证举例】皮急紧小症　余乡马某某，女，20 岁。劳动忘餐，时常两目播昏，初觉两小眦赤烂，有时不治而愈，以后眼渐渐皮急紧小。按其脉，厥阴沉细，太阴虚弱，是知肝血不足，脾胃不健，脂肪缺乏，以致两目干涩紧小，视扬昏蒙。即将强间、三阳络、少泽略刺，内服活血益气汤，十余剂而大轻。待脾健气盛，再服活血除风汤三剂，紧小之弊徐徐而愈。

63231　活血调气汤

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】荆芥　天花粉　防风　赤芍　陈皮各一钱二分　甘草节八分　川贝母(去心)　金银花　白芷　当归尾各二钱

【用法】水煎服。

【功用】消毒散瘀，活血调气。

【主治】痈疽，肿疡。

【加减】疮背上及冬月，加羌活；内热及夏热，加连翘、山栀；消肿，加牛蒡子、穿山甲；痛甚，加乳香、没药；小便涩，加木通；泄泻，加苍术。

63232　活血调经汤

【方源】《普济方》卷三三三引《德生堂方》。

【组成】当归　赤芍药　生地黄　川芎　生牛膝　广术(炒)　三棱　官桂　干漆(锉研，酒炒)　桃仁(去皮尖)　红花各一两

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，酒一小匙，同煎至八分，去滓，空心温服。

【主治】妇人经候闭塞不通，渐成癥瘕血块者。

63233　活血通经汤

【方源】《兰宝秘藏》卷下。

【组成】芍药五分　升麻　葛根　人参　当归身　炙甘草各一钱　酒黄柏　桂枝各二钱

【用法】上锉，如麻豆大，都作一服，水二大盏，煎至一盏，热服，不拘时候。令暖房中近火摩搓其手。

【功用】活血通经，缓急润燥。

【主治】风气暴至，六脉俱弦甚，按之洪实有力，挛急，大便秘涩，面赤热。

【方证选录】用桂枝、甘草以却其寒邪而缓其急搐；以黄柏之苦寒以泻其实面润燥，急救肾水；用升麻、葛根以升阳气，行手足阳明之经，不令遏绝；更以桂枝辛热入手阳明之经，为引用，润燥；复以芍药、甘草专补脾气，使不受风寒之邪而退木邪，专益肺经也；加人参以补元气，为之辅佐；加当归身去里急而和血润燥。

63234　活血通经汤

【方源】《马培之医案》。

【组成】当归二钱　延胡钱半　生地二钱　丹参二钱　木香四分　独活一钱　桃仁钱半　炙没药一钱　红花五分　淮牛膝五钱　桑枝三钱

【主治】闪挫折伤，腰痛脊驼者。

63235　活血通经散

【方源】《简明医彀》卷七。

【组成】白芷　肉桂各一两半　刘寄奴(取穗)　赤芍各五两　凌霄花　苏木　红花　牛膝(土者尤可)　甘草　香附各二两　木通　桃仁各一两

【用法】上为末。每服三钱，空心热好酒送下，午、晚再服；未效，红花酒送下。

【主治】妇人气虚留滞，瘀血不行，月经过期断续，时作腹痛，渐至闭绝。

63236 **活血接骨散**

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】羌活　独活　川芎　防风　当归各一钱　官桂五分　荆芥　赤芍药　苏木　猴姜　白芷各六分

【用法】上㕮咀，用水、酒各半煎好，滤清，另研乳香、没药、自然铜各五分调入，病在上食后，在下食前，温服。

【主治】从高坠下，或行车走马，跌折筋骨者。

63237 **活血续命散**

【方源】《元和纪用经》。

【组成】白芍药四两　当归三两　绵黄耆四两　续断三两　芎䓖（各先为细末）　柏子仁各一两半（别研匀）

【用法】上为末。酒服方寸匕。

【主治】虚损。

63238 **活血散瘀汤**

【方源】《外科正宗》卷八。

【组成】川芎　归尾　赤芍　苏木　牡丹皮　枳壳　瓜蒌仁（去壳）　桃仁（去皮尖）各一钱　槟榔六分　大黄（酒炒）二钱

【用法】水二茶钟，煎八分，空心服，滓再煎服。

【功用】活血散瘀，破气消积，润肠通便。

【主治】①《外科正宗》：肠痈；产后恶露不尽，或经后瘀血作痛；或暴急奔走，或男子杖后，瘀血流注肠胃作痛，渐成内疽，腹痛，大便燥者。②《金鉴》：委中毒，木硬肿痛微红，屈曲艰难。

63239 **活血散瘀汤**

【方源】《外科正宗》卷九。

【组成】川芎　当归　防风　赤芍　苏木　连翘　天花粉　皂角针　红花　黄芩　枳壳各一钱　大黄二钱

【用法】水二钟，煎八分，食前服。

【功用】活血散瘀。

【主治】臀痈。

【加减】便通者，去大黄，加乳香。

63240 **活血散瘀汤**

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】苏木三至五钱　赤白芍三至五钱　草红花三至五钱　桃仁三至五钱　鬼箭羽五钱至一两　三棱三至五钱　莪术三至五钱　木香一至三钱　陈皮三至五钱

【功用】活血散瘀定痛。

【主治】浅层静脉炎，皮下瘀血（隔血症），及跌扑损伤，瘀血胀痛。

63241 **活血散瘀汤**

【方源】《中医外伤科学》。

【组成】归尾　赤芍　桃仁　防风　延胡索　黄芩　半夏　陈皮　川芎

【用法】水煎服。

【功用】活血化瘀。

【主治】一切新伤，瘀阻肿胀疼痛。

63242 **活血散瘿汤**

【方源】《外科正宗》卷六。

【组成】白芍　当归　陈皮　川芎　半夏　熟地　人参　茯苓　丹皮各一钱　红花　昆布　木香　甘草节各五分　青皮　肉桂各三分

【用法】水二钟，煎八分，量病上下服，再饮酒一小杯。

【功用】活血散瘿。

【主治】瘿瘤已成，日久渐大，无痛无痒，气血虚弱者。

63243 **活血紫金丹**

【方源】《良朋汇集》卷四。

【组成】归尾　巴豆（去皮油）各五钱　五灵脂　赭石（火煅，醋淬七次）各一两

【用法】上为细末。醋糊为丸，如绿豆大，每服五七丸。

【主治】妇人经脉不通，腹内成块，遍体发热，心疼。

63244 **活血舒和散**

【方源】《元和纪用经》。

【组成】芎䓖　续断各一两半　牛膝三两（淮州者）

【用法】上为末。每服方寸匕，木瓜酒调下。

【主治】风冷变痹，筋脉急迫。

63245　活血舒筋汤

【方源】《中医伤科学讲义》。

【组成】归尾　赤芍　片姜黄　伸筋草　松节　海桐皮　落得打　路路通　羌(独)活　防风　续断　甘草

【用法】水煎，内服。

【功用】活血祛瘀，舒筋通络。

【主治】伤筋与筋错、筋挛，关节行动不舒，肿痛。

【加减】病在上肢，加用川芎、桂枝；下肢，加用牛膝、木香；痛甚者，加乳香、没药。

63246　活血解毒丸

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】乳香(醋炙)　没药(醋炙)各一两　菖蒲膏(干)一钱五分　蜈蚣二钱　雄黄五钱　黄米(蒸熟)八钱五分

【用法】为丸。每服一钱，一日二次，温黄酒或温开水送下。

【功用】解毒消肿，活血止痛。

63247　活血解毒汤

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】防风　荆芥　生地　赤芍　当归　连翘　牛子　黄连　紫草　甘草　苍术　薄荷　川芎　木通各等分

【用法】水煎服。

【功用】活血解毒。

【主治】痘后余毒。

【备考】方中苍术，《简明医彀》作"白术"；《种痘新书》作"白芷"。

63248　活血解毒汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】葶苈子五钱(炒)　黄芩三钱　大黄四钱　黄柏三钱　灵脂三钱　当归四钱　地骨皮三钱　赤芍三钱　银花六钱　石膏八钱　防风二钱　大贝四钱　龙胆草三钱　白芷二钱　牛膝三钱　甘草一钱

【功用】活血解毒。

【主治】肿胀如杯症(炎性睑肿)：两眼目珠赤疼，羞明胞痒，肿胀坚硬，热泪如汤，气轮起红泡，刺之血少；又治旋螺突出症：风轮高胀，偏突而起，形如旋螺，疼痛不止，热泪常流，赤丝横绕，眉骨微疼，此乃肝木独旺，胆液壅塞，火乘风起，上冲于脑。

【临证举例】旋螺突出　阳谷县康某某，男四十岁。秉性暴躁，素日嗜酒，半夜忽觉头疼目胀，忍疼待旦，急来就诊。按其脉，六脉弦数，惟厥阴为甚；观其目，风轮高起。此乃五脏积热，肝火旺盛，上攻于头目，以致左目旋螺突出，疼痛不已，热泪常流。先刺内迎香出血，继又将后溪、目窗略刺；授以活血解毒汤，加田三七五分煎服之，隔日疼止，连服七剂，红退而旋螺亦缩小大半。后又改用疏肝解肌汤常服，以消炎散常洗罨，月余能分五指，以后间服黄连上清丸，年余高胀虽退，但瘢痕终身未免。

63249　活血解热汤

【方源】《疯门全书》。

【组成】全当归五钱　大生地二钱　白苦参三钱　京赤芍一钱　川黄连一钱　炒栀仁一钱　荆芥穗一钱　北防风一钱　苏薄荷一钱　石菖蒲五分　明雄(研末，冲服)一钱　条甘草二钱

【用法】加灯心为引，或加绿豆半杯，煎服。

【功用】活血解毒。

【主治】麻风。

63250　活肠败毒丹

【方源】《疡医大全》卷二十一。

【组成】当归　金银花各二两　生甘草三钱　地榆　牛膝各一两

【用法】水煎取汁一碗，调乳香、没药末各一钱五分，饮之；滓再煎一碗，又调乳香，没药末各一钱五分，饮之。

【功用】败毒溃脓。

【主治】肠痈已成。

【备考】本方方名，《中国医学大辞典》引作

"活肠散毒丹"。

63251 **活肠散毒丹**

《中国医学大辞典》。即《疡医大全》卷二十一"活肠败毒丹"。见该条。

63252 **活命无忧散**

《女科旨要》卷二。为《女科万金方》"活水无忧散"之异名。见该条。

63253 **活命芎归汤**

《寿世保元》卷七。为《得效》卷十四"加味芎归汤"之异名。见该条。

63254 **活命羊肝丸**

《医学入门》卷七。为《本事》卷五"羊肝丸"之异名。见该条。

63255 **活胎和气饮**

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷二。

【组成】枳壳二钱　厚朴　香附　陈皮（去白）　苍术　苏叶各一钱　砂仁六分　炙草五分　一方加小茴香

【用法】水一钟半，煎七分，空心服。

【主治】怀胎四五月，胎气困倦，气急，饮食无味，贪睡头晕，四肢瘦软。

63256 **活络内灸膏**

【方源】《奇效良方》卷五十四。

【组成】当归　黄耆　白芷　芍药　半夏　木鳖子　铜青各一两　白胶香一斤半　乳香　没药各一两　麻油一斤

【用法】将前六味锉碎，入油内熬至白芷焦色，滤去滓，下白胶香，煎至黑色，次下乳、没、铜青末，搅匀。用时随病大小，厚纸摊贴患处。

【主治】闪肭筋骨，一切无名肿毒疼痛。

63257 **活络祛寒汤**

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】生黄耆五钱　当归四钱　丹参四钱　桂枝尖二钱　生杭芍三钱　生明乳香四钱　生明没药四钱　生姜三钱

【功用】活络祛寒。

【主治】经络受寒，四肢发搐。

63258 **活络透毒饮**

【方源】《救偏琐言》卷十。

【异名】五十八号困象方（《杂病源流犀烛》卷二十一）、木二（《痧书》卷下）。

【组成】羌活　红花　荆芥　牛蒡　木通　当归　牛膝　蝉蜕　青皮　连翘　地龙各等分

【用法】水煎，温服。

【主治】痘收靥时热毒留连，愁容可掬，将来余毒在所不免者。

63259 **活络透毒饮**

【方源】《重订通俗伤寒论》卷八。

【组成】荆芥穗　小青皮　净蝉衣各一钱　青连翘　蜜银花各一钱半　炒牛蒡　紫花地丁各二钱　杜红花五分

【用法】先用活水芦荀一两，大青叶四钱，煎汤代水煎药服。

【功用】活络，解毒，透斑。

【主治】痧因斑隐者。

63260 **活络效灵丹**

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】当归五钱　丹参五钱　生明乳香五钱　生明没药五钱

【用法】水煎服。若作散，一剂分作四次服，温酒送下。

【功用】《方剂学》：活血祛瘀，通络止痛。

【主治】气血凝滞，痃癖癥瘕，心腹疼痛，腿疼臂疼，内外疮疡，脏腑积聚，经络湮瘀。现常用于冠心病，宫外孕，脑血栓形成、急性阑尾炎、坐骨神经痛、脑震荡后遗症等有血瘀气滞者。

【加减】腿疼，加牛膝；臂疼，加连翘；妇女瘀血腹疼，加生桃仁（带皮尖，作散服炒用）、生五灵脂；疮红肿属阳者，加金银花、知母、连翘；疮白硬属阴者，加肉桂、鹿角胶；疮破后生肌不速者，加生黄耆、知母、甘草；脏腑内痛，加三七（研细冲服）、牛蒡子。

【方论选录】《方剂学》：本方所治诸证皆由瘀血凝滞所致，故宜祛瘀止痛为主。方中当归活血养血；丹参助当归以加强活血祛瘀之力；乳香、没药活血祛瘀，行气止痛。诸药合用，使

瘀去络通,则疼痛自止。本方祛瘀止痛之力颇强,为治疗血瘀所致心腹诸痛,癥瘕积聚,以及跌打损伤,瘀血肿痛之有效方剂。

【临证举例】①癥瘕　《衷中参西》:一人年三十许,当脐忽结癥瘕,自下渐长而上,其初长时稍软,数日后即硬如石,旬日长至心口。自言凌晨冒寒,得于途间,时心中有惊恐忧虑,遂觉其气结而不散,此病因甚奇,然不外气血凝滞。为制此方,于流通气血之中,大具融化气血之力,连服十剂全消。②疮疡　《衷中参西》:一少妇,左胁起一疮,其形长约五寸,上半在乳,下半在肋,皮色不变,按之甚硬,而微热于他处。延医询方,调治两月不效,且渐大于从前。后愚诊视,阅其所服诸方,有遵林屋山人治白疽方治者,有按乳痈治者。愚晓病家曰:此证硬而色白者,阴也。按之微热者,阴中有阳也。统观所服诸方,有治纯阴阳之方,无治半阴半阳之方,勿怪其历试皆不效也。用活络效灵丹,俾作汤服之,数剂见轻,三十剂后,消无芥蒂。③冠心病、心绞痛　《江苏中医杂志》(1983;3:38):仇某某,男,54岁。心前区疼痛阵作年余,剧时胸闷如窒,并向左臂部放射,每日三至四次,发时面色晄白,心悸气短,怯冷,苔白质淡,有紫气;脉沉涩。心电图示:冠状T波。此心阳不振、血瘀凝滞之候也。治拟温振心阳,活血化瘀。迳用参附汤合活络效灵丹损益:炒党参12克,紫丹参12克,制附片9克,制黄精12克,全当归10克,杭川芎9克,生明乳香6克,生明没药6克,降香5克。服上方三帖后,痛减未已,续服十五帖后,胸次觉畅,余症亦见好转。原方出入持续治疗四月,心绞痛仅偶有发作,心电图亦趋好转。④宫外孕　《黑龙江中医药》(1986;3:24):赵某某,女,24岁。患者停经二个月,一周来阴道不规律出血,伴下腹疼痛,妇科检查为宫外孕而收住院。查:阴道出血量多,挟有血块,下腹痛甚拒按,脉弦滑。治以活血化瘀,用活络效灵丹加味:当归20克,丹参20克,乳香15克,没药15克,杜仲炭10克,蒲黄炭15克,五灵脂15克,水煎服。三剂后血止,腹痛大减。九剂后腹痛消失,能下床活动。出院后随访情况良好。⑤中风(脑血栓形成)《黑龙江中医药》(1986;3:24):王某某,女,56岁。患者于家中劳动时突然不能言语,随之右侧半身不遂,面色赤红,精神萎顿,言语不清,舌质红而干,脉弦。诊为中风,系由气虚挟痰火,复受风邪所致瘀血凝滞,经络阻塞。治以补虚化痰,清火疏风活络法,用活络效灵丹与化痰汤合剂加地龙、黄耆、桂枝、牛膝、红花、鸡血藤,服用月余,基本痊愈,随访三年情况良好,并能从事家务劳动。⑥肠痈(化脓性阑尾炎)《云南中医杂志》(1983;2:21):赵某,女,47岁。患者右下腹疼痛,伴恶心,身微热。口干不欲饮,纳差,大便微结,舌质红而挟滞,苔薄黄,脉沉数。血常规化验:白血球12000/mm³,中性80%,西医诊为化脓性阑尾炎,中医诊为肠痈(气滞血瘀,热毒聚结),予活络效灵丹加三七15克(研末冲服),丹皮10克,赤芍12克,枳壳10克,大黄9克,牛蒡子10克,桃仁10克,银花30克。二剂痛减,再进五剂,诸症皆除,随访未再发。

63261　活络流气饮

【方源】《金鉴》卷七十。

【异名】和中既济汤。

【组成】苍术　木瓜　羌活　附子(生)　山楂肉　独活　怀牛膝　麻黄各二钱　黄柏　乌药　干姜　槟榔　枳壳(麸炒)各一钱五分　甘草八分　黑豆四十九粒　生姜三片

【用法】水四钟,煎一钟服;滓再煎,水三钟,煎八分服。

【主治】青腿牙疳。

【加减】如牙疳盛,减去干姜、附子,加胡黄连二钱,龙胆草二钱;如牙疳轻而腿疼重,加肉桂二钱;如寒热已退,减去羌活、麻黄,加威灵仙二钱、五加皮二钱。

63262　活络流气饮

【方源】《观聚方要补》卷八引《会元方》。

【组成】白通草　白芷　桔梗　薄荷　川

芎 猪牙皂各七分 红兰花 连翘 当归 羌活 柴胡 土木鳖肉各一钱 威灵仙八分 升麻五分 生甘草四分

【用法】水煎，加酒半盏，食远服。

【主治】流注块，或痛或不痛者；或发乍寒乍热之流注风。

【加减】素禀虚弱而脉微细者，加人参、黄耆；脉洪大者，加玄参、天花粉。

63263 **活络通经丸**

【方源】《三因》卷二。

【组成】川乌头二两（一两生，不去皮尖；一两炮，去皮尖） 草乌二两（制如上法） 木鳖子三两三分（别研） 斑蝥一百个（去头足并翅，醋煮香熟，焙干） 乌蛇（酒浸，去皮骨，焙） 白花蛇（酒浸，去皮骨，焙） 好墨（火煅） 白胶香各一两（别研） 当归一两半 五灵脂三两三分

【用法】上为末，将木鳖子末醋研为膏，和黑豆末一斤，好醋拌，一两作十丸，以墨为衣。每服一丸，空心、食前温酒盐汤嚼下。

【功用】活络通经，宣导凝滞，壮筋骨，助血脉，起偏废。

【主治】半身不遂，口眼㖞斜，瘫痪诸风。

63264 **活络疏肝散**

【方源】《疬科全书》。

【组成】柴胡 牛蒡子 淮牛膝 青皮 防风各一钱半 花粉 土茯苓各三钱 山慈菇（去皮毛） 葛根 夏枯草各二钱 生甘草一钱

【主治】风火疬。初起或在两耳之下，或环颈皆是，或单在左耳之下，或单在右耳之中，无论核之多少，色带红光，即有欲破之势，或痛或不痛，或寒热交作。

【加减】若有实热者，酌加芩、连。

63265 **活络镇风丹**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】卷柏一两 木瓜一两 马钱子（炙）五钱 生地三钱 白芍三钱 当归三钱 川芎三钱 乌蛇（炙）五钱

【用法】上为细末，过罗，炼蜜为丸，重一钱五分。每服一丸，一日二次，用温黄酒送下；开水亦可。

【功用】活络镇痛，强筋健骨。

【主治】筋痿软，腰背疼痛，手足麻木。

63266 **活瘀四物汤**

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】酒生地 15 克 赤芍 当归各 9 克 川芎 3 克 苏木 9 克 血竭 6 克 刘寄奴 9 克 枳壳 1.5 克

【功用】活血祛瘀，通络，补养肝肾。

【主治】钝力撞击，眼珠受损，但未破裂，瞳神慢慢变白（外伤性白内障）。

【方论】方中苏木、血竭、刘寄奴、赤芍、川芎活血祛瘀，疏通络脉；酒生地、当归清热养阴，且有行血之力；枳壳理气以助活瘀。

63267 **活瘀理气汤**

【方源】《儿科证治简要》。

【组成】桃仁三枚（捣碎） 三棱一钱半 莪术一钱半

【用法】水煎服。

【功用】《古今名方》：活血祛瘀，行滞理气。

【主治】小儿由于啼哭暴怒或跌打损伤而致气滞血瘀，阻碍气机而喘，面色灰暗，口唇发绀，胸部郁闷不畅，呼吸困难，气短胸痛，甚则指甲发青或淡黑色。若患病日久不愈，则见形体消瘦，或肌肤甲错，舌质淡紫，苔薄白。脉象沉弦，指纹深紫。

63268 **活血止痛洗药**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】川羌二钱 骨碎补二钱 乳香三钱 三七二钱 归尾二钱 川续断二钱 没药三钱 牛膝二钱 红花二钱 马前子二钱（去毛） 血竭二钱 防己二钱 防风三钱 透骨草二钱 白芷二钱 甘草二钱 老葱胡十个 食盐二两 烧酒半斤（拌好，将药装袋内）

【用法】减马前子加苏木三钱，为粗末，装在布口袋内，每早熏洗，缝两个口袋，用笼篦

蒸烫。

【功用】活血止痛，化痰通络。

【主治】腰痛。

63269 **活瘀止痛洗药**

【方源】《慈禧光绪医方选议》

【组成】酒归尾三钱　赤芍二钱　丹皮一钱五分　防风一钱五分　酒红花一钱　木香六分(研)

【用法】水熬透，熨洗患处。

【功用】活血化瘀，通络止痛。

【主治】筋骨痛。

63270 **活水推生无忧散**

《郑氏家传女科万金方》卷二。为《女科万金方》"活水无忧散"之异名。见该条。

63271 **活血润燥生津汤**

【方源】《医方集解》引丹溪方。

【异名】生津汤(《医级》卷九)、活血润燥生津饮(《杂症会心录》卷上)。

【组成】当归　白芍　熟地黄一钱　天冬　麦冬　括楼八分　桃仁(研)　红花五分

【功用】滋阴生津，活血润燥。

【主治】内燥，津液枯少。

【方论选录】《医方集解》：此手太阴、足厥阴药也。归、芍、地黄滋阴可以生血，括楼、二冬润燥兼能生津，桃仁、红花活血又可润燥，分用各有专能，合用更互相济。

63272 **活血润燥生津饮**

【方源】《医学入门》卷八。

【异名】生津散(《证治宝鉴》卷四)。

【组成】天门冬　麦门冬　五味子　瓜蒌仁　麻子仁　甘草　当归　生地黄　熟地黄　天花粉各等分

【用法】水煎，温服。

【功用】活血，润燥，生津。

【主治】燥渴。

63273 **活血润燥生津饮**

《杂症会心录》卷上。为《医方集解》引丹溪"活血润燥生津汤"之异名。见该条。

63274 **活血通经止痛散**

【方源】《跌损妙方》。

【组成】三棱　莪术　黄柏　黄连　青皮　赤芍　紫苏　香附　柴胡　乳香　红花　苏木　菖蒲　千里马

【用法】水煎服。

【功用】活血化瘀，通经止痛。

【主治】跌打损伤，瘀血冲心，气紧急者。

63275 **活血解毒透肌汤**

【方源】《幼科直言》卷二。

【组成】黄芩　川芎　防风　荆芥　红花　山楂　连翘　牛蒡子

【用法】荸荠为引，水煎服。

【功用】活血解毒。

【主治】痘疮。

63276 **活血顺气何首乌散**

【方源】《疡科选粹》卷八。

【组成】何首乌　当归　赤芍药　白芷　乌药　枳壳　防风　甘草　川芎　陈皮　香附　紫苏　羌活　独活　肉桂各一钱

【用法】用薄荷、生地黄煎，入酒和服。

【功用】活血化瘀，顺气止痛。

【主治】《金鉴》：跌打损伤，瘀血攻心，不能言语。

【加减】痛甚，加乳、没。

63277 **活血舒筋止痛洗药**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】酒归尾三钱　赤芍二钱(炒)　丹皮二钱　乳香一钱(研)　夏枯草三钱　没药一钱(研)　木香一钱(研)　红花一钱(酒)

【用法】用水熬透，熏洗患处。

【功用】活血舒筋，通络止痛。

【主治】皮肤病，筋骨痛。

济

63278 **济川饮**

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】焦术四钱　附子　藁本　花椒各三钱　吴萸　肉桂各一钱

【用法】水煎服。

【主治】厥阴头痛在脑顶。

63279 济川饮

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】熟地八钱 人参四钱 茯神 山药 杜仲 枸杞各三钱 枣仁二钱 五味一钱半

【用法】煨姜、灯心为引，水煎，用金樱膏冲服。

【主治】遗精，无梦亦遗，心肾虚弱者。

63280 济川煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】当归三五钱 牛膝二钱 肉苁蓉(酒洗去咸)二三钱 泽泻一钱半 升麻五七分或一钱 枳壳一钱(虚甚者不必用)

【用法】水一钟半，煎七八分，食前服。

【功用】《方剂学》：温肾益精，润肠通便。

【主治】虚损，大便秘结不通。

【加减】气虚者，但加人参无碍；如有火，加黄芩；如肾虚，加熟地；虚甚者，枳壳不必用。

【方论选录】《方剂学》：方中用肉苁蓉温肾益精，暖腰润肠，是为君药；当归养血和血，润肠通便，牛膝补肾强肾，性善下行，共为臣药；枳壳下气宽肠而助通便，泽泻渗利小便而泄肾浊，共为佐药；尤妙在稍加升麻以升清阳，清阳升则浊阴自降，配合诸药，以加强通便之效，为使药。总之，本方在温补之中，寓有通便之功，故名"济川煎"。济，相助也，益也；川，此处指肾和后窍。顾名思义，便可知本方旨在温肾益精，以润肠通便，故对年老肾虚而大便秘结者，颇为适用。

63281 济川煎

【方源】《叶氏女科》卷一。

【组成】当归三钱 熟地黄 牛膝各二钱 乌药(炒) 肉桂各一钱 桃仁七粒(捣如泥)

【用法】水二钟，煎八分，食前服。

【主治】血结成瘕，寒气客于冲脉、任脉，则血涩不行，成瘕作痛，暂见停蓄而根盘未固者。

63282 济仁丹

【方源】《全国中药成药处方集》(呼和浩特方)。

【组成】粉草十两(切片) 藿香叶三钱 砂仁二两(另轧兑) 薄荷五两 檀香一两 零零香五钱 葛根五钱 大丁香二两(另轧面) 蔻仁一两五钱(另轧兑)

【用法】共为细面，每两细面兑薄荷冰四分，人造麝香四分，冰片二分；用朱砂八钱，血竭花二钱上衣闯亮。

【主治】中暑呕吐，烦躁痞满，晕车晕船，水土不服。

63283 济心丹

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】熟地二两 麦冬 玄参 生枣仁各五钱 丹皮 地骨皮 柏子仁 菟丝子 巴戟天各三钱

【用法】水煎服。

【主治】老人因肾水大亏而患虚烦不寐，大便不通，常有一股热气，自脐下直冲于心，便觉昏乱欲绝。

63284 济水汤

【方源】《点点经》卷一。

【组成】天冬 麦冬 陈皮 草薢 泽泻各一钱半 砂仁二钱 官桂一钱 干葛二钱 甘草三分

【用法】煨姜为引，水煎服。

【主治】酒伤，胸膈不块，呕吐不定。

63285 济水汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】白术二两 肉桂三钱 茯苓一两 山药一两 薏仁一两 茵陈一钱 芡实五钱

【用法】水煎服。

【功用】补肾中之火，去湿健脾。

【主治】肾疸之症，由肾寒而成，身体面目俱黄，小便不利，不思饮食，不得卧。

【方论选录】此方用白术以健脾也，然而白术能利腰脐之气，是健脾正所以健肾；况茯苓、山药、芡实之类，俱是补肾之味，又是利湿

之剂；得肉桂以生其命门之火，则肾不寒，而元阳之气自能透化于膀胱；况所用薏苡之类，原是直走膀胱之品，所谓离照为空，而冰山雪海尽行消化，何黄之不散哉！

63286　**济世丹**

【方源】《普济方》卷二〇九。

【组成】巴豆七枚(去壳膜)　丁香四十二个　胡椒四十二枚

【用法】上药为末。糯米为丸，如绿豆大。每服一丸，赤痢，米饮送下；白痢，姜汤送下；赤白痢，姜饮汤送下。

【主治】痢疾。

63287　**济世丹**

【方源】《普济方》卷二五六。

【组成】斑蝥一钱(去头翅)　全蝎一钱(去足，另研)　草乌一个(去皮)　雪膏一两(宿干，另研)　沉香屑一钱　木香一钱　巴豆一钱(去皮油)　蓬莪术二钱　姜黄二钱　丁香一钱　粉霜一钱(另研)　草果一钱　京三棱二钱(炮)　硇砂一钱(另研)　三柰子一两　肉豆蔻二钱　槟榔二钱　香附子二钱　甘草二钱(炙黄)　乌药二钱　雄黄一钱(另研)　麝香一钱半(另研，用好者)

【用法】上为细末，打醋面糊为丸，如小梧桐子大，朱砂为衣。每服三丸、五丸、七丸、九丸、十一丸、十三丸，十五丸，服者只用单数，盐汤送下；温水亦得。不损真气，除疾根，治百病。诸病所伤，随所伤病作引子。如酒伤，酒送下；茶伤，茶送下；面伤，面汤送下；大小便不通，温水送下；九种心疼，石菖蒲汤送下；泄泻不止，干姜汤送下；赤痢，甘草汤送下；白痢，陈仓米汤送下；翻胃吐食，人参汤送下；八般痃气、疝气，小茴香汤送下；妇人经病，艾醋汤送下；经闭不通，红花汤送下，或苏木汤送下；小儿内伤，滑肠夜起，宿食不化，生姜汤送下；妇人赤白带下，黄耆汤送下；牛马肉所伤，肉汁汤送下；小儿常服，米饮汤送下。

【功用】除疾根，消百病，和脾胃，顺三焦，磨积顺气。

【主治】伤心腹疼痛，胸膈满闷，不思饮食，癥瘕食积气块，酒食所伤，大小便不通，九种心疼，泄泻不止，赤白痢疾，翻胃吐食，痃气疝气，妇人经闭不通，赤白带下，小儿内伤，滑肠夜起，宿食不化等。

63288　**济世丹**

【方源】《普济方》卷三九五。

【组成】木香　五灵脂各一钱　肉豆蔻二个　胡椒一钱　丁香一钱　全蝎二钱　巴豆四粒(去油存性)　朱砂半钱(为衣)

【用法】上为末，米糊为丸，如萝卜子大。每服二三十丸，米汤送下。

【主治】小儿吐泻，并百物所伤，惊疳潮热。

63289　**济世丹**

【方源】《全国中药成药处方集》(禹县方)。

【组成】西滑石二两　粉甘草一两　丁香二钱五分　儿茶五钱　樟脑一钱　紫蔻二钱　砂仁二钱　广木香一钱五分　薄荷冰二分　朱砂二钱　麝香一厘五毫

【用法】上为细末，水为丸，如莱菔子大。每服二十丸，白开水送下。

【主治】头晕恶心，胃口不开，胸腹膨胀，口臭喉热，饮食不消，中暑吐泻。

【宜忌】孕妇忌用。

63290　**济世散**

【方源】《本草纲目》卷十八引张三丰仙方。

【异名】双牛串(《串雅内编》卷三)。

【组成】黑白牵牛各一合

【用法】布包捶碎，以好醋一碗，熬至八分，露一宿，次日五更温服。以大便出脓血为妙。

【主治】一切痈疽发背，无名肿毒，年少气壮者。

63291　**济生丸**

【方源】《卫生鸿宝》卷一。

【组成】云苓十五两　母丁香八钱　香薷　甘草　藿香　白檀香各八两　木瓜　苏叶各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，金箔为衣，每丸重一钱，每服二丸，阴阳水煎服。先刺腿湾红筋出血，再服此药。

【主治】时疫，四肢麻木。

63292 **济生丹**

【方源】《本草纲目》卷二十二引魏元君方。

【组成】莜麦(炒焦)

【用法】上为末，鸡子白为丸，如梧桐子大。每服五十丸，盐汤送下，一日三次。

【主治】男子白浊。

63293 **济生汤**

《古今医鉴》卷十二。为《摄生众妙方》卷十一"三合济生汤"之异名。见该条。

63294 **济生汤**

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】熟地五钱　玄参五钱　麦冬三钱　山茱萸一钱　山药三钱　茯苓二钱　白芍三钱　柴胡五分　神曲三分　竹茹一丸

【用法】水煎服。先用小柴胡汤，再用此方。

【主治】冬月伤寒，至五六日往来寒热，胸胁苦满，或呕吐，或渴或不渴，或烦或不烦。

63295 **济生饮**

【方源】《玉案》卷五。

【组成】牛膝　枳壳　香附　粉草　川芎各一钱　当归三钱　大腹皮　紫苏各一钱五分

【用法】水煎，即刻热服。

【主治】将产试月，弄胎试水腰痛。

63296 **济生散**

【方源】《永乐大典》卷九八一引《大方》。

【组成】厚朴(去粗皮，用甘草五寸拍破，水二碗，文火煮令水减半，去甘草不用，只用厚朴干末)一钱　白术(片切，蜜炙黄色)一钱　人参一两　陈皮(去白)　五味　紫菀　干姜(炮)　杏仁各七钱半(去皮尖双仁)　肉桂(去粗皮)　甘草(炙)各半两

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，枣子一个，煎至七分，食前温服。

【主治】吐泻后，壮热多睡，眼目上视，时发惊悸，手足瘈疭，成慢脾风者。

63297 **济生散**

【方源】《麻科活人》卷一。

【组成】紫草茸　梅蕊　凤尾草　郁金各一钱　牛黄一分　川山甲五分　蝉蜕(去头足)一钱

【用法】上为末。每服一钱，麦冬煎汤调下。

【主治】麻疹欲出不出而生杂证。

63298 **济生散**

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】郁金　蝉蜕　牛黄　麦冬　甲珠　姜蚕　酒洗紫草　梅花蕊　凤尾草

【主治】麻疹，火邪相搏，胃窍受邪，狂乱谵语，吐泻惊候。

63299 **济宇丸**

【方源】《疯门全书》。

【组成】羌活二钱　独活二钱　防风二钱　荆芥二钱　豨莶二钱　灵仙二钱　桑寄生二钱　白芷一钱半　僵蚕一钱半　细辛一钱　首乌一两　龟版五钱　枸杞五钱　当归五钱　川芎二钱　白芍二钱　玄参二钱　丹皮二钱　乌药五钱　槟榔二钱　银花二钱　牛蒡子二钱

【用法】米糊为丸。每次服二钱，早、午、晚三次，茶水送下。

【功用】去余毒。

【主治】疯病已愈，只皮肤不能复原光润，或骨节间有瘦疼。

【加减】有热，加川连一钱半，黄柏一钱半。

63300 **济阳丸**

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】人参六两　黄耆半斤　鹿茸一个(酒浸，切片，又切作小块，粉炒)　龟膏半斤　人胞一个(火焙)　麦冬四两　北五味一两　炒枣仁三两　远志二两　巴戟天半斤　肉桂三两　白术八两　菟丝子一斤　半夏一两　砂仁五钱　黄连八钱　神曲一两

【用法】上药各为末，炼蜜为丸。每日五钱，白滚水送下。

【主治】阴痿。

63301　**济阳汤**

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】杜仲二钱　山药一两　甘草一钱　人参五钱　白术五钱　破故纸一钱

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒,大汗热解,腹微痛,腰不可俯仰。

63302　**济阴丸**

【方源】《丹溪心法》卷三。

【组成】黄柏二两七钱(盐酒拌抄)　龟版(炙)一两三钱半　陈皮七钱　当归一两(酒浸)　知母一两(酒炒)　虎骨七钱(酥炙)　锁阳一两　牛膝一两三钱半　山药　白芍　砂仁　杜仲(炒)　黄耆各七钱(盐水拌抄)　熟地七钱　枸杞五钱　故纸三钱半(炒)　菟丝子(酒浸)一两三钱半

【用法】上为末,以地黄膏为丸。每服七十丸。

【功用】益阴补虚。

【主治】《东医宝鉴·杂病篇》:阴虚劳证。

63303　**济阴丸**

【方源】《普济方》卷三三二引《德生堂方》。

【组成】香附子一斤　乌药一斤(微烧透,去烟,研为末)　川芎　生地黄　熟地黄　白芍药　当归各半两　甘草　香白芷各四两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如弹子大。每服五七十丸,用酒送下。

【功用】调经顺气,温子宫,济阴助孕。

63304　**济阴丸**

【方源】《医统》卷八十四。

【组成】当归　熟地黄　生地黄　川芎　芍药各一两　香附米八两　人参八钱　肉桂七钱　黄芩一两。

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食前米汤或温酒送下。

【功用】滋阴养血。

【主治】妇人血虚挟火,子宫干涩,不能摄精,久不受孕。

63305　**济阴丸**

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【异名】种子济阴丹(《回春》卷六)、种子济阴丸(《医学正印》卷下)。

【组成】香附米四两(一分醋浸,一分米泔浸,一分酒浸,一分童便浸,各浸三日,焙干为末)　益母草二两(忌铁器)　艾叶一两(醋煮)　阿胶二两(蛤粉炒)　熟地黄二两(酒洗过,姜汁炒)　川芎一两　当归一两五钱(酒洗)　白芍药一两三钱(盐酒炒)　陈皮一两(去皮)　白术一两五钱(土炒)　半夏(汤泡,姜汁浸,香油炒)　白茯各一两(去皮)　甘草(炙)三钱　条芩一两(炒焦)　丹皮一两(酒洗)　吴萸五钱(汤泡)　玄胡索四钱　小茴香(盐酒炒)　没药各五钱　续断一两(酒洗)　麦冬一两(去心)

【用法】上为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服一百丸,空心米汤送下;温酒白水亦可。

【功用】顺气养血,调经脉,除白带,益子宫,育胎孕。

63306　**济阴丸**

【方源】《玉案》卷五。

【组成】香附一斤(分作四分,一分童便制,一分醋制,一分艾汤制,一分盐水制)　川芎　当归　白芍　熟地各四两　阿胶二两(蛤粉炒)

【用法】上为末,以香附留末一半打糊为丸。每服三钱,空心滚汤送下。

【主治】月经不调,屡次过期。

63307　**济阴丸**

【方源】《证治汇补》卷六。

【组成】香附一斤(醋浸,炒)　莪术　当归各四两(俱酒浸)

【用法】上为末,醋糊为丸。醋汤送下。

【主治】经候不调,痃癖积块,刺痛。

63308　**济阴丸**

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】当归　白术　生地　茯苓　陈皮　益母各二钱　香附　川芎　黄芩　麦冬各

一钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二钱，空心白汤送下。

【主治】妇人无子。

63309 **济阴丸**

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】益母草 香附米各八分(童便浸炒七次，醋炒三次) 熟地 当归 白术各四两 阿胶 生地 陈皮 白茯苓各三两 川芎 半夏 白芍 麦冬 黄芩 杜仲 丹皮 续断 延胡各二两 没药 甘草各一两 吴萸 小茴各七钱

【用法】上为末，炼蜜加酒为丸，如梧桐子大。每服七十丸，黄酒送下。

【功用】顺气益血，调经除带，益子宫，善胎育。

63310 **济阴丸**

《医级》卷九。为《明医杂著》卷一“补阴丸”之异名。见该条。

63311 **济阴丸**

【方源】《会约》卷二。

【组成】熟地八两 枣皮四五两 山药四两 茯苓三两 龟版胶三两(酒蒸) 肉桂三两 附子三四两 杜仲(淡盐水炒)三两 菟丝子(淘净泥沙，酒蒸)四两 五味二两

【用法】先将地黄、枣皮捣成膏，余药研末，加龟胶，炼蜜为丸。每服七八钱，空心淡盐汤送下。

【主治】肾经阴阳两亏，两尺脉空虚无神，将成劳瘵。

63312 **济阴丸**

《丸散膏丹集成》。即《准绳·类方》卷七“济阴地黄丸”。见该条。

63313 **济阴丹**

【方源】《三因》卷十八。

【异名】南岳魏夫人济阴丹(《局方》卷九吴直阁增诸家名方)、益阴丹(《局方》卷九续添诸局经验秘方)。

【组成】木香(炮) 茯苓 京墨(烧) 桃仁(炒，去皮尖)各一两 秦艽 甘草(炙) 人参 桔梗(炒) 石斛(酒浸) 蚕布(烧) 藁本各二两 当归 桂心 干姜(炮) 细辛 牡丹皮 川芎各一两半 川椒(炒) 山药各三分 泽兰 熟地黄 香附各四两 苍术八两 大豆卷(炒)半升 糯米(炒)一升

【用法】上为末，炼蜜为丸，每两作六丸。每服一丸，嚼细，食前温酒或醋汤送下。

【功用】除宿血，生新血，令人有孕，生子充实。

【主治】妇人久冷无子及数经堕胎，皆因冲任之脉虚冷，胞内宿挟疾病，经水不时，暴下不止，月内再行，或前或后，或崩中漏下，三十六疾，积聚癥瘕，脐下冷痛，小便白浊，以上诸疾，皆令孕育不成，以至绝嗣；亦治产后百病，男子亡血诸疾。

63314 **济阴丹**

【方源】《医方类聚》卷二一二引《急救仙方》。

【组成】香附子 乌豆 干姜 苍术各四两

【用法】重用黄子醋浸二七，苍术只浸一七后切作片子，再浸一七，取出乌豆，再炒过，香附子捣碎，加当归一两，茱萸半两，重煮过，同焙干为末，糯米糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，空心温酒或醋汤吞下。

【主治】妇人诸病。

63315 **济阴丹**

【方源】《普济方》卷三二七。

【组成】三棱二两 莪术一两(切片，煨) 苍术(泔浸，去皮) 枳壳(去瓤) 大艾(去根) 刘寄奴 香附子(净) 败姜各一两半 乌头三合(上药用米醋三升，煮干取出焙干为末) 当归身一两半 蒲黄一两(隔纸炒) 生地黄(酒浸) 熟地黄(酒蒸)各七钱半 橘皮(去白，细红者佳) 白芍药各一两半 玄胡索(炒) 五灵脂(酒煮) 白术(煨)各半两 牡丹皮(净，去滑) 桂(去粗皮) 赤芍药 片子姜黄 青皮(去白)各一两 川芎七钱半

【用法】上为末，糯米粉谷醋打糊为丸。沉香汤送下；苏汤、盐汤亦可。

【功用】①《奇效良方》：暖子宫，和血气，悦颜色，退风冷。②《准绳·女科》：理气，活血，消积。

【主治】①《普济方》：妇人诸疾。②《奇效良方》：妇人血海虚冷，久无子息；产后败血冲心，中风口噤，子死腹中，堕胎腹中攻刺痛，横生逆产，胎衣不下，血晕血癖，血崩血滞，血入四肢；一应血脏有患，诸种风气，伤风吐逆，咳嗽寒热往来，遍身生疮，头痛恶心，经脉不调，赤白带下，乳生恶气，胎脏虚冷，数曾堕胎，崩中不定，室女经脉不通。

63316　济阴丹

《正体类要》卷下。为《仙传外科集验方》"洪宝丹"之异名。见该条。

63317　济阴丹

【方源】《活人心统》卷三。

【组成】川芎　川归　川萆薢　生地各八钱　赤芍　香附各一两半　陈二艾　小茴香五钱　南木香三钱　刘寄奴五钱　蓬术七钱半

【用法】上为末，米糊为丸，如梧桐子大。每服六十丸，空心白汤送下。

【主治】月水不调，赤白带下，不受孕，肚腹刺痛。

63318　济阴丹

【方源】《摄生众妙方》卷十一。

【组成】赤芍药四两(去芦)　川芎四两(去芦)　生干地黄四两(去苗)　当归四两(去芦)　好大艾叶一斤(去梗)　香附子一斤

【用法】分为四份：一份醋浸，一份童便浸，一份酒浸，一份盐水浸，俱各过一宿，用醋三壶拌匀，以砂锅煮干醋为度，取出晒干，为末，醋打面糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，一日三餐饭前服。

【功用】令人体壮，经调有孕，诸病不作。

63319　济阴丹

《臞仙活人方》卷下。为《本草纲目》卷十五引《产宝》"济阴返魂丹"之异名。见该条。

63320　济阴丹

【方源】《医学正印》卷下。

【组成】益母草四两(酒洗，蒸)　白芍药一两(酒炒)　川芎一两　当归(酒洗)三两　香附一两半(酒炒)　砂仁一两　熟地一两半(酒洗，晒干摘断，姜汁拌渗)　条芩八钱(酒洗，炒)　白术一两(土炒)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，白汤送下。

【功用】济阴安胎。

【主治】胎动不安。

63321　济阴丹

【方源】《玉案》卷四。

【组成】紫菀　麦冬　辽五味各四两　人参二两　知母　青蒿各三两　紫河车二具

【用法】上为细末，以陈荷叶煎汤为丸。每服三钱，空心白滚汤送下。

【主治】酒色过度，怒气伤肝，阴虚火动，咳嗽吐痰，咯血盗汗。

63322　济阴丹

《女科指掌》卷四。为《丹溪心法附余》卷一"返魂丹"之异名。见该条。

63323　济阴丹

【方源】《医略六书》卷二十七。

【组成】熟地五两　人参一两半　当归三两　川芎一两　肉桂一两半(去皮)　干姜一两(炒)　秦艽二两　木香一两　糯米一合(炒)

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三钱，温酒送下。

【主治】久不孕，脉软弦涩者。

【方论选录】气血两亏，寒凝经脉，不能输泄而天癸来迟，久不孕育焉。熟地补血以滋血海，人参扶元以通血脉，当归养血荣经，川芎活血行气，肉桂温经暖血，干姜暖胃散寒，秦艽活血脉以通经，木香调胃气以化气，糯米实土膏以滋营经脉也。炼蜜丸之，温酒下之，使寒滞消散，则血气充盈而经脉调和，天癸无来

迟之患，即久不孕者，尚可图效耳。

63324 济阴丹

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】龙骨一两 黄柏（盐酒炒）三两 当归（酒）一两 熟地二两 锁阳（酒）一两 白芍（酒）一两五钱 牛膝三两 虎胫骨（酥炙）一两 知母（盐炒）二两 陈皮（酒）七钱五分 败龟版（酥制）三两

【用法】上为极细末，羊肉二斤酒煮，捣膏为小丸。每服二钱，淡盐汤送下。

【功用】补肾，养血，生精。

【主治】肾虚精亏，房劳过度，遗精，失眠健忘，筋骨痿弱，骨蒸劳热，腰膝痠软，手足发冷。

【禁忌】忌生冷食品。

63325 济阴汤

【方源】《外科枢要》卷四。

【组成】连翘 山栀（炒） 黄芩 黄连（炒）各一钱 芍药一钱五分 金银花三钱 甘草一钱 牡丹皮一钱二分

【用法】水煎服。

【主治】疮属纯阳，肿痛发热。

【加减】大便秘，量加大黄。

63326 济阴汤

【方源】《衷中参西》卷上。

【组成】怀熟地一两 生龟版五钱（捣碎） 生杭芍五钱 地肤子一钱

【用法】水煎服。

【主治】阴分虚损，血亏不能濡润，小便不利。

【方论选录】以熟地为君；辅以龟版，以助熟地之润；芍药善利小便，以行熟地之滞；少加地肤子为向导药。

63327 济阴散

【方源】《点点经》卷四。

【组成】龙胆汤加天冬 大云各一钱 蒺藜 黄芩 黄柏各一钱 石决 车前 木通各一钱五分 甘草三分

【用法】生石膏三钱为引，水煎服。

【主治】眼目红肿，热泪不干，双珠肿痛，眼角作痒，鼻流臭水，头眩头昏，头肿头痛等症。

63328 济阴煎

【方源】《医略六书》卷二十六。

【组成】川连一钱半 白术一钱半（炒） 木通一钱半 当归三钱 川芎一钱 白芷一钱半 升麻八分 生地五钱 甘草八分

【用法】水煎，去滓温服。

【主治】阴疮。脓汁淋漓，脉数者。

【方论选录】湿热下注阴中，蕴蓄日久不化，故伤于阴内而生疮不愈，脓汁淋漓焉。黄连清热燥湿以降心火，生地滋阴凉血以壮肾水，白术培脾土以制湿，白芷散伏湿以升阳，木通降火利水，甘草缓中解毒，当归养经中之血，川芎行血中之气，升麻升阳明清气以散湿热也。水煎温服，使清升浊降，则湿化热解而阴内肃清，何致日久生疮脓汁淋漓之患者？

63329 济肝散

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】羌活 细辛 菊花 蒺藜

【用法】上研末。麦冬煎汤调下。

【主治】眼泪常出。

63330 济坤丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】紫丹参一两 益智仁一两 木通一两 当归三两 桔梗一两 生地二两 龙胆草二两 远志（炙）五钱 天冬二两 枣仁（炒）二两 麦冬三两 草豆蔻五钱 川楝子四钱 乌药八钱 茯苓二两 白芍二两 于术八钱 健神曲 阿胶（炒珠）五钱 丹皮一两 青木香八钱 藏红花二两 枳壳（炒）一两 橘皮八钱 熟地四两 香附（炙）四钱 稻芽（炒）一两 玄胡索（醋炙）三两 青皮（炒）一两五钱

【用法】上为细粉，过罗，炼蜜为丸。重三钱，朱砂为衣，蜡皮封固。每服一丸，一日二次，黄酒化服；或温开水送下。

【功用】健脾和胃，养血安神。

【主治】妇女经期不准，胸膈不舒，食欲不

振，心跳不眠。

63331　**济坤丸**

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】丹参　丹皮各一两　当归三两　生地二两　熟地四两　桔梗一两　生白芍　天冬　麦冬　延胡(醋制)各二两　木通一两　红花二两　生阿胶　炒枣仁　远志肉(甘草水制)各五钱　川楝子(酒蒸)四钱　陈皮八钱　乌药八钱　炒稻芽一两　泽兰三两　茯苓(去皮)二两　莲子(去心)四两　胆草二两　广木香八钱　蝉蜕一两　草蔻五钱　香附(醋制)四两　枳壳(麸炒)一两　生于术八钱　青皮(醋炒)一两五钱　厚朴(姜制)二两　炒益智仁一两

【用法】上为细粉，炼蜜为丸，四钱重，每斤丸药用朱砂面三钱上衣，蜡皮或蜡纸筒封固。每次服一丸，白开水送下。

【功用】调经养血，健胃安神。

【主治】经期不准，血色紫黑，崩漏带下，腰痠腹疼，心跳不眠，心膈不舒，食欲不振。

【宜忌】孕妇忌服。

63332　**济坤丹**

【方源】《胎产秘书》卷下。

【异名】回生至宝丹。

【组成】川芎　当归　牛膝　蒲黄(酒拌，隔纸炒)　茯苓　桃仁　熟地各一两(九蒸九晒)　三棱　芍药　羌活　橘红　萸肉　灵脂各五钱　木瓜　青皮各七钱　良姜四钱　香附　延胡　苍术　益母各一两　乳香　没药(去油)各三钱　甘草　黄葵子各五钱　乌药(去皮)一两五钱　麝香三钱

【用法】上除木香、乳、没、麝另研入外，余共为细末听用；又以大黄一斤(净)为末，苏木三两，河水五碗，煎三碗，去滓存汁，乌豆三升，水六碗，煎豆汁三碗，去豆；红花三两(炒黄)入好酒四碗，煮四五沸，去花存酒；先将大黄末好醋七碗煮干，再下醋五碗煮干，又下醋三碗，入豆苏、红花酒汁共煎为糊样，取起，其鑊焦亦铲起为末，入煎药和匀，同糊捣为丸，重五钱五分，阴干。每服一丸，酒送下。重者二丸。

【主治】产后十八症。难产；胎衣不下；死胎不下；眼目昏花；口干心闷；寒热如疟；咳嗽，寒热不定；败血如肝；四肢浮肿；失音不语；血邪癫狂妄语；心腹痛；百节痠疼；舌干津枯，鼻中出血，绕顶生疮；腰痛如角攻；小便短缩；喉中蝉声；胸膈气满，喘逆不食。

63333　**济泄丹**

【方源】《医方类聚》卷一〇二引《经验秘方》。

【组成】木香　丁香　信(另研)各一两　粉霜(另研)一钱　五灵脂一两半　肉豆蔻半两　诃子(去油，春四钱半，夏三钱半以上，秋三钱半以下，冬四钱半以上)　硇砂(春三钱半，夏三钱，秋三钱，冬三钱半)

【用法】上为末，好糯米粉煮饼为丸，生朱砂，麝香为衣；大人丸如芥菜子大，小儿丸如菜子大。小儿一岁每服三丸，三岁每服五丸，大小加减服。大人每服一两末加江子末半钱，每服十五丸至二十丸，随汤物送下。

【主治】脾虚积冷，胃脘停寒，食物多伤，不能克化，心下坚满，二胁胀痛，霍乱吐泻，中酒痰逆；小儿五疳八痢，乳食失节，蛔虫上攻，时发潮热，食癖，奶胎疟，食疟；妇人胎前产后血块。

63334　**济艰汤**

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】熟地　当归各一两　山药　玄参各五钱　牛膝三钱　前仁一钱

【主治】因肾虚而噎膈者。

63335　**济艰汤**

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】白术五钱　人参五钱　茯神三钱　菖蒲五分　远志一钱　柏子仁三钱　半夏三钱　天花粉一钱　南星一钱　附子一钱　神曲一钱

【用法】水煎服。

【主治】壮年之人，痰气太盛，一时跌仆，口

作牛马之鸣者，世人所谓牛马之癫也，其实乃虚寒之症，痰入心包也。

63336 济急丹

【方源】《集成良方三百种》卷中。

【组成】人参一两 白术二两 茯苓五钱 当归一两 熟地一两 麦冬一两 半夏三钱 山茱萸五钱

【用法】水煎服。

【主治】卒倒，痰涎壅塞，汗出如雨，手足懈弛不收。

63337 济急饮

【方源】《玉案》卷三。

【组成】紫苏叶

【用法】细嚼，白汤咽下。如此数次即愈。

【主治】飞丝人口，令人口舌生泡。

63338 济急散

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】附子一枚（切下盖，取出肉，纳丁香在内） 丁香四十九枚

【用法】上药用生姜自然汁略浸附子，于瓷瓶中重汤煮之令干，捣罗为细散。每服一钱匕，含化咽津。

【主治】脾胃虚寒，痰饮留滞，呕吐不止。

63339 济神丸

【方源】《千金翼》卷十二。

【组成】茯神 茯苓 桂心 干姜各四两 菖蒲 远志（去心） 细辛 白术 人参各三两 甘草二两（炙） 枣膏八两

【用法】上药治下筛，炼蜜和，更捣万杵，为丸如弹丸大。每含一丸，有津咽之，尽，更含之。若食生冷宿食不消，增一丸。

【主治】积聚结气，呕逆，心腹绞痛，口干，胀，酢咽吐呕。

63340 济腰汤

【方源】《观聚方要补》卷四引《医学集要》。

【组成】破故纸 小茴 玄胡索 牛膝 当归 杜仲 黄柏 知母

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】一切腰痛不可忍者。

63341 济世仙丹

【方源】《集成良方三百种》卷上。

【组成】明雄五钱 火消四钱 白芷一钱 枯矾一两 牙皂五钱 菖蒲五钱 丁香三钱 荜茇三钱 北细辛四钱 苍术五钱 麝香三分 冰片七分 地胡椒三钱（即鹅不食草）

【用法】上为细末，过筛。以此点眼角内；或用姜汤送下一二分；或吹入鼻孔内；或以一二分装入肚脐，外以膏药贴住。

【功用】回阳救逆，起死回生。

【主治】痧症暴死，阴阳脱缩，阴寒证，胸腹积滞，羊毛寒疹，恶心翻胃，霍乱吐泻，气痛血痛，鼻塞头痛，中风中痰，风疳痢疾，山岚瘴气，天行瘟疫，牙关紧闭，人事不知，以及四时不正之气。

63342 济生大丹

【方源】《同寿录》卷四。

【组成】脂麻 黄豆 糯米各一斗（水淘蒸熟，晒干，焙炒） 熟地十斤 黄耆（蜜炙微炒） 山药各五斤 白术三斤

【用法】上为细末，红枣十斤，煮烂去核，同捣烂，炼蜜为丸，每丸重五钱。每服一丸，白汤化下。

【功用】耐饥却病。

63343 济危上丹

【方源】《产育宝庆集》卷上。

【组成】乳香（研） 五灵脂（研） 硫黄（研） 太阴玄精石（研） 陈皮（去白） 桑寄生 真阿胶（炙，捣） 卷柏（生）各等分

【用法】将后四味同研匀，石器内微火上炒，勿令焦，再研极细，后入余药末，用地黄汁糊为丸，如梧桐子大。产后温酒送下二十丸，当归酒亦得。

【主治】产后所下过多，虚极生风，唇青肉冷，汗出目眩，神昏或痰鸣气喘，命在须臾。

【方论选录】《医略六书》：产后真阳上浮，不能通运营血而虚极生风，故痰鸣气喘，势在危笃焉。硫黄补火润躁以壮阳，玄精补血坠热以填阴，乳香活血脉，灵脂破瘀血，阿胶补阴

益血以化虚痰上逆,寄生补肾强腰以摄气喘之不归,卷柏入血分以调营血也。为末,生地汁为丸,务使阴阳相等,则水火既济而营血调和,呼吸如度,何患痰鸣不退,气喘不除。

63344　济阴清露

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】栀子　黄柏　黄连　黄芩

【用法】上为细末,和荷叶上露水,或井花水拌湿,摊碗底,上用艾火覆碗熏之,至烟透药干,刮下,和露水(用蚌壳承月下取水尤妙)浸汁,加纸覆水上挹其清水,点洗眼内,或少呤漱而咽之。

【主治】目赤肿痛甚,怕日羞明不可忍者。

【方论选录】栀子泻心包、三焦火,黄柏泻肾、膀胱火,黄连泻心、肝胆火,黄芩泻肺、大肠火。药甚寒凉,佳在熏以艾火,有阴阳相济之意。

63345　济火延嗣丹

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】人参三两　黄耆半斤　巴戟天半斤　五味子三两　黄连八钱　肉桂二两　当归三两　白术五两　龙骨一两(煅)　山茱萸四两　山药四两　柏子仁二两　远志二两　牡蛎一两(煅)　金樱子二两　芡实四两　鹿茸一具

【用法】上药各为末,炼蜜为丸。每日一两,白滚水送下,不拘时候。

【功用】济火延嗣,心肾两补,延年益寿。

【主治】男子滑精。

【宜忌】服此药,必须坚守三月不战,否则亦不过期月之壮,种子于目前也。

63346　济火养心汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】熟地五至七钱　当归身二至三钱　泽兰叶四至五钱　怀牛膝(酒煮)　茯神　枣仁(炒,研)各一钱三分　远志七分

【用法】煎就加童便一杯合服。或加柏子(去油)一钱。如因恶露未下,败血攻心,加苏木浓煎汁合服。

【主治】产后阴虚火炎,似狂非狂,乃血虚假狂,不得认为实证。

【加减】产后恶露未下,败血攻心,加桃仁(去皮),红花(酒炒)各五六分;如血虚内热,脉滑,舌黄便燥,少加清火之品,如生地、白芍、丹皮、麦冬、淡竹叶之类。

63347　济生回阳散

《本草纲目》卷十七。为《圣济总录》卷二十七"附子回阳散"之异名。见该条。

63348　济生肾气丸

《张氏医通》卷十六。为《济生》卷四"加味肾气丸"之异名。见该条。

63349　济生消毒饮

【方源】《医林绳墨大全》卷八。

【组成】郁金　巴豆　雄黄　黄蜡

【用法】上为丸。每服七丸。

【主治】时行咽痛。

63350　济生莲蕊散

【方源】《回春》卷四。

【组成】莲蕊一两　锦纹大黄　黑牵牛(取头末)各二两二钱　当归　五倍子　矾红各一钱　黄连三钱　乳香　没药各一钱

【用法】上为细末。欲服药,先一日勿吃晚饭,次日空心,用淡猪肉汁一钟、好酒一钟半,和猪肉汁,称前药末一钱二分调服。午后,于净黄土上疏宣时,见出毒物为验,或如烂杏五色相杂,亦为验矣。如散药难服,用酒糊丸,如绿豆大。每服一钱五分。

【主治】痔漏。

【宜忌】忌烧酒、色欲、恼怒及羊、鱼、犬肉发物。

63351　济阳逐火汤

【方源】《点点经》卷一。

【组成】胆草二钱　升麻二钱　柴胡一钱　甘草二钱　生石膏二钱(引)

【用法】水煎服。

【主治】头脑作痛,不拘左右;胃火牙痛。

【备考】此方服后,头痛甚者,切不可畏,火燥则炀,随服必平,须记之。

63352 **济阴大造丸**

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】人参 熟地各一两五钱 当归身二两五钱（酒洗） 麦冬（去心） 天冬（去心） 山药（炒）各一两 五味子五钱 黄柏八钱

【用法】上药各为末。加头胎壮盛紫河车一具，水洗，挑去经络污血净，酒蒸，捣烂人诸药，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，白水、桂圆汤任下，早、晚俱可服。

【主治】妊娠胎气不充；产后日久，肾虚腰痛。

【加减】如脾胃患泻，去黄柏，减地黄，加土炒白术一两。

63353 **济阴化痰饮**

【方源】《喉科紫珍集》卷上。

【组成】小生地三钱 银花 玄参各一钱五分 广皮七分 远志 柴胡各八分 桔梗一钱二分 川贝一钱 赤苓二钱 甘草六分

【用法】水煎服。投五七剂，兼用吹散可愈。

【功用】济阴化痰。

【主治】阴虚火灼，忧思郁虑，致成喉证。

63354 **济阴地黄丸**

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】五味子 麦门冬 当归 熟地黄 肉苁蓉 山茱萸 干山药 枸杞子 甘菊花 巴戟肉各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心白汤送下。

【主治】足三阴亏损，虚火上炎，致目睛散大，视物不清，昏花涩紧，作痛畏明；或阴虚火燥，唇裂如茧。

【备考】本方方名，《丸散膏丹集成》引作“济阴丸”。

63355 **济阴百补丸**

【方源】《医便》卷四。

【组成】当归（酒洗，晒干）六两 熟地（酒洗）一钱 香附子一斤（分四制：醋、酒、童便、盐水各浸三日，炒干） 白芍药（酒炒）一钱 川芎一钱 益母草（五月五日采者佳，忌铁，净末）半斤 甘草（炙）一两 白茯苓（去皮）三两 玄胡索（炒）二两 人参（去芦）二两 木香（不见火） 白术（土炒）各四两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，渐加至八九十丸，空心米汤、酒任下。

【功用】调脾胃，补虚损。

【主治】女人劳伤，气血不足，阴阳不和，作寒作热，心腹疼痛，胎前产后，诸虚百损。

63356 **济阴至宝丹**

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】当归（酒洗）一钱 白芍（酒洗）八分 白茯苓（去皮）八分 白术（去芦）一钱 陈皮八分 知母八分（生用） 贝母八分（去心） 香附（便制）八分 柴胡（酒炒）三分 薄荷三分 地骨皮（去皮）八分 甘草三分 麦门冬（去心）八分

【用法】上锉一剂。用煨生姜三片，水煎，温服。

【功用】调经水，滋血脉，补虚劳，扶元气，健脾胃，养心肺，润咽喉，清头目，定心悸，安神魂，退潮热，除骨蒸，止喘嗽，化痰涎，收盗汗，止泄泻，开郁气，利胸膈，疗腹痛，解烦渴，散寒热，祛体疼。

【主治】妇人诸虚百损，五劳七伤，经脉不调，肢体羸瘦。

63357 **济阴回春饮**

【方源】《慈航集》卷四。

【组成】赤鲜首乌一两（打碎） 当归八钱 白芍八钱（酒炒） 甘草一钱二分 莱菔子五钱（炒，研） 车前子五钱 枳壳二钱（炒） 陈皮一钱五分 煨广木香一钱五分

【主治】痢疾误药伤阴，卧床不起，舌苔中间焦黑，四边红赤，昼夜痢下无度。

【加减】如腹胀下坠，加槟榔一钱五分。

【宜忌】此方一服痢轻，再服痢又轻，胃气亦开，病人想吃之物，即与之食，但不可过多。

63358 **济阴寿子饮**

【方源】《胎产心法》卷上。

【组成】人参一钱　当归身(土炒)　熟地(择顶大枝头无灰者,酒拌,九蒸九晒)　白术(土炒)各二钱　川芎八分　紫苏　陈皮　炙草各四分

【用法】加大枣一枚,水煎,食远温服,滓再煎服,不拘时候。

【功用】大益胎元,济阴寿子,稀疮痘。

【加减】弱者,人参倍用之;虚肥人,陈皮去白,加蜜炙黄耆五分;泄泻,加莲子(去心)十枚,带皮砂仁三分,减地黄;多怒,加木香二分,磨冲药服;口躁,加去心麦冬一钱;怔忡,加炒枣仁一钱,益智仁一钱,龙眼肉十枚。

63359　济阴返魂丹

【方源】《本草纲目》卷十五引《产宝》。

【异名】返魂丹(《袖珍》卷四引《圣惠》)、秘方益母丸(《玉机微义》卷四十九)、益母丸(《普济方》卷三五六)、济阴丹(《臞仙活人心方》)、益母草丸(《校注妇人良方》卷二十)。

【组成】野天麻(即茺蔚子也。花正开时,连根收采,阴干,用叶及花子,忌铁器)

【用法】以石器研为细末,炼蜜为丸,如弹子大。随证嚼服,用汤使;其根烧存性为末,酒服。其药不限丸数,以病愈为度;或丸如梧桐子大,每服五七十丸;又可捣汁滤净,熬膏服之。胎前脐腹痛或作声者,米饮送下;胎前产后,脐腹刺痛,胎动不安,下血不止,当归汤送下;产后,以童子小便化下一丸;胎衣不下,及横生不顺,死胎不下,经日胀满,心闷心痛,炒盐汤送下;产后血运,眼黑血热,口渴烦闷,如见鬼神,狂言不省人事,以童子小便和酒化下;产后结成血块,脐腹奔痛,时发寒热,有冷汗,或面垢颜赤,五心烦热,用童子小便、酒送下,或薄荷自然汁送下;产后恶露不尽,结滞刺痛,上冲心胸满闷,童子小便、酒送下;产后泻血水,以枣汤送下;产后痢疾,米汤送下;产后血崩漏下,糯米汤送下;产后赤白带下,煎胶艾汤送下;月水不调,温酒送下;产后中风,牙关紧急,半身不遂,失音不语,童便、酒送下;产后气喘咳嗽,胸膈不利,恶心吐酸水,面目浮肿,两胁疼痛,举动失力,温酒送下;产后月内咳嗽,自汗发热,久则变为骨蒸,童便、酒送下;产后鼻衄,舌黑口干,童便、酒送下;产后两太阳穴痛,呵欠心忪,气短羸瘦,不思饮食,血风生热,手足顽麻,百节疼痛,米饮化下;产后大小便不通,烦躁口苦者,薄荷汤送下;妇人久无子息,温酒送下。

【功用】安魂定魄,调顺血气,破血痛,养脉息,调经络。

【主治】妇人胎前产后诸疾危证。

63360　济阴返魂丹

【方源】《医统》卷八十五。

【组成】益母草八两(端午日或小暑日收采,连根置透风处阴干,用时以手摘去根,不犯铁器,石臼捣烂,磨罗为细末听用)　川当归七钱　赤芍药六钱　南木香五钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,好酒、童便各半化下;或丸如梧桐子大,酒、便各半吞三十丸。凡产仓卒未合,只生用益母草捣烂,绞汁入蜜少许服之。

【主治】横生逆产,胎前产后一切诸证。

63361　济阴承气汤

【方源】《会约》卷五。

【组成】大黄(或煨或生)二三钱　枳实(面炒)一钱　当归一钱半　厚朴一钱　生地　白芍各一钱　丹参二钱　陈皮　甘草各五七分

【用法】水煎服。

【功用】攻补兼施,济阴承气。

【主治】瘟疫,体弱血虚者。

63362　济阴保元汤

【方源】《纲目拾遗》卷三引《医铃》。

【组成】滇珍参三钱　苡米仁四钱(拌水蒸透,咀片,再入姜,加米仁汁蒸,晒干)　怀生地一两(砂仁、酒、姜三味拌蒸,九晒,收,再以瓦焙为炭)　当归四钱　白芍三钱(酒炒)　川芎二钱(去净油,米泔水浸洗,收干,再入酒浸)　丹参四钱(酒洗透)　茺蔚子四钱(酒蒸透)　香附三钱(以姜、土、醋、盐、童便、甘草

水、乳汁逐次制过） 云白术五钱(陈土炒) 女贞子三钱(以白芥、车前水浸，干用)

【功用】疏肝调经，济阴保元。

【主治】妇人经血不调。

【加减】如气血热，加丹皮、生地；气血寒，加肉桂数分；经闭，加牛膝。

63363 济阴浚泉丸

【方源】《会约》卷二。

【组成】熟地八两 枣皮四两(去核，酒蒸) 淮药四两(微炒) 丹皮二两五钱 茯苓四两 泽泻一两半 枸杞三两(酒蒸) 上肉桂二三两

【用法】加真龟版胶三四两，水、酒蒸化合，炼蜜为丸。

【主治】阴虚劳热，骨蒸喉痛，尿赤夜躁。

【宜忌】远房室，调饮食，一切损神耗力之事务宜切戒。

【加减】如精滑自遗者，加杜仲(盐烧)三两，补骨脂(酒炒)二两，胡桃肉三两；如火炎肺咳，加麦冬三两，款冬花三两；如火灼肺而痰臭者，加白及三两。

63364 济坤大造丸

【方源】《产科心法》引丹溪方。

【组成】紫河车一具(制) 人参一两(切片，焙干，研细和入) 天冬(去心) 麦冬(去心) 当归 淮牛膝 山药各一两 熟地四两 杜仲(姜汁同盐炒) 黄柏 五味子各五钱

【用法】上药各为末，同紫河车捣匀为丸。

【功用】益气血，补子宫，种子。

【主治】气血本虚，不能摄元成孕；或频堕胎，及生子不寿；成孕后虚热自汗，食少带多。

【加减】如虚弱多汗，加黄耆二两(蜜炙)，地骨皮、知母各一两；如脾胃虚，常大便溏泻，加白术二两，莲子二两(俱炒)；如少睡惊悸者，血少也，加炒枣仁、桂圆肉各二两。

63365 济艰催挽汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】熟地二两 山药一两 当归二两 牛膝三钱 玄参一两 车前子一钱

【用法】水煎服。一日一剂。

【功用】纯补精血，通畅上下。

【主治】精血津液不足之噎膈翻胃。

63366 济阴孕阳封汗煎

【方源】《寒温条辨》。

【组成】当归三钱 熟地八钱 人参二钱(桂圆肉合人乳蒸，取汁入药) 赤石脂三钱(盐水炒) 代赭三钱(火煅，盐水淬，蜜合饴糖煎共一杯)

【用法】水三升，先煎诸药浓，后入蜜糖调匀，温服。

【主治】温病下后，证见额上汗出而喘，及头汗出而小便自利，甚或额头汗出如贯珠。

洋

63367 洋参麦冬汤

【方源】《笔花医镜》卷二。

【组成】洋参 麦冬 当归各二钱 生地三钱 白芍 丹参 钗石斛各一钱五分 犀角 甘草各五分

【主治】心经虚热而痛者。

63368 洋参保肺丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】米壳四两(折膏一两八分) 杏仁(去皮，炒)二两 橘皮二两 枳壳(炒)二两 甘草二两 玄参(去芦)二两 川贝母二两 五味子(炙)一两 麻黄一两 生石膏一两 砂仁一两

【用法】上为细末，过罗；如用米壳膏，改用细粉十六两，加米壳膏一两八分。每二十两细粉兑洋参面一两五钱。上药混合均匀，炼蜜为丸，重二钱；如用米壳膏每丸改重一钱七分，蜡皮封固。每服二丸，一日二次，温开水送下。

【功用】滋阴补肺，止咳定喘。

【主治】劳伤久嗽，肺气虚弱，咳嗽痰喘，春秋必犯，睡卧不安。

63369 洋参保肺丸

【方源】《全国中药成药处方集》(兰州方)。

【组成】生地 酒地 玄参 百合 白芍 杏仁 冬花 桔梗 粉草各二两 寸冬 当归各三两 荷梗 贡胶各一两 西洋参三钱

【用法】上为细末,炼蜜为大丸,三钱重,蜡皮封固。每服一丸,开水送下。

【功用】润肺止咳。

【主治】肺虚咳嗽,气喘咳嗽,老年体虚咳嗽,痰中带血。

63370 **洋参保肺丸**

【方源】《全国中药成药处方集》(大同方)。

【组成】白术 党参各四两 云茯苓二两 陈皮 厚朴各四两 橘红三两 冬花二两 寸冬三两 天冬二两 紫菀三两 洋参一两四钱 知母 杏仁各二两 百合六两 麻黄 生草各二两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,朱衣蜡皮。每服三钱,开水送下。

【功用】扶助元气,祛痰理气。

【主治】肺虚久喘。

63371 **洋糖百解饮**

【方源】《医钞类编》卷十五。

【组成】白糖五钱

【用法】阴症,葱汤送下;阳症,百沸汤送下;暑症并中热,中暍,新汲水送下;虚症,米汤送下;实证,陈皮汤送下;伤食,山楂汤送下;结胸,淡盐汤送下;蛔厥,乌梅花椒汤送下;紧沙腹痛,新汲水送下;血崩,锅脐煤汤送下。

【主治】瘟疫并伤寒。

浑

63372 **浑元汁**

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】紫河车(不拘男女,初胎尤妙)

【用法】将紫河车入新瓦罐内,封固其口,上以碗覆,埋于土中,久则化而为水是也。气虚甚者,人参、紫草煎浓汤冲入服之。

【主治】气虚血热,痘色红紫,干枯黑陷。

63373 **浑元散**

【方源】《麻疹全书》。

【异名】天元浑元散。

【组成】天麻三钱 地龙(用甘草水洗过,再加滑石粉同炒,去粉用)一钱 人中白一钱 兔白一钱五分 神曲一钱 鳖木(即千金木凿柄是也)一钱五分 辟温丹八分。

【用法】大寒节用露天七夕,再要雪压七夕,共研细末,收贮完固。如麻疹初潮不现及抽搐直视,用此钱许。

【主治】麻疹。

63374 **浑元散**

【方源】《赤水玄珠》卷二十八。

【组成】紫河车一具(分作五七块)

【用法】用白糯米三合,水淘净,入无油铫内同炒,以米黄色为度,同为末。每用五七分,儿大者一钱。

【功用】极补气血,助痘灌浆。

【主治】小儿气血俱虚,痘灰白色,不灌脓回浆者。

63375 **浑金丹**

【方源】《幼幼新书》卷十六引茅先生方。

【组成】巴豆粉(不出油) 砒霜末 白丁香末各等分

【用法】上为末,用皂角揉水浓煎膏相合为丸,如绿豆大。每服三丸至五丸,用鲫鱼淡煎汤吞下。掠出涎。

【主治】小儿鮈鮐嗽。

63376 **浑金丹**

【方源】《幼幼新书》卷十六引《惠眼观证》。

【组成】黄丹 信砒末各抄二钱 飞罗面(炒)一钱

【用法】上为极细末,滴水为丸,如黍大。每服三丸,用糖冷水五更初吞下。如天明不吐,再进一二丸,小儿服一丸。

【主治】大人,小儿鮈鮈咳嗽。

63377 **浑身碎痛丸**

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】虎骨 防风 芍药(酒炒) 秦艽

白芷 茯苓各一两 川归 续断 白术各一两 附子（炮）七钱

【用法】上为末，酒为丸，如梧桐子大。每服七十丸，白汤送下。

【主治】诸虚，遍身碎痛。

63378 浑身碎痛饮子

【方源】《奇效良方》卷六十三。

【组成】虎骨五铢 防风 藁本 甘草 白芷 茯苓各二铢 当归 芍药 续断 白术 附子各三铢

【用法】上为粗末。生姜大枣煎服，不拘时候。

【主治】妇人劳倦。

【方论选录】《济阴纲目》：主浑身之经络者，肝也；而肝所以藏血以荣周身之筋，则一身之碎痛，当以肝为主，而生血之本以脾为主，为脾统诸经之血也。防风行肝气于周身，白芷行阳明于血海，甘、术益中土以生血，归、芍荣肝木于周身，附子温内而通所不通，藁本行上而散至巅顶，茯苓渗下而内达九渊，虎骨、续断其搜筋骨诸邪而定痛者欤。其曰治劳倦者，必每因劳倦而浑身痛者也。

津

63379 津调散

【方源】《三因》卷十五。

【组成】黄连 款冬花各等分

【用法】上为末。以地骨皮、蛇床子煎汤洗，用软帛挹干，以津调药敷之。

【主治】妬精疮，脓汁淋漓，臭烂者。

【宜忌】忌用生汤洗之。

【备考】《普济方》有麝香少许。

将

63380 将军丸

【方源】《袖珍》卷二。

【组成】锦纹大黄（九蒸，晒，焙） 麝香一钱（研） 管仲（炒） 牙皂（去皮，醋炙） 桃仁（去皮，炒） 槟榔 雷丸各一两 芜荑半两 鳖甲（醋炙黄）一两

【用法】上为末。先将蒿叶二两，东边桃、柳枝、桑叶各七片，水一碗，煎七分，去滓，入蜜一大盏，再熬成膏，入前药末及麝香、安息香捣，丸如梧桐子大。每服三十丸，食前枣汤送下。

【主治】传尸劳瘵。

63381 将军饮

《古今医鉴》卷五。为《保命集》卷中“大黄汤”之异名。见该条。

63382 将军蛋

【方源】《种福堂方》卷二。

【组成】生大黄三分 生鸡子一个

【用法】将鸡子顶尖上敲损一孔，入大黄末在内，纸糊煮熟。空心食之。

【主治】赤白浊；梦遗。

63383 将军散

【方源】《点点经》卷二。

【组成】大黄 朴消各三钱 桃仁一钱 乌药一钱半 香附一钱半 羊藿一钱 甘草八分

【主治】酒痢，二便不通。

63384 将军散

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】大黄（煨） 贝母 白芷 甘草节各等分

【用法】上为末。酒调，空心服。

【主治】悬痈。

【加减】虚弱者，加当归一半。

63385 将军散

【方源】《古今医鉴》卷十三。

【组成】川大黄（酒浸，蒸）五钱 荞麦面（炒黄）三钱 阿魏一钱

【用法】上为细末。每服三分，烧酒调服。

【主治】癖疾。

63386 将军散

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】大黄（微炒） 黄芩 黄耆（炙）各一两 赤芍 玄参 丹参 山茱萸（去核）

蛇床子各五钱

【用法】上为末。每服二钱,食前温酒调下。

【主治】妇人阴痒,是虫蚀,微则为痒,重则痛。

63387　**将军散**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】远年石灰二两　大黄一两

【用法】同炒至石灰桃花色,去大黄用石灰,加血竭五钱,为末。

【主治】刀伤。

63388　**将军膏**

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】大黄

【用法】上为末。生姜汁调,敷患处。

【主治】伤损肿痛,不消之瘀血流注紫黑,或伤脸上青黑。

63389　**将军久战丸**

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】大黄不拘多少(拌九次,蒸九次,以黑为度,晒干)

【用法】上为末,水为丸。每服五十丸,临卧时白水送下。

【主治】痰火所致之头目眩晕。

63390　**将军复战丹**

【方源】《纲目拾遗》卷三引《张云野琐记》。

【组成】山芝麻二十两(童便浸四次,烧酒浸三次,略炒)　乳香(炙,去油)　没药(炙,去油)各三两　血竭(煨)二两

【用法】上为极细末。火酒送下四分,随食白煮猪肉压之。如持斋者,食白腐干。

【主治】跌打损伤。

【宜忌】服药后,切记避风。

63391　**将军铁箍散**

《种福堂方》卷四。为《普济方》卷二七二引《德生堂方》"将军铁箍膏"之异名。见该条。

63392　**将军铁箍膏**

【方源】《普济方》卷二七二引《德生堂方》。

【异名】将军铁箍散(《种福堂方》卷四)。

【组成】南星一两　草乌三钱　川乌五钱　雄黄三钱　大黄一两　盐霜白梅一两　苍耳根一两　白及　防风　白蔹各五钱

【用法】上为细末。先用苍耳根、盐梅捣烂,和余药调成膏;如干,入醋调得所。于疮四围用药作铁箍涂上,只留疮高突处。药干,以鸡翎蘸水扫之,一日换二三次。

【主治】诸疮,恶毒疮,红肿突起。

63393　**将军百战百胜膏**

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】大黄　白芷各二两　三棱　莪术各一两　木鳖子十个　蜈蚣十条　穿山甲十五片　巴豆一百五十个　蓖麻子一百五十个　栀子五个　黄连五钱　槐柳条三百寸

【用法】香油二斤,入药熬黑色,去滓滤净;再人黄丹一斤,熬至点水成珠;再加血竭五钱,芦会五钱,天竺黄五钱,轻粉五钱,阿魏五钱,麝香五分,胡黄连二钱,硼砂二钱,为末,下油中。贴癖。

【主治】积癖。

前

63394　**前甲散**

【方源】《直指小儿》卷四。

【异名】炙甲散(《得效》卷十二)。

【组成】穿山甲(前膊鳞,炙焦)

【用法】上为细末。麻油、轻粉调敷。

【主治】小儿眉丛中生疮,名曰炼银癣。

63395　**前朴散**

《小儿病源》卷三。为《圣惠》卷八十四"前胡散"之异名。见该条。

63396　**前胡丸**

【方源】《外台》卷九引《深师方》。

【组成】前胡六分　乌头(炮)二枚　桔梗　干姜各二分　桂心八分　蜀椒八分(汗)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如樱桃大。每用一丸含化,稍咽之,一日三次。

【主治】新久咳嗽,昼夜不得卧,咽中水鸡声,欲死者。

【宜忌】忌猪肉、冷水、生葱。

63397 前胡丸

【方源】《外台》卷八引《广济方》。

【组成】前胡 白术 甘草（炙）各五分 旋覆花 豆蔻仁各三分 人参 麦门冬（去心）各六分 枳实（炙） 大黄各四分

【用法】上药治下筛，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空肚以酒送下，渐加至三十丸，一日二次。

【主治】心头痰积宿水，呕逆不下食。

【宜忌】忌桃李、雀肉、海藻、菘菜、热面、炙肉、鱼、蒜、粘食、生冷等物。

63398 前胡丸

【方源】《圣惠》卷三。

【组成】前胡三分（去芦头） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 黄芩三分 沙参三分（去芦头） 犀角屑三分 蔓荆子三分 栀子仁三分 瓜蒌根一两 车前子三分 麦门冬一两（去心，焙） 川升麻一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后用温浆水送下。

【主治】肝脏壅热，心胸烦躁，头目不利，多渴，体热。

63399 前胡丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】前胡一两（去芦头） 旋覆花半两 槟榔一两 川大黄一两（锉碎，微炒） 牛蒡子一两（微炒） 皂荚三分（去皮，涂酥炙令焦黄，去子） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 赤茯苓一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以荆芥、薄荷汤送下，不拘时候。

【主治】脾脏风壅，胸膈气滞，痰涎烦闷，神思昏浊。

63400 前胡丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】前胡一两（去芦头） 木香三分 枳实三分（麸炒微黄） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襕） 诃黎勒一两（煨，用皮） 桂心三分 槟榔三分 半夏三分（汤浸七遍去滑，微炒） 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 赤茯苓一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以生姜、橘皮汤送下，不拘时候。

【主治】气劳。心胸噎塞，不下食，渐加羸瘦。

【宜忌】忌苋菜。

63401 前胡丸

【方源】《圣惠》卷三十。

【组成】前胡一两（去芦头） 旋覆花半两 人参三两（去芦头） 槟榔一两 木香半两 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 诃黎勒皮一两 赤茯苓三分 桑根白皮三分（锉） 郁李仁一两（汤浸，去皮尖，微炒） 桂心半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎生姜、大枣汤送下，一日三次。

【主治】虚劳，四肢浮肿，心胸满闷，不欲饮食。

63402 前胡丸

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】前胡一两（去芦头） 川大黄三分（锉碎，微炒） 白术三分 旋覆花半两 肉豆蔻二分（去壳） 人参三分（去芦头） 麦门冬一两（去心，焙） 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，热酒送下，不拘时候。

【主治】痰结，心胸积滞，气不宣散，饮食不下。

63403 前胡丸

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】前胡一两（去芦头） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 桂心一两 草豆蔻一两（去壳） 高良姜一两（锉） 干姜半两（炮裂，锉） 赤茯苓一两 吴茱萸一两（汤浸七遍，焙干，微炒） 赤芍药一两 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 川大黄二两（锉碎，微炒）

杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以生姜汤送下,不拘时候。

【主治】胸胁支满,背上时寒,腹胀多噫,醋咽气逆。

63404　**前胡丸**

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】前胡半两(去芦头)　赤芍药半两　桔梗半两(去芦头)　赤茯苓半两　鳖甲一两(涂醋炙令黄,去裙襕)　枳壳半两(麸炒微黄,去瓤)　川大黄半两(锉碎,微炒)　郁李仁半两(汤浸,去皮,微炒)　当归半两(锉,微炒)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如绿豆大。三岁儿每服五丸,空心以粥饮送下。

【主治】小儿癖气腹痛。

63405　**前胡丸**

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】前胡(去芦头)　白术　枳壳(去瓤,麸炒)　半夏(汤洗七次,去滑)　赤茯苓(去黑皮)　人参各三分　白矾半两(枯)　丁香一分

【用法】上为末,枣肉为丸,如梧桐子大。每服二十丸,煎生姜、竹茹汤送下,食后服。

【主治】风头旋。风痰不散,食逆呕吐。

63406　**前胡丸**

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】前胡(去芦头)二两　大黄(锉,炒)　黄芩(去黑心)　木通(锉)　麻子仁　芍药各一两一分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如豌豆大。每服十五丸,食前温水送下。

【功用】润利肠胃。

【主治】风秘。心烦腹满,便秘不通。

63407　**前胡丸**

【方源】《圣济总录》卷三十七。

【组成】前胡(去芦头)　赤茯苓(去黑皮)　芍药　枳壳(去瓤,麸炒)　黄芩(去黑心)各半两　大黄一两(生)　大麻仁一两半(细研)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十丸,午食前以米饮及浆水送下,令溏利为度;不利,加至十五丸。

【主治】疟气急黄并痢。

【加减】有痃癖者,加虻虫(去翅足,炒)二十枚,黄耆(薄切)、天门冬(去心,焙)各一两,鳖甲(去裙襕,醋炙)、生干地黄(焙)各二两,赤茯苓(去黑皮)、人参各半两。

63408　**前胡丸**

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】前胡(去苗)一两一分　葶苈(隔纸炒紫色,研如膏)　巴豆(去皮心,研)各三分　大黄(锉,炒)一两一分　甘遂(炒)　墨(炙)各半两

【用法】上六味,除葶苈、巴豆外,为末,再研匀,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三丸,空腹粥饮送下。吐利痰涎为度。若吐利多,即减丸数,三日一服。

【主治】上气呀嗽,喉中如水鸡声。

63409　**前胡丸**

【方源】《圣济总录》卷九十。

【组成】前胡(去芦头)　人参　白茯苓(去黑皮)　桂(去粗皮)　陈橘皮(汤浸,去白,焙)白术各一两半　杏仁(去皮尖双仁,入麸炒,研)　槟榔(锉)各二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,温酒送下,一日二次。

【主治】虚劳。胸膈痞闷,气逆烦满,胁肋虚胀。

63410　**前胡丸**

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【异名】补胆丸(《普济方》卷七十七引《龙木论》)。

【组成】前胡(去芦头)　人参　马兜铃　赤茯苓(去黑皮)各一两半　桔梗(炒)　细辛(去苗叶)　柴胡(去苗)　玄参各一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,米汤送下。

【功用】补胆。

【主治】眼痒难任。

【备考】本方改为汤剂，名"补胆汤"（见《银海精微》）。

63411 **前胡丸**

《圣济总录》卷一七〇。为《外台》卷三十五引《小品方》"一物前胡丸"之异名。见该条。

63412 **前胡丸**

【方源】《圣济总录》卷一七六。

【组成】前胡（去苗） 人参 半夏（汤浸去滑七遍，切，焙） 白术各一两 丁香一分

【用法】上为细末，生姜自然汁煮面糊为丸，如绿豆大。每服五丸至七丸，食后、临卧生姜汤送下。

【功用】调顺胃气，进益饮食。

【主治】小儿咳逆上气，喘满气促。

63413 **前胡汤**

【方源】《外台》卷七引《深师方》。

【组成】前胡一两 羊脂二两 大枣二十枚 当归一两 茯苓一两 白术一两 芍药六分 桂心一两 半夏二两 干姜一两 麦门冬六分（去心） 吴茱萸三百粒

【用法】上切。以水八升，煮取三升，分三服，相去如人行十里进一服。

【主治】久寒冷，胸膈满，心腹绞痛，不能食，忽气吸吸不足。

【宜忌】忌酢物、生葱、羊肉、饧、桃李、雀肉等。

63414 **前胡汤**

【方源】《外台》卷二十一引《删繁方》。

【组成】前胡 秦皮 细辛 栀子仁 黄芩 升麻 蕤仁 决明子各三两 芒消三两 苦竹叶（切）一升 车前草（切）一升

【用法】上切。以水九升，煮取三升，去滓，纳芒消，分为三服。

【功用】泻肝。

【主治】肝实热目痛，胸满急塞。

【方论选录】《千金方衍义》：肝热而见胸满气急，火邪内蕴之兆。火性上炎而害空窍，所以目痛。故用前胡、决明、蕤仁专祛肝窍之风，升麻、细辛、黄芩开发上盛之热，芒消、栀子、苦竹、车前疏泄内蕴之火，秦皮苦燥，专主肝胆湿热，且为目痛要药。

63415 **前胡汤**

《外台》卷二十六引《删繁方》。为原书卷十六"前胡吐热汤"之异名。见该条。

63416 **前胡汤**

【方源】《外台》卷八引《延年方》。

【组成】前胡三两 枳实（炙） 细辛 杏仁（去皮尖，碎） 芎䓖 防风 泽泻 麻黄（去节） 干姜 芍药各三两 茯苓（一作茯神） 生姜各四两 桂心 甘草（炙）各二两

【用法】上切。以水九升，煮取二升六合，分三服，微汗。

【主治】胸背气满，膈上热，口干，痰饮气，头风旋。

【宜忌】忌生冷、油滑、猪牛肉、面、海藻、菘菜、生葱、生菜、酢物。

63417 **前胡汤**

【方源】《千金》卷十三。

【组成】前胡 甘草 半夏 芍药各二两 黄芩 当归 人参 桂心各一两 生姜三两 大枣三十枚 竹叶一升

【用法】上㕮咀。以水九升，煮取三升，分四服。

【主治】胸中逆气，心痛彻背，少气不食。

【方论选录】《千金方衍义》：胸痹多由寒热之邪痹着心下。故专取前胡之祛风下气，参入桂枝汤中，更加半夏以涤痰，参、归以助气血，竹叶以泄风热旺气也。

63418 **前胡汤**

【方源】《千金》卷十三。

【组成】前胡 人参 生姜 麦门冬 饧 半夏 甘草 芍药 茯苓各三两 桂心 黄芩 当归各一两 大枣三十枚

【用法】上㕮咀。以水一斗四升，煮取三升，去滓，分为三服。

【主治】胸中逆气，心痛彻背，少气不食。

63419 **前胡汤**

【方源】《千金》卷十六。

【组成】前胡 生姜各二两 甘草 朴消各二两 大黄(别浸)二两 茯苓 麦门冬 当归 半夏 芍药 滑石 石膏 栝楼根 黄芩 附子 人参各一两

【用法】上㕮咀。以水一斗二升,煮取六升,分四服。

【主治】寒热呕逆少气,心下结聚,膨亨满,不得食,寒热消渴。

【方论选录】《千金方衍义》:寒热呕逆,故用前胡、黄芩、半夏、生姜;少气,故用参、苓、归、芍、甘草、附子;心下坚满不得食,故用消、黄;渴,故用麦冬、栝楼、滑石、石膏。寒热补泻之法,萃于一方矣。

63420 **前胡汤**

【方源】《千金》卷十八。

【组成】前胡三两 黄芩 麦门冬 吴茱萸各一两 生姜四两 大黄 防风各一两 人参 当归 甘草 半夏各二两 杏仁四十枚

【用法】上㕮咀。以水一斗,煮取三升,去滓,分三服。

【主治】胸中久寒,澼实隔塞,胸痛,气不通利,三焦冷热不调,食饮损少无味,或寒热身重,卧不欲起。

【加减】《千金》注文引《深师方》:若胁下满,加大枣十二枚。

63421 **前胡汤**

【方源】《千金翼》卷二十二。

【组成】前胡 芍药 黄芩 大黄 甘草(炙)各二两 大枣二十枚(擘)

【用法】上㕮咀。以水八升,煮取二升五合,分三服。

【主治】石发,头痛,胸胀满,或寒或热,手足冷,或口噤,或口烂生疮干燥,恶闻食气。

【加减】若心胁坚满,加茯苓三两;胸满塞,加枳实一大两(炙);连吐,胸中冷,不饮食,加生姜三两;胃虚口燥,加麦门冬三两(去心)。

63422 **前胡汤**

【方源】《外台》卷三引《广济方》。

【组成】前胡一两 麦门冬三两(去心) 竹茹二两 橘皮一两 甘草一两(炙) 生姜二两 生地黄四两(切)

【用法】上切。以水七升,煮取二升三合,绞去滓,分温三服,如人行六七里,进一服。

【主治】天行恶寒壮热,食则呕逆。

【宜忌】忌海藻、菘菜、芜荑、热面、猪犬肉、油腻。

63423 **前胡汤**

【方源】《外台》卷三引《广济方》。

【组成】前胡 升麻各八分 贝母 紫菀各六分 石膏十二分(碎,绵裹) 麦门冬八分(去心) 杏仁三十枚(去皮尖双仁) 竹叶(切)一升 甘草二分(炙)

【用法】上切。以水八升,煮取二升五合,绞去滓,分温三服,相去如人行六七里进一服。不吐利愈。

【主治】天行壮热咳嗽,头痛心闷。

【宜忌】忌海藻、菘菜、油腻、猪、鱼等。

【加减】《圣惠》加地骨皮一两,名"前胡散"。

63424 **前胡汤**

【方源】《外台》卷三十八。

【组成】前胡 黄芩 甘草(炙) 茯苓各二两 栀子仁 枳实(炙) 大黄各一两 杏仁六十枚(去皮尖) 生姜三两(切)

【用法】上切。以水九升,煮取二升半,分服。

【功用】下气除热。

【主治】①《外台》:石发,内热结不除。②《圣济总录》:乳石发动,气上不得食,呕逆,大小便不通,气满烦闷。

63425 **前胡汤**

【方源】《幼幼新书》卷十七引《婴孺方》。

【组成】前胡 黄芩 升麻各四分 细辛 甘草 芍药各三分 大黄 常山各二分

【用法】以水一升六合煎，分为四服，日三夜一。

【主治】小儿时气兼疟。

63426 **前胡汤**

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】前胡二两（去芦头） 赤茯苓二两 白术二两 川大黄一两（锉碎，微炒） 赤芍药一两 枳实一两（麸炒微黄） 木通一两（锉） 半夏一两（汤洗七遍去滑） 厚朴二两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 甘草一两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓，不拘时候温服。

【主治】伤寒七日，发热，汗出不解，心中痞坚。

63427 **前胡汤**

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】前胡一两（去芦头） 半夏一两（汤洗七遍去滑） 白术一两 枳实一两（麸炒微黄） 赤芍药一两 黄芩一两 甘草半两（炙微赤，锉） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】伤寒九日不解，心腹坚满，身体疼痛，内外有热，烦呕不安。

63428 **前胡汤**

【方源】《伤寒微旨论》卷上。

【组成】前胡一两 石膏二两 豆豉（熬焦）三合 桔梗三分 甘草半两

【用法】上为末。每服三钱，水一盏，生姜一块如枣大（擘破），同煎至七分，去滓热服。依前热未解，每服入豆豉三十粒，水一盏半，同煎至八分，去滓热服。

【主治】伤寒，病人脉浮数，或紧或缓，其脉上出鱼际，寸脉力大于关脉，发热冒闷，口燥咽干，清明以后至芒种以前得者。

63429 **前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】前胡（去芦头）半两 木通（锉）一分 赤茯苓（去黑皮）半两 桔梗（去芦头，切，炒）半两 枳壳（去瓤，麸炒） 旋覆花（微炒）各一分 半夏（汤浸洗七遍，入生姜一两同捣，炒）半两 升麻半两 麦门冬（去心，焙）半两 甘草（炙）一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，以水一盏半，入生姜一枣大（拍碎），同煎至一盏，去滓，空心、日午、临卧温服。

【主治】首风。每发胸膈满闷，吐逆痰涎，饮食不下。

【备考】《普济方》有白菊半两，细辛一分。

63430 **前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】前胡（去芦头） 旋覆花 黄耆（薄切） 防己 桂（去粗皮） 竹茹 防风（去叉）各三分 甘草（炙，锉）半两 赤茯苓（去黑皮） 石膏（研碎）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，早、晚食后、临卧温服。

【主治】风头眩，饮食不下。

63431 **前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】前胡（去芦头） 柴胡（去苗） 羌活（去芦头） 芎䓖 人参 枳壳（去瓤，麸炒） 甘草（炙，锉） 芍药各半两 麻黄（去根节，汤煮，掠去沫，焙）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入葱白三寸，煎至七分，去滓热服。

【功用】取汗。

【主治】伤寒表不解。

【宜忌】服讫以厚被盖覆，如人行五里再服。徐令汗透遍身，即旋去衣被，避风。

【加减】如要发汗，更加薄荷三五叶同煎。

63432 **前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】前胡（去芦头） 羌活（去芦头）各

六两 防风(去叉)四两 桔梗(炒)三两 茅芘(去芦头,锉)二两 蛇蜕皮一两(剪碎,炒令黄) 陈橘皮(汤浸,去白,焙干称)半两 蝉壳(净去土)一两 甘草(炙,锉)一两半 人参二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,入生姜三片,薄荷七片,煎至七分,去滓温服。

【主治】伤寒头痛,恶寒发热,肢体疼倦。

63433 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】前胡(去芦头) 蔓荆实(去白皮) 芎䓖 麻黄(去根节,煎,掠去沫,焙) 甘菊花 防风(去叉) 羌活(去芦头) 白茯苓(去黑皮) 石膏(碎) 甘草(炙,锉)各三两 枳壳(去瓤,麸炒)四两 黄芩一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕,以水一大盏,入生姜二片,煎至七分,去滓温服。

【主治】中风伤寒,头目昏眩,壮热,肩背拘急疼痛。

63434 前胡汤

《圣济总录》卷二十二。为《圣惠》卷十五"前胡散"之异名。见该条。

63435 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】前胡(去芦头) 升麻 麦门冬(去心,焙)各三分 贝母(去心) 紫菀(去苗土) 杏仁(去皮尖双仁,炒,研)各半两 甘草(炙)一分 石膏一两一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕, 水一盏,加竹叶二七片,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】时行疫疠,壮热咳嗽,头痛胸闷。

63436 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】前胡(去芦头) 生干地黄(焙) 麦门冬(去心,焙) 陈橘皮(汤浸,去白,焙) 甘草(炙) 人参各半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,加竹叶七片,煎至七分,去滓温服。

【主治】时行疫疠,壮热恶寒,食即呕吐。

63437 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】前胡(去芦头) 百合 葛根(锉)各一两 麦门冬(去心,焙)半两 石膏(碎) 麻黄(去根节)各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎至八分,去滓温服。

【主治】伤寒愈后,已经十余日,潮热不退,身体沉重,昏昏如醉。

63438 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】前胡(去芦头) 半夏(汤洗七遍去滑,生姜汁炙,切,焙) 玄参(坚者) 旋覆花 甘草(炙,锉) 桂(去粗皮) 黄芩(去黑心) 桔梗(锉,炒) 生干地黄(焙)各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕, 水一盏半,加生姜五片,煎至八分, 去滓热服,不拘时候。

【主治】初得伤寒,头痛壮热。

63439 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】前胡(去芦头) 桂(去粗皮) 玄参 射干 款冬花 马兜铃 杏仁(去皮尖双仁,炒,研) 贝母(去心) 甘草(炙,锉)各一两 麻黄(去根节) 旋覆花各一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎取八分,去滓,食后顿服。

【主治】肺脏感寒,咳嗽不止,兼头痛不可忍。

63440 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】前胡(去芦头)二两 柴胡(去苗) 常山 人参 葛根(锉)各一两 甘草(炙,锉)三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一大盏,乌梅一个(捶碎),生姜三片,煎至七分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒坏病,潮热颊赤,口干烦躁,神

思昏塞，经久不愈。

63441 **前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】前胡（去芦头）一两　半夏一两半（汤洗七遍，炒干）　黄芩（去黑心）　甘草（炙，锉）各三分　人参一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一枣大（拍碎），大枣三枚（擘破），煎至八分，去滓，空心温服。

【主治】伤寒不发汗成狐惑，六七日不解，寒热未去，胸胁满痛，默默欲睡卧，不欲食，心烦善呕，腹痛。

63442 **前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷二十九。

【组成】前胡（去芦头）　甘草（炙）　白术　陈橘皮（汤浸，去白，焙）　大腹皮各三分　赤茯苓（去黑心）　旋覆花　桔梗（焙）各半两　半夏（汤洗七遍）一分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一枣大（拍破），煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】伤寒内热，鼻衄，痰壅吐逆。

63443 **前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】前胡（去芦头）　桔梗各一两　龙胆　甘草（炙）各半两　柴胡（去苗）二两　乌梅（去核，炒）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，生姜二片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后，百节疼痛，变为劳气，发热盗汗。

63444 **前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷三十一。

【组成】前胡（去芦头）　茯神（去木）　人参各一两　远志（去心）一两半　甘草（炙）一分

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后，惊悸不定。

63445 **前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷四十五。

【组成】前胡（去芦头）一两半　赤茯苓（去黑皮）二两　桂（去粗皮）三分　犀角（镑）一两　槟榔三枚（锉）　芍药一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓温服。

【主治】脾瘅。口甘，烦渴不止。

63446 **前胡汤**

《圣济总录》卷四十七。为《医方类聚》卷十引《简要济众方》“前胡散”之异名。见该条。

63447 **前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷四十九。

【组成】前胡（去苗）　紫菀（去苗土，焙）　柴胡（去苗）　赤茯苓（去黑皮）　桔梗（炒）　桑根白皮（锉，炒）各半两　百部（焙）　杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒）各一分　白前（去苗）三两　栝楼（锉，炒）一枚

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】肺气壅热。

63448 **前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷五十三。

【组成】前胡（去芦头）一两　白茯苓（去黑皮）三分　木香半两　大腹一两　附子（炮裂，去皮脐）三分　桔梗半两（炒）　枳壳（去瓤，麸炒）半两　五味子一两　甘草（炙，锉）半两　半夏半两（生姜自然汁四两，浆水一升，于银器内慢火煮令水尽，切，焙）

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水二盏，入生姜三片，同煎至一盏，去滓，食前稍热服。

【功用】顺三焦气，利胸膈，进饮食。

【主治】肾脏虚壅多唾，头目昏眩。

63449 **前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷五十九。

【组成】前胡（去芦头）　生干地黄（焙）　大黄（锉，炒）各一两　黄芩（去黑心）　栀子仁　升麻　芍药　栝楼根　石膏（碎）各三分

麦门冬(去心,焙)一两一分　桂(去粗皮)一分　枳实(去瓤,麸炒)　甘草(炙)各半两

【用法】上为粗末。每服四钱匕,水一盏半,入生地黄一分(切碎),同煎至八分,去滓,食前温服,一日三次。

【主治】渴利有热,小便涩难,欲下之。

63450　**前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷六十一。

【组成】前胡(去苗)一两半　赤茯苓(去黑皮)二两　甘草(炙,锉)一两　杏仁二七枚(汤浸,去皮尖双仁,炒)

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至六分,去滓,空心温服。

【主治】胸痹。胸中气满塞,短气。

63451　**前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】前胡(去芦头)　芍药(炒)　半夏(汤洗去滑七遍)　人参　百合各三分　赤茯苓(去黑皮)　枳壳(去瓤,麸炒)　枇杷叶(炙,刷去毛)　木香　槟榔(煨,锉)　白茅根各半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎至八分,去滓温服,不拘时候。

【主治】膈气痰逆,胸中痛,不思食。

63452　**前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】前胡(去芦头)　麦门冬(去心,焙)　人参　淡竹茹　芍药　陈橘皮(汤去白,焙)　半夏(汤洗七遍,焙)各等分

【用法】上锉,如麻豆大,拌匀。每服三钱匕,水一盏,加生姜三片,煎至七分,去滓,食前温服。

【主治】呕吐不下食。

63453　**前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】前胡(去芦头)　五味子　生干地黄(焙)　半夏(汤洗七遍,焙)　泽泻各二两　贝母(去心,焙)　人参　山芋　白茯苓(去黑皮)　白术　杏仁(汤去皮尖双仁,麸炒)　麻黄(不去节)　甘草(炙,锉)　葛根　乌梅(取肉)各一两

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水二盏,加生姜五片,同煎至七分,去滓,食后临卧温服。去枕仰睡。

【主治】五脏诸咳。

63454　**前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】前胡(去芦头)　陈橘皮(去白,炒)　桂(去粗皮)　甘草(炙,锉)　人参　紫菀(去苗土)　五味子(炒)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,生姜二片,大枣一枚(擘),水一盏,煎至七分,去滓温服,一日三次。

【主治】逆气咳嗽,胸中寒热,短气不足。

63455　**前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】前胡(去芦头)二两　小麦　茅根(锉)　麦门冬(去心,焙)　麻黄(去根节)　石膏(碎)　甘草(炙,锉)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,入生姜汁、生地黄汁各半合,同煎至七分,去滓温服。

【主治】肺伤唾血。

63456　**前胡汤**

《圣济总录》卷八十三。为原书卷八十二"前胡饮"之异名。见该条。

63457　**前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷八十三。

【组成】前胡(去苗)　半夏(汤洗三度去滑,焙)　枳壳(去瓤,麸炒)　赤茯苓(去黑皮)　芦根(锉碎)　麦门冬(去心,焙)各三分　旋覆花半两

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏半,入生姜半分(拍碎),同煎至六分,去滓,食前温服,一日三次。

【主治】脚气多痰,膈壅头痛。

63458　**前胡汤**

《圣济总录》卷八十六。为《外台》卷十六引

《删繁方》“前胡泻肝除热汤”之异名。见该条。

63459 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】前胡（去芦头）三分 柴胡（去苗） 桔梗（炒） 人参 赤茯苓（去黑皮）各半两 大腹三枚（并皮锉） 半夏（汤洗七遍去滑，焙干） 陈橘皮（汤浸，去白，炒）各一分

【用法】上为粗末。每用五钱匕，水一盏半，入生姜一分（拍破），煎至一盏，去滓，空腹分温二服。

【主治】虚劳胸满，气逆呕吐，饮食不入。

63460 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷八十八。

【组成】前胡（去芦头） 柴胡（去苗） 桔梗（炒） 羌活（去芦头） 独活（去芦头） 人参 枳壳（去瓤，麸炒） 鳖甲（去裙襕，醋炙）各一两 旋覆花一两半 甘草（炙，锉）半两 石膏（碎）一分

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服。

【主治】虚劳，营卫不调；寒热羸瘦，肢体烦倦，头目昏疼，饮食无味，多困少力。

63461 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷九十二。

【组成】前胡（去芦头）一两 半夏（汤洗去滑，焙） 麻黄（去根节） 芍药各半两 枳实（去瓤，麸炒）一分 黄芩（去黑心）一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，入生姜一枣大（拍碎），大枣二枚（去核），煎至八分，去滓温服，一日三次，不拘时候。

【主治】气极。伤热，喘息冲胸，常欲恚怒，心腹满痛，内外有热，烦呕不安。

63462 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】前胡（去芦头）二两 决明子（炒） 防风（去叉） 车前子各一两 甘菊花 黄连（去须）各半两 细辛（去苗叶） 苦参各三两 枳壳（去瓤，麸炒） 升麻各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，入马牙消半钱匕，食后温服，临卧再服。

【主治】目赤疼痛如脱，视物不明。

【加减】如已疏利，即不用入消。

63463 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】前胡（去芦头）二两 芍药 青葙子 决明子（微炒） 细辛（去苗叶） 车前子 栀子仁各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，入竹叶七片，煎取八分，去滓，入芒消一字，食后放温，临卧再服。取利为度。既利，即去芒消。

【主治】目赤肿痛。

63464 前胡汤

《圣济总录》卷一〇四。为《圣惠》卷三十二“前胡散”之异名。见该条。

63465 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷一〇五。

【组成】前胡（去芦头） 升麻各二两 菊花一两半 细辛（去苗叶） 栀子仁 大黄（锉碎，炒熟）各一两 秦皮（去粗皮） 决明子（微炒） 蕤仁（去皮，研如膏）各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水二盏，入竹叶七片，煎至一盏，去滓，入芒消一钱匕，放温，食后、临卧服。

【主治】肝实热，赤脉冲睛。

63466 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】前胡（去芦头） 赤芍药 青葙子各一两半 山栀子仁 细辛（去苗叶） 车前子各一两 淡竹叶五片（洗） 朴消一钱匕（汤成下） 柴胡（去苗）一两半 甘草（微炙，锉）三分

【用法】上药除消、竹叶外，为粗末。每服四钱匕，水一盏半，入竹叶，煎至八分，去滓入消，放温，食后、临卧服。

【主治】目暴肿生翳。

63467 前胡汤

【方源】《圣济总录》卷一〇六。

【组成】前胡（去芦头）　旋覆花各二两　桔梗（锉，炒）　犀角（镑）　羌活（去芦头）　杏仁（去皮尖双仁，炒黄）　玄参　生干地黄（焙）　半夏（为末，生姜汁制作饼，悬干）　黄芩（去黑心）　甘草（炙，锉）　防风（去叉）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，生姜一分（拍碎），煎至八分，去滓，食后温服。

【主治】风毒上攻，眼目赤涩，或胬肉侵睛，头旋心闷。

63468　**前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】前胡（去芦头）三两　生麦门冬（去心，焙干）五两　甘草（炙）二两　栀子仁　葛根（锉）　漏芦各一两　蕨蕤二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，入竹叶十片，煎取八分，去滓，食后、临卧服。

【主治】时气后，服补药过多，眼忽失明，头痛憎寒，天阴即甚。

63469　**前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】前胡（去芦头）　决明子（炒）　黄连（去须）　芍药　大黄（锉，炒）　升麻各二两　山栀子仁　枳壳（去瓤，麸炒）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加苦竹叶十片，煎至一盏，去滓，下芒消末一钱匕，食后临卧温服。

【主治】眼赤膜不见物，或生息肉。

63470　**前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷一一六。

【组成】前胡（去芦头）　木通（锉）　石膏各二两　黄芩（去黑心）　甘草（炙，锉）各一两半　大黄（锉，炒）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入葱白一寸，豉二十粒，生姜一枣大（切），煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】鼻渊。脑热，鼻塞多涕。

63471　**前胡汤**

《圣济总录》卷一一六。为《圣惠》卷三十七“前胡散”之异名。见该条。

63472　**前胡汤**

《圣济总录》卷一五一。为《千金》卷四“前胡牡丹汤”之异名。见该条。

63473　**前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】前胡（去芦头，锉）一两　半夏二两（以生姜自然汁一升半，浆水一升，同于银器内慢火煮，令水与姜汁尽，薄切，焙干）　人参　木香各一两（锉）　厚朴（涂生姜汁炙令香熟，细锉）　枳壳（去瓤，麸炒）　旋覆花　陈橘皮（汤浸，去白，焙干）　桔梗（炒）各半两　赤茯苓（去黑皮，锉）　白术各一两　甘草三分（炙微令黄，锉）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入生姜五片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠痰饮留滞，不思饮食。

63474　**前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】前胡（去芦头）　细辛（去苗叶）　芎䓖　麻黄（去根节，先煎，掠去沫，焙）　杏仁（去皮尖双仁，炒黄色）　枳壳（去瓤，麸炒）　防风（去叉）　泽泻　芍药各三两　茯神（去木）四两　白术　旋覆花各二两　甘草（擘破，炙）　干姜（炮裂）各二两半　半夏三两（水煮三五十沸，薄切放干，入生姜汁拌，炒黄色）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入葱白一寸，同煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】妊娠伤寒，头痛恶寒，浑身壮热。

63475　**前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】前胡（去芦头）　升麻　麻黄（先煮，掠去沫，焙）　人参　羚羊角（镑）　白术各一两　陈橘皮（去白，炒）三分　甘草（炙）一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入

葱白一寸，生姜三片，煎至七分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】妊娠伤寒，憎寒发热，头痛身疼。

63476 **前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】前胡（去芦头） 白术 人参 石膏（碎） 黄芩（去黑心）各二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入葱白一寸，同煎至六分，去滓，空心、食前温服。

【主治】妊娠伤寒，头疼壮热。

63477 **前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】前胡（去芦头） 黄芩（去黑心） 石膏（碎） 阿胶（炙燥）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠伤寒，头痛壮热。

63478 **前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷一六二。

【组成】前胡（去芦头） 麻黄（去根节，煎，掠去沫，焙） 柴胡（去苗） 人参 桔梗 芎䓖 细辛（去苗叶） 枳壳（去瓤，麸炒） 甘草（炙）各一两 半夏半两（洗七遍去滑，姜汁炒）

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，入生姜一枣大（切），煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后伤寒，发热，头疼体痛，咳嗽痰壅。

63479 **前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】前胡（去芦头） 半夏（为末，生姜汁制作饼，焙） 白术 人参 甘草（炙，锉） 桔梗（炒）各一两 诃黎勒（炮，去核）半两 麦门冬（去心，焙）三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，生姜三片，大枣一枚（擘），同煎至七分，去滓温服，一日三次。

【主治】产后肺气不足，短气虚乏。

63480 **前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷一六四。

【组成】前胡（去芦头） 升麻 桂（去粗皮） 紫菀（去苗土） 白茯苓（去黑皮） 五味子 麦门冬（去心，炒） 杏仁（去皮尖双仁，炒）各一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后肺寒咳嗽。

63481 **前胡汤**

【方源】《圣济总录》卷一六七。

【组成】前胡（去芦头） 龙胆 甘草（炙，锉） 人参 麦门冬（去心，焙）各一两

【用法】上为粗末。每服一钱匕，水七分，煎至四分，去滓，食后温服。

【主治】小儿变蒸，热气乘心，烦躁，啼叫不已，及骨蒸烦热。

63482 **前胡汤**

《圣济总录》卷一八〇。为《圣惠》卷八十九“前胡散”之异名。见该条。

63483 **前胡汤**

《圣济总录》卷一八三。为《圣惠》卷三十八“前胡散”之异名。见该条。

63484 **前胡汤**

《妇人良方》卷十四。为方出《外台》卷三十三引《广济方》，名见《活人书》卷十九“前胡七物汤”之异名。见该条。

63485 **前胡汤**

【方源】《医方类聚》卷一五〇引《济生》。

【组成】前胡（去芦） 半夏（汤泡七次） 杏仁（去皮尖，麸炒） 紫苏子（炒） 枳实（去瓤，麸炒） 橘皮（去白） 桑白皮（炙） 甘草（炙）各等分

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】①《医方类聚》引《济生》：气实极，胸膈不利，咳逆短气，呕吐不下食。②《杏苑》：嘈杂，湿痰气滞，不喜饮食。

63486　**前胡汤**

《普济方》卷二十四。为《圣济总录》卷四十五“平胃前胡汤”之异名。见该条。

63487　**前胡汤**

《普济方》卷二十八。为《圣济总录》卷五十“前胡饮”之异名。见该条。

63488　**前胡汤**

《普济方》卷二十八。为《圣惠》卷六“前胡散”之异名。见该条。

63489　**前胡汤**

《普济方》卷七十二。为《圣济总录》卷一〇二“泻肝前胡汤”之异名。见该条。

63490　**前胡汤**

【方源】《普济方》卷七十二。

【组成】防风(去叉)　决明子(微炒)　青葙子　黄连(去须)　木通　茯神(去木)　玄参　升麻　地骨皮各一两　羚羊角　前胡(去芦)一两半

【用法】上为粗末。每服五钱，水一盏半，煎至七分，食后温服，临卧时再服。

【主治】五脏气虚，风热乘之，毒气上攻，眼目赤痛。

63491　**前胡汤**

《普济方》卷七十五。即《千金》卷六“泻肝汤”。见该条。

63492　**前胡汤**

【方源】《奇效良方》卷六十三。

【组成】前胡　白术各一钱半　黄芩二钱(炒)　栀子仁　知母　木香各二钱

【用法】上作一服。水二钟，加竹茹一块，葱白三寸，煎一钟，不拘时候服。

【主治】妊娠伤寒，头疼壮热，肢节烦疼。

63493　**前胡汤**

【方源】《四明心法》卷下。

【组成】前胡　柴胡　紫苏　桔梗　陈皮　半夏　白芷　甘草

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】十二月伤寒，或从畏寒而起者，此即感也，属表症。

【加减】有食，加枳实。

63494　**前胡汤**

【方源】《引经证医》卷四。

【组成】前胡　黄芩　栀子　茯苓　蝉衣　薄荷　甘草　通草

【主治】身热恶寒，鼻塞脉数，面赤口干，不思纳谷，舌苔黄燥者。

63495　**前胡汤**

《不知医必要》。为《圣惠》卷四十六“前胡散”之异名。见该条。

63496　**前胡饮**

【方源】《圣济总录》卷二十四。

【组成】前胡(去芦头)　桔梗(炒，锉)　旋覆花(炒)　玄参　人参　桂(去粗皮)　生干地黄(焙)　甘草(炙，锉)各一两　厚朴(去粗皮，生姜汁炙)一两半　半夏(汤洗去滑，焙)二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，加生姜一分(切)，同煎取八分，去滓，食后顿服。

【主治】肺脏感寒，痰嗽不止，心膈烦满，饮食不得，常多呕逆。

63497　**前胡饮**

《圣济总录》卷四十四。为《圣惠》卷五“前胡散”之异名。见该条。

63498　**前胡饮**

【方源】《圣济总录》卷五十。

【异名】前胡汤(《普济方》卷二十八)。

【组成】前胡(去芦头)一两半　贝母(去心)　白前各一两　麦门冬(去心，焙)一两半　枳壳(去瓤，麸炒)一两　芍药(赤者)　麻黄(去根节)各一两半　大黄(蒸)一两

【用法】上㕮咀，如麻豆大。每服三钱匕，以水一盏，煎取七分，去滓，食后温服，一日二次。

【主治】肺热，咳嗽痰壅，气喘不安。

63499　**前胡饮**

【方源】《圣济总录》卷六十四。

【组成】前胡(去芦头)　赤茯苓(去黑皮)

陈橘皮（汤浸，去白，焙） 人参 半夏（汤洗七遍，去滑） 枇杷叶（炙，去毛） 旋覆花等分

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，入生姜七片，煎取七分，去滓，食后良久温服。

【主治】痰饮呕逆，头目不利。

63500 **前胡饮**

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【异名】前胡汤（原书卷八十三）。

【组成】前胡（去芦头） 生姜（切，焙） 羚羊角（镑） 半夏（汤洗七遍） 大黄（锉，炒） 赤茯苓（去黑皮）各半两 枳壳（去瓤，麸炒）三分

【用法】上细锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，下朴消一钱匕，搅匀，空腹温服。

【主治】脚气攻心，腹胀满，呕吐不下食。

63501 **前胡饮**

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】前胡（去芦头） 人参 白茯苓（去黑皮） 桂（去粗皮） 柴胡（去苗） 桔梗（炒） 生干地黄（焙） 黄芩（去黑心） 玄参 旋覆花 甘草（炙，锉）各一两 厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉）二两 麦门冬（去心，焙） 半夏（汤洗七遍，焙） 白术各一两半

【用法】上为粗末。每服四钱匕，水一盏半，入生姜七片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】暴急成劳，痰盛喘嗽。

63502 **前胡饮**

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】前胡（去芦头） 细辛（去苗叶） 白茯苓（去黑皮） 甘草（炙） 厚朴（去粗皮，涂生姜汁炙烟出七遍）各半两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，加生姜一分（切），同煎至六分，去滓温服，不拘时候，一日二次。

【主治】妊娠恶阻，食即吐逆，头痛颠倒，寒热。

63503 **前胡散**

【方源】方出《千金》卷十六，名见《普济方》卷三〇六。

【组成】前胡 芎䓖 甘草 当归 石膏 人参 桂心 橘皮各二两 芍药三两 半夏四两 生姜五两 大枣三十枚 （一方无黄芩）

【用法】上㕮咀。以水一斗三升，下黄芩三两，合煮取三升，分三服。

【主治】呕吐，四肢痹冷，上气腹热，三焦不调。

【方论选录】《千金方衍义》：此以三焦真火式微，不能温养中土而致呕吐。用芩、姜、半、归、芍、参、甘下气温中诸味，但取石膏以治标热，桂心以代附子，川芎以佐归、芍，橘皮以佐姜、半，大枣以佐参、甘；以无坚满，故无取于消、黄；以无消渴，故无取于麦冬、栝楼、滑石。

63504 **前胡散**

【方源】《普济方》卷二十八引《千金》。

【组成】前胡二两（去芦头） 半夏一两（汤洗七次，去滑） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 赤芍药二两 麻黄一两（去根节） 人参一两（去芦头） 赤茯苓一两 陈皮一两（洗，浸去白瓤） 白术一两 厚朴一两（去粗皮，生姜汁制） 甘草三两（炙微赤，锉）

【用法】上为末。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，不拘时候服。

【主治】肺急，胸膈不利，咳逆头痛，呕吐不下食。

63505 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷五。

【异名】前胡饮（《圣济总录》卷四十四）。

【组成】前胡一两（去芦头） 大腹皮三分（锉） 赤芍药半两 赤茯苓半两 桔梗半两（去芦头） 羚羊角屑半两 旋覆花半两 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 甘草半两（炙微

赤,锉)

【用法】上为散。每服三钱,水一中盏,入生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】脾气实,四肢不利,头重目疼,腹胁胀闷,心膈壅滞,少思饮食。

63506　前胡散

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】前胡一两(去芦头)　半夏半两(汤浸七遍去滑)　枳壳一两(麸炒微黄,去瓤)　旋覆花半两　赤茯苓一两　甘草半两(炙微赤,锉)　大腹皮一两(锉)　桔梗一两(去芦头)　麦门冬一两(去心)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,入生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】脾脏气壅,气滞多涎,胸膈满闷,不下饮食。

【宜忌】忌生冷、油腻、湿面、饴糖。

63507　前胡散

【方源】《圣惠》卷六。

【组成】前胡一两(去芦头)　桔梗半两(去芦头)　半夏半两(汤洗七遍去滑)　白术三分　人参三分(去芦头)　枳壳三分(麸炒微黄,去瓤)　桂心一两　甘草半两(炙微赤,锉)　陈橘皮一两(汤浸去白瓤,焙)　细辛半两　枇杷叶半两(拭毛,炙微黄)　厚朴一两半(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,入生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】肺脏因伤风冷,痰嗽不止,心膈烦满,或时呕逆,鼻中多涕。

63508　前胡散

【方源】《圣惠》卷六。

【异名】前胡汤(《普济方》卷二十八)。

【组成】前胡(去芦头)　紫菀(洗去泥土)　诃黎勒皮　枳实(麸炒微黄)各一两

【用法】上为细散。每服一钱,以温水送服,不拘时候。

【主治】肺喘,痰毒壅滞,心膈昏闷。

63509　前胡散

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】前胡一两(去芦头)　大腹皮三分(锉)　半夏一两(汤洗七遍去滑)　杏仁一两(汤浸)　陈橘皮三分(汤浸去白瓤,焙)　白术一两　泽泻一两　赤茯苓一两　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,入生姜半分,煎至六分,去滓,食前温服。

【主治】肾脏虚损,脾气乏弱,津液不荣,上焦生热,多唾稠粘,胸膈壅滞,不欲饮食。

63510　前胡散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】前胡一两(去芦头)　人参一两(去芦头)　细辛半两　陈橘皮一两(汤浸去白瓤,焙)　桂心一两　赤茯苓一两　附子二两(炮裂,去皮脐)　诃黎勒一两半(用皮)　甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服五钱,以水一中盏,入生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒,初觉头痛,膈上痰壅。

63511　前胡散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】前胡半两(去芦头)　半夏一分(汤洗七遍去滑)　甘草半两(炙微赤,锉)　桂心半两　人参半两(去芦头)　赤茯苓半两　白芷一分　白术半两　干姜一分(炮裂,锉)　当归半两(锉,微炒)　葛根半两(锉)　柴胡半两(去苗)　陈橘皮半两(汤浸去白瓤,焙)　木香半两　旋覆花半两

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,入生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】伤寒四日,虽经发汗后,心胸不利,头目多疼,胃气不和,少思粥食。

63512　前胡散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】前胡一两（去芦头） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 川大黄一两（锉碎，微炒） 黄芩一两 川朴消一两 槟榔一两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入竹叶三七片，煎至六分，去滓温服。不拘时候，取利为度，不利再服。

【主治】伤寒五日，心腹壅滞，烦热不退。

63513 前胡散

【方源】《圣惠》卷十一。

【组成】前胡三分（去芦头） 桔梗三分（去芦头） 槟榔半两 桂心半两 诃黎勒皮一两 木香半两 当归半两（锉，微炒） 青橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，稍热频服，不拘时候。

【主治】阴毒伤寒，四肢厥逆，头痛心躁，胸中结实，两胁妨闷。

63514 前胡散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】前胡（去芦头） 麻黄（去根节） 桂心 甘草（炙微赤，锉） 葛根（锉） 百部 贝母（煨令微黄）各三分 柴胡一两（去苗） 石膏二两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒咳嗽，头目痛，痰滞胸膈不利。

63515 前胡散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】前胡一两（去芦头） 人参一两（去芦头） 赤茯苓一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 独活一两 甘草半两（炙微赤，锉） 旋覆花半两 半夏半两（汤洗七遍去滑） 桔梗一两（去芦头）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒，胸膈痰滞，头目疼闷。

63516 前胡散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】前胡一两（去芦头） 人参一两（去芦头） 泽泻一两 半夏半两（汤洗七遍去滑） 赤茯苓一两 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒，痰滞呕逆，肢体疼痛，心胸不利。

63517 前胡散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】前胡一两（去芦头） 赤茯苓三分 柴胡一两（去苗） 赤芍药三分 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 诃黎勒一两（煨，用皮） 桂心三分 白术三分 甘草半两 （炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒，心腹痞满，头痛，四肢烦疼。

63518 前胡散

【方源】《圣惠》卷十二。

【组成】前胡一两（去芦头） 半夏半两（汤洗七遍去滑） 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 芎䓖三分 白术三分 赤芍药三分 甘草半两（炙微赤，锉） 木香半两 人参半两（去芦头） 桔梗半两（去芦头） 枇杷叶半两（拭去毛，炙微黄）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，不拘时候温服。

【主治】伤寒，心腹痞满，不思饮食。

63519 前胡散

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】前胡一两（去芦头） 当归半两（锉碎，微炒） 川大黄一两（锉碎，微炒） 羌活一两 桔梗一两（去芦头） 槟榔三分 郁李仁一两（汤浸去皮尖，微炒）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒五日后，结胸，气不散，汤饮难下，连背闷痛。

63520　**前胡散**

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】前胡三两(去芦头)　半夏一两(汤洗七遍去滑)　黄芩三分　人参一两(去芦头)　甘草三分(炙微赤，锉)　当归一两(锉，微炒)

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒不经发汗，变成狐惑，六七日不解，寒热来去，胸胁满痛，默默欲睡，卧不得，不欲饮食，心烦呕逆。

63521　**前胡散**

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】前胡一两(去芦头)　百合一两　麻黄三分(去根节)　葛根一两(锉)　麦门冬半两(去心)　石膏一两

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后已经十余日，潮热不退，身体沉重，昏昏如醉，恐成坏病。

63522　**前胡散**

【方源】《圣惠》卷十三。

【组成】柴胡一两(去苗)　防风三分(去芦头)　前胡一两(去芦头)　黄芩一两　葛根一两(锉)　甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后，已经十余日，潮热不退，身体沉重，昏昏如醉，恐成坏病。

63523　**前胡散**

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】前胡一两(去芦头)　半夏二两(汤洗七遍去滑)　白鲜皮三分　柴胡三分(去苗)　桑根白皮三分(锉)　黄耆三分(锉)　大腹皮三分(锉)　诃黎勒皮三分　白术三分　青橘皮三分(汤浸去白瓤，焙)　甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后夹劳，寒热时作，咳嗽盗汗，四肢疼痛，颊赤面黄，心胸不利。

63524　**前胡散**

【方源】《圣惠》卷十四。

【组成】前胡一两(去芦头)　半夏三分(汤洗七遍去滑)　桂心三分　甘草三分(炙微赤，锉)　陈橘皮三分(汤浸去白瓤，焙)　赤茯苓一两半　大腹皮三分　桑根白皮一两半(锉)

【用法】上为散。每服四钱，以水一大盏，入生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒后，脚气上攻，痰逆，头目旋闷。

63525　**前胡散**

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】前胡一两(去芦头)　半夏一两(汤洗七遍去滑)　枳壳三分(麸炒微黄，去瓤)　赤芍药二分　黄芩三分　麦门冬一两(去心)

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，竹茹一分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气八九日不解，心腹坚满，身体疼痛，内外有热，烦呕不安。

63526　**前胡散**

【方源】《圣惠》卷十五。

【异名】前胡汤(《圣济总录》卷二十二)。

【组成】前胡(去芦头)　知母　犀角屑　葛根(锉)　赤芍药各一两　石膏二两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入竹叶二七片，生姜半分，葱白七寸，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】时气壮热，头痛呕吐，不能饮食。

63527　**前胡散**

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】前胡二两(去芦头)　川升麻二两

百合一两半　贝母一两半(煨令微黄)　紫菀一两半(去苗土)　桔梗一两半(去芦头)　石膏三两　麦门冬二两(去心)　甘草半两(炙微赤,锉)　杏仁一两(汤浸去皮尖双仁,麸炒微黄)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,入竹叶二七片,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】时气壮热,咳嗽头痛,心闷。

63528 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】前胡一两(去芦头)　天门冬半两(去心)　川升麻一两　赤茯苓三分　桔梗半两(去芦头)　络石半两　射干半两　犀角屑半两　赤芍药半两　杏仁三分(汤浸去皮尖双仁,麸炒微黄)　甘草半两(炙微赤,锉)　枳壳半两(麸炒微黄,去瓤)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】时气,热毒上攻,咽喉不利。

63529 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】前胡一两(去芦头)　麦门冬一两(去心)　生干地黄一两　陈橘皮半两(汤浸去白瓤,焙)　甘草半两(炙微赤,锉)　葛根一两(锉)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,入生姜半分,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】时气,恶寒壮热,食则呕逆。

63530 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】前胡一两(去芦头)　芦根一两　犀角屑三分　葛根三分(锉)　麦门冬一两半(去心)　石膏一两　人参三分(去芦头)　陈橘皮三分(汤浸去白瓤,焙)　甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,入竹叶二七片,生姜半分,大枣三枚,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】时气,壮热头痛,呕逆不能食。

63531 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】前胡(去芦头)　赤芍药　木香　青橘皮(汤浸去白瓤,焙)　槟榔各一两

【用法】上为散。每服五钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】时气,心下痞满,胸膈不利。

63532 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷十五。

【组成】前胡(去芦头)　半夏(汤洗七遍去滑)　枳壳(麸炒微黄,去瓤)　黄芩　人参(去芦头)　桔梗(去芦头)　槟榔各一两　赤芍药半两　甘草半两(炙微黄,锉)

【用法】上为散。每服五钱,以水一中盏,入生姜半分,大枣三枚,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】时气,心腹痞满,身体疼痛,烦热呕逆。

63533 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】前胡一两(去芦头)　葛根半两(锉)　桂心半两　旋覆花半两　麻黄二两(去根节)　杏仁一两(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄)

【用法】上为粗散。每服五钱,以水一大盏,入生姜半分,葱白五寸,煎至五分,去滓温服,不拘时候。衣盖取汗,未汗再服。

【主治】热病二日,口苦咽干,头痛壮热。

63534 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】前胡一两(去芦头)　半夏半两(汤洗七遍去滑)　黄芩三分　人参三分(去芦头)　赤芍药三分　桂心三分　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,入生姜半分,大枣三枚,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热病七日不解,寒热往来,胸胁苦满,不思饮食,心烦欲吐。

63535 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】前胡一两(去芦头)　赤茯苓一两　麦门冬一两半(去心,焙)　甘草三分(炙微赤,锉)　紫菀一两(去根土)　陈橘皮三分(汤浸去白瓤,焙)　大腹皮一两(锉)　桔梗一两(去芦头)　枳壳一两(麸炒微黄,去瓤)

【用法】上为粗散。每服五钱,以水一大盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热病气喘,心膈烦闷,或痰壅不能食。

63536 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】前胡一两(去芦头)　黄耆一两(锉)　人参一两(去芦头)　麦门冬半两(去心)　陈橘皮半两(汤浸去白瓤,焙)　甘草一分(炙微赤,锉)　生干地黄三分

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,入竹茹一分,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热病,胃中有热,谷气入则胃气逆,逆则哕,不下食。

63537 **前胡散**

《圣惠》卷十八。即《外台》卷三引《广济方》“前胡汤”加地骨皮。见该条。

63538 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷二十。

【组成】前胡一两(去芦头)　羌活三分　羚羊角屑三分　人参半两(去芦头)　甘菊花半两　沙参半两(去芦头)　芎䓖半两　白术半两　黄耆半两(锉)　半夏半两(汤洗七遍去滑)　防风半两(去芦头)　蔓荆子半两　枳壳半两(麸炒微黄,去瓤)　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,入生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】风痰,心胸壅闷,头目不利,神思昏浊,少欲饮食。

63539 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷二十一。

【组成】前胡半两(去芦头)　羚羊角屑一两　子芩半两　栀子仁半两　麦门冬一两(去心,焙)　枳壳一两(麸炒微黄,去瓤)　防风半两(去芦头)　甘菊花半两　沙参半两(去芦头)　甘草半两(炙微赤,锉)　石膏二两

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热毒风,头目壅热,口干心烦,不欲吃食。

63540 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】前胡一两(去芦头)　白术一两　防风一两(去芦头)　枳壳一两(麸炒微黄,去瓤)　茯神一两　细辛半两　蔓荆子三分　半夏三分(汤洗七遍去滑)　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一大盏,入生姜半分,薄荷三七叶,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】上焦风痰,头旋目晕,不欲饮食。

63541 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷二十二。

【组成】前胡一两半(去芦头)　旋覆花三分　防风一两(去芦头)　甘草半两(炙微赤,锉)　飞廉半两　黄芩半两　杜若半两　防己半两　赤茯苓一两　石膏二两　芎䓖半两

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,入甜竹茹一分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】头风头眩,痰逆头痛,水浆不下。

63542 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】前胡一两半(去芦头)　旋覆花半两　桑根白皮一两(锉)　陈橘皮一两(汤浸去白瓤,焙)　枇杷叶一两(拭去毛,炙微黄)　白术一两

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,

入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳。心胸痰饮不散，少欲饮食。

63543 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】前胡一两（去芦头） 赤茯苓半分 陈橘皮三分（汤浸，去白瓤，焙） 枇杷叶半两（拭去毛，炙微黄） 槟榔半两 人参半两（去芦头） 草豆蔻半两（去皮） 半夏半两（汤洗七遍去滑） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，不拘时候，稍热服。

【主治】虚劳。脾胃气滞，胸膈疼壅不散，食即呕逆。

63544 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷二十九。

【组成】前胡一两（去芦头） 麦门冬一两（去心） 诃黎勒皮一两 赤茯苓一两 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 赤芍药三分 射干三分 生干地黄一两 人参三分（去芦头） 紫菀三分（去苗土） 甘草三两（炙微赤）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】虚劳损乏，短气不足，上焦壅滞，唾稠如胶，咽喉不利。

63545 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷三十一。

【组成】前胡三分（去芦头） 桑根白皮三分（锉） 地骨皮三分 桔梗半两（去芦头） 木通三分（锉） 甘草半两（炙微赤，锉） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 麦门冬一两半（去心，焙） 赤茯苓一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】骨蒸劳，咳嗽，胸背烦热。

63546 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【异名】前胡汤（《圣济总录》卷一〇四）。

【组成】前胡三分（去芦头） 防风一两（去芦头） 决明子一两 木通一两（锉） 茯神三分 羚羊角屑三分 玄参半两 川升麻三分 地骨皮半两 川朴消一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食后温服。

【主治】肾脏风毒冲眼，赤痛及紫色。

【备考】《圣济总录》有白芷一两，五味子二两。

63547 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷三十二。

【组成】前胡（去芦头） 防风（去芦头） 独活 玄参 栀子仁 车前子 黄芩 甘菊花 甘草（炙微赤，锉） 桔梗（去芦头） 地肤子各一两 细辛一两半

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食后温服。

【主治】肝脏壅热，风毒所攻，眼赤肿痛，生瘀肉侵睛。

【宜忌】忌炙煿，热面。

63548 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷三十七。

【异名】前胡汤（《圣济总录》卷一一六）。

【组成】前胡（去芦头） 木通（锉） 大青 青竹茹 麦门冬（去心）各三分 川升麻一两 玄参一两 黄柏半两（锉） 川芒消一两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，煎至六分，去滓，每于食后温服。

【主治】鼻中生疮，咽喉闭塞，及干呕头痛。

63549 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷三十八。

【异名】前胡汤（《圣济总录》卷一八三）。

【组成】前胡二两（去芦头） 黄芩三分 甘草半两（生，锉） 知母一两 牡蛎一两（烧，为粉） 石膏二两

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】乳石发动，头痛寒热，如伤寒，又似疟状。

63550 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】前胡一两(去芦头)　赤茯苓三分　陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙)　黄耆三分(锉)　枳壳一两(麸炒微黄,去瓤)　芦根一两(锉)　甘草半两(炙微赤,锉)　川大黄一两(锉碎,微炒)　麦门冬三分(去心)　枇杷叶三分(拭去毛,炙微黄)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,入生姜半分,竹茹一分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】乳石发动,热毒上攻,心神烦躁,痰饮呕逆,不纳饮食。

63551　**前胡散**

【方源】方出《圣惠》卷三十八,名见《普济方》卷二六一。

【异名】茯苓汤(《圣济总录》卷一八四)。

【组成】前胡一两(去芦头)　石膏二两　黄耆一两(锉)　甘草半两(生,锉)　芦根二两(锉)　麦门冬一两(去心)　子芩一两　赤芍药一两　枇杷叶半两(拭去毛,炙微黄)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,加生姜半分,煎至六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】乳石发动,虚热痰饮,头目不利,食即呕逆,四肢烦痛。

63552　**前胡散**

【方源】《圣惠》卷三十八。

【组成】前胡一两(去芦根)　槟榔一两　桂心一两　赤茯苓二两　犀角屑三分　白术三分　赤芍药三分　木香半两　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服四钱,以水一中盏,入生姜半分,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】乳石发动,心胸壅闷,腹痛,寒噤不食。

63553　**前胡散**

【方源】《圣惠》卷四十二。

【组成】前胡一两(去芦头)　枳壳一两(麸炒微黄,去瓤)　人参一两(去芦头)　陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)　槟榔一两　紫苏茎叶一两　甜葶苈半两(隔纸炒令紫色)　甘草半两(炙微赤,锉)

【用法】上为散。每服五钱,以水一大盏,入生姜半分,大枣三枚,煎至五分,去滓温服,一日三四次。

【主治】上气,腹胀满,坐卧不得,少思饮食。

63554　**前胡散**

【方源】方出《圣惠》卷四十二。名见《普济方》卷一八六。

【组成】前胡三分(去芦头)　木香三分　五味子三分　桔梗三分(去芦头)　赤芍药三分　当归三分　槟榔三分　青橘皮半两(汤浸,去白瓤,焙)

【用法】上为散。每服二钱,以水一中盏,入生姜半分,煎至六分,去滓稍热服,不拘时候。

【主治】心痹。满急刺痛,不可俯仰,气促,咳唾不利。

63555　**前胡散**

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】前胡一两(去芦头)　陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)　当归一两(锉,微炒)　赤茯苓一两　白术一两　赤芍药一两　桂心一两　半夏半两(汤洗七遍去滑)　干姜半两　吴茱萸半两(汤浸七遍,焙干,微炒)

【用法】上为散。每服三钱,以水一中盏,入生姜半分,大枣三枚,煎至六分,去滓,不拘时候,稍热服。

【主治】久冷,胸膈气滞,心腹痛,胀满,不能饮食,四肢虚乏,吃食全少。

63556　**前胡散**

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】前胡一两(去芦头)　槟榔一两　半夏半两(汤浸七遍去滑)　枳实三分(麸炒微黄)　诃黎勒一两(煨,用皮)　桂心半两　赤茯苓三分　陈橘皮一两(汤浸去白瓤,焙)　旋覆花半两　吴茱萸一分(汤浸七遍,焙干,微炒)

【用法】上为粗散。每服三钱,以水一中盏,

入生姜半分，煎至六分，去滓，不拘时候，稍热服。

【主治】心痛气胀，心胸不利，痰饮不消，多唾。

63557 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷四十三。

【组成】前胡一两（去芦头） 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 赤茯苓一两 陈橘皮二分（汤浸，去白瓤，焙） 紫苏子一两（微炒） 槟榔一两 木香三分 草豆蔻一两（去苗）

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】腹虚胀满，不欲饮食。

63558 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】前胡半两（去芦头） 桔梗半两（去芦头） 桑根白皮半两（锉） 人参半两（去芦头） 款冬花半两 大腹皮半两（锉） 半夏半两（汤洗七遍去滑） 陈橘皮半两（汤浸，去白瓤，焙） 甘草一分（炙微赤，锉） 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 枳实三分（麸炒微黄）

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咳嗽，气急不下食，食则呕吐，心胸满闷。

63559 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷四十六。

【异名】前胡汤（《不知医必要》卷一）。

【组成】前胡一两（去芦头） 麦门冬一两半（去心） 贝母一两（煨微黄） 桑根白皮一两（锉） 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咳嗽，涕唾稠粘，心胸不利，时有烦热。

63560 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷四十六。

【组成】前胡三分（去芦头） 木通三分（锉） 半夏半两（汤洗七遍去滑） 旋覆花半两 紫菀半两（去苗土） 款冬花半两 枳壳三分（麸炒微黄，去瓤） 杏仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 甘草半两（炙微赤，锉） 桑根白皮半两（锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咳嗽，心胸痰滞，喉中作呀呷声。

63561 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】前胡一两（去芦头） 半夏一两（汤洗七遍去滑） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 桂心一两 诃黎勒皮一两

【用法】上为粗散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，稍热服，不拘时候。

【主治】五膈气噎，胸胁逆满，每食即气塞不通。

63562 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】前胡一两（去芦头） 丁香三分 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 大腹皮一两（锉） 枇杷叶三分（拭去毛，炙微黄） 草豆蔻一两（煨，去皮） 半夏三分（汤洗七遍去滑） 甘草半两（炙微赤，锉） 干姜半两（炮裂，锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】脾胃虚冷，痰饮结聚，饮食不消。

63563 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】前胡一两（去芦头） 半夏二两（汤洗七遍去滑） 桂心一两 人参一两（去芦头） 诃黎勒皮一两 白术一两 槟榔一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，煎至五分，去滓稍热服，一日三四次。

【主治】悬饮。腹胁痞急，宿食不化，心胸满闷。

63564　**前胡散**

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】前胡一两(去芦头)　半夏一两(汤洗七遍去滑)　桂心半两　干姜半两(炮裂，锉)　陈橘皮一两(汤浸，去白瓤，焙)　白术半两　人参半两(去芦头)

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】痰饮，腹胁胀满，呕逆不下食，胸中冷。

63565　**前胡散**

【方源】《圣惠》卷五十一。

【组成】前胡一两(去芦头)　旋覆花半两　桂心半两　人参一两(去芦头)　川大黄二两(锉碎，微炒)　甘草半两(炙微赤，锉)　半夏一两(汤洗七遍去滑)　槟榔一两　杏仁半两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄)

【用法】上为散。每服五钱，以水一大盏，入生姜半分，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】胸中宿痰结实，食饮减少，或发寒热，卧不欲起。

63566　**前胡散**

《圣惠》卷五十七。为《外台》卷十六引《删繁方》“前胡吐热汤”之异名。见该条。

63567　**前胡散**

【方源】《圣惠》卷六十二。

【组成】前胡一两(去芦头)　麦门冬一两(去心)　川升麻一两　黄芩一两　知母一两　甘草一两(锉，生用)　川大黄一两(锉碎，微炒)　黄耆一两(生，锉)　赤芍药一两　当归一两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】发背及诸疮肿，疼痛。

63568　**前胡散**

【方源】《圣惠》卷七十四。

【异名】旋覆花汤(《活人书》卷十九)。

【组成】前胡一两(去芦头)　旋覆花半两　白术三分　人参三分(去芦头)　麻黄三分(去根节)　黄芩二分　赤芍药半两　石膏一两　甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半两，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠伤寒，头目旋疼，壮热心躁。

63569　**前胡散**

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】前胡一两(去芦头)　赤茯苓一两半　阿胶一两(捣碎，炒令黄燥)　芎䓖二两　当归三两(锉，微炒)　麦门冬一两(去心)　白术一两半　甘草三两(炙微赤，锉)　人参一两(去芦头)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠三两月，伤寒头痛，烦热呕哕，胎气不安。

63570　**前胡散**

【方源】《圣惠》卷七十四。

【组成】前胡一两(去芦头)　子芩一两　贝母一两(煨令微黄)　麦门冬一两(去心)　半夏半两(汤浸七遍去滑)　人参一两(去芦头)　赤茯苓一两　木香半两　陈橘皮一两(汤浸，去白瓤，焙)　甘草半两(炙微赤，锉)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠伤寒头痛，身体烦热，胸胁气滞，呕逆不止。

63571　**前胡散**

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】前胡一两(去芦头)　麦门冬一两(去心)　人参一两(去芦头)　赤芍药半两

陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙） 半夏半两（汤洗七遍去滑） 枳壳半两（麸炒微黄，去瓤） 甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入生姜半分，淡竹叶二七片，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠胸中满闷，呕逆不下食，四肢疼痛。

63572 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】前胡三分（去芦头） 石膏二两 麻黄一两（去根节） 葛根（锉） 人参（去芦头） 黄芩 芎䓖 枳实（麸炒微黄） 赤芍药 甘草（炙微赤，锉） 半夏（汤洗七遍去滑） 桂心各半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，豉五十粒，葱白五寸，煎至六分，去滓，稍热频服。以微汗为效。

【主治】产后伤寒，头目疼痛，四肢烦热，心胸满闷，不欲饮食。

63573 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】前胡三分（去芦头） 杏仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 桂心半两 人参三分（去芦头） 麻黄三分（去根节） 赤茯苓三分 白术三分 细辛半两 甘草一分（炙微赤，锉） 赤芍药半两

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后伤寒咳嗽，心胸不和，背膊烦疼。

63574 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷七十八。

【组成】前胡（去芦头） 半夏（汤洗七遍去滑） 旋覆花 当归（锉，微炒） 甘菊花 甘草（炙微赤，锉） 赤茯苓各半两 石膏二两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】产后痰壅头痛，心胸不利。

63575 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷八十三。

【组成】前胡半两（去芦头） 丁香一分 甘草一分（炙微赤，锉） 人参一分（去芦头）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿心腹气胀，胸膈烦满。

63576 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】前胡半两（去芦头） 黄芩一分 赤茯苓一分 石膏一两（细研） 枳壳一分（麸炒微黄，去瓤） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿伤寒，心胸壅闷，烦热头痛。

63577 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷八十四。

【异名】前胡枳壳散（《小儿痘疹方论》）、五味前胡枳壳汤（《永类钤方》卷二十一）、前胡枳壳汤（《医学入门》卷六）。

【组成】前胡半两（去芦头） 枳壳一分（麸炒微黄，去瓤） 赤茯苓一分 川大黄一分（锉碎，微炒） 甘草一分（炙微赤，锉）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，一日三四次。

【主治】小儿痰食壮热，心胸壅闷，不欲乳食。

63578 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】前胡半两（去芦头） 贝母一分（煨令黄） 白术一分 桑根白皮一分（锉） 人参一分（去芦头） 陈橘皮半分（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为粗散。每服一钱，以水一小盏，煎至五分，去滓温服，不拘时候。

【主治】小儿痰实，心胸不利，多欲呕吐。

63579 **前胡散**

【方源】《圣惠》卷八十四。

【异名】前朴散(《小儿病源》卷三)。

【组成】前胡一分(去芦头)　白术一分　人参一两(去芦头)　高良姜一分(锉)　陈橘皮一分(汤浸,去白瓤,焙)　藿香一分　甘草半分(炙微赤,锉)　厚朴一分(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】①《圣惠》:小儿胸中寒气结塞不通,时欲呕吐。②《袖珍》:心腹急气,或呕哕泄泻,腹胀时痛,或发惊悸。

63580　前胡散

【方源】《圣惠》卷八十四。

【组成】前胡三分(去芦头)　赤茯苓半两　桂心一分　人参半两(去芦头)　白术半两　枇杷叶半两(拭去毛,炙微黄)　芦根三分(锉)　甘草半两(炙微赤,锉)　厚朴半两(去粗皮,涂生姜汁炙令香熟)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,入生姜少许,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿脾胃不和,见食欲呕,心胸壅闷。

63581　前胡散

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】前胡三分(去芦头)　赤茯苓半两　犀角屑半两　川大黄三分(锉碎,微炒)　枳壳半两(麸炒微黄,去瓤)　郁李仁半两(汤浸,去皮,微炒)　鳖甲半两(涂醋炙令黄,去裙襕)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓温服。微利为度。

【主治】小儿腹内痞结,壮热羸瘦,多啼。

63582　前胡散

【方源】《圣惠》卷八十八。

【组成】前胡半两(去芦头)　槟榔半两　诃黎勒皮三分　木香一分　川大黄半两(锉碎,微炒)　枳壳半两(麸炒微黄,去瓤)　赤茯苓半两　沉香半两　甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,入生姜少许,煎至五分,去滓温服,一日三四次。

【主治】小儿伤饱,心腹滞闷,不能乳哺。

63583　前胡散

【方源】《圣惠》卷八十九。

【异名】前胡橘皮汤、前胡汤(《圣济总录》卷一八〇)。

【组成】前胡半两(去芦头)　白茯苓一分　陈橘皮半两(汤浸去白瓤,焙)　桂心一分　白术一分　人参一分(去芦头)　细辛一分　甘草一分(炙微赤,锉)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓温服,一日三四次。

【主治】小儿肺脏伤冷,鼻流清涕。

63584　前胡散

【方源】《医方类聚》卷十引《简要济众方》。

【异名】前胡汤(《圣济总录》卷四十七)。

【组成】前胡一两半(去芦头)　茅根二两(锉,去须)　麦门冬一两(去心)　甘草一两(炙)　黄芩半两

【用法】上为散。每服二钱,水一中盏,入生姜三片,大枣二枚,同煎至七分,去滓热服,不拘时候。

【主治】脾脏实热,干呕烦闷,目黄燥渴。

63585　前胡散

【方源】《圣济总录》卷十三。

【组成】前胡(去芦头)　秦艽(去苗土)　当归(切,焙)　知母各一两　贝母(去心)　羌活(去芦头)　芎䓖　甘草(炙,锉)　白术　防风(去叉)　天仙藤　乌头(炮裂,去皮尖)各一两半

【用法】上为细散。每服二钱匕,温酒调下,不拘时候。

【主治】风成寒热,肢体烦疼。

63586　前胡散

【方源】《幼幼新书》卷十四引张涣方。

【组成】前胡一两　甘草(炙)　桔梗　半

夏(汤洗七遍) 黄芩 柴胡(去苗) 人参(去芦头)各半两

【用法】上为细末。每服一钱,水一盏,入生姜二片,大枣一枚,同煎至五分,去滓温服。

【主治】小儿伤寒四五日,邪热不除者。

63587 前胡散

【方源】《鸡峰》卷五。

【组成】前胡 川升麻 地骨皮 杏仁(汤去皮尖,麸炒黄)各一两 紫菀一两半 石膏二两半 麦门冬二两 甘草半两

【用法】上为细末。每服五钱,水一大盏,竹叶五七片,煎至五分,去滓,非时温服。

【主治】热病,壮热咳嗽,头痛心闷。

63588 前胡散

【方源】《产宝诸方》。

【组成】半夏(汤洗七次,切) 陈皮各六两 白茯苓 前胡 枳壳(麸炒赤,去瓤) 甘草(炙)各三两

【用法】上为粗末。每服二钱,水一盏,煎至六分,去滓热服,一日二三次,不拘时候。

【主治】妇人脾虚,心下有结气及气疾,不能服温药者。

63589 前胡散

《宣明论方》卷一。为《圣济总录》卷九"前胡膏"之异名。见该条。

63590 前胡散

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【异名】柴胡梅连散(《玉机微义》卷九引《瑞竹堂方》)、柴前梅连散(《玉机微义》引《瑞竹堂方》,见《医方类聚》卷六十三)、八煎散(《医方类聚》卷二一五引《医林方》)、柴胡梅连汤(《傅青主女科·产后编》卷下)、清骨散(《胎产心法》卷下)。

【组成】柴胡(去苗) 前胡(去芦头) 胡黄连 乌梅肉各等分

【用法】上㕮咀。每服五钱,水酒、童便共一盏半,猪胆一枚取汁,猪脊髓一条,葱、薤白各三寸,同煎至八分,去滓,食前冷服。

【主治】童男、室女骨蒸潮热,及热在肌肉,吐血等疾。

63591 前胡散

【方源】《云岐子保命集》卷下。

【组成】前胡 赤茯苓各一两 大腹皮 人参各五钱 木香三钱 槟榔 大黄各三钱

【用法】上为细末。每服五钱,沸热点服。

【主治】伤寒汗下后,脐右有动气者。

63592 前胡散

【方源】《玉机微义》卷九。

【组成】大黄半两 桔梗 枳壳 前胡 杏仁各一钱 葛根二钱

【用法】上为末。每服二钱,入姜煎服。

【主治】胃气实热,唇口干裂,中心热躁,大便秘结,非时烦渴,睡中口内生涎。

63593 前胡散

【方源】《普济方》卷一六六。

【异名】前胡人参散(《杏苑》卷五)。

【组成】前胡 人参 赤茯苓(去皮) 紫苏各七钱半 陈皮(去白) 半夏曲 枳壳(麸炒,去瓤) 甘草 木香各半两

【用法】上为末。每服三钱,水一盏半,生姜七分,煎至一盏,去滓,取七分热服,一日三次。

【主治】①《普济方》:温饮停留肢体,时疼痛,气膈,痰热客于上焦,心下痞闷,不欲饮食,头目眩昏。②《杏苑》:痰气客肺,上喘气促。

63594 前胡散

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】川芎一钱 当归三钱 黑姜四分 炙草四分 桃仁十粒 熟地三钱 前胡 肉桂各一钱

【用法】上为末服。

【主治】产后虚中感寒饮冷,其寒下攻小腹作痛;又有血块作痛;又产后血虚,脐下痛者。

63595 前胡膏

【方源】《圣济总录》卷九。

【异名】前胡散(《宣明论方》卷一)。

【组成】前胡(去芦头)三两 白术(生用)

三两　白芷(锉)三两(留一枚不锉,以验膏成)　芎䓖三两　椒(去目及闭口,生用)　吴茱萸(汤洗,焙干,炒)二两　附子(去脐皮,生用)五两　当归(细切)五两　细辛(去苗叶)三两　桂(去粗皮)三两

【用法】上锉,别以苦酒三升(拌匀,同窨一宿,以炼成猪膏五斤,入药微煎之,候白芷黄紫色,去滓膏成。病在外,摩之;病在内,以热酒调化服樱桃大;若伤折及坠堕损,外摩内服。

【主治】肉苛。营虚卫实,肌肉不仁;疮癣疮痍;诸风瘴麻疼痛;伤折及坠堕损等。

63596　**前喘汤**

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】升麻八分　桑皮　栀子　黄芩各三分　桔梗一分半　天冬七分　知母四分半　生姜一片

【用法】水煎服。

【主治】麻疹,七日以前喘急者。

63597　**前列腺汤**

【方源】《中医外科学》。

【组成】丹参　泽兰　赤芍　桃仁　红花　乳香　没药　王不留行　青皮　川楝子　小茴香　白芷　败酱草　蒲公英

【用法】水煎服。

【功用】活血化瘀,行气导滞。

【主治】慢性前列腺炎,有瘀滞见症者。

63598　**前胡饮子**

【方源】《圣惠》卷十七。

【组成】前胡二两(去芦头)　麦门冬二两(去心)　竹茹三两　陈橘皮一两(汤浸去白瓤,焙)　甘草一两(炙微赤,锉)　生地黄二两　葛根二两　枇杷叶一两(拭去毛,炙微黄)

【用法】上为细末。每服半两,以水一大盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】热病,恶寒壮热,食则呕逆。

63599　**前胡饮子**

【方源】《普济方》卷三六一。

【组成】升麻　白芍药　干葛　前胡　川芎　甘草　知母　麻黄　苦梗　黄芩各等分

【用法】上为末。每服一钱,葱白、薄荷同煎,温服。

【主治】婴儿变蒸,潮热,烦渴,头痛;疮疖热伏,或疹痘未匀。

63600　**前锋正将**

【方源】《得效》卷十九。

【组成】荆芥　薄荷　山蜈蚣　老公须　天花粉　菇黄　菇片　败荷心　川白芷　猪牙皂角(切,炒)　赤芍药各等分　淮乌(大者)一枚(煨)　红内消(倍其数)　甘草每十五文入一文(喜甜加用)

【用法】上为末。每服二钱,薄荷、茶清送服。欲快利,酒调服;不饮酒,麦门冬(去心)煎汤亦可,但较缓耳。

【主治】一切痈疽,不问发肩发背,作痛疼痛。

【加减】若服经日未见效,可加当归、羌活;如热重,雄黄酒调;乳痈,加萱草根研汁调。

63601　**前胡七物汤**

【方源】方出《外台》卷三十三引《广济方》,名见《活人书》卷十九。

【异名】前胡汤(《妇人良方》卷十四)。

【组成】前胡　知母各三两　石膏五两　大青　黄芩　栀子各一两　葱白(切)一升

【用法】上切。以水七升,煮取一升三合,绞去滓,分三服。服后相去如人行七八里久,再服。

【主治】妊娠伤寒,头痛壮热,肢节烦疼。

【宜忌】忌热面、羊肉。

【备考】《妇人良方》有甜竹茹三分。

63602　**前胡人参散**

《杏苑》卷五。为《普济方》卷一六六“前胡散”之异名。见该条。

63603　**前胡木香汤**

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】前胡(去芦头)　木香　柴胡(去苗)　秦艽(去苗土)　桂(去粗皮)　茴香子

（炒）各一两 槟榔三枚（面裹煨熟） 肉豆蔻（去壳）三枚 芎䓖 甘草（炙，锉） 青橘皮（汤浸去白，焙） 甜葶苈（隔纸炒）各半两

【用法】上为粗末。每服四钱匕，水一盏半，生姜三片，煎至一盏，去滓温服。

【主治】胃寒肠热，食已复饥，小腹胀痛。

63604 前胡木香散

【方源】《普济方》卷二二八引《卫生家宝》。

【组成】前胡一两 柴胡一两 木香一两 秦艽一两 京三棱半两（煨） 官桂一两 茴香一两 槟榔三个（面煨） 白术一两 肉豆蔻三个（去皮） 甘草半两（炙） 青皮半两 川芎半两 甜葶苈半两（微炒）

【用法】上每服二钱，水一盏半，生姜三片，乌梅一枚，煎至六分，温服。

【功用】调顺三焦，平和胃气。

【主治】五劳七伤，气膈不通，日渐消瘦。

63605 前胡化斑散

【方源】《医方考》卷六。

【组成】酒红花 当归各一钱 前胡八分 荆芥四分 白芷 甘草节 赤芍药 陈皮各五分 郁金七分（酒浸） 胡荽子三十粒

【主治】痘中夹斑之轻者。

【方论选录】①《医方考》：此方用酒红花、当归、赤芍药所以活斑中之血，前胡、白芷、陈皮、荆芥所以利表里之气，乃胡荽子、甘草节、酒郁金皆所以散滞气尔。此其为药，和调营卫，不寒不热，诚得治痘斑之理也。②《治痘全书》：红花、当归、芍药、郁金流通血道，血和则邪火自解；前胡、陈皮祛风热，消痰气；佐白芷、荆芥、荽子以发散，甘节以消毒。内用和血，外用升散，斑毒自化。凡痘未出先斑，及出时夹斑黑陷，大便自利者宜用。

63606 前胡白术汤

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】前胡（去芦头） 白术 防风（去叉）各二两 柴胡（去苗） 熏草 白鲜皮各一两半 石膏（碎）三两 麻黄（去根节，煎，掠去沫）四两 甘草（炙）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，入薄荷五叶，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】中风伤寒，百节痠疼。

63607 前胡半夏丸

【方源】《卫生总微》卷十四。

【异名】前胡半夏丹（《普济方》卷三八七）。

【组成】前胡（去芦）一两 半夏一两（汤泡七次，焙干） 大黄半两（炮） 麦门冬（去心）半两 川朴消半两

【用法】上为细末，生姜自然汁为丸，如黍米大。每服十丸，煎人参汤送下，不拘时候。

【主治】风热痰实，肺气壅滞，涎流口出。

63608 前胡半夏丹

《普济方》卷三八七。为《卫生总微》卷十四“前胡半夏丸”之异名。见该条。

63609 前胡半夏汤

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】前胡 人参各三分 陈橘皮 半夏曲 枳壳 甘草 木香各半两 紫苏叶 茯苓各三分

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏半，生姜七片，煎至一盏，去滓，取七分热服，一日二三次。

【主治】①《鸡峰》：痰气客于上焦，呕逆不思饮食，头目昏眩。②《医统》：感冒停痰，咳逆。

63610 前胡吐热汤

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【异名】前胡汤（原书卷二十六）、前胡散（《圣惠》卷五十七）。

【组成】前胡 白术 赤茯苓 枳实（炙） 细辛 旋覆花 龙胆 杏仁（去皮尖双仁） 常山 松萝各三两 竹叶（切）一升

【用法】上切。以水一斗，煮取三升，去滓，分为三服。

【主治】①《外台》引《删繁方》：脾劳热，有白虫长一寸，在脾为病，令人好呕，胸中塞，呕而不出。②《嵩崖尊生》：胃咳，呕而不出。

【宜忌】忌酢物、桃、李、雀肉、生葱、生菜。

【加减】若腹中热满，加芒消、山栀子仁、黄芩各三两，苦参二两，加水二升。

【备考】方中枳实，《圣惠》作"枳壳"。

63611　前胡苏子饮

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】前胡　苏子　枳壳　半夏　橘红　桔梗　甘草

【主治】哮病，外有感冒，身发热者。

【加减】伤风，加防风；伤热，加薄荷、石膏；伤寒，加麻黄；身痛，加羌活；口干燥，加葛根；嗽不止，加桑白皮。

63612　前胡牡丹汤

【方源】《千金》卷四。

【异名】前胡汤(《圣济总录》卷一五一)。

【组成】前胡　牡丹　玄参　桃仁　黄芩　射干　旋覆花　瓜蒌根　甘草各二两　芍药　茯苓　大黄　枳实各三两

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取三升，分为三服。

【主治】妇人盛实，有热在腹，月经瘀闭不通，及劳热、热病后，或因月经来得热不通。

63613　前胡泻肝汤

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】前胡(去芦头)　大青　秦皮(锉)　干蓝　黄芩(去黑心)　细辛(去苗叶)　决明子各三两　栀子仁二两　石膏四两(碎)

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，入竹叶十片，车前叶七片(细切)，煎至八分，去滓，入芒消一钱匕，放温，食后、临卧服。

【主治】丹石毒上攻，目赤烦闷，热气，胸中澹澹。

63614　前胡建中汤

【方源】《千金》卷十九。

【组成】前胡二两　黄耆　芍药　当归　茯苓　桂心各二两　甘草一两　人参　半夏各六分　白糖六两　生姜八两

【用法】上㕮咀。以水一斗二升，煮取四升，去滓，纳糖，分四服。

【主治】大劳虚羸劣，寒热呕逆；下焦虚热，小便赤痛；客热上熏头目，及骨肉疼痛，口干。

【方论选录】《千金方衍义》：此以小建中、黄耆建中、内补建中，加前胡、半夏，以治胸中痰气；人参、茯苓，以治胃虚呕逆；去大枣者，恶其滞腻恋膈，滋痰助呕也。

63615　前胡建中汤

【方源】《千金翼》卷二十二。

【组成】前胡三两　生姜(切)　茯苓　黄芩各五两　桂心一两　人参一两半　当归　芍药　半夏(汤洗十遍)　甘草(炙)各二两

【用法】上㕮咀。以水一斗，煮取四升，分四服。

【主治】发背。

63616　前胡细辛散

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】前胡　细辛　茯苓　厚朴　芎　人参　半夏　甘草各二两

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盏，入生姜三片，煎至七分，去滓，食后服。

【主治】妊娠阻病，心中愦闷，嗜烦吐逆，恶闻食气，头目眩重，四肢百节疼烦，多卧少起，恶寒汗出，疲极体瘦。

63617　前胡枳壳汤

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】前胡(去芦头)　人参　赤茯苓(去黑皮)各一两　枳壳(去瓤，麸炒)　半夏(汤洗七遍去滑，焙)　桔梗(炒)　甘草(炙，锉)　桑根白皮(锉)　旋覆花(微炒)各半两　麦门冬(去心，焙)三分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，生姜三片，同煎至六分，去滓，食后温服。

【主治】上焦热结，头痛昏眩，胸膈烦闷，涕唾稠粘，痰实恶心，不欲饮食。

63618　前胡枳壳汤

《医学入门》卷六。为《圣惠》卷八十四"前胡散"之异名。见该条。

63619　前胡枳壳散

《小儿痘疹方论》。为《圣惠》卷八十四"前胡散"之异名。见该条。

63620 前胡犀角汤

【方源】《圣济总录》卷一〇八。

【组成】前胡(去芦头) 犀角屑 菊花 羌活(去芦头) 防风(去叉) 细辛(去苗叶) 甘草(炙,锉) 栀子仁 麦门冬(去心,焙) 生干地黄(焙) 蔓荆实 青葙子 决明子(微炒) 车前子(微炒)各一两 黄耆(锉)一两半

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎至八分,去滓,食后温服,一日二次。

【主治】伤寒后,两目昏暗,或生浮翳。

63621 前胡橘皮汤

《圣济总录》卷一八〇。为《圣惠》卷八十九"前胡散"之异名。见该条。

63622 前麓开翳散

【方源】《直指》卷二十。

【组成】白蒺藜(炒,捣去刺) 苍术(洗,童便换浸二宿,晒)各一两 蝉壳(洗,晒) 蛇蜕(去头尾及脊上一线皮,不堪用,用皂角水洗,新瓦焙) 菜花蛇皮 好川芎 杏仁(水浸,去皮) 防风 羌活 白芷各半两 华阴细辛 独活各四钱 白附子(生) 明烂石膏 荆芥穗 真蚌粉各三钱

【用法】上为细末。每服一钱,沸汤点,茶清调,以舌浸子药中良久,毒涎自出;又别换药,食后临卧服。

【主治】眼生翳障。

63623 前麓点翳膏

【方源】《直指》卷二十。

【组成】朱砂二钱 南硼砂一钱半 蕤仁二十一粒(用草纸去油,干为度) 真珠 烂石膏各半钱 熊胆一字 麝香少许

【用法】上为细末,用冬蜜研和,于铫内蒸,得粘,入角罐收,用时煎秦皮汁调,铜箸点于眼眦。泪出为效。

【主治】眼生翳障。

【备考】本方方名,《东医宝鉴·外形篇》引作"点翳膏"。

63624 前胡木香煮散

【方源】《传家秘宝》卷三。

【组成】前胡(去苗,锉) 柴胡(去苗) 木香 秦艽(去芦头) 官桂 舶上茴香各一两 槟榔三个(面裹煨熟用) 豆蔻一个(去皮) 芎䓖 甘草半两(炙黄) 青橘皮(汤浸去白瓤,焙)半两 甜葶苈半两(微炒)

【用法】上为散。每服一钱匕,生姜三片,同煎至六分,温服。

【功用】调顺三焦,平和胃气。

【主治】《圣济总录》:胃寒肠热,食已复饥,小腹痛。

63625 前胡麦门冬饮

【方源】《圣济总录》卷八十六。

【组成】前胡(去芦头) 麦门冬(去心,焙) 葳蕤 玄参 升麻 人参 射干 芍药 甘草(炙)各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,入生姜半分(切),赤小豆三十粒,煎至八分,去滓,食后服。

【主治】心劳客热,烦躁,头目昏眩。

63626 前胡泻肝除热汤

【方源】《外台》卷十六引《删繁方》。

【异名】前胡汤(《圣济总录》卷八十六)。

【组成】前胡 干姜 大青 细辛 秦皮 决明子 栀子仁 子芩各一两 淡竹叶(切)一升 车前子(切)一升 石膏八两(碎,绵裹)

【用法】上切。以水一斗,煮取三升,去滓,平旦分为三服。

【主治】肝劳虚热,两目为赤,闭塞不开,烦闷宛转,热气,胸里炎炎。

【宜忌】忌生菜。

【加减】须利,加芒消三两。

首

63627 首乌丸

【方源】《理伤续断方》。

【异名】何首乌丸(《普济方》卷四十六)。

【组成】何首乌十斤(黑豆半升,同蒸熟)

牵牛子十两(炒)　牛膝　薄荷各二十两　川乌二两　青木香五两　皂角二斤(一斤烧存性,一斤蜜炙用)

【用法】上为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,葱汤或薄荷汤送下,不拘时候。

【功用】宽筋。

【主治】风损。

63628　首乌丸

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】首乌 62 克　当归 62 克　女贞子 62 克　旱莲草 62 克　菟丝子 62 克

【用法】上为细末,以炼蜜为粘合剂,压制成 0.5 克片剂。每服 5～7 片,一日三次,或炼蜜为丸,每丸 7 克,一日服 2～3 丸。

【主治】斑秃。

63629　首乌丸

【方源】《中国药典》。

【组成】何首乌(制)360 克　地黄 20 克　牛膝(酒制)40 克　桑椹清膏 70 克　女贞子(酒制)40 克　墨旱莲清膏 48 克　桑叶(制)40 克　黑脂麻 16 克　菟丝子(酒蒸)80 克　金樱子清膏 70 克　补骨脂(盐炒)40 克　豨莶草(制)80 克　金银花(制)20 克

【用法】何首乌等十味为细末,用金樱子等三味清膏,加炼蜜与适量之水为丸;稍干后,再用剩余之墨旱莲清膏加炼蜜 10 克包衣,打光,干燥即得。口服一次 6 克,一日二次。

【功用】补肝肾,强筋骨,乌须发。

【主治】肝肾两虚,头晕目花,耳鸣,腰酸肢麻,须发早白,高血脂症。

63630　首乌汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十六。

【组成】首乌五钱　牛膝三钱　草薢　泽泻　甘草各一钱

【主治】颈项强痛,属肝血虚,肝火旺,筋燥强急者。

63631　首乌汤

【方源】《痢疟纂要》卷九。

【组成】何首乌五钱　郁李仁一钱半　当归一钱半　火麻仁二钱　枳实七八分

【主治】痢不应攻下而后重秘迫难支者。

63632　首乌汤

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】首乌 18 克　生地 15～31 克　丹皮 9 克　赤芍 9 克　当归 9 克　旱莲草 31 克　女贞子 9 克

【用法】水煎服。

【主治】脂溢性皮炎。

63633　首乌散

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】蒸首乌一两　当归五钱　川芎三钱(炒)　生地三钱　防风一钱　土茯苓三钱　土贝母一钱半　连翘一钱　上元桂五分　附子五分　乌梅一钱(去核)

【用法】竹叶、灯心为引,水煎服。

【主治】肾虚牙痛,两腮俱肿,饮食不能下咽。

63634　首乌散

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】蒸首乌二两　当归一两　川芎五钱(炒)　土茯苓三钱　土贝母三钱　防风一钱　连翘一钱　人中黄一钱

【用法】竹叶、灯心为引,水煎服。

【主治】大头瘟疫,头面肿甚,眼目不能视,饮食不能进。

63635　首乌散

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】赤色鲜首乌八钱(打碎)　当归五钱　青皮一钱五分　柴胡六分　草蔻仁三钱(研)　制半夏二钱　炙甘草五分

【用法】河井水煎,温服。

【主治】手太阴肺经之疟,寒甚脉弱者。

【加减】热重,加青蒿三钱;口渴,加知母二钱;寒甚,加煨姜三钱,大枣三枚;恶心,加灶心土三钱。

63636　首乌粥

【方源】《大众医学》(1980;7:22)。

【组成】制首乌 30 克

【用法】浓煎去滓，加大米烧粥食用。

【主治】老年性高血脂，血管硬化，大便干燥者。

63637 **首攻汤**

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】白芍五钱 当归二钱 茯苓五钱 半夏二钱 香附三钱 羌活五分 甘草 神曲各一钱

【用法】水煎服。

【主治】疟病初发之时，往来寒热，口苦耳聋，胸胁胀闷作痛，或呕或不呕。

63638 **首经散**

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】室女首经抹布（烧灰） 轻粉二分 冰片一分

【用法】上各为细末，外搽。

【主治】妒精疳疮，及诸疳。

63639 **首乌合剂**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】何首乌 18 克 黑脂麻 12 克 赤芍 12 克 白芍 12 克 合欢皮 12 克 红花 9 克 远志 9 克 夏枯草 12 克 当归 12 克 沙苑子 12 克 生地 12 克 熟地 12 克 丹参 12 克 龙胆草 12 克

【用法】水煎服。

【主治】白癜风。

63640 **首乌甘菊散**

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】何首乌 蔓荆子 石菖蒲 荆芥穗 甘菊花 枸杞子 威灵仙 苦参各等分

【用法】上为细末。每服三钱，蜜茶送下，不拘时候。

【主治】大风，眼断白仁，鼻梁崩塌，皮肤疮疥，手足皴裂，睡卧不稳，步履艰辛，筋骨疼痛，四肢少力；及紫白癜风。

63641 **首乌白芍汤**

【方源】《镐京直指》卷二。

【组成】制首乌三钱 北沙参三钱 银胡一钱五分 白茯苓三钱 黑驴胶二钱（蛤粉炒） 生白芍二钱 炒扁豆二钱 扁石斛三钱 生苡仁六钱 生谷芽五钱

【用法】水煎服。

【主治】泻久，伤及肝脾阴分，大人似损，小者疳劳。

63642 **首乌汤 1 号**

【方源】《临证医案医方》。

【组成】生地 熟地各 9 克 白芍 9 克 当归身 9 克 何首乌 9 克 枸杞子 12 克 菊花 9 克 女贞子 9 克 旱莲草 9 克 黑豆 30 克 鹿角胶 3 克 甘草 3 克

【功用】养血益肾。

【主治】脱发，头发变黄，逐渐脱落；斑秃。

63643 **首乌汤 2 号**

【方源】《临证医案医方》。

【组成】何首乌 9 克 生地黄 9 克 白芍 9 克 当归身 9 克 夏枯草 9 克 菊花 9 克 连翘 9 克 霜桑叶 9 克 黑脂麻 30 克 白茅根 30 克 丹皮 9 克 黑豆 30 克

【功用】养血凉血，益肾清脑。

【主治】青年白发，或须发早白。

63644 **首乌延寿丹**

《中药成方配本》引董香充方。为《良方合璧》卷上引董玄宰"秘传延寿丹"之异名。见该条。

63645 **首乌补益丸**

《实用中成药手册》。为《本草纲目》卷十八引《积善堂方》卷十八"七宝美髯丹"之异名。见该条。

63646 **首乌和疟汤**

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】赤色鲜首乌八钱（打碎） 当归五钱 鳖甲五钱 青蒿三钱 柴胡一钱 青皮一钱五分 草蔻仁三钱（研） 甘草五分（蜜） 煨老姜三钱 大枣三枚

【用法】水煎服。

【主治】瘴疟，脉弱，虚热不退。

【加减】胸口饱闷，加槟榔一钱五分，炒枳壳一钱五分；如恶心，加藿香三钱；痰多，加白

芥子三钱。

63647 首乌枸杞汤

【方源】《简明中医妇科学》。

【组成】首乌 枸杞 菟丝子 桑螵蛸 赤石脂 狗脊 杜仲各四钱 熟地八钱 藿香 砂仁各二钱

【用法】水煎服。

【主治】白带，属肾气虚弱者。

63648 首乌鳖甲汤

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】生首乌 炙鳖甲各一钱 乌梅肉二分 冰糖八分

【用法】上用雪水、滚水两钟，煎成一钟，去滓温服。

【功用】清滋阴血，截疟。

【主治】胎疟，病在阴分，血虚者，夜热神烦。

63649 首功玄黑散

《玉机微义》卷十五。为原书同卷引郭氏方“神效乌金散”之异名。见该条。

63650 首乌当归鳖甲饮

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】赤色鲜首乌二两(打碎) 怀牛膝一两(酒泡) 当归五钱 生鳖甲一两 广橘皮三钱

【用法】上用河井水煎，疟前温服，加好酒一钟更妙。

【主治】三阴疟，午时以后发疟者。

63651 首乌青蒿鳖甲饮

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】赤色鲜首乌八钱(打碎) 青蒿三钱 鳖甲五钱 当归五钱 柴胡一钱五分 草蔻仁三钱(研) 青皮二钱

【用法】水煎服。

【主治】虚热温疟之证，脉弱阴虚。

【加减】口干，加知母三钱，生甘草八分；恶心，加广藿香三钱，热甚烦躁，加石膏五钱。

养

63652 养元汤

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】当归 川芎 白芍(炒) 炙甘草 熟地 杜仲(炒去丝)各一钱 枸杞一钱八分 杏仁一钱五分 白茯苓一钱五分 金樱子一钱五分(去刺) 羊藿(酥炒，去边)一钱 石斛一钱四分 牛膝一钱八分

【用法】水三钟，煎一钟，空心服，晚复滓连服。十剂为妙。

【功用】补虚，益肾，种子。

【加减】如衰弱者，加山萸、肉苁蓉各一钱。

63653 养元汤

【方源】《医方简义》卷五。

【组成】生地五钱 归身二钱 白术二钱 条芩(炒)一钱 黄耆二至四五钱(蜜炙)

【用法】妊娠每月加减而服四剂，俟其气化有序而顺产。

【功用】养胎元。

【加减】始受之胎，一月足厥阴养之，加桑寄生三钱；二月，加川贝母二钱，减黄耆一半，加条芩一倍炒；三月，加川连六分，减黄耆一半；四月，去黄耆，加阿胶(冲入)，地骨皮三钱；五月，加茯苓、山药各三钱；一钱；六月，加川连五分，大枣三枚；七月，加知母(炒)一钱，天冬三钱，百合三钱，炙橘红八分；八月，去白术，加川连(酒炒)五分，党参三钱；九月，加党参三钱，杞子三钱，川芎八分，白芍(炒)一钱；十月，去白术，加川芎一钱，炒白芍一钱五分，党参三钱，枸杞子三钱，炙龟版三钱。

63654 养元粉

《景岳全书》卷五十一。为《红炉点雪》卷二“养元散”之异名。见该条。

63655 养元散

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】糯米一升 莲肉(去心)三两 怀庆山药三两 大鸡头实三两

【用法】用糯米一升，水浸一宿，沥干燥，慢

火炒令极熟，磨细罗过如灰面，将莲肉、山药、鸡头实碾末入米粉内，每日清晨用一钟，再入白糖二匙，或砂糖，用滚汤调食，其味甚佳，可以常食不厌。

【主治】脾胃病。

63656 **养元散**

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】糯米一升（水浸一宿，滤干燥，慢火炒令极熟） 干山药少许 胡椒少许

【用法】上为细末。每日清晨用半盏，再入砂糖少许，滚汤调服。其味极佳，且不厌人。

【功用】滋补。

【主治】泄泻，饮食少进。女人子宫虚冷，不能成孕，久服之，亦能怀孕。

63657 **养元散**

【方源】《红炉点雪》卷二。

【异名】养元粉（《景岳全书》卷五十一）。

【组成】糯米一升（水浸一宿，滤干，慢火炒令极干，为细末） 淮山药 芡实 莲肉各三两 胡椒末一钱

【用法】和匀。每日清晨用半盏，再入砂糖二匙，滚汤调服。

【功效】《景岳全书》：实脾，养胃气。

【主治】久泄，饮食少进。

63658 **养中汤**

【方源】《幼幼新书》卷二十七引张涣方。

【组成】大附子（炮裂，去皮尖脐）一枚 沉香 木香各半两 人参一两 官桂 半夏（汤浸七遍，焙干）各一两

【用法】上为细末。每服一钱，水一小盏，入生姜三片，煎五分，去滓。放温，时时服。

【功用】养脾胃。

【主治】呕吐不止。

63659 **养中汤**

【方源】《局方》卷四（吴直阁增诸家名方）。

【组成】半夏曲（炙）八钱 甘草（爁） 肉桂（去粗皮）各半两 罂粟壳（去蒂盖，蜜炙）二两半

【用法】上为细末。每服一大钱，水一盏，生姜四片，同煎至七分，通口服，不拘时候。

【主治】肺胃受寒，咳嗽多痰，胸满短气，语声不出，昼夜不止，饮食减少。

63660 **养中汤**

《不居集》上集卷十四。为《景岳全书》卷五十一“养中煎”之异名。见该条。

63661 **养中饮**

【方源】《产科发蒙》。

【组成】人参 白术 干姜 甘草 白扁豆 当归 阿胶 艾叶

【用法】上以水二合，煮取一合，去滓温服。

【主治】妊娠吐血。若因内伤气上逆者，其始胸背疼痛，或咳嗽连声不止。

63662 **养中煎**

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】养中汤（《不居集》上集卷十四）。

【组成】人参一二三钱 山药（炒）二钱 白扁豆（炒）二三钱 炙甘草一钱 茯苓二钱 干姜（炒黄）一二钱

【用法】水二钟，煎七分，食远温服。

【主治】中气虚寒，为呕为泄者。

【加减】如嗳腐气滞者，加陈皮一钱，或砂仁四分；如胃中空虚觉馁者，加熟地三五钱。

63663 **养气丸**

【方源】《鸡峰》卷二十。

【组成】丁香 胡椒 荜茇 木香 干蝎各半两 萝卜子一两

【用法】上为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮送下。

【主治】鼓胀。

63664 **养气丸**

【方源】《简易方》引叶氏方（见《医方类聚》卷八十八）。

【组成】木香 丁香各半两 厚朴（刮去皮，用生姜同研，杵碎，焙干）各等分 大麦糵（微炒，筛净） 白豆蔻（去皮，秤肉） 神曲（炒） 茴香（微炒）各一两 甘草（好者。炒） 诃子（炮，去皮核） 川干姜（炮）各半两 陈皮（去白）一两

【用法】上为末，面糊为丸，如绿豆大。每服三五十丸，食前人参汤送下。

【功效】调脾胃，进饮食，理虚滑泻痢。

【主治】一切气疾。

【备考】方中木香，《普济方》引《医方集成》作“白术”。

63665　**养气丹**

【方源】《局方》卷五(宝庆新增方)。

【组成】禹余粮石(火煅七次，醉淬七次，为末)　紫石英(火煅一次)　赤石脂(火煅一次)各半斤　代赭石(火煅七次，醉淬七次，为末)一斤　磁石(火煅十次，醋淬十次)半斤

上五石各贮之，各为细末，又以水研之。挹其清者，置之纸上，纸用筲箕盛，欲使细末在纸上，而水滴在下，挹尽而上。既干，各用藏瓶盛贮，以盐水纸筋和泥固济，阴干；以好硬炭五十斤分为五处，每一处用炭十斤，烧红作一炉子，煅此五药，以纸灰盖之；两日后，火尽灰冷，则再煅，如此三次，埋地坑内两日，出火毒，再研，人后药：

附子(炮，去皮脐)二两　肉苁蓉(净洗，酒浸一宿，焙干)一两半　当归(酒浸一宿，焙干)　茴香(炒)　破故纸(酒炒香熟)　木香(不见火)　肉桂(去粗皮)　巴戟(盐汤浸，打，去心)　肉豆蔻(面裹；煨)　丁香　山药　鹿茸(酥炙)　白茯苓(去皮)　沉香　远志(去心)各一两

已上各如法修制，同研为末，却入：

乳香(别研)　五灵脂(去砂，别研)　没药(去砂石，研)各一两

已上三味人众药同研，却入：

朱砂(或煅或蒸)　阳起石(略煅，或只用酒煮)　钟乳粉各一两

已上三味别研，临时入。

【用法】上为细末，用糯米粉煮糊为丸，每两作五十丸，阴干，入布袋内，擦令光莹。每服五丸至十丸，空心用温酒吞下，或姜盐汤、或枣汤送下亦可；妇人用艾醋汤吞下。

【功用】《局方》：助养真气，生阳逐阴，温平不僭，消磨冷滞，克化饮食，使五脏安宁，六腑调畅，百病不侵。②《玉机微义》：固滑脱，镇虚逆，复阳助阴。

【主治】诸虚百损，脾元耗惫，真阳不固，三焦不和，上实下虚，中脘痰饮上攻，头目昏眩，八风五痹；或卒暴中风，痰潮上膈，言语蹇涩，神昏气乱，状若瘫痪；及奔豚肾气，上冲胸腹连两胁，膨胀刺痛不可忍者；阴阳上下，气不升降，饮食不进，面无精光，肢体浮肿，五种水气，脚气上冲，腰背倦痛，夜梦鬼交，觉来盗汗，胃冷心痛，小便滑数，牵引小腹，足膝缓弱，步履艰难；妇人血海久冷，赤白带下，岁久无子，及阴毒伤寒，面青舌卷，阴缩难言，四肢厥冷，不省人事者，急服百丸，用生姜、大枣煎汤灌下，即便回阳，命无不活；或触冒寒邪，霍乱吐泻，手足逆冷，六脉沉伏，唇口青黑，腹胁攻刺；及男子阳事痿怯，脚膝瘦疼，腹脐虚鸣，大便自滑；兼疗膈胃烦壅，痰饮虚鸣，百药不愈者。

【加减】《中国医学大辞典》：肾虚，加熟地黄三钱。

63666　**养气汤**

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】香附子(圆实者，去尽黑皮，微炒)四两　甘草一两(炙)　姜黄(汤洗，浸一宿，用水淘去灰，以尽为度，焙干)二两

【用法】上为细末。每服一大钱，入盐点，空心服。

【功用】预防岚瘴。

63667　**养气汤**

【方源】《百一》卷十五。

【组成】茴香(炒)　丁香各半两　良姜三两(麻油炒)　甘草三钱(炙)　白豆蔻仁四钱

【用法】上为细末。每服二钱，入盐少许，沸汤调下，食前服。

【功用】养气散寒。

【主治】奔豚气。

【备考】本方方名，《普济方》引作“食气汤。”

63668 **养气汤**

【方源】《御药院方》卷四。

【组成】干姜（炮） 甘草（炙）各二两 白檀香（锉） 丁香各一两半 丁皮一两 胡椒二钱 盐二两半 人参二钱 白芷一钱

【用法】上药一处碾微碎，用慢火爁令香熟，乘热入瓷器中，密覆候冷，为细末，入器中，密盛勿令泄气。每服一钱，沸汤点服，不拘时候。

【功用】温暖脾胃，进美饮食。

【主治】冷气上攻心腹，胁肋胀满刺痛，口苦无味，噫气吞酸，痰逆呕吐，胸膈痞闷，不思饮食；或发霍乱，五膈五噎，一切气疾。

63669 **养心丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】茯神（去木） 人参（去芦头） 绵黄耆（蜜炙） 酸枣仁（去皮，别研成膏）各一两 熟干地黄（洗，焙） 远志（去心） 五味子 柏子仁（别研成膏）各半两 朱砂三分（研细，水飞）

【用法】上为细末，入二膏和匀研细，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后、临卧浓煎人参汤送下。

【主治】忧思太过，健忘怔忡，睡多恐惕，梦涉峻危，自汗不止，五心烦热，目涩昏倦，梦寐失精，口苦舌干，日渐羸瘦，全不思食。

63670 **养心丸**

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【组成】柏子仁（择净，微蒸，晒干，去壳）四两 枸杞子（水洗净，晒干）三两 当归（酒浸）二两 麦门冬（去心）一两 茯神（去皮心）一两 熟地黄（酒洗，蒸）二两 甘草（去粗皮）五钱 黑玄参（洗净）二两 石菖蒲（去尾，洗净）五钱

【用法】除柏子仁、熟地黄蒸过，石器内捣如泥外，余药为细末，和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四五十丸，临睡白汤送下。

【功用】宁心保神，益血固精，壮力强志。

63671 **养心丹**

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】菖蒲 紫石英 茯神 苁蓉 远志 麦门冬 豆卷 柏子仁 当归 细辛 卷柏 干姜 人参 石膏 泽泻 薯蓣 秦艽 丹参 熟地黄 桔梗 白蔹 前胡 防风 白术 半夏 桂各一两 牛黄 铁粉精 麝香 末砂各一分 金箔各一百片 （一方有山药 甘草 芍药各一两）

【用法】上为细末。枣肉为丸，如绿豆大。以牛黄等为衣。每服三十丸，人参汤送下。

【功用】补益心气，安神，去百邪，调顺营卫，补养肾气。

63672 **养心丹**

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】光明朱砂 明净乳香各一分 酸枣仁 白茯苓各半两

【用法】上为细末。以枣为丸，如梧桐子大。每服一丸，空心清净水吞下。

【功用】宽神，消虑，全志，通神明。

【主治】健忘。

63673 **养心丹**

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】酸枣仁（略炒，去皮，别研作膏） 茯神（去木） 人参（去芦） 绵黄耆（蜜炙） 柏子仁（别研）各一两 当归（去芦，酒浸） 熟干地黄（洗） 远志（去心） 五味子各半两 朱砂一分（研，水飞）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食后、临卧人参汤送下。

【功用】宁心定志，升降真火，调养荣卫。

63674 **养心丹**

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】远志（去心）七钱 当归 熟地 阿胶（炒） 柏子仁 酸枣仁 黄耆 茯神 龙齿 茯苓 紫石英各一两 丹参五钱（为衣）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，枣汤送下。

【主治】心血虚少，失心，神不守舍，恍惚，

怔忡，健忘

63675　养心丹

【方源】《医统》卷四十八。

【组成】生地黄　远志　当归　甘草(炙)各一两五钱　柏子仁　酸枣仁　川芎　人参各一两　茯神(去木)七钱　半夏曲　南星(制)　朱砂各五钱(另研为衣)　麝香一钱(另研)　石菖蒲　琥珀三钱　金箔二十片

【用法】上为细末。汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服五十丸，津咽，有痰姜汤下。

【主治】心虚手振。

63676　养心汤

【方源】《直指》卷十一。

【组成】黄耆(炙)　白茯苓　茯神　半夏曲　当归　川芎各半两　远志(取肉，姜汁淹焙)　辣桂　柏子仁　酸枣仁(浸，去皮，隔纸炒香)　北五味子　人参各一分　甘草(炙)四钱

【用法】上为粗末。每服三钱，加生姜五片，大枣二枚，煎，食前服。

【主治】①《直指》：心血虚少，惊惕不宁。②《医方简义》：劳淋、气淋。

【加减】加槟榔、赤茯苓，治停水怔悸。

【方论选录】《医方考》：《内经》曰：阳气者，精则养神。故用人参、黄耆、茯神、茯苓、甘草以益气；又曰：静则养脏，燥则消亡，故用当归、远志、柏仁、酸枣仁、五味子以润燥；养气所以养神，润燥所以润血；若川芎者，所以调肝而益心之母；半夏曲所以醒脾而益心之子；辣桂辛热，从火化也，《易》曰：火就燥，故能引诸药直达心君而补之，《经》谓之从治是也。

【备考】《古今医鉴》有生地黄一钱。

63677　养心汤

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【组成】酸枣仁(去壳，炒)一钱　人参三钱　当归(酒洗)八分　白茯苓(去皮)八分　茯神(去木)五分　生甘草二分　大黄连(酒炒)五分　麦门冬(去心)七分　白芍药(酒炒)七分　黄柏(酒炒)八分　远志(甘草水煮，去骨)五分　橘仁(去白)八分

【用法】上用水一钟半，加莲肉四个(去心)，煎至七分，食远服。

【主治】勤政劳心，痰多少睡，心神不足。

63678　养心汤

【方源】《医统》卷七十。

【组成】当归身　生地黄　熟地黄　茯神各一钱　人参　麦门冬各一钱半　五味子十五粒　柏子仁　酸枣仁各八分　甘草(炙)四分

【用法】水一盏半，加灯心、莲子，煎八分，食远服。

【主治】体质素弱，或兼病后思虑过多而不寐者。

【备考】《证治宝鉴》无柏子仁。

63679　养心汤

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】人参　山药　茯神　麦门冬　当归身　白芍　石莲肉　远志　酸枣仁　鸡头实　莲花须　子芩(酒洗)

【用法】上锉一剂。加生姜三片，大枣一枚，水煎服。

【主治】用心过度，心热遗精，恍惚多梦，或惊而不寐者。

【加减】气虚，加黄耆、白术；血虚，加熟地；遗久气陷，加川芎、升麻，去子芩。

【方论选录】《古今名医方论》引吴于宣：是方人参、茯神以神养心，枣仁、归、芍以母养肝，山药、门冬、黄芩以清养肺，莲须、芡实、石莲、远志以涩养精而升之，于是神明之君主泰然于天钧之上矣。此养心之旨也。

63680　养心汤

【方源】《回春》卷四。

【组成】辰砂(另研末，调入服)　远志(去心)　酸枣仁　石莲肉　芡实　莲心　天门冬　桔梗(去芦)　麦门冬(去心)　车前子　龙骨各等分　甘草减半

【用法】上锉一剂。加灯心二十寸，水煎服。

【功用】滋阴降火。

【主治】阴虚火动而遗精者。

63681 养心汤

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】人参 麦门冬(去心) 黄连(微炒) 白茯苓(去皮) 白茯神(去木) 当归(酒洗) 白芍(酒炒) 远志(去心) 陈皮 柏子仁 酸枣仁 甘草各等分

【用法】上锉,加莲肉五个(去心),水煎,温服。

【主治】劳心,痰多少睡,心神不定。

63682 养心汤

【方源】《济阳纲目》卷五十四。

【组成】黄耆 白茯苓 茯神 酸枣仁(炒去油) 人参 远志(去心) 五味子 辣桂各二钱半 甘草(炙)四钱

【用法】上锉。每服五钱,加生姜三片,大枣一枚,水煎服。

【主治】心血虚少,神气不安,令人惊悸怔忡。

【加减】停水怔忡,加槟榔、赤茯苓。

63683 养心汤

【方源】《玉案》卷四。

【组成】玄参 白术 麦门冬 当归 白芍 生地各一钱 川芎 天麻 紫石英 柏子仁 枣仁 陈皮各八分

【用法】加灯心三十茎,水煎服。

【主治】心虚胆怯,健忘怔忡,不能成寐者。

63684 养心汤

【方源】《医林绳墨大全》卷四。

【组成】黄连 白茯苓 茯神 麦冬 当归 芍药 甘草 远志 陈皮 人参 柏子仁 半夏 五味子 川芎 肉桂 莲肉四个(去心)

【用法】水煎服。

【主治】痰多少睡,心神不足。

63685 养心汤

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】炙黄耆一钱 茯神八分 川芎八分 当归二钱 麦冬一钱八分 远志八分 柏子仁一钱 人参一钱半 炙草四分 五味十粒(一方有元肉六枚)

【用法】加生姜,水煎服。

【主治】产后心血不定,心神不安。

【备考】《胎产指南》有枣仁。

63686 养心汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】天冬 麦冬 菖蒲 远志 白术 熟地 人参 茯神 牛膝 当归 黄耆 木通

【主治】健忘,或上盛下虚。

63687 养心汤

【方源】《医级》卷八。

【组成】人参 黄耆 茯苓 茯神 当归 川芎 柏子仁 枣仁 远志 甘草

【功用】培中益气,养肝脾,通肾气,宁心神。

【主治】心气不足,神志不安。

【加减】烦渴,加麦冬、五味子、桂圆。

63688 养心汤

【方源】《外科图说》卷一。

【组成】人参 神曲 白茯苓 赤苓 半夏 黄耆 肉桂 远志 五味 川芎 甘草 当归 枣仁 柏子仁 熟地

【用法】水煎,内服。

【主治】痈疽疔肿。

63689 养正丹

【方源】《吴直阁增诸家名方》引宝林真人谷伯阳《伤寒论》(见《局方》卷五)。

【异名】交泰丹。

【组成】水银 硫黄(研细) 朱砂(研细) 黑锡(去滓,秤,与水银结砂)各一两

【用法】上用黑盏一只,火上熔黑锡成汁,次下水银,以柳枝子搅匀,次下朱砂,搅令不见星子,放下少时,方入硫黄末,急搅成汁和匀,如有焰,以醋洒之。候冷取出,研如粉极细,用糯米粉煮糊为丸,如绿豆大。每服二十丸,加至三十粒,盐汤送服,或空心食前枣汤送下。

【功用】升降阴阳，既济心肾，却邪辅正，助阳接真。常服济心火，强肾水，进饮食。

【主治】元气虚亏，阴邪交荡，正气乖常，上盛下虚，气不升降，呼吸不足，头旋气短，心神怯弱，梦寐惊悸，遍体盗汗，腹痛腰疼；或虚烦狂言，口干上喘，翻胃吐食，霍乱转筋，咳逆不定；又治中风涎潮，不省人事，阳气欲脱，四肢厥冷。如伤寒阴盛，自汗唇青脉沉，最宜服之。及妇人产后，血气身热，月候不均，带下腹痛，悉能治疗。

【方论选录】《本事方释义》：黑铅气味甘寒，入足少阴；水银气味辛寒，能伏五金为泥，能行九窍；硫黄气味辛大热，入右肾命门；朱砂气味苦温，入心。虚风头旋，吐涎不止，阴阳二气不能交接者，诸药不能效验，万不得已，故用金石之品。惟恐药性悍戾，以枣肉和丸，以缓其性，盐汤送药，以达于下，欲药性之不即发于上也。

63690　**养正丹**

《普济方》卷二三七引《仁存方》。为《妇人良方》卷五"养正膏"之异名。见该条。

63691　**养正丹**

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】黑锡丹头二两　水银一两　朱砂末一两

【用法】用黑锡丹头就火微溶，入水银顿搅，勿令青烟起，烟起便走了水银；又入朱砂末一两，炒令十分匀和，即放地上，候冷为末，糯米糊丸，如绿豆大。每服三十丸，空心盐汤送下。

【功用】升降水火，助阳接真。

【主治】呃逆反胃，痰结头晕，腰痛腹痛，霍乱吐泻。

63692　**养正丹**

《医宗必读》卷六。为《幼幼新书》卷九引《养生必用》"至圣来复丹"之异名。见该条。

63693　**养正汤**

【方源】《时疫白喉捷要》。

【组成】生玉竹五钱　淮山药四钱(炒)　云茯苓三钱　熟地黄四钱　大生地三钱　酒白芍二钱　天花粉二钱　麦门冬二钱(去心)　首乌四钱(制)　女贞子三钱

【用法】水煎服。

【主治】白喉。

【宜忌】彻尽余毒，再服养阴之剂。

【备考】《喉科家训》有西归身、生甘草。

63694　**养正膏**

【方源】《妇人良方》卷五。

【异名】养正丹(《普济方》卷二三七引《仁存方》)。

【组成】鳖甲一两(醋炙)　青蒿一握　淡豉三十粒　葱白三茎　安息香一分(研)　桃、柳、桑枝各七茎　桃仁四十九个(去皮尖双仁)　天灵盖用匕头大一片(酥炙)

【用法】上药，隔夜以水一升浸至五更，煎至半升，再以童便半升同煎，取四合；又用槟榔一个(为末)，麝香一钱匕，将所煎药去滓调下，至日高二丈时，放温顿服。以衣覆出汗，审看十指，汗出如藕丝，五色臭秽；汗出后，仍泻下虫状恶物尽。甚者，旬日再服。

【功用】出汗，取虫，辟邪。

【主治】传尸。

63695　**养龙汤**

【方源】《解围元薮》卷四。

【组成】归尾　白芷梢　全蝎　僵蚕　蝉壳　风藤　菖蒲　木瓜　苦参　荆芥　甘草　薄荷　红花　生地　连翘　蔓荆子　首乌　米仁　鱼刺　牛蒡子　白蒺藜　威灵仙　金银花　五加皮　胡麻虱　养骨龙

【用法】水煎，加乳香、没药服。

【主治】大风瘫挛眉堕。

63696　**养目汤**

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】当归　熟地　葳蕤　白芍各五钱　山萸　茯苓　麦冬　白术　丹皮　枸杞各三钱　巴戟天二钱　柴胡三分

【用法】水煎服。

【主治】目痛，迎风流泪，至夜则目暗不明，

一见灯光，两目干涩。

63697 **养目汤**

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】熟地一两 白芍五钱 麦冬五钱 当归一两 葳蕤五钱 山茱萸四钱 北五味一钱 甘草一钱 甘菊花二钱 柴胡五分

【用法】水煎服。

【功用】大补肝肾。

【主治】患时眼之后，其目不痛，而色淡红，然羞明恶日，与目痛时无异，此乃内伤之目。

63698 **养生丹**

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】母猪大肠一尺（入朴消四两，两头扎住入瓦罐，水三碗煮将干，盐泥塞口，勿泄气，炭火煅存性，象牙末二两 刺猬皮二个（煅存性） 麝香一钱 猪悬蹄二十四个（切片，土炒） 川山甲二十四片（土炒） 乳香 没药 雄黄 地榆各三钱 大黄五钱 青盐七钱 白芷一两 明矾五钱 小活龟三个（连肉入罐内，用泥封口，煅存性） 蜂房一个（带子者）。焙干为末） 黄牛角鳃一个（煅存性） 朴消七钱 槐花五钱（炒） 黄蜡一两 自然铜（煅，醋淬七次）五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服三钱，空心老酒送下，一日二次，服至半月出管。一月全愈，不用生肌。

【功用】内消痔漏。

【主治】痔漏。

63699 **养生主**

【方源】《摄生秘剖》卷四。

【异名】归圆杞菊酒（原书同卷）、养生酒（《惠直堂方》卷一）。

【组成】当归身（酒洗）一两 圆眼肉八两 枸杞子四两 甘菊花（去蒂）一两 白酒浆七斤 好烧酒三斤

【用法】用绢袋盛之，悬于坛中，再入二酒封固，藏月余，不拘时候随意饮之。

【功用】补心肾，和气血，益精髓，壮筋骨，安五脏，旺精神，润肌肤，驻颜色。

63700 **养生汤**

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】黄耆二钱 当归 白芍 甘草各一钱

【用法】水煎，不拘时服。

【功用】补脾养血。

【主治】妇人三十二三岁，气血盛实，热结血闭，脐腹疼痛，手不可近者，先以三军丸荡其瘀秽后以本方润其营卫。

63701 **养生酒**

《惠直堂方》卷一。为《摄生秘剖》卷四“养生主”之异名。见该条。

63702 **养老丸**

【方源】《奇方类编》卷下。

【异名】养老丹（《集验良方》卷二）。

【组成】熟地八两 巴戟四两 山萸四两 北五味一两 薏苡仁三两（炒） 芡实四两 车前子一两（炒） 牛膝三两（酒炒） 山药四两（炒）

【用法】炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心滚水送下。

【功用】补益。

63703 **养老丹**

《集验良方》卷二。为《奇方类编》卷下“养老丸”之异名。见该条。

63704 **养老膏**

【方源】《集验良方》卷二。

【组成】建莲肉（去心，研末） 芡实肉（去壳，研末） 薏米粉（蒸熟，研末） 甜梨 大山楂 甜藕各等分（各熬膏）

【用法】先将梨、藕、山楂蒸熟，用麻布滤去滓，熬成膏，调莲肉三味细末为膏，酌量加白砂糖拌匀，晾干，收贮食之。

【功用】润燥清火，滋阴健脾，补益老人。

63705 **养血丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】牡丹皮 白芍药 卷柏 当归（洗，焙） 石斛 白茯苓（去皮） 巴戟（去心） 熟地黄（洗，焙） 肉苁蓉（酒浸一宿，

切，焙干)　杜仲(去粗皮，炙)　山药　柏子仁(别研)　白薇　枳壳(去瓤，麸炒黄色)　蒲黄(微炒)　肉桂(去粗皮)　京三棱(煨香，切)　蓬莪术(煨香，切)　枸杞子　覆盆子各一两　附子(炮，去皮脐)半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心，食前以温酒或米饮送下。

【功用】补血海，疗虚弱，调经，快三焦，进饮食，久服令人肥盛有子。

【主治】月事阻滞，腹胁作痛；或结坚块，面黄发落，时发寒热，身体羸瘦。

63706　养血汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】当归　生地黄　秦艽　肉桂　牛膝(去芦，酒洗)　杜仲(盐酒炒)　茯苓(去皮)　防风(去芦)各一钱　土茯苓一钱半　川芎五分　甘草三分

【用法】上锉一剂。水煎，临熟入酒少许同服。

【主治】腰痛，腿痛，筋骨疼痛。

63707　养血汤

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】藁本七分　防风　白芷　细辛各五分　川芎　白芍药　当归　熟地黄各一钱

【用法】上㕮咀。水煎熟，食前温服。

【功用】养血荣筋。

【主治】破伤风病久衰弱者。

63708　养血汤

【方源】《明医指掌》卷五。

【组成】当归二钱　生地黄二钱　玄参二钱　阿胶二钱　知母二钱　红花五分(酒洗)　桃仁五分(研泥)

【用法】上锉一剂。水二盏，煎八分，加生白蜜二匙服。

【主治】血气槁弱而成噎塞者。

63709　养血汤

【方源】《傅青主男科》卷下。

【组成】当归　生地　肉桂　牛膝　杜仲　破故纸　茯苓　防风各二钱　川芎五分　甘草三分　核桃一个　山萸　土茯苓各二钱

【用法】水煎服。

【主治】腰腿筋骨痛。

63710　养血汤

【方源】《麻科活人》卷二。

【组成】生地黄　当归身　红花　陈皮　甘草

【用法】生姜一片为引，水煎服。

【主治】心血不足，麻出白色。

63711　养血汤

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】当归(酒洗)　白芍　白术(蜜炙)　茯苓　香附(制)　青皮　柴胡各一钱　炙甘草五分

【用法】水一钟半，煎一钟，食前服。

【功用】平肝养血。

【主治】怒人大怒后，经血暴下，此暴怒伤肝，肝不藏血而血妄行所致。

63712　养血汤

【方源】《疯门全书》。

【组成】拣北耆一两　拣归身五钱

【主治】痨疯。

63713　养阴丸

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】龟版(酒炙)　黄柏(酒炒)　枳壳(麸炒)　干姜　炙甘草

【用法】上为末，醋为丸。一日二次，温汤送下。

【主治】血崩日久则血少，复亡其阳，白滑之物下流不止。

63714　养阴汤

【方源】《痘疹仁端录》卷十六。

【组成】川芎　当归　生地　芍药　五味　麦冬　黄芩　桔梗

【功用】养阴。

【主治】麻疹后。

63715　养阴汤

【方源】《麻科活人》卷二。

【组成】熟地黄　牛蒡子(炒，研)各八分

当归 白芍药 麦冬各七分 荆芥三分 川芎 薄荷各二分 元参 连翘各五分

【用法】水煎服。

【功用】养阴配阳。

【主治】麻疹久病，元气虚弱，或烦躁口渴，麻竟不收，凝滞在皮肤间者。

【加减】后剂加黄连二分五厘。麻疹女子经水适来，女子十四岁以后有出麻者，常恐天癸正行，血走气虚而成伏陷，宜去白芍、川芎、熟地黄，加生地黄。

【方论选录】秉真按：养阴汤，观其配合用量，不仅适应久病虚弱烦渴之证，实为麻疹收后之主方。盖其方用四物滋水以养血，用麦冬、玄参润肺以清心；再加翘、牛，略用荆、薄，兼解余毒，以清肌表；麻后应何证变，总不离此方出入加减，真用化毒清表汤后第一方也。惟麻疹刚收之后，余热犹存；生地黄相宜，熟地黄难用。《医宗金鉴》云：麻疹属阳，热盛则阴分受伤，血为所耗，故收后须以养血为主，可保万全。

63716 **养阴汤**

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】熟地黄 当归 川芎 白芍 人参 茯苓 陈皮 柴胡 羌活 香附（童便制） 郁金 甘草

【用法】水煎，食前服。

【功用】清神养荣。

【主治】师尼室寡经闭，每日上午神思昏愦，畏日羞明，心胸幽痛，稍涉劳动与行经时，其病更极。

63717 **养阴膏**

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】生地黄一两半 当归 赤芍药 牛膝各一两 乌药半两 牡丹皮一钱 茯苓 红花（炒令黄） 水蛭各一钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每日一丸，空心好酒化下。

【主治】室女气血相搏，经脉不行，体黄面肿，多胀减食。

【宜忌】忌醋及酸物等。

63718 **养阴膏**

【方源】《医钞类编》卷一。

【组成】地黄 麦冬 当归

【用法】水煎成膏，入韭汁、人乳、童便、芦根、桃仁泥和，细细呷之。

【主治】噎膈反胃，血槁消瘦。

63719 **养寿丹**

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】远志（去心） 菖蒲 巴戟（去心） 白术 茯苓 地骨皮 续断 枸杞子 甘菊花 细辛 熟地黄 车前子 何首乌 牛膝 苁蓉 菟丝子（二味酒浸） 覆盆子各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下。

【功用】补五脏，散麻痛，驻容颜，黑髭鬓，壮筋骨，久服不老。

63720 **养寿丹**

《遵生八笺》卷十七。为原书同卷“延寿酒药仙方”之异名。见该条。

63721 **养肝丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷六。

【组成】沉香一两（不见火） 穿心巴戟二两（去心） 鹿茸三两（爁去毛，锉成片，酒浸，炙） 附子四两（炮，去皮脐） 菟丝子（淘洗）五两（酒浸一宿，研成饼） 熟干地黄（自蒸者）六两（如铺中者，再蒸过）

【用法】上为细末，人麝香肉一钱半，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，温酒、盐汤空心任下。

【功用】镇心肾，润益五脏，调顺三焦。

63722 **养肝丸**

【方源】《济生》卷五。

【组成】当归（去芦，酒浸） 车前子（酒蒸，焙） 防风 白芍药 蕤仁（别研） 熟地黄（酒蒸，焙） 川芎 楮实子各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，温热水送下，不拘时候。

【主治】肝血不足，眼目昏花，或生眵泪，久

视无力。

63723　养肝丸

【方源】《朱氏集验方》卷八引梁国佐方。

【组成】白芍药　禹粮石(煅)　肉苁蓉　黄耆(蜜炙)　当归　茯神(去木)各一两　杜仲(炒)四两　鹿角胶(炒)一两半　川续断　柏子仁　牛膝　木瓜　石菖蒲各半两

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。早空心盐汤送下。

【功用】养血气，壮筋骨。

【主治】虚劳。

63724　养肝丸

【方源】《奇效良方》卷五十七。

【组成】当归(去芦，酒浸)　防风(去芦)　蕤仁(别研)　车前子(酒蒸焙)　白芍药　熟地黄各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，白汤送下，不拘时候。

【主治】肝血不足，眼目昏花，或生翳瞖，久视不明。

63725　养肝丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十五。

【组成】川芎　当归　白芍　熟地　防风　羌活

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，熟汤送下。

【主治】筋伤。

63726　养肝汤

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】沙参　石菖蒲　蝉蜕　当归　茯神　生地　枣仁　柴胡　陈皮　甘草

【用法】水煎服。

【主治】小儿受惊吓，伤其心肝，或闭肾气，致耳聋者。

63727　养肝散

【方源】《简明医彀》卷五。

【组成】夏枯草七两　香附子三两

【用法】上药用童便浸透，晒干为末。每服三钱，茶调下。

【主治】肝虚目痛，冷泪不止，畏明。

63728　养肾丸

【方源】《普济方》卷二二四引《医学切问》。

【组成】人参一两　破故纸一两

【用法】上为末，胡桃一百个，取肉为丸。每服五十丸，空心温酒送下。

【功用】补肾。

63729　养肾散

【方源】《百一》卷十一引《荆岑方》。

【异名】踊乌散(《普济方》卷一五六引《经验良方》)。

【组成】全蝎半两　天麻三钱　苍术(去粗皮)一两　草乌头(去皮脐)二钱(生用)　黑附子(炮，去皮脐)二钱

【用法】上为细末，拌匀。肾气，每服一大钱，豆淋酒调下(豆用黑大豆)，药气所至，麻痹少时，须臾疾随药气顿愈；骨髓中痛，用胡桃肉酒调下。

【主治】《局方》(淳祐新添方)：肾气虚损，腰脚筋骨间疼痛，不能步履，久病脚膝缓弱，风、寒、湿悉治之。

【宜忌】《妇人良方》：孕妇勿服。

【临证举例】脚气　忠州太守陈逢原传，云渠前知坊州，因暑中取凉食瓜，至秋忽然右腰腿间疼痛，连及膝胫，曲折不能，经月右脚艰于举动，凡治腰脚药服之无效。儿子云安刑曹似在商熙助教处得养肾散方服之，才一服，移刻举身麻痹，不数刻间脚遂屈伸，再一服即康宁。又，坊州监酒年几四十，虚损，两脚不能行步，试与此药，初进二钱，大腿麻木，遂能起立；再服二钱，大小拇指皆麻，迤逦可行；三服驰走如旧。太室居士得此方，乾道己丑岁在都州都纂府日，宋判院审言久病脚膝缓弱不能行，传之。数日来谢：此疾经年，无药不服，得方次日即合，二服见效，五服良愈，令有力，能拜起矣。后数日又云：因浴，遍身去薄皮如糊，肌骨遂莹，其效如神。

63730　养明饮

【方源】《续名家方选》。

【组成】黄柏 白芍药各一钱 人参 黄耆各七分 蔓荆子 葛根 升麻各五分 甘草二分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】老眼、虚眼,中气不振,饮食不进者。

63731 **养命丹**

【方源】《普济方》卷三八一引《傅氏活婴方》。

【组成】石胆一个 龙骨 麝香 龙胆草 芦荟 熊胆各等分

【用法】上为末。临卧涂之。

【主治】五疳传变脏腑,舌口生疮。

63732 **养金汤**

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十四。

【组成】生地 阿胶 杏仁 知母 沙参 麦冬 桑皮 蜜

【用法】水煎服。

【主治】喉燥痛,水涸火炎,肺金受克。

【宜忌】忌辛热收涩。

63733 **养肺丸**

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】人参(去芦头,取净) 官桂(去粗皮) 甘草(炒) 五味子 干姜(炒) 紫苑(去土取净) 细辛(去苗叶土)各一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每两作二十丸。每服一丸,绵子裹,口内含化,随津液下之,食后服。

【主治】风冷咳嗽,上气喘急,语声不出,喉中似噎。

63734 **养肺丸**

【方源】《全国中药成药处方集》(大同方)。

【组成】粟壳一两五钱 五味子二两五钱 姜半夏二钱 广陈皮二钱五分 生石膏 广木香各二钱 糖瓜蒌 麻黄各二钱五分 酒黄芩二钱 冬花 粉甘草二钱五分 百合三钱

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每丸重二钱。每次服一丸,开水送下。

【主治】咳嗽,肺气不清。

63735 **养肺汤**

【方源】《幼幼新书》卷十六引张涣方。

【组成】紫苑(洗去土,焙干) 半夏(汤洗七次) 款冬花 阿胶(炙)各一两 人参(去芦头) 桂心各半两

【用法】上为细末。每服一钱,水一小盏,入生姜二片,糯米五粒,煎至五分,去滓放温,时时服。

【功用】温养肺胃。

【主治】小儿嗽。

63736 **养肺汤**

【方源】《普济方》卷二十八引《卫生家宝》。

【组成】紫苑(去土)半两 款冬花半两 杏仁半两 五味子半两 白茯苓 半夏一两(汤洗十余次) 桂半两(去粗皮) 桔梗半两(微炒) 紫苏子半两(微炒)

【用法】上为末。每服三钱,水一盏,生姜十片,同煎至七分,去滓,微热服,不拘时候。

【主治】肺感寒邪,上气喘急,咳嗽无时,声音不出,痰唾稠。

63737 **养肺汤**

【方源】《直指》卷八。

【组成】人参 紫苑 赤茯苓 杏仁(不去皮) 真苏子 陈皮 桑白皮(炙) 款冬花 半夏曲 北梗 甘草(炙)各等分

【用法】上为粗末。每服三钱,加生姜四片,乌梅半个,食后煎服。

【主治】肺壅,上气痰嗽。

【加减】寒者,加桂。

63738 **养肺汤**

【方源】《症因脉治》卷四。

【组成】生脉散加黄耆 当归 紫苑 甘草

【主治】肺受寒凉,积寒泄泻。

63739 **养肺煎**

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】阿胶 人参 五味子 贝母 百合 桔便 芍药各一两 甘草 半夏曲各减

半

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服四十丸，食后生姜汤送下。

【主治】肺虚咳嗽。

63740　养荣丸

【方源】《医统》卷四十八。

【组成】白术(土炒)　黄耆　芍药　远志　当归(酒洗)　山药　熟地黄各一两　陈皮八钱　人参一两　白茯苓二两　山茱萸　生地黄各半两

【用法】上为细末，用鸭一只取血，入炼蜜为丸，如梧桐子大。每服八十丸，盐汤送下；冬月酒送下。

【主治】①《医统》：男妇气血两虚，精神短少，脾胃不足，形体羸瘦。②《饲鹤亭集方》：脾肺气虚，荣血不足，惊悸健忘，寝汗发热，食多无味，身体疲瘦，色枯气短，毛发脱落，小便赤涩；亦治发汗过多，身振肢摇，筋惕肉瞤。

【加减】咳嗽，加麦门冬、紫菀、贝母、款冬花各一两；热，加黄柏、知母各一两；遗精、带浊，加牡蛎一两，龙骨半两；吐血血腥，加牡丹皮、赤芍药各一两。

63741　养荣丸

【方源】《玉案》卷三。

【组成】黄耆　当归　桂心　甘草　陈皮各八分　白术　人参　白芍　生地各一钱　五味子九粒　茯苓　远志各二钱

【用法】水煎，温服。

【主治】五疸，体弱血虚，口淡耳响，微寒发热，小便白浊。

63742　养荣汤

【方源】《三因》卷十三。

【异名】人参养荣汤(《局方》卷五淳祐新添方)。

【组成】黄耆　当归　桂心　甘草(炙)　橘皮　白术　人参各一两　白芍药三两　熟地黄　五味子　茯苓各三分　远志(去心，炒)半两

【用法】上锉散。每服四大钱，水一盏半，加生姜三片，大枣二个，煎至七分，去滓，空腹服。

【功效】①《医方集解》：养荣。②《医方论》：三阴并补，气血交养。

【主治】心脾气虚，营血不足，倦怠无力，食少气短，惊悸健忘，夜寐不安，虚热自汗，咽干唇燥，消瘦，咳嗽痰白，皮肤干枯；或疮疡溃后气血不足，寒热不退，体倦瘦弱，食少气逆，疮口久不收敛。

①《三因》：积劳虚损，四肢沉滞，骨肉酸疼，吸吸少气，行动喘咳，小便拘急，腰背强痛，心虚惊悸，咽干唇燥，饮食无味，阴阳衰弱，悲忧惨戚，多卧少起；久者积年，急者百日，渐至瘦削；五脏气竭，难可振复；又治肺与大肠俱虚，咳嗽下利，喘乏少气，呕吐痰涎。②《校注妇人良方》：溃疡寒热，四肢倦怠，体瘦少食，面黄气短，不能收敛，或大疮愈后多服之。③《医方集解》：发汗过多，身振脉摇，筋惕肉瞤。

【加减】便精遗泄，加龙骨一两；咳嗽，加阿胶。

【方论选录】①《医方考》：人参、黄耆、白术、茯苓、甘草、陈皮，皆补气药也，荣血不足而补气，此大易之教，阴生于阳之义也。阴者，五脏之所主，故用当归泽脾，芍药调肝，熟地滋肾，五味益肺，远志宁心，五脏和而阴血自生矣。桂性辛热，热者入心而益火，辛者入经而利血，又心为生脉之源，故假之引诸药入心而养荣血于脉耳！②《名医方论》：柯韵伯：古人治气虚以四君，治血虚以四物，气血俱虚者以八珍，更加黄耆、肉桂，名十全大补，宜乎万举万当也。而用之有不获效者，盖补气而不用行气之品，则气虚之甚者，无气以受其补；补血而仍用行血之物于其间，则血虚之甚者，更无血以流行。故加陈皮以行气，而补气者悉得效其用；去川芎行血之味，而补血者因以奏其功。此善治者，只一加一减，便能转旋造化之机也。然气可召而止，血易亏难成，苟不有以求其血脉之主而养之，则营气终归不足，故倍

人参为君，而佐以远志之苦，先入心以安神定志，使甘温之品，始得化而为血，以奉生身。又心苦缓，必得五味子之酸以收敛神明，使营行脉中而流于四脏，名之曰养荣，不必仍十全之名，而收效有如此者。③《古方选注》：养营者，调养营气循卫而行，不使其行之度数疾于卫也。故于十全大补汤中减川芎行血之品，独用血分填补收敛之药，则营行之度缓于气分。药中加广皮行气之品，则卫行之度速。观其一减一加，便能调平营卫，使其行度不愆。复远志、五味者，经言：营出中焦，心经主之。以远志通肾，使阴精上奉于心，佐以五味收摄神明，一通一敛，则营有所主而长养矣。

【临证举例】贫血 《上海中医药杂志》(1985；1：35)：患者王某，女，50岁。患贫血7～8年，血色素5～7克之间。近两周来常有昏厥之象，面色不华，心慌耳鸣，少气懒言，易汗纳差，舌淡面胖，苔薄白，脉沉细。辨证属脾胃虚弱，气血不足。先用归脾汤7剂，继用本方大补气血。共服34剂，血色素上升至9.5克，症状逐渐消失。

【备考】本方改为丸剂，名"人参养荣丸"(见《中国医学大辞典》)。

63743 养荣汤

【方源】《杨氏家藏方》卷十五。

【组成】白芍药 川芎 熟干地黄（洗，焙） 当归（酒浸一宿，焙干） 青皮（去白） 姜黄 牡丹皮 五加皮 海桐皮 香白芷各半两 牛膝（酒浸一宿，焙干） 延胡索 没药（别研） 五灵脂（去砂石） 肉桂（去粗皮）各一分

【用法】上㕮咀。每服五钱，水一盏半，生姜五片，乌梅一枚，煎至一盏，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人血海虚弱，气不升降，心悸恍惚，时多惊悸，或发虚热，经候不调，可进饮食。

63744 养荣汤

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】白芍 川芎 当归 熟地 青皮 姜黄 川姜 丹皮 海桐皮 五加皮 白芷各等分

【用法】上㕮咀。每服五钱，水一盏半，加生姜五片，乌梅一个，煎至一盏，去滓温服，将此药送下紫桂丸七十粒，不拘时候。

【主治】妇人血海虚弱，心悸恍惚，时多惊悸，或发虚热，经候不调。

63745 养荣汤

【方源】《医学集成》卷三。

【组成】生地六钱 茯神五钱 枣仁 麦冬各三钱 五味十粒 桂圆三个 竹茹 灯心

【功用】养心安神。

【主治】心血虚少，以致不寐。

【备考】方中竹茹、灯心用量原缺。

63746 养荣汤

【方源】《疮疡经验全书》卷六。

【组成】当归三钱 白芍 川芎 丹皮 远志 龙胆草 夏枯草各一钱 青皮 柴胡各八分

【用法】用水一钟，煎八分服；滓再煎七分服。

【主治】梅疮，毒中肝经，先发便毒，嗣作筋痛，疮形如砂仁，甚则筋痿不起。

63747 养荣汤

《赤水玄珠》卷二十八。为《痘疹全书》卷下"益荣汤"之异名。见该条。

63748 养荣汤

【方源】《回春》卷二。

【组成】当归 川芎（去毛） 白芍（酒炒） 生地黄 麦门冬（去心） 远志（甘草水泡，去骨） 石菖蒲（去毛） 陈皮 芍药 白茯苓（去皮） 枳实（麸炒） 半夏（用生姜、牙皂、白矾煎水浸二三日） 南星（同上制） 黄连（姜汁炒） 防风 羌活 秦艽 甘草各等分

【用法】上锉一剂。加生姜三片，竹茹一团，水煎，入童便、竹沥、姜汁少许同服。

【主治】风中血脉，四肢不举、口不能言；及

痰迷心窍，不省人事，舌强不能语言，痰涎壅盛，口眼㖞斜，半身不遂。

63749 养荣汤

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】当归 川芎 续断 生地黄 羌活 甘草 白芷 白芍药 桂枝 防风 乳香

【主治】痘后手足不能伸屈。

63750 养荣汤

【方源】《慈幼新书》卷七。

【组成】川芎 当归 白芍 生地 人参 白术 黄耆 甘草

【用法】水煎服。

【主治】麻疹血虚，疹出色白，按之稍红。

63751 养荣汤

【方源】《医家心法》。

【组成】白芍 当归 远志 熟地 五味 肉桂 人参 黄耆 茯苓 白术 陈皮

【用法】姜、枣为引，水煎服。

【功用】补五脏。

【主治】①《医家心法》：大虚症。②《麻科活人》：麻疹脾肺气虚，营血不足，惊悸健忘，寝汗发热，食少无味，体倦肌瘦；女人麻疹初热正出已出之间，适遇经行，阴血重耗，麻后遍体浮肿者。

【宜忌】《麻科活人》：此方大补，斟酌用之。

【加减】虚寒甚者，当加附子以治之。

【备考】此方五脏皆补，无乎不到，凡属大虚证，勿论其脉与证，但服此方，其病悉退。

63752 养荣汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】川芎一钱半 当归二钱 炙草五分 桃仁十个

【用法】水煎服。

【主治】产后潮热有汗，大便不通，口燥舌干而渴，汗出谵语，便秘。

【加减】便秘，加肉苁蓉一钱，陈皮四分(炒)，麻仁二钱；汗多，加黄耆、麻黄根各一钱，人参二钱；燥渴，加麦冬、人参各一钱；腹满便实，加麦冬一钱，枳壳六分；汗出谵语，加茯神、远志、枣仁、柏仁、黄耆、人参、白术各一钱。

63753 养荣汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷六。

【组成】当归 小草 黄耆 枣仁 茯神 木香 人参 白芍 麦冬 炙甘草 柏子仁各一钱

【主治】①《杂病源流犀烛》：思虑多而怔忡，兼不寐，便浊。②《中国医学大辞典》：劳伤血崩。

63754 养荣汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十一。

【组成】当归 白芍 生地 熟地 赤苓 山栀 麦冬 陈皮各一钱 人参 甘草各五分 大枣二枚 乌梅一个

【主治】营血内伤，兼夫任、冲、手厥阴者。

63755 养荣汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷十七。

【组成】当归 白芍 熟地 生地 秦艽 黄芩 防风 甘草

【功用】滋养荣血。

【主治】风燥，病在表者，肌肤枯，毛发槁，爪枯。

63756 养荣汤

【方源】《会约》卷七。

【组成】当归二三钱 熟地三五钱 枸杞二钱 白芍(煨)一钱半 甘草(炙)一钱 肉桂一二钱

【用法】水煎，温服。

【功用】甘温养血，补胃和中。

【主治】气血虚寒，不能荣养心脾而痛，连绵不止，或按之熨之，而痛稍缓者。

【加减】如寒甚者，加附子一二钱；如气虚者，加人参；如脾虚痛而泻者，加白术二三钱；如中气虚寒，呕恶者，加半夏二钱，焦干姜一钱半；如气滞者，加香附一二钱。

63757 养胃丸

【方源】《圣济总录》卷六十二。

【组成】厚朴(去粗皮,锉作小块)一斤　丁香半斤　生姜五斤(取自然汁于银石器内,同厚朴文火煮尽姜汁,炒令干)　白术十两　人参十两

【用法】上为末。以煮枣肉为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心、食前米饮送下。

【主治】膈气,宿食不消。

63758　养胃丸

【方源】《玉案》卷四。

【组成】干丁香　甘草　陈皮　神曲(炒)　麦芽(炒)各二两　大附子(童便制)八钱　砂仁　肉豆蔻(面包煨)　白豆蔻各一两二钱

【用法】上为末,生姜四两煎汤法为丸。每服二钱,空心白滚汤送下。

【主治】脾胃虚冷,不思饮食,翻胃呕吐。

63759　养胃丹

【方源】《中藏经·附方》。

【组成】丁香一两半　白豆蔻仁半两　人参三分　甘草半两(炙)　干姜三两(炮,用干生姜尤佳)　半夏曲半两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每两作十丸。每服一丸,温汤化下,空心、食前服之;或细嚼,汤下亦可。

【功用】温中养胃,散饮思食。

【主治】脾胃不和,全不思食,中脘停寒,呕逆恶心,脏寒泄痢,腹痛肠鸣。

63760　养胃丹

【方源】《卫生总微》卷十一。

【组成】附子一枚(重半两者,炮裂,去皮脐)　赤石脂一两　干姜一两(炮)　诃黎勒皮一两

【用法】上为细末,粟米饭为丸,如黍米大,每服十粒,乳食前米饮送下。

【主治】小儿脏寒下痢,白脓频数。

63761　养胃丹

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】人参一两(去芦)　苍术二两(炒)　白茯苓一两　半夏(泡)二两五钱　陈皮一两五钱　藿香一两　草果一两　厚朴(姜炒)一两五钱　常山(酒蒸)二两　甘草(炙)五钱　乌梅四十九个(去核)

【用法】上为末,淡姜汤打糊为丸,如梧桐子大。每服七十丸,仍用淡姜汤送下。

【主治】疟久虚弱,经年累月。

63762　养胃汤

【方源】《三因》卷八。

【组成】厚朴(姜制炒)　藿香(去梗)　半夏(汤洗七次)　茯苓各一两　人参　甘草(炙)　附子(炮,去皮脐)　橘皮各三分　草果(去皮)　白术各半两

【用法】上锉散。每服四钱,水一盏半,加生姜五片,大枣一枚,乌梅半个,煎七分,去滓,空心服。

【功用】①《三因》:温胃消痰,进食下气,辟寒疫。②《岭南卫生》:辟山岚瘴气,四时瘟疫。

【主治】外感寒邪,内伤生冷,脾胃虚寒,腹痛肠鸣,或呕哕不食,或寒湿肢体疼痛,或疟邪发作多吐者。

①《三因》:胃虚寒,胫寒不得卧,淅淅恶风,洒洒恶寒,腹中痛,虚鸣,寒热如疟,唇口干,面目虚浮,呕哕吐泻,四肢疼痛,不思饮食;或伤寒湿,骨节皆痛。②《济生》:寒多热少,或但寒不热,头痛恶心,胸满啘呕,身体疼痛,栗栗振寒,面色青白,不进饮食,脉来弦迟。③《医方类聚》引《直指》:外感寒邪,内伤生冷。④《保命歌括》:食疟及感寒湿疟,发作多吐者。

63763　养胃汤

【方源】《易简方》。

【异名】人参养胃汤(《局方》卷二《淳祐新添方》)。

【组成】厚朴　苍术　半夏各一两　茯苓　人参　草果　藿香各半两　橘红三分　甘草一分

【用法】上㕮咀。每服四钱,水一盏半,加生姜七片,乌梅一个,煎至六分,去滓热服。先用厚被盖睡,连进此药数服,加以薄粥热汤之类佐之,令四肢微汗濈濈然,候干,则徐徐去被,

谨避外风,自然解散。若先自有汗,亦须温润以和解之。

【功效】温中解表,兼能辟山岚瘴气。

【主治】①《易简方》:外感风寒,内伤生冷,憎寒壮热,头目昏疼、肢体拘急,不问风寒二证,及内外之殊。兼能治四时瘟疫。②《济阴纲目》:妊娠疟疾,寒多热少,或但寒不热,头痛恶心,身痛,面色青白,脉弦迟。

63764 **养胃汤**

【方源】《医方大成》卷四引徐同知方。

【组成】白蔻仁 人参 丁香 缩砂仁 肉豆蔻 炮附子 粉草(炙) 沉香 橘红 麦芽 神曲各二钱半

【用法】上为细末。姜盐汤调下。

【主治】脾胃虚冷,不思饮食,翻胃呕吐。

63765 **养胃汤**

【方源】《婴童百问》卷十。

【组成】陈皮(去白)三钱半 甘草(炙) 半夏各三钱(泡) 人参 草果各二钱 白茯苓四钱 藿香七钱(洗) 青皮(去瓤) 苍术 三棱(煨) 蓬术(煨) 大腹皮各一钱半 乌梅五钱

【用法】上锉散。每服三钱,加生姜、大枣,水煎服。

【功效】温中快膈;辟山岚瘴气。

【主治】小儿外感风寒,内伤生冷;寒疟,脾胃虚寒。

63766 **养胃汤**

【方源】《育婴家秘》卷四。

【组成】草果仁 藿香各五钱 陈皮七分半 甘草 肉桂各二钱

【用法】上为末。加生姜、乌梅,水煎服。

【主治】感寒发疟。

63767 **养胃汤**

【方源】《回春》卷三。

【组成】香附 砂仁 木香 枳实(麸炒)各七分 白术(去芦) 茯苓(去皮) 半夏(姜汁炒) 陈皮各一钱 白豆蔻(去壳)七分 藿香 厚朴(姜汁炒)各七分 甘草(炙)二分

【用法】上锉一剂。加生姜三片,大枣一枚,水煎,食后服。

【主治】胸腹痞满。

【加减】瘦人心下痞闷,加炒黄连,去半夏;血虚中满,加当归、白芍,去半夏;食积中满,加炒神曲、山楂、麦芽,去白术、半夏;肥人心下痞闷,加苍术;气虚中满,加人参,去半夏;痰膈中满,加瓜蒌仁、贝母、桔梗、竹沥、姜汁少许,去白术、半夏;脾泄中满,加炒苍术、炒白芍,去半夏;内伤元气面痞满者,宜大补气也。

63768 **养胃汤**

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】当归(酒洗) 白芍(酒炒) 白术(去芦,炒) 白茯苓(去皮) 陈皮 藿香 砂仁 神曲(炒) 半夏(汤泡透,切片,用杏仁炒过,不伤胎气) 香附(炒)各等分 甘草减半

【用法】上锉。加生姜三片,大枣二枚,水煎服。

【主治】恶阻。

63769 **养胃汤**

【方源】《婴童类萃》卷中。

【组成】苍术一钱 厚朴 半夏 藿香 草果五分 人参 茯苓 陈皮 槟榔各七分 甘草五分 生姜三片

【用法】水煎服。

【功用】温中快胃。

【主治】疟,外感风寒,内伤生冷。

63770 **养胃汤**

【方源】《济阳纲目》卷十八。

【组成】人参 橘红 白豆蔻仁 丁香 砂仁 肉豆蔻 附子(炮) 沉香 麦芽(炒) 神曲(炒) 甘草(炙)各等分

【用法】上为细末。每服二钱,姜盐汤调下。

【主治】脾胃虚冷,不思饮食,呕吐翻胃。

63771 **养胃汤**

【方源】《诚书》卷七。

【组成】柴胡七钱 人参 当归 升麻

甘草(炙) 干姜 葛根 白术 羌活各一两 防风五钱 黄耆一两半 白茯苓三钱 白芍六钱 五味子二钱

【用法】上为散。每服二钱,水煎服。

【主治】内障昏花。

63772 养胃汤

《嵩崖尊生》卷十三。为《三因》卷九"藿香养胃汤"之异名。见该条。

63773 养胃汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】川芎一钱 当归三钱 藿香四分 炙草四分 茯苓 苍术 人参各一钱 陈皮四分

【主治】类疟疾,头痛无汗。

【加减】有痰,加竹沥、姜汁、半夏。

63774 养胃汤

【方源】《脉症正宗》卷一。

【组成】黄耆二钱 白术一钱 茯苓八分 甘草五分 砂仁五分 陈皮八分 神曲一钱 草蔻八分

【用法】水煎服。

【功用】养胃。

63775 养胃汤

【方源】《幼幼集成》卷三。

【组成】草果仁(姜制)五分 藿香叶一钱五分 真广皮(姜汁炒) 上桂心各一钱 炙甘草五分 生姜三片 乌梅一粒

【用法】水煎,热服。

【主治】感寒发疟。

63776 养胃汤

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】白芍一钱 茯苓二钱 白术一钱 甘草四分 山药三钱 黄耆二钱 党参四钱 木香五分 砂仁一钱 广皮一钱 大枣二枚 生姜三片

【主治】胃气虚弱,胃脘作痛。

63777 养胃汤

【方源】《古今名方》引《老中医临床经验选编》。

【组成】石斛 太子参 瓦楞子各 12 克 金铃子 玄胡 佛手各 9 克 黄连 2 克 吴茱萸 0.5 克 白芍 15 克 甘草 3 克

【功用】养胃疏肝,和里缓急,降逆止呕。

【主治】胃阴不足,脘胁疼痛,呕恶泛酸,或有口干口苦,胃脘灼热,舌质偏红或红绛,舌苔薄或薄黄,脉弦细或细而带数。常用于胃和十二指肠溃疡病、慢性胃炎等病而偏于胃热伤阴者。

【加减】阴虚肝旺血热妄行者,加炒栀子、牡丹皮、白茅根、大生地、藕节以清肝养阴止血;肝郁气滞,加柴胡、枳壳、当归以疏肝行气;肝胃不和,胃阴已伤,加沙参、麦冬、玉竹、生扁豆以养胃阴。

63778 养胃散

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】丁香 藿香叶(去土) 陈橘皮(去白) 白豆蔻仁 缩砂仁各等分

【用法】上为细末。每服半钱,乳食前煎生姜、枣汤调下。

【功用】养胃气,快胸膈,定哕逆,止呕吐,美进饮食。

【主治】小儿呕吐。

63779 养骨汤

【方源】《辨证录》卷五。

【组成】熟地二两 甘草一钱 金钗石斛 地骨皮 茯苓 牛膝各三钱

【用法】水煎服。

【主治】伤风身热后,肢体骨节皆痛,手足寒甚。

63780 养胎饮

【方源】《医方类聚》卷二二七引《吴氏集验方》。

【组成】熟地黄

【用法】上为末。每服二钱,食后温酒调下。

【主治】胎漏。

63781 养胎饮

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】当归三钱 白芍(酒炒)一钱五分

白术(饭蒸)　杜仲(盐水炒)各三钱　熟地四钱

【用法】水煎服。

【主治】血不养胎,胎动不安。

【加减】腹时痛,多寒者,加川椒五分,煨姜一片;有火者,加黄芩一钱。

63782　**养胎散**

【方源】《松崖医经》卷下。

【组成】当归　川芎　黄芩　陈皮　白术　香附各一钱　白芷五分　甘草二分

【用法】上切。用水二盏,煎去滓,调六一散一钱服。临月用。

【功用】养胎元。

【加减】虚者,加人参七分。

63783　**养津汤**

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】柴胡　半夏　甘草　蔓荆子各一钱　丹皮　麦冬各三钱　玄参四钱　神曲五分

【用法】水煎服。

【功用】补血养阴。

【主治】饥饱劳役,伤损津液,口渴舌干,又感风邪,头痛发热。

63784　**养津饮**

【方源】《古今名方》引广州市中医院肿瘤科方。

【组成】雪梨干　芦根各30克　花粉　玄参　荠苨各15克　麦冬　生地　桔梗各9克　杭菊花12克

【功用】养阴生津,润肺止渴。

【主治】鼻咽癌放疗后反应,症见口干,舌燥,恶心,胃纳下降;白细胞降低,口咽部粘膜充血水肿,糜烂及唾液腺受到损害而引起的咽喉干燥疼痛等。

【加减】咽痛、口腔糜烂者,加板蓝根、金丝草;口干不欲饮,舌苔白腻,加佩兰、金丝草。

63785　**养神丸**

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】远志(去心)　麦门冬(去心,焙)　菖蒲　熟干地黄(焙)　山芋　人参　茯神(去木)各一两　甘草(炙)半两　白术三分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后米饮送下。

【主治】心气不定,惊悸多忘。

63786　**养神丸**

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】阿片(极品)一钱　麝香二分　酸枣仁三钱　甘草三分

【用法】上为末,糊为丸,如粟粒大。每服十丸,临卧白汤送下。

【主治】不寝,咳嗽,诸般疼痛,及眼目赤痛,难眠等。

【宜忌】妄用过量,却有害。

63787　**养神汤**

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【组成】木香　橘皮　柴胡各一分　酒黄芩二分　人参　黄柏　白术　川芎各三分　升麻四分　苍术　麦蘖　当归身　黄连各五分　甘草　半夏各七分　黄耆一钱

【用法】上㕮咀。每服五钱,水二大盏,煎至一盏,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】精神短不得睡,项筋肿急难伸。

【宜忌】禁甘温,宜苦味。

63788　**养神汤**

【方源】《便览》卷三。

【组成】天门冬(去心)　麦门冬(去心)各一钱　归身一钱　丹参五分　贝母(去心)一钱　黄连五分　白术一钱　知母(去毛,酒炒)一钱　陈皮一钱　菖蒲五分　五味子九粒

【用法】加生姜三片,水煎,食远服。

【功用】清爽精神。

【主治】勤读诵,劳苦者。

63789　**养神酒**

【方源】《同寿录》卷一。

【组成】当归身二两　大熟地三两　甘枸杞二两　白茯苓二两　山药二两　苡仁一两

木香五钱 枣仁一两 续断一两 麦冬一两 丁香二钱 建莲肉(去心)二两 大茴五钱 桂圆肉半斤

【用法】上将茯苓、山药、苡仁、建莲为细末,余药切为饮片,全装细绢袋,入好酒二十斤,隔汤蒸透,停数日饮之。

【功用】生津健脾,安神定魄,平人可以常服。

63790 **养神散**

【方源】《痘疹一贯》卷六。

【组成】人参(去芦) 白术(土炒) 白茯苓 石菖蒲 远志(去心,甘草水煎) 枣仁(炒) 甘草(炒)各等分

【用法】上为细末。每服三五分或七八分,用滚水调服。

【主治】小儿惊痫愈后。

63791 **养神膏**

【方源】《理瀹》。

【组成】牛心一个(麻油先熬,去滓,无牛心,用龟板、石莲肉、龙眼肉三味代之) 党参 熟地 茯苓 黄耆 白术 当归 远志 枣仁 柏子仁 益智仁 麦冬 木鳖仁 半夏各一两 酒芍 五味子 陈皮 甘草各五钱 黄连四钱 肉桂二钱 陈胆星八钱

【用法】麻油熬,黄丹收,入朱砂七钱,生龙齿、郁金、菖蒲各五钱,搅匀,摊贴患处。

【主治】一切神病。如老人心虚不眠者,用之甚妙。

63792 **养真丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】羊肚一枚(去膏膜) 羊肾一对(去膜) 白术二两(炒) 神曲一两半(炒) 丁香(不见火) 荜茇各七钱半 沉香(不见火) 熟干地黄(洗) 大附子(炮,去皮脐) 干姜(炮,洗) 荜澄茄 白茯苓(去皮)各一两 当归(去芦,酒浸) 厚朴(去粗皮,姜制,炙) 白豆蔻仁 人参(去芦) 半夏曲 钟乳粉各半两 天门冬三两半(去心) 益智一两

【用法】上㕮咀。用羊肾切细,入在羊肚子中,以线缝肚子口,于净甑蒸极熟为度,趁热于木臼中捣碎,晒干或焙干,再研为细末,用熟枣肉为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,空心、食前米饮送下。

【功用】补诸虚弱。

【主治】脏腑不固。

63793 **养真丸**

【方源】《普济方》卷二二四引《余居士选奇方》。

【组成】当归(去芦,酒浸一宿,汤洗过,焙干) 熟地黄(洗净,焙干)各三两 北五味子(去梗)一两 川芎 人参 茯苓 白术 黄耆各一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前米饮吞下。

【功用】内补腑脏,外充百脉,滋血平气,调筋强力,进食养精。

【宜忌】宜常服。

63794 **养真丸**

【方源】《妇人良方》卷九。

【组成】鹿茸 当归 肉苁蓉 禹余粮 菟丝子 覆盆子 熟地黄 紫石英 海螵蛸各二两 五味子 真琥珀 白芍药 川芎 桑寄生 卷柏 艾叶 川姜 坚白茯苓 人参 牡蛎 酸枣仁各一两 钟乳粉四两

【用法】上为末。酒煮面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食前温酒送下,一日三次。吃后用粥饭压之。

【主治】妇人血虚气惫,阴阳不升降,久不成妊娠者。

63795 **养真丸**

《普济方》卷二一九。即《御药院方》卷六"养真丹"。见该条。

63796 **养真丸**

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【异名】养真丹(《外科真诠》卷上)。

【组成】当归 川芎 白芍 天麻 羌活 熟地 木瓜 菟丝

【用法】炼蜜为丸。盐汤送下。外以艾、菊

花、薄荷、防风、藁本、藿香、甘松、蔓荆、荆芥煎汤洗之。

【主治】①《嵩崖尊生》：头发脱落成片。②《外科真诠》：油风毒。

【备考】《外科真诠》本方用量各等分。

63797　养真丹

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】补骨脂(炒)　益智仁　晚蚕蛾(微炒)　没药(研)　丁香　青盐(研)　川山甲(炙)各半两　茴香　白术　乳香(研)　南青皮各三钱　沉香(锉)　香附子(炒)　姜黄　薯蓣　木香　甘草(炙)　巴戟(去心)各一两　川楝子(去皮及子，麸炒黄色)一钱　牛膝(酒浸一宿)七钱　苁蓉(酒浸一宿)七钱　檀香七钱　苍术三两(酒浸二宿)　蛤蚧一对　缩砂仁半两

【用法】上为细末，酒浸面糊为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心及食前温酒送下，一日二次。

【主治】阴衰消小，痿弱不举。

【备考】本方方名，《普济方》引作“养真丸”。

63798　养真丹

《元戎》卷十，为原书同卷“小风髓丹”之异名。见该条。

63799　养真丹

【方源】《医学入门》卷四。

【组成】四物汤加羌活　天麻各等分

【用法】炼蜜为丸，如鸡子大。每服一丸，木瓜、菟丝子浸酒送下。

【主治】肝虚，为四气所袭，手足顽麻，脚膝无力，及瘫痪痰涎，半身不遂，言语謇涩，头目昏眩，营气凝滞，遍身疼痛；兼治产后中风，坠堕瘀血。

63800　养真丹

《外科真诠》卷上。为《嵩崖尊生》卷六“养真丸”之异名。见该条。

63801　养真汤

【方源】《医方类聚》卷一五三引《经验秘方》。

【组成】苍术(净)四两(用姜四两制，微炒黄色，同炒)　厚朴四两(去皮，同上制炒)　人参　白术　木香　藿香　茯苓(去皮)　青皮(去白)　陈皮　槟榔　缩砂　广术(煨)　泽泻　甘草(锉，炒)　干姜各一两　小枣七十个(焙干)

【用法】上为极细末。每服二钱，煎生姜、枣汤，空心调服。

【主治】脾胃不和，中脘气闷，心腹胀满，不思饮食，呕吐痰噫，逆气吞酸，面色痿黄，肌肉消疲，腹胁刺痛，便利不调，或泻痢不止，少力嗜卧，体重节重，五劳七伤，山岚瘴气，八般疟疾，及治咳嗽，脾胃虚弱，食饮不化，

【宜忌】老幼气弱皆可服。

63802　养真汤

【方源】《回春》卷六。

【组成】当归(酒洗)　川芎　白芍(酒炒)　益母草　香附(酒、醋、米泔、童便同浸，炒)　熟地黄(姜汁炒)　山茱萸(去核)　白茯苓(去皮)　栀子(炒)　小茴(酒炒)　陈皮各等分

【用法】上锉六剂，水煎服尽。经通后，作丸服。

【主治】妇人经闭不通，脐下有块，已经三载，颜色如故，百药无功者。

63803　养真汤

【方源】《血证论》卷七。

【组成】人参三钱　白术三钱　云苓三钱　甘草一钱半　山药三钱　莲米三钱　麦冬三钱　五味八分　黄耆三钱　白芍三钱

【用法】水煎，去头煎，只服二三煎。

【功用】养脾。

【备考】去头煎者，取燥气尽去，遂成甘淡之味，盖土本无味，无味即为淡，淡即土之正味也。此方取淡以养脾，深得其旨。

63804　养夏汤

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】麦冬三钱　元参三钱　五味子一钱　白术五钱　甘草一钱　香薷八分　六曲二分　茯苓三钱　陈皮五分

【用法】水煎服。

【功用】健脾润肺，清凉去暑。

63805　养脏丸

【方源】《杨氏家藏方》卷七。

【组成】生硫黄一两　干姜（炮）　肉豆蔻（面裹，煨香）　附子（炮，去皮脐）　山药　鹿角霜各三两

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，渐加至五十丸，食前、空心温米饮送下。

【主治】肠胃虚寒，泄泻无度，不进饮食。

63806　养脏丹

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】猪大脏半斤　大附子二只（炮，去皮脐）　厚朴（姜制，炒为末）四两　硫黄二两（研细，同厚朴入猪大脏内，以麻绳系定两头，用水五升煮干，取出细研）　龙骨（生用）　肉豆蔻（面裹煨）　木香（不见火）　白茯苓（去皮）　牡蛎（煅）　大诃子（炮，去核）　茴香（淘去沙，炒）各一两　破故纸二两（炒）

【用法】上为细末。入麝香一钱，薄面糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心、食前盐汤或饭饮送下。

【主治】脾元虚弱，久泻不止，肠胃不固，致成五泄。

63807　养脏汤

【方源】《幼幼新书》卷七引张涣方。

【组成】川当归一两　沉香　丁香　白术　桂心　川芎各半两

【用法】上为细末。每服一钱，水八分，入生姜二片，煎至四分，去滓放温，时时滴口中。

【主治】躯啼。婴儿在胎之时，其母将养一切不如法，及取凉饮冷过度，冷气入儿腹胃，使胎气不强，致生下羸弱多病，俯仰多啼。

63808　养脏汤

【方源】《幼幼新书》卷二十九引张涣方。

【组成】当归（洗，焙干）　乌梅肉（炒干）　干姜　黄耆　白术（炮）　龙骨各一两

【用法】上为细末。每服一钱，水一小盏，生姜、粟米各少许，煎至五分，乳食前去滓温服。

【主治】白痢频并。

63809　养脏汤

【方源】《续易简》卷四。

【组成】厚朴（去皮，姜制）　肉豆蔻（面裹煨）　苍术（米泔浸，锉，炒）　赤茯苓各二钱半　木香　橘红各二钱　甘草（炙）一钱

【用法】上锉散。每服四钱，水一盏半，加生姜五片，大枣一枚，煎八分，去滓，食前温服。

【主治】湿毒痢，所下如豆羹汁，心腹刺痛，腰腿沉重。

63810　养脏汤

【方源】《陈氏幼科秘诀》。

【组成】白术八分　芍药六分　茯神七分　川芎五分　藿香六分　甘草四分　木香三分　钩藤三分　泽泻　肉豆蔻各七分

【用法】水一钟，生姜三片，煎服。

【主治】小儿生下身青白无血色，日夜啼不止，体仰而躯，腹满不乳，大便青白，是在胎为风冷所伤而然，时时吐哯。

63811　养脏汤

《直指小儿》卷四。为《局方》卷六（绍兴续添方）“纯阳真人养脏汤”之异名。见该条。

63812　养脏汤

【方源】《普济方》卷三六一。

【异名】养脏散（《金鉴》卷五十）。

【组成】川当归一两　沉香半两　丁香半两　白术半两　桂心半两　川芎半两　木香半两

【用法】上为细末。每服一钱。水八分，生姜二片，煎至四分，去滓放温，时时滴口中。

【主治】躯啼。

63813　养脏汤

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】五倍子　白矾　蛇床子各等分

【用法】上为末。水煎浸洗,洗后用赤石脂末少许放在芭蕉叶上,频用托入。

【主治】小儿久痢脏寒,肛门出不收。

63814　**养脏汤**

【方源】《痘疹金镜录》卷一。

【组成】白术　厚朴　陈皮　茯苓　甘草　槟榔　枳壳　木香　黄连　芍药　莲肉　诃子

【用法】加生姜、大枣,水煎服。

【功用】平调脏腑,去积和中。

【主治】痢疾。

【加减】红痢,加当归、地榆、乌梅;白痢,加干姜;赤白相兼,加当归、干姜;纯血,加生地、当归、地榆、黄芩;腹痛,加芍药、木香;久痢,加粟壳(蜜炙);禁口,加石莲、老米;干呕,加藿香;发热,加柴胡、知母;元气下陷,加人参、柴胡;胸膈不宽,加砂仁;作渴,加麦门冬、五味子、天花粉;里急后重,加木香、枳壳;小便不利,加滑石、猪苓、泽泻。

63815　**养脏散**

《金鉴》卷五十。为《普济方》卷三六一"养脏汤"之异名。见该条。

63816　**养脏散**

《全国中药成药处方集》(吉林方)。即《局方》卷六(绍兴续添方)"纯阳真人养脏汤"改为散剂。见该条。

63817　**养容方**

【方源】《奇方类编》卷下。

【组成】白菊花一两　梨汁半碗　白果一两　白蜜一两　人乳半钟　白酒酿半钟

【用法】先将白菊花、梨汁以好酒煎浓汁,再将白果捣烂,并蜜、乳研在一起,卧时搽面上,次早洗之,颜如童子。

【功用】养容。

63818　**养营汤**

【方源】《观聚方》卷六引《示儿仙方》。

【组成】人参　茯苓　甘草　当归　芍药　酸枣　附子　柏子仁　紫石英　川芎　黄耆　官桂　木香　远志各等分

【用法】每服三钱,加生姜、大枣,水煎成,取雄鸡冠滴血,旋入竹沥及童便,同妙香散服。

【功用】滋补营卫,收敛心气。

【主治】汗过多,不语。

63819　**养营汤**

【方源】《不知医必要》卷四。

【组成】党参(去芦,米炒)　枸杞各一钱五分　山药(炒)二钱　熟地　当归各三钱　炙草一钱　生姜二片

【用法】水煎服。

【功用】养营血。

【主治】因血崩、小产去血过多,心无所养而作痛。

【加减】如有热,去生姜,加酒炒白芍二钱。

63820　**养营汤**

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】人参　白术(蜜炙)　茯苓　黄耆(蜜炙)　熟地黄　当归　陈皮各一钱　白芍二钱　肉桂　炙甘草各五分　生姜三片　大枣二枚

【用法】水煎服。

【主治】妇人三十二三岁经证,赋禀衰弱,或素有失血之证,或生育过多,血海干枯,或房室纵肆过伤阴血,或子多乳众,伤其血液,以致经闭失血过多者。

63821　**养婆汤**

《百一》卷六。为《苏沈良方》卷四"健脾散"之异名。见该条。

63822　**养筋汤**

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】白芍一两　熟地一两　麦冬一两　炒枣仁三钱　巴戟天三钱

【用法】水煎服。

【功用】补心、肝、肾,养筋。

【主治】行役劳苦,动作不休,以至筋缩不伸,卧床呻吟,不能举步,遍身疼痛,手臂痠麻。

63823　**养脾丸**

【方源】《局方》卷三。

【异名】大养脾丸（《岭南卫生方》卷中）。

【组成】大麦蘖（炒） 白茯苓（去皮） 人参（去芦）各一斤 干姜（炮） 缩砂（去皮）各三斤 白术半斤 甘草（锉，爁）一斤半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两作八丸。每服一丸，细嚼，生姜汤送下，食前服。

【功用】养胃进食。

【主治】①《局方》：脾胃虚冷，心腹绞痛，胸膈满闷，胁肋虚胀，呕逆恶心，噫气吞酸，泄泻肠鸣，米谷不化，肢体倦怠，不思饮食。②《普济方》：小儿躽啼。

63824 养脾丸

《鸡峰》卷十二，为《圣济总录》卷四十四"大养脾丸"之异名。见该条。

63825 养脾丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】钟乳粉 人参（去芦） 白茯苓（去皮） 附子（炮，去皮脐） 吴茱萸（汤泡七次，炒） 细辛 南木香（不见火） 枳实（麸炒） 肉豆蔻（面裹煨） 青皮（去瓤） 金钗石斛 白术（麸炒） 干姜（炮洗） 麦蘖（炒） 神曲（炒） 丁香（不见火） 川椒（去目，并合口者，炒出汗） 陈皮（去白） 益智仁 缩砂仁 诃子肉 槟榔 肉桂（去皮，不见火） 厚朴（去粗皮，锉，姜制，炒）各等分

【用法】上为细末。炼蜜为丸，如豌豆大。每服三五十丸，空心米饮送下。

【主治】脾胃虚弱，胸膈痞闷，心腹疠痛，四肢少力，腹胀肠鸣，饮食不化。

63826 养脾丸

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】缩砂（连壳用） 干姜（炮，洗）各半斤 麦蘖（炒） 白术（炒） 藿香叶（去土） 人参（去芦） 白扁豆 厚朴（去粗皮，锉，姜制，炒） 橘红 白茯苓（去皮） 神曲（炒） 丁香各五两（不见火） 甘草七两（炙）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每两分作八丸。每服一丸，空心细嚼，生姜汤送下。

【主治】脾胃虚弱，胸膈痞闷，心腹疠痛，四肢少力，腹胀肠鸣，饮食不化。

63827 养脾丸

【方源】《普济方》卷三九六。

【组成】附子一枚（重半两。炮制，去皮脐） 赤石脂 川姜 诃子各一两

【用法】上为细末，粟米饮为丸，如黍米大。每服十粒，食前粥饮送下。

【主治】便脓频数。

63828 养脾丸

【方源】《袖珍小儿》卷六。

【组成】白术 茯苓（去皮） 干姜（炮） 黄连（炒） 木香 肉豆蔻（面裹，煨去油）（一方无干姜）

【用法】上为极细末，煮面糊为丸，如黍米大。灯心、糯米同煎汤送下，不拘时候。

【主治】小儿脾虚泄泻。

63829 养脾丸

【方源】《痘疹心法》卷十二。

【组成】人参 白术 当归 川芎各一钱半 木香 青皮 黄连 陈皮（炒）各一钱 砂仁 山楂肉 神曲（炒） 麦芽（炒）各五分

【用法】上为细末，水调神曲糊为丸，如麻子大。每服三五十丸，陈仓米饮汤送下。

【主治】①《痘疹心法》：痘疹伤食，但脾中满或痛，脾胃素弱者。②《金鉴》：惊泻，粪稠若胶，带青色。

【方论选录】《准绳·幼科》：参、术助气以补脾，芎、归活血以滋脾，曲、芽、青、楂消食以健脾，砂、陈、木香通气以和脾，黄连清火以厚脾。凡病后能食不节，面黄腹饱，或泄泻，或疳积，此方治之，统名养脾。

【备考】本方制成汤剂，名"养脾汤"（见《痘学真传》卷七）。

63830 养脾丸

【方源】《保命歌括》卷五。

【组成】人参 麦芽（炒） 神曲（炒） 归身各七分 白术一两半 苍术（制） 陈皮 厚朴（姜汁炒） 莲肉 白茯苓 山药各一两

砂仁八钱　炙草半两　木香一钱半

【用法】上药各制取末，和匀，用粳米粉、荷叶浸水煮糊为丸，如小豆大。每服五七十丸，米饮送下。

【功用】养脾进食，调理胃气，和畅营卫。

【主治】饥困伤力。

63831　**养脾丸**

【方源】《幼科指南》卷四。

【组成】人参　白术　茯苓　炙草　白芍(酒炒)　炙耆　陈皮　归身　山药　莲肉各一两　神曲五钱　肉桂二钱

【用法】荷叶水煮粳米糊丸。米汤送下。

【功用】补脾。

【主治】小儿脾病，困倦不思饮食，兼见肾症，羸瘦痿弱，嗜卧不起。

【备考】本病宜脾肾兼补，补肾，地黄丸主之；补脾，养脾丸主之。

63832　**养脾丸**

【方源】《片玉心书》卷五。

【组成】苍术(制)五钱　厚朴三钱　陈皮五钱　砂仁二钱　草果仁二钱　神曲(炒)三钱　益智仁二钱　茯苓三钱　麦芽(炒)三钱

【用法】共为末，酒糊为丸，如粟米大。米饮送下；呕吐，煨姜汤送下，脾胃虚弱，米汤送下；食积，山楂汤送下；腹痛，茴香汤送下；肿胀，萝卜汤送下；寒泄，姜枣汤送下。

【主治】小儿脾胃虚弱，不思饮食，伤食癖积，面色黄，呕吐泻泄，腹痛膨胀。

63833　**养脾丸**

【方源】《育婴秘诀》卷一。

【组成】甘草(炙)　麦芽(炒)　枳实(炒)各五钱　白术一两　陈皮七钱五分　半夏曲　青皮　厚朴(姜汁炒)　神曲(炒)各五钱

【用法】上为极细末，薄荷叶浸水，煮粳米饭，作糊为丸，如梧桐子大。米饮送下。

【功用】健脾消食。

63834　**养脾丸**

【方源】《幼科指南》卷上。

【组成】苍术(米泔浸，去黑皮，焙)五钱　神曲(炒)三钱　陈皮五钱　青皮一钱　枳壳二钱　砂仁二钱　厚朴(炒)三钱　苡仁二钱　麦芽二钱(炒)　粉草一钱　白术三钱　草果二钱

【用法】上为细末，酒糊为丸，如黍米大。脾胃虚弱，米汤送下；食积，山楂汤送下；腹痛，茴香汤送下；膨胀，萝卜子汤送下；寒泄，姜汤送下。

【主治】小儿脾胃虚弱，不思饮食，伤食脾积，面色痿黄，呕吐泄泻，腹痛膨胀。

63835　**养脾汤**

【方源】《普济方》卷一四六引《保生回车论》。

【组成】茯苓一两　白术二两　丁香半两　干姜一两(炮)　人参半两　甘草半两

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，煎至六分，去滓温服，一日三次，不拘时候。

【主治】伤寒后，脾胃气不和。

63836　**养脾汤**

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】苍术五钱　神曲三钱　茯苓　厚朴　白术各二钱　麦芽二钱半　陈皮二钱半　人参二钱　炙草一钱

【主治】不思饮食，面黄。

63837　**养脾汤**

《痘学真传》卷七。即《痘疹心法》卷十二"养脾丸"改为汤剂。见该条。

63838　**养脾散**

【方源】《圣济总录》卷四十四。

【组成】陈曲(炒)　白茯苓(去黑皮)　附子(炮裂，去皮脐)　诃梨勒(煨)　甘草(炙)　人参　草豆蔻(去皮，炮)各一两　干姜(炮)半两　麦蘖(炒)一两半　白豆蔻(去皮)一分　丁香(大者)五十粒

【用法】上为散。每服一钱匕，入盐少许，白汤点服；如中酒，加生姜两片，水煎服。

【主治】脾虚不思饮食，气逆濡泄，米谷不消。

63839　**养脾散**

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】肉桂 干姜 肉蔻 赤茯苓 莪术 川芎 桔梗各等分

【用法】上为末。每服三钱，白汤调下，晨、午、晚各一服。

【主治】水肿。

63840 养痘汤

【方源】《辨证录》卷十四。

【组成】当归二钱 川芎一钱 连翘五分 麦冬一钱 天花粉三分 木通三分 甘草二分

【用法】水煎服。

【功用】补血，解毒。

【主治】痘疮已见点后，热气大盛，疮粒过多，痘难贯浆。

【方论选录】当归、麦冬、川芎为君，连翘、木通、天花粉为佐、使，则血旺而火不过炎，热消而毒不内隐，故能速于收功而又无后患也。

63841 养源散

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】熟干地黄三两（锉） 破故纸二两 青盐一两（别研）

【用法】先将地黄炒令焦，次入破故纸同炒令爆声定，却入青盐同炒，碾为细末。临睡揩牙，早晨用亦得。

【主治】牙痛。

63842 养儒汤

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】熟地一两 金樱子 芡实 山药 玄参 麦冬各五钱 牡蛎末三钱 北五味五分

【用法】水煎服。

【功用】安心补肾。

【主治】梦遗症，久则玉茎着被，精随外泄，不着则否，饮食减少，倦怠困顿。

63843 养元藕粉

【方源】《良方合璧》卷上。

【组成】白莲藕粉 建莲肉（去心） 白茯苓 白蜜 白扁豆（炒） 川贝母（去心） 怀山药各等分

【用法】上为细末，用人乳拌成一块。每用一两，开水冲服。日常服之极效。

【功用】年老人健脾养胃。

63844 养正金丹

【方源】《鸡峰》卷十三。

【组成】硫黄（去砂，别研） 大附子（炮） 干姜 丁香 桂 厚朴 半夏 肉豆蔻各二两

【用法】上为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服二三十丸，加至七八十丸，空心米饮送下。老人服之尤佳。

【功用】进饮食，暖脾胃。

【主治】中下寒冷。

63845 养荣药片

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】橘皮十二两 白术（炒）十二两 香附（炙）十二两 茯苓十二两 神曲（炒）十二两 槟榔十二两 法半夏八两 炙黄耆八两 麦芽（炒）二两 木香六两 甘草四两（上药共研为末） 当归十二两 台党参（去芦）十二两 川芎六两 白芍八两 柴胡四两

【用法】后五味熬膏，再和前十一味药末和匀，制成药片，每瓶装三十六片。每服六片，一日二次，温开水送下。

【功用】补气养荣，舒郁调经。

【主治】妇人气虚血亏，月经不调，胸结堵闷，身体衰弱。

63846 养胎饮子

【方源】《宋氏女科秘书》。

【组成】归身二钱 川芎八分 芍药一钱 白术一钱五分 条芩八分 枳壳八分 泽泻一钱

【用法】水煎服。五日一服。

【主治】怀妊五月，觉胎胀腹重，睡卧不安者。

【备考】《叶氏女科》有甘草四分。

63847 养卫化毒汤

【方源】《片玉痘疹》卷九。

【组成】人参　黄耆(炙)　当归　甘草

【用法】水煎服。

【主治】痘疮已成浆，或寒战，或咬牙，单见一症者可治。

63848 **养子舒筋散**

【方源】《点点经》卷二。

【组成】天冬二钱　玄胡　当归　川芎　天麻各一钱半　白芍　熟地　生地各一钱　羊藿二钱　甘草三分

【用法】茄根、松节为引，水煎服。

【主治】酒伤筋弱，手足发战，经络麻胀。

63849 **养元辟谷丹**

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】黄犍牛肉十五斤(去筋膜，切作棋子大片，用河水洗数遍，令血水净，再用河水浸一宿，次日再洗二三遍，清水为度；用无灰好酒煮一夜，桑柴文武火，用砂罐煮，取出焙干，黄色者佳，黑焦不用。每牛肉末一斤，加入后药二斤)　山药八两(用葱、盐炒山药至黄色，去葱、盐不用)　莲肉八两(去心皮)　白茯苓(去皮筋膜，为末，水飞过)八两　芡实肉(取粉)八两　白术八两(油者，不用炒)　薏苡仁八两(炒)　白扁豆八两(去壳，姜汁炒)　人参(去芦)四两　小茴香(炒)四两　干姜(炒)二两　砂仁(炒)二两　青盐四两　川椒(去目，炒)二两　甘草(炙)四两　乌梅肉二两(熬浓汁半碗)　粳米(洗净，炒黄)六斤

【用法】上为细末，与米粉、牛肉末和匀，用小红枣五斤，醇酒五斤，煮枣极烂，去皮核，捣膏，加炼蜜二斤半，共和为丸，如弹子大。每次二丸，不拘冷热茶汤嚼下，一日二三次，永不饥。

【功用】安五脏，消百病，和脾胃，补虚损，固元气，实精髓，助脾健胃，瘦者令肥，老者健，常服极妙。

63850 **养气活血丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【异名】养气活血丹(《女科百问》卷上)。

【组成】大艾叶(炒焦，取细末)五两　干姜(炮，取末)二两半(用上醋二升半，无灰好酒二升，生姜自然汁一升，将姜、艾末同调于银器内，慢火熬成膏)　附子(炮，去皮脐)二两半　白芍药　白术　椒红　川芎　当归(洗，焙)　紫巴戟(去心，糯米炒)　人参(去芦头)　五味子各二两

【用法】后九味为细末，入前膏子，并熟炒白面二两半，同和为剂，入杵臼内捣千下，为丸如梧桐子大。每服五十丸，食前温酒或米饮送下。

【主治】产后诸虚不足，劳伤血气，真元内弱，四肢倦乏，肌肉消瘦。及脾元虚损，不入饮食，或吐利自汗，或寒热往来。

63851 **养气活血丹**

《女科百问》卷上。为《杨氏家藏方》卷十六“养气活血丸”之异名。见该条。

63852 **养气镇心丹**

【方源】《普济方》卷十六引《余居士选奇方》。

【组成】远志(去心)二两　人参(去芦头)一两　辰砂一钱(别研)　天门冬(去心)二两　石菖蒲一两(去须)　生龙脑一钱(别研)白茯苓(去皮)一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，用朱砂、龙脑为衣。每服二三十丸，煎人参汤，食后临卧服。

【功用】补心气而实五脏。

63853 **养火助明汤**

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】熟地五钱　山茱萸三钱　葳蕤五钱　巴戟天一两　肉桂一钱　麦冬三钱　北五味子三分　枸杞三钱

【用法】水煎服。

【主治】能近视而不能远视者。

63854 **养心化毒汤**

【方源】《片玉痘疹》卷下。

【组成】当归　生地　麦冬　升麻　人参

【用法】灯心为引，水煎服。

【主治】痘疮，喉门中无疮而暴哑者，此少阴之脉不荣于舌也。

63855 **养心化毒汤**

【方源】《幼幼集成》卷六。

【组成】大当归 怀生地 大麦冬 绿升麻 天花粉 川黄柏 漂苍术 荆芥穗

【用法】生姜一片为引，水煎服。

【主治】咽中无疮而暴哑。

63856 **养心化痰丸**

【方源】《何氏济生论》卷五。

【组成】龙齿（煅，研极细）一两 麦冬一两 白芥子一两（焙） 朱砂（水飞，猪心血煮三次） 五味子五钱（拣双核者） 半夏 胆星一两 远志（炒）二两 牡蛎（煅）一两 枣仁（炒）八钱 橘红一两 茯神一两 海粉

【用法】上为细末，用淡竹沥一碗，生姜汁一杯，和匀，蒸饼为丸，如绿豆大。每服二钱，临卧百沸汤下；灯心、竹叶汤亦可。

【主治】痰多不寐，谵妄神昏。

63857 **养心四物汤**

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】力参1.5克 炙甘草 石菖蒲各3克 远志6克 当归12克 熟地9克 酒白芍6克 川芎1.5克

【功用】补心安神，益目生光。

【主治】视瞻昏渺，神光内沉，兼有心悸心烦，健忘失眠，脉细弱等。

【方论选录】四物汤为补血的要剂，力参、炙甘草补气以生血，力参且有开心明目之功；石菖蒲、远志养心安神，心中气血充裕，神自安和，神光发越，目自不昏。

63858 **养心安神丸**

【方源】《医统》卷七十。

【组成】当归身 白茯苓 酸枣仁 五味子 犀角 琥珀 玄明粉 黄连 朱砂（为衣） 甘草（熬膏）各等分

【用法】上为细末，甘草膏和炼蜜为丸，如黍米大。每服二十丸，夜卧时津吞下。

【功用】除乱梦、恶梦。

【主治】心虚多梦。

63859 **养心安神汤**

【方源】《济阳纲目》卷五十四。

【组成】当归身（酒洗） 川芎 白芍药（炒） 陈皮 黄连 柏子仁（炒）各五分 生地黄（酒洗） 茯神各一钱 白术 酸枣仁（炒）各七分 甘草（炙）三分

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】血虚火动，惊悸怔忡。

63860 **养心安神汤**

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】生耆一钱半 小洋参一钱半 归身一钱半 川芎二钱（炒） 茯神三钱 贝母一钱（去心） 麦冬一钱（去心） 法夏一钱 橘红一钱 石菖蒲一钱（炒） 乌梅二钱（去核） 五味子五分（炒） 生草二钱

【用法】竹叶、灯心为引，水煎服。

【主治】用心过度，气血两亏，陡然不省人事，周身软而不言者。

63861 **养心安神膏**

【方源】《理瀹》。

【组成】牛心一个 牛胆一个（用小磨麻油三斤浸熬听用） 川黄连三两 大麦冬 丹参 玄参 苦参 郁金 胆南星 黄芩 丹皮 天冬 生地各二两 潞党参 熟地 生黄耆 上于术 酒白芍 当归 贝母 半夏 苦桔梗 广陈皮 川芎 柏子仁 连翘 熟枣仁 钗石斛 远志肉（炒黑） 天花粉 蒲黄 金铃子 地骨皮 淮山药 五味子 枳壳 黄柏 知母 黑山栀 生甘草 木通 泽泻 车前子 红花 官桂 木鳖仁 羚羊角 镑犀角各一两 生龟版 生龙齿 生龙骨 生牡蛎各二两 生姜 竹茹 九节菖蒲各二两 槐枝 柳枝 竹叶 桑枝各八两 百合 鲜菊花（连根叶）各四两 凤仙草一株

【用法】上药共用油十六斤，分熬去滓，合牛心油并熬，丹收，再入寒水石、金陀僧各四两，芒消、朱砂、青黛各二两，明矾、赤石脂、赭石（煅）各一两，牛胶四两（酒蒸化，如清阳膏

下法)，收膏，贴膻中穴。

【主治】心虚有痰火不能安神，亦治胆虚。凡年老心怯，病后神不归舍，及少年相火旺，心肾不交，怔忡梦遗，亦有因惊而不能寐者。

63862　养心固本丸

【方源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】玄武胶(红曲炒珠)　鹿角胶(红曲炒珠)　萸肉　杞子　人参　黄耆　石莲肉(加肉桂一钱同煮一日，去肉桂)　白术　甘草　枣仁　地黄　淮牛膝

【用法】炼蜜为丸服。

【功用】收功固本。

【主治】梦泄滑精，体倦骨痿，健忘怔忡，久而成劳者。

63863　养心固肾汤

【方源】《理虚元鉴》卷下。

【组成】生地　当归　茯神　山药　芡实　萸肉　陈皮　甘草　五味　石莲肉

【用法】河水煎，空心服。

【主治】漏精。

63864　养心健脾丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】党参三钱　于术三钱(土炒)　茯神五钱　焦枣仁四钱　远志肉一钱　归身三钱(土炒)　杭芍三钱(炒)　炒杜仲四钱　陈皮二钱　薏米五钱(炒)　广砂一钱五分(炒)　沙苑蒺藜三钱　石莲肉四钱　谷芽三钱(炒)　山药四钱(炒)　炙甘草一钱五分

【用法】上为细末，枣汤、神曲糊为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服三钱，白开水送服。

【功用】养心健脾。

【方论选录】本方从归脾汤和参苓白术散两方化裁而来，实具养心健脾之功效。归脾汤中去黄耆，以防补气升阳太过；去木香，以防芳香辛散耗阴；龙眼肉、当归之属似嫌滋腻，一并减去。用方大旨在于养心。参苓白术散功可和胃利湿，以沙苑蒺藜、白芍、杜仲易扁豆、桔梗，是为兼顾肝肾。立方稳健，寒热相宜。

63865　养心润燥汤

【方源】《医醇剩义》卷二。

【组成】松子仁二钱　柏子仁二钱　天冬二钱　丹参二钱　当归二钱　犀角五分　生地五钱　人参一钱　茯神二钱　甘草四分

【用法】加藕汁半杯，冲服。

【主治】秋燥，心受燥热，渴而烦冤。

63866　养心滋肾丸

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】人参一两　芡实(去壳)一两　酸枣仁(炒)二两　天冬(去心)二两　远志(甘草水泡，去心)一两　当归(酒洗)一两　莲蕊一两　柏子仁(去油，炒)一两　石菖蒲(去毛)六钱　熟地黄(酒蒸)二两　五味子一两　麦冬(去心)二两　知母(去毛，酒炒)二两　白芍(盐酒炒)一两五钱　白茯神(去皮木)一两　莲肉(去心皮)一两　牡蛎(火煅)一两　怀山药(炒)三两　生地黄(酒洗)二两　黄柏(去皮，盐水炒)二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【功用】养元气，生心血，健脾胃，滋肾水，止盗汗，除遗精，降相火，壮元阳。

【主治】遗精。

63867　养正定痛汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】芎　归　芍　熟地　白术　人参　杜仲　玄胡索　青皮　香附　乌药　益母草　甘草

【功用】行气安胎，养血消积。

【主治】妊娠已久，其人素患积聚，或湿痰死血留积肠胃，或气郁食积隐于胸膈中下二焦，而生癥瘕痃癖诸症，卒为风热寒湿所触，郁怒伤于肝脾，痰饮停于胃脘，暴病难忍，脐腹腰胁上下左右随起，胎元受伤，因而痛堕。

【加减】如痛不止，按之有形，加五灵脂、乳香、没药。

【方论选录】此方四物、参、术、杜、草大补气血以培养胎元；青、乌、延、附辛温疏达以消

磨积聚，益母草补中有行，行中有补，痛止胎安，诚处方之得其正者矣。

63868 养正通幽汤

【方源】《产后编》卷上。

【组成】川芎二钱半 当归六钱 炙草五分 桃仁十五粒 麻仁二钱（炒） 肉苁蓉（酒洗，去甲）一钱

【主治】产后大便秘结，类伤寒三阴症。

【加减】汗多便实，加黄耆一钱，麻黄根一钱，人参二钱；口燥渴，加人参、麦冬各一钱；腹满溢，便实，加麦冬一钱，枳壳六分，人参二钱，苁蓉一钱；汗出谵语便实，乃气血虚竭，精神失守，宜养营安神，加茯神、远志、苁蓉各一钱，人参、白术各二钱，黄耆、白芷各一钱，柏子仁一钱。

63869 养正通幽汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【异名】助血润肠汤。

【组成】川芎二钱五分 炙甘草五分 桃仁五粒 苁蓉五钱 陈皮四分 麻仁三钱

【用法】水煎，温服。

【主治】产后潮热有汗，大便不通，口燥咽干。

【加减】汗出谵语便实，乃气血两亏，神衰，心主失守，急宜养营安神，加茯苓、枣仁、柏仁、参、耆、白术各一钱，水煎服；如大便至十日以上，燥结不通，肛门必有燥屎，用蜜煎入皂角末或猪胆汁，及枯盐导之。

【宜忌】慎勿误用下药。

63870 养正通幽汤

【方源】《产宝》。

【组成】川芎二钱 当归六钱 甘草（炙）五分 人参一钱 黄耆（生）二钱 陈皮一钱 桃仁（去皮尖，研）十一粒 黑脂麻（炒，研）二钱 肉苁蓉（酒洗）一钱

【用法】用水二盏，煎七分，稍热服。

【主治】产后潮热自汗，谵语便秘，口燥舌干咽痛。

【加减】汗多，加麻黄根五分；口燥，加麦冬一钱；腹满咽干，便结，加枳壳六分；汗多谵语便实，加茯神二钱，炒酸枣仁一钱，柏子仁一钱，生白术二钱。

63871 养正通幽汤

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】川芎一钱或一钱五分或二钱 当归四钱或六钱 桃仁十粒（去皮尖） 炙草五分 陈皮四分 麻仁一钱或一钱五分（炒） 肉苁蓉一钱或二钱（酒洗，去泥甲） （一方无苁蓉）

【用法】水煎服。

【主治】产后大便秘结。

【加减】如有血块痛，加肉桂、炒延胡索各五分，不用苁蓉；如气虚多汗，加蜜炙黄耆一钱，人参一二钱（一方再加麻黄根一钱）；燥渴，加去心麦冬一钱五分，人参一二钱（一方再加五味子七粒）；腹满便实，加去心麦冬一钱，麸炒枳壳六分；汗出谵语便实，乃气血并竭神衰，心主失守，宜养气安神，加茯神、炒枣仁、制远志肉、炙黄耆、柏仁、苁蓉各一钱，人参、土炒白术各二钱。

63872 养生化滞汤

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】川芎二钱 当归四钱 人参一钱半（胀甚者减半） 白芍 茯苓各一钱 白术二钱（胀甚倍用） 桃仁十粒 腹皮四分 苁蓉（酒洗）一钱五分

【主治】产后腹胀。

63873 养生化滞汤

【方源】《产宝》。

【组成】川芎二钱 当归三钱 人参一钱 于术（生）二钱 陈皮八分 香附（制）五分 茯苓二钱 甘草（炙）三分 大腹皮四钱 桃仁（去皮尖，研）十一粒

【用法】上药用水一盏半，加黄酒一小钟，煎七分，热服。

【主治】产后中气不足，胸膈窒滞，胃虽纳谷，传化艰难，而膨胀者。

【加减】大便秘结，加肉苁蓉二钱；误服大

黄,加生黄耆四钱,倍用人参;胀甚,人参可加至四五钱。

63874　**养生化滞汤**

【方源】《胎产心法》卷下。

【组成】人参　茯苓　川芎　白芍(炒)各一钱　当归四钱　桃仁十粒(去皮尖)　肉苁蓉一钱五分(酒洗去泥甲)　大腹皮五分(黑豆水制净)　陈皮四分　制香附　炙草各三分

【用法】水煎服。

【主治】产后大便不通,误服大黄等药,致成鼓胀。

【加减】如胀甚,再加人参二三钱;误用大黄多者,服参、归至半斤以上,大便方通,肿胀渐退。

63875　**养血化斑汤**

【方源】《准绳·幼科》卷六。

【组成】当归身　生地黄　红花　蝉蜕　人参各等分

【用法】上为细末。水一盏,生姜一片,煎六分,去滓温服,不拘时候。

【主治】麻疹已出,疹色淡白者。

63876　**养血平肝散**

【方源】《济阴纲目》卷二。

【组成】当归(酒浸)　白芍药(炒)　香附(炒黑)各二钱　青皮(醋炒)　柴胡　川芎　生地黄各八分　甘草五分

【用法】上锉。水煎,食前服。

【主治】大怒,经血暴下。

【方论选录】以大怒而用是,故曰平肝。香附、青皮、柴胡、芍药、甘草、川芎缓肝疏肝,升提肝气;当归、生地养血营肝,然重在大怒,故立方如此。

63877　**养血四物汤**

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】当归　川芎　白芍　熟地黄　人参　茯苓　半夏　黄连　栀子　甘草

【用法】上锉。加生姜三片,水煎服。

【主治】血虚嘈杂。

【加减】去人参,加香附、贝母甚效。

【备考】《寿世保元》本方用量:当归三钱,川芎一钱五分,白芍(炒)二钱,熟地黄(姜炒)四钱,人参二钱,白茯苓(去皮)二钱,半夏(姜炒)二钱,黄连(姜炒)六分,栀子三钱,甘草八分。并有白术(去芦)一钱五分。

63878　**养血宁心汤**

【方源】《医部全录》卷三二〇。

【组成】当归一钱二分　白芍药(酒炒)　栀子各七分　黄芩　黄连各八分　枣仁　生地各一钱　远志　麦冬各二钱

【用法】加生姜、大枣,水煎服。

【主治】惊悸,怔忡,健忘。

63879　**养血地黄丸**

【方源】《本事》卷一。

【组成】熟干地黄(酒洒,九蒸九晒,焙干),十分　顽荆一分　山茱萸五分(连核)　地肤子　黑狗脊(炙,去毛净,焙,锉)　白术　干漆(炒令烟出)　蛴螬(干炒)　天雄(炮去皮)　车前子各三分　萆薢　山芋　泽泻　牛膝(酒浸,水洗,焙干)各一两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心、夜卧温酒送服。春夏服之。

【主治】①《本事》:筋极。②《医钞类编》:颤振。

【方论选录】《本事方释义》:熟地黄气味甘寒微苦,入足少阴;顽荆气味苦微温,入足太阳;山茱萸气味酸平,入足少阴、厥阴;狗脊气味苦平,入足太阳、少阴,能健筋强骨;地肤子气味苦微寒,入足太阴、阳明;干漆气味辛温,降而行血,入足厥阴;蛴螬气味咸微温,通瘀血,入肝明目;天雄气味辛大热,入下焦命门之品,热药中之峻者也;车前子气味甘寒,入足太阳、阳明,能利小便;萆薢气味苦平,利湿祛风,入足阳明、厥阴;山羊胫骨气味甘温微咸,强筋壮骨,入足厥阴;泽泻气味甘苦微咸,入足太阳、少阴,牛膝气味酸咸平,入足厥阴,此舒筋养血之方也。肝、脾、肾三经既有专补之品,而搜风逐湿诸味各得行其志以驱邪焉,

有不获奇效者乎！

【备考】方论中“山羊胫骨”，宋本作“山芋”。

63880 **养血地黄汤**

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十五。

【组成】熟地 生地 白芍 当归 阿胶 麦冬 白术

【用法】水煎服。

【主治】伤寒发汗过多则伤血，血虚无以营筋，因拘急而惕惕然跳，四肢百骸亦瞤瞤然动者。

63881 **养血百补丸**

【方源】《鸡峰》卷七。

【组成】人参 牡丹 槟榔 吴茱萸 肉豆蔻 白芍药 泽泻 木香 远志 缩砂 枳壳 柴胡 麻黄 麝香 盐各半两 乌梅二两 知母 升麻 甘草 鳖甲 灰蓉 白蔹 葳蕤 虎骨 桃仁 羌活 防风 茯苓 附子 青蒿 秦艽 厚朴 牛膝 半夏 桂各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至五十丸，空心温酒送下。

【主治】真元衰弱，营卫虚微，久病羸瘦，咳嗽痰涎，唾如胶粘，或如红物，手足心热，虽思饮食而吃不多，睡眠不安，肩背拘急，百节烦疼，足胫痿弱，行步无力，腹中如空，气短喘促，精神烦扰，郁抑悲啼。

63882 **养血托毒汤**

【方源】《会约》卷二十。

【组成】当归二钱 白芍（酒炒）一钱半 熟地二钱 茯神一钱 淮山药（炒）一钱半 沙参一钱二分 甘草 生地（酒浸） 丹参各一钱 柏子仁（炒去油）八分 牛蒡子（炒，研）六分 白莲肉（去心，炒，研）一钱

【用法】水煎频服。

【主治】麻现色白，心血不足，体虚神倦者。

63883 **养血当归膏**

【方源】《全国中药成药处方集》（武汉方）。

【异名】养血当归精。

【组成】当归四斤 川芎二两 党参四两 白芍四两 熟地四两 黄耆四两 茯苓四两 阿胶十五斤 炙甘草二两

【用法】取当归粗粉四斤，加 60％乙醇八斤，浸一星期，过滤，将乙醇收回；再将当归残滓与川芎、党参、白芍等药混合入锅，照量加水五倍，用常温（70℃）浸渍四小时，过滤，照例二次；最后滤液，加阿胶十五斤，与当归液合并浓缩，再加蔗糖十三斤，使成稠膏即得。每服一茶匙，一日三次。

【主治】面色萎黄，肌肉消瘦，及妇女月经失常。

63884 **养血当归精**

《全国中药成药处方集》（武汉方）。为原书“养血当归膏”之异名。见该条。

63885 **养血壮筋汤**

【方源】《万氏家抄方》卷一。

【组成】当归 白芍 熟地黄 白术 木瓜 牛膝 知母 陈皮 白茯苓

【用法】水二钟，煎服。吃药后饮好酒一杯。

【主治】鹤膝风，腿膝不能行动。

63886 **养血安胎丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归一两 川芎一两 续断一两 橘皮一两 黄芩一两 茯苓一两 苏梗一两 杜仲炭一两 麦冬一两 补骨脂（盐炒）一两 壳砂一两 白术（炒）二两 益母草三两 香附（炙）三两 甘草五钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重三钱。每服一丸，一日二次，温开水送下。

【功用】调养营卫，益气安胎。

【主治】妊娠气虚，营卫不足，腰痠肢痛，胎动不安。

63887 **养血安胎丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】当归身 大熟地各四两 生杭芍 川芎 白术 制香附各三两 黄耆 阿胶 炒杜仲 川续断各二两 砂仁 广陈皮 炙甘草各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重三钱。每服一丸，空腹时白开水送下。

【主治】孕妇脾胃虚弱，血不充足，腰痠腹胀，时常见血，四肢无力，腿足浮肿，习惯小产等。

63888　**养血安胎丸**

【方源】《全国中药成药处方集》(青岛方)。

【组成】当归五斤　白术　条芩各二十斤　砂仁　香附各五斤

【用法】上为末，炼蜜为丸，重二钱五分，蜡皮。

【主治】孕妇腰腹疼痛，胎动不安。

63889　**养血安神丸**

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】朱砂五钱　白芍七钱　归身一两　川芎三钱　侧柏叶一两　陈皮五钱　黄连五钱　生草五钱

【用法】上为细末，猪心血为丸。每服三五丸，以菖蒲汤送下。

【功用】安心养血，调气清心。

【主治】心役过度，致血不生，而成惊悸者。

63890　**养血安神丸**

【方源】《北京市中药成药规范》。

【组成】仙鹤草100斤　墨旱莲60斤　夜交藤60斤　合欢皮60斤　鸡血藤60斤　生地黄60斤　熟地黄60斤

【用法】上七味药材取50%煮提二次，浓缩为稠膏；另50%为细末。每斤药粉对膏半斤为丸，用生赭石粉一两五钱为衣。每服24粒，一日三次，温开水送下。

【功用】益气养血，宁心安神。

【主治】心血不足，精神倦怠，失眠健忘，睡眠多梦，肾虚腰痠，头晕乏力。

63891　**养血安神汤**

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归身五分(酒洗)　川芎五分　白芍(炒)五分　生地黄(酒洗)一钱　陈皮五分　白术七分　茯神一钱　酸枣仁七分(炒)　柏子仁五分(炒)　黄连五分(酒炒)　甘草(炙)三分

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】惊悸。

63892　**养血安神汤**

【方源】《会约》卷十五。

【组成】当归身二钱　熟地三五钱　白芍(酒炒)一钱半　茯神　枣仁(炒)　生地　炙草各一钱　远志六分　五味三分　干姜(炒黑)三四分　柏子仁(微炒，去油)七分　白莲五粒(去心，微炒，捶碎)

【用法】水煎，温服。

【主治】产后心血不足，以致神魂不安而惊悸者。

63893　**养血助胃丸**

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】当归(酒洗)一两　川芎一两　白芍(盐酒炒)一两二钱　熟地黄(姜汁浸，炒)八钱　人参五钱　白术(土炒)一两三钱　白茯苓六钱　甘草(炙)三钱　山药(炒)一两　莲肉(去皮心)一两　扁豆(姜汁炒)六钱

【用法】上为末，姜打神曲糊为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，空心白滚水送下。

【功用】养元气，健脾胃，生血脉，调营卫，清郁气。

【主治】呕吐翻胃，愈后用。

63894　**养血佐肝丸**

【方源】《古今医鉴》卷十二。

【组成】当归(酒洗)　南芎　白芍(酒炒)　陈皮(去白)　半夏(香油炒)　白术(去芦，炒)　神曲(炒)　青皮(香油炒，去瓤)　莱菔子(炒)　牡丹皮(酒洗)　红花各一两　香附二两(醋浸炒)　桃仁(去皮尖)　柴胡各八钱　白茯苓一两　龙胆草(酒洗)六钱　三棱　莪术(各醋炒)各五钱

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服一百丸，白汤送下。

【主治】产后左胁胀满一块，卧不敢着床。

63895　**养血返精丸**

《医部全录》卷三三二引《集验方》。为《魏氏

家藏方》卷六"返精丸"之异名。见该条。

63896 **养血固本汤**

【方源】《点点经》卷三。

【组成】当归 淮耆 山药各二钱 人参五分 白术 茯苓 枸杞 川芎 厚朴 熟地各一钱五分 陈皮一钱 甘草三分

【用法】生姜、大枣为引，水煎服。

【主治】积疾年久，骨瘦如柴，发肌焦枯，脉大洪弦，腹痛不休，饮食减少。

【加减】如手足冷，加肉桂一钱。

【备考】此方服之，令人精神爽畅，饮食如常，再行攻破，百无一失。

63897 **养血固胎丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】生黄耆 当归各二两 川芎八钱 黄芩三两 广砂仁一两五钱 菟丝饼二两 炙甘草八钱 川贝母一两五钱 炙鱼鳔一两 益母草四两 白芍 熟地 贡白术各二两 川续断一两 艾炭一两五钱 西洋参九钱 川杜仲一两五钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，二钱重。每服一丸，白开水送下。

【功用】养血安胎。

【主治】气亏血弱，腰部疼痛，经患流产，胎动不安，孕期腹痛。

63898 **养血定风汤**

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】生地五钱 当归三钱 赤芍二钱 川芎五分 天冬二钱 麦冬二钱 僵蚕二钱（生研） 鲜首乌五七钱 丹皮一钱五分或二钱

【用法】上加桑枝二十寸，水煎，温服无时；或为丸服亦可。

【主治】痒风。遍身瘙痒，并无疮疥，搔之不止。

【备考】外用地肤子、苍耳叶、浮萍煎汤暖浴。

63899 **养血参茸片**

【方源】《古今名方》引《常见病的中医治疗研究》。

【组成】太子参150克 当归 皂矾各90克 桑寄生 紫河车各75克 炒丹皮 炒栀子 甘草各45克 鹿茸片3克（研细末） 生地150克 天冬 菟丝子各90克 麦冬45克

【用法】上药水煎，浓缩成膏，加阿胶90克，制成片剂，每片0.5克。每服4～8片，一日二次。

【功用】益气补血，滋阴补阳。

【主治】阴阳气血俱虚。面色㿠白，精神倦怠，腰痠腿软，头昏耳鸣，自汗盗汗，舌质淡，苔白，脉沉细无力。可用于再生障碍性贫血有上述证候者。

63900 **养血荣筋丸**

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】潞党参五钱 土炒白术四钱 当归三钱 首乌一两 川续断五钱 寄生五钱 补骨脂四钱 木香三钱 伸筋草五钱 威灵仙三钱 陈皮三钱 鸡血藤五钱 赤小豆五钱 透骨草五钱 松节三钱 赤芍五钱

【用法】为丸。每服一丸至二丸，一日二次，温开水送下。

【功用】养血，荣筋，通络。

63901 **养血顺气汤**

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】四物汤加桃仁 红花 诃子 青皮 竹沥 姜汁

【主治】肺胀咳嗽，不得眠，动则喘急。

63902 **养血胜风汤**

【方源】《医醇賸义》卷四。

【组成】生地六钱 当归二钱 白芍一钱五分 川芎一钱 枸杞三钱 五味五分 枣仁一钱五分 柏仁二钱 杭菊二钱 桑叶一钱 红枣十枚 黑脂麻三钱

【主治】血虚头痛，自觉头脑俱空，目眊而眩。

63903 **养血祛风汤**

《东医宝鉴·外形篇》卷一。即《古今医

鉴》卷九"补血祛风汤"。见该条。

63904　养血祛风汤

【方源】《松峰说疫》卷二。

【组成】熟地　当归(酒洗)　白芍(酒炒)　川芎(酒洗)　半夏(制)　僵蚕(泡去涎,焙)　天麻(酒蒸)

【用法】生姜、大枣为引,水煎服。

【主治】因惊、因气恼而瘈疭者。

【加减】若虚甚者,加人参;有风者,酌加羌活、白芷、柴胡、防风。

63905　养血祛风汤

【方源】《会约》卷十一。

【组成】当归二钱　白芍(酒炒)一钱半　熟地一钱半(若血虚有热者,改用生地)　秦艽一钱半　防风　独活各一钱二分　羌活一钱　桂枝八分　陈皮七分　松节四钱

【用法】水煎,温服。

【主治】风邪外中,历节肿痛,脉浮涩者。

63906　养血祛风汤

【方源】《会约》卷十四。

【组成】当归　山药　生地　沙参　钩藤钩　麦冬各二钱　熟地三五钱　枸杞一钱半　玄参　青蒿　阿胶(蛤粉炒)各一钱

【用法】水煎,加竹沥半杯,姜汁四五匙,合服。

【主治】妊娠血虚生热,热生风,以致拘挛昏迷。

【加减】如痰盛,加胆星二钱,海石二钱,陈皮(去白)一钱半;如火盛而痰不降,加童便。

63907　养血祛风汤

【方源】《医醇剩义》卷一。

【组成】生地五钱　当归二钱　白芍一钱(酒炒)　桂枝六分　茯苓三钱　白术一钱　虎胫骨一钱五分(炙)　续断二钱　独活一钱(酒炒)　秦艽一钱　牛膝二钱　木香五分　红枣十枚　姜三片　桑枝一尺

【主治】中经。风入经脉,身体重着,步履艰难。

63908　养血祛风汤

【方源】《马培之医案》。

【组成】川芎八分　乌药八分　秦艽一钱半　甘草八分　大胡麻三钱　当归二钱　丹参一钱半　云苓二钱　川断一钱半　萆薢草一钱　苍耳子一钱半　白蒺藜三钱　白术一钱　桑枝三钱

【功用】和营顺气,达肌表。

【主治】麻风,块斑退,汗孔未透。

63909　养血祛风汤

【方源】《中西结合治疗皮肤病学》。

【组成】生地15克　当归9克　川芎9克　白芍9克　荆芥9克　防风9克　苍术9克　黄柏9克　甘草6克

【功用】养血润燥,祛风利湿。

【主治】慢性瘙痒症、慢性湿疹和慢性荨麻疹等属血虚生风者,证见慢性全身瘙痒性丘疹,头晕,五心烦热,全身奇痒,咽干,舌质淡红,脉细。

【方论选录】生地、当归、川芎、白芍为四物汤,能养血润燥;荆、防祛风止痒;苍术,黄柏是二妙散,可燥脾清热祛湿,以佐四物;甘草和中。

63910　养血除风汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】当归9克　酒白芍　天花粉各6克　荆芥1.5克　甘草3克

【主治】睑弦赤烂,干涩而痒,睫毛根部有皮屑附着者。

【方论选录】方中当归补血而润燥;白芍养血而敛阴;天花粉清热生津而润燥;荆芥疏风解热而退赤,且能引诸药以达肌表,润泽皮毛;甘草补中而益脾胃,配芍药酸甘化阴,敛阴和营。诸药凑效,风邪得除,阴血充沛,津液得生,胞睑得养,睑弦自润,病自除也。

63911　养血透脓汤

【方源】《顾氏医径》卷六。

【组成】首乌　紫草　羌活　泽泻　生首　川乌　陈皮　笋尖　茄蒂

【用法】水煎服。

【主治】脑疽，根坚平塌者。

【加减】脉不扬，阴毒内结，加附子以通阳化脓。

63912 **养血健胃汤**

【方源】《点点经》卷二。

【组成】熟地 当归 丹参各一钱 川芎 条参 白芍 骨皮 陈皮 茯神 六曲 黄芩各一钱半 杏仁 甘草各六分

【用法】红曲、黑枣为引，水煎服。

【主治】酒毒伤脏，大便下血。

63913 **养血健脾汤**

【方源】《医学传灯》卷上。

【组成】当归 白芍 麦冬 山楂 神曲 陈皮 泽泻 白茯 苡仁 桔梗

【功用】养血健脾。

【主治】脾虚血弱，食欲不振。

【加减】滞重，加厚朴。

63914 **养血健脾汤**

【方源】《医学传灯》卷下。

【组成】当归 白芍 麦冬 枳壳 厚朴 山楂 赤茯 杏仁 桔梗 陈皮

【主治】谷疸，火热郁结，遏生苔衣，干涩难下。

63915 **养血健脾汤**

【方源】《幼科直言》卷五。

【组成】白术（炒） 白茯苓 当归 沙参 丹皮 黄耆 陈皮 甘草 白扁豆（炒）

【用法】水煎服。

【主治】头晕，唇白，气虚面作晕者。

63916 **养血消风散**

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】熟地 15 克 当归 9 克 荆芥 9 克 白蒺藜 9 克 苍术 9 克 苦参 9 克 麻仁 9 克 甘草 6 克

【功用】养血润燥，消风止痒。

【主治】脂溢性皮炎，血虚风燥，皮肤干燥、脱屑、瘙痒等。

【方论选录】熟地、当归滋阴养血，荆芥、白蒺藜、苦参消风止痒，苍术健脾，麻仁、甘草润燥。

63917 **养血润肤饮**

【方源】《外科证治全书》卷一。

【组成】当归三钱 熟地 生地 黄耆各四钱 天冬（去心） 麦冬各二钱（去心） 升麻 片芩各一钱 桃仁泥 红花各六分 天花粉一钱五分

【用法】水煎，温服。

【功用】《朱仁康临床经验集》：滋阴养血，润燥止痒。

【主治】①《外科证治全书》：面游风。初起面目浮肿，燥痒起皮，如白屑风状，次渐痒极，延及耳项，有时痛如针刺。湿热盛者浸黄水，风燥盛者干裂，或浸血水，日夜难堪。②《朱仁康临床经验集》：皮肤瘙痒症、牛皮癣静止期（血虚风燥型）、红皮症等。

【加减】如大便燥结，加火麻仁、郁李仁各五钱；如风盛痒甚，加明天麻一钱五分。

63918 **养血润筋汤**

【方源】《陈素庵妇科补解》卷五。

【组成】当归五钱 川芎一钱五分 熟地五钱 川断三钱 丹皮二钱 秦艽一钱 防风一钱 生耆二钱 白芍（酒炒）一钱五分 桑寄生二钱

【主治】新产去血过多，足厥阴肝经虚极，筋无所养，以致产后发痉。

【方论选录】是方四物加丹皮养血扶阴，寄生祛周身之风邪，行周身之经络；秦艽、防风得黄耆驱风固表，补其暴亡之血，敛其易出之汗，祛其乘虚而入之风，养血即以润筋，命名之深义也。

63919 **养血益气汤**

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】川芎 白术 黄耆各一钱 人参 当归各二钱 熟地二钱 炙草四分 麦冬一钱 五味子十粒 川附子一钱

【用法】水煎服。

【主治】产后血块，痛止而厥。

【加减】汗多，用麻黄根、枣仁各一钱；大便

难,用肉苁蓉二钱。

63920 **养血益荣汤**

《杂病源流犀烛》卷二。为《痘疹全书》卷下"益荣汤"之异名。见该条。

63921 **养血益荣汤**

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】人参 当归 红花 赤芍 黄芩 丹参 甘草 力子 连翘

【用法】水煎服。

【主治】血虚麻白,肌瘦色枯。

63922 **养血调经丸**

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归(酒洗)二两 南芎一两 白芍(酒炒)二两 熟地四两 山茱萸(酒蒸,去核)二两 白茯苓(去皮)一两半 山药二两 牡丹皮一两半 泽泻一两半 栀子(炒)一两半 益母草二两 生地(酒洗)二两 香附(醋炒)二两 陈皮一两半

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三钱,空心淡姜汤送下。

【主治】妇人经闭,或二三年不通者,脐左下一块如碗大,间或吐血或便血,余无恙。

63923 **养血调经丸**

【方源】《全国中药成药处方集》(呼和浩特方)。

【组成】熟地 当归 坤草 杜仲各一斤 香附 白芍 川芎 茯苓各一斤半 人参半斤 川断十二两 牛膝十二两 丹参一斤 肉桂四两 红花四两 炙草八两

【用法】炼蜜为丸服。

【主治】经期不准,腹痛腰痠。

63924 **养血调经膏**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归十两 川附片十两 小茴香十两 良姜十两 川芎十两 木香十两

【用法】上药切碎,用香油二百四十两炸枯,过滤去滓,炼至滴水成珠,入黄丹一百两,搅匀成膏,取出放入冷水中出火毒后,加热溶化。另兑细料:青毛鹿茸(去毛)八两,肉桂(去粗皮)十两,沉香八两(以上三味为细末)。每十六两油膏,兑药粉二钱,搅匀,摊贴脐上。

【功用】养血,散寒,止痛。

【主治】妇女子宫寒冷,经血不调,腹痛,带下。

【宜忌】孕妇忌贴。

63925 **养血调经膏**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】当归二两 川芎一两六钱 白芍二两 益母草二钱 丹参一两六钱 泽兰二钱 茯苓五钱 木香一两六钱 牛膝六钱 杜仲八钱 柴胡八钱 鲜姜九两 续断八钱 香附一两六钱 陈皮二两 白术六钱 艾把二两五钱 腹皮二两

【用法】上药酌予切碎,每锅用香油四斤六两,油热时先炸坚硬药品,后入叶草等药,将陈皮焖湿放在上边,分次撒于浮面,炸至焦枯,用细铁丝筛子过滤,去净滓,炼至滴水成珠为度;在火上下丹,每锅用樟丹一斤十一两,搅匀,将锅端下用水喷,随喷随搅,烟出净即成。放入水中,消毒凝坨,加热溶化,兑入鹿茸粉三钱,人参尾五钱,搅匀,摊贴。贴时先将鲜姜煨熟,擦净肚脐部、腰部,各贴一张。

【功用】调经养血。

【主治】积气,积寒,神经衰弱,腰腿疼痛。

63926 **养血通经汤**

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】牡丹皮 当归各一钱七分 白芍 陈皮 白术(去芦) 香附各一钱 川芎七分 柴胡七分 黄芩七分 甘草四分 生地黄一钱

【用法】上锉一剂。水煎,空心热服。

【主治】室女经闭,咳嗽发热,属虚弱者。

63927 **养血清火汤**

【方源】《回春》卷四。

【组成】当归 川芎七分 白芍(酒炒) 生地黄(酒洗) 黄连(酒炒)各一钱 片芩(去朽)八分 栀子(炒)八分 酸枣仁(炒) 麦门冬(去心)各一两 远志(去心) 辰砂五

分(另研,调服) 甘草三分

【用法】上锉一剂。加生姜三片,水煎,温服。

【主治】怔忡,心慌神乱,烦躁不宁。

63928 **养血清火汤**

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】当归一钱 川芎八分 白芍(酒炒)一钱 生地黄(酒洗)一钱 麦冬一钱 石莲肉五分 天花粉七分 知母一钱 黄连八分 薄荷五分 乌梅肉五分 黄柏(盐水炒)五分 甘草五分

【用法】上为末,水煎,温服。

【主治】消渴,阴虚火盛,烦渴引饮无度。

63929 **养血清心丸**

【方源】《续名家方选》。

【组成】当归(酒洗)十钱 麦冬六钱 川芎 白芍 防风(去梢)各十钱 黄芩 荆芥 青皮各八分 黄连十钱 薄荷五钱 牛黄二钱 甘草三钱

【用法】上为细末,面糊为丸,如绿豆大。每服五十丸,空心热酒送下。

【主治】凡人口吃,语言蹇涩者,心血虚而火亢甚也,轻者语涩,重者口眼㖞斜,医误为中风者。

63930 **养血清心汤**

【方源】《回春》卷四。

【组成】人参(去芦) 白术(去芦) 茯苓(去皮) 远志(去心) 酸枣仁(炒) 川芎 生地黄 石菖蒲各一钱 当归一钱半 甘草五分

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】癫狂,喜笑不常。

【备考】《寿世保元》有麦门冬一钱五分。

63931 **养血清心汤**

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】当归(酒洗)一钱 川芎七分 白芍(酒炒)一钱 生地黄(酒洗)一钱 黄连(姜汁炒)一钱 甘草二钱五分 片芩(去朽)八分 栀子(炒)八分 酸枣仁(炒) 远志(去心) 麦门冬(去心)各一钱

【用法】上锉一剂。加生姜,水煎服。

【主治】血虚火盛,怔忡心慌恍惚,烦躁不宁。

63932 **养血清心汤**

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】人参 白术 云苓 甘草 麦冬 枣仁 熟地 归身 远志肉 柏子仁

【用法】加桂元肉,水煎服。

【主治】小儿先天心血不足,睡与不睡之间,偶而闪跳,谓之悸。

【加减】如大病后,睡中闪跳者,加石菖蒲、猪心血。

63933 **养血清心汤**

《东医宝鉴·内景篇》卷一。即《古今医鉴》卷七“清心养血汤”。见该条。

63934 **养血清胃汤**

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】泽兰叶一钱半 归尾一钱 赤芍五分 川芎七分 青皮八分 降香五分 人中黄一钱 白芷五分 僵蚕一钱(炒) 蝉蜕一钱 秦艽一钱 紫草茸六分 连翘六分 骨皮五分 白藓皮五分 生草五分 三春柳一撮

【用法】水煎服。

【功用】和血调胃。

【主治】小儿一切水痘、麻疹。

【加减】如舌尖上有红点,加莲子心五分。

63935 **养血清热汤**

【方源】《会约》卷十四。

【组成】当归二钱 川芎一钱 白芍(酒炒)一钱半 熟地二三钱 陈皮(去白) 半夏(姜炒) 炙草各一钱半 黄芩(酒炒)一钱半

【用法】加竹沥、姜汁,水煎服。

【主治】风热子痫,因风木为热,痰涎壅盛。

63936 **养血散火汤**

【方源】《程松崖先生眼科》。

【组成】生地一钱(切片) 丹皮八分 归身一钱 草决明八分 白芍一钱(酒炒) 防

风六分　荆芥六分　青葙子八分　川芎八分　菊花一钱　茯苓一钱　车前子八分

【主治】眼小角淡红或赤痛者。

【加减】若服药红痛俱愈，但看物不明，去防风、荆芥，加沙苑蒺藜一钱(淡盐水炒)，菟丝子一钱，熟地二钱。

63937　**养血舒肝汤**

【方源】《会约》卷十四。

【组成】当归身二三钱　熟地三五钱　白芍(酒炒)一钱半　甘草(炙)一钱　阿胶(蛤粉炒)　白术　杜仲(盐水炒)各一钱半　枸杞　淮山药(炒)二钱

【用法】加大枣为引，水煎服。

【功用】生血养肝，固胎。

【主治】受胎一月，系属肝经，前此或堕，后孕至期亦堕者。

63938　**养血舒筋汤**

【方源】《杂症会心录》卷上。

【组成】当归二钱　白术二钱(土炒)　茯苓一钱　沙参一钱五分　麦冬一钱　枣仁一钱(炒，研)　牛膝一钱　苡仁二钱　丹参二钱　何首乌二钱

【用法】加桂圆肉五枚，水煎服。

【主治】血虚不能荣筋而挛症作。

63939　**养血疏气汤**

【方源】《医钞类编》卷六。

【组成】当归　白芍　川芎　生地　竹沥　桃仁　红花　诃子肉　青皮

【用法】水煎，加韭汁、姜汁冲服。

【主治】肺胀而嗽，或左右不得眠，动则喘急，乃痰挟瘀血所致。

63940　**养血填精汤**

【方源】《点点经》卷一。

【组成】枸杞　全归　茯苓　芡实　菟丝各一钱半　条参(蜜炙)　大云各二钱　熟地　川芎　白芍　仙茅各一钱　甘草三分

【用法】加金樱子(打碎)五个为引，水煎服。

【主治】酒疾伤害膀胱，遗精滲精，腰脊痛胀，浊红浊白等。

63941　**养血愈风酒**

【方源】《全国中药成药处方集》(上海方)。

【组成】独活　杜仲(炒)　怀牛膝　玄参　天麻　川萆薢各四两　生地六两　羌活四两　熟地六两　当归三两　官桂二两　玉竹一斤　烧酒二百八十斤

【用法】上为粗末，用夏布盛装，浸入酒内一星期，去滓，再加冰糖二十斤和匀。每次五钱，一日二次。

【主治】筋络牵强，骨节疼痛。

63942　**养血熄风方**

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】黄耆15克　当归9克　白芍9克　川芎6克　红花9克　玄参9克　荆芥9克　白蒺藜9克　甘草6克

【功用】养血润燥，消风止痒。

【主治】老年皮肤瘙痒症。

63943　**养阳双解散**

《点点经》卷三。为原书同卷“四逆双解散”之异名。见该条。

63944　**养阳济阴汤**

【方源】《点点经》卷三。

【组成】当归　淮耆(炙)　车前　熟地　白术　羊藿　玉竹　陈皮　枳壳　茯神　川芎

【用法】黑枣、建莲为引，水煎服。

【主治】酒伤黄肿，气喘发咳，小腹肿满膨胀等。

63945　**养阴止血汤**

【方源】《妇产科学》。

【组成】生地八钱　生白芍三钱　黄芩三钱　玄参三钱　石斛三钱　地骨皮三钱　煅牡蛎一两　花蕊石一两　棕榈炭四钱　侧柏叶五钱　藕节炭四钱

【功用】养阴止血，固摄冲任。

【主治】崩漏属于阴虚血热者。

【方论选录】生地、花蕊石、棕榈、侧柏叶、藕节凉血止血；白芍、黄芩、地骨皮、牡蛎平肝

清热；玄参、石斛养阴生津而起到养阴止血，固摄冲任的功效。

63946 **养阴甘桔汤**

【方源】《证因方论集要》卷四引汪蕴谷。

【组成】甘草　桔梗　生首乌　玉竹　丹皮　当归　黑大豆

【主治】体虚肿腮者。

【方论选录】首乌、玉竹以养阴，当归、丹皮以和血，黑大豆除热解毒，桔梗清头目，甘草扶脾胃。

63947 **养阴生肌散**

【方源】《中医皮肤病学简编》。

【组成】雄黄 20 克　青黛 20 克　甘草 20 克　冰片 2 克　牛黄 10 克　黄柏 10 克　龙胆草 10 克

【用法】上为末。外用。

【主治】口炎。

63948 **养阴抑阳汤**

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】尖生　归身　枯芩　骨皮　酒芍　麦冬　川连　柴胡

【用法】水煎服。

【主治】麻症血虚，余毒内扰，发热。

63949 **养阴补脾汤**

【方源】《慎斋遗书》卷七。

【组成】白茯苓　茯神　甘草　白芍　生地各一钱　山药　归身各一钱半　熟地三钱　大枣二枚

【主治】思虑过度以致伤神，或因饮食不节而伤脾，或因郁怒不节而伤肝，肝木凌脾，以致火动，右胁热，或足大趾端循趾内侧白肉际间、内踝前臁、上腹热如电状，或自觉手足脱落，眼见虚形，或喜食易饥，或食入反胀，面色焦黄，肌肉不泽，神困意懒，痰有红筋。

63950 **养阴驱邪汤**

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】全当归八钱（酒炒）　川芎三钱　紫苏一钱五分　淡豆豉三钱　炮姜一钱五分　枳壳一钱五分　砂仁三钱（研）　炙甘草三分

【用法】上用酒半杯对水煎服。

【主治】产后受瘟疫，头痛恶寒发烧。

【宜忌】一服盖暖，出汗自愈。

【加减】如恶心发呕，加藿香梗三钱；如作泻，加炒白芍五钱，车前子三钱；如热入血室，经到发昏，加益母草三钱，炒黑山楂三钱；如腹痛，加酒炒玄胡索二钱；如误药抽搐，反张发厥等证，加白僵蚕三钱，钩藤二钱，制南星二钱，橘红一钱五分；如大便结燥六七日不通，发厥者，加制军五钱，玄明粉二钱。

63951 **养阴软坚汤**

【方源】《疡科捷径》卷上。

【组成】海石　麦冬　川贝　云苓　橘红　沙参　生地　牡蛎　生草　海带　昆布　南星

【主治】内伤气怒郁结，痰火凝集而成瘰疬。

63952 **养阴固土饮**

【方源】《喉科家训》卷三。

【组成】广藿香　阳春砂　酒生地　肥麦冬　奎白芍　川尖贝　焦麦芽　生甘草

【用法】流水煎服。

【主治】白喉，服药后吐泻者。

63953 **养阴和中饮**

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】赤色鲜首乌五钱（打碎）　当归三钱　白芍三钱（酒炒）　炙甘草三分　枳壳一钱五分　白蔻仁二钱（研）　陈皮一钱

【用法】水煎服。

【主治】瘟疫表邪未清而转疟者。

【加减】如胃气不开，加炒谷芽三钱，炒峡面一钱五分；如咳嗽痰多，加制半夏二钱，炒莱菔子三钱；如口渴，加麦冬二钱；如泻，加车前子三钱；如腹痛，加煨广木香一钱五分；如大便结，加酒泡巴戟天五钱。

63954 **养阴和中煎**

【方源】《喉科家训》卷三。

【组成】润玄参　花提冬　湖丹皮　大生

地　炒麦芽　南薄荷　广藿香　缩砂仁

【用法】水煎服。

【主治】白喉病，未服药而呕泻者。

63955　**养阴泻火汤**

【方源】《古今名方》引《老中医临床经验选编》。

【组成】生地12克　丹皮　黄柏各6克　赤芍　茯苓　山药　泽泻　吴茱萸　知母　川牛膝各9克　川芎2.4克

【功用】养阴泻火。

【主治】头皮油脂外溢，头发易脱。

【备考】本方内服，配合四黄汤洗头：黄连须、黄芩、黄柏、大黄各9克，龙胆草6克，枯矾12克。煎水洗头，隔日一次。

63956　**养阴定搐汤**

【方源】《热辨》。

【组成】生地　丹皮　赤苓　炒栀子　泽泻　当归　柴胡　钩藤钩

【用法】水煎服。

【主治】热久伤阴，风乃内动，作搐。

63957　**养阴柏子丸**

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】柏子仁　牛膝　卷柏各五钱　泽兰叶　续断各二两　熟地三两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下。

【主治】妇人血虚，经少或闭，皮热骨疼，渐瘦脉数。

63958　**养阴种玉汤**

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】熟地五钱　白芍五钱　当归一钱　茯苓二钱　山茱萸五钱　甘菊花一钱　丹皮二钱　山药三钱　杜仲二钱　牛膝一钱

【用法】水煎服。

【主治】妇人瘦怯身躯，久不受孕。

63959　**养阴复液汤**

【方源】《杂证要法》卷一。

【组成】大生地　生鳖甲(打碎)各五钱　生龟版(打碎)五钱　黑玄参　麦冬　北沙参各三钱　杭白芍二钱　生甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】斑疹，壮热渐退，大伤真阴者。

63960　**养阴消毒汤**

【方源】《医林纂要》卷九。

【组成】当归二钱　生地黄一钱　川芎一钱　半夏五分(不可多用)　陈皮八分　茯苓八分　甘草(炙)五分　瓜蒌仁(去油)八分　桔梗八分

【用法】水煎服。

【主治】麻后咳嗽，积热遗于肺，而郁热成痰癖者。

【加减】渴，加麦门冬、枳壳；喘，加桑白皮、苏子；喉痛，加桔梗；肺热甚则去半夏，加贝母。

63961　**养阴润燥汤**

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】钩藤　制首乌　阿胶　白菊花　当归　丹皮　生地　白芍　沙苑子　玄武版　女贞子　丝瓜络

【主治】似痹非痹。

63962　**养阴益气汤**

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】泡参　丹参各三钱　地骨皮五钱　白芍三钱　黄柏二钱　麦冬四钱　五味子一钱

【用法】水煎服。

【功用】扶气清热。

【主治】月经色红量多，时有潮热，头晕心悸，苔黄微干，舌红，脉浮数无力。

63963　**养阴益阳汤**

【方源】《点点经》卷四。

【组成】炙耆　葳蕤　全归　生地　茯神　山栀　黄柏　木通　车前各一钱五分　川芎　白芍　淡竹各一钱　甘草三分　竹茹一团

【用法】黑枣三枚为引，水煎服。

【主治】脉三部洪数，大汗如雨，人事软弱，日夜不寐，胸膈烦躁，喘息。

63964　**养阴培元煎**

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】大熟地八钱 当归五钱(酒洗) 甘草五分 炮姜一钱 枳壳一钱五分 益母草三钱 砂仁二钱

【用法】水煎服。

【主治】小儿痘后患痢。

63965 养阴救阳汤

【方源】《点点经》卷二。

【组成】黄耆三钱 当归 川芎 熟地 杭芍 白术 茯苓 陈皮 羊藿 怀膝各一钱半 仙茅一钱 炙甘草八分

【用法】姜、枣为引,不煎服。

【功用】调理酒伤。

63966 养阴清肺汤

【方源】《玉钥》卷上。

【组成】大生地二钱 麦冬一钱二分 生甘草五分 玄参一钱半 贝母八分(去心) 丹皮八分 薄荷五分 炒白芍八分

【功用】养阴清肺。

①《玉钥》:养阴清肺,兼辛凉而散。②《北京市中药成方选集》:清热润肺。③《中国药典》:养阴润燥,清肺利咽。

【主治】①《玉钥》:喉间起白如腐,即所谓白缠喉也。初起发热,或不发热,鼻干唇燥,或咳或不咳,鼻通者轻,鼻塞者重,音声清亮,气息调匀易治。②《方剂学》:白喉。喉间起白如腐,不易拔去,咽喉肿痛,初起发热,或不发热,鼻干唇燥,或咳或不咳,呼吸有声,似喘非喘。

【加减】质虚,加大熟地,或生熟地并用;热甚,加连翘,去白芍;燥甚,加天冬、茯苓。

【宜忌】如有内热及发热,不必投表药,照方服去,其热自除。

【方论选录】①《中医方剂学讲义》:方中麦冬、玄参、生地、丹皮养阴清热,凉血解毒;甘草生用,泻火解毒;贝母润肺化痰;薄荷宣肺达邪。合用具有养阴清肺之功。②《方剂学》:本方为治疗白喉的常用方。白喉一证,多由素体阴虚蕴热,复感疫毒所致,治宜养阴清肺为主,兼散疫毒。方中以生地养肾阴;麦冬养肺阴;玄参清虚火解毒;丹皮凉血而消肿;贝母润肺化痰;白芍敛阴泄热;少佐薄荷散邪利咽;甘草和药解毒。综合全方,滋养肺肾,消肿利咽,微散表邪,故对阴虚白喉,确有良效。

【临证举例】①喉痹 《冉雪峰医案》:魏某,女。患喉痹,咽喉肿痛,滴水不入,药不得下,病来较暴,俨已封喉,唇口色乌,眼面俱肿,气痰鼾鼾,筑筑然若将窒息,病势颇危,某医院拒不收治,求诊于余。予曰:热毒太炽,肿毒太剧,但非必死证。因喉闭药物难下,先以雷氏六神丸置舌上,以温水少许润之,至第二日茶水勉下,乃投养阴清肺汤,原方薄荷减半,生地加倍,越七日诸病消失,气平神清如常人。②白喉 《福建中医药》(1959;12:516):采用养阴清肺汤加减制为合剂,治疗白喉 213 例,处方:生地一两,玄参、麦冬各八钱,丹皮、白芍、蒲公英、板兰根各四钱,银花、连翘、百合、川贝、薄荷、甘草各三钱,煎成 90 毫升,分次频服,另加吹喉散吹喉。服药后多数于第二天退热,白膜消退最快者为 2 天,最迟者 12 天,平均为 5.5 天。杆菌培养转阴最快 2 天,最慢 12 天,平均 6.4 天。213 例中,痊愈 192 例,死亡 21 例。③急性扁桃体炎 《中华医学杂志》(1962;3:169):用本方加减,治疗急性扁桃体炎 50 例。处方:大生地八钱,白芍四钱,玄参八钱,浙贝四钱,甘草二钱,麦冬四钱,薄荷一钱,丹皮四钱。大便秘结者加玄明粉三钱;小便短黄者加车前子二钱;口干者加天花粉三钱。结果:治愈 45 例,好转 3 例,无效 2 例。在有效病例中,轻者服药 1 剂,重者 4 剂,多半服药 2 剂即可获效。服药过程中未发现不良反应。

【备考】本方制成膏剂,名“养阴清肺膏”(见《全国中药成药处方集》北京方);制成糖浆剂,名“养阴清肺糖浆”(见《中药制剂手册》)。

63967 养阴清肺汤

【方源】《医学碎金录》引聂云台方。

【组成】黄芩　黄连　银花　连翘　石膏　人中黄　生地　玄参　白芍　浙贝　木通　桑叶　薄荷　鲜芦根

【主治】咽白喉。

63968　**养阴清肺膏**

《全国中药成药处方集》(北京方)。即《玉钥》卷上"养阴清肺汤"制成膏剂。见该条。

63969　**养阴清络饮**

【方源】《马培之医案》。

【组成】炙鳖甲　秦艽　黄柏　炙龟版　地龙　川石斛　独活　赤芍　川牛膝　当归　川萆薢　苡米仁　桑枝

【主治】鹤膝,肿热日久,夜分痛甚者。

63970　**养阴清痢饮**

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】当归三钱　白芍五钱(酒炒)　炙甘草五分　枳壳一钱八分　槟榔一钱五分　车前子三钱　莱菔子三钱(炒,研)　陈皮一钱五分　煨木香一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】痢疾。

【加减】如腹痛,加制军三钱;如下痢红多,加酒炒川连五分;如无红白色,加炮姜一钱五分,红枣五个。

63971　**养阴清燥汤**

【方源】《玉钥续编》。

【组成】大生地一钱　大麦冬一钱　川贝母八分　粉丹皮八分　玄参一钱　薄荷叶三分　生甘草五分

【用法】水一钟半,煎至五六分,温服。

【主治】肺肾阴虚,感燥而发,咽痛白腐缠喉,及口舌白疮,口糜唇疮。

【加减】发热者,不必拘泥外感之有无,只照方投之而热自退;鼻塞,音微痞,气急者,去薄荷,加玉竹二钱,北沙参二钱;舌苔黄色而唇燥者,加真钗斛一钱;肺热咳嗽,加干桑叶三片;大便闭结,三四日未更衣者,加叭哒杏仁(去皮尖,研末)八分,黑芝麻三钱,或火麻仁二钱;时行燥疫,易于传染者,加陈人中黄三分;阴火盛而咽干不润者,加大熟地三钱,天门冬(去心)二钱,女贞子一钱;体质虚弱,两脉浮数无力,或潮热不退者,去生地,重用大熟地,而热自除;白腐已减,尚有些微,滞于咽间不得退净者,亦须重用大熟地至五六钱,其白即除矣;喉白既已退净,可用炒白芍八分,甜百合二钱,以固肺气,淮山药亦可加入。

63972　**养阴解毒汤**

【方源】《临证医案医方》。

【组成】玄参6克　石斛5克　麦冬9克　紫花地丁5克　金银花5克　连翘5克　山栀1克　竹叶1克

【功用】养阴解毒。

【主治】麻疹退后,阴液耗伤,余毒未净,咽干唇裂,鼻干无涕,手足心热,烦躁,夜间汗出,食欲不振,大便干,小便黄。

63973　**养阴辟邪丹**

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】当归五钱　白芍五钱　柴胡一钱　甘草一钱　蔓荆子五分　川芎三钱　天花粉一钱　茯苓三钱

【用法】水煎服。

【主治】饥饱劳役,伤损津液,以致口渴舌干,又感风邪,头痛发热者。

63974　**养肝抑邪汤**

【方源】《会约》卷三。

【组成】当归二钱　白芍(酒炒)一钱半　柴胡(酒炒)一钱半　熟地二钱　川椒(炒)七分　麦冬一钱　乌梅二三钱　木香(煨)三五分　白术一钱半　茯苓二钱

【用法】水煎服。

【主治】厥阴肝经病,或气上撞心,心中疼,烦热消渴,饥不欲食,食即呕蛔,下利不止,脉沉而弦。

【加减】如消渴甚者,加黄柏、知母各一钱半,肉桂五分。

63975　**养肝活络汤**

【方源】《会约》卷十五。

【组成】当归二钱 白芍（酒炒） 肉桂各一钱 蜜耆一钱半 熟地二三钱 秦艽 防风 木瓜 阿胶（炒）各一钱 白术一钱半

【用法】水煎服。

【主治】产后中风，血虚不能养肝，以致木动风摇，角弓反张，神昏扑倒。

【加减】以此温养，如不应，加附子、人参；如血虚有热者，加生地二钱，丹皮一钱半；如风盛不退，四肢拘挛，加钩藤钩二钱。中风昏迷，用荆芥为末，童便加酒调服二钱，神效。

63976 **养肺止嗽丸**

【方源】《全国中药成药处方集》（禹县方）。

【组成】辽沙参 姜半夏 陈皮各一两 大熟地三两 川厚朴一两 知母二两 辽五味一两 白茯苓一两五钱 炙冬花一两 炙枇杷二两 生百合三两 川贝母 地骨皮 麦冬各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸二钱重。每服一丸，白开水送下。

【主治】气血双亏，发热自汗，肺气喘急，咳嗽痰涎。

【宜忌】风寒咳嗽忌用。

63977 **养肺止嗽丹**

【方源】《全国中药成药处方集》（沈阳方）。

【组成】百合六两 生地三两 紫菀四两 川贝五两 白果 兜铃 天冬各四两 五味子二两 枳壳 莱菔各二两 木香 麻黄（炙） 白芍各三两 杏仁 甘草各四两 草蔻三两 苏子二两 蒌仁五两 玄参 陈皮各三两 当归五两 京知母四两 熟地三两 阿胶珠八两 冬花 麦冬各三两 橘红四两 乌药三两 桔梗二两 桑皮四两 槟榔三两 川朴四两 苏叶三两 粟壳十两 黄芩二两 茯苓三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，二钱重。每服一丸，小儿半丸，白开水送下。

【功用】化痰止嗽，养肺补气。

【主治】新久咳嗽，痰中带血，痨伤咳嗽，骨蒸潮热，痰喘气短，身瘦食少，倦怠乏力，虚劳盗汗。

【宜忌】忌咸辣食物。

63978 **养肺去痿汤**

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】金银花三钱 生甘草五钱 生地二钱 麦冬三钱 紫菀五钱 百部五分 百合二钱 款冬花三分 天冬门一钱 贝母三分 白薇三分

【用法】水煎服。

【主治】肺痿。久嗽之后，肺受损伤，皮肤黄瘦，咽嗌嘶哑，自汗盗汗，卧眠不得，口吐稠痰，腥臭难闻，而毛色憔悴，嗽之时必忍气须臾，轻轻吐痰，始觉膈上不痛，否则必大痛不已，气息奄奄，全无振兴之状。

63979 **养荣双和汤**

【方源】《原瘄要论》。

【组成】人参 当归 熟地黄 黄耆 肉桂 白芍 麦冬 甘草

【用法】水煎服。

【主治】疹退之后，饮食如常，动心如故，猝然心腹绞痛，遍身汗出如水；及中恶等。

【加减】如有积食，加神曲、麦芽；如有热，去肉桂。

63980 **养荣平肝汤**

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】当归四钱 川芎二钱 白芍三钱 茺蔚子三钱 桑皮三钱 枳壳二钱（炒） 寸冬三钱 贝母三钱 石斛三钱 菊花二钱 夏枯草三钱 甘草一钱 羚羊角五分

【用法】水煎服。

【主治】倒睫卷毛症（眼睑内翻倒睫）。两眼赤酸，怕日羞明，上下眼皮弦紧皮松，倒睫卷毛，刺激眼球，发生白膜，热泪常流。

63981 **养荣归脾汤**

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十一。

【组成】熟地八钱 酸枣仁二钱（炒，研） 鸡腿白术三钱（炒黄） 白芍一钱二分（酒炒） 白茯苓一钱五分 牛膝二钱 麦冬二钱（炒

燥）　五味子六分　上肉桂（去皮）八分

【用法】加灯心、莲子，水煎，食前温服。

【主治】一切劳伤发热，咳嗽吐血，似疟非疟，懒食倦怠，寸洪尺弱。

63982　**养荣生化汤**

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】当归四钱　白芍一钱　白茯苓一钱　人参一钱　白术二钱　陈皮五分　大腹皮五分　香附五分　苁蓉一钱　桃仁十粒（制）（一本无桃仁）

【主治】产后，大便不通，误服下药成胀，及腹中作痛者。

63983　**养荣壮肾汤**

【方源】《傅青主女科·产后编》卷下。

【组成】当归二钱　防风四分　独活　桂心　杜仲　续断　桑寄生各八分

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】产后感风寒，腰痛不可转。

【加减】服药后痛未止，属肾虚，加熟地三钱。

63984　**养荣壮肾汤**

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】当归二钱　独活　桂心　川芎　杜仲各八分　续断八分　防风四分　桑寄生八分

【用法】加生姜，水煎服。

【主治】产后腰痛，属劳伤，或风寒所乘者。

【加减】二服后痛不止，虚也，加熟地三钱；失血过多者，加当归二钱，黄耆、白芍各一钱五分；乍热乍寒，加当归、白芍、川芎、人参、炙草各八分，炮姜一钱。

63985　**养荣附气汤**

【方源】《救偏琐言》卷十。

【组成】当归　熟地　川芎　红花　生地　甘草

【用法】加生姜一片，水煎服。

【主治】痘窠囊苍老，浆不厚而色淡白者。

63986　**养荣承气汤**

《重订通俗伤寒论》。为《瘟疫论》卷上“承气养荣汤”之异名。见该条。

63987　**养荣透毒汤**

【方源】《救偏琐言》卷十。

【组成】桔梗　甘草　当归　川芎　熟地　紫草　山楂　蝉蜕　木通　穿甲

【用法】加芦笋十株，水煎服。

【主治】痘疮血虚，淡白，并囊窠不起者。

63988　**养荣健脾丸**

【方源】《医学六要》卷七。

【组成】人参　白术各四两　枳实一两半　当归　白芍各三两　抚芎一两　麦冬二两　柏子仁一两

【用法】生地黄煎汤熬膏，神曲糊丸。米饮送下。

【主治】血少肠胃枯涩，口干便秘，皮肤干燥，食不能运；妇人经血干涸，色淡来少。

63989　**养荣健脾丸**

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】洋参　归身　丹参　酒芍　柏仁　建曲　谷芽　玉竹

【主治】脾胃不足，饮食不思，血虚脾虚，肌肤瘦疲。

63990　**养荣鹿韭丸**

【方源】《元和纪用经》。

【组成】鹿韭（牡丹）　当归　续断各等分

【用法】上为末，酒煮米粥膏为丸，如梧桐子大。每服二十五至四十丸，酒送下，不拘时候。

【功用】调养血脉，补劳伤不足，续筋骨，生肌肉，除寒热，通关腠。

【主治】女人血候不调，血沥腰痛；男子疮痈留滞，失血。

【加减】妇人血瘕，男子伤折，煎加没药四分之二（别研）和服。

63991　**养荣舒筋汤**

【方源】《会约》卷七。

【组成】当归二钱　陈皮一钱　熟地三钱　肉桂一钱五分　木瓜二钱　白芍（酒炒）一钱五分　厚朴（姜炒）八分　白术一钱二分　甘

草（炙） 茯苓各一钱

【用法】水煎，温服。先用盐汤吐法。

【主治】干霍乱。

【加减】如血虚寒甚，加炒干姜一钱；如小腹寒痛，加吴茱萸六分；如气滞作痛，加木香、砂仁、乌药之属。

63992 养胃开痰汤

【方源】《痘疹活幼至宝》卷终。

【组成】人参五分 白术五分 白茯苓五分 桔梗三分 建莲子（去心，炒）五分 山楂肉五分 山药（炒）五分 陈皮（去白）三分 制半夏三分 甘草（炙）五分

【用法】生姜一片同煎，温服。

【主治】痘出稠密，而脓不甚满，食减痰盛者。

【加减】渴者，去半夏，加麦冬（去心）、北五味（研碎）；吐逆者，加藿香、砂仁。

63993 养胃化毒汤

【方源】《片玉痘疹》卷九。

【组成】白术 白茯苓 砂仁 陈皮 黄连（姜汁炒）少许

【用法】水煎服。

【主治】痘疮成浆之时，吐而有物。

63994 养胃化疸汤

【方源】《医碥》卷三。

【组成】茵陈 苍术 木通 泽泻 猪苓 山栀 白茯苓 薏苡仁

【主治】五疸。

【加减】食滞，加神曲、山楂、麦芽；酒疸，加苜蓿、葛根；女劳疸，加当归、红花。

63995 养胃进食丸

【方源】《御药院方》卷三。

【组成】人参（去芦头） 甘草（锉）各一两 白术 白茯苓（去皮）各二两 厚朴三两（去粗皮，生姜制，炒） 陈皮（去白）一两半 神曲（炒）二两半 大麦糵（炒黄）一两半 苍术五两（去粗皮，泔浸）

【用法】上为细末，水面糊为丸，如梧桐子大。每服三十至五十丸，食前用温生姜汤送下；或粥汤送下亦得。

【功用】滋养脾胃，进美饮食，消痰导气，去风寒暑湿冷邪气。

【主治】脾胃虚弱，心腹胀满，面色萎黄，肌肉清瘦，怠惰嗜卧，全不思食。

【备考】本方改为汤剂，名“养胃进食汤”（见《类证治裁》卷六）。

63996 养胃进食汤

《类证治裁》卷六。即《御药院方》卷三“养胃进食丸”改为汤剂。见该条。

63997 养胃沉香丸

【方源】《医方类聚》卷一〇二引《经验秘方》。

【组成】沉香 当归 广木香 白茯苓 陈皮（去白） 补骨脂 肉豆蔻（面裹煨） 白豆蔻 荜澄茄 青皮各半两 丁香四钱 白术七钱 桂花三钱 大故脂一两（面炒，去瓤） 人参 萝卜 藿香叶各三钱

【用法】上为细末，生姜自然汁、熟枣肉为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，米饮汤送下。

【主治】胃气虚，脐腹冷痛，大便滑泄，咽膈塞闷，口苦无味，四肢无力，不思饮食，中满痰逆，噫气吞酸，困倦。

63998 养胃枳壳丸

【方源】《医方类聚》卷一〇四引《经验秘方》。

【异名】枳术丸。

【组成】人参 甘草 青皮（去白） 沉香 黄连（酒煮，焙） 玄胡索各一两 白术 枳壳（去瓤，麸炒） 白茯苓 半夏曲 南木香各二两 厚朴 神曲（炒） 麦芽（炒）各三两 陈皮（去白）一两半 益智仁 片姜 檀香末各一两二钱 槟榔二两半 当归（酒洗） 甘松（洗去土）各半两 白豆蔻三两半 缩砂仁 京三棱 蓬莪术（煨）各四两 苍术（去皮，泔浸）五两

【用法】上为细末，生姜自然汁打糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，食后淡姜汤送下。

【主治】翻胃。

63999　**养胃胜金汤**

【方源】《宋氏女科》。

【组成】黄耆　白术　茯苓　甘草　芍药　陈皮　麦芽　川芎　柴胡　当归

【用法】水煎，空心服。

【主治】妇人女子经闭。

【宜忌】经脉不行，多有脾胃损伤而致者，不可轻用通经破血之药，用此补养脾胃，脾旺则能生血而经自行矣。

64000　**养胃健脾丸**

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】人参　神曲（炒焦）　白术　山楂肉（炒焦）　莲肉　茯苓各二两　陈皮　甘草（炙）　法半夏　麦芽（炒焦）　枳实　广木香　泽泻各一两　豆蔻五钱

【用法】上为细末，水泛为丸，如梧桐子大。每服三钱，熟汤送下。

【主治】脾胃虚弱，饮食恶心，胸膈饱闷，食不消化，大便泄泻，四肢无力，饮食不甘。及多酒伤脾，或作呕吐吞酸，口舌苦干，一切脾胃等证。

64001　**养胃增液汤**

【方源】《中医儿科学》。

【组成】石斛　乌梅　北沙参　玉竹　甘草　白芍

【功用】养胃育阴。

【主治】小儿厌食。口干多饮而不喜进食，皮肤干燥，大便干结，舌苔光剥，或舌红少津，脉细。

64002　**养胎人参丸**

【方源】《圣惠》卷七十五。

【组成】人参一两（去芦头）　白茯苓一两　当归一两　柴胡一两（去苗）　厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟）　枳壳三分（麸炒微黄，去瓤）　桑寄生一两　刺蓟一两　阿胶一两（捣碎，炒令黄燥）　甘草半两（炙微赤，锉）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前以温水送下。

【主治】妊娠胎不长。

64003　**养津益胃汤**

【方源】《千家妙方》引刘渡舟方。

【组成】玉竹 30 克　石斛 30 克　白芍 12 克　生地黄 12 克　麦冬 12 克　胡麻 10 克　甘草 6 克　钩藤 10 克　石决明 30 克　何首乌 10 克

【用法】水煎服，每日一剂。

【功用】滋养胃液，以生营血，平息肝风。

【主治】风阳走于肢体，消灼血液，肌肉萎缩而游走作痛。

【临证举例】杨某某，女，28 岁。1971 年开始，两手掌鱼际肌肉渐见萎缩，并伴麻木感，四肢及后背时现游走性疼痛，屡治无效。饮食日减，更厌荤腥，口咽发干而不多饮，月经提前，量少，心烦不安，两颊绯红，舌红苔薄黄，脉大而软。证由胃液不足，血虚不能养肝以熄风，而使风阳走于肢体，消灼血液所致。治宜滋养胃液以生营血，投以养津益胃汤，共服 30 余剂而愈。

64004　**养真益元膏**

【方源】《幼科证治大全》引《济世全书》。

【组成】人参五钱　白术（炒）　茯苓　陈皮　麦冬　山药各一两　山楂二两　甘草（炙）五分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如芡实大。每服三丸，枣汤化下。

【主治】小儿魃病，虚羸面黄，肌瘦体热。

64005　**养脏复元汤**

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】人参三钱　白术（去芦，炒）一钱半　白茯苓（去皮）一钱　白豆蔻（去壳，研）一钱　干姜（炒黑）一钱　粟壳（去芦，炒）一钱半　制附子五分　乌梅二个　木香一钱　甘草（炒）五分

【用法】上锉一剂。加北枣三枚，水煎，空心服；滓再煎服。

【主治】下痢，曾服推荡药过多，又服攻击

克伐等不效，以致形气极弱，去无休息，积久恶候出者。

【宜忌】谨节饮食。

64006 养脑利肢汤

【方源】《衷中参西》下册。

【组成】野台参四钱 生赭石六钱（轧细） 怀牛膝六钱 天花粉六钱 玄参五钱 生杭芍四钱 生明乳香三钱 生明没药三钱 威灵仙一钱 䗪虫四枚（大者） 制马钱子末二分

【用法】上药十一味，将前十味煎汤，送服马钱子末；至煎滓再服时，亦送服马钱子末二分。

【主治】脑部充血以致肢体痿废，迨脑充血治愈，脉象和平，而肢体仍痿废者。

64007 养营惜红煎

【方源】《古方汇精》卷三。

【组成】归尾三钱 川芎一钱五分 荆芥穗一钱（炒黑） 血余灰五分

【用法】水煎成，入陈京墨酒磨汁半小杯，童便一小杯，和温服。

【主治】产后鼻中流血不止。

64008 养营解毒汤

【方源】《经验集痧疹选要》。

【组成】生地 当归 白芍 川芎 丹皮 连翘 丹参 银花 黄芩 知母 木通 灯心

【主治】痦后血不归经。

64009 养液通痹汤

【方源】《伏瘟证治》。

【组成】苏薄荷一钱半 杭菊花三钱 冬桑叶三钱 荷叶三钱 鲜生地五钱 鲜石斛一钱半 麦冬四钱 金银花四钱 京玄参三钱 原蚕砂三钱 米仁六钱 萆薢三钱 秦艽一钱半

【主治】伏瘟终后期，心神清醒后，身热未清，口渴舌燥，头痛甚剧，项筋疼胀，身不转侧，去汗，但头汗出，左关脉弦数者。

【加减】大便不通者，麦冬、玄参、银花可各加至五六钱。

64010 养筋活血丹

【方源】《医方易简》卷十。

【组成】生地 当归 川芎 赤芍 羌活 桂枝 乌药 青皮 秦艽 续断 杜仲 破故纸 甘草 木瓜 三七 枳壳 小茴香 香附 五加皮 威灵仙各等分

【用法】上为细末。每服二三分，用绍酒调下。

【主治】跌打损伤。

64011 养脾进食丸

【方源】《医便》卷二。

【组成】人参 白术（土炒） 白茯苓各三两 甘草一两半 陈皮 半夏曲 厚朴（姜汁炒）各二两 苍术（麸炒）三两 砂仁（炒）一两半 神曲（炒） 麦芽（炒）各二两半 木香五钱

【用法】上为细末，神曲、麦芽面打糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食远白汤送下。

【主治】泻痢后脾胃虚弱，饮食减少。

64012 养脾肥儿丸

【方源】《幼科发挥》卷四。

【组成】人参 白术 甘草 陈皮 枳实 木香 茯苓 砂仁 山药 莲肉 麦芽 神曲 山楂 青皮

【用法】上为末，荷叶浸水煮粳米饭为丸，如麻子大。米饮送下。

【主治】脾胃久虚。

【临证举例】脾胃病 本县大尹朱云阁公子，常有脾胃病，向是韩医生调治。平时服养脾丸，伤食服保和丸，未有宁日。一日问余云：闻汝小儿甚精，小官人脾胃久虚，汝可治之？余曰：当攻补兼用，不可偏补偏攻。韩医云：密斋非所长也，如专补脾胃则饮食难化，如专消导则中气易耗。尹不听，曰：汝进一方来。乃进养脾肥儿丸，修合服之，大效，再无脾胃之病。尹犹相信，赐匾。

64013 养脾消积丸

【方源】《幼科发挥》卷一。

【组成】白术一两　陈皮七钱五分　苍术五钱　厚朴(姜汁炒)五钱　枳壳(面炒)五钱　半夏五钱　青皮五钱　神曲五钱　麦芽五钱　山楂五钱　炙甘草三钱

【用法】上为细末，蒸饼为丸，如黍米大。每服二三十丸，米饮送下。

【功用】消宿食，去陈积。

【主治】小儿初食鸡肉太早，自此成积，日渐羸瘦，不思乳食。

64014　养脾消积丸

【方源】《幼科发挥》卷四。

【组成】钱氏异功散加木香　青皮　砂仁　使君子　枳实(炒)　黄连(炒)

【用法】上为末，神曲糊丸，米饮送下。

【主治】小儿疳积。

【临证举例】疳积　胡凤崖子病疳，但多食则腹痛，请予治之。予曰：人以谷为本，谷入则痛，岂新谷作痛乎？必有旧谷为积，未能消去，故与新谷相持也，岂有绝谷食之理？乃作养脾消积丸服之，安。

64015　养精种玉汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【组成】大熟地一两(九蒸)　当归五钱(酒洗)　白芍五钱(酒炒)　山萸肉五钱(蒸熟)

【用法】水煎服。

【功用】补肾水，平肝木。

【主治】妇人身瘦不孕，一交男子，即卧病终朝。

64016　养阴清肺糖浆

《中药制剂手册》。即《玉钥》卷上"养阴清肺汤"改为糖浆剂。见该条。

64017　养元固本暖腰方

【方源】《种福堂方》卷二。

【组成】广木香　真川椒　大茴(炒)　故纸　升麻各一两　川附子五钱　蕲艾半斤　丁香四钱　上肉桂　川楝子各一两

【用法】先将艾搓软，次以各药为末和匀，用绫绢做暖腰，入药密扎腰上，着肉。

【主治】养元固本，暖腰。

64018　养心延龄益寿丹

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】茯神五钱　柏子仁四钱(炒)　丹参四钱　酒白芍四钱　丹皮四钱　全当归五钱(酒炒)　川芎二钱　干生地四钱(酒洗)　醋柴三钱　香附米四钱(炙)　栀子三钱(炒)　酒条芩三钱　陈皮三钱　野于术二钱(炒)　枳壳四钱(炒)　酸枣仁四钱(炒)

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服三钱，白开水送下。

【功用】养心安神，补肾滋阴，调肝理脾。

【主治】心肾俱亏，肝脾不调，心烦躁汗，夜寐不实，耳觉作响，梦魇惊怖，醒后筋惕，梦闻金声，偶或滑精，腰膝痠痛，坐立稍久则腰膝痠痛，劳累稍多则心神迷惑，心中无因自觉发笑，有时言语自不知觉，进膳不香。

64019　养心益肾百补丹

【方源】《宋氏女科》。

【组成】淮生地八两(酒蒸，另杵为膏)　枸杞子四两(酒浸)　山药四两　丹皮三两(去木)　茯苓三两(乳蒸)　山萸肉四两(酒蒸)　柏子仁二两(炒)　覆盆二两　泽泻二两(去毛)　五味子二两　菟丝子三两(水洗净，酒蒸烂，研饼，焙干，又研细末)

【用法】上为末，用蜜八两，鹿角胶一两，先溶入蜜，浮小麦粉四两，芡实粉四两，水调，亦入胶蜜同炼熟，和诸药，杵千余下为丸，如梧桐子大。每日空心服百丸，淡盐汤送下。

【功用】补益元气，培填虚损。

【主治】真精内乏，以致胃气怯弱，下焦虚惫，及梦泄自汗，头晕目黑，耳鸣，四肢无力者。

64020　养血当归地黄汤

《普济方》卷一一三。即《保命集》卷中"养血当归地黄散"。见该条。

64021　养血当归地黄散

【方源】《保命集》卷中。

【异名】当归地黄汤(《慎斋遗书》卷五)。

【组成】当归　地黄　芍药　川芎　藁本

防风 白芷各一两 细辛五钱

【用法】上㕮咀。每服五钱，水一盏半，煎至一盏，去滓，温服。

【主治】①《保命集》：破伤风，病日久气血渐虚，邪气入胃。②《景岳全书》：中风，少血偏枯，筋脉拘挛疼痛。

【备考】本方方名，《普济方》引作"养血当归地黄汤"。

64022 **养血壮筋健步丸**

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】黄耆（盐水炒）一两 山药一两 五味子一两 破故纸（盐水炒）一两 人参一两 白芍（酒炒）一两五分 熟地黄四两 枸杞子一两 牛膝（酒浸）二两 菟丝子（酒炒）一两 川归二两（酒洗） 白术一两（炒） 杜仲（姜汁炒）二两 虎胫骨（酥炙）一两 龟版（酥炙）一两 苍术（米泔浸）三两 黄柏（盐水炒）二两 防风六钱（酒洗） 羌活五钱（酒洗） 汉防己五钱（酒洗）

【用法】上为末，用猪脊髓七条，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一百丸，空心盐汤送下。

【主治】气血两虚，双足痿软，不能行动，久卧床褥。

64023 **养血祛风润燥汤**

【方源】《顾松园医镜》卷十五。

【组成】秦艽二三钱 胡麻（炒，研）三五钱 鲜首乌五钱至一两 生地三五钱 松子仁五钱至二两（研烂调服） 牛乳一杯（或牛酥一二两） 梨汁一杯

【主治】素患风热，大便秘者。

64024 **养血清热固胎饮**

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】归身八钱（酒炒） 川芎二钱 枳壳一钱五分（麸炒） 细黄芩一钱二分 紫苏一钱五分 淡豆豉三钱 砂仁二钱（研） 炙甘草三分

【用法】煨姜二片为引，水煎服。

【主治】妇人怀孕染瘟疫者。

【宜忌】盖暖取汗。

【加减】如恶心，加藿香梗三钱，灶心土三钱；如作泻，加炒白芍五钱，红枣五个；如腹痛，加煨广木香一钱；如腰痛，加制杜仲三钱，川续断五钱；如咳嗽，加川贝母八分；如内热，加青蒿三钱；如口渴，加花粉二钱；如咽喉痛，加桔梗二钱，牛蒡子二钱，换生甘草一钱；如心里热，加连翘一钱五分；如胎火旺，呕吐不止，加姜汁炒黄连三分，乌梅肉一钱五分；如大便结，加鲜首乌八钱；如子气上逆，加葡萄干五钱，纹银一两同煎服；如肝火化风，痰厥，加钩藤二钱，白僵蚕三钱，羚羊角一钱五分，磨郁金一钱和服。

64025 **养阴化湿除痢汤**

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】当归一两 白芍一两 车前子五钱 槟榔二钱 生军三钱 荆芥二钱（炒黑） 莱菔子五钱（炒，研） 生广木香一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】痢疾，血虚夹湿，渴又饮水，饮后胃中不舒，心烦懊憹，小便短涩，下利红白相间，似脓非脓，似血非血。

64026 **养阴调中化饮膏**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】西洋参三钱（研） 朱茯神六钱 柏子仁四钱（去油） 川贝母三钱（研） 次生地四钱 当归身四钱 陈皮三钱 制香附三钱 炒神曲四钱 炒枳壳二钱 焦山楂四钱 姜黄连一钱五分（研）

【用法】水煎去滓，再熬浓汁，兑炼蜜收膏。每服三钱。

【功用】养阴健脾祛痰。

【主治】火盛津枯，干咳，食滞纳呆，口渴思饮。

64027 **养阴解毒清痢汤**

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】当归五钱 银花二钱 甘草五分 枳壳五分（炒） 陈皮一钱五分 白芍五钱（酒炒） 车前子三钱 煨广木香八分

【用法】水煎服。

【主治】小儿痘疹后，毒热未清之痢，面赤，手足温者。

【加减】如红多热重，加酒炒黄连三五分；痢不止，加制军三钱；如恶心，加灶心土三钱；如伤肉食，加炒山楂二钱；如伤面食，加炒莱菔子二钱；如伤蛋积，加白蔻仁一二钱；如伤糯米食积，加杏仁三钱，炒麦芽二钱；如生冷伤胃，加煨老姜二钱，红枣三枚。

64028　养命开心益智方

【方源】《千金》卷十四。

【组成】干地黄　人参　茯苓各二两　苁蓉　远志　菟丝子各三两　蛇床子二分

【用法】上为末。每服方寸匕，一日二次。

【主治】好忘。

【宜忌】忌兔肉。

【方论选录】《千金方衍义》：地黄滋心血，人参固中气，茯苓安神志，余皆滋补下元，收摄虚阳，不使上扰灵明也。

64029　养营清热和中汤

【方源】《摄生众妙方》卷四。

【组成】当归（酒洗）一钱　白芍药（炒）八分　生地黄（酒洗）一钱　白术一钱　白茯苓八分　黄芩（炒）八分　黄柏（炒）七分　生甘草五分　香附（童便浸）四分　陈皮（去白）四分　贝母五分　山栀仁（炒）六分　麦门冬（去心）七分

【用法】用水一钟半，加生姜三片煎，食远服。

【功用】养阴，清热，和中。

【主治】风热郁结，头目昏眩，咳嗽。

64030　养阴凉血补心滋肾丸

【方源】《广笔记》卷二。

【异名】补心滋肾丸（《医学正印》卷上）。

【组成】麦门冬六两　鳖甲六两　五味子六两　怀生地黄八两　山茱萸四两　牡丹皮三两　白茯苓三两（拌人乳晒，至六两）　天门冬四两　杜仲（去皮，切片，酥炙）四两　黄柏四两　砂仁二两　甘草一两　怀山药四两　柏子仁（拣净）八两（酒蒸，另研细如泥）　车前子三两　菟丝子（净末）八两　枸杞子（去枯者）八两　远志肉三两　牛膝四两

【用法】炼蜜为丸。每服五钱，空心白汤送服。

【主治】虚弱。

64031　养心理脾解郁清肺缓肝丸

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】茯神六钱　枣仁二钱（焦）　远志肉四钱　广红四钱　玉竹五钱　当归六钱　大生地八钱　杭芍五钱（炒）　香附六钱（炙）　桔梗四钱　桑枝四钱　厚朴花四钱　郁金四钱　川贝四钱　鸡血藤膏五钱　薏米五钱（炒）

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如绿豆粒大，朱砂为衣。每服三钱，白开水送下。

【功用】养心解郁。

64032　养营益卫补心清肺育脾和肝滋肾膏子丸

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十一。

【组成】人参三两（切，并隔纸焙）　熟地八两（切块，焙）　枣仁三两（炒熟）　当归身二两（酒拌晒干，炒）　鸡腿白术四两（人乳拌，晒干，炒）　白芍二两（蜜酒拌，晒干，炒）　白茯神二两四钱（焙）　远志肉（去心，甘草汁煮透，晒干，焙）一两五钱　雄牛膝二两（酒拌晒干，炒）　麦门冬（去心，拌老米炒燥，去米用）二两　五味子一两二钱（打扁，蜜酒拌蒸，炒）　肉桂（临磨刮尽粗皮）八钱

上为细末，人后膏子：

熟地六两（切块）　酸枣仁三两（炒熟，捣碎）当归身二两（酒拌，晒干，炒）　鸡腿白术四两（人乳拌，晒干，炒黄）　白芍一两五钱（蜜酒拌，晒干，炒）　白茯神二两四钱　远志肉（去心，甘草煮透，晒干）一两五钱　怀牛膝二两（酒拌，晒干）　五味子一两（捣碎）　麦门冬（去心，用老米同拌，炒黄）二两　肉桂（临煎去尽粗皮）八钱

先用建莲子（去心衣）二斤，入清水煎取头汁、二汁，去莲子，入上药煎取头汁、二汁，

滤去滓，慢火熬成浓膏子。

【用法】将膏子入前药细末和膏子为丸。每晚服四钱，用桂园汤送下。

【功用】养营益卫，补心清肺，育脾和肝滋肾。

举

64033 举元煎

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【组成】人参　黄耆（炙）各三五钱　炙甘草一二钱　升麻五七分（炒用）　白术（炒）一二钱

【用法】水一钟半，煎七八分，温服。

【功用】补气。

【主治】气虚下陷，血崩血脱，亡阳垂危。

【加减】如兼阳气虚寒者，桂、附、干姜随宜佐用；如兼滑脱者，加乌梅二个，或文蛤七八分。

【临证举例】①妊娠小便不通　《江西中医药》(1985；4：26)：黄某某，怀孕8个月，近半个月来尿频而少，渐至点滴不通，曾治未效。今小便点滴不通已两天，少腹胀急疼痛，弯腰曲背，坐卧不安，频频登厕而不便，气短乏力，头晕目眩，舌质淡，脉虚缓。治以举元煎加味：黄耆18克，党参15克，白术9克，桔梗9克，升麻4.5克，甘草3克。二剂一日服。翌日复诊，药后小便得通，少腹胀急疼痛等症顿除，仍服上方二剂而愈。　②先兆流产　《江苏中医杂志》(1984；3：34)：陈某某，女，25岁。妊娠三月，因用力举物而致腰酸，小腹坠痛，阴道见红，血量较多，经注射黄体酮和止血剂不显。证见面色少华，精神萎靡，舌淡苔薄，脉沉细滑。治以举元煎加味：红参10克（另煎，和冲），黄耆20克，焦白术10克，杜仲10克，续断10克，桑寄生10克，阿胶12克（烊化），艾炭10克，升麻6克，炙甘草3克，苎麻根30克。服3剂，症情改善，续服3剂，出血即止，腰酸坠痛亦除。　③崩漏　《浙江中医学院学报》(1986；1：27)：董某某，女，45岁，经崩26天，时而量多如冲，头晕，肢倦神疲，面色㿠白，舌淡胖大，苔薄白润，脉细促。治以大剂举元煎加味：炒党参30克，炙黄耆50克，炒白术30克，升麻炭6克，炒白芍15克，黄明胶15克（烊冲），艾叶炭5克，仙鹤草30克，炙甘草5克。三剂血止。　④恶露不尽　《浙江中医学院学报》(1986；1：27)：姚某某，女，29岁。产后已临三月，恶露时多时少，时浓时淡，淋漓难尽，神疲肢倦，脉细，舌胖苔薄黄。治以举元煎加味：党参15克，白术15克，炙黄耆20克，升麻炭5克，荆芥炭5克，益母草30克，地榆炭15克，炒黄芩10克，炙甘草5克。服四剂，恶露尽。

64034 举气汤

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】当归　川芎　橘皮　人参　白术各一钱　甘草四分　熟地黄　半夏各八分　白芍药七分

【用法】上㕮咀。水煎，空心服。服后指探喉中，吐出药水，少顷再饮再吐。

【主治】妊娠转胞，小便不通者。

64035 举肛丸

【方源】《医方考》卷三。

【组成】半夏　天南星　枯白矾各五钱　枯红矾　鸡冠花（炒）　白附子各五两　诃子肉（煅）　黑附子（生）　枳壳各一两　猬皮二枚（炙）　瓜蒌一枚（烧存性）　胡桃仁十五枚（烧存性）

【用法】上为末，醋糊为丸。每服三十丸，空心温酒下。

【主治】泄泻虚寒脱肛者。

【方论选录】湿盛则濡泻，久泻则胃虚，胃虚则脏寒，脏寒则无阳以升举，故令肛肠脱而不止。燥能去湿，故用半夏、南星；枯能制湿，故用红、白枯矾；温能暖脏，故用黑、白附子。乃若鸡冠花、刺猬皮、枳壳所以驱风；而诃子、瓜蒌、胡桃仁之灰，取其涩以固脱也。

64036 举肺汤

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】桔梗　甘草　竹茹　二冬　阿胶　沙参　百合　贝母

【功用】《医碥》:散火热,以复肺之清肃。

【主治】肺痿。久咳气虚,有热则成痿,其症寒热,气急烦闷,多唾或带血。

【宜忌】忌辛燥、升散、温热。

64037　**举胎散**

【方源】《医钞类编》卷十七。

【组成】白术(炒)三钱　鹿茸(酥炙)一钱　归身一钱半　川芎一钱　条芩(炒)一钱　黄耆(炙)二钱　炙草五分

【用法】红枣煎,或加黄杨树枝八分引,更妙。

【主治】胎气偏坠腰腿,小水不利。

64038　**举陷汤**

【方源】《医碥》卷六。

【组成】柴胡　升麻　葛根　羌活　防风　桃仁　红花　猪苓　四物汤

【主治】疟疾,邪陷阴分。

64039　**举斑汤**

【方源】《温热暑疫全书》卷四。

【组成】白芍药一钱　当归一钱　升麻五分　柴胡七分　白芷七分　穿山甲二钱　水姜一片

【用法】水煎,温服。

【功用】托里举斑

【主治】①《温热暑疫全书》:疫气留血分,里气壅闭,不下则斑不出,出则毒邪从外解矣。如下后斑渐出,更不可下,设有下证,宜少与承气缓服。倘大下则元气不振,斑毒内陷则危,宜此方。②《医碥》:斑出不透而热不退。

【加减】如下后斑毒隐伏,反见循衣撮空,脉微者,加人参三钱,得补发出者不死。

64040　**举元益血丹**

【方源】《竹林女科》卷一。

【组成】人参(去芦)三钱　白术(蜜炙)　当归(酒洗)　熟地黄各二钱　黄耆(蜜炙)三钱　白芍(酒炒)　条芩(酒炒)　炙甘草各一钱　升麻五分(炒)

【用法】水一钟半,煎七分,温服。

【主治】冲任伤损,不能约束经血而崩漏。

64041　**举轻古拜散**

《明医指掌》卷九。为《本事》卷十"愈风散"之异名。见该条。

64042　**举胎四物汤**

【方源】《金鉴》卷四十六。

【组成】当归　白芍　熟地　川芎　人参　白术各二钱　陈皮　升麻各一钱

【用法】上锉。水煎服。

【主治】转胞。饮食如常,心烦不卧,不得小便。

64043　**举陷参耆煎**

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】玄参　黄耆各二钱　炒白术　茯苓　陈皮　柴胡　升麻各一钱　炙甘草五分　泽泻二钱

【用法】姜、枣、灶心土为引,水煎服。

【主治】妄下阴脱。凡伤寒温热攻下太过,脾胃受伤,心中懊侬,起卧不安,下泻不止者。

64044　**举卿古败散**

《中藏经·附录》卷六(宽保本)。即原书孙星衍本"古卿古败散"。见该条。

64045　**举卿古拜饮**

《准绳·类方》卷五。为方出《活人书》卷十九,名见《玉机微义》卷三十九"举卿举败散"之异名。见该条。

64046　**举卿古拜散**

《校注妇人良方》卷十九,为方出《活人书》卷十九,名见《玉机微义》卷三十九"举卿举败散"之异名。见该条。

64047　**举卿举败散**

【方源】方出《活人书》卷十九,名见《玉机微义》卷三十九。

【异名】愈风汤、举卿古拜散(《校注妇人良方》卷十九)、举卿古拜饮(《准绳·类方》卷五)。

【组成】荆芥末三钱

【用法】温酒调下。不愈再服。

【主治】①《活人书》：痉证。 ②《玉机微义》：妇人新产血虚痉者，汗后中风发搐。

【临证举例】产后昏睡 《续名医类案》：一妇人产后睡久及醒，则昏昏如醉，不省人事，用荆芥穗微焙为末，每服三钱，豆淋酒调服，或童便服。

宣

64048 宣木散

【方源】《石室秘录》卷四

【组成】白芍三钱 柴胡二钱 丹皮二钱 玄参三钱 麦冬三钱 荆芥三钱 生地三钱 炒栀子三钱 防风一钱 天花粉三钱

【用法】水煎服。

【功用】散肝木之火。

【主治】火丹，痧疹。

64049 宣牙膏

【方源】《普济方》卷七十。

【异名】牙宣膏（《回春》卷五）。

【组成】龙骨 定粉各二钱半（另研） 麝香一字

【用法】上前二味为细末，后入麝香和匀；用黄蜡一两，瓷盏内销开，入药于内，搅匀，放冷，取出，熨斗烧热，铺纸用药摊之匀薄。每用剪作纸条儿，临卧于齿患处、齿断间，封贴一宿，至次日早晨取出药。每夜用之，如此半月。

【功用】消牙齿肿闷，生断肉，去风邪，牢牙齿。

【主治】疳蚀。牙齿动摇不牢，疼痛不止。

64050 宣化丸

《春脚集》。即《景岳全书》卷五十一“百顺丸”。见该条。

64051 宣化饮

【方源】《重订通俗伤寒论》

【组成】新会皮 大腹皮 炒麦芽 前胡各一钱半 炒萝卜子三钱 小青皮一钱

【用法】先用小山楂一两，煎汤代水，煎成去滓，稍温服。

【功用】消食和气。

【主治】伤寒兼痧，痧因食结者。

64052 宣气汤

【方源】《妇科玉尺》卷四。

【组成】白术 郁李仁 葶苈 桑皮 炙草 赤苓 陈皮 川芎 当归 白芍 生地

【主治】产后浮肿，由于水气者。

64053 宣气散

【方源】《普济方》卷二一六引《济生》。

【组成】甘草 木通各三钱 栀子二钱 葵子 滑石各一钱

【用法】上为末。每服半钱，灯心汤调下。

【主治】小便不通，脐腹急痛。

64054 宣气散

【方源】《普济方》卷三八六。

【组成】木香一分 槟榔 橘皮 甘草各半两 黑牵牛一两（半生半炒）

【用法】上㕮咀。三岁者，每服一钱，水半盏，煎三分，去滓温服。止与一服，后补之。

【主治】小儿腹急气粗；风肿、气肿、通身肿；疮痘盛出，身热烦渴，腹胀喘促，大小便涩，面青闷乱；久泻不退，脾虚生热。

64055 宣气散

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【组成】木通 滑石各一两 黑牵牛（头末）半两

【用法】上㕮咀。每服一钱，水七分钟，灯心十茎，葱白一茎，煎四分，食前服。

【主治】小便不通，腹痛不可忍。

64056 宣风丸

【方源】《圣惠》卷八十五。

【异名】祛风丹（《普济方》卷三七四）。

【组成】巴豆七枚（去皮心，研，纸裹压去油） 腻粉一分（研入） 川乌头一分（炮裂，去皮脐） 白附子一分（炮裂） 天南星一分（炮裂）

【用法】上为末，入巴豆、腻粉同研令匀，以枣肉为丸，如粟米大。每服二丸，以薄荷汤送下，不拘时候。

【主治】小儿急惊风，头热足冷，口噤面青，

筋脉抽掣，多痰涎，痰状甚者。

64057 **宣风丸**

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】大黄末　牵牛子末　郁李仁(去皮，研)各半两　巴豆一分(去心皮膜，油煤，研)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。看虚实，生姜蜜水下一丸至二丸。

【主治】伤寒结胸，热气蕴蓄。

64058 **宣风丸**

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】黑丑(取头末)二两　青皮一两　胡椒二十一粒　全蝎二十四枚(去头足)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸或三十丸，食前白汤送下。

【主治】风湿脚气，走注上攻，两足拘急疼痛，或遍身作痛。

【临证举例】脚气　《续名医类案》：一女子患脚气，忽手足遍身拘挛疼痛，六脉沉下，乃胃气盛也，服宣风丸三十粒，泄去而愈。

64059 **宣风散**

【方源】《小儿药证直诀》卷下。

【组成】槟榔二个　陈皮　甘草各半两　牵牛四两(半生半熟)

【用法】上为细末。三二岁儿，每服五分，蜜汤调下；三岁以上每服一钱，食前服。

【功用】①《普剂方》：疏导风热，逐脾间风。　②《景岳全书》：治湿痰，去积滞，通秘结，攻里实。

【主治】①小儿慢惊，痘疮里陷，腹胀气喘，大小便涩；疳气，惊风。

《小儿药证直诀》：小儿慢惊。　②《普剂方》：小儿疮痘盛出，身体热，烦渴，腹胀气喘，大小便涩，面赤闷乱；及气肿水肿，风肿积肿；又治风热筋脉挛缩作痛，及痘疮二三日，疮痂不焦欲死者。　③《婴童百问》：风痰壅盛，或大便紧涩，肚急，诸般疳气，肚急惊风痰潮，及热症便秘。　④《幼幼集成》：小儿梦中咬牙。

【方论选录】《医林纂要》：此方为痘疹毒气壅盛乎中，故通利之。槟榔、陈皮、甘草调其升降，而君以牵牛，使下达而中上亦平也。然非壅盛之甚，未可猛用。

64060 **宣风散**

【方源】《保命集》卷下。

【组成】川芎　甘菊各二钱　乳香　没药各三钱

【用法】上为极细末。每用少许鼻内搐之。

【主治】眼风毒发肿，鼻中欲嚏，嚏多大损而生疮。

64061 **宣风散**

【方源】《秘传外科方》引李防御方。

【组成】巴豆(去油)　大黄(炮)　朴消　枳壳　陈皮(去瓤)各等分

【用法】每服二钱，水一盏，煎至七分，温服。如服药后，大便结涩，二三日可服。

【主治】痔漏。

64062 **宣风散**

【方源】《本草纲目》卷四十引《全幼心鉴》。

【组成】全蝎二十一个(无灰酒涂，炙，为末)　麝香少许

【用法】每用金、银煎汤，调半字服之。

【主治】初生断脐后伤风湿，唇青口撮，出白沫，不乳。

64063 **宣风散**

【方源】《育婴家秘》卷三。

【组成】槟榔二个　草果仁　陈皮各半两　黑牵牛(生、熟各半)二两　枳实五枚　大黄一两

【用法】上为细末。每服半钱，蜜汤调服。

【主治】伤食发热，惊风。

64064 **宣风散**

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】尖槟榔二个　橘皮　青皮　甘草各二钱　牵牛头末四钱

【用法】上为散。三岁儿每服一钱匕，蜜水调服。

【主治】痘，毒肿乘肾，腹胀黑陷。

64065 **宣扬散**

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】柴胡五分 白芍五钱 甘草 白芷 干葛 细辛各一钱 青蒿三钱 天花粉三钱 石膏二钱

【用法】水煎服。二剂愈。

【主治】牙齿疼痛。

64066 **宣扬散**

【方源】《辨证录》卷六。

【组成】柴胡一钱 荆芥二钱 当归一两 麦冬一两 天花粉三钱

【用法】水煎服。

【主治】热症，满身皮窍如刺之钻，又复疼痛于骨节之内外。

64067 **宣闭汤**

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】黄耆 茯苓各五钱 人参 猪苓各三钱 泽泻二钱 半夏 肉桂 羌活各一钱

【用法】水煎服。

【主治】终日捕鱼，身入水中，时而发热，畏寒恶冷。

64068 **宣阳汤**

【方源】《衷中参西》卷上。

【组成】野台参四钱 威灵仙一钱半 寸麦冬六钱（带心） 地肤子一钱

【主治】阳分虚损，气弱不能宣通，致小便不利。

【方论选录】以人参为君，辅以麦冬以济参之热，灵仙以行参之滞，少加地肤子为向导药，名之曰宣阳汤，以象日象暑。

【临证举例】水肿、癃闭 一媪，年六十余，得水肿证，延医治不效。时有专以治水肿名者，其方秘而不传，服其药自大便泻水数桶，一身水尽消，言忌咸百日，可保永愈。数日又见肿，旋复如故。服其药三次皆然，而病人益衰惫矣。盖未服其药时，即艰于小便，既服药后，小便滴沥全无，所以旋消而旋肿也。再延他医，皆言服此药愈后复发者，断乎不能调治。后愚诊视，其脉数而无力。愚曰：脉数者阴分虚也，无力者阳分虚也。膀胱之腑，有上口无下口，水饮必随气血流行，而后能达于膀胱，出为小便。此脉阴阳俱虚，致气化伤损，不能运化水饮以达膀胱，此小便所以滴沥全无也。爰立二方，曰宣阳汤、济阴汤，二方轮流服之，以象日月寒暑相推，往来屈伸相感之义。俾先服济阴汤，取其贞下起元也，服到三剂小便稍利，再服宣阳汤亦三剂，小便大利；又再服济阴汤，小便直如泉涌，肿遂尽消。

64069 **宣志汤**

【方源】《辨证录》卷九。

【组成】茯苓五钱 菖蒲一钱 甘草一钱 白术三钱 生枣仁五钱 远志一钱 柴胡一钱 当归三钱 人参一钱 山药五钱 巴戟天三钱

【用法】水煎服。

【主治】年少之时因事体未遂，抑郁忧闷，遂至阳痿不振，举而不刚。

64070 **宣连丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十九引《婴童宝鉴》。

【组成】宣连（为末，用鸡清搜作饼子，炙令黄）一两 木香（茱萸炒令黄）一分

【用法】上为末，面糊为丸，如萝卜子。每服十丸，饭饮吞下。

【主治】小儿赤白痢。

64071 **宣连丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十九引《四十八候》。

【组成】宣连一钱（作散，鸡子清和作饼，于瓦上烧干，再为末） 肉豆蔻一个（去心脐，内入乳香，不拘多少，纸裹，火煨黄色） 朱砂 木香各半钱 杏仁七粒（和皮烧） 巴豆四粒（烧，七粒亦得）

【用法】上为末，醋糊为丸，如萝卜子大。每服七丸，陈米饮下；赤痢，槐花汤下。

【主治】毒痢。

64072 **宣连丸**

【方源】《幼幼新书》卷十。

【组成】宣连　雷丸各一分　木香(炒)二钱

【用法】上为末，用粟米饭为丸，如麻子大。每服十丸，饭饮送下。

【主治】盘肠气痛。

64073　宣连散

【方源】方出《百一》卷十二引胡上舍方，名见《普济方》卷三〇〇引《直选方》。

【异名】双圣散(《普济方》卷三〇〇引《直选方》)。

【组成】宣黄连(碾细)　密陀僧(别研)各等分

【用法】和匀。每用时先以葱、盐煎汤洗疮上，然后敷药；若疮干时使少清麻油调涂之。

【主治】足疮，臁疮。

64074　宣肠散

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】巴豆(去油)一钱　大黄(炮)　朴消　枳壳　陈皮各一两

【用法】上为散。每服二钱，水一盏，煎七分，加酒少许服之。以利为度。

【主治】内外大便结涩，痔疮痛甚。

64075　宣补丸

【方源】《千金》卷二十一(注文)引《集验》。

【异名】茯神丸(《千金》卷二十一)。

【组成】茯神　黄耆　栝楼根　麦门冬　人参　甘草　黄连　知母各三两　干地黄　石膏各六两　菟丝子三合　苁蓉四两

【用法】上为末，以牛胆汁三合加炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以茅根汤送下，一日二次。渐加至五十丸。

【主治】肾消渴，小便数者。

64076　宣明丸

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】赤芍药　当归　黄连　生地黄　大黄　川芎　薄荷　黄芩各等分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食后米饮送下。

【主治】眼内血灌瞳神，赤肿涩痛，大热上壅。

【方论选录】《成方便读》：夫肝为藏血之地，一受热邪，即逼血上行。于是血灌瞳神，赤肿涩痛等证，有自来矣。治之者，当正其本而清其源，自然流清而标亦愈。生地养肝之阴；赤芍散肝之血；当归、川芎并入肝经，理血中之气，而遂其条达之性；黄连、大黄、黄芩直清其上中下三焦之患；故以薄荷轻扬上焦，肃清余孽。蜜丸，食后服者，亦留恋之意耳。

64077　宣肺汤

【方源】《百一》卷五。

【组成】细辛　甘草各一两　防风二两(去芦)　麻黄四两(不去根节)

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一盏半，煎至七分，去滓温服。

【主治】喘。

64078　宣肺散

【方源】《百一》卷五。

【组成】白茯苓四两　干姜一两半(泡)　五味子　细辛　甘草(炙)各二两半　人参一两(去芦)

【用法】上为细末。每服二钱，沸汤调下，食后临卧服。

【主治】①《百一》：痰饮。②《普济方》：胸膈不利，痰嗽喘促，脾胃壅滞。

64079　宣肺散

【方源】《辨证录》卷三。

【组成】柴胡　黄芩　紫菀各二钱　白芍一两　当归　麦冬各五钱　茯苓　白芥子各三钱　甘草　款冬花各一钱　紫苏一钱　辛夷五分

【用法】水煎服。

【主治】鼻渊。

64080　宣经丸

【方源】《卫生家宝产科备要》卷五。

【组成】巴豆十五粒(去皮心膜，用生绢袋子盛，以灰汁煮十余沸，取出，研，纸压油了，重研)

【用法】先用乌金散三钱，以无灰酒调似糖，入瓷瓶中，于重汤内熬成膏，入巴豆末同和为丸，如绿豆大。每服十五丸，熟水送下。宜了冷粥补之。

【主治】产后七日内下床冲风，百日内伤房劳，或有灸疮，即中风也。初中之状，气涩腰痛，筋急如角弓反张，牙关紧急；或面色黑，遍身赤黑，败血流入脏腑，脏腑皆满，流入皮肤，退返不得，变成血点。

【宜忌】忌毒物。

64081 **宣经丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】芍药二两 威灵仙一两（取茸） 牵牛五两（取面）

【用法】上为细末，淡面糊为丸，如梧桐子大。米饮送下，不拘时候。

【主治】腰疼；兼治经络邪热，疮肿，腮肿。

64082 **宣毒丸**

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】大黄（锉） 白牵牛（炒）各一两 滑石 朴消 甘遂（麸炒） 郁李仁（去皮，炒，研）各半两 大戟（麸炒）一分 续随子（去皮，煮，研）半两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，看虚实，以龙脑蜜水化下。

【主治】伤寒结胸，心下坚硬。

64083 **宣毒丸**

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】大黄（炮）三钱 青皮 陈皮 苍术各一两 当归（去须）一两 黑牵牛四两

【用法】上为末，煮萝卜为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，温水临卧服。来日粥补之。

【主治】积聚。

64084 **宣毒汤**

【方源】《疮疡经验全书》卷三。

【组成】白芷 赤芍 甘草各五分 大黄三钱（酒蒸） 连翘 枳壳各一钱 当归尾二钱

【用法】水、酒各一钟，煎一滚，去滓，早晨空心服。

【主治】坐马痈。

64085 **宣毒散**

【方源】《圣济总录》卷二十一。

【组成】大黄（锉，炒） 甘草（炙，锉）各半两 朴消（研）一分 牵牛子一两（半生半炒）

【用法】上为散。每服二钱匕，用龙脑、腻粉、蜜水调下。一方炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，用龙脑、腻粉水下。

【主治】伤寒脉大，潮躁伏热。

64086 **宣毒散**

【方源】《保命集》卷下。

【组成】盆消 雄黄 乳香 没药各等分

【用法】上为极细末，以少许鼻内搐之。

【主治】眼发赤肿，毒气侵睛胀痛。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作“拔毒散”。

64087 **宣毒散**

【方源】《外科精要》卷下。

【组成】露蜂房三两（炒焦） 小米一合 赤小豆 南星 草乌各一两 白矾五钱

【用法】上为细末。用淡醋调，敷四畔，干则频用醋润之。

【功用】①《外科精要》：消疮毒，收赤晕。②《疡科选粹》：行经散血。

【主治】痈疽。

64088 **宣毒散**

【方源】《普济方》卷三〇一引《孟氏诜诜方》。

【组成】全蝎（微炒） 白僵蚕（炒去丝嘴） 蝉蜕（洗净，去土，炒，焙干）各半两 石燕三两（醋淬，火煅令酥）

【用法】上为末。每服二钱，用盐、酒煮猪腰子一对，蘸药嚼之，以原煮酒送下，用蒸饼干吃压之，频服见效。

【主治】丈夫阴气盛，阳气微弱，风寒之气乘虚而客于肾经，阴囊湿痒而微热，或但痒而不湿，或在阴根并毛际痒，或湿而不痒，或无汗者，谓之毒气不泄；亦治肾脏风湿流注，生

【功效】宣瘰疬风热之毒。

【主治】瘰疬。自小便宣毒后，及病虽愈，宜常服之。

64096 **宣积丸**

【方源】方出《续本事》卷十，名见《医学纲目》卷二十三。

【组成】巴豆 干姜 韭子 良姜 硫黄 甘遂 白槟榔各等分。

【用法】上为末，研饭为丸，如梧桐子大。用时早朝使椒汤洗手了，麻油涂于掌口，握药一粒，移时便泻，止即以冷水洗手。

【主治】大便不通。

【备考】本方方名，《医统》引作"宣积掌握丸"。

64097 **宣积丸**

【方源】《医方类聚》卷一一三引《经验秘方》。

【组成】京三棱（炮） 雷丸（炮）各五两 黑牵牛（头末，生用）十两 大腹子（取末，生用）七两 莪术二两 广木香一两

【用法】上为细末，和匀。用好紫色皂角半斤，去皮弦，截碎，水一大碗半，浸一宿，冬月两宿，捞去皮滓，铜瓷器内熬数沸，白沫出为度。放冷，和匀，药须揉到，为丸如梧桐子大。每服四钱，五更时用砂糖水，温冷不妨，天明去四五行，看取出是何虫积，温白粥补之。

【主治】虫积。

【宜忌】孕妇休服；忌生冷、腥硬物。

64098 **宣积药**

【方源】《续本事》卷十。

【组成】巴豆一百粒（去壳，水洗四十九次） 五灵脂 白姜 赤茯苓各一两

【用法】上为末，用醋糊为丸，如绿豆大。每服五丸，五更初用冷茶清送服。或欲泻止，冷水洗手、面、脚三处，立住。

【主治】大便不通。

64099 **宣脑散**

【方源】《普济方》卷四十四。

【组成】川楝三分 苦丁香二十个 山栀子二个

【用法】上为细末。每用一字，鼻内搐之。

【主治】气虚头痛。

64100 **宣脑散**

【方源】《医碥》卷七。

【组成】川郁金 川芎 青黛 薄荷 小黄米各二分

【用法】上为细末。每用少许，口噙冷水，搐鼻中。

【主治】鼻病。

64101 **宣营汤**

【方源】《产孕集》卷下。

【组成】当归 黄耆 阿胶各三钱 人参五钱 芎䓖 芍药各二钱 川贝母一钱 炮姜一钱 红花 甘草各五分

【用法】上作一服。

【功用】益阳化阴，温经通络。

【主治】产后血虚无乳。

64102 **宣脬丸**

【方源】《普济方》卷二四七。

【组成】猪脬 黑牵牛四两（人脬内，好醋一升煮至尽，焙干） 木香 木猪苓（去皮） 续随子 淡豆豉 三棱（煨） 川楝肉 马蔺花 茴香（炒）各等分

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大，每服五十丸，盐汤送下。第二服车前子汤送下。

【主治】膀胱疝气，及奔豚，外肾其大如斗。

【加减】小便秘实不通，加土狗十个，金沙一两。

64103 **宣解汤**

【方源】《衷中参西》卷上。

【组成】滑石一两 甘草二钱 连翘三钱 蝉退三钱（去足土） 生杭芍四钱

【主治】感冒久在太阳，致热蓄膀胱，小便赤涩；或因小便秘，而大便滑泻；兼治湿温初得，憎寒壮热，舌苔灰色滑腻者。

【加减】若滑泻者，甘草须加倍。

【临症举例】风温 一叟，年六十五，得风温证。六七日间，周身悉肿，肾囊肿大似西瓜，

屡次服药无效。旬日之外，求为诊视。脉洪滑微浮，心中热渴，小便涩热，痰涎上泛，微兼喘息，舌苔白厚。投以此汤，加生石膏一两，周身微汗，小便通利，肿消其半，犹觉热渴。遂将方中生石膏加倍，服后又得微汗，肿遂尽消，诸病皆愈。

64104　宣痹汤

【方源】《温病条辨》卷一。

【组成】枇杷叶二钱　郁金一钱五分　射干一钱　白通草一钱　香豆豉一钱五分

【用法】水五杯，煮取二杯，分二次服。

【功用】苦辛通阳，轻宣肺痹。

【主治】太阴湿温，气分痹郁而哕者。

【临证举例】①呃逆　《成都中医学院学报》(1982;4:57)：陈某某，女，成年，售货员。呃逆频作，治疗三月余未效。症见呃逆连声，偶有嗳气，食欲不振，郁郁寡欢，苔薄白，脉缓。治以炙枇杷叶12克，郁金10克，射干10克，香豉6克，炙旋覆花12克，柿蒂10克，香附子10克，通花5克，进二剂，呃逆大减，续服而愈。②胸痛：《成都中医学院学报》(1982;4:57)刘某某，女，30岁，工人。患右胸膜炎经西药治愈，唯胸膜增厚，胸部憋闷不适，疼痛经久不愈，服中西药罔效。凡负重或咳嗽，胸痛加剧，精神抑郁，食量减少，舌淡苔薄，脉弦。治以炙枇杷叶10克，郁金10克，射干10克，降香10克，橘络5克，路路通10克，炙旋覆花10克，丝瓜络15克，瓜蒌壳15克，青皮8克，通花5克，连进三帖，疼痛减轻，服至十余帖，诸证悉愈。　③喉痹　《成都中医学院学报》(1982;4:57)冯某某，女，35岁，工人。三月以来咽中不爽，常有异物梗阻感，饮食吞咽无异常不适，胃纳减少，形体偏瘦，心怀恐惧，神志不乐，舌红苔少，脉濡细数。治以炙枇杷叶12克，射干10克，郁金10克，瓜壳15克，北沙参15克，麦冬12克，重楼10克，大青叶10克，降香10克，通花5克。守方出入十余帖而愈。

64105　宣痹汤

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】防己五钱　杏仁五钱　滑石五钱　连翘三钱　山栀三钱　薏苡五钱　半夏(醋炒)三钱　晚蚕沙三钱　赤小豆皮三钱(赤小豆乃五谷中之赤小豆，味酸肉赤，凉水浸，取皮用。非药肆中之赤小豆，药肆中之赤小豆乃广中野豆，赤皮蒂黑肉黄，不入药者也)

【用法】水八杯，煮取三杯，分温三服。

【功用】辛苦通阳。

【主治】湿痹。湿聚热蒸，蕴于经络，寒战热炽，骨骱烦疼，舌色灰滞，面目痿黄。

【加减】痛甚，加片子姜黄二钱，海桐皮三钱。

【方论选录】舌灰目黄，知其为湿中生热，寒战热炽，知其在经络；骨骱疼痛，知其为痹证。若泛用治湿之药，而不知循经入络，则罔效矣。故以防己急走经络之湿，杏仁开肺气之先，连翘清气分之湿热，赤豆清血分之湿热，滑石利窍而清热中之湿，山栀肃肺而泻湿中之热，薏苡淡渗而主挛痹，半夏辛平而主寒热，蚕沙化浊道中清气。痛甚，加片子姜黄、海桐皮者，所以宣络而止痛也。

64106　宣壅丸

【方源】《鸡峰》卷十三。

【组成】麻子仁　郁李仁(去皮)各二两(并研为膏)　陈橘皮　羌活　川芎　木香各一两　槟榔二分

【用法】上为细末，与麻子仁、郁李仁膏同研，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，熟水送下，不拘时候。

【主治】大便秘滞。

64107　宣毒散丸

【方源】《普济方》卷二九五。

【组成】苦参　荆芥　当归　川芎　玄参　白芷各半两　牵牛一两半　乌蛇一条　青黛半两。

【用法】上先将牵牛、巴豆(肥白者，去壳，十粒)慢火烧令色黑，去巴豆不用，则用牵牛同前九味为末；将煨熟大蒜擂细，看稀稠得

所，面糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心以盐酒送下。

【主治】痔漏。

64108 **宣中降逆汤**

【方源】《温病刍言》。

【组成】清半夏 10 克　广皮 10 克　旋覆花 10 克　赭石 10～30 克　沉香 5 克　刀豆 30 克　生枇杷叶 20 克

【功用】宣中降气。

【主治】呃逆。

【方论选录】刀豆温中下气，益肾归元；旋覆花、赭石平肝降逆；清半夏、广皮、沉香理气宽中；生枇杷叶降逆气，气不上冲，则呃逆自止。

64109 **宣气木香饮**

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】木香　桂（去粗皮）　昆布（洗去咸，焙）　槟榔（一半生，锉；一半炮，锉）　大黄（锉，炒）　半夏（汤洗七遍，去滑，麸炒）各半两　芎䓖　甘草（炙，锉）各一分　诃黎勒（煨，去核）三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，生姜一枣大拍碎，煎至八分，去滓，食后温服，一日三次。

【主治】膈气痰涎，食不消化，大便不通，腹中雷鸣。

64110 **宣风快斑散**

【方源】《痘疹全书》卷下。

【组成】木香　枳壳　槟榔　大黄

【用法】水调，煎黑牵牛（半生半熟）末一钱服之。以通为度。通后疮回，以四君子汤调之。

【主治】痘疮，毒火太甚，煎熬阴血，其血干枯而变黑色。

64111 **宣风快斑散**

【方源】《片玉痘疹》卷八。

【组成】木通　枳壳　甘草　槟榔　大黄

【用法】水煎半生半熟，同黑牵牛头末和匀服之，以通为度。通后疮回，以四君子汤徐调之。

【主治】①《片玉痘疹》：痘疹。②《幼幼集成》：痘疹黑陷而身无大热，大小便调者。

64112 **宣风牢牙散**

【方源】《医统》卷六十四。

【组成】细辛　青盐各七钱　川芎　当归（酒洗）各一两

【用法】上为末。每用少许，清晨擦牙，满口漱之，连药咽下。先以温水漱口净，然后擦药咽之。

【功用】驻颜补肾，牢牙固齿。

64113 **宣风换肌散**

【方源】《玉机微义》卷十五。

【组成】炙甘草　黄耆　当归各一两　黄连　黄芩（各酒浸，炒）　大力子（炒）　防风　白芷　荆芥穗　川芎　乌蛇肉各半两　羌活　苍术　何首乌各三钱　全蝎十个（炒）

【用法】上为细末。每服二钱，酒调服；茶清亦可。

【主治】一切风癣疥疮，疙瘩风疮。

64114 **宣白承气汤**

【方源】《温病条辨》卷二。

【组成】生石膏五钱　生大黄三钱　杏仁粉二钱　栝楼皮一钱五分

【用法】水五杯，煮取二杯，先服一杯。不知再服。

【主治】阳明温病，喘促不宁，痰涎壅滞，右寸实大，肺气不降者。

【临症举例】小儿麻疹并发肺炎　《陕西中医》（1983；6：3）患儿于 1969 年 3 月患麻疹，第五日夜间皮疹突然隐没，伴喘咳，呼吸困难。体温 40.5℃，脉搏 168 次/分。面色苍白，双目紧闭，喘咳，呼吸表浅而急促，鼻翼煽动，口唇舌质呈青紫色。口腔可见麻疹粘膜斑，胸腹、头面四肢均可见紫暗色隐没的小疹点。对光反射，睫反射迟钝。胸腹灼热而胀满，四肢膝肘以下厥冷，并时有抽搐。指纹青紫色，直透三关射甲。听诊：两肺布满中等大小的湿性罗音，诊为“麻疹合并肺炎”。治以宣白承气汤加味：大黄、杏仁、石膏、连翘、银花各 10 克，

麻黄 3 克，赤芍、僵蚕、蝉蜕、党参各 6 克，水煎服一剂。服药后约半小时开始腹泻，至夜半共十余次，四肢发热，腹色转红，紫绀解除，呼吸平稳，心率 116 次/分，体温 37.8℃，转危为安。次日服沙参麦冬汤加连翘、银花、杏仁，二剂而愈。

64115 宣圣辟瘟丹

【方源】方出《摄生众妙方》卷四，名见《医统》卷二十五。

【组成】腊月二十四日五更井花水　乳香

【用法】将平旦第一汲水盛净器中，量人口多少，浸乳香至岁旦五更，暖令温。从小至大，每人以乳香一小块，饮水一二呷咽下，则一年不患时疫。

【功用】预防时疫。

64116 宣郁化毒汤

【方源】《辨证录》卷十三。

【组成】柴胡二钱　白芍一两　香附二钱　薄荷二钱　当归一两　陈皮一钱　枳壳一钱　天花粉三钱　生甘草三钱　金银花一两

【用法】水煎服。

【主治】①《辨证录》：肝痈。②《石室秘录》：脾郁生胁痈。

64117 宣郁定痛汤

【方源】《辨证录》卷二。

【组成】白芍一两　川芎　当归　丹皮各三钱　柴胡二钱　甘草　白芥子　大黄　牛膝　炒栀子各一钱

【用法】水煎服。

【主治】胁痛。

64118 宣郁调经汤

《辨证录》卷十一。为《傅青主女科》卷上“宣郁通经汤”之异名。见该条。

64119 宣郁通经汤

【方源】《傅青主女科》卷上。

【异名】宣郁调经汤(《辨证录》卷十一)。

【组成】白芍五钱(酒炒)　当归五钱(酒洗)　丹皮五钱　山栀子三钱(炒)　白芥子二钱(炒，研)　柴胡一钱　香附一钱(酒炒)　川郁金一钱(醋炒)　黄芩一钱(酒炒)　生甘草一钱

【用法】水煎服。

【功用】补肝血，解肝郁，利肝气，降肝火。

【主治】妇人经前腹疼数日，而后经水行，经来多紫黑块。

64120 宣肺化痰汤

【方源】《喉科家训》卷二。

【组成】牛蒡　连翘　防风　薄荷　生草　竹沥　荆芥　杏仁　蒌仁　玄参　枳壳

【用法】水煎服。

【主治】锁喉缠喉，痰涎上升，呼吸短促，形寒烦热，骨节胀闷，脉弦紧数，舌黄尖绛。

64121 宣肺扶土方

【方源】《医门补要》卷下。

【组成】杏仁　南沙参　玉竹　太子参　茯苓　苏子　橘红　半夏

【用法】冰糖为引，水煎服。

【主治】劳嗽。

【临症举例】劳嗽　一人体虚，劳动而哮作，脉细弱，以宣肺扶土方，即平。

64122 宣肺散结饮

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】桑皮 9 克　桔梗 6 克　酒黄芩　赤芍各 9 克　牡丹皮 6 克

【功用】清宣肺气，活瘀散结。

【主治】金疳。白睛上出现一个或数个突起的灰白色小泡，周围绕以赤丝，往往反复发作。

【加减】若小泡溃后不敛，此为正虚邪实，方中桑皮改炙桑皮，以免泻之过重，再加麦门冬 9 克以养阴润肺；若丝脉从两眦而来，可加生地 9 克，木通 3 克，以清心中之邪热；若赤脉从下方上冲而来，可加天花粉 9 克，茅根 15 克，以清胃火；若小泡位于风轮边缘，可加当归 9 克，补益肝血，以防肺邪侵入，或加青葙子 3 克，清肝中之邪热，以防二火相并，损伤风轮。

【方论选录】方中桔梗宣肺散结，桑皮降肺

气，酒黄芩清肺热，这样一宣、一降、一清，肺中郁热均能祛除；更有赤芍、牡丹皮活血凉血，疏通络脉以退目中赤丝。

【临证举例】金疳 荀某某，男，18岁。1972年3月10日就诊。右目涩痛流泪10余天，结眵羞明。检查：患眼大眦赤胀，赤脉从眦部射出，白睛内侧有一灰白色小泡，周围有赤丝缠绕，且兼溲赤，脉数，舌红。此为金疳。为心肺二经邪热上攻所致。治以宣肺散结饮加生地9克，木通6克，服药3剂而愈，未再复发。

64123 宣毒一醉膏

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】瓜蒌一个（去皮） 老翁须一倍半

【用法】上锉。酒、水等分，同煎，少顷入开口真川椒四十九粒，临熟又入乳香、没药末少许，任意服。

【主治】痈疽。

64124 宣毒去风汤

【方源】《疯门全书》

【组成】川连 黄柏 黄芩 玄参 赤芍 栀仁 续断 花槟榔 大黄 朴消 石膏（末） 银花 荆芥 北防风 藓皮 独活

【用法】灯心为引，水煎，朴消后下。

【主治】麻风，麻木不仁。

64125 宣毒发表汤

【方源】《痘疹活幼至宝》卷终。

【组成】升麻 葛根各八分 防风 荆芥各五分 桔梗 薄荷 甘草各二分 牛蒡 连翘 前胡 杏仁 枳壳 木通 竹叶各八分

【用法】水煎服。

【主治】痘疹。

【加减】大寒，加蜜炙麻黄八分；天气大热，加黄芩（炒）八分。

64126 宣毒发表汤

【方源】《麻科活人》卷二。

【组成】薄荷叶八分 葛根 防风 荆芥穗 连翘 牛蒡子（炒） 木通 枳壳 淡竹叶各一钱 升麻 桔梗 甘草。

【用法】灯心为引，水煎服。

【主治】麻疹发热，欲出未出。

【加减】冬天寒月，可加苏叶八分，又加葱白为引；暑月炎天，可加生黄芩一钱，除升麻、甘草、桔梗不用；初潮无咳者，宜用留白陈皮以甚其咳，有咳切勿再加；初起，往来潮热者，除淡竹叶，免解肤热，致麻难透表；在寒月仍宜加苏叶，葱白以疏表之，初潮潮热太甚者，加赤茯苓、生地黄，并可加生黄芩，不必拘麻初用寒凉毒伏，麻不得出之说，正当用之，以保肺受火克之虞；但春冬寒月，黄芩等分，宜略少耳；初潮无汗，使毒透，切不可遽用胡荽酒奮之法，免助邪火内攻，肺金重受其克，药中略加胡荽作引，稍可；初潮不食，不必治之，盖热毒内蕴，自必不食，热毒一解，自然能食，切勿加进食开胃之药；初潮即见喘促，加黄芩、葶苈、瓜蒌仁，以清肺开胸，或更加姜汁炒白芥子、家苏子、莱菔子以降之；初潮呕吐，加竹茹，柿霜（如无柿霜，用柿饼亦可）；初潮呃逆，加枇杷叶、竹茹；初潮鼻衄，加鲜茅根；初潮即现咽喉痛者，加射干，倍用牛蒡子；初潮即现唇干齿燥、舌苔枯黄、口渴等候，加麦冬、花粉、黄芩，甚则加黄连、黄柏、栀仁等味，以预解之；初潮热甚，大便坚实者，加火麻仁二三钱以润之，用枳实以导之，免至闭塞，而热毒不得发越，致变紫黑；若便不通者，加生黑白丑牛末以利之，如利之不通者，必生气喘鼻扇逆证，即用黄连解毒汤加大黄、牛蒡子、连翘、地骨皮、桑白皮以通之；如兼口渴者，并加麦冬、天花粉；初潮大便溏者，方内之枳壳等分减用，以为开泄之路，庶可免便闭之患；初潮溏泄而有微汗，除薄荷、竹叶，不可兼用止汗止泄之品，以堵其发越之；初潮泄泻者，除枳壳；初潮洞泄者，除枳壳，加猪苓，泽泻，以分利之，不可止泄，以塞其舒畅之机；初潮小便赤者，除薄荷叶，加赤茯苓，或更加车前子以利之；初潮小便不通者，合导赤散，除甘草，加车前子以通之；初潮溺血者，加

生地黄、黄连、黄柏、黄芩、栀仁，俱可随意加入，更加牡丹皮以去其滞血，免使留而为殃；冬月寒天，无汗不咳者，量加蜜汁、和酒炒麻黄二三分，其余诸症，不能悉备，宜因所见之证，加减而用，至于等分之轻重，须量人之大小，若月内半周婴儿，只宜以杯许与服，当令乳母代服，使药性流入乳中，儿食母乳，如同服药。

64127　宣毒发表汤

【方源】《麻疹全书》卷四。

【组成】马勃一钱五分　大力子一钱五分　广郁金一钱五分　细辛一钱　条子芩一钱五分　藿香一钱五分　荆芥一钱五分　炒陈皮八分　银花一钱　生姜三片

【用法】水煎服。

【主治】麻疹。

64128　宣毒发表汤

【方源】《麻疹全书》卷四。

【组成】升麻　桔梗　甘草　焦栀　葛根　薄荷　前胡　牛蒡子　防风　苏叶　连翘　杏仁　银花各等分

【用法】水煎服。

【主治】天行时气，发热昏闷。预防麻疹。

【宜忌】气质虚弱不可与此汤。

【加减】渴，加花粉；气逆，去升麻、桔梗，加淡竹；头痛，加蔓荆子；呕吐，去甘草，加陈皮；热甚，加黄芩；初起潮热，除升麻、桔梗、甘草，加紫苏叶、葱白；初潮咳嗽，除升麻、桔梗、甘草，加桑白皮；如潮热轻者，并除淡竹叶；初潮谵语，去升麻、桔梗、甘草，加桂、附、滑石、辰砂末；初潮泄泻，除薄荷、淡竹叶、升麻、桔梗、甘草，加赤茯苓、车前子；初潮大便出血，去淡竹叶、升麻、甘草、桔梗，加生地黄、丹皮，甚者加犀角；初潮小便赤者，除升麻、桔梗、甘草，加泽泻；初潮口鼻出血者，除升麻、桔梗、甘草，加炒栀仁、茅根、生地黄；初潮腹痛，除升麻、桔梗、甘草。

64129　宣毒透疹汤

【方源】《痘疹定论》卷二。

【组成】干葛一钱　前胡八分　荆芥穗八分　防风八分　连翘六分(去心)　牛蒡六分(炒，研末)　枳壳六分(麸炒)　木通七分　桔梗七分　黄芩七分(酒炒)　薄荷五分　甘草三分(生，去皮)　淡竹叶八分

【用法】灯心二十茎为引，水煎服。

【主治】痘浆饱满，初转褐色，忽然通身大热，脐之四周及腰间有小红颗粒，欲出解毒疹者。

【加减】口糜烂，加煅石膏七分。

64130　宣毒通气丸

【方源】《秘传大麻疯方》。

【组成】川大黄　江子　条芩

【用法】上为细末，面糊为丸，如粟米大。每服十二丸，空心温汤吞下；弱人八丸，得通五六次，温粥补之。如不止，煎甘草汤吃下即止。

【功用】去脏内热毒。

【主治】麻风。

【宜忌】忌胡椒、生姜、鸡子、老鸭、水鸡、鹅、羊、犬、猪肉、炙煿、葫芦、茄子、豆腐、面、酱、梨、李、梅、酒、醋、房事、元米、莲肉、芡实、山药皆不可食，惟淡食调理为养病之要。

64131　宣毒解肌汤

【方源】《麻疹全书》卷三。

【组成】葛根　前胡　荆芥穗　牛蒡子　连翘(去子)　蝉蜕各八分　木通七分　赤芍　甘草　灯心(引)　桑白皮(蜜蒸)　贝母(去心，姜汁拌)

【主治】麻疹初起，发热咳嗽，或乍凉乍热，已现麻路；并宜初潮未明是否麻证。

64132　宣胃解毒汤

【方源】《济阳纲目》卷二十二。

【组成】白芍药一钱五分　黄连　枳壳(炒)　茯苓各一钱　青皮　槟榔各七分　木香　泽泻　甘草各五分

【用法】上锉，一服。水二钟，加生姜三片，煎服。

【主治】痢疾。

【加减】初感积滞，湿热正炽，下之，加大

黄、朴消各一钱；血痢，加黄芩（炒）、川芎、当归各六分；腹痛，加泽泻、延胡索各八分；赤白兼下，加川芎、桃仁、滑石（炒）、当归尾、陈皮、干姜（炒）各五分；白痢久者胃虚，加白术、黄耆、茯苓各一钱，去槟榔、枳壳、黄连；赤痢久弱下后未愈，去芩、连，加当归、白芍药（炒），白术、熟地黄、川芎、阿胶珠各一钱；湿胜水少，少加木通、泽泻、茯苓、炒山栀各五分；下后二便流利，惟后重不去，以升麻、川芎提之；痢久，气血两虚，以八物汤养之；痢久滑泄，腹中已清，二便流利，加罂粟壳、诃子、阿胶以止涩之。

64133 宣积掌握丸

《医统》卷六十九。即方出《续本事》卷十，名见《医学纲目》卷二十三“宣积丸”。见该条。

64134 宣通下气方

【方源】《外台》卷八引《古今录验》。

【组成】吴茱萸 泽泻 芍药 白术 汉防己 赤茯苓各二两 蜀大黄二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十五丸，饮送下。

【主治】胸膈痰饮，食啖经日，则并吐出，食皆不消，出如初；空腹一两日，聚食还复吐之，极不便，此由痰饮聚下绝不通。

【宜忌】忌桃、李、雀肉、酢物。

64135 宣通络痹方

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十三。

【组成】羚羊角 白僵蚕 川桂枝尖 煨明天麻 炒丹皮 黑山栀 钩藤钩

【用法】水煎服。

【主治】牙痈。

64136 宣清导浊汤

【方源】《温病条辨》卷三。

【组成】猪苓五钱 茯苓五钱 寒水石六钱 晚蚕沙四钱 皂荚子（去皮）三钱

【用法】水五杯，煮成两杯，分二次服。以大便通快为度。

【主治】湿温久羁，三焦弥漫，神昏窍阻，少腹硬满，大便不下。

【方论选录】此湿久郁结于下焦气分，闭塞不通之象，故用能升、能降、苦泄滞、淡渗湿之猪苓，合甘少淡多之茯苓，以渗湿利气；寒水石色白性寒，由肺直达肛门，宣湿清热，盖膀胱主气化，肺开气化之源，肺藏魄，肛门曰魄门，肺与大肠相表里之义也；晚蚕沙化浊中清气，大凡肉体未有死而不腐者，蚕则僵而不腐，得清气之纯粹者也，故其粪不臭不变色，得蚕之纯清，虽走浊道而清气独全，既能下走少腹之浊部，又能化浊湿而使之归清，以己之正，正人之不正也，用晚者，本年再生之蚕，取其生化最速也；皂荚辛咸性燥，入肺与大肠，金能退暑，燥能除湿，辛能通上下关窍，子更直达下焦，通大便之虚闭，合之前药，俾郁结之湿邪，由大便而一齐解散矣。二苓、寒石化无形之气，蚕砂、皂子逐有形之湿也。

64137 宣湿化热汤

【方源】《古今名方》李聪甫方。

【组成】香青蒿 淡黄芩 佩兰梗 炒山栀各 6 克 南杏仁 栝楼仁各 9 克 大豆卷 赤茯苓 鲜竹茹 炒神曲 鲜芦根各 10 克 广郁金 5 克 益元散（鲜荷叶包，刺孔）12 克

【功用】宣湿化热，清胃降浊。

【主治】湿温病。证属湿遏热郁，邪在肺胃者。症见舌苔灰白而腻，脉象弦滑，胸膈痞闷，咳嗽胸痛，痰粘气促，口苦泛恶，身热不退，小溲短涩等。

【加减】若热重，则重用青蒿、黄芩；舌绛，口干唇焦者，加鲜地黄、鲜石斛、麦门冬；小便短赤，重用鲜芦根、益元散。

64138 宣和赐耆丝丸

【方源】《三因》卷十三。

【组成】当归（酒浸，焙，轧）半斤 菟丝子（酒浸，去土，乘湿研破，焙干秤）一斤 薏苡仁 茯神（去木） 石莲肉（去皮） 鹿角霜 熟地黄各四两

【用法】上为末。用耆二斤，捶碎，水六升，浸一宿，次早挼洗味淡，去滓，于银石器中熬

汁成膏，搜和得所，捣数千杵，为丸如梧桐子大。每服五十丸，加至百丸，空心、食前用米汤、温酒任下，常服。

【功用】守中安神，禁固精血，益气驻颜，延年不老。

【主治】少年色欲过度，精血耗竭，心肾气惫，遗泄白浊，腰背疼痛，面色黧黑，耳聋目昏，口干脚弱，消渴便利，梦与鬼交，阳事不举。

【备考】本方方名，《普济方》引作"菁丝丸"。

64139　宣利积热金花丸

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】大黄二两（微炮）　黑牵牛末二两（半生半熟）

【用法】上为末，薄荷汁为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后熟水送下。

【主治】积热。

室

64140　室女万病丸

【方源】《证类本草》卷十二引席延赏方。

【组成】干漆一两（为粗末，炒令烟尽）　牛膝末一两。

【用法】以生地黄汁一升，入银器中熬，候可丸，为丸如梧桐于大。每服一丸，加至三五丸，酒饮送下。以通利为度。

【主治】女人经血不行及诸癥瘕等病。

宫

64141　宫颈炎散

【方源】《妇产科学》

【组成】青黛三钱　青果核二钱　月石二两　炉甘石三两　人中白三两　黄柏八钱　西瓜霜一两　甘草一两　石膏五两　冰片三分　黄连三分　硼砂三分

【用法】上为细末。先清洁子宫颈口，将药粉喷于子宫颈糜烂处，间日或每日一次，十次为一疗程。

【主治】慢性子宫颈炎。

【宜忌】治疗期禁性生活。

64142　宫中十二味

【方源】《成方便读》卷四。

【组成】炙黄耆　川芎　当归身　白芍药　菟丝子　荆芥　厚朴（姜汁炒）　羌活　川贝母　炒枳壳　广艾　甘草　生姜

【用法】水煎服。胎至七八九月，每月服二三剂，产时再服三四剂，即易于分娩。

【功用】催生。

【方论选录】夫妇人怀妊之后，固当血足气固，以为充养，然七八九月，尤宜气血流利，表里无滞，上下宣通，无一毫之壅闭，方可临盆易产。方中黄耆、甘草补中气以达于卫；归、芎、白芍养阴血以和其营；菟丝、广艾益肝肾以温其下，以血气者喜温而恶寒，得温则流行而无滞也；荆芥、羌活以宣表气；厚朴、枳壳以疏里气；贝母快胸膈之气，以化其痰；生姜去秽恶之气，以通于神明耳。

64143　宫方七香丸

【方源】《直指》卷六。

【组成】木香　丁香　檀香　甘松（净）　丁皮　橘红　缩砂仁　白豆蔻仁　三棱（醋炙）　蓬术（醋煮，焙干）各半钱　大香附（炒去毛）二两半

【用法】上为末，研米糊为丸，如绿豆大。每服三四十丸，姜汤送下。

【功用】消食快膈，和胃止痛。

【主治】胃痛。

64144　宫方定风酒

【方源】《潜斋简效方》。

【组成】天冬　麦冬　生地　熟地　川芎　五加皮　牛膝　秦艽各五钱　川桂枝三钱

【用法】绢袋盛之，汾酒二十斤，净白蜜、赤沙糖、米醋各一斤，搅匀，浸以瓷坛，豆腐皮封口，压以巨砖，安水锅内蒸三炷香，取起埋土中七日，可饮矣。

【功用】补血息风。

【主治】虚风病。

64145 宫方瑞莲丸

《得效》卷八。为《医方大成》卷四引《经验方》“瑞莲丸”之异名。见该条。

64146 宫方感应丸

【方源】《医方类聚》卷九十四引《经验良方》。

【组成】肉豆蔻 干姜（炮） 百草霜各一两 南木香 青木香各三钱 荜澄茄 枳壳 三棱 丁香 姜黄（片子者） 槟榔 白豆蔻各半两 巴豆（去皮膜） 杏仁（去皮尖，二味别研）各五十粒 酒煮蜡二两 清麻油半两

【用法】上除巴豆、杏仁别研，余药并为细末，和作一处，次下巴豆、杏仁，和匀；先将清麻油熔蜡化开，倾在药内，搜和得所，木臼内杵千百下，用蜡作一柜，瓦盒子收之。临用旋丸，用姜汤送下，或津液又妙。

【功用】宽快胸膈，疏通顺气。

【主治】心腹胀满。

64147 宫制蔷薇油

【方源】《永乐大典》卷八八四一引《山居备用》。

【组成】真麻油随多少。

【用法】以瓷瓮盛之令半瓮，取降真香少许投油中，厚用油纸封系瓮口；顿甑中，随饭炊两饷，持出顿冷处，三日后去所投香；清晨旋摘半开柚花（俗呼为臭橙者），拣去茎蒂，纳瓮中，令燥湿恰好，如前法密封。十日后以手漉其清液收之。取之以理发，经月常香。

【功用】香发长鬓。

64148 宫外孕Ⅰ号方

【方源】《中医妇科学》。

【组成】赤芍 丹参各 15 克 桃仁 9 克

【功用】活血祛瘀。

【主治】宫外孕已破损型。突发下腹剧痛，拒按，面色苍白，四肢厥逆，冷汗淋漓，恶心呕吐，血压下降或不稳定，有时烦躁不安或表情淡漠，脉微欲绝或细数无力。

64149 宫外孕Ⅱ号方

【方源】《中医妇科学》。

【组成】赤芍 丹参各 15 克 桃仁 9 克 三棱 3～6 克 莪术 3～6 克

【功用】活血化瘀，消癥消胚。

【主治】宫外孕未破损型及包块型。

突

64150 突门散

【方源】《辨证录》卷十二。

【组成】黄耆二两 败龟版一个（捣碎） 牛膝 川芎各五钱 附子三分

【用法】水煎服。

【主治】难产。

【加减】加当归亦可，加人参更神。

穿

64151 穿牙散

【方源】《济生》卷五。

【组成】全蝎七个（去毒） 细辛（洗净）三钱 草乌二个（去皮） 乳香二钱（别研）

【用法】上为细末。每用少许擦患处。须臾以温盐水盥漱。

【主治】一切齿痛，不问久新。

64152 穿针散

【方源】《续本事》卷四。

【组成】木贼半两（去黑不要尘者） 香附子 细辛 菊花 羌活各半两

【用法】上为细末。每服二钱，好茶少许同点，食后服。

【主治】眼目赤肿，翳障羞明。

64153 穿肠丸

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】猪胆汁一枚

【用法】以蜜二两，煮令可丸，入腻粉一钱匕，捏如中指长，纳下部。

【主治】大便七八日不通，服诸药未效。

64154 穿骨散

【方源】《古方汇精》卷二。

【组成】白芥子不拘分两

【用法】用白酒酿调敷患处。

【主治】贴骨疽,又名缩脚疽,皮色不异,肿硬作痛者。

64155　**穿结药**

【方源】《洁古家珍》。

【异名】穿结散(《医学纲目》卷三十二)。

【组成】蟾酥　麝香　轻粉各等分　巴豆少许(另研)

【用法】上为细末,以乳汁为丸。每服如黍米大二粒,姜汤送下,不拘时候。

【主治】大实大满,心胸高起,气塞不通。

64156　**穿结散**

《医学纲目》卷三十二。为《洁古家珍》"穿结药"之异名。见该条。

64157　**穿珠丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】石菖蒲(节密者,去毛)五钱　麝香半钱

【用法】上为细末,熔黄腊半两,和为块。每用小石莲大,中间以大针穿窍,夜间安两耳内,日间取出。

【主治】上壅耳聋。

64158　**穿粉散**

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】轻粉(研,隔纸微炒)　穿山甲(炙)铅粉　黄丹(水飞过)各三钱

【用法】上为极细末。香油调敷。

【主治】①《金鉴》:旋耳疮。②《中医皮肤病学简编》:外耳湿疹,黄水疮。

64159　**穿瘿丸**

【方源】《普济方》卷二九四。

【组成】通草二两　杏仁(去皮尖,研)　牛蒡子(去油)各一两　射干　昆布(去咸)　诃黎勒　海藻(去咸)各四两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如弹子大。噙化咽津下,一日三次。

【主治】瘿瘤结硬。

64160　**穿山甲丸**

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】穿山甲一分(炙令黄色)　干姜一分(炮裂,锉)　硼砂一分(细研)　半夏一分(汤洗七遍,去滑)　威灵仙半两　斑猫一分(糯米拌炒微黄,去翅足)　肉桂一分(去皴皮)　川乌头半两(炮裂,去皮脐)　芫花半两(醋拌炒,令干)　巴豆半两(去皮心,研,纸裹压去油)

【用法】上为末,入巴豆、硼砂,研令匀。用糯米饭为丸,如小豆大。每服三丸,食前煎橘皮汤放冷送下。

【功用】破结块。

【主治】食癥,及积恶血气。

64161　**穿山甲丸**

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】穿山甲　没药　延胡索　当归(锉,微炒)　硇砂各半两　狗胆二枚(干者)

【用法】上为丸,如绿豆大。每服十丸,食前以温酒送下。

【主治】妇人月水不通,腹胁疼痛。

64162　**穿山甲丸**

【方源】《圣惠》卷八十一。

【组成】穿山甲(烧灰)　猪牙皂荚(烧灰)王不留行　皂荚针(炙微黄)　自然铜(细研)蝉壳　蛤粉　胡桃瓤(烧灰)各半两

【用法】上为末,以车脂为丸,如梧桐子大。每服二十丸,以热酒送下,不拘时候。

【主治】吹奶,肿硬疼痛,日夜不歇。

64163　**穿山甲散**

【方源】《圣惠》卷六十。

【异名】内消散(《直指》卷二十二)。

【组成】穿山甲二两(炙令焦黄)　麝香一分(细研)

【用法】上为细散,入麝香,同研令匀。每服二钱,食前煎黄耆汤调下。

【主治】痔,肛边生鼠乳,及成疮,痛楚至甚。

64164　**穿山甲散**

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】穿山甲二两(炙令黄色)　京三棱二两(微炮,锉)　木香一两　槟榔一两　桂

心一两 白术三分 鬼箭羽半两 川大黄一两（锉碎，微炒） 桃仁三分（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 防葵三分 鳖甲一两半（涂醋炙令黄，去裙襕） 当归三分（锉，微炒）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，煎至六分，去滓，食前稍热服。

【主治】妇人癥瘕，及血气凝滞，心腹疠痛，四肢羸瘦，时吐清水，不欲饮食。

64165 **穿山甲散**

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】穿山甲一两（炙令黄色） 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襕） 赤芍药一两 芎䓖半两 当归半两（锉，微炒） 麝香一分（细研） 川大黄一两（锉碎，微炒） 干漆一两（捣碎，炒令烟出） 桂心一两 芫花半两（醋拌炒令干）

【用法】上为细散，入麝香，同研令匀。每服一钱，以热酒调下，不拘时候。

【功用】《济阴纲目》：散结破血，行气消饮，温行积块。

【主治】妇人癥瘕，及恶血气攻刺，心腹疼痛，面无颜色，四肢瘦弱。

64166 **穿山甲散**

【方源】《圣惠》卷七十二。

【组成】穿山甲一两（炙令黄色） 榼藤子一两（去壳，微炒） 麒麟竭半两 露蜂房半两（微炙） 猬皮一两（炙令黄） 麝香一分（研入）

【用法】上为细散，入研了药令匀。每服一钱，食前以当归汤调下。

【主治】妇人痔疾。

64167 **穿山甲散**

【方源】《圣惠》卷七十七。

【组成】穿山甲二分（炒令黄色） 牡丹半两 肉桂半两（去皱皮） 鬼臼一两（去毛） 驴护干一两 蒲黄一两 当归一两 莲子一两 川大黄半两（锉碎，微炒） 桃胶三分 槟榔一分

【用法】上为散。每服三钱，以水、酒各半中盏，煎至六分，去滓，每于食前温服。

【主治】妇人经脉不通，一月至三个月，腹内有气块，发来从胁下起冲心，此是鬼胎。

64168 **穿山甲散**

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】穿山甲一两 儿孩子头发一两（十岁以下者佳） 干漆一两 红兰花子一两 赤鲤鱼鳞二两 灶突墨二两

【用法】上药都入于瓷瓶子内，以瓦子盖瓶口，用盐泥固济，于盖上开一窍，以大火烧令烟白色，住火候冷取出，细研为散。每服一钱，以热酒调下，不拘时候。

【主治】产后恶血在腹中，疠痛不可忍。

64169 **穿山甲散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十三。

【组成】黄牛角腮（锉） 猪牙皂角（锉） 穿山甲各半两 蝉蜕一分

【用法】上药入在瓷罐子内，炭火烧留性，为细末。每服二钱，食前胡桃酒送下。

【主治】肠风痔疾，疼痛难忍，或下血不止。

64170 **穿山甲散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十六。

【组成】当归（洗、焙） 干漆（米醋炒令烟出） 穿山甲（石灰炒如田螺） 干姜（炮）各等分

【用法】上为细末。每服二钱，食前温酒送下。

【主治】妇人血积、血块，往来刺痛，经脉欲行，腹胁疠痛，或作寒热，肌肉消瘦。

64171 **穿山甲散**

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】蜂房一两 蛇蜕 穿山甲 油发（并烧，带生存性）各一分

【用法】上为末。每服二钱，入乳香末半钱，暖酒调下。

【功用】托毒排脓，托出毒气，止痛内消。

【主治】痈疽，五毒附骨，在脏腑里。

64172 **穿山甲散**

【方源】《直指》卷二十三。

【组成】穿山甲(撮取后段尾根尽处,炙焦存性)一两 鳖甲半两(酒炙酥) 麝香半钱(细研)。

【用法】上为末。每服一钱半,用腊茶半匙夹和,沸汤送下;防风煎汤调下亦得。留滓涂痔。

【主治】痔,肛边生鼠乳,或成疮痛。

64173 **穿山甲散**

【方源】《普济方》卷二八四。

【组成】穿山甲一两(炒) 天花粉二两 白芷二两

【用法】上为细末。每服二钱,酒调下。

【主治】痈疽诸痛,未有头者。

64174 **穿山甲散**

【方源】《疡医大全》卷十七。

【组成】白霜梅(烧存性)一个 枯矾一钱 穿山甲(炒) 雄黄各五分

【用法】共为细末。吹喉中。立效。

【主治】《疡医大全》引盛锡朋:咽喉内生疮,鼻孔俱烂,名天白蚁疮。

64175 **穿山甲膏**

【方源】《圣济总录》卷一四四。

【组成】穿山甲(烧灰) 虎胫骨(烧灰)各一两 鸡舌香一枚(生用) 麝香(研)少许

【用法】上为细末。每用一钱匕,看所患大小,以黄米粥摊在纸上,候温,掺药末在粥上,封裹所伤处,疼痛立止,隔日换贴之。

【主治】伤折筋骨。

64176 **穿牙如圣散**

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】石燕子三对(烧七返,醋淬) 乳香(另研) 青盐各一两 细辛半两

【用法】上为细末。每用以指蘸药干擦于痛处,良久温荆芥汤漱。

【功用】牢牙齿,止疼痛。

【主治】牙疼。

64177 **穿山甲骨贴熁膏**

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】穿山甲骨三两(涂醋炙令黄) 桂心一两 当归一两 生地黄汁三合 飞曲面一匙 附子一两(去皮脐,生用) 生姜汁五合。

【用法】上为细散。热暖地黄、生姜汁,调散五钱令匀,摊于绢上,乘热裹贴损折痛处,急系缚,每日换之。

【功用】接骨。

【主治】伤折疼痛。

美

64178 **美首膏**

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】百草霜一两 雄黄一两 胆矾六钱 轻粉一钱 榆树皮三钱

【用法】用石灰窑内烧红流结土渣四两,共为细末,猪胆汁调。剃头后搽之。

【主治】小儿白秃,癞疮。

64179 **美容膏**

【方源】《普济方》卷五十一。

【组成】料炭灰 桑柴灰 荞麦秸灰各半两(上灰用热汤淋取一升,熬至五分) 独角仙一个 红娘子半钱 糯米四十九粒 石灰一两

【用法】上为末,将前项灰调汁如面糊相似,入瓷盒内,土底埋五七日,取出使用。取瘢痕靥内刺破,用细竹签子点之,放药,用湿纸揉药;再点,至三上,见瘢痕时,令水淋洗。

【主治】偏满头面大小诸靥子,或遍身体者。

【宜忌】忌姜、醋、无肉之物。

64180 **美容膏**

【方源】《简明医彀》。

【组成】防风 零陵香 藁本各二两 白及 白附子 白蔹 天花粉 绿豆粉 僵蚕 白芷各一两 甘松 三奈 茅香各五钱 肥皂(去皮弦)

【用法】上为末,蜜和捣。匀擦。

【主治】面生黑皯,雀斑。

64181 **美髯丹** 《医级》卷八。为《本草纲目》

卷十八引《积善堂方》“七宝美髯丹”之异名。见该条。

64182 **美髯醑**

【方源】《摄生秘剖》卷四。

【组成】桑椹子（火烘干）二两　何首乌（黑芝麻煮）十两　冬青子（盐水炒）二两　旱莲草（晒干）三两　熟地黄七两（怀庆者）　乌饭叶（切碎）三两　黑豆皮三两（不用豆）　干茄花（净瓣）三两　乌犀角三两（用铜罐河水熬，滴水成珠）

【用法】用无灰酒六十斤，将药用绢袋盛之，投入酒内，封固坛口，煮三炷香，放土地上出火气。多少随意饮之，不拘时候，每饮加青盐少许，引入肾经为佳。

【功用】乌须。

姜

64183 **姜术丸**

【方源】《圣济总录》卷九十四。

【组成】苍术（米泔浸，切，炒）　干姜（炮制）　马蔺花　芫花（醋炒焦）　五灵脂（去土）　乌头（炮裂，去皮脐）各一两

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前温酒或盐汤送下。

【主治】卒疝，少腹与阴相引，疼痛不可忍。

64184 **姜术汤**

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】干姜　白术　桂（去粗皮）各一两　附子（炮裂，去脐皮）　甘草（炙）各半两　防风（去叉）一两

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，用水一盏半，煎至八分，去滓温服。

【主治】时行及伤寒后虚惫，发即闭眼合面者，柔痓之候也，手足厥冷，筋脉急强，汗出不止。

64185 **姜术汤**

【方源】《直指》卷十一。

【组成】白姜（生）　白术　茯苓　半夏曲各半两　辣桂　甘草（炙）各一分

【用法】上锉。每服三钱，加生姜，大枣，水煎服。

【主治】虚证，停饮怔忪。

64186 **姜术汤**

【方源】《御药院方》卷二。

【组成】川姜（炮）　白术（炒）　茯苓各一两　附子（炮，去皮脐）　甘草（炙）各半两

【用法】上为粗末。每服三钱，水一盏半，煎至八分，去滓，温服，不拘时候。

【功用】温和中外，退除寒湿。

【主治】阳虚里寒，外挟风冷，头痛恶风，战慄多汗；风湿相搏，身体疼痛，腰背强直，转侧不能；又疗食寒饮冷，内伤脾胃，呕逆吐痰，不思饮食。

64187 **姜术散**

【方源】《济阴纲目》卷十三。

【组成】白术一两二钱半　生姜一两半

【用法】上锉，作一服。酒、水各二升，煎取一升，分三服。

【主治】产后更无他疾，但多呕逆，不能食。

64188 **姜术散**

【方源】《慈幼新书》卷二。

【组成】半夏　木香各五钱　川白姜　白术　青皮　陈皮各二钱五分

【用法】面糊为丸，如麻子大。一岁十丸，米饮送下。

【主治】小儿滞颐。

64189 **姜石散**

【方源】《圣惠》卷八十七。

【组成】姜石（以浓米泔浸七日，晒干，捣研，水飞过）　桑耳（捣罗为末）　豉（焙干捣罗为末）各一两

【用法】上为末，三岁以下每服半钱，三岁以上至七岁每服一钱，用羊肝或猪肝、牛肝两指大，去膜细切，以水研绞取汁调下，一日三服。

【主治】小儿眼疳，怕日赤烂，泪下疼痛，不久眼睛将落。

64190 **姜汁丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】半夏(汤洗七次) 干生姜各一两 巴豆二钱半(去皮心膜油,取霜)

【用法】上为细末,入巴豆霜再研匀,姜汁面糊为丸,如黍米大。每服十丸,食后生姜汤送下。

【主治】肺气壅盛,喘满咳嗽,呕吐饮食,便溺不利。

64191 **姜汁汤**

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】半夏半两 桔梗 橘皮(黄者) 茯苓各二两 附子 甘草 桂各一两 椒一两半

【用法】上为粗末。每服三钱,水一盏半,煎至八分,去滓,入姜汁半醋勺,再煎,食前服。

【主治】胸中痰饮,积聚不消,咳嗽逆吐,饮食不下,脾胃久虚,肌体羸瘦,或自下者。

64192 **姜汁饮**

【方源】《圣济总录》卷八十二。

【组成】生姜四两

【用法】上和皮捣取自然汁,早晨取半合,以温汤半合和服之,每如人行十里一服,一日三次。

【功用】开胃口,令人能食。

【主治】①《圣济总录》:脚气,上气闷绝者。②《仙拈集》:中暑。

64193 **姜汁酒**

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】生姜汁六分盏(作三服) 鸡子黄三枚(作三服)

【用法】先用酒三分盏,醋二分盏,同煎沸,入姜汁二分盏,又煎,令沸倾出,用鸡子黄一枚,乘热打转,稍热服之。须臾未下,尽此三服。

【主治】子死腹中,气血凝冷难下。

64194 **姜汁酒**

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】热酒 姜汁各半盏

【用法】灌服。

【主治】中寒卒倒,昏迷不省。

64195 **姜汁膏**

【方源】《理瀹》。

【组成】吴茱萸 生姜汁 陈酒

【用法】熬膏。敷痛处。

【主治】厥阴冷结膀胱,小腹满痛。

64196 **姜半饮**

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】生姜一两(打碎) 半夏五钱

【用法】水煎,徐徐服之。加橘皮更效。

【主治】一切呕哕。

64197 **姜半散**

【方源】《痘疹传心录》卷十七。

【组成】半夏二两(姜制,锉如豆大) 生姜(去皮,切,如绿豆大)一两 肉桂(去皮)二钱

【用法】上姜、半共炒令香熟,下桂再炒,微有香气,取出去桂,以皮纸摊地上,出火气,为末。每周二钱,水一盏,煎半盏,陆续服。

【主治】惊风,吐不止,将成慢惊者。

64198 **姜朴丸**

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【异名】厚朴煎丸(《杨氏家藏方》卷六)。

【组成】厚朴(去粗皮)一斤(擘作十六片,肥生姜一斤,捶碎,锅内旋添汤,煮姜味淡取出,厚朴焙) 干姜半斤(以甘草半斤,捶碎,煮甘草味淡取出,干姜切作片子,焙) 附子(炮裂,去皮脐)四两

【用法】上为末,用熟枣肉为丸,如梧桐子大。每服二十丸,食前温米饮送下。

【功用】和脾胃,进饮食。

【主治】三焦俱虚。

64199 **姜朴丸**

【方源】《普济方》卷二〇九引《鲍氏方》。

【组成】干姜 厚朴各等分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。任下三十丸。

【主治】中寒洞泄。

64200 **姜朴汤**

【方源】《医统》卷十六。

【组成】干姜（炮） 厚朴 人参 白术 白茯苓各一钱 陈皮 枳实 羌活 炙甘草各五分

【用法】水二盏，姜三片，水煎服。

【主治】夏秋暑热过食冷物茶水，以伤其内，过乘凉风以伤其外，致恶寒发热，胸膈饱闷，饮食不进，或吐泻，此内外俱寒冷也。

64201 **姜朴汤**

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】高良姜一两 厚朴五钱 生姜三钱

【用法】水煎，冷服。

【主治】霍乱腹痛欲呕。

64202 **姜芍散**

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】干姜（炒黑）五钱 白芍（酒炒）二两

【用法】上为末。每服二钱，空心米饮调下。

【主治】赤白带下，不论新久。

64203 **姜曲丸**

【方源】《丹溪心法》卷二。

【组成】隔年陈麦曲二两（炒） 茴香五钱 生姜二两

【用法】上为末，或丸。每服五七钱，白汤下。

【功用】止泻。

【主治】泄泻。

64204 **姜曲汤**

《杨氏家藏方》卷二十。为《鸡峰》卷十三“八神汤”之异名。见该条。

64205 **姜合丸**

【方源】《局方》卷三（吴直阁增诸家名方）。

【组成】丁香（不见火） 木香（不见火） 人参各一两 白术（焙） 青皮（去白） 陈皮（去白）各二两 附子（炮，去皮脐）二两半 厚朴（去粗皮，姜汁炙） 肉豆蔻（炮）各二两 干姜（炮）三两

【用法】上为细末，入硇砂八钱，姜汁、面糊为丸，每一两做二十丸。每服一丸，用老姜一块如拇指头大，切开作合子，安药于内，用湿纸裹，慢火煨一顿饭久，取出去纸，和姜细嚼，白汤送下。小儿一粒分四服。

【主治】男子、妇人气血虚弱，久积阴冷，留滞不化，结聚成形，心腹膨胀，刺痛成阵，上连胸胁；或脾胃久虚，内伤冷物，泄泻注下，腹痛肠鸣；或久痢纯白，时下青黑，肠滑不禁。又治胃脘停痰，呕吐吞酸，痞塞不通，不思饮食，身体沉重，面色痿黄，或久患心脾疼痛。

【宜忌】孕妇不得服。

64206 **姜合丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】木香 附子（炮，去皮脐） 肉桂（去粗皮） 硇砂（纸上飞过）各一两 丁香 沉香 荜澄茄 青橘皮 陈橘皮（去白） 五味各半两 茴香一分（炒）

【用法】上为细末，次入硇砂研匀，酒煮面糊为丸，每一两作二十丸。每服一丸，以生姜一块，剜如合子，安药在内，湿纸裹，煨令香，去纸，放温细嚼，盐汤送下，不拘时候。

【主治】中脘停寒，胸膈结痞，呕吐恶心，不思饮食。

64207 **姜合丸**

【方源】《朱氏集验方》卷三。

【组成】生姜一块（中破，两边各剜去少许，可容巴豆丸十五粒，却合姜，纸裹浸湿，煨熟用）

【用法】先热下热白汤一盏，取出药丸，先一口汤咽下，再嚼煨姜，白汤尽咽下，如泻亦好。

【主治】气痛多因冷，或感风雨湿，或冷食癥滞，则腹有痛块，引引上心。

【方论选录】煨姜能正冷气，而巴豆祛积有功也。

64208 **姜米汤**

【方源】《圣济总录》卷一六三。

【组成】干姜（炮）一两 陈粟米（炒）二两 甘草（炙）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎

至六分,滤去滓,食前稍热服,一日三次。

【主治】产后虚乏,津液衰耗,烦渴不止。

64209　**姜米汤**

【方源】《痘疹活幼至宝》卷终。

【组成】老生姜一块(重一两许)

【用法】煨熟,去皮研烂,用水一碗,陈米二撮,同入瓦罐内煮清汤,候温,用小酒杯,少少渐服,其呕自止。

【主治】吐多而胃气欲绝者。

64210　**姜米散**

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【组成】陈米一升(用生姜二斤取汁浸米,焙,捣筛为末,炒令黄)　肉豆蔻三枚(去壳)　草豆蔻十枚(煨,去皮)　陈橘皮(去白,炒)　甘草(炙,锉)　烧盐各一两(研)

【用法】上为散。每服二钱匕,沸汤点服,不拘时候。

【主治】脾胃气虚,腹胀飧泄困劣,服暖药即呕逆,食饮不下。

64211　**姜麦汤**

《普济方》卷一八三。为《千金》卷十七"下气方"之异名。见该条。

64212　**姜芷散**

【方源】《外科传薪集》。

【组成】姜黄　白芷各一斤

【用法】上为末。敷患处。

【主治】火湿毒。

64213　**姜芷散**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】生僵蚕　白芷各等分

【用法】上为末。外疡之由风痰湿者,可掺入膏药中用,亦可用姜、醋调敷;眼癣风,用姜汁调涂。

【主治】外疡,眼癣风。

64214　**姜苋方**

【方源】《普济方》卷二一二。

【组成】马齿苋　生姜各二两

【用法】上和匀,用湿纸裹,煨熟,不拘多少,细嚼,米饮咽下。

【主治】久痢不止,或赤或白。

64215　**姜苏饮**

【方源】《许氏幼科七种·热辨》。

【组成】生姜　橘皮　苏叶各等分

【用法】水煎服。

【主治】小儿面青唇暗,振慄指冷,或皮肤粟生,或吐乳。

64216　**姜连丸**

【方源】《卫生总微》卷十一。

【组成】黄连(去须)　龙骨(煅)　白石脂　川姜(炮)　枯矾各一两

【用法】上为末,以粟米粥为丸,如麻子大。每服三十丸,乳食前米饮送下。

【主治】①《卫生总微》:小儿诸利。②《普济方》:元脏久冷,滑泄不止,饮食不进,渐至危困。

64217　**姜连丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】宣黄连(去须)　生姜(连皮同黄连炒)各四两　肉豆蔻(面裹煨)　当归(去芦)各二两　罂粟壳三两(去顶蒂,瓤,蜜炒)　干姜(炮,洗)　阿胶(锉,麸炒成珠)各一两

【用法】上为细末,以枣子四十九枚,生姜四两切片,银石铫内同枣子水浸,煮候干,取枣去皮核,捣成膏为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心米饮送下。

【主治】痢下赤白。

64218　**姜连丸**

【方源】《胎产秘书》卷上。

【组成】川连　白术　砂仁　阿胶　炮姜　川芎各一两　枳壳五钱(炒)　乳香三钱(另研)

【用法】上为末,加盐杨梅三枚,醋少许,打糯米糊为丸,如梧桐子大。每服四十丸,白痢,淡姜汤送下;赤痢,甘草汤送下;赤白痢,甘草生姜汤下。

【主治】妊娠下痢赤白。

【加减】赤痢,可加银花;白痢,腹痛可加青皮。

64219 **姜连散**

【方源】《圣济总录》卷七十四。

【异名】姜香散（《魏氏家藏方》卷七）。

【组成】生姜四两　黄连（去须）一两

【用法】上㕮咀，如麻豆大，一处慢火炒令姜赤色，去姜，取黄连为细散。每服二钱匕，空腹腊茶清调下。

【主治】①《圣济总录》：久患脾泄泻。②《医部全录》：气痢，里急后重。

64220 **姜连散**

【方源】《普济方》卷七十四引《大卫方》。

【组成】干姜　黄连各半两

【用法】上为粗末，以绵包之，沸汤泡。闭目乘热频洗。

【主治】暴赤眼。

64221 **姜连散**

【方源】《普济方》卷三四〇。

【组成】诃黎勒　龙骨　乳香　干姜　芎䓖　白术　盐梅各等分　（一方有黄连）

【用法】上为细末，入梅肉搅匀如膏，为丸，如梧桐子大。每服五七丸，白痢，白姜汤送下五丸；赤痢，甘草汤送下；赤白痢，白姜甘草汤下。

【主治】胎前下痢。

【宜忌】忌生冷毒物。

64222 **姜连散**

【方源】《普济方》卷三九七。

【组成】生姜四两（锉）　黄连一两（去毛，生姜炒，分作二份）　甘草五分（炙）

【用法】上为末。米汤调下。

【主治】诸般泻痢，冷热不调，赤白五色。

【备考】以黄连、甘草治热痢、血痢；生姜、甘草治白痢。

64223 **姜陈汤**

《高崖尊生》卷九。为《圣济总录》卷二十五"姜橘汤"之异名。见该条。

64224 **姜陈汤**

【方源】《穷乡便方》。

【组成】广陈皮一钱　生姜皮一钱

【用法】加水一盏煎。不拘时候服。

【主治】夏间阳气在外，胃虚邪气易侵，作吐泻。

64225 **姜附丸**

【方源】方出《肘后》卷一，名见《外台》卷七。

【组成】附子二两（炮）　干姜一两

【用法】上为末，捣为蜜丸，如梧桐子大。每服四丸，一日三次。

【主治】①《肘后》：卒心痛。②《外台》：心肺伤动，冷痛。

【宜忌】《外台》：忌猪肉，冷水。

64226 **姜附丸**

【方源】《圣济总录》卷二十六。

【异名】附子姜朴丸（《卫生总微》卷七）。

【组成】干姜（炮）半两　附子（炮裂，去皮脐）二两　厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉）一两

【用法】上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮送下。

【主治】伤寒霍乱，呕吐不止，手足厥逆。

64227 **姜附丸**

【方源】《圣济总录》卷四十三。

【组成】附子（炮裂，去皮脐）一分　干姜（炮）三分　乌头（炮裂，去皮尖）一分　吴茱萸（汤浸一宿，焙干，炒）半两　厚朴（去粗皮，生姜汁炙）半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，空腹以酒送下，日三夜一；未效，稍加丸数。

【主治】心中寒，心痛彻背，背痛彻心，或心下结实。

64228 **姜附丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】附子三枚七钱重者（炮，去皮脐）　白术四两　干姜二两（炮）

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前温米饮送下。

【功用】逐寒祛湿，温脾胃，止泄泻。

64229 **姜附丸**

【方源】《朱氏集验方》卷三。

【组成】香附子一斤(大者,去毛皮,泔浸三宿,春夏一宿,滤出水,净洗,入银石器内用井水煮,上有二寸分水方可,入大蒜二十枚,去皮铺在上,慢火煮,候蒜烂,以竹箸搅,以蒜汁干为度,滤出焙干用)　神曲(炒黄)四两　干姜(生)四两　荜茇　丁皮　胡椒　缩砂仁各二两

【用法】上为末,浥蒸饼为丸,如梧桐子大。每服五十丸,任意汤使下,不以时候。

【功效】壮实脾胃,进美饮食。

【主治】脾胃气弱,饮食少,或心腹疼痛,或饮食难于克化。

64230　**姜附丸**

【方源】《普济方》卷二一二。

【组成】赤乌脚四两　附子一两　干姜一分

【用法】上为末,用醋煮面糊为丸,如绿豆大。每服十五丸,以粥饮送下。

【主治】久赤白痢不愈。

64231　**姜附丹**

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】生姜(切片)五两　川附子(炮,切片,童便浸,再加姜汁炒干)五两

【用法】上为末。每服四钱,水一盏,煎七分,和滓服。

【功用】补虚助阳,消阴。

【主治】伤寒阴证,痈疽发背,心胸作痛,心腹痞闷,喉痺,颐项肿,汤水不下;及虚劳发热,咳嗽吐血,男妇骨蒸劳热,小儿急慢惊风,痘疹缩陷,黑泡水泡,斑;脾劳面黄肌瘦,肾劳面白骨弱;两目昏翳,内障,脾疟,久痢,水泻,米谷不化;又能解利两感伤寒,天行瘟疫,山岚瘴气,及不时感冒。

64232　**姜附汤**

【方源】《千金》卷十八。

【组成】生姜八两　附子四两(生用,四破)

【用法】上㕮咀。以水八升,煮取三升,分四服。

【主治】痰冷癖气,胸满短气,呕沫头痛,饮食不消化;亦主卒风。

【方论选录】《千金方衍义》:姜汁、附子二味,辟冷癖,其力倍专,乃干姜附子汤之变法。彼取温中,故用干姜,此取涤痰,故用姜汁,两不移易之定法。

64233　**姜附汤**

《外台》卷十四。为《千金》卷八"干姜附子汤"之异名。见该条。

64234　**姜附汤**

【方源】《普济方》卷二〇九引《指南方》。

【组成】干姜三两　附子三分　甘草一两

【用法】上㕮咀。每服五钱,水二盏,煎至一盏,去滓温服。

【主治】①《普济方》引《指南方》:阴寒暴下。②《医方类聚》引《濟衆方》:中寒口噤,四肢强直厥冷,语音不出。

64235　**姜附汤**

《局方》卷二。为《伤寒论》"干姜附子汤"之异名。见该条。

64236　**姜附汤**

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】干姜(炮)　附子(炮裂,去皮脐)　甘草(炙)　桂(去粗皮)　当归(酒浸,切,焙)　白术　细辛(去苗叶)　杏仁(去皮尖双仁,炒,研)各一两　麦门冬(去心,焙)二两

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服。

【主治】中风,失音不语。

64237　**姜附汤**

【方源】《圣济总录》卷二十二。

【组成】附子(炮裂,去皮脐)一两　干姜(炮)　葛根　甘草(锉,炙)　桂(去粗皮)各三分　芍药半两　麻黄(去根节,先煮,掠去沫,焙)一两半

【用法】上锉,如麻豆大。每服三钱匕,水一盏,入大枣二枚(去核),同煎至七分,去滓食前温服,取汗,未汗再服。

【主治】伤寒巨阳中风,项背强,啬啬恶寒,

汗不出。

64238 姜附汤

【方源】《圣济总录》卷一四二。

【组成】生姜 艾叶各半两 附子（炮裂去皮脐） 枳壳（去瓤，麸炒）各三分 生地黄一两半

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓，早、晚食前温服。

【主治】脉痔有虫，时或痒痛，血不止。

64239 姜附汤

《普济方》卷二〇一引《十便良方》。为《伤寒论》"通脉四逆汤"之异名。见该条。

64240 姜附汤

【方源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】白豆蔻半两（去壳） 附子一个（七钱，炮） 缩砂仁三钱 白姜一两（炮） 甘草半两

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一盏半，煎八分，空心服。

【主治】脾虚腹胀，呕吐痰饮，食不进，或发寒热。

64241 姜附汤

【方源】《普济方》卷一九九引《广南卫生方》。

【组成】黑附子（生，去皮脐）

【用法】每个分作四份，每份用水一盏半，入炮黄耆、干姜二钱，切作片子同煎至八分一盏，去滓温服，不拘时候。滓再煎。

【主治】瘴毒阴候，发热或寒，烦躁，手足冷，鼻尖凉，身体疼重，舌上苔生，引饮烦渴，或自利呕逆，或汗出恶风。

64242 姜附汤

【方源】《外科枢要》卷四。

【异名】参术姜附汤（《景岳全书》卷六十四）。

【组成】人参 附子（炮，去皮脐）一两 干姜（炮） 白术各五钱

【用法】上作二剂，水煎服。

【主治】疮疡，真气亏损，或误行汗下，或脓血出多，失于补托，以至上气喘急，自汗盗汗，气短头晕。

64243 姜附汤

【方源】《赤水玄珠》卷二。

【组成】干姜五钱 熟附子三钱

【用法】水二钟，煎八分，作二次服。或虑此方太燥，即以附子理中汤相继服。

【主治】中寒口噤，四肢强直，失音不语，忽然晕倒，口吐涎沫，状如暗风，手足厥冷，或复烦躁；兼阴症伤寒，大便利而发热；及中脘虚寒，久积痰水，心腹冷痛，霍乱转筋，四肢厥逆。

64244 姜附汤

【方源】《痘疹活幼至宝》卷终。

【组成】白附子二钱 老生姜二钱（切细）

【用法】浓煎，灌下一二酒杯。出微汗即愈。

【主治】痘正出时，调护不慎而为风邪所袭，眼直视，牙关紧者。

64245 姜附汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】白术一两 茯苓五钱 附子一钱 人参五钱 甘草一钱 干姜一钱

【用法】水煎服。

【主治】冬月伤寒，四五日后，腹痛，小便不利，手足沉重而疼，或咳，或呕。

64246 姜附汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十七。

【组成】杜仲 干姜（炮） 附子（炮）

【用法】水煎服。

【主治】腰脐寒痛，腰间如冰，得热则减，得寒则增，脉必紧。

64247 姜附汤

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】白术（净炒）三钱 附子（制）三钱 干姜（炒）一钱五分 良姜一钱 炙草一钱

【用法】水煎，候温急服。

【主治】暴泻不止，或大汗大喘，手足厥冷，气少不欲言语。

【加减】欲呕者，加制半夏二钱。

64248　姜附散

【方源】《外台》卷二十五引《张文仲方》。

【组成】干姜　附子(炮)　皂荚(炙,去子)各等分。

【用法】上为散。饮服方寸匕。不过再服即愈。亦可丸服。

【主治】青下,白下。

64249　姜附散

【方源】《圣济总录》卷七十五。

【组成】干姜(炮)　附子(炮裂,去皮脐)　诃黎勒(煨,去皮)　龙骨各一两

【用法】上为散。每服三钱匕,煎乌梅汤空心调下。

【主治】脏寒,下痢白脓,心腹疞痛。

64250　姜附散

【方源】《魏氏家藏方》卷五。

【组成】生附子七钱　生姜一斤　胡椒　丁香各半两(研末,不见火)

【用法】用生姜一斤(肥者),取自然汁,同附子入砂器内,慢火煮,候附子化为糊,须不住用匙搅动,恐焦,直至姜汁煮耗尽,约七分取出,挑入银器内,四面摊开,顿重汤上,时复搅转,重摊过,候药九分干,可以捻不粘缀手,尽取出,捻成小饼子,顿在筛子内,或晒或焙干,碾为细末,再入胡椒、丁香末。空心米饮调下。

【主治】脾虚胃寒。

64251　姜附散

【方源】《赤水玄珠》卷四。

【组成】香附子一斤,生姜三斤

【用法】生姜捣汁,浸香附一宿,晒干再浸,再晒,以姜汁尽为度,为末。每服二钱,米饮调下。

【主治】膈气不通,胸膈间结块,大如拳,坚如石,呕吐恶心,饮食不下。

64252　姜附散

《不知医必要》卷二。为《医说》卷二引《类编》"一服饮"之异名。见该条。

64253　姜鸡蛋

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】鸡蛋一个

【用法】煮二三沸,取起,去白用黄,研碎。以生姜汁半钟和匀服之。

【主治】小儿痢疾。

【宜忌】不宜吃茶。

64254　姜枣丸

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】生姜(去皮,片切,焙干)四两　丁香　附子(炮裂,去皮脐)各一两

【用法】上为末,用蒸枣肉为丸,如梧桐子大。每服十五至二十丸,米饮送下,不拘时候。

【主治】胃寒痰逆,噫醋吞酸,胸膈不利,不思饮食。

64255　姜枣丸

【方源】《圣济总录》卷五十四。

【组成】桂(去粗皮)　附子(炮裂,去皮脐)　干姜(炮)　陈橘皮(去白,焙)　人参　白茯苓(去黑皮)　厚朴(去粗皮,生姜汁炙熟)各一两　陈曲(炒黄色)二两

【用法】上为末,姜汁煮枣取肉为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心食前温酒送下。

【功用】进饮食,益脾元。

【主治】中焦寒。

64256　姜枣丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】干生姜一斤　大枣四斤(去核,饧水洗,拌匀,焙干)　陈橘皮(去白)一两

【用法】上为细末,别用枣一斤,生姜一斤,切作片子,同枣煮烂,不用生姜,只将枣去皮核,取肉和前药末为丸,如梧桐子大。每服一百丸,空心食前温米饮送下。

【功用】安和脾胃,美进饮食。

【主治】中脘不快,呕吐无时。

64257　姜矾散

【方源】《永乐大典》卷一〇三七引《全婴方》。

【组成】生姜五两(切片子)　白矾二两半

【用法】上药调少时,晒干,不见火,为末。

生姜自然汁调，鹅毛拂之。

【主治】小儿火瘅，并一切风疹，赤游肿。

64258 姜矾散

【方源】《金鉴》卷六十二。

【组成】枯矾 干姜各等分

【用法】上为末，先用细茶、食盐煎汤洗之，后用此散掺之。

【主治】一切诸疮发痒者。

64259 姜饴煎

【方源】《圣济总录》卷六十五。

【组成】干姜三两（炮裂，为细末） 胶饴一斤

【用法】上拌匀，以瓷器盛置，饭上蒸令极熟。每服一枣大，含化咽津，日三夜二。

【主治】冷嗽。

64260 姜鱼丸

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】干生姜末一两

【用法】用鲫鱼胆汁为丸，如梧桐子大。每服七丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】消渴，饮水不止。

64261 姜柏散

【方源】《金鉴》卷六十五。

【组成】干姜 黄柏各等分

【用法】各为末，共合一处。干搽口内，温水漱口。

【主治】口糜。

64262 姜茂汤

【方源】《圣济总录》卷一五五。

【组成】姜黄 蓬莪茂（煨） 藿香叶各一两 甘草（炙）半两

【用法】上为粗末。每服二钱匕，水一盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【功用】和气思食。

【主治】妊娠腹痛，中满。

64263 姜草汤

【方源】《校注妇人良方》卷七。

【组成】甘草（炒） 干姜各一钱

【用法】水煎服。

【主治】阴乘于阳，寒而呕血。

64264 姜茶丸

【方源】《朱氏集验方》卷六。

【组成】干姜（炮） 建茶各一两

【用法】上以乌梅取肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前米饮送下。

【主治】休息痢。

64265 姜茶方

【方源】《得效》卷六。

【组成】生姜

【用法】切碎，如粟米大，加草茶等分，水煎服。

【主治】痢下腹痛，肚皮热，手不可近。

64266 姜茶汤

《古今医鉴》卷五。为《续易简方》卷四“姜茶散”之异名。见该条。

64267 姜茶饮

《幼科铁镜》。为《痘疹传心录》卷十七“姜茶散”之异名。见该条。

64268 姜茶饮

《医林纂要》卷六。为《续易简方》卷四“姜茶散”之异名。见该条。

64269 姜茶散

【方源】《圣济总录》卷四十。

【组成】干姜（炮，为末）二钱匕 好茶末一钱匕

【用法】上以水一盏，先煎茶末令熟，即调干姜末服之。

【主治】霍乱后烦躁，卧不安。

64270 姜茶散

【方源】《续易简方》卷四。

【异名】姜茶煎（《医学入门》卷七）、姜茶汤（《古今医鉴》卷五）、姜茶饮（《医林纂要》卷六）。

【组成】生姜（和皮，切片）十片 陈腊茶末二钱

【用法】上用水二盏，煎至一盏，去滓，食前热服。

【主治】赤白痢。

【方论选录】《医学入门》：姜助阳，茶助阴，二者皆能消散，又且调平阴阳，暑毒、酒食毒皆能解之。

64271 **姜茶散**

【方源】《痘疹传心录》卷十七。

【异名】姜茶饮(《幼科铁镜》)。

【组成】芽茶三钱　生姜三钱　黄蜡一分　盐一撮　车前草叶七片

【用法】水一钟，煎至四分，服之即止。不尽止，再一服。红多重用茶叶，白多重用生姜。

【主治】赤白痢。

64272 **姜茶煎**

《医学入门》卷七。为《续易简方》卷四"姜茶散"之异名。见该条。

64273 **姜茶煎**

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】生姜　红糖各三钱　细茶二钱　核桃仁五个(一方加砂仁)

【用法】水二碗，煎八分服。

【主治】泻痢。

64274 **姜面丸**

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】好面一斤　干姜十两　吴茱萸五钱　青盐一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下。

【主治】腹虚冷，不饮食，食辄不消，羸瘦。

64275 **姜面丸**

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】苍术　好面一斤　当归　干姜各三两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心米饮送下。

【主治】腹寒冷，不饮食，食辄不消，羸瘦者。

64276 **姜面方**

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】生姜(细切碎，湿纸裹，煨)半两　白面(治如食法)三两

【用法】拌和毕，沸汤中下煮二十沸，空心旋旋食之。

【主治】赤白痢及水痢。

64277 **姜香丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷六。

【组成】生姜十两(和皮细擦，与茴香腌二宿)　茴香五两(淘去沙)

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大，每服四十丸，早、晚食前盐汤、盐酒任下，服讫如人行三五里后方可吃食。

【主治】脾肾百病。

64278 **姜香散**

《魏氏家藏方》卷七。为《圣济总录》卷七十四"姜连散"之异名。见该条。

64279 **姜胆膏**

【方源】《疡科遗编》卷上。

【组成】生姜十斤　雄猪胆一百个　葱五斤　乳香十两　没药十两

【用法】先将葱、姜打烂，同猪胆搅和，再将乳香、没药研细，一并搅匀，置钵内，烈日中晒之，俟晒月余则稀稠得宜而成膏。用此外贴。

【主治】流注初起，漫肿无头，不红不痛者。

64280 **姜桂丸**

【方源】《洁古家珍》。

【组成】南星(洗)　半夏(洗)各一两　官桂一两(去粗皮)

【用法】上为细末，蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，食后生姜汤送下。

【主治】寒痰咳嗽，脉沉，面黧黑，小便急痛，足寒面逆，心多恐怖。

【加减】如心下痞闷者，加枳实五钱；如身甚热者，加黄连五钱；如体重，加茯苓、白术各一两，如气逆上者，加苦葶苈五钱；如气促者，加人参、桔梗各五钱；如浮肿，加郁李仁、杏仁各五钱；如大便秘，加大黄五钱；如痰而能食者，大承气汤微下之；如痰而不能食者，厚朴汤主之。

64281 **姜桂丸**

【方源】《直指》卷十八。

【组成】良姜(碎片)半两 巴豆肉二十一粒(截断,同炒焦,去巴豆) 桂心半两

【用法】上为末,醋面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食前温酒服。

【主治】肾冷寒疝。

64282 **姜桂丸**

【方源】《杂病源流犀烛》卷十六。

【组成】白术一斤 炮干姜 肉桂各八两

【用法】炼蜜为丸。每服二三十丸。

【主治】饮食胃寒,或饮茶过多,致成五饮及酒癖。

64283 **姜桂汤**

《全生指迷方》卷二。为《伤寒论》“柴胡桂枝干姜汤”之异名。见该条。

64284 **姜桂汤**

【方源】《朱氏集验方》卷四。

【组成】白姜(炮) 红豆 肉桂 丁香 粉草 缩砂仁(炒) 败姜(用灶心土炒)各半两

【用法】上为细末。每服一钱,生姜自然汁一分,沸汤调下。

【主治】翻胃呕吐。

【备考】方中败姜,《普济方》引作“败酱”。

64285 **姜桂汤**

【方源】《普济方》卷二一三。

【组成】干姜 官桂 甘草 罂粟壳 黄柏各等分

【用法】上为粗散。每服十两重,泉水煎,空心服。

【主治】赤白痢,里急后重,小腹疼痛不可忍者。

【加减】赤,加黄柏;白,加干姜。

64286 **姜桂汤**

【方源】《回春》卷五。

【组成】干姜 良姜 官桂各七分 藿香 苍术(米泔制) 厚朴(姜汁炒) 陈皮 甘草(炙) 木香 茴香(酒炒) 枳壳(麸炒) 砂仁 香附(炒)各等分

【用法】加生姜三片,水煎,磨木香服。

【主治】痛甚,加乳香;手足厥冷,脉沉伏,加附子,去良姜。

64287 **姜桂汤**

【方源】《回春》卷五。

【组成】干姜 肉桂 良姜各七分 枳壳(去瓤,麸炒) 陈皮 砂仁 厚朴(姜汁炒) 吴茱萸(炒)各一钱 香附一钱半 木香五分(另研入服) 甘草二分

【用法】加生姜一片,水煎服。

【主治】寒腹痛。

【加减】痛不止,加玄胡索、茴香、乳香;寒极,手足冷,加附子,去茱萸、良姜;泄泻,去枳壳。

64288 **姜桂汤**

《仙拈集》卷二。即《外科全生集》卷四“桂姜汤”。见该条。

64289 **姜桂汤**

【方源】《疝癥积聚编》。

【组成】干姜 桂枝 苍术 半夏 附子 生姜各等分

【用法】水煎,温服。

【主治】寒疝,心胃痛不可忍。

64290 **姜桂饮**

【方源】《直指》卷六。

【组成】良姜 辣桂各等分

【用法】上为末。每服二钱,米汤乘热调下。

【主治】心腹刺痛。

64291 **姜桂饮**

《不知医必要》卷二。为《圣济总录》卷七十八“姜桂散”之异名。见该条。

64292 **姜桂散**

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【异名】姜黄散(原书卷一六一)。

【组成】姜黄一两 桂(去粗皮)三两

【用法】上为细散。每服二钱匕,醋汤调下,或生姜酒调下。

【主治】心痛及产后血块攻筑,心腹疠痛。

64293 **姜桂散**

【方源】《圣济总录》卷七十八。

【异名】姜桂饮(《不知医必要》卷二)。

【组成】干姜(炮)三两 甘草一两(锉，二味用砂糖二两，水微化开，同炒干) 桂(去粗皮)一分

【用法】上为散。每服二钱匕，白汤调下。

【功用】止虚渴。

【主治】①《圣济总录》：洞泄、飧泄，里急后重，腹痛。②《不知医必要》：顷刻间咽喉痛极难忍。

64294 **姜桂散**

【方源】《直指》卷三。

【组成】干姜 良姜各半两 辣桂 木香 半夏曲 甘草(炒)各二钱半

【用法】上锉散。每服三钱，加生姜五片，大枣二个，水煎服。

【功用】温中，散寒气。

64295 **姜桂散**

【方源】《直指》卷五。

【组成】辣桂 川白姜(不炒)各一两 蓬莪术半两

【用法】上为末。每服一钱，温酒调下。

【主治】心中卒痛，腹胁气滞。

64296 **姜桂散**

【方源】《济阴纲目》卷十三。

【组成】肉桂五钱 姜汁三合

【用法】上锉，同煎，服三合。以大火炙手，摩令背热，时时涂药汁尽妙。

【主治】产后咳逆，三日不止，欲死。

64297 **姜桂散**

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】桂心一两半(醋炒黑) 干姜一两半(醋炒黑)

【用法】上为散。每服二钱，荆芥灰一钱，煎汤调下。

【主治】产后血痢，脉紧细者。

【方论选录】产后寒伤肠胃，失其传送输化之职，不能分泌浊阴，故下痢纯乎血少焉。桂心温血分以散寒，干姜暖胃气以散寒，二物炒黑，均能燥湿却水，以定妄渗之血。为散，荆灰汤下，使清浊有分，则小小畅快而无水血夹下之虞，何下痢之不瘳乎。

64298 **姜桂散**

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】肉桂三两(去皮) 生姜一两半。

【用法】上为散，每服三钱，水煎，去滓温服。

【主治】产后呃逆，脉紧细者。

【方论选录】产后胃气虚寒，寒邪直入血分，故气不得下降而呃逆不止焉。肉桂温经暖血以散寒邪，生姜温胃散寒以和逆气。为散，水煎，使胃家温暖，则血分之寒邪外散而气道顺利，升降如常，何呃逆之有哉？

64299 **姜盐汤**

《普济方》卷二〇二。为《圣济总录》卷三十八“返魂汤”之异名。见该条。

64300 **姜盐饮**

《直指》卷十三。为《圣济总录》卷三十八“返魂汤”之异名。见该条。

64301 **姜柴汤**

【方源】《嵩崖尊生》卷十二。

【组成】柴胡一钱 桂枝三分 花粉五分 牡蛎 炮姜 炙草各二分

【用法】水煎服。汗出愈。

【主治】妇入热病经来，寒热如疟，狂妄。

64302 **姜胶膏**

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】鲜姜自然汁一斤 明亮水胶四两

【用法】同熬成稀膏，摊于布上。贴患处，旬日一换。

【主治】肢体受凉疼痛，或有凝寒阻遏血脉，麻木不仁。

【宜用】热肿疼者，断不可用。

64303 **姜粉散**

【方源】《三因》卷十。

【组成】生姜(研汁，控粉) 轻粉

【用法】搜匀。每服二钱匕，长流水调下。齿浮是效，次投猪肚丸。

【主治】消中。多因外伤瘅热，内积忧思，喜

啖碱食及面，致脾胃干燥，饮食倍常，不为肌肤，大便反坚，小便无度。

64304 姜粉散

【方源】《卫生家宝产科备要》卷五。

【组成】当归（洗，去芦须，切，焙） 官桂（去皮，不见火） 人参（去芦，切片） 茯苓（白者，去黑皮） 甘草（炙） 芍药（洗净） 知母（润者，切，炒） 川芎（洗） 大黄（略炒） 黄耆（蜜炙） 木香（不见火） 草豆蔻（去壳） 白术（锉，焙） 诃子（煨熟，去核） 高良姜（锉，炒） 青橘皮（去瓤）各等分 熟干地黄（洗，酒浸，焙）

【用法】上药锉，焙干；次用附子一个结实半两者，炮裂，去皮脐，切；生姜一斤，研取自然汁，于碗器中停留一食久，倾去清汁，取下面粉脚，摊在箬叶中，人焙笼焙干，同众药捣罗为末。才产后，用药末三钱，水一盏，加生姜三片，枣子一个（劈开）同煎至七分，乘热吃。如吃药之后，自然产母睡着，半日以来，睡觉再服，全除却腹痛。一日只可三服，至九服不可服，恐肚中冷。

【功用】荡尽儿枕，除百病源。

64305 姜黄丸

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】姜黄三分 牡丹半两 赤芍药半两 桂心三分 芫花一分（醋拌炒干） 当归半两（锉，微炒） 鳖甲一两（涂醋炙令黄，去裙襕） 琥珀半两 延胡索半两 鬼箭羽半两 木香半两 硇砂半两 凌霄花半两 京三棱三分（微炮，锉） 水蛭一分（炙炒令微黄） 虻虫一分（炒令微黄，去翅足） 川大黄一分（锉碎，微炒） 干漆三分（捣碎，炒令烟出）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸，食前以温酒送下。

【主治】妇人虚冷，血气积聚，心腹妨闷，月候久不通，少思饮食，四肢羸瘦。

64306 姜黄丸

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】姜黄一两 当归一两（锉，微炒） 熟干地黄一两 牡丹一两 厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁炙令香熟） 肉桂一两（去粗皮） 芎䓖一两 续断一两 木香三分 桃仁一两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄） 白术一两 羚羊角屑一分 赤芍药三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】产后虚羸不足，胸中气短，腹内紧急，腰背疼痛，月水不调，烦渴，四肢无力。

64307 姜黄丸

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】缩砂 草豆蔻 荜澄茄 橘皮 青皮 姜黄各一两

【用法】上为细末，水煮面糊为丸，如豌豆大。每服二十丸，生姜汤送下，不拘时候。

【功用】消食和胃。

64308 姜黄丸

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】干姜黄四两 干姜二两

【用法】上为末。每服方寸匕，空心食前酒调下，一日二次。

【主治】妊娠漏胞。

64309 姜黄丸

【方源】《古今医鉴》卷九。

【异名】二味消毒丸（《杏苑》卷三）。

【组成】僵蚕一两 大黄二两

【用法】上为末，姜汁为丸，如弹子大。每服一丸，井水入蜜少许研，徐徐食后呷服。

【主治】头面肿大疼痛并喉痺。

64310 姜黄汤

【方源】《圣济总录》卷十三。

【异名】姜黄散（原书卷八十七）。

【组成】姜黄一两 沉香（锉）三分 黄耆（锉）一两 桂（去粗皮）半两 延胡索 人参 厚朴（去粗皮涂生姜汁炙） 芎䓖 防风（去叉） 芍药各三分 杏仁（汤浸去皮尖双仁，别研） 羌活（去芦头） 诃黎勒（煨去皮）各半两

【用法】上药除杏仁外，为粗末，入杏仁和匀。每服三钱匕，旋汲井华水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风消，四肢无力，胸膈烦闷。

64311　**姜黄汤**

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【异名】姜黄散(《普济方》卷二三九)。

【组成】姜黄一两三分　藿芦(锉)一两　鹤虱(微炒)一两一分

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，又入酒一合，更煎取沸，空心服，晚食热饭。即虫下。一服未尽，更服。

【主治】蛔虫心痛，喜吐水，冲刺痛不可忍，或不能食，面黄腹满。

64312　**姜黄汤**

《圣济总录》卷一五四。为《圣惠》卷七十五“姜黄散”之异名。见该条。

64313　**姜黄汤**

【方源】《名家方选》。

【组成】防风　独活各五分　桂枝　芍药　樱皮　姜黄各三分　甘草一分

【用法】水煎服。

【主治】诸头项痛，引肩背者。

64314　**姜黄汤**

【方源】《伤科方书》。

【组成】桃仁　兰叶　丹皮　姜黄　苏木　当归　陈皮　牛膝　川芎　生地　肉桂　乳香　没药

【用法】水、酒、童便煎服。

【主治】一切跌打。

64315　**姜黄散**

【方源】《圣惠》卷七十五。

【异名】姜黄汤(《圣济总录》卷一五四)。

【组成】姜黄一两　当归一两(锉，微炒)　熟干地黄一两　艾叶一两(微炒)　鹿角胶一两(捣碎，炒令黄燥)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，入生姜半分，大枣三枚，煎至六分，去滓，每于食前温服。

【主治】妊娠胎漏，下血不止，腹痛。

64316　**姜黄散**

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】姜黄三分　牡丹三分　当归三分(锉，微炒)　虻虫一分(炒微黄，去翅足)　没药一分　水蛭一分(炒令黄)　刘寄奴三分　桂心三分　牛膝一两(去心)

【用法】上为细散。每服一钱，食前以温酒调下。

【主治】产后恶血不尽，攻心腹疼痛。

64317　**姜黄散**

【方源】《博济》卷三。

【组成】姜黄二两　大附子一两(炮)　赤芍药半两　芫花一分(醋浸过，炒令黄色)　丹皮一分　红蓝子半两　郁李仁一分(去皮)　荆三棱半两　没药一分　木香一分　柳桂半两(去皮)

【用法】上为末。每服一大钱，如腹痛，用当归、没药酒煎服，水七分，酒三分，同煎及七分，热服。

【主治】血脏久冷，腹疼痛，小便浓白泔。

64318　**姜黄散**

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】姜黄(微炒)　当归(切，焙)各一两　木香　乌药(微炒)各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，煎茱萸醋汤调下。

【主治】心痛不可忍。

64319　**姜黄散**

《圣济总录》卷八十七。为原书卷十三“姜黄汤”之异名。见该条。

64320　**姜黄散**

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】姜黄　丁香　当归(切，焙)　芍药各半两

【用法】上为散。每服二钱匕，温酒调下，不拘时候。经脉欲来先服此药。

【功用】调顺荣气。

【主治】室女月水滞涩。

64321 **姜黄散**

【方源】《圣济总录》卷一五一。

【组成】生姜（切）四两 生地黄（切）八两

【用法】上为散。每服一钱，温酒调下，不拘时候。

【主治】室女经脉虚冷，月水来腹痛。

64322 **姜黄散**

【方源】《圣济总录》卷一五三。

【组成】姜黄 白术各八两 生姜（去皮，细切）三升 当归（切）十两 陈曲末 大麦蘖末各二升 生地黄（细切）三升 桃仁（去皮尖，双仁） 杏仁（去皮尖双仁）各二升 青橘皮（汤浸去白，切）三升

【用法】用木杵臼捣如泥，纳甑中铺匀，以面封之，勿使泄气，蒸熟，并甑置屋下三日，开，出药晒干，为散。每服方寸匕，酒调下，一日二次，取利为度。若炼蜜为丸亦得，每服三十丸，酒送下，一日二次。

【主治】妇人冷癖，血块虚胀，月经不调，瘦弱不能食，面无颜色。

【宜忌】十日内忌生冷难消化物，过十日百无所忌。

64323 **姜黄散**

《圣济总录》卷一六一。为原书卷五十五“姜桂散”之异名。见该条。

64324 **姜黄散**

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】姜黄 当归（切，炒） 蒲黄 桂（去粗皮） 生干地黄（焙）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，空心温酒调下，一日二次。

【主治】产后血气块，疞刺痛。

64325 **姜黄散**

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】姜黄 牡丹皮 牛膝（去苗，酒浸，切，焙） 乌药（锉） 生干地黄（焙）各一两

【用法】上为散。每服三钱匕。温酒调下。

【主治】产后血气血块，攻筑疼痛。

64326 **姜黄散**

【方源】《圣济总录》卷一六一。

【组成】姜黄（切碎，炒干） 蒲黄（微炒） 桂（去粗皮）各一两

【用法】上为散。每服二钱匕，生地黄自然汁调下，日三夜一服。

【主治】产后血块攻冲，心腹痛。

64327 **姜黄散**

【方源】《圣济总录》卷一七四。

【组成】姜黄 槟榔（锉）各等分

【用法】上为散。温酒调下，一二岁儿每服半钱匕，余以意加减。

【主治】小儿心痛。

64328 **姜黄散**

【方源】《普济方》卷六十五引《海上方》。

【组成】姜黄（如无，以川芎代） 细辛 白芷各等分

【用法】上为散。擦三两次，盐汤灌漱。

【主治】诸般牙疼不可忍。

【加减】如蛀牙疼，去姜黄加蝎梢。

【临证举例】牙疼 胡长文给事之父，牙疼不可忍，面肿。偶无姜黄，检《本草》，川芎亦治牙，遂代之。坐间，便见肿消疼止。后用川芎亦验。

64329 **姜黄散**

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】姜黄三分 槟榔半两 干漆（捣碎，炒令烟出）半两 石灰（捣末，炒令黄色）一两

【用法】上为细末。每服二钱，温酒调下，不拘时候。

【主治】九种心痛，发动无时，及虫痛不可忍者。

64330 **姜黄散**

【方源】《妇人良方》卷一引《专治妇人方》。

【组成】川姜黄（成片子者）四两 蓬莪术 红花 桂心 川芎各一两 延胡索 牡丹皮 当归各二两 白芍药三两

【用法】上为细末。每服一钱，水半盏，酒半盏，煎至七分，热服。

【主治】血脏久冷,月水不调,脐腹刺痛。

64331 **姜黄散**

【方源】《妇人良方》卷二十。

【组成】没药一分　川姜黄末三分

【用法】以水、童子小便各一盏,入药煎至一盏半,分作三服,通口服;约行五七里,再进一服即止。

【主治】产后腹疼。

64332 **姜黄散**

《寿亲养老》卷二。为《博济》卷三"神圣香姜散"之异名,见该条。

64333 **姜黄散**

【方源】《活幼口议》卷二十。

【组成】姜黄

【用法】上为末。每服半钱,用红酒调下,连二三服。以通为度。

【主治】小儿血淋。

64334 **姜黄散**

【方源】《普济方》卷二一四。

【组成】姜黄　滑石各二两　木通一两

【用法】上为细末。每服一钱,水一盏,煎七分,温下,一日三次。

【主治】五般淋。

64335 **姜黄散**

《普济方》卷二三九。为《圣济总录》卷五十六"姜黄汤"之异名。见该条。

64336 **姜黄散**

【方源】《普济方》卷二八五。

【组成】干姜一两　大黄一两　生姜一两　皂角刺九个

【用法】用酒一碗,水一碗,同煎至一半,去滓温服。滓用酒、水各一碗,再煎温服。须用瓦器煎。

【主治】内毒。

64337 **姜黄散**

《普济方》卷三四六。即《圣惠》卷八十"赤龙鳞散"。见该条。

64338 **姜黄散**

【方源】《赤水玄珠》卷十二。

【组成】姜黄　甘草　羌活各一两　白术二两

【主治】臂痛,非风、非痰者。

【加减】腰以下痛者,加海桐皮、当归、芍药。

64339 **姜黄散**

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】姜黄八两(醋浸,炒黑)

【用法】上为散。每服三钱,米饮调下。

【主治】产后恶露不尽,脉沉涩者。

【方论选录】《医略六书》:产后污血不尽,新血又虚,故腹痛,胸闷,恶露经久不尽焉。姜黄一味,性能行散血气,醋浸炒黑又能祛血中之湿,以止多郁入污血之漏血也。为散,米饮调下,使污血去尽,则郁结顿开,而新血自生,经脉完复,何患恶露不净,腹痛胸闷不除乎。

64340 **姜豉汤**

【方源】《普济方》卷三九一引《傅氏活婴》。

【组成】黄瓜叶三片　生姜块一块　淡豉十粒

【用法】上研取汁。饮半盏,必吐涎,如不吐,闪癖自然而愈。

【主治】闪癖走疰,胁下疼痛。

64341 **姜豉饼**

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】生姜一两(碎切)　生葱五根　豆豉七钱(润者)　生盐一钱　生蒜七个(碎切)　酰糟一灯盏(无有糟酒代)　穿山甲(汤浸透,取甲,锉碎,同热灰铛内慢火炒令焦黄色)五钱

【用法】石钵内同杵烂,捻作饼子,二寸阔,用微火炒热,带温贴脐上,外以绢帕兜住;如冷,依前法换带温者贴之,或再以火烘暖亦好。先投解表散,后用此药贴之。

【主治】久因湿气中于膀胱,复为风邪客热攻激,小便不利,脐凸腹胀,食减作痛。

64342 **姜梨饮**

【方源】《医钞类编》卷十五。

【组成】大梨一个　生姜一块

【用法】同捣汁。入童便一钟，重汤顿服。

【主治】瘟疫久汗不出。

64343 **姜液膏**

【方源】《直指》卷二十。

【组成】生姜母一块

【用法】用银簪插入即拔出，点眼头尾。

【主治】眼风痒，冷泪，烂眩有虫。

64344 **姜椒丸**

【方源】《普济方》卷二四七。

【组成】蜀椒（去目及合口，炒出汗）一两一分　干姜（炮）　厚朴（去粗皮，涂生姜汁炙）　黄芩（去黑心）　细辛（去苗叶）　芍药　桂（去皮）各一两　桔梗（炒）半两　乌喙（炮裂，去皮脐）一分　柴胡（去苗）　白茯苓（去黑皮）　牡丹皮各一分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，温酒或米饮送下，一日三次。

【主治】七疝诸寒，在脐旁痛，上及胸，中满少气。

64345 **姜椒汤**

【方源】《外台》卷九引《古今录验》。

【组成】生姜　椒（去目、汗）各一两

【用法】以水五升，煮取三升，每服一合。

【主治】咳嗽，及短气胁痛。

64346 **姜椒汤**

【方源】《千金》卷十八。

【组成】姜汁七合　蜀椒三合　半夏三两　桂心　附子　甘草各一两　橘皮　桔梗　茯苓各二两（一方不用甘草）

【用法】上㕮咀，以水九升，煮取二升半，去滓，纳姜汁煮取二升，分三服。服三剂佳。

【主治】胸中积聚痰饮，饮食减少，胃气不足，咳逆呕吐。

【方论选录】《千金方衍义》：川椒、桂、附入子二陈汤中，但加桔梗舟楫之剂，载诸药以破胸中冷积寒痰也。

64347 **姜棕散**

【方源】《妇科玉尺》卷一。

【组成】棕炭一两　炮姜五钱

【用法】上为末。酒煎乌梅汤调下。

【主治】虚寒经病。

64348 **姜酥膏**

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】酥三两　杏仁　阿胶　紫苏子各二两　生姜汁一合　白蜜五合

【用法】相和于银锅内，以慢火熬成膏。每服一茶匙，以温粥饮调下，一日四五次。

【主治】咳嗽喘急，喉中似有物，唾脓血不止。

64349 **姜葱饮**

【方源】《惠直堂方》。

【组成】凤尾草连根一大握　老米一勺　生姜三片　葱白三根（连须）

【用法】上以水三大碗，煎至一碗，去滓，入烧酒一小杯，蜜三茶匙，乘热服一小杯，移时再服一杯，一日服尽为度。

【主治】久近红白痢。

64350 **姜葱膏**

【方源】《梅氏验方新编》卷七。

【组成】生姜一斤（取自然汁）四两　葱汁四两

【用法】共煎成膏，入牛胶少许，麝香一分，摊布上，贴。

【主治】流痰痉痛，不红不肿，皮肉冰冷。

64351 **姜葱熨**

【方源】《简明医彀》卷二。

【组成】生姜　葱（连须叶）各八分（另切，捣细，麻布绞汁并置一处）

【用法】二滓纳入铅粉二两，漆匠用者，研匀，起油锅炒极热，布包着实，顺气揉熨胀处，先隔布，次贴肉重熨，如冷，拌入姜葱汁调匀，少许炒，又熨多次，全畅为度。

【主治】伤寒初起，必有食积，先按患人胸腹略觉胀闷作痛，即是病，时饮食停滞，变成结胸杀人，及诸结胸痞满等证。凡男、妇、老、幼食积气滞，痰凝冷痛，悉效。

64352 **姜粟散**

【方源】《普济方》卷二〇八引《家藏经验

方》。

【组成】罂粟壳(去盖子净洗)　甘草　陈皮(净去瓤)　干姜各等分

【用法】炭火上炒干姜黄色为细末。每服三钱,陈米煎稠饮调下,全在米浓有汁,温服有效。

【主治】暴泻。

64353　**姜蔻散**

【方源】《直指》卷十七。

【组成】人参　川厚朴(制)　草果仁　良姜　诃子(炒)　川白姜(生)　藿香　丁皮　苍术(炒)　真橘红　甘草(炒)各一分　木香　肉豆蔻(炮)　缩砂仁　茯苓各一分半

【用法】上锉散。每服三钱,水煎,食前服。仍以木香、缩砂煎汤,浓调正料参苓白术散佐之。

【主治】胸满腹肿,大泻不止,时或干呕。

64354　**姜蜜汤**

【方源】《千金》卷十八。

【组成】生姜汁五合　白蜜三合　黄连三两

【用法】上以水二升,别煮黄连取一升,去滓,纳姜、蜜,更煎取一升二合,五岁儿平旦空腹服四合,一日二次。

【主治】湿䘌。

【方论选录】方中一寒一热,分解湿热,借蜜引入虫口,湿热之䘌无容身之地矣。

64355　**姜蜜汤**

【方源】《普济方》卷一九六引《百一》。

【组成】蜜半盏　生姜十片

【用法】用新汲水一盏,煎服。逐日常服二次,小便渐白,及出血,黄疸遂愈。

【主治】诸疸,或小便如血。

64356　**姜蜜汤**

【方源】《得效》卷七。

【异名】姜蜜煎(《医略六书》卷二十八)。

【组成】生姜七片　蜜半盏　白茅根一握

【用法】用水同煎服。

【主治】①《得效》:小便出血不止。②《医略六书》:妊娠尿血。

【方论选录】《医略六书》:妊娠冲脉内虚,挟寒邪而憎寒、口燥,经气漏泄,故尿血不止,谓之溺血。白蜜以润经燥,生姜以散经寒,茅根凉血以止血也;姜、茅煎汁,入蜜炼嗆,使经寒外散,则经气完复,而血自归经,何有憎寒口燥,溺血不止之患?胎孕无不自安矣。

64357　**姜蜜汤**

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】生姜汁一二盏(煎沸二三次)　白砂蜜二三盏(炼熟)

【用法】各盛瓷器内。每次用一茶匙姜汁,二茶匙蜜,用沸汤服之。

【主治】①《活人心统》:呕吐恶心。②《医学从众录》:老人上气,喘嗽不得卧。

64358　**姜蜜饮**

【方源】《圣济总录》卷四十七。

【组成】生姜半两(取自然汁)　白蜜一合　糯米半合(淘净细研)

【用法】和匀,入新汲水一盏调开,分二服,不拘时候。

【主治】胃中实热,吐逆心烦,不下食饮。

64359　**姜蜜煎**

【方源】《圣济总录》卷四十六。

【组成】生姜汁一合　蜜一合　生地黄汁一升

【用法】相和,以慢火煎如稀饧。每服半匙,温酒化服,空心、晚食前各一服。

【主治】脾胃气虚弱,不能饮食,肌体黄瘦。

64360　**姜蜜煎**

《医略六书》卷二十八。为《得效》卷七"姜蜜汤"之异名。见该条。

64361　**姜蝎散**

《医方类聚》卷七十八引《瑞竹堂方》。为方出《证类本草》卷二十二引《杜壬方》,名见《三因》卷十六"干蝎散"之异名。见该条。

64362　**姜墨丸**

【方源】《本草纲目》卷七引《肘后》。

【组成】干姜　好墨各五两

【用法】上为末，醋浆和丸，如梧桐子大。每服三四十丸，米饮送下，日夜六七服。

【主治】赤白下痢。

64363 **姜墨煎**

【方源】《圣济总录》卷八十四。

【组成】生姜汁一合　墨（研）一钱　蜜一合

【用法】和匀，细细呷之。

【主治】乳石发动，热盛，或吐血、唾血不定。

64364 **姜橘丸**

【方源】《百一》卷二。

【组成】生姜（洗净，不去皮，切作片子，焙干）　陈皮（去白）各一斤　神曲二两（炒）

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，姜汤熟水任下，不拘时候。

【主治】脾胃不和。

64365 **姜橘丸**

【方源】《百一》卷八。

【组成】生姜一斤（去皮，切作片子，青盐一两淹一宿，焙干）　甘草一两半（炙）　陈皮一两半（去白）　青皮（去瓤）　缩砂仁　木香各三分　蓬莪术一两（醋浸一宿）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，细嚼盐汤送下，不拘时候；或空心含化亦可。

【主治】中酒恶心，心脾痛，吐逆。

64366 **姜橘丸**

【方源】《卫生总微》卷十三。

【组成】好橘皮　生姜末

【用法】以好陈橘皮不拘多少，极陈者尤妙，洗净去白，焙干，为细末，每五两入生姜末三两和匀，炼蜜为丸，如麻子大。每服三四十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】乳哺失宜，脾胃不和。

64367 **姜橘汤**

【方源】《圣济总录》卷二十五。

【异名】姜陈汤（《嵩崖尊生》卷九）。

【组成】生姜（切，焙）　陈橘皮（汤浸去白，焙）各等分

【用法】上药治下筛。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓热服，不拘时候。

【主治】①《圣济总录》：伤寒干呕不止，手足逆冷。②《医统》：老人噎病，胸满塞闷，饮食不下。

64368 **姜橘汤**

【方源】《圣济总录》卷一五四。

【组成】生姜母一两一分　陈橘皮（去白，焙）　青竹茹各半两　前胡（去苗）三分　槟榔（锉）二枚

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妊娠恶阻，呕吐涎痰，不能食。

64369 **姜橘汤**

【方源】《活幼心书》卷下。

【异名】姜橘散（《金鉴》卷五十二）。

【组成】白姜二钱（炮）　陈橘皮（去白）一两　粉草（炙）三钱

【用法】上为末。每服半钱或一钱，用温枣汤调化，空心少与缓服。

【功用】温中定吐。

【主治】①《活幼心书》：脾慢胃冷，呕吐不止。②《金鉴》：小儿寒吐，朝食暮吐，乳食不化，吐出之物不臭不酸，四肢逆冷，面唇色白。

64370 **姜橘汤**

【方源】《简明医彀》卷三。

【组成】橘红四钱　牛姜七钱（略打破，湿纸包，煨，再打碎）　枣一枚　粟米一撮

【用法】水煎，细呷。

【主治】病后或虚弱人一切呕吐，不纳药食。

64371 **姜橘饮**

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】陈皮四两（去白）　生姜二两（去皮）

【用法】上为粗末，用水三碗，煎一碗，去滓，分作二服，当发日五更服。

【主治】①《魏氏家藏方》:疟疾。②《丹台玉案》:呕吐干哕,四肢厥冷。

64372　**姜橘饮**

《医统》卷四十六。即《直指》卷八"星姜饮"。见该条。

64373　**姜橘散**

【方源】《幼幼新书》卷二十九引《庄氏家传》。

【组成】干姜　青橘皮　好腊茶各等分

【用法】上为细末。每服一钱,米饮调下,不拘时候。

【主治】赤白痢。

64374　**姜橘散**

《普济方》卷一九八。即《传信适用法》卷一"十枣汤"。见该条。

64375　**姜橘散**

《金鉴》卷五十二。为《活幼心书》卷下"姜橘汤"之异名。见该条。

64376　**姜糖煎**

【方源】《医统》卷八十七。

【组成】生姜汁五合　沙糖四两

【用法】上和,微火煎一二十沸。每含半匕,渐渐咽之。

【主治】老人上气,咳嗽气急,炽热,饮食不下,食即呕逆,腹内胀满。

64377　**姜魏丸**

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】生姜一斤(去皮,切片,盐腌一宿,焙干)　阿魏一钱(用白面和作饼子,炙黄)　青橘皮(去白,焙)　甘草(炙,锉)　陈橘皮(去白,焙)各二两　当归(切,焙)　白芷　胡椒　蓬莪术(炮,锉)　桂(去粗皮)各一两　丹砂(研,为衣)　木香　丁香各一钱

【用法】除丹砂外,捣罗为末,炼蜜为丸,如樱桃大,丹砂为衣。每服一丸,生姜汤嚼下;妇人空心食前醋汤送下。

【功用】调胃气,化冷痰。

【主治】一切气,并妇人血气。

64378　**姜魏丸**

【方源】《普济方》卷二十一引《朱氏家传方》。

【组成】生姜一斤(去皮,切作片子,盐三两,浸一宿,候干)　阿魏一分(用面一两,醋和为饼,炙黄)　甘草二两(炙)　青橘皮(去白)四两　缩砂仁一百枚　木香一两　干姜二两(炮)　肉桂(去粗皮)　蓬莪术半两(煨香)　当归(洗,焙)半两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每一两作二十丸。每服一丸,空心、食前生姜汤嚼下。

【功用】温胃进食,止腹痛泄痢,消食。

64379　**姜藕饮**

【方源】《圣济总录》卷三十九。

【组成】生藕一两(洗,切)　生姜一分(洗,切)

【用法】研绞取汁。分三服,不拘时候。

【主治】霍乱吐不止,兼渴。

64380　**姜髓煎**

【方源】《圣济总录》卷六十六。

【组成】生姜汁六合　牛髓　油(别炼)各三合　桂(去粗皮)一两　芎䓖　独活(去芦头)　防风(去叉)各三两　秦椒(去目并闭口,炒出汗)三分

【用法】上为散,与姜汁、油、髓等和匀,于微火上煎五七沸,又以酒一升二合和煎,令成煎。每服一匙头,含化,一日三五次。

【主治】肺感风邪,气道凝涩不利,声音嘶嗄。

64381　**姜汁索饼**

【方源】《圣济总录》卷一八九。

【组成】白面　曲末各二合

【用法】上以生姜汁三合,和作索饼,煮熟,以羊肉臛调和,空腹服。

【主治】脾胃气弱,食不消化,羸劣瘦弱。

64382　**姜曲饼子**

【方源】《普济方》卷一六七引《十便良方》。

【组成】生姜二斤(切作片子,以盐二两淹一宿,焙干)　半夏曲一两半　大杏仁三十枚　甘草二两　丁香半两

【用法】上为末，糯米糊丸为小饼子。每以白汤嚼下三五饼。

【主治】冷痰厥逆。

64383 **姜桂饮子**

《普济方》卷一九七。为《伤寒论》"柴胡桂枝干姜汤"之异名。见该条。

64384 **姜艾馄饨子**

【方源】《外台》卷二十五引《张文仲方》。

【组成】干姜（末） 熟艾各等分

【用法】作面馄饨，如酸枣大，煮熟，服四五十枚，一日二次。腹胀者，炙厚朴煮汁服药。

【主治】冷痢。

64385 **姜术二仁汤**

【方源】《医醇剩义》卷四。

【组成】炮姜五分 白术二钱 茯苓三钱 半夏一钱 当归二钱 苡仁八钱（炒） 砂仁一钱 厚朴一钱 木香五分 广皮一钱 生熟谷芽各四钱（煎汤代水）

【功用】扶土渗湿，兼解寒邪。

【主治】脾胀，善哕，四肢烦悗，重不能胜衣，卧不安。

64386 **姜术半夏汤**

【方源】《普济方》卷一三七引《保生回车论》。

【组成】干姜二两（炮） 白术二两 半夏二两（汤浸七次，片切，焙干）

【用法】上锉碎，如麦豆粒大，为散。每服四钱，水一盏半，生姜五片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候，一日三次。

【主治】伤寒呕吐。

64387 **姜石救急散**

【方源】《普济方》卷三二五。

【组成】白姜石一二斤（捣末）

【用法】取上药，用鸡子白和如饧，敷肿上，干易之。

【主治】乳痈，肿如碗大，痛甚。

64388 **姜汁六一丸**

【方源】《济阳纲目》卷三十六。

【组成】滑石六两 甘草二两

【用法】上为末，用生姜自然汁澄清，取白脚，制成小丸，时时服之。

【主治】实火及饮积翻胃。

64389 **姜汁半夏汤**

【方源】《医统》卷十四。

【组成】半夏五钱 生姜自然汁半盏

【用法】水一盏半，同煎至八分，温服。

【主治】胸中似喘不喘，似呕不呕。

64390 **姜芩四物汤**

【方源】《金鉴》卷四十四。

【组成】当归 赤芍 熟地 川芎 姜黄 黄芩 丹皮 延胡索 香附（制）各等分

【用法】水煎服。

【主治】经水先期而至，血涩少，其色赤者，乃热盛滞血。

64391 **姜连木香饮**

【方源】《医级》卷八。

【组成】干姜 黄连 木香 甘草

【用法】水煎服。

【主治】邪伤太阴，腹痛，下利后重，或寒热交结，不得升降者。

64392 **姜附六合汤**

【方源】《医林纂要》卷八。

【组成】四物加干姜二钱 附子一钱

【主治】寒阻经血不行，兼见沉寒症者。

【方义】沉寒之甚，非姜、附不能除，寒甚而经绝不行，可加肉桂。此用桂、附，则须留生地以配之，而后桂、附不至上僭。

64393 **姜附四君汤**

《竹林女科》卷二。为《症因脉治》卷四"姜附四君子汤"之异名。见该条。

64394 **姜附归桂汤**

《医方集解》。为《法律》卷二"附姜归桂汤"之异名。见该条。

64395 **姜附白通汤**

《成方切用》卷六。为《法律》卷二"附姜白通汤"之异名。见该条。

64396 **姜附御寒汤**

【方源】《东垣试效方》卷二。

【组成】干姜(炮)一钱二分　半夏(汤洗)五分　柴胡(去苗)一钱　防风(去芦)半钱　羌活一钱　藁本(去土)八分　人参(去芦)半钱　白葵花五朵(去心萼)　甘草(炙)八分　升麻七分　郁李仁(汤浸,去皮尖)半钱　当归身六分(酒制)　桃仁半钱(汤浸,去皮尖,与郁李仁研如泥,入正药)　黑附子(炮,去皮脐)四钱

【用法】上㕮咀,都作一服。水五大盏,煎至三盏,入黄耆一钱,橘皮五分,草豆蔻一钱,再煎至二盏,再入酒制黄柏三分,酒制黄连三分,枳壳三分,酒地黄二分(此四味锉碎,预一日先用新水多半盏浸一宿),蔓荆子二分(亦预先一日用新水各另浸),将前正药去滓,入此三味,再上火同煎至一盏,去滓,空心热服之,待少时以美膳压之。

【主治】中气不足,遇冬天寒气客于脾胃之间,相引两胁缩急而痛,善嚏,鼻中流浊涕不止,不闻香臭,咳嗽脑痛,上热如火,下寒如冰,头时作阵痛,或暴痛,两目中流火,视物䀮䀮然,或耳鸣耳聋,喜晴明,恶阴寒,夜不得安卧,胸中痰涎,膈咽不通,饮食失味,口中沃沃,牙齿动摇,不能嚼物,腰脐间及尻臀膝足胻冷,阴汗自出,行步失力,风痹麻木,小便数,气短喘喝,少气不足以息,卒遗矢无度。妇人白带,阴户中大痛,上牵心而痛,黧黑失色;男子控睾而痛,牵心腹阴阴而痛,面如赭色,食少,大小便不调,烦心,霍乱,逆气,里急,而腹皮白或黑,下气腹中腹鸣,膝下筋急,及腰背肩胛大痛,此阴盛阳虚之证也。

【宜忌】忌肉汤,宜食肉。

64397　**姜苓术草汤**

【方源】《温热经解》。

【组成】生姜三钱　茯苓三钱　白术三钱　甘草八分

【用法】水煎服。

【主治】寒湿下痢,色纯白者。

64398　**姜苓半夏汤**

【方源】《四圣心源》卷五。

【组成】茯苓三钱　泽泻二钱　甘草二钱　半夏二钱　橘皮三钱　生姜三钱

【用法】煎大半杯,温服。

【主治】痰饮咳喘。

64399　**姜苓阿胶汤**

【方源】《四圣心源》卷十。

【组成】丹皮三钱　甘草二钱　桂枝三钱　茯苓三钱　干姜三钱　丹参三钱　首乌三钱　阿胶三钱

【用法】水煎大半杯,温服。

【主治】经水后期。

64400　**姜苓桂枝汤**

【方源】《四圣心源》卷六。

【组成】桂枝三钱　芍药三钱　甘草二钱　茯苓三钱　干姜三钱

【用法】水煎大半杯,温服。

【主治】脾肝下陷,痛在少腹者。

64401　**姜枣竹叶汤**

【方源】《医略六书》卷三十。

【组成】竹叶一钱半　人参一钱半　麦冬三钱(去心)　浮小麦一钱半　炙草一钱半　生姜二片　大枣三枚

【用法】水煎,去滓温服。

【主治】产后胃虚挟热,心肺受病,心烦浮热,自汗短气不休,脉数浮短者。

【方论选录】竹叶清心热以肃金,人参扶元气以生血,麦冬润肺清心,浮麦凉心止汗,炙草缓中益胃,大枣缓中益脾,生姜散浮热以温胃气也。水煎温服,使胃阴充足,则浮热自解,而心肺肃清,元气完复,何心烦自汗浮热短气不痊乎。

64402　**姜栀六君汤**

【方源】《医级》卷八。

【组成】六君子汤加干姜、栀子

【用法】水煎服。

【主治】中虚痰饮,善怒多呕,肝热脾寒。

64403　**姜砂二陈汤**

【方源】《会约》卷八。

【组成】干姜(炒)一二钱　砂仁(炒)七八

分 陈皮(去白) 半夏 茯苓各一钱半 炙甘草七分

【用法】水煎，温服。

【主治】胃寒胀满，或伤生冷，或寒痰滞塞，恶心。

【加减】如气滞不快者，加厚朴；如伤湿者，加苍术；如食滞者，加神曲、麦芽、山楂之属；如宿食宿水在上焦者，宜用此汤探而吐之，或用盐炒红淬水服，探吐最妙。

64404 姜桂二合汤

【方源】《陈素庵妇科补解》卷四。

【组成】平胃散(苍、朴、陈、甘)合佛手散(芎、归)加乌药 枳壳 红花 桂心 炮姜

【功用】临产催生。

【主治】孕妇双胎，一生一死。

【方论选录】下死胎，可用朴消与平胃散，此就一胎而言也。若同时坐草，而胎有一死一生，用朴消则伤生胎，去朴消则死胎不下，治法当以佛手散合平胃散，加肉桂、黑姜、乌药、红花、枳壳则无伤于生胎，而死胎可以随而出矣，不至有胀满难产之患也。

64405 姜桂二陈汤

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】炮姜五分 桂枝五分 橘红一钱 半夏一钱 葶苈子二钱 当归一钱五分 茯苓二钱 白术一钱 苏子一钱五分 杏仁三钱 苡仁一两(煎汤代水)

【主治】肺寒而咳，乃水邪射肺，水冷金寒，咳吐痰沫，胸脘作懑，肌肤凛冽。

64406 姜桂大顺散

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】干姜 肉桂 杏仁 甘草

【用法】水煎服。

【主治】呕吐酸水，脉弦迟者。

64407 姜桂苓参汤

【方源】《四圣心源》卷十。

【组成】甘草二钱 人参三钱 茯苓三钱 干姜三钱 桂枝三钱 丹皮三钱

【用法】煎大半杯，温服。

【功用】木郁土困，胎妊失养而欲堕。

【加减】腹痛，加砂仁、芍药。

64408 姜桂苓砂汤

【方源】《四圣心源》卷十。

【组成】茯苓三钱 甘草二钱 干姜三钱 桂枝三钱 芍药三钱 砂仁一钱

【用法】煎大半杯，入砂仁末，温服。

【主治】饮食不消。

64409 姜橘白术汤

【方源】《济阳纲目》卷二十二。

【组成】白术二钱半 橘皮(去白) 生姜各二钱 半夏(姜汤泡) 茯苓各一钱半 厚朴(姜汁炒)一钱

【用法】上锉。水煎，食前徐徐服。

【主治】胃气不和，下痢兼呕。

【加减】因火逆冲上而呕者，加姜汁炒黄连。

64410 姜附四君子汤

【方源】《症因脉治》卷四。

【异名】姜附四君汤(《竹林女科》卷二)。

【组成】干姜 附子 人参 白术 茯苓 炙甘草

【用法】水煎服。

【主治】①《症因脉治》：寒气霍乱。②《竹林女科》：半产，身热面赤，脉沉而细。

【备考】《竹林女科》本方用量：人参、白术(蜜炙)、茯苓、炙甘草各一钱，干姜(炮)、附子(制熟)各五分。

64411 姜附赤石脂丸

《赤水玄珠》卷十五。为《此事之难》"姜附赤石脂朱砂丹"之异名。见该条。

64412 姜桂六君子汤

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】六君子汤加干姜、肉桂

【用法】水煎服。

【主治】寒气呕吐。

64413 姜汁雪梨百花膏

【方源】《奇方类编》卷上。

【组成】生姜各一两 雪梨

【用法】共捣汁，去滓，加蜜四两，共煎一滚，入瓷瓶内封固，不拘时服。

【功用】滋阴降火。

【主治】肺痿声哑，气急哮喘，久嗽。

【宜忌】忌萝卜。

64414　**姜苓五味细辛汤**

《四圣心源》卷五。为《金匮》"桂苓五味甘草去桂加干姜细辛半夏汤"之异名。见该条。

64415　**姜桂参苓首乌汤**

【方源】《四圣心源》卷八。

【组成】人参三钱　首乌三钱　桂枝三钱　甘草二钱　茯苓三钱　干姜三钱

【用法】煎大半杯，温服。

【主治】目珠塌陷。

64416　**姜附赤石脂朱砂丹**

【方源】《此事难知》。

【异名】朱砂丹(原书同卷)、姜附赤石脂丸(《赤水玄珠》卷十三)。

【组成】附子半两　生干姜半两(不炮)　朱砂一两(另研)　赤石脂一两半(水飞)

【用法】上为细末，酒糊为丸，如黑豆大。每服十五至二三十丸，米饮送下；茯苓汤送下尤妙。

【主治】小便数而不禁，怔忡多忘，魇梦不已，下元虚冷，遗尿，精滑，或阳虚精漏不止，或肾气虚寒，脾泄肾泄。

类

64417　**类从散**

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】白马毛一钱(和椒火烧)　龟甲四钱(醋炙)　鳖甲五钱(醋炙)　牡蛎一两半(火炙)

【用法】上为末。每服一钱，酒调下，一日三次。

【主治】赤白带。

64418　**类圣散**

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】川乌　草乌　苍术　细辛　白芷　薄荷　防风　甘草各五钱

【用法】上为细末。蛋清调涂患处，留顶。

【主治】一切疔疮恶毒，肿痛。

64419　**类倒散**

【方源】《良朋汇集》卷二。

【组成】大黄　滑石各六钱　皂角三钱

【用法】上为末。黄酒送下。如小便不通，大黄三钱，滑石六钱；如大便不通，大黄六钱，滑石三钱。皂角三钱，大小便俱用。

【主治】大小便不通，此前后热结也。

娄

64420　**娄金丸**

【方源】《局方》卷一。

【组成】甘菊(去土)四两　黄耆(去芦头)　藁本(洗)　白僵蚕(去丝嘴，爁)　甘草(爁)　羌活(去苗)　麻黄(去根节)　茯苓(去皮)　芍药　犀角(镑)各二两　白芷(洗)　南星(末，以牛胆汁和作饼，阴干)　细辛(去苗，洗，焙)　人参(去芦)　防风(去芦)　川芎各一两半龙脑(研)　牛黄(研)　麝香(研)　白附子(炮)　天竺黄各一两　白花蛇(酒浸，去皮骨，炙)　天麻(去苗)各三两　生地黄汁五升(入蜜一两，酒二升，酥一两半，慢火熬成膏，放冷)　金箔一百片(为衣)

【用法】上为细末，以地黄汁膏子搜和，每两作五十丸，以金箔为衣。每服一丸，细嚼，温酒下。若中风涎潮不语，昏塞甚者，加至三丸，用薄荷自然汁同温酒共半盏，化药灌之，常服一丸，浓煎人参汤嚼下；薄荷汤亦得。小儿每服皂荚子大，薄荷汤化下。

【主治】诸风神志不定，恍惚去来，舌强语涩，心怔烦闷，口眼㖞僻，手足亸曳；及风虚眩冒，头目昏痛；或旋运僵仆，涎潮搐搦，卒中急风，不省人事；小儿惊风诸痫。

64421　**娄金丸**

【方源】《医方类聚》卷二一七引《仙传济阴方》。

【组成】茴香半钱　香附子半钱　草乌一

个　半夏曲一两　白茯苓半两　细辛半两

【用法】酒糊为丸。每服二十丸，食后酒送下，仍以三五七散补之。

【功用】补肝行风化痰。

【主治】妇人头晕眼花，不得起止，心中欲吐，是肝虚受痰饮所致。

64422　娄金散

【方源】《惠直堂方》卷四。

【组成】犬屎内骨七分(经霜粪更妙，多收，布包，打碎，水淘出骨，洗净，捣烂)　金银花三钱

【用法】水煎服。初起一服即消，已溃即敛。

【主治】痘毒，不问寒热虚实。

送

64423　送子丹

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】生黄耆一两　当归一两(酒洗)　麦冬一两(去心)　熟地五钱(九蒸)　川芎三钱

【用法】水煎服。

【主治】血虚难产。

64424　送胞汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【异名】送胎汤(《辨证录》卷十二)。

【组成】当归二两(酒洗)　川芎五钱　益母草一两　乳香一两(不去油)　没药一两(不去油)　芥穗三钱(炒黑)　麝香五厘(研，另冲)

【用法】水煎服。

【主治】正产胞衣不下，心烦意躁，时欲昏晕。

【方论选录】《辨证录》：此方以当归、川芎补其气血，以荆芥引气血归经，用益母草、乳香等药逐瘀下胎。新血既长，旧血难存，气旺上升，瘀浊自然迅降无留滞之苦也。

64425　送胎汤

《辨证录》卷十二。为《傅青主女科》卷下“送胞汤”之异名。见该条。

逆

64426　逆气丸

《宣明论》(四库本)。即原书千顷堂石印本“导气丸”。见该条。

64427　逆冲饮

【方源】《名家方选》。

【组成】槟榔末二钱　生姜汁五分　童便二合。

【用法】上三味，搅调顿服。

【主治】脚气，气急上冲心欲死。

64428　逆挽汤

【方源】《辨证录》卷七。

【组成】人参一两　茯苓二两　大黄一两　黄连三钱　栀子三钱　甘草三钱

【用法】水煎服。

【主治】腹中大痛，手不可按，一时大泻，饮食下喉即出，完谷不化，势如奔马不可止抑，顷刻之间泻数十次，一日一夜约至百次，死亡呼吸，此肝经风不挟邪而大泻也。

【方论选录】此方用人参以固其脾胃之气，则气不至于骤脱，然最奇在用大黄也。盖此泻乃火留于肠胃，非用大黄迅逐，则火不遽散，水不尽流；然徒用大黄，不用黄连、栀子，则火邪甚炽，盘踞于断涧曲溪，未必骤涸，三味并用则大小河渠无不尽行；益之茯苓以分清浊，且是健脾开胃之药，则上气既坚，自无冲决之患；又佐甘草之和缓以调剂于迟速之间，使人参易于生气，所谓剿抚并用无激而死斗之虞，自然风浪息平，水归故道，平成立奏也。

误

64429　误耗益气汤

【方源】《灵验良方汇编》卷下。

【组成】人参二钱(虚人四钱)　白术二钱　茯苓一钱半　川芎　大腹皮各八分　当归三钱陈皮　厚朴各四分　木通　苏梗　莱菔子各五分　木香(磨)二分

【主治】中气不足微满，或受气作饱，二症

误服耗药，致成膨胀者。

64430　**误消健脾汤**

【方源】《胎产辑萃》卷四。

【组成】人参二钱　白术一钱　茯苓一钱　甘草三分　川芎七分　当归二钱　腹皮四分　陈皮四分　白芍一钱　神曲一钱　砂仁（或胁腹痛，或块痛加）五分

【用法】水煎服。

【主治】产后伤食，误服消耗药多致成胀满。

【加减】如伤冷粉、梨、橘，腹内大痛，加吴茱萸一钱。

诰

64431　**诰敕丸**

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】连翘　附子（炮裂，去皮脐）　桂（去粗皮）　槐荚　白矾（飞，枯）　杜仲（去粗皮，锉，炒）　枳壳（去瓤，麸炒）　黄耆（锉）　当归（切，焙）　藁本（去土）各等分。

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心、食前米饮送下，一日三次。

【主治】痔。

【备考】此方曾有人于诰敕后偶见，屡效，故以为名。

诱

64432　**诱敌出营汤**

【方源】《喉科种福》卷四。

【组成】苏梗一斤　葱白半斤　石菖蒲四两

【用法】煎滚汤倾盆内，令病人坐盆上，以席围之，俾热气熏蒸，逼令汗出。

【功用】散表，开牙关。

【主治】厥证喉，遍体冰冷，足硬如木马，六脉皆无，两目瞪视露睛，牙关紧闭者。

袪

64433　**袪风丸**

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】没药（研）　木鳖子各一两　防风（去叉）半两　乳香（研）一分　血竭（研）半两　乌头（炮裂，去皮脐）一两半　荆芥穗半两　青橘皮（汤浸，去白，焙）一两　五灵脂（研）二两半。

【用法】上九味，除研者外，为细末，再和匀。用醇酒熬成膏，为丸如鸡头子大。每服一丸，热酒送下。

【主治】风，身体疼痛。

64434　**袪风丸**

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】槐牙（焙干）　皂荚牙（焙干）各一斤　苦参三两　防风（去叉）　羌活（去芦头）各一两三分　乌蛇一条（酒炙，去皮骨）　使君子一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心酒送下，夜蜜汤送下。

【主治】一切癣、疥、癞疮。

64435　**袪风丸**

【方源】《宣明论》卷三。

【组成】绿豆粉　川乌头（炮）　草乌头（炮）　天南星　半夏各一两　甘草　川芎　藿香叶　苓苓香　地龙　蝎梢各三钱　白僵蚕（淘米泔浸，去丝）　川姜半两（炮）

【用法】上为末，每一两，用绿豆粉一两，（又一法：用药一两，以白面二两），滴水为丸，如梧桐子大。每服五丸至七丸，细嚼，茶酒送下；食后初服三丸，渐加。

【主治】①《宣明论》：中风偏枯，手足战掉，语言謇涩，筋骨痛。②《儒门事亲》：上下齿痛，由于风热甚者。

64436　**袪风丸**

【方源】《普济方》卷一六五引《卫生家宝》。

【组成】半夏四两（生姜四两一处拌，作饼阴干）　白矾一两（生用）　荆芥四两（去土）　槐角子一两（麸炒黄）　陈皮一两（去白）　朱砂一两（水飞，半入药，半为衣）

【用法】上为细末，用四两，生姜汁面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，生姜汤或皂角

子仁汤送下，临卧服。

【功用】宽中祛痰，搜风理气，和血驻颜，延年益寿。

【主治】痰饮聚于胸膈，满则呕逆，恶心涎漉，一臂麻木，升则头目昏眩，降则腰脚疼痛，深则左瘫右痪，浅则蓦然倒地，因味喜咸酸，饮酒过多，色欲无戒所致者。

64437 祛风丸

【方源】《玉机微义》卷四十引易老方。

【组成】黄耆 枳壳 防风 芍药 甘草 熟地 地骨皮 枸杞子 生地

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】疥癞。

64438 祛风丸

【方源】《御药院方》卷五

【组成】车前子 赤茯苓（去皮） 木香 槟榔各一两 枳壳（麸炒，去瓤） 青皮（去白） 陈皮（去瓤） 半夏（汤洗）各二两 干生姜半两 大黄三两 黑牵牛（生）六两 皂角（烧存性）一两

【用法】上为细末，烧饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸至七十丸，食后生姜汤送下。

【功用】清膈化痰，降气消谷，宣通蕴滞，调顺三焦。

【主治】痰饮。

64439 祛风丸

【方源】《医方类聚》卷二十三引《经验秘方》。

【组成】木香 槟榔 青皮（去瓤） 陈皮（去白） 枳壳（麸炒）各一两 车前子（炒） 防风（去芦头及叉） 天麻（去苗）各半两 半夏一两半（洗七次） 川大黄二两半（去皮，生熟各半） 黑牵牛（头末）四两 干生姜一两 猪牙皂角（烧灰存性）一两

【用法】上为细末，生姜汁稀面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，生姜汤送下。

【功用】去上热，暖下元。

【主治】风痰。

64440 祛风丸

《普济方》卷二九二。即《圣惠》卷六十六“何首乌丸”。见该条。

64441 祛风丸

【方源】《直指附遗》卷四。

【组成】防风（去芦）二两 防己二两 荆芥二两 当归（酒洗）二两 川芎二两 生地黄（酒洗）三两 陈皮（去白） 白术（炒） 桑寄生 薏苡仁各二两 栀子仁一两 牙皂二两 何首乌二两 川乌二个 白芍药（酒炒） 羌活 独活 黄芩（酒炒）各一两半 半夏（便煮） 木瓜 青藤 牛膝（酒洗） 沉香 白豆蔻各二两 木香一两 桂枝一两 光乌（酒浸，去皮）二两

【用法】上为细末，酒打米糊为丸，如梧桐子大。每日五更时用茶清送下七八十丸，少许时再服大补元丸。

【主治】历节风。

64442 祛风丸

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】苦参 当归 白蒺藜 熟地 羌活 独活 灵仙 大胡麻 制首乌 蝉衣 火麻仁 天麻 紫浮萍 黑芝麻

【用法】上为末，白蜜为丸服。

【主治】赤白游风。

64443 祛风丹

《普济方》卷三七四。为《圣惠》卷八十五“宣风丸”之异名。见该条。

64444 祛风散

《圣济总录》卷一〇六。为《证类本草》卷六引《博济》“神效驱风散”之异名。见该条。

64445 祛风散

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】天南星 白矾 草乌头（去皮脐）各等分。

【用法】上为细末。每看肿处，用酒调，鸡翎刷之。如风毒肿甚者，生姜自然汁调刷之。

【主治】风肿。

64446 祛风散

【方源】《圣济总录》卷一五八。

【组成】羌活(去芦头)二两 大黄(湿纸裹煨)半两 芎䓖二两 黄耆(锉)三两 朴消(别研)半两 当归(切,焙)一两半

【用法】上为散,与朴消和匀。每服一钱匕,日午、夜卧用温蜜水调下。微利为效。

【主治】妊娠风热气盛,攻身体生疮,皮肤燥涩,大便结滞。

64447 祛风散

【方源】《永乐大典》卷九八一引《医方妙选》。

【组成】胡黄连半两(取末) 全蝎一分(取细末) 犀角一分(屑,取末) 天竺黄一分(别研) 麻黄一分(去节,为末)

【用法】上为细末。每服半钱,研入麝香一字,乳汁调下。

【主治】胎痫,多啼叫。

64448 祛风散

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】天南星二两(泡) 生姜一两(同南星制) 防风二两 甘草一两

【用法】上为末。每服四钱,加生姜七片,水煎服。取汗;无汗再服。

【主治】风寒头痛,遍身拘急,破伤风,洗头风,牙槽风,肩背痉直,口噤。

64449 祛风散

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】干姜一两(洗净) 铜绿一钱

【用法】上为细末。每用一字,于铜盂内以沸汤浸,澄清洗眼,渐渐闪开眼,放药入眼内,连睑通洗,直至药冷住,闭眼少时方开,洗之半月,赤烂自除。如冷,再烫令热,更洗一次。

【主治】风眼连睑赤烂,隐涩疼痛。

64450 祛风散

【方源】《朱氏集验方》卷九。

【组成】大黄 黄芩 地骨皮 山栀子仁各半两 柴胡 元参 赤芍药 荆芥 薄荷 防风 甘草 桑白皮各二钱半

【用法】上㕮咀。每服三大钱,水一盏半煎。

【主治】一切风热上攻,眼目赤肿羞明。

【加减】赤肿,加生地黄,煎。大小便秘涩,心胸满闷,加枳壳。

64451 祛风散

【方源】《医方类聚》卷二十四引《烟霞圣效方》。

【组成】细辛 苍耳 贯芎 白芷 石膏 当归各等分

【用法】上为末。口噙水,鼻内嗃之半字;服茶调散半钱。

【主治】偏正头疼痛,鼻塞不通。

64452 祛风散

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】大蚕砂五升(筛净,水淘二遍,晒干) 东行蝎虎一条(焙干,白面四斤或五斤伴蚕砂为络索,晒干)

【用法】上为末。每服一二合,食前煎柏叶汤调下,一日三次。

【主治】疠风。

64453 祛风散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】防风(去芦)一两半 南星(生用) 甘草(生用) 半夏(汤煮透,滤,仍锉,焙干) 黄芩各一两

【用法】上㕮咀。每服二钱,水一盏半,加生姜三片,慢火煎七分,不拘时温服。

【主治】①《活幼心书》:卒暴中风,全不能言,口眼㖞斜,惊瘫搐掣,痰实烦躁,神昏有热,睡卧不稳。②《幼科折衷》:惊瘫鹤膝。

64454 祛风散

【方源】《医方类聚》卷二一四引《仙传济阴方》。

【组成】生川乌 白术 白芷各三钱 甘草二钱

【用法】上温酒调,吞下五补丸

【主治】遍身麻痹。

64455 祛风散

【方源】《永乐大典》卷一三八七九引《大方》。

【组成】白附子 白术 白芷 薄荷叶 藁本 防风（去叉） 芎脑 羌活 天麻 山药 细辛 全蝎（去毒）各一两 甘草（爁） 藿香各二钱

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，煎七分，去滓服。

【功用】理气祛风。

【主治】手足肢体麻痹。

64456 祛风散

【方源】《万氏家抄方》卷一。

【组成】郁金二两 大黄四两 白牵牛六两（半生半熟） 防风二两 槟榔四两 皂刺十两

【用法】上为末。空心无灰酒调下。

【主治】疠风风虫。

64457 祛风散

【方源】《古方汇精》卷一。

【组成】虎胫骨一两（炙酥，为末） 没药五钱（为末）

【用法】二味和匀。每服一钱，温酒调服。

【主治】历节风痛，昼夜不止，半身不遂。

64458 祛风散

【方源】《痘疹传心录》卷十八。

【组成】防风 川芎 白芷 黄芩 细辛 甘草 羌活 薄荷 当归

【用法】水煎服。

【主治】真气虚弱，客邪侵袭风府，传于筋骨，天柱骨倒，项软垂下而无力。

64459 祛风散

《鲁府禁方》卷一。为《杨氏家藏方》卷一“牵正散”之异名。见该条。

64460 祛风散

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】防风三钱 荆芥一钱五分 苍术五分 茯苓二钱 炒栀子二钱 枳壳一钱 丹皮一钱 白芥子一钱

【用法】水煎服。

【主治】强壮之人伤风。

64461 祛风散

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】天南星（姜汁炒） 僵蚕（炒） 防风 白芷各三钱

【用法】上为末。每服三钱，童便和好酒送下。

【主治】一切痈疽溃后透风，并诸般跌扑破伤风。

64462 祛风散

【方源】《秘传大麻疯方》。

【组成】人参 茯苓 甘草 僵蚕 羌活 防风 厚朴 藿香 蝉退 麻黄 薄荷 黄柏 独活各等分

【主治】紫霞疯。初起时形如紫霞，遍身如云头样，其点牵长，色在头不露，将火照之，见其细白点。

【加减】咳嗽，加半夏；不咳嗽，加陈皮。

64463 祛风膏

【方源】《普济方》卷五十二。

【组成】滑石 牙子盆消 船上硫黄 乳香各等分 轻粉 脑子 麝香各少许

【用法】上为细末，用酥油和匀。临卧洗之，后涂在面上。无酥油，清油亦佳。

【主治】瘢痕。

64464 祛火丹

【方源】《石室秘录》卷四。

【组成】熟地三两 山茱萸五钱 北五味三钱 麦冬一两 元参一两 沙参一两 丹皮三钱 甘菊花五钱 牛膝三钱 金钗石斛一两 茯苓五钱 泽泻三钱 车前子三钱 草薢二钱

【用法】水煎服。

【主治】因人用热药，立而行房，火聚于脚心而不散，以致脚板中色红如火不可落地，又非痰毒，终岁经年不愈。

【宜忌】忌房事三月。

64465 祛水饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】麻黄（去节） 柴胡各一钱 升麻八分 防风 山楂各三钱 生姜五片

【用法】水煎服。

【功用】发汗。

【主治】腰以上肿，身热气在表。

64466　**祛邪丸**

《活人书》卷十七。为《千金》卷十"恒山丸"之异名。见该条。

64467　**祛邪丹**

【方源】《百一》卷十一。

【组成】黑豆　砒霜一两　生黄丹二两　朱砂。

【用法】五月初四日拣黑豆，冷水浸至端午早，用好砒霜一两，顺手研极细，入生黄丹二两相和，取黑豆去皮，细研成膏子，和药丸时，便分大小丸，用细朱砂为衣。老弱孕妇不可服药者，分十数等丸，大者如梧桐子止。当发日五更初井花水送下一丸。

【主治】疟疾。

【宜忌】忌热物半日，次忌鱼腥、菜油、冷物等，不禁冷水。

64468　**祛邪汤**

【方源】《痘疹仁端录》卷三。

【组成】乌毛一两　升麻　荆芥　木通　防风　紫苏　广荔枝壳　水杨枝

【用法】水煎。徐徐浴。

【功用】解痘秽气。

【备考】《准绳·幼科》：痘本美丽鼎峻，而一对失防，或触于腥血，或感于秽臭，倏忽更变，外宜祛邪汤浴之，内服玉枢、正气丹。

64469　**祛邪饮**

【方源】《圣济总录》卷九十三。

【组成】槟榔(煨)　大黄(锉，炒)各一两　阿魏(研)一钱　丹砂(研)　麝香(研)　秦艽(去苗土)各一分

【用法】上药除麝香丹砂外，细锉如麻豆大，相和令匀，分为五服。每用东南桃柳梢各七枚，各长一握，细锉，青蒿一握，以童子小便一升半，隔夜浸至来日五更鸡鸣时，并药同煎十余沸，倾出，将细绢滤过，分为两服，空腹，相次服之。至明即转下恶物，似头发、马尾、鱼脑，转不止自住。

【主治】传尸劳，气满喘咳，大肠秘涩，羸瘦无力。

【宜忌】宜食软饭粥将息，七日后用劳药补之。

64470　**祛邪散**

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】白矾三两(生研)　黄丹半两

【用法】上为细末，用桑柴于瓦中烧一伏时。每服半钱，以乳香汤调下，不拘时候。

【主治】癫邪恶候。

64471　**祛虫丹**

【方源】《玉案》卷四。

【组成】大虾蟆一只(将砂仁实其腹中，倒挂，当风阴干，炙脆为末)　人参　白术(土炒)　槟榔　使君子肉(炒)各一钱　针砂二钱(醋炒)　胡黄连　山楂　麦芽各一两五钱

【用法】上为末，水为丸。每服二钱，空心白滚汤送下；或为末，用糖调下。

【主治】小儿疳虫，面黄体瘦，肚腹膨胀。

64472　**祛虫散**

【方源】《外科十三方考》。

【异名】胖儿丹。

【组成】石榴根皮(须向东方未出土者，采得时刮去外黄皮)二两　二丑(各取头末)一两　槟榔二两　鹤虱一两　雷丸二两(不见火)　使君子仁(捣碎)五十粒　榧子二两

【用法】上为细末。每用五钱，于五更时酌用白糖开水调服。至中午或黄昏时，其中即从大便而出。隔五天再照服一次，服二次后可断根。

【主治】蛔虫、钩虫、绦虫等肠寄生虫。

64473　**祛伤散**

【方源】《伤科补要》卷三。

【组成】川断一两五钱　全归二两　羌活一两　独活一两　加皮一两五钱　川芎五钱　牛膝一两　肉桂三钱　草乌五钱　细辛四钱　乌药一两　红花五钱　川乌五钱　甘草五钱

【用法】上为细末。热酒冲服。

【功用】通经活络，散寒祛瘀。

【主治】跌打损伤。

64474 **祛劳汤**

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【异名】柴胡散（《普济方》卷二〇〇）。

【组成】柴胡（去苗） 常山（锉） 鳖甲（去裙襕，醋浸，炙） 知母（切，焙） 青蒿（干者） 甘草（炙，锉） 枳壳（去瓤，麸炒） 桂（去粗皮）各一两 木香半两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，入柳枝心七枚，葱白三寸，煎至一盏，去滓，空腹温服。

【主治】①《圣济总录》：劳疟经年不愈，寒热痿瘦。②《普济方》：瘴疟气。

64475 **祛疟丹**

【方源】《活幼心书》卷下。

【异名】黄丹丸（《本草纲目》卷十七）。

【组成】常山二两（细锉） 乌梅（和核薄切）一两 红丹半两

【用法】上药乌梅用屋瓦别焙，常山或晒或焙，仍同乌梅、红丹研为细末，糯米粉煮糊为丸，如麻子仁大。每服三十至五十丸，未发前凉酒空心送下，或隔晚酒下，重则二服，轻则一服。

【主治】疟疾经久不愈。

【宜忌】忌鸡、面、羊、生冷饮食、毒物。

64476 **祛疟丹**

【方源】《医方类聚》卷一二三引《经验秘方》。

【组成】人参 槟榔各一两 茯苓（去皮） 半夏（汤泡七次） 草果各半两 常山三两（酒浸二宿） 良姜 川芎 香白芷各七钱

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温酒送下；如不饮酒者，皂角子二七枚，捶碎熬汤，放令温送下。白日发，晚夕一服，半夜一服，平明一服；夜发，早一服，午时一服，晚夕一服，计一百五十丸。

【主治】烟瘴寒疟。

【宜忌】忌荤腥五七日，切忌鸡肉、湿面，一月方可食；服药之后，一日不许食辛辣之物、湿热、鱼肉。

64477 **祛疟丹**

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】常山（姜汁炒） 草果 槟榔 砂仁 青皮 陈皮 甘草各等分

【用法】上为末，神曲为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心酒送下，或姜汤送下。时疟临疟发时，用吴茱萸七分，辰砂五分为末，酒调。

【主治】久疟胃虚者。

64478 **祛疟饮**

【方源】《准绳·类方》卷一。

【组成】知母（去毛，净，盐酒炒过）五钱 贝母（去心）九分 陈皮（去白） 山楂肉 枳实（去瓤）各一钱 槟榔八分 柴胡（去苗，净）七分 紫苏一钱 甘草（去皮，炙）三分

【用法】用水两钟，煎至一钟，滓亦用水二钟，煎至八分，俱露一宿，临发日天明服头煎，未发前一个时辰服二煎。

【主治】疟疾。

【备考】疟疾三发后可用，因其衰而减之。

64479 **祛疟饮**

【方源】《玉案》卷三。

【组成】白术 苍术 青皮 陈皮 草果各一钱二分 厚朴 槟榔 茯苓 甘草 良姜 半夏各一钱 人参三钱 乌梅三个

【用法】水二钟，加生姜五片，空心服。

【主治】疟经岁月不愈，诸药不效者。

64480 **祛疟散**

【方源】《洪氏集验方》卷一。

【组成】好高良姜（锉碎，微炒） 好川白姜（炮，锉）各等分

【用法】上药各为极细末，勿令偏些，再入乳钵内，一处研匀，细罗过二味。病大者，共抄三大钱，病小者，共三小钱，于当发日日未出时，以豮猪胆二枚，勿用白色者，割开取汁，与药调匀，再用热酒少许打匀，通口猛作口咽，更以酒少许送下，急漱口，以甜物压之，一日不得吃别药。

【主治】疟疾热多寒少，及时行寒热等症。

【组成】射干 山栀子 当归 防己 龙胆 黄芩 芎䓖 黄连 石决明各一两

【用法】上为散。每服一钱，温酒调下；茶调亦可。

【主治】赤眼，及目睛肿痛，不得眠睡。

64491 **祛毒散**

【方源】《古今医鉴》卷十四。

【组成】猪苓 泽泻 白术 赤茯苓 官桂 防风 羌活 牛蒡子（炒） 黄连 柴胡 甘草各等分

【用法】上锉。加生姜、灯草、薄荷，水煎服。

【主治】痘疮作毒，发痈疽。

64492 **祛毒散**

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】白芷 五倍子各一两 花椒 黄丹各五钱 枯矾二钱

【用法】上为细末。干则香油调搽，湿则干掺。

【功用】除毒。

【主治】小儿头疮胎毒等疮。

64493 **祛毒散**

【方源】《洞天奥旨》卷十三。

【组成】白芷一两 生甘草五钱 夏枯草二两 蒲公英一两 紫花地丁一两 白矾三钱

【用法】水煎服。

【主治】蛇咬疮毒。

64494 **祛毒散**

【方源】《外科医镜》。

【组成】白芷五钱 麦冬一两（去心）

【用法】水煎服。滓敷伤处。

【主治】毒蛇咬伤。

【临证举例】邻村丁全龄被毒蛇咬伤，臂肿如股，少刻身胀，黄黑色，势已濒危，照此方煎汤灌之，觉腹中声响，恶水自伤口流出，肿消神清，次日全愈。

64495 **祛毒煎**

【方源】《霉疠新书》。

【组成】车前子 牙茶 黄芩 栀子 连翘 木通 黄连 黄柏

【用法】水煎，温服。

【功用】去轻粉毒。

64496 **祛毒膏**

《普济方》卷四〇六。为《幼幼新书》卷三十五引张焕方"祛毒散"之异名。见该条。

64497 **祛疯酒**

【方源】《经验奇方》。

【组成】大熟地 龙眼肉各二两 全当归 潞党参 炙绵耆 米仁 茯神 甘枸花各五钱 炒白芍 炒冬术 千年健 海风藤 羌活 独活 虎胫骨 钻地风 五加皮 杜仲 忍冬藤 川续断 牛膝各三钱 淡附片 瑶桂心 炙桂枝 虎头蕉 明天麻 川芎 炙甘草各二钱 广木香 红花各一钱五分

【用法】上药用陈绍酒浸瓷瓶，瓷盘作盖，棉纸封口，重汤炖至点三炷香时为度。随量温饮，一日二次。

【主治】一切疯痛，半身不遂。

【宜忌】孕妇忌服。

64498 **祛涎丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】天南星四两 半夏九两半 白附子二两六钱 川乌头七钱半

上并生为细末，用生绢袋盛，以井花水揉洗澄滤，有滓更研，再入袋摆洗尽，瓷盆中日晒夜露，每至晓澄去宿水，别换井花水，搅匀晒，春五日，夏三日，秋七日，冬十日，去水晒干如玉片，方入后诸药：

白花蛇（酒浸，去皮骨，焙干，称）一两 剑背乌梢蛇（酒浸一宿，去皮骨，焙干，称）一两 白僵蚕一两（炒去丝嘴） 全蝎一两（去毒，微炒） 川芎二两 天麻二两

【用法】上为细末，生姜自然汁煮糊为丸，如绿豆大，以飞研细朱砂一两，麝香末二钱为衣，风干，密器中盛之。每服三十丸，食后生姜、薄荷汤送下。

【主治】风痰壅盛，头目昏痛，旋晕欲倒，呕哕恶心，恍惚健忘，神思昏愦，肢体烦疼，颈项

拘急，头面肿痒，手足不举，或时麻痹。

64499 祛涎散

【方源】《便览》卷一。

【组成】白矾二钱

【用法】上生为末，生姜自然汁调服。其痰或吐或化便甦。蜜水、滚水俱可调服，腹中响即开。

【主治】中风，不省人事。

64500 祛热汤

【方源】《圣济总录》卷一六八。

【组成】大黄(锉，炒) 朴消 甘草(炙) 龙齿各一分 枳壳(去瓤，麸炒)一两

【用法】上为粗末。每服半钱匕，以水半盏，煎至三分，去滓放温，时服一分，一日三次。乳母服之亦妙。

【主治】小儿百日以来，结实壮热兼惊。

64501 祛热汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】大黄三钱 黄连 厚朴 桃仁 朴消各二钱

【用法】水煎，不拘时服。

【主治】火结。

64502 祛浮饮

【方源】《医方类聚》卷一二九引《吴氏集验方》。

【组成】川当归一两(洗去土，切) 郁李仁半两 白术一两 陈皮红半两 白茯苓一两 甘草半两(炙) 葶苈子半两(炒) 川木通半两 槟榔半两(鸡心) 益智半两 木香半两

【用法】上㕮咀。每服半两，生姜三片，水一盏半，煎七分，不拘时候，一日三五次。以此下圣灵丸尤良。

【主治】四肢浮肿，将成水气。

64503 祛祟丹

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】鳗鱼一条(重六两) 怀山药三两 芡实一两

【用法】水煮极烂，少加青盐同食。食后不必吃饭，连汤汁饮之。一次之后，隔七日，再照前食之。三次则骨中之虫，无不死者，然后另用起瘵汤。

【主治】痨瘵。

64504 祛黄汤

《仙拈集》卷一。即《外科全生集》“黄疸立效方”。见该条。

64505 祛秽散

《东医宝鉴》卷十一。为《普济方》卷四〇三“辟秽丹”之异名。见该条。

64506 祛厥汤

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】人参五钱 白术一两 甘草二钱 当归五钱 柴胡一钱 附子一分

【用法】水煎服。

【功用】大补正气。

【主治】冬月伤寒，发热而厥，厥后复热，厥多热少，寒多热少，正不胜邪者。

【方论选录】人参、归、术以助其正气，非助其邪热也，正旺则敢与邪战而作热，一战而胜，故寒与厥尽除也。方中加入附子者尤有妙义，参、术之类，未免过于慈神，倘不用附子将军之药，则仁而不勇，难成迅扫之功，加入一分，以助柴胡之力，则无经不达，寒邪闻风而尽散。

64507 祛暑汤

【方源】《玉案》卷二。

【组成】香薷 厚朴(姜汁炒) 白扁豆各一钱(炒) 沉香二钱 川黄连(酒炒) 陈皮 桔梗各一钱二分

【用法】水二钟，加灯心三十茎，煎七分服。

【主治】暑厥，气升不省人事。

64508 祛痢饮

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】当归八钱 白芍八钱(酒炒) 枳实二钱 槟榔二钱 莱菔子三钱(炒，研) 车前子三钱 制军五钱 甘草八分(生，引) 煨广木香一钱五分

【用法】水煎服。一服痢轻，再服痢又轻，三服必愈。无论风寒暑湿之痢服此方，再无变

证。

【主治】初痢实证，腹痛下坠，无寒无热，专痢红白，有里无表。

【加减】如恶心，加广藿香三钱；红多，加酒炒川连五分。

64509 **祛痫饮**

【方源】《证治宝鉴》卷二。

【组成】天竺黄 陈皮 半夏 茯苓 甘草 胆南星 蝉蜕 僵蚕 麻黄 杏仁 天麻 葛根 远志 麦冬 羌活 防风 枳壳 竹沥

【用法】水煎服。

【主治】痫。忽然僵仆，手足劲强，半晌乃苏，俗名羊儿风。

64510 **祛痫散**

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】皂矾（煅红） 鱼鳔（切断，面炒） 铅粉（炒黄）各一两 朱砂三钱

【用法】上为末。每服三钱，空心酒调下。即愈。

【主治】猪羊儿风，时常跌倒，不省人事。

64511 **祛痛丸**

【方源】《医方类聚》卷八十九引《必用全书》

【组成】破故纸（碾细，炒） 黑牵牛（头末）各等分

【用法】先用酽米醋煮蒜瓣熟，研烂入前药三味，搜成剂，为丸如梧桐子大。每服二三十丸，空心淡醋送下；或橘皮汤送下。

【主治】小肠气，膀胱气痛不可忍者；脚气。

64512 **祛痛丸**

【方源】《嵩崖尊生》卷十三。

【组成】当归 熟地 白术 牛膝各一两五钱 川芎 苍术各七钱五分 白芍 茯苓各一两 防风 羌活 独活 南星 天麻 木瓜 防己 虎胫 没药各五分 乳香二钱半

【用法】酒糊丸服。

【主治】女人两足痛。

64513 **祛痛汤**

【方源】《医方简义》卷六。

【组成】当归四钱 川芎二钱 天仙藤一钱 杜仲三钱（炒） 炒川断二钱 生沙苑子三钱 延胡三钱 肉桂五分 小茴四分（炒）

【用法】水煎，入酒少许冲服。

【主治】腰痛，小腹痛，不论虚实皆治。

【加减】如小腹痛甚者，必瘀多，加青皮一钱，炒桃仁一钱，韭白一握，水煎服。

64514 **祛痛散**

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】皂荚子（不蛀者）一枚（麸二升同炒麸焦黑，去麸） 薄荷（干者）三两（锉）

【用法】上为散。每服二钱匕，米饮调下，空心服。

【主治】痔疾疼痛不可忍，及肠风下血。

64515 **祛痛散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十一。

【组成】细辛（去叶土） 鸡肠草 旱莲子 茴香 白矾 诃子（煨，去核） 晚蚕砂 青盐 皂角 茜根 麻枫各一两

【用法】上锉，入一大瓶内，盐泥厚固济，于瓶口留一窍子出烟，用炭半秤煅，候青白烟出去火，候冷取药，细研如粉，揩牙如常法。

【主治】元脏气虚，风热内攻，牙龈浮肿，疼痛发歇。

64516 **祛痛散**

【方源】《普济方》卷六十六。

【组成】细辛（去叶土） 鸡肠草 旱莲子

【用法】上为极细末。每服用一字，以鸡毛蘸药扫患处，日用一二次。若小儿走马疳，唇龈蚀烂者，先泡青盐汤净后，用新绵拭干掺药。

【主治】元脏气虚，风热内攻，牙龈浮肿，疼痛发歇。

64517 **祛痛散**

【方源】《胎产秘书》卷下。

【组成】当归二钱 人参 白术各一钱 黄耆 川膝 独活各八分 肉桂五分 韭白

一撮　生姜一片

【用法】水煎服。

【主治】产后遍身疼痛及腰、小腹痛。

64518　**祛痛散**

【方源】《外科医镜》。

【组成】地榆(研细末)

【用法】用麻油调敷伤处;若遇已破,即以干末掺上。

【主治】汤火灼伤。

64519　**祛痛膏**

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】防风　羌活　藁本　细辛　菊花各五分　南星　草乌　白芷各一钱　(一方加菊花、独活各一钱五分,草乌一钱,麝香一分)

【用法】上为细末,用连须葱一把洗净,同前药捣成膏,铜锅顿热,量痛大小,以油纸摊药贴痛处,周围以生面糊封之,再用干帕包定,其痛即止。

【主治】半边头痛。

64520　**祛湿汤**

【方源】《玉案》卷五。

【组成】泽泻　黄柏　白茯苓　木通各一钱　防己　苍术　杜仲　破故纸各一钱六分

【用法】加生姜三片,水煎服。

【主治】湿热腰痛,重坠如带数千钱者。

64521　**祛湿散**

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】蚕砂四两　薄荷半两

【用法】上为末。生油调搽之,湿者干掺之。

【主治】干湿癣。

64522　**祛湿散**

《赵炳南临床经验集》。为原书"祛湿药粉"之异名。见该条。

64523　**祛湿散**

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】黄柏末30克　白芷末30克　轻粉30克　煅石膏60克　冰片6克

【用法】先将轻粉、冰片研细,然后与其他药末研细极匀。用药膏调,搽于疮面;渗水多时亦可撒于疮面。

【功用】祛湿止痒。

【主治】皮肤病。

【备考】本方常与其他药膏混合后用,如五石膏、玉黄膏、湿毒膏等同用。

64524　**祛湿膏**

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】祛湿散460克　玉黄膏1560克

【用法】调和成膏。薄涂皮损上。

【功用】润肤止痒。

【主治】脂溢性皮炎,神经性皮炎初起。

64525　**祛温汤**

【方源】《玉案》卷二。

【组成】苍术　黄柏　赤茯苓　牛膝　木瓜　木通　槟榔　甘草　黄连　乌药　防己各三钱

【用法】水煎空心服。

【主治】脚气,热气留于肌肉之中。

【备考】热气留于肌肉之中,宜急治之,少缓其气上行,至心即死。

64526　**祛寒汤**

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】青橘皮二两(不去白)　陈橘皮二两半(不去白)　丁香皮　甘草(炙)　干姜(炮)各一两

【用法】上为细末。如觉身热头痛,即抄药一钱,沸汤点下,不拘时候。

【功用】祛逐寒邪。

【主治】伤寒,时行瘟疫。

64527　**祛寒汤**

【方源】《医学集成》卷二。

【组成】焦术五钱　肉桂三钱　吴萸二钱　丁香一钱

【用法】水煎服。

【主治】厥逆腹痛,筋青囊缩。

64528　**祛寒膏**

【方源】《中医方剂临床手册》。

【组成】肉桂　白胡椒　细辛　干姜　公

丁香 生川乌 生草乌 甘松

【用法】上为细末，用蜂蜜调成膏剂，摊布上。敷患处。

【功用】祛寒止痛。

【主治】风湿性关节炎。

64529 **祛痰丸**

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】天南星（生） 半夏（生） 赤茯苓（去黑皮） 干姜（炮） 陈橘皮（汤浸去白，焙）各等分

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至四十丸，温米饮送下，不拘时候。

【主治】风头旋，痰逆恶心，咽膈不利。

64530 **祛痰丸**

【方源】《瑞竹堂经验方·补遗》。

【组成】木香 天麻各一两 槐角子七钱半 人参（去芦） 半夏七钱半 茯苓（去皮） 青皮（去瓤） 白术（煨）各一两 陈皮（去白） 牙皂角（去皮弦，酥炙）七钱

【用法】上为细末，生姜自然汁打糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，食后、临卧温酒送下；姜汤亦可。

【主治】风痰喘嗽。

64531 **祛痰丸**

【方源】《医统》卷十。

【组成】防风 天麻 白僵蚕 白附子（炮）各一两 全蝎（炒，去足） 木香五钱 朱砂 猪牙皂角一两（炒） 白矾五钱 半夏（汤泡七次，研为末，称六两作二分，一分生姜汁作面，一分皂角洗浆作面） 南星三两（一半水泡白矾浸，一半皂角浆浸一宿）

【用法】上为末，姜汁糊丸，如梧桐子大。每服七十丸，食远姜汤送下。

【主治】诸痫风证。

64532 **祛痰丸**

【方源】《医方类聚》卷二十三引《医林方》。

【组成】半夏四两 生姜四两（一处和匀，捏作饼，阴干） 白矾一两（生） 荆芥穗（去土，称）四两 槐角子一两（面炒黄） 陈皮一两（温水浸一宿，去白） 朱砂一两（水飞，一半入药，一半为衣）

【用法】上为细末，生姜汁面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，生姜、皂子仁汤送下，早晨、临卧各一服。中风三年，服月余痊可；五年以里，百日痊可。

【功用】宽中祛痰，搜风，理气和血，驻颜延寿。

【主治】痰饮聚于胸膈，满则呕逆恶心，流则一臂大痛，升则头面昏眩，降则腰脚疼痛，深则左瘫右痪，浅则蹶然倒地。

【宜忌】大忌驴、马、猪、狗肉、湿面、蘑菇、桑蛾、芋头、黄头、黄瓜、茄子发病之物。

64533 **祛痰丸**

【方源】《医部全录》卷二四五。

【组成】半夏一两 白术七钱 茯苓六钱 黄芩 陈皮（留白） 桔梗 枳壳 石膏（煅）各半两 僵蚕（炒）二钱半 五味子一钱半

【用法】上用神曲糊丸，每服二十丸，姜汤送下，先与三拗汤加黄芩、白术二贴，夜与小胃丹十丸，以搅其痰。

【主治】疟后痰嗽，时时发热，痰稠如黄胶者。

【临证举例】疟痰 一男子五十岁，旧年因暑月入冷水作劳患疟，后得痰嗽，次年夏末得弦脉面左手虚，叩之必汗少而有痰，身时时发热，痰如稠黄胶，与上方，仍灸大椎、风门、肺俞五处。

64534 **祛痰丸**

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十五。

【组成】姜制皂角 半夏各一两 大黄（酒浸，纸包煨，再浸煨三次）二两 橘红 桔梗 天麻各五钱 片芩七钱 薄荷三钱 青礞石 白芷 甘草各一钱

【用法】蒸饼为丸。临卧茶送下。

【主治】头风。

64535 **祛瘴散**

【方源】《准绳·疡医》卷二。

【组成】苦花子(又名苦花椒)

【用法】擂水服。夏月冷服,冬月温服。

【主治】疔疮,瘴毒,蛇伤,热腹痛,热喉风。

64536 **祛癫汤**

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】人参五钱 白术一两 肉桂一钱 干姜一钱 白芥子五钱 甘草五分 菖蒲五分 半夏三钱 陈皮一钱

【用法】水煎服。

【功用】《古今名方》:益脾健胃,温中散寒,化痰祛癫。

【主治】癫症。

【方论选录】用人参、白术专补脾胃,用桂、姜以祛寒邪,用白芥子、半夏以消顽痰,用甘草、菖蒲以引入心而开窍,自然正气回而邪痰散。

64537 **祛风大丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】芎䓖 赤芍药 防风(去芦) 白僵蚕(直者,炒去丝) 天麻 麻黄(去节) 朱砂(研,水飞) 石膏各一两 龙齿(煅,别研) 白花蛇(好酒浸,取肉) 甘草各半两 川大黄二钱 蝎梢(炙) 麝香各三钱(别研)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每两作五丸。每服一丸,用生姜自然汁化开,却用温汤浸,食后服,一日二次。

【主治】一切风痰,手足麻痹,语言蹇涩,痰涎壅盛,头目眩晕,耳鸣松悸,举动艰难,口眼㖞斜,半身不遂,牙关紧急,不省人事等。

【宜忌】忌食酒、面、鸡、鱼、一切海鲜。

64538 **祛风药酒**

【方源】《古今医鉴》卷二。

【组成】防风(去芦) 荆芥穗 苍术(米泔浸) 麻黄(不去节) 细辛 天麻 白芷 川芎 当归 半夏(制) 茯苓 僵蚕 川乌(童便浸) 草乌 洛阳花 白花蛇各等分

【用法】上为细末,每药三钱,用小黄米烧酒一斤,大枣三枚,蜜五钱,同入瓶内,上盖盏,和面封固,麻绳扎左右上下,入锅悬起,重汤煮一炷香,半冷定取出。每服一小盏,随疾之上下,以定食前食后。刻日取效,不可轻忽。

【主治】诸风瘫痪,肿痛顽麻者。

64539 **祛风药酒**

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】生地 当归 枸杞 丹参各一两 熟地一两五钱 茯神 地骨皮 丹皮 川芎 白芍 女贞子各五钱 米仁 杜仲 秦艽 续断各七钱五分 牛膝四钱 桂枝二钱五分 龙眼肉四两

【用法】黄酒二斗,绢袋盛药,浸七日随用。

【主治】痛风。

64540 **祛疟饼子**

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】砒二钱半(别研细,放露下三宿) 白茯苓(去皮) 绿豆粉 石菖蒲 甘草(四味并生用)各一两

【用法】上为细末,研匀,煮面糊为丸,作一百二十饼子,每饼子用竹刀切十字,不可切断,晒干。每服一饼子,先用冷茶清半盏,浸饼子在内,临卧时调匀服。

【主治】久新疟疾,不问先寒后热,先热后寒。

64541 **祛湿软膏**

《中医皮肤病学简编》。为《赵炳南临床经验集》"祛湿药膏"之异名。见该条。

64542 **祛湿药油**

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】苦参四两 薄荷三两 白芷三两 防风三两 芥穗四两 连翘四两 白鲜皮五两 鹤虱草三两 大黄三两 苍术三两 威灵仙四两 大枫子(碎)十两 五倍子(碎)五两 香油二十斤

【用法】将群药放香油内一昼夜后,文火炸黄焦,过滤,每斤油加青黛面五分。调药粉外敷,或涂油后外撒药粉,也可做清洁剂。

【功用】除湿润肤。

【主治】急性湿疹(风湿疡),接触性皮炎。

【宜忌】慎勿入目、入口。

64543 **祛湿药粉**

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【异名】祛湿散。

【组成】川黄连八钱 川黄柏八两 黄芩四两八钱 槟榔三两二钱

【用法】直接撒扑，或用植物油调敷，或配制软膏用。一般丘疹样或有少量渗出液的皮损，可以直接撒扑或用鲜芦荟蘸药外搽，流水多或脓汁多者可用油调外用，暗红干燥脱皮者可用药粉配成软膏。

【功用】清热解毒，除湿止痒。

【主治】急性湿疹，接触性皮炎，脓疱疮，婴儿湿疹。

【宜忌】阴疮禁用。

64544 **祛湿药膏**

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【异名】祛湿软膏（《中医皮肤病学简编》）。

【组成】苦参四两 薄荷三两 白芷三两 防风二两 芥穗四两 连翘四两 苍术三两 大黄三两 鹤虱草三两 威灵仙四两 白鲜皮五两 五倍子五两 大枫子十两 青黛面六钱 白蜡一百二十两 香油（或豆油）二十斤

【用法】先把群药碾碎，放入油内浸泡一昼夜，后用文火炸至焦黄，过滤去滓，离火（青黛除外）称其重量，趁热兑入白蜡。春、秋季节每斤药油兑蜡四两，冬季兑蜡三两，夏季兑蜡五两。青黛后下，每斤药油兑五分，搅拌均匀冷却成膏。

【功用】清热除湿，润肤去痂。

【主治】①《赵炳南临床经验集》：单纯糠疹，鱼鳞癣以及皮肤干燥脱屑皮损。②《中医皮肤病学简编》：神经性皮炎。

64545 **祛湿痰汤**

【方源】《杂病源流犀烛》卷十六。

【组成】茯苓 胆星 半夏 羌活 独活 当归 黄芩 白术 苍术 陈皮 薄荷 甘草 香附 防己 威灵仙

【主治】痰涎流注肌肉间，时作痠痛。

64546 **祛痰火丸**

《医学入门》卷七。为方出《丹溪心法》卷三，名见《医学正传》卷三"软石膏丸"之异名。见该条。

64547 **祛风一醉散**

【方源】《准绳·类方》卷五。

【组成】朱砂（水飞）半两 曼陀罗花二钱半 （一方加乳香二钱）

【用法】上为细末。每服二钱，温酒调下。若醉便卧，勿令惊觉为佳。有痰者先服胜金丸。

【主治】阳厥气逆，多怒而狂。

64548 **祛风化痰丸**

《普济方》卷一六四。为《瑞竹堂方》卷二"宽中祛痰丸"之异名。见该条。

64549 **祛风匀气饮**

《幼幼集成》卷五。为《片玉痘疹》卷七"祛风匀气散"之异名。

64550 **祛风匀气散**

【方源】《片玉痘疹》卷七。

【异名】祛风匀气饮（《幼幼集成》卷五）。

【组成】川芎 当归身 赤芍 麦冬 人参 防风 青皮 官桂 木香 荆芥穗 甘草

【用法】水煎，不拘时服。

【功用】行气补血。

【主治】①《片玉痘疹》：痘出密而重。②《幼幼集成》：痘出如蚕壳，如蛇皮，由气至而血不随。

64551 **祛风四物汤**

【方源】《陈素庵妇科补解》卷三。

【组成】荆芥 防风 川芎 羌活 柴胡 白芷 甘草 蔓荆子 当归 白芍 天冬 甘菊 香附 黄耆 陈皮 苍耳子 黄连 茶叶

【主治】妊娠肝脏蕴热，风充入脑，头旋目晕，忽然视物不明，腮颈项发肿结核。

【宜忌】病愈后一切炙煿、酒、面、辛热及毒物、鲜味、烦劳皆忌。如不守禁，两目必至失明。

【方论选录】是方荆芥、防、羌、芷、芎、蔓、苍、柴以分各经之风热，而蔓、荆、苍耳上达巅顶以止头旋，荆芥、白芷散行两颊以清风肿核，归、芍、冬、草以清热养血，菊、连明目祛障，附、陈利膈顺气兼散肝郁，香、防则引诸药通行十二经以疏风而固表，茶叶苦寒为使，通心降火头旋目眩自止，急则治标，缓则治本矣。

64552　**祛风白芷散**

【方源】《准绳·疡医》卷三。

【组成】白芷三钱　黄连　黄柏　黄丹各二钱　茯苓一钱五分　轻粉一钱

【用法】上为细末，用油调搽癣疮上。或加孩儿茶二钱，麝香二分亦可。

【主治】面上风癣疮。

64553　**祛风地黄丸**

【方源】《金鉴》卷六十八。

【组成】生地　熟地各四两　白蒺藜　川牛膝(酒洗)各三两　知母　黄柏　枸杞子各二两　菟丝子(酒制)　独活各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，黄酒送下，夏月淡盐汤送下。

【主治】鹅掌风。无故掌心燥痒起皮，甚则枯裂微痛。又名掌心风。

64554　**祛风至宝丹**

【方源】《杂类名方》。

【异名】祛风至宝膏(《法律》卷三)。

【组成】防风一两半　石膏一两　川芎二两半　滑石三两　当归二两半　芍药一两半　甘草二两　大黄半两　白术一两三钱　连翘半两　荆芥穗五钱　薄荷叶半两　麻黄半两(去根不去节)　山栀子六钱　黄芩一两　芒消半两　桔梗　熟地黄　天麻　人参　羌活　独活各一两　黄连　黄柏　细辛各半两　全蝎五钱

【用法】上为极细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，临卧细嚼，茶、酒任下。

【功用】《古今医鉴》：发表攻里。

【主治】诸风热等证。

【备考】《古今医鉴》有朱砂。

64555　**祛风至宝丹**

【方源】《回春》卷四。

【组成】防风　薄荷　荆芥　羌活　独活　连翘　黄芩　黄柏　黄连　栀子　全蝎　天麻　细辛　枳实　桔梗　大黄　芒消　生地　石膏　甘草各一两　盐梅五十个(去核)　干葛　赤芍　细茶各一两半　麻黄三钱(临症详审或用或不用)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大，朱砂为衣。每服二丸，细嚼，临卧时茶、酒任下，不拘时候。

【功用】祛风清热。

【主治】癫痫属风热者。

【加减】血虚，加川芎、当归各一两；气虚，加参、术各一两。

64556　**祛风至宝汤**

【方源】《金鉴》卷三十九。

【组成】防风通圣散加全蝎　天麻　细辛　白附　羌活　独活　黄柏　黄连　僵蚕

【主治】中风热。不论经络脏腑，风邪中府热之人，六脉浮数，身热心烦。

64557　**祛风至宝膏**

《法律》卷三。为《杂类名方》“祛风至宝丹”之异名。见该条。

64558　**祛风导痰汤**

【方源】《杏苑》卷三。

【组成】防风(去芦)　南星(牛胆制)　枳实　茯苓(去皮)　羌活各一钱　白术(土炒)　半夏各一钱五分　甘草(炙)五分　橘皮(去白)一钱五分　生姜五片

【用法】上㕮咀。用水煎好，滤清，入竹沥二蛤壳，生姜汁一蛤壳，食远服。

【主治】中风，半身不遂，四肢无力，痰涎壅盛；也治风与痰在上焦，一臂不随时，复转移一臂，其脉沉细。

【加减】若气弱之人，加人参、白术佐之。

【备考】《张氏医通》有乌梅肉，无羌活。

64559　**祛风导痰汤**

【方源】《中医妇科治疗学》。

【组成】法半夏三钱 陈皮 胆星各二钱 钩藤 茯苓各三钱 桂枝 葛根各二钱 甘草一钱 荆竹沥二十滴

【用法】水煎，温服。

【功用】祛风化痰。

【主治】子痫。风寒夹痰，妊娠数月，肢体常痛，有时面浮肢肿，憎恶风寒，头痛胸闷，忽然呕恶，昏闷不识人，喉间痰鸣，舌淡，苔白而润，脉浮滑而紧。

64560 祛风抑火汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】防风 荆芥 薄荷 白芷各一钱五分 升麻八分 黄芩 黄连各二钱 甘草五分

【用法】加葱头二枚，水煎，食后温服。

【主治】齿缝胀肿作痛。

64561 祛风羌活汤

《丹溪心法附余》卷二十二。为《直指小儿》卷一"祛风羌活散"之异名。见该条。

64562 祛风羌活散

【方源】《直指小儿》卷一。

【异名】羌活散（《朱氏集验方》卷十一）、祛风羌活汤（《丹溪心法附余》卷二十二）。

【组成】羌活 粉草 天麻（生） 茯苓 川芎各二钱 荆芥穗 白僵蚕（炒） 白术 白附子（炮）各一钱 桔梗二钱半 防风一钱半 全蝎（去皮，炒）半钱 朱砂五分 天南星一字（炮熟）

【用法】上为末。薄荷汤调下。

【功用】败风邪，止惊搐，退肌热。

【主治】小儿惊热。

64563 祛风牢牙散

【方源】《普济方》卷七十。

【组成】防风 川芎 白蒺藜 石膏 沉香 青盐 香白芷 细辛 甘松 三柰 香附子 荆芥穗 升麻 旱莲草 荷叶灰 没石子 胆矾各二钱半

【用法】上为细末。每用揩牙。

【功用】牢牙。

【主治】牙齿脱落。

64564 祛风坠涎丸

【方源】《御药院方》卷十一。

【组成】荆芥穗 密陀僧 白矾（生）各半两 半夏一两（汤洗） 朱砂一钱（为衣）

【用法】上为细末，水糊为丸，如黍米大，朱砂为衣。每服二十丸，乳后荆芥汤送下。

【主治】小儿诸痫。

64565 祛风明目散

【方源】《种痘新书》卷九。

【组成】防风 荆芥 川芎 薄荷 生地 红花 连翘 白芍 菊花 蒙花 谷精 覆盆 蔓荆 川椒

【用法】加生姜为引，水煎，发时连服数剂，可以除根。

【主治】痘后风眼，弦红作痒，下泪者。

64566 祛风败毒散

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】枳实 赤芍 前胡 柴胡各五分 荆芥 薄荷 牛蒡子 独活 苍术各六分 僵蚕 连翘各七分 川芎 羌活各八分 蝉蜕 甘草各三分

【用法】上锉一剂，加生姜三片，水煎服。

【主治】风疮疥癣，瘾疹，紫白癜风、赤游风，血风臁疮丹瘤，及破伤风。

【加减】在上部者，加桔梗一钱；在下部者，加木瓜、牛膝各一钱；如湿气成患而在下，去蝉蜕、僵蚕。

64567 祛风定志汤

【方源】《杏苑》卷三。

【组成】防风 酸枣仁 人参 当归各八分 远志一钱二分 石菖蒲 橘红各一钱 南星 茯神各七分 独活六分 甘草四分 生姜三片

【用法】上㕮咀，用水煎熟，食后温服。

【主治】中风，心血衰少，惊悸不能言。

64568 祛风定痛汤

【方源】《傅青主女科》卷下。

【组成】川芎一钱　当归三钱　独活　防风　肉桂　荆芥各五分(炒黑)　茯苓一钱　地黄二钱　大枣二枚

【用法】水煎服。

【主治】产后起居太早,产门感风作痛,衣被难近身体。

64569　祛风定痛散

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】防风　川芎　白蒺藜　石膏　沉香　青盐　白芷　香附子　细辛　没石子　甘松　三柰　薄荷叶　旱莲子各二钱半　胆矾二钱

【用法】上为末。早晨临卧擦牙患处,少时出涎,用盐汤漱吐之。

【主治】牙痛。

64570　祛风牵正汤

【方源】《常见病辨证治疗》。

【组成】当归　川芎各 9 克　赤芍 15 克　羌活 9 克　荆芥 9 克　白附子 12 克　全虫　僵蚕　白芷　薄荷　菊花各 9 克　甘草 6 克

【功用】祛风通络,益气活血。

【主治】面神经麻痹发病初起。

【加减】若发病日久,或气血较虚而身体弱者,加黄耆 30 克。

【方论选录】方中当归、川芎、赤芍活血;白附子、荆芥,性味辛散,善治头面之风;薄荷、菊花轻而走上,疏风清热;全虫、僵蚕、羌活、白芷通经活络,祛风消肿;甘草益气清热,调和诸药,共奏祛风通络,益气活血之功效。

64571　祛风保安丸

【方源】《保婴撮要》卷三。

【组成】川乌(去皮尖)二钱半(生用)　五灵脂半两

【用法】上为末,猪心血为丸,如梧桐子大。每服一二丸,姜汤化下。

【主治】诸风久远者。

64572　祛风保安丹

【方源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】乌蛇(酒浸,去皮骨取肉,焙干)半两　附子(炮,去皮脐)五钱　赤箭天麻(去苗)　朱砂(别研,为衣)各三钱半　白附子(炮)　防风(去芦头)　没药(别研)　白术　细辛(去叶土)　羌活(去芦头)　独活(去芦头)　黄耆(生用)　白僵蚕(炒去丝嘴)　藁本(去土)　香白芷　五灵脂(微炒,别入)　赤芍药　乌药　川乌头(炮,去皮脐尖)　当归(洗)各三钱　木香　全蝎(去毒,微炒)　川芎　干姜　乳香(别研)　石莲肉(去心)各二钱半　麝香(别研)一钱半

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每一两作十五丸,朱砂为衣。每服一丸,细嚼,茶、酒任下;金银薄荷汤或豆淋酒亦得。

【主治】中风左瘫右痪,一切风气攻注,荣卫凝滞,筋骨疼痛,手足拘挛,口眼不正,肢体偏废。

64573　祛风顺气丸

【方源】《医方类聚》卷二十三引《经验秘方》。

【组成】木香　槟榔　川芎　天麻　陈皮(去瓤)　半夏　青皮(去瓤)　车前子　干生姜　防风(去芦)　猪牙皂角各一两　大黄四两　牵牛头末八两

【用法】上为细末,煮陈米饮为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,茶清、温酒、温水任下,临卧服。

【功用】祛风顺气。

【主治】口眼㖞斜,半身不遂,及酒食所伤等病。

【加减】夏月,加青皮一倍;秋,加车前子、川芎一倍。

64574　祛风追痰丸

【方源】《幼科金针》卷上。

【组成】防风五钱　白附子五钱　枯矾五钱　天麻五钱　净全蝎二钱五分(炙,去毒)　木香二钱五分　南星一两五钱(明矾水、皂角水各浸一半,经一宿)　半夏三两(牙皂水、姜汁各浸一半,经一宿)　猪牙皂(炒)五钱　僵

蚕（净，炒，去丝）五钱

【用法】上为末，姜汁糊丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服五丸，卧时薄荷汤化服。

【主治】小儿五痫，初起时未发声音。五痫者：马痫，声如马鸣，张口摇头；牛痫，目直视而腹胀；鸡痫，摇头反折，喜惊；羊痫，扬目吐舌；猪痫，喜吐沫。

64575 祛风胜湿汤

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】荆芥9克 防风9克 羌活9克 蝉衣6克 茯苓皮9克 陈皮6克 银花9克 甘草6克

【用法】水煎服。

【功用】祛风胜湿，佐以清热。

【主治】丘疹性荨麻疹，皮肤瘙痒症等。

【方论选录】《中医内科临床治疗学》：本方由《局方》消风散精简而成。荆芥、防风宣散肌表风邪；羌活祛风胜湿；蝉衣散风热，消瘾疹，合而用之使湿随风去；陈皮、茯苓利水渗湿，健脾和中；银花、甘草清热化毒。适用于风湿热类型的皮肤病。

64576 祛风胜湿汤

【方源】《中医外伤科学》。

【组成】黄柏 苦参 银花 白鲜皮 茯苓皮 羌活 防风 荆芥 陈皮

【用法】水煎服。

【功用】清热利湿，祛风止痒。

【主治】湿热型瘙痒。

64577 祛风活血汤

【方源】《玉案》卷五。

【组成】防风 当归 川芎各一钱五分 荆芥 红花 生地 桃仁 青皮 香附 天麻各一钱二分

【用法】水、酒各一钟煎服。

【主治】血风。

64578 祛风活血散

【方源】《普济方》卷一一一。

【组成】当归 川芎 白芍药 地黄 赤芍药 连翘 防风 川椒各一两 小茴香七两 肥皂角十四个（重揉，水滤净，将前药浸入水内一日后，取出滤去水，焙干）

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，煎苏木、薄荷汤送下，不拘时候。

【主治】大风癞，眉落鼻塌。

64579 祛风活络膏

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】白花蛇一盘 全蝎五钱 僵蚕五钱 白附子八钱 川乌五钱 细辛五钱 川羌五钱 稀莶草一两 皂角五钱 南星五钱

【用法】用香油半斤，将药炸枯，滤去滓，再兑白淀粉，老嫩合宜，俟凉后再入麝香面二钱，搅匀收膏。

【功用】祛风。

【主治】各类风病风症。

【方论选录】花蛇好食石南，生于土穴阴霾之处，秉受毒厉幽暗之气，所以透骨搜风，截惊定搐较宜，是以方中用为主药，继用乌、附祛风散寒止痛，其余药物均能祛风定风。经曰："风善行而数变"，"风气通于肝"，故祛风之药多能活络行血，方名祛风活络膏，信不虚也。

64580 祛风神妙散

【方源】《普济方》卷四十六。

【组成】瓜蒂四十九个 赤小豆四十九粒 小黄米一百粒

【用法】上为细末。于日间口含水，搐鼻内。

【主治】偏正头风。

64581 祛风退热汤

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】防风（去叉） 当归（锉，焙干，去土） 芍药 甘草（炙） 人参各一两 山栀子仁半两 大黄半两（炙） 柴胡（去苗）一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】目眦暴赤，邪热攻睑，膜隐肿瘀成疮，眦烂，乍差乍发。

64582 祛风除湿汤

【方源】《古今医鉴》卷二

【组成】当归(酒洗)一钱　川芎八分　橘红一钱　赤芍药一钱　半夏(姜制)一钱　苍术(米泔制)　片术各一钱　白茯苓一钱　乌药一钱　枳壳一钱　桔梗八分　黄连(酒炒)一钱　黄芩(酒炒)一钱　白芷九分　防风八分　羌活一钱　甘草五分

【用法】上㕮咀。加生姜五片,水二钟,煎八分,空心服。

【主治】中风瘫痪,筋骨疼痛。

【加减】身痛,加姜黄一钱;脚痛,加牛膝、防己、威灵仙各一钱。

64583　**祛风除湿汤**

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】焦白术9克　茯苓6克　炒薏仁9克　甘草1.5克　荆芥3克

【用法】水煎服。

【主治】睑弦赤烂。

【方论选录】方中焦白术、茯苓、炒薏仁、甘草健脾除湿,炒薏仁且有消肿排脓,清除粘着之物的功能;荆芥疏散风邪,脾健湿得行,风除痒自止,湿除风去,病可自愈。

64584　**祛风除湿散**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】荆芥穗三钱　防风三钱　香白芷三钱　僵蚕二钱(炒)　白鲜皮三钱　地肤子三钱　穿山甲二钱(炙)　滑石三钱　枯白矾一钱　黄柏三钱　粉丹皮二钱　冰片五分

【用法】上为细末,过重绢罗,盛布袋内撮之。涂擦皮肤。

【功用】祛风除湿,止痒化斑。

【主治】皮肤病血热者。

64585　**祛风逐湿散**

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】番木鳖(制,净末)　穿山尾甲(制,净末)各三钱　熟附子　桂枝　当归　延胡索各末一钱

【用法】上为末。每服二钱,好陈酒送下。随量饮醉,暖卧取汗,服至痛处更痛,头眩背汗,昏沉片刻即定,定则全愈。服后不觉痛麻,连服数剂,至知觉乃止。

【主治】痛风。周身痹痛,或手足不仁,遍身麻木,属血虚,风湿凝滞者。

64586　**祛风逐痰汤**

【方源】《玉案》卷二。

【组成】半夏曲　枳实(炒)　橘红各一钱五分　桔梗(炒)　胆南星　明天麻(湿纸包煨)　防风　薄荷各一钱　全蝎七枚(洗净)

【用法】水二钟,加竹沥半酒杯,姜汁十茶匙煎服。

【主治】痰痉挟风。

64587　**祛风换肌丸**

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】威灵仙　石菖蒲　何首乌　苦参　牛膝　苍术　大胡麻　天花粉各等分　甘草　川芎　当归减半

【用法】上为末,新安酒泛丸,如绿豆大。每服二钱,白汤送下。

【主治】白屑风,及紫白癜风,顽癣,淫热疮疥,一切诸疮,瘙痒无度,日久不绝,愈而又发。

【加减】忌牛肉、火酒、鸡、鹅、羊等物。

64588　**祛风换肌丸**

【方源】《鲐翁录验方》

【组成】马齿苋一斤　浮萍草一斤　熟军八两　防风八两　蔓荆子四两　黄芩四两　连翘六两　荆芥八两　苦参一斤　白蒺藜一斤　大胡麻一斤　黄柏八两　牛膝四两　白鲜皮八两　丹皮四两　白芷三两

【用法】上为末,水泛为丸。每服三钱,开水送下。

【主治】风湿发为遍体红斑,按之热者。

64589　**祛风涤热汤**

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十五。

【组成】薄荷　甘菊　牛蒡子　防风　荆芥穗　连翘　竹叶

【主治】热盛风搏,并于经络,风火相乘,发为筋挛,亦曰筋瘈。

64590　**祛风润面散**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】绿豆白粉六分 山柰四分 白附子四分 白僵蚕四分 冰片二分 麝香一分

【用法】上为极细末，再过重罗，兑胰皂四两，搀匀。

【功用】开窍，通络，散瘀，辟秽，滋润肌肤。

【主治】面风。

【方论选录】本方仍为牵正散加减方，妙在加麝香与绿豆白粉，麝香开窍、通络、散瘀、辟秽，绿豆白粉甘凉解毒，能滋润肌肤，相得益彰。

64591 **祛风润燥汤**

【方源】《外科经验方》。

【组成】防风 荆芥 羌活 黄连 黄芩 秦艽 枳壳各一钱半 当归（酒拌） 皂角仁（去皮存性） 桃仁（去皮尖，研） 泽泻 红花各一钱 大黄（煨）二钱

【用法】上作一剂。用水二钟，煎八分，食前服。

【主治】痔疮，焮肿作痛，大便秘涩。

64592 **祛风益胆汤**

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】柴胡二钱 郁李仁一钱 乌梅一个 当归一两 川芎三钱 麦冬五钱 沙参三钱 竹茹一钱 甘草一钱 白芥子二钱 陈皮五分

【用法】水煎服。连服二剂而颤慑止，再服二剂。

【功用】泻胆木之风邪，助胆木之真气。

【主治】胆虚风袭，心颤神慑，如处孤垒，而四面受敌，达旦不能寐，目眵眵无所见，耳愦愦无所闻，欲少闭睫而不可多得。

64593 **祛风清上汤**

《疡医大全》卷十。为《准绳·类方》卷四引《医学统旨》"祛风清上散"之异名，见该条。

64594 **祛风清上散**

【方源】《准绳·类方》卷四引《医学统旨》。

【异名】祛风清上汤（《疡医大全》卷十）。

【组成】酒黄芩二钱 白芷一钱 羌活 防风 柴胡梢各一钱 川芎一钱二分 荆芥八分 甘草五分

【用法】水二钟，煎八分，食后服。

【主治】风热上攻，眉棱骨痛。

64595 **祛风清金散**

【方源】《赤水玄珠》卷十四。

【组成】防风 栝楼根 桔梗 枳壳 旋覆花 川芎各一钱 山栀 黄芩 贝母 瓜蒌仁（炒） 茯苓 天门冬 麦门冬 橘红各八分 五味子十五粒 甘草四分

【用法】水煎服。

【主治】痉病，肺热壅盛，痰唾如脓。

64596 **祛风清热饮**

【方源】《幼科证治大全》引丹溪方。

【组成】防风 黄连 连翘 升麻 桔梗 栀子 草决明 赤芍 当归

【用法】水煎服。

【主治】小儿热眼，肿痛。

64597 **祛风清热散**

【方源】《便览》卷一。

【组成】细辛一分半 酒芩二钱 白芷一钱二分 防风八分 柴胡梢八分 川芎一钱 荆芥七分 羌活七分 甘草五分 蔓荆子三分 天麻七分 石膏一钱半 菊花七分

【用法】水煎，食远热服。

【主治】风热头目昏痛，偏正头风，头痛鼻塞。

64598 **祛风清热散**

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】当归尾二钱 赤芍二钱 川芎一钱五分 生地黄三钱 黄连六分 黄芩二钱 栀子三钱 连翘三钱 薄荷八分 防风一钱五分 荆芥一钱 羌活二钱 桔梗八分 枳壳一钱 甘草八分 白芷梢一钱

【用法】上锉一剂，加灯草七根，水煎，食后服。

【主治】暴发眼肿如桃，并赤眼痛涩难开者。

【加减】肿痛甚，加大黄、芒消；风热，加蔓

荆子、牛蒡子；乌珠痛，加天麻、川乌（生用三片）；犯眼，加苍术、朱砂；眼生翳障，加白蒺藜；眼目被人打伤青肿，加大黄；如杖疮肿痛未破作憎寒壮热，打重血气攻心，加大黄、桃仁；如打扑伤损内重，瘀血不散，加桃仁、大黄。

64599　祛风清热散

【方源】《病机沙篆》卷下。

【组成】酒芩二钱　白芷一钱五分　茱萸　防风　柴胡各一钱　川乌一钱二分　荆芥八分　甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】风热上攻脑，下注目睛，头痛连眉骨相并而痛。

64600　祛风越痹酒

【方源】《活人方》卷一。

【组成】白术五两（炒）　当归五两　杜仲三两（盐炒）　牛膝三两　防风三两　苍术二两　川芎二两　羌活二两　红花一两　桂枝一两　威灵仙一两

【用法】上锉片，绢囊盛，用无灰陈酒二十斤浸五七日，隔汤煮透，早、晚随量热饮。

【功用】利关节，通经络。

【主治】风寒湿三气留滞经络血脉之中，以致肢体酸疼筋骨拘挛，久则半身不遂，麻木不仁，兼为湿痰流注，腰膝痿躄。

64601　祛风舒筋丸

【方源】《中国药典》。

【组成】防风 50 克　桂枝 50 克　麻黄 50 克　威灵仙 50 克　川乌（制）50 克　草乌（制）50 克　苍术（炒）50 克　茯苓 50 克　木瓜 50 克　秦艽 50 克　骨碎补（炒）50 克　牛膝 50 克　甘草 50 克　海风藤 50 克　青风藤 50 克　穿山龙 50 克　老鹳草 50 克　茄根 50 克

【用法】上为细末，混匀。每 100 克粉末加炼蜜 160～180 克制成大蜜丸，每丸重 7 克。口服，一次一丸，一日三次。

【功用】祛风散寒，舒筋活络。

【主治】风寒湿痹，四肢麻木，腰腿疼痛。

【宜忌】孕妇慎用。

64602　祛风湿洗药

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】南红花三钱　羌活五钱　透骨草五钱　宣木瓜六钱　防己五钱　桑枝六钱

【用法】各捣粗滓，分包，水煎，趁热熏洗。

【功用】祛风除湿。

【主治】筋骨痛。

【方论选录】本方为祛风除湿之剂，羌活散太阳之游风，风能胜湿；木瓜、防己、桑枝去湿通络；透骨草配红花则活血止痛，配羌活、防己则祛风去湿，对治风湿疼痛有效。

64603　祛风滋血汤

【方源】《种痘新书》卷七。

【组成】黄耆八分　当归二钱　白芍二钱　元支（要大）一钱六分　勾藤一钱　僵虫五条　白术一钱　川芎四分　官桂六分

【用法】水煎服。

【主治】痘疮血亏，或为肝风，手足牵引者。

64604　祛风解毒汤

【方源】《寿世保元》卷五。

【异名】祛风辟毒汤（《观聚方要补》卷六）。

【组成】黄连一钱　黄芩一钱　连翘一钱五分　赤芍一钱　枳壳（麸炒）一钱　大黄（酒蒸）一钱五分　苦参一钱五分　黄柏一钱　槐花一钱

【用法】上锉。水煎，空心服；或为末，水泛为丸，用温水送下亦可。

【主治】痔疮肿痛初起。

64605　祛风辟毒汤

《观聚方要补》卷六。为《寿世保元》卷五“祛风解毒汤”之异名。见该条。

64606　祛风燥湿汤

【方源】《朱仁康临床经验集》。

【组成】乌蛇 9 克　独活 9 克　白芷 6 克　藁本 9 克　黄柏 9 克　白鲜皮 9 克　银花 9 克　甘草 6 克

【功用】驱风，除湿，清热。

【主治】肾囊风(阴囊湿疹,阴囊神经性皮炎),风重于湿,肾囊干燥发痒,搔后略有出水者。

【方论选录】乌蛇、独活、白芷、藁本、白鲜皮驱风止痒,黄柏、银花、甘草燥湿清热。

64607 **祛风豁痰汤**

【方源】《玉案》卷五。

【组成】陈皮 瓜蒌仁 半夏 紫苏子各八分 乌药 川贝母 防风 当归各一钱

【用法】加生姜三片,水煎,临服加竹沥一小钟。

【主治】产后血虚,风痰壅塞,似中非中。

64608 **祛火外消汤**

【方源】《洞天奥旨》卷十二。

【组成】地榆三钱 白及三钱 柏叶三钱 炒栀子二钱 白芍五钱 当归五钱 生甘草一钱

【用法】水煎服二剂,伤轻者药减半。

【主治】汤烫油烧。

64609 **祛火利痰丸**

【方源】《玉案》卷三。

【组成】大黄(锦纹者一斤,切片,好酒浸二日,上下柳叶蒸黑色,晒干为末) 巴戟天四两(水泡,去骨) 萝卜子(炒) 真苏子(炒) 麦芽(炒) 枳实(炒)各二两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心茶清送下。

【主治】一切痰火,久嗽不住。

64610 **祛火通关饮**

【方源】《玉案》卷三。

【组成】黄连 玄参 山豆根 桔梗 牛蒡子 枳实各二钱 大黄 玄明粉 瓜蒌仁各三钱

【用法】加生姜二片,水煎,温服。

【主治】喉痹不通,饮食不下。

64611 **祛邪止痢散**

【方源】《华氏医方汇编》卷一。

【组成】上川连二钱 滑石(飞)四两 楂肉(炒)八两 煨木香四两 黑白丑四两

【用法】上为细末。每服三钱,红痢用白糖,白痢用红糖,开水冲服。

【主治】夏、秋红白痢。

64612 **祛邪止嗽丸**

【方源】《简明医彀》卷四。

【组成】紫苏叶 冬花蕊 紫菀茸 杏仁(研,纸压去油,另捣如泥) 乌梅肉(洗,蒸,捣) 粟壳(润,去瓤)各四两 麻黄(去根) 陈皮 桑皮(蜜炒) 知母 甘草各二两 官桂一两

【用法】上为末,入梅拌,重晒,磨,和杏蜜为丸,如龙眼大。每服一丸,临睡姜、葱汤化下。

【主治】因感风寒雨湿成嗽,患久不已,冬月风冷嗽甚。

64613 **祛邪化滞煎**

【方源】《古方汇精》。

【组成】川芎 黄芩各八分 当归 炒白术各一钱五分 建曲 夏曲各二钱 藿梗 云苓各一钱 赤芍一钱二分 煨木香四分 炙草三分

【用法】加姜皮半分,砂仁壳二分,冬瓜皮五分为引,水煎服。

【功效】化滞祛邪,和调荣卫。

【主治】妊娠痢疾。

64614 **祛邪立效散**

【方源】《会约》卷六。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 甘草 白芷 川芎 荆子各一钱 羌活 防风 桂枝各八分 北细辛三分 苏叶四分 生姜五分

【用法】水煎热服,取汗。

【功用】发表。

【主治】外感风寒,头痛暴甚,畏风恶寒,脉紧而数。

【加减】如寒甚者,冬季加麻黄(去节)五分;夏天加麻黄(去节)三四分,须佐以当归一钱,白芍七分,不致大发;先有汗者,不用麻黄,并去羌活。

64615 **祛邪导滞汤**

【方源】《会约》卷五。

【组成】枳实　猪苓　木通　泽泻　陈皮　车前各一钱　大黄二三钱

【用法】加灯心为引，水煎服。

【主治】疫病，小便胶浊，为邪到膀胱，干于气分所致。

【加减】如涩痛，加滑石三钱；如短赤，加山栀一钱；如溺血、蓄血，加桃仁二钱，红花七分，或加漆滓(炒令烟尽)一二钱。

64616　**祛阴至圣丹**

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】人参一两　白术五钱　半夏五钱　茯苓五钱　菖蒲一钱　陈皮五分

【用法】水煎服。

【主治】尸厥属阴邪者。

64617　**祛阴救痘丹**

【方源】《辨证录》卷十四。

【组成】人参一钱　当归三钱　白术三钱　附子三分　荆芥一钱　黄耆三钱

【用法】水煎服。

【主治】小儿阴症之痘疮，痘疮虚空，而色又清白，发痒中塌，身寒颤，咬牙不已，腹中虚胀，上吐下泻，脉复沉细微弱。

【方论选录】此方用参、耆、归、术以补气血，气旺而阴自难留，血足而阳自可复；然后益之附子，则奏功始神；方中又加荆芥者，以附子直攻其内，非荆芥则不能引附子外散耳。

64618　**祛狂至神丹**

【方源】《石室秘录》卷一。

【组成】人参一两　白术一两　半夏三钱　天南星三钱　附子一钱

【用法】水煎，大剂灌之。

【功用】固正气，祛痰，祛邪。

【主治】发狂如见鬼状，或跌倒不知人，或中风不语，或自卧而跌在床下者。

64619　**祛疟神应丸**

【方源】《普济方》卷二〇〇引《德生堂方》。

【组成】干面(用三姓人家寒食日食用者)　青蒿

【用法】每一家取一匙，为细末。五月五日午时，采青蒿擂取自然汁，和前面为丸，如绿豆大。每服一丸，当发日早晨，取无根井水送下。

【主治】久疟，及诸疟疾。

64620　**祛疠神效丸**

【方源】《玉案》卷二。

【组成】丢子肉十五斤　防风二斤半(去芦)　白蒺藜二斤半　荆芥二斤半　银柴胡六两　胡黄连六两　草胡麻二斤半　当归二斤半(酒浸)　羌黄二斤半　木鳖子十五两(去壳)　薄荷一斤

【用法】上为末，以酒为丸。每服五钱，一日三次。

【主治】大麻风。

【加减】若脾经受病，加白术五两；肺经受病，加黄芩五两；胃经受病，加厚朴五两；肝经受病，加连翘五两；心经受病，加山栀仁、胡黄连各八两；肾经受病，加破故纸五两；五脏受病，加苍术四两，甘草二两；六腑受病，加威灵仙四两，续断四两，何首乌八两；春则气暖融和，加连翘一斤；夏则火旺烦躁，加胡黄连八两，薄荷八两；秋则乍寒乍暖，多生雾露，加苍术八两，白术八两；冬则严寒冰冻，加乌药一斤；面生浮肿，加白芷五两，续断八两；遍身浮肿，加苍术八两；脚底肿，加牛膝八两；手蜷挛，加威灵仙八两；骨节疼痛，加虎骨一斤。凡遇是病，依前法加减，其验如神。

64621　**祛毒化肿汤**

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】连翘　天花粉各一钱　当归　贝母　黄芩(酒炒)各七分　甘草节　桔梗　柴胡　昆布　海藻各五分　瓜蒌仁八分

【用法】上㕮咀，水煎熟，食远温服。

【功用】祛毒化肿。

【主治】瘿气发于颈项。

64622　**祛毒牛黄丸**

【方源】《御药院方》卷九。

【组成】牛黄(研)二钱半　人参一两　南

琥珀 犀角屑（取极细末） 桔梗 生干地黄（沉水研）各半两 雄黄（飞）二两 川升麻 南玄参各三钱 蛤粉（水飞）四两 南硼砂半两 朱砂（飞研）七钱 铅白霜一钱 脑子三钱 金箔（为衣） 寒水石（烧赤，去火毒）三两（研）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如小弹子大。金箔为衣，用瓷器内收。每服一丸，浓煎薄荷汤温化下，或新汲水化服亦得，食后一日二三次，更或含化咽津亦得。

【主治】大人小儿咽喉肿痛，舌本强硬，或满口生疮，涎潮喘急，胸膈不利，饮食难进。

64623 祛毒至神汤

【方源】《外科医镜》。

【组成】金银花三两 人参五钱 当归五钱 甘草三钱（生） 牛皮胶五钱 山甲三片（炒） 大黄五钱（溃后忌用，恐泄真气也）

【用法】水煎服。

【主治】骑马悬痈。

64624 祛毒养荣汤

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】当归一钱 芍药二钱 生地黄（酒洗）一钱 黄连（酒炒）一钱五分 黄芩一钱 黄柏（酒炒）五分 知母一钱 连翘一钱 升麻五分 荆芥一钱 槐角二钱 皂角子二钱 皂角刺二钱 天花粉二钱 黄耆一钱 人参一钱 甘草节一钱

【用法】上锉一剂。水煎，空心热服。

【主治】痔漏，肾阴不足，大肠火盛者。

【宜忌】远酒色。

64625 祛热生胃汤

【方源】《石室秘录》卷六。

【组成】石膏三两 知母三钱 人参五钱 元参三两 茯苓一两 麦冬三两 车前子五钱

【用法】水煎服。

【主治】凡有火热而发狂，或汗如雨下，口渴舌燥，或如芒刺者。

【方论选录】石膏知母以泻胃火，人参以生胃气，元参去浮游之焰，麦冬生肺中之阴，茯苓、车前引火下行于膀胱从小便而出。且火盛者口必渴，口渴必多饮水，吾用此二味以分湿则水流，而火自藏水自散矣。

64626 祛热搜风饮

【方源】《回春》卷八。

【组成】苦参 金银花 柴胡 连翘 片芩 荆芥 黄柏（炒） 黄连（炒） 生地黄 薄荷 独活 枳壳（麸炒） 防风 甘草（蜜炙）

【用法】上锉。水煎，食远热服。

【主治】疥及脓疱疮。

64627 祛疳消食丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十八。

【组成】黄连（去须）二两（微炒） 青橘皮（去白） 木香各二两 大麦芽（微炒） 川楝子肉（炒黄） 神曲（炒黄） 芜荑仁（研）各一两

【用法】上药前六味为细末，次入芜荑仁，同研匀，蒸饼和猪胆汁为丸，如黄米大。每服二十丸，温米饮送下，不拘时候。

【功用】肥肌，退疳，化饮食。

【主治】小儿疳症。

64628 祛烦养胃汤

【方源】《医醇賸义》卷三。

【组成】鲜石斛五钱 熟石膏四钱 天花粉三钱 南沙参四钱 麦冬二钱 玉竹四钱 山药三钱 茯苓三钱 广皮一钱 半夏一钱五分

【用法】甘蔗三两，煎汤代水，煎药服。

【功用】清阳明之热，润燥化痰。

【主治】中消。

64629 祛暑神秘丹

【方源】《玉案》卷二。

【组成】青蒿（净末）一斤 白梅 乌梅 生姜各四两 生姜皮一两 沙糖十两

【用法】上为末，共捣为丸，如龙眼肉大。每服一丸，井水调下。

【主治】夏月中暑，卒倒不省人事。

64630　祛湿止痛饮

【方源】《玉案》卷五。

【组成】苍术　防己　白术各一钱五分　官桂　泽泻　乌药　木通　橘核　荜澄茄各一钱

【用法】水煎，食前温服。

【主治】湿疝。睾丸一大一小，疼痛不可忍者。

64631　祛湿化痰汤

【方源】《证治宝鉴》卷十二。

【组成】茯苓　陈皮　防己　薄荷　南星　白术　苍术　威灵仙　香附　甘草　当归　猪苓　半夏

【用法】水煎服。

【功用】祛湿化痰。

【主治】上中下三部疼痛。

64632　祛湿健发汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】炒白术　猪苓　萆薢　首乌藤　白鲜皮各 15 克　车前子(包)　川芎　泽泻　桑椹各 9 克　赤石脂　生地　熟地各 12 克

【功用】健脾祛湿，滋阴固肾，乌须健发。

【主治】脂溢性脱发。

【宜忌】避免用肥皂洗头。

【方论选录】方中炒白术、泽泻、猪苓、茯苓块、萆薢、车前子健脾祛湿，利水而不伤其阴；生熟二地、桑椹、首乌藤补肾养血，以助生发；川芎活血，且能引药上行；白鲜皮除湿散风止痒，以治其标；赤石脂能收敛，旨在减少油脂的分泌。

64633　祛湿清宫汤

【方源】《镐京直指》卷二。

【组成】连翘三钱(连心)　蝉蜕一钱五分　粘子三钱　薄荷一钱五分　秦艽一钱五分　银花三钱　广郁金三钱　石菖蒲一钱五分　僵蚕三钱　钩藤三钱(后下)　至宝丹一颗(或用紫雪丹、牛黄丸)

【用法】水煎服。

【功用】芳香开窍，透达白痦。

【主治】湿邪蒙蔽，神识不清，耳聋言謇，午后益甚，白痦。

64634　祛寒平胃散

【方源】《医醇剩义》卷三。

【组成】炮姜五分　广皮一钱　茅术一钱　厚朴一钱　佩兰一钱　归身一钱五分　茯苓二钱　木香五分　砂仁一钱　郁金二钱　佛手柑五分

【主治】邪气结胸，胃阳不通，中脘痞满，四肢倦怠。

64635　祛寒去湿丹

【方源】《医林纂要》卷十。

【组成】白术四两　茯苓三两　金银花三两　蛇床子五钱　附子二钱　肉桂三钱　当归一两

【用法】上为末，炼蜜为丸。每服一两，盐姜汤送下。

【主治】腹疽生于脐之上下左右者。

【方论选录】术、苓以健脾土，附、桂以补命火，而后加以行血解毒之品以治腹疽，固有道也。

64636　祛寒至圣丹

【方源】《石室秘录》卷二。

【组成】肉桂一钱　附子一钱　熟地一两　山茱萸四钱　白术三钱　人参三钱　柴胡五分

【用法】水煎服。

【主治】阴寒无火而夜热者。

【方论选录】此方之妙，用附、桂祛寒之药加之于参、熟补阴之内，使阳得阴而有制，不至奔越沸腾，少加柴胡数分则阴邪自散。盖阳根于阴，可真阴肾水，实为真阳君相之火之母也，此方中加熟地、山萸正是此意。

64637　祛寒安脾汤

【方源】《会约》卷十。

【组成】苍术一钱半　陈皮一钱　茯苓一钱半　扁豆(炒)二钱　甘草七分　草蔻三钱　木通一钱半　泽泻一钱半　吴茱萸(制)五分　厚朴一钱　木香四分　生白芍一钱　肉桂一

钱半

【用法】水煎服。

【功用】去寒湿，安脾胃。

【主治】误食生冷，致成泻痢，腹痛尿短，或胀满呕恶。

【加减】若夹食者，加神曲（炒）一钱五分；如外感头痛者，加北细辛三分；呕吐冷水者，加半夏一钱半，生姜一钱；中寒喜热汤者，加炮干姜一钱。

64638 **祛寒建中汤**

【方源】《医醇賸义》卷四。

【组成】当归二钱 白芍一钱（酒炒） 茯苓二钱 白术一钱 附子八分 广皮一钱 厚朴一钱 枳壳一钱（麸炒） 白蔻六分 木香五分 大枣二枚 生姜三片

【用法】水煎服。

【功用】扶正祛寒，理气化浊。

【主治】肤胀。寒气客于皮肤之间，鼕鼕然不坚，腹大，身尽肿，皮厚，按其腹窅而不起，腹色不变。

64639 **祛寒舒胁汤**

【方源】《辨证录》卷一。

【组成】人参五钱 肉桂三钱 白芍二钱 当归三钱 柴胡五分 白术一两 甘草五分

【用法】水煎服。

【主治】猝犯阴寒之气，两胁痛极至不可受，如欲破裂者。

64640 **祛瘀四物汤**

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】酒生地 归尾 赤芍各9克 川芎3克 益母草6克 刘寄奴9克 红花1.5克

【用法】水煎服。

【主治】上胞下垂。

【方论选录】方中用四物汤，意在补血调血；而用归尾、赤芍，不用白芍、归身，是为增强其活血之力；益母草活血通经，有祛瘀生新之效，刘寄奴主跌仆损伤，有破血行瘀之功。

64641 **祛痰三生丸**

【方源】《普济方》卷一〇四引《德生堂方》。

【组成】皂角半斤（去皮弦） 牵牛一斤 白矾四两 萝卜子四两（合研） 木香二两 朱砂一两（另研，为衣）

【用法】用萝卜熬水打面糊为丸，如梧桐子大。每服三四十丸，加至五十丸，食后临卧温水送服。量气虚实加减丸数。

【主治】中风后，痰涎壅塞胸膈之间，令人头目昏眩，手臂肩背腰腿疼痛，麻痹不仁，不能动止，大便实者；又治风痫不时发作。

64642 **祛痰定癫汤**

【方源】《石室秘录》卷六。

【异名】定癫汤（《集成良方三百种》）。

【组成】人参三钱 白术五钱 白芍五钱 茯神三钱 甘草一钱 附子一片 半夏三钱 陈皮一钱 菖蒲一钱

【用法】水煎服。

【主治】癫痫，卒然昏倒，口吐白沫，作牛羊马声。

【方论选录】参、术、茯、芍皆健脾平肝之圣药，陈皮、半夏、甘草不过消痰和中，妙在用附子、菖蒲以起心之迷，引各药直入心窍之中，心清则痰自散而癫痫自除矣，既不耗气，又能开窍，安有死法哉。

64643 **祛痰镇惊丸**

【方源】《医部全录》卷四三二引《幼幼近编》。

【组成】牛胆南星一两 竺黄 僵蚕各五钱 珍珠 全蝎（去毒）各一钱 琥珀二钱 朱砂三钱 麝香三分 真金三帖 （一方有牛黄二钱）

【用法】炼蜜为丸，如芡实大。薄荷、姜、蜜汤送下。

【功用】镇惊宁神，退热化痰。

【主治】急惊风。

64644 **祛瘴辟瘟丹**

【方源】《痧书》卷下。

【组成】厚朴 苍术 羌活 防风 陈皮 枳实 香附 牛蒡子各一钱 槟榔 白芷各

八分　藿香　川芎各五分　细辛四分　甘草三分

【用法】加姜、葱，水煎服。

【主治】时疫疬瘴。

【加减】无汗，加苏叶、薄荷；口渴，加花粉、葛根；身重汗出，加防己、石膏；温疟，加柴胡、半夏；遍身疙瘩肿痛，加兰叶、大黄、僵蚕；肌肉发红黑紫斑，加元参、大青、连翘；大便秘结，加大黄；先中热又中暑，加白虎、香薷；头疼，加川芎；风温身体灼热，加芩、连、栀子；咳嗽涕唾，头目昏眩，加荆芥、金沸草。

64645　**祛风杀虫肥皂**

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】百部(新鲜者，洗净，晒干，蒸烂)十两　紫背浮萍(阴干，温火焙燥，为末)　鲜肥皂各四两　浮皮消二两

【用法】共捣烂至极细，为丸如青梅大。早、晚洗浴净脸，用以遍擦。

【主治】大麻疯。

64646　**祛风活络贴药**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】防风三钱　白芷三钱　白附子二钱　僵蚕三钱　天麻二钱　薄荷一钱五分

【用法】上为末，兑大肥皂六两，蒸透合匀，随意敷用。

【功用】祛风活络。

【主治】面风。

64647　**祛风活络贴药**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】白附子五钱　僵蚕一两　蝎尾五钱　薄荷三两　防风一两　芥穗一两　天麻一两　炙草一两　川羌活五钱　川芎五钱　乌头五钱　藿香五钱

【用法】上为细末，用大角子四十个，香肥皂二十个，黑糖水化开，合药为锭，每锭二两。

【主治】面风。

【方论选录】活血祛风之羌活、川芎，中医研究实验证明其有抗血栓形成作用，并有改善微循环功效；藿香芬芳而微温，通而不燥，较之慓悍祛寒涤痰之乌头，有独到之处。

64648　**祛风活络洗药**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】防风二钱　白芷二钱　白附子二钱　僵蚕三钱　细辛六分　天麻一钱五分　白菊花二钱　南星二钱　橘络二钱　薄荷一钱

【用法】水煎，热熏，温洗。

【主治】面风。

【方论选录】本方为牵正散与奇风散合方加减而得，祛风活络之力较专。方中僵蚕用量最大，取其熄风化痰解痉之作用，现代研究僵蚕所含蛋白质有刺激肾上腺皮质的功效。

64649　**祛风活络熨方**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】防风三钱　白芷三钱　川山甲三钱(炙)　皂角三钱　薄荷一钱

【用法】上为细末，用酒、水合匀，装绢袋内，蒸熟熨之。

【主治】面风。

64650　**祛风清上洗药**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】防风三钱　川芎二钱　白芷二钱　薄荷一钱　桑叶二钱　甘菊一钱五分　天麻一钱

【用法】用水熬透，洗之。

【主治】偏正头痛，头目昏重。

【方论选录】本方与《局方》川芎茶调散、《本事方》川芎丸相类。川芎为血中之气药，能上行头目，下行血海，功能活血祛瘀，祛风止痛。药理研究提示10%川芎浸膏能抑制大脑活动和麻痹神经中枢，故有镇静、镇痛、止痉作用。

64651　**祛风清热洗药**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】红花二钱　防风三钱　白芷二钱　羌活二钱　桑叶二钱　杭菊二钱　薄荷二钱　僵蚕一钱

【用法】开水煎一沸，兑花露水一匙。

【主治】皮肤病。

【方论选录】此方于祛风中加红花活血，治风治血并行，兑以花露水，芳香止身痒当更好。

64652 **祛风蠲麻洗药**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】明天麻二钱 防风二钱 白芷二钱 僵蚕二钱（炒） 南薄荷一钱五分 藁本二钱 全归三钱

【用法】水煎，洗之。

【主治】头痛。

【方论选录】天麻为定风神药，又名定风草，既能平熄肝风，又能祛除风湿。药理实验表明，天麻浸膏有明显对抗动物戊四氮阵挛性惊厥、镇痛、抗癫痫和促进胆汁分泌作用。方中配以僵蚕、当归、芍药，治风治血同行，配白芷、藁本、薄荷，治头疼目眩诸疾。

64653 **祛风补益蚲蛴丸**

【方源】《圣惠》卷二十三。

【组成】蚲蛴一两半（微炒） 白附子一两（炮裂） 沉香一两 肉桂一两（去皱皮） 芎䓖一两 槟榔一两 木香一两 天麻一两 石斛二两（去根，锉） 牛膝二两（去苗） 白蒺藜一两（微炒，去刺） 附子一两（炮裂，去皮脐） 巴戟三分 白僵蚕三分（微炒） 羌活三分 肉苁蓉二两（酒浸一宿，刮去皱皮，炙令干） 当归三分（锉，微炒） 山茱萸三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心及晚食前以温酒送下。

【主治】脏腑久虚，风冷所攻，四肢无力，背膊多疼，膀胱冷气流注，腰脚沉重。

64654 **祛风导气化痰丸**

【方源】《普济方》卷九十四引《瑞竹堂方》。

【组成】大川乌头半两重（炮，去皮脐用） 乌迭泥 天南星 白附子各三两（生用） 天麻（酒浸，焙）一两 全蝎一两（不去毒，用薄荷叶炒） 半夏七两

【用法】上各取净末，除南星、半夏生取末，以绢袋盛，安瓷器中，新水浸，日晒夜露三昼夜，每早换水，三日取出，晒干为细末，各依分两称，相和重罗，用苏合香油三两，如无苏合香丸，膏子亦可。如不敷，入糯米粉打薄糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，食后临卧用姜汤送下，一日二次。药只阴干，不要晒干及焙。

【主治】咳嗽气积，呕吐痰涎，头目昏晕，半身不遂，偏废，口眼㖞斜，他药不疗者。

64655 **祛风顺气香枳散**

【方源】《普济方》卷一〇六引《余居士选奇方》。

【组成】枳壳（去瓤，麸炒） 防风（去叉）各一两（锉） 甘草（炙，锉）半两

【用法】上为散。每服二钱匕，沸汤点服，空心、食前各一服。

【主治】大肠秘涩。

64656 **祛老乌须健阳丹**

【方源】《同寿录》卷一。

【组成】何首乌（赤白各一斤，米泔水浸，竹刀刮去皮，切碎） 牛膝半斤（用何首乌、黑豆五升砂锅内蒸三次） 茯神半斤（乳拌） 茯苓（赤一斤，牛乳浸一宿，白一斤，乳汁浸一宿） 枸杞子半斤（酒浸，蒸，晒干） 当归半斤（酒浸一宿，晒干） 破故纸五两（炒黄） 菟丝子半斤（酒浸，蒸，晒干）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心酒送下，午时姜汤送下，晚上盐汤送下，一日三次；或俱用酒下亦可。

【功用】健身体，去诸风，明眼目，乌须发，益气力。

64657 **祛风和脉调气利湿化痰膏**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】羌独活各二两 僵蚕三两 威灵仙一两五钱 川乌一两五钱 片姜黄一两五钱 橘络二两 鸡血藤三两（后入） 秦艽一两五钱 桑寄生二两 归尾二两 穿山甲二两 红花二两 川续断二两 香附三两（生） 没药一两五钱（后入） 乳香一两五钱（后入） 乌梢蛇一两五钱 防风二两 茅苍术

二两　赤芍二两　台乌二两　青皮二两　半夏二两(炙)　稀莶草二两　麝香五钱(后兑)

【用法】用香油十斤将药炸枯,去滓,兑丹成膏,老嫩合宜。

【主治】顽痰恶风,入中经络,面神经痉挛。

祓

64658 祓除丸

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】雄黑豆(小者)一百二十粒(醋浸三日,去皮,研为膏)　砒霜(研)一钱　雄黄(研)半两

【用法】上三味除黑豆外,研令极细,与黑豆膏同研,为丸如梧桐子大,丹砂为衣,用素绢袋子盛。有患者,取二丸,未发时服一丸,面东新汲水下,临发时,更服一丸。令患者闭目服。

【主治】鬼疟。

【宜忌】忌食热物一日。

祖

64659 祖传固本还睛丸

《景岳全书》卷六十。为《医学正传》卷五"固本还睛丸"之异名。见该条。

神

64660 神丹

【方源】《鸡峰》卷二十九。

【组成】狼毒五钱　巴豆　蓖麻　芫花各二两　蜜四两　辰砂不拘多少

【用法】先将好纸淹烂和泥,入盐二两,将成砂子,以纸裹,用线系定,以蜜先滚了,次滚狼毒末,次将蜜和麻、巴、芫三末固济砂子,入泥再固济,周围两指厚,日中晒干;以醋和灰二三斗自炉底固济,次和泥毬包之,厚两指,次发火,用硬炭二十五斤(如无,用软炭三十斤);再用炭三十斤依前法煅之,用好砂五两为一料,用前草药分两固济,候煅了,研极细,以半夏曲糊为丸,如梧桐子大。每服量病浅深虚实,寻常以三二丸,空心以米饮送下。

【主治】肌肉如柴瘦,皮如树皮,痰多不食者。

64661 神丹

【方源】《得效》卷七。

【组成】刺猬皮一个(铁器中炒,焦黑为度)　皂角刺(烧存性)　硫黄(研)　猪牙皂角(去黑皮,蜜涂,炙)　白矾　枳壳(炒)　黄耆(蜜炙)　附子(去皮)各半两　白鸡冠花子一两

【用法】上为末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服七至十丸,空心、食前以温酒送下;不饮酒者以米饮送下;久年痔漏,可服至三四十丸;外痔,用药十丸与朱砂细研,蜜调涂。

【功用】消诸痔。

【主治】肠风,痔漏。

【加减】若服药觉热,加白鸡冠花子一两半或二两,更加三五丸服之,脏腑自调。

64662 神丹

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】天南星(光白大者)七个(剜作锅儿)　硇砂一两(填入南星锅内)　赤脚蜈蚣七个(去头足)　全蝎七个(去毒,上二味焙干,为粗末,俱入南星锅内,装满,仍用剜下南星末醋调封南星口)

上同南星以纸数十重裹了,用酒、醋浸透;于泥地上掘一穴坑,方圆一尺,四周排定砖,用炭十斤烧坑至砖通红,扫净;以酒、醋各二升泼在坑内,却将南星包儿放在中间,更以砖盖定,次用炭团团护之;经宿,次日取出,细切,焙干,碾为细末,入后药:

粉霜(另研)　辰砂各半两(另研)　麝香一钱(另研)　凌霄花一两(研细末)　针砂半两(米醋同炒,另研)

【用法】将前后药末相和,再为极细末,分作四份,一份猪心血为丸、一份羊心血为丸、一份羊蹄草根汁为丸、一份煮枣肉为丸,如小绿豆大。三岁儿每服三十丸,十岁儿每服一百丸,以灯心枣汤送下,一日三次。

【主治】诸痫癫倒,手足搐搦,或吐或不吐,

喉间有痰,咽下方甦。

64663 **神灯**

【方源】《痘疹一贯》卷六。

【异名】火照散(《医学心悟》卷三)、神灯照(《疡科捷径》卷上)。

【组成】雄黄 没药 朱砂 血竭各一钱 麝香二分

【用法】上为细末。用绵纸作捻,每捻药三分,蘸香油于灯上点着,离患处寸许,自外而内,周围徐徐照之,毒大者可用捻三根,日照二次;毒小者用捻一根,日照一次。重者不过五六日,已成者即消,已溃者即敛,阴疮不起发者,一照即起红晕,毒随火出,保无后患。

【主治】一切痈疽恶疮毒疖,不拘未成已成,未溃已溃。

64664 **神枕**

【方源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】当归 芎䓖 白芷 辛夷 杜仲(去粗皮) 藁本(去苗土) 肉苁蓉 柏实 薏苡仁 蘼芜 秦椒(去目及合口者) 木兰皮 蜀椒(去目及合口者) 桂(去粗皮) 干姜 飞廉 防风(去叉) 款冬花 人参 桔梗 白薇 荆实 山蓟 白鲜皮 乌头(去皮) 附子(去皮尖) 藜芦(去芦头) 皂荚 莽草 半夏 矾石 细辛(去苗叶)各半两

【用法】上㕮咀,纳枕中(作枕应于五月五日、七月七日采山阳柏木,长一尺二寸、高四寸、广三寸五分、容一斗二升,选柏心赤者为盖,悉厚四分,钻黍粟大孔三行,每行四十孔),后八味毒者安下,前二十四味香者安上,既满即用竹钉钉盖,四边悉用蜡封,惟上不用封,乃以绛纱三重裹之,其药一年一易。每用冬至为首,枕及一百日,筋骨强壮,身面光泽,即去一重纱;二百日血气充实,百疾皆愈,又去一重;三百日又去一重。三年后齿发益壮,容色还童。

【功用】令筋骨强壮,身面光泽,血气充实,百疾皆愈,齿发益壮,容色还童。

64665 **神烟**

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】桑树嫩枝

【用法】上以铜刀切碎,香炉贮之。微火烧熏患处,再用桑枝煎浓汁,绢帕蘸之,屡拭患处。熏至一二时后,或脓丁跃出,或流紫血而愈。

【主治】一切无名肿毒,背疽,疔疮。

64666 **神散**

《千金》卷二十二引济阁黎方。为原书同卷引浩仲堪方"王不留行散"之异名。见该条。

64667 **神散**

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】石燕一枚(先为细末,再研) 石韦(去毛)半两 (一方有海金砂一两)

【用法】上为细散。每服一字匕,煎三叶酸浆草汤调下。甚者三服愈。

【主治】小儿小便淋闭不通。

64668 **神膏**

【方源】《疡科选粹》卷八。

【组成】唐魏六钱 麝香九分 甘草三两 川乌三两 草乌三两 甘松 山柰各三两 雄黄三钱 朱砂三钱 桐油三斤 胡椒一两 密陀僧一斤三两(研极细末,取净末)六七两

【用法】先将桐油熬至三四滚,下甘草、川草乌、甘松、山柰,再煎一二滚,漉出滓,次下细药末,一滚即止。贴患处。

【主治】诸般肿痛毒,跌打损伤,痈疽发背。

64669 **神膏**

【方源】《洞天奥旨》卷十五。

【组成】金银花八两 蒲公英八两 木连藤八两 真麻油八两 黄丹十二两 乳香三钱 没药三钱 松香三两

【用法】上以麻油先煎金银花、蒲公英、木连藤至黑,滤去滓,入黄丹、乳香、没药、松香,煎成膏,去火毒。摊贴。

【主治】发背,诸疮疡,不论阴阳痈毒,皆可贴之。

【加减】阳疽,用冰片一钱,麝香二分,黄柏三钱,白芷三钱,五灵脂二钱,三七根五钱,洋

参三钱，各为末，掺入膏药贴之；阴疽，用肉桂三钱，冰片三分，人参一钱，丹砂三钱，紫石英三钱，儿茶三钱，五灵脂二钱，各为末，掺入膏内贴之。

64670　**神膏**

【方源】《华佗神医秘传》卷三。

【组成】乳香　没药　血竭　儿茶　三七各二钱　冰片一钱　麝香二分

【用法】上为末。掺用。或上药加豚脂半斤，蜂蜡一两，稍温用棉纸摊膏，贴痈疽破烂处。

【功用】去腐生新。

【主治】痈疽皮肤溃烂，及施割后。

【加减】杖伤，倍三七；有热，加黄连一钱；腐，加轻粉一钱；有火，加煅龙骨一钱；欲速收口，加珍珠一两，或加蟹黄(取团脐螃蟹，蒸熟取黄，晒干收用)二钱。

64671　**神人散**

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】人参二钱　白术三钱　甘草五分　肉桂三分　白豆蔻一枚　神曲五分　半夏三分　山楂五枚

【用法】水煎服。

【功用】补脾胃之气，调饮食之伤。

【主治】小儿疳证。因多餐水果，恣食肥甘，而致脾胃虚寒，身体黄瘦，毛竖肤焦，形如猿猴，状如刺猬，食土食炭。

64672　**神力丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】牛膝(去芦头，酒浸一宿，焙干)　肉苁蓉(酒浸一宿，焙干)　何首乌　川椒(去黑子闭口者，炒)各二两　木鳖子(去壳)　天南星(炮)　茴香(炒)　防风(去芦头)　草薢　附子(炮，去皮脐)　地龙(去土，微炒)　羌活(去芦头)　乌药　白蒺藜(炒，去刺)　骨碎补(去毛)　金毛狗脊(去毛)　黄耆　赤小豆　覆盆子　白附子各一两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十至五十丸，空心以温酒或盐汤送下。

【主治】风寒湿痹，客搏经络，四肢拘挛，及瘫缓亸曳，脚膝无力，筋骨疼痛。

64673　**神力丸**

【方源】《普济方》卷八十九引《经效济世方》。

【组成】乳香　没药　当归(洗净，去芦头)各半斤　草乌(好酒浸，春夏三日，秋冬五日，去皮)　晏木　威灵仙各一两　五灵脂二两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五丸，食后临卧以温酒送下，旋加至七八丸。

【主治】手足失力，麻痹冈胁，打扑风血凝滞，走疰作痛及瘫缓等疾。

【宜忌】服药后忌热物少时。

64674　**神力汤**

【方源】《圣济总录》卷十二。

【组成】人参　白茯苓(去粗皮)　木香　桂(去粗皮)　肉豆蔻(去皮)　草豆蔻(去皮)　防风(去叉)　附子(炮裂，去皮脐)　厚朴(去粗皮，生姜汁炙)　苍术(米泔浸软，去皮，细切，晒干，麸炒)　黄耆(薄切)　干姜(炮)　白术　当归(切，焙)　羌活(去芦头)　诃藜勒(煨，去核)　菖蒲　牛膝(酒浸，切，焙)　草薢　山芋　甘草(炙)　白芷　芍药　枳壳(去瓤，麸炒)　桔梗(锉，炒)　陈橘皮(去白，切，焙)　京三棱(煨，乘热锉)　蓬莪术(煨，锉)　吴茱萸(汤洗，焙干，炒)　大腹　五味子　芎藭　前胡(去芦头)　䓍酱　丁香各半两

【用法】上锉，如麻豆大。每服三钱匕，水一盏，入盐少许，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【主治】风劳冷气，及膀胱冷气，攻刺腹内疼痛；兼治妇人血风、血气及伤寒。

64675　**神力散**

【方源】《医方类聚》卷二十四引《烟霞圣效方》。

【组成】草乌头尖

【用法】上为细末。每服一字，以温酒调服。

【主治】破伤风。

64676 **神化丸**

【方源】《千金》卷十九。

【组成】茯苓 牛膝 薯蓣各六分 山茱萸 续断 大黄各五分 远志 泽泻 天雄 人参 柏子仁 防风 石斛 杜仲 黄连 菟丝子 栝楼根 白术 甘草 礜石 当归各一两 桂心 石南 干姜 萆薢 茯苓 蛇床子 细辛 赤石脂 菖蒲 芎䓖各二分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五丸，渐加至二十丸，酒送下，一日三次。

【功用】①《千金》：调中利食。②《千金方衍义》：清热燥湿，温补元阳，透表通肌，攻坚破结，分利阴阳，涩精滋血。

【主治】五劳七伤，气不足，阴下湿痒或生疮，小便数，有余沥，阴头冷疼，失精自出，少腹急，绕脐痛，膝重不能久立，目视漠漠，见风泪出，胫酸，精气衰微，卧不欲起，手足厥冷。

64677 **神化丹**

【方源】《普济方》卷一一六。

【组成】天麻（去苗） 附子（炮裂，去皮脐） 牛膝（酒浸一宿） 防风（去芦头） 地龙（去土，炒） 蝎梢（去毒，炒） 羌活（去芦头） 白僵蚕（炒，去丝嘴） 独活（去芦头） 肉桂（去粗皮） 当归（洗，焙） 干姜（炮） 虎胫骨（醋浸，炙黄） 半夏（生用） 败龟（醋浸，炙黄） 乌蛇肉（酒浸，去皮骨，取肉，焙干）天南星（生用） 白附子（生用） 黑参各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每一两作十五丸，朱砂为衣。每服一丸，温酒化下，不拘时候。

【主治】一切风，及瘫痪偏枯，疠风，卒中喑哑，神昏志乱，手足不遂。

64678 **神化丹**

【方源】《回春》卷三。

【组成】硇砂 干漆（炒） 血竭各三钱 红娘二十个（去翅） 乳香一钱半 斑蝥二十个（去翅足）

【用法】上为末，枣肉为丸，如豌豆大。每服一至三五丸，临卧以枣汤、姜汤或红花苏木汤任下。

【功用】消癖积，破血块，下鬼胎，通经脉。

【主治】诸痞积血气块。

64679 **神化丹**

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】马兜铃 水芹菜 旋覆花 酱瓣菜各半斤（俱生活用） 薄荷八两 五倍子五两

【用法】上为末，做成饼，置七日白毛出后，又采生的四样，捣烂绞汁，拌前饼子，又捣千余下，如此四十九次。每用半分，入舌上，闭口噙化。

【主治】痰证。

64680 **神化丹**

【方源】《疡医大全》卷七。

【异名】醉消散。

【组成】黑丑（头末） 母丁香 槟榔 何首乌 荆芥 荆三棱（醋炒） 熟地 蓬莪术（醋炒） 巴豆 五灵脂 大黄 白豆蔻（去壳） 桂枝 穿山甲 当归 赤芍药 川乌 小茴香 草乌 杏仁（炒） 全蝎（去足） 连翘 麻黄 甘草 桔梗 斑蝥 雄黄 朱砂各三钱 乳香（去油） 没药（去油）各二钱 麝香五分 大蜈蚣一条

【用法】上为细末，水泛为丸，如萝卜子大，朱砂为衣。每服三分，以热酒吞下，尽醉为度。被盖出汗。

【功用】双解表里，疏通经络，以毒攻毒，削坚导滞。

【主治】痈疽疔毒，一切无名肿毒初起。

【宜忌】孕妇、体虚禁用。

64681 **神手膏**

【方源】《普济方》卷五十一。

【组成】石灰一两 斑蝥七个

【用法】上蘸苦竹、麻油少许，却和匀，石灰揭调，然后入酽醋少许搅和。用时先用刀剔破痣，再取药适量人于内涂之。

【功用】去痣。

64682　**神乌丸**

【方源】《济生》卷三。

【组成】川乌(炮,去皮脐,切片,炒令变色)　虎胫骨(酥炙)　海桐皮　川萆薢各一两　川牛膝(去芦,酒浸)　肉苁蓉(酒浸)各一两半　金毛狗脊(燎去毛)半两

【用法】上为细末,用木瓜膏为丸,如梧桐子大。每服七十丸,空心、食前温酒送下。

【主治】远年近日干湿脚气。

【备考】造木瓜膏法:先用好艾叶以盐水洒湿,蒸炊久,再洒再蒸,凡三次;用宣木瓜一个(生),去皮瓤,切下盖子作一瓮子,填艾叶在内,将盖子合定,再蒸极软,去艾不用,只将木瓜研细为膏。

64683　**神乌散**

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】腊月乌鸦一个(全)　朱砂半两

【用法】将朱砂填入乌鸦口内,以麻缠乌嘴安瓶内,盐泥固济,用木炭一秤半煅一夜,取出为末。每服一钱,麝香酒调下,每日三次。连服十日愈。

【主治】小儿暗风痫。

64684　**神乌散**

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】浑黑老鸦一个(全者)　胡桃七枚　苍耳心子七个

【用法】用一藏瓶,逐入上药在内,盐泥固济,木炭火煅,烟尽为度,取出为细末。每服一钱,空心热酒调下。

【主治】小儿暗风痫。

【加减】疝气肾肿,阴囊偏坠,加新生孩儿胎衣一副同烧,依上法以葱椒热酒调下,看大小加减。

64685　**神丹丸**

【方源】《千金》卷九。

【组成】附子　乌头各四两　人参　茯苓　半夏各五两　朱砂一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,以真丹为色,如大豆大。每服二丸,食前以生姜汤送下,每日三次。服后须臾进热粥二升许,重覆汗出,止;若不得汗或汗少不解,复服如前法;若得汗足,应解而不解者,当服桂枝汤。若治疟,当于发前服二丸。此药多毒,服后热者令饮水,寒者温饮解之。

【功用】发汗。

【主治】伤寒脉涩,恶寒发热,体疼者。

【宜忌】《外台》引《崔氏方》:忌猪、羊肉、大酢、生血等物。

64686　**神丹煎**

《外台》卷十七引张文仲方。为原书同卷"枸杞子煎"之异名。见该条。

64687　**神巴丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】巴豆二粒(去壳)　乌梅肉一个(白梅亦可)

【用法】上为丸,如绿豆大。每服三丸,置口中;如牙关紧闭者,用少许揩牙即开。

【主治】喉闭。

64688　**神水丹**

【方源】《玉案》卷三。

【组成】天花粉　玄参各三钱　青黛　地骨皮各二钱　冰片四分　牛黄一钱　知母　川贝母各六钱

【用法】上为末,以藕汁熬膏为丸,如弹子大。噙化润下。

【主治】失音。

64689　**神水方**

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】出山铅十斤(打作二十片)　好酒　好醋各十斤

【用法】将二缸上下合封,上缸吊铅片,下缸贮酒、醋,中用一瓷盘架托铅片,用柴火煨十二炷香,取熏蒸于铅上之汽水。每服一匙。

【主治】瘵证。

64690　**神水膏**

【方源】《圣惠》卷九十。

【组成】密佗僧半两（细研）　栝楼根半分　淀花半分　丁香半分　附子半分（去皮脐）　麝香半分（细研）　莨菪子半合（水淘去浮者）　皂荚一挺（去皮子）　防风半分（去芦头）　朱砂　半分（细研）　土花消一分　沙参半分（去芦头）　人参半分（去芦头）　芎䓖半分　龙骨半分　槟榔半分　桂心半分　清麻油一斤　黄蜡二两

【用法】上为末，先取油入铛中，而后下诸药末，以慢火煎三二沸，后下黄蜡令消，次下麝香搅令匀，膏成，贮瓷盒中。用时涂于故帛上，外贴患处。三五次即愈。

【主治】小儿恶疮。

64691　**神水膏**

【方源】《经验良方》。

【组成】水银四十八钱　家猪脂二百钱

【用法】将水银入石臼内，加猪脂三十二钱，文火烊化，研和至不见星。和余家猪脂擦患处。

【主治】霉毒骨节疼痛，并诸部生结核者。

64692　**神功丸**

【方源】《脚气治法总要》卷下。

【异名】麻仁丸（《圣济总录》卷一五七）、神效麻仁丸（《外科精要》卷中）、各神丸（《普济方》卷三十九）、神功麻仁丸（《普济方》卷二八三）。

【组成】大黄三两　人参半两　诃子（泡，去核）二两　麻仁（另研）五两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，温水送下，不拘时候。以通为度，未通更加丸数。

【功用】①《脚气治法总要》：疏解秘滞。②《普济方》：调三焦，开胃口。

【主治】①《脚气治法总要》：脚气，腰脚疼肿胀满。②《活人书》：三焦气壅，心腹痞闷，六腑风热，大便不通，津液内枯，大肠干涩，里急后重，或下鲜血，痰唾稠粘，风气下流，腰疼脚重，脐下胀痛，溺赤如金。

64693　**神功丸**

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】阿魏（研）　丹砂（研）　雄黄（研）各一两　腊月狐肝（焙，研）二两　麝香（研）一钱

【用法】上为细末，重午日日未出时同粽子为丸，如梧桐子大。用时以绯线系一丸子病人中指上（男左女右）；若未愈者，则以桃仁汤送下一丸。

【主治】久疟不愈，恶寒壮热，百节疼痛，面色黄瘦。

64694　**神功丸**

《普济方》卷三十七引《余居士选奇方》。为原书卷四十三“加味神功丸”之异名。见该条。

64695　**神功丸**

【方源】《兰室秘藏》卷中。

【异名】神效丸（《片玉心书》卷五）。

【组成】兰香叶　当归身　藿香（用叶）　木香各一钱　升麻二钱　生地黄（酒洗）　生甘草各三钱　黄连（去须，择净，酒洗）　缩砂仁各五钱

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如绿豆大。每服一百丸，加至二百丸止，食远白汤送下；若治血痢、血崩、肠澼下血等，则空心以米汤送下。

【主治】多食肉人口臭不可近，牙齿疳蚀，牙龈肉将脱，牙齿落血不止；并治血痢及血崩，血下不止，血下褐色或紫色、黑色，及肠澼下血，脉洪大而缓者；及治麻木厥气上冲，逆气上行，妄闻妄见者。

【方论选录】《古方选注》：东垣意在清热，仍以去湿为首务。湿淫所胜，治以黄连、木香，以苦燥之；佐以兰香、藿香，以辛散之。热淫所胜，治以木香、砂仁之苦温；佐以升麻、甘草之甘辛；反佐以清胃散中之当归、生地滋湿之品，引领风燥之药，并去其血分之湿热。

64696　**神功丹**

【方源】《普济方》卷三三一。

【组成】枯白矾五钱一分　乌头一个（炒

黄)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如弹子大。用时以绵包之,临卧纳阴门内。

【主治】妇人赤白带下。

64697　**神功丹**

【方源】《玉钥》卷上。

【组成】人中白二两　黄柏六钱　青黛六钱(水飞)　薄荷叶六钱　儿茶一两　冰片六分

【用法】上为极细末。每日用七八次。

【主治】一切牙疳。

【备考】用药后涎外流不止者吉,无涎乃毒气内攻,则属不治之症。

64698　**神功汤**

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】知母　人参　龙骨　天麻　附子甘草

【用法】水煎服。

【主治】诸般内障。

64699　**神功饮**

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】罂粟壳十四个　甘草三寸　生姜一块　橘皮一两　黑豆一百二十粒

【用法】上用水二碗,煎至一碗,去滓,空心、食前分二次服;又次日五更,将滓以水一碗,重煎至七分服。

【主治】泻痢赤多白少者。

64700　**神功饮**

【方源】《玉案》卷六。

【组成】忍冬藤　蒲公英　甘草节　金银花各二钱　瓜蒌一个(连壳)

【用法】生酒煎服。

【主治】妇人乳内一核,初起如钱,不作疼痒,三五年成功红肿,溃时无脓,惟流清水,形如岩穴之凹。

64701　**神功散**

【方源】《圣济总录》卷一七七。

【组成】桃上寄生二两

【用法】上为散。每服半钱匕,如茶点服,每日三次。

【主治】小儿中蛊毒,腹内坚痛,面目青黄,羸瘦骨立,病变无常。

64702　**神功散**

【方源】《洪氏集验方》卷三。

【组成】黄连七寸(为末)　巴豆七粒(去皮,新瓦上出油)

【用法】上拌匀。令患者仰卧,先取药三斡耳子,着于患者脐中,再取三斡耳和艾一炷,如中指大,安于前药上,只灸一炷。觉脐腹间有声,即便汗出而愈。

【主治】结胸伤寒,不问阴阳二毒,只微有气者。

64703　**神功散**

【方源】《百一》卷十九。

【组成】五倍子　百药煎　干姜(炮)各等分

【用法】上为细末,每服一钱,米饮调下;大人煮糊为丸,如黍米大,每服三十丸,米饮送下。

【主治】小儿滑肠不止。

64704　**神功散**

【方源】《魏氏家藏方》卷九。

【组成】白及

【用法】上为细末。以雪水调令稀稠得所,涂遍鼻上,频用雪块熨药上;无雪则只用冷水扫,并用掠头子于发际处紧系。妇人无掠头子,用头发相接亦得。

【主治】鼻衄。

64705　**神功散**

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】北白芍药一两半　甘草一两

【用法】上㕮咀。每服三钱,水一盏半,煎至六七分,不拘时服。

【主治】消渴。

64706　**神功散**

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】雄黄(飞)半两　款冬花　甘草(炙)　肉桂(去粗皮)各一两

【用法】上为细末，入雄黄令匀。每用半钱，吸入咽喉中，不拘时候。

【主治】久咳嗽。

64707 神功散

【方源】《医方类聚》卷一九二引《吴氏集验方》。

【组成】大活鲫鱼一个（略破开肚，去肠脏，白纸揩尽血） 白矾若干

【用法】将白矾填满鱼肚，用布线缝口，再使麻枝扎定，文武火煅成炭存性，乳为末。用时入轻粉少许，先以葱椒汤将患处洗净揩干，再以麻油调敷。

【主治】臁疮。

64708 神功散

《普济方》卷一〇三。即《宣明论》卷三“神芎散”。见该条。

64709 神功散

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】黄芩 柴胡（去芦） 桔梗（去芦） 防风（去芦） 荆芥穗 陈皮（去白） 赤芍药 牛蒡子（炒） 枳壳（煨，去油） 木通 紫草 赤茯苓 甘草各等分

【用法】上锉。加灯心、白附子、麦门冬，水煎服；若便秘、大热，加煨大黄、糯米，水煎服。微利即止后服。

【功用】清心凉肌，解利热毒，免攻头目咽喉。

【主治】小儿痘疮大热，发狂谵语。

【加减】小热，加竹茹；大热，加北薄荷、山栀子仁、天花粉。

64710 神功散

【方源】《臞仙活人方》。

【组成】青黛三钱 铜绿二钱 晋矾二钱 黄柏二钱 藜芦二钱 枯矾二钱 黄连二钱 麝香半钱 轻粉四十九贴 芒消二钱 人言二钱（用红枣十枚，去核，匀分此物入内，于火内煅作灰）

【用法】上各为细末，入粉、麝研烂。随时擦之。

【主治】牙疳，臭烂涎出者。

64711 神功散

【方源】《外科经验方》。

【组成】黄柏（炒，为末）一两 草乌（炒，为末）一两

【用法】上以漱口水调，入香油少许。搽患处。如干，仍用前水润之。

【主治】发背痈疽及诸疮，不问肿溃。

【宜忌】《准绳·疡医》：忌气怒、房室劳役；饮酒之人忌饮酒并羊、鸡、鱼、肉、瓜茄、姜辣之物。

【备考】《准绳·疡医》本方用法：发背痈疽等疮才起者，将药敷于患处留头，候药干用淘米水常湿润，每日换药敷一次；如疮已成重患将溃烂者，先将槐枝、艾叶煎汤，顿温将疮洗净，用绢帛展去脓血，以香油润患处，用绵纸仍照患处剪成圆钱留头，贴上后用药涂于纸，如干依前用淘米水润，日换一次，听其自然流脓，不可手挤，如敷药后病入觉疮住疼减热即愈，如生肌则腐肉自落，腐而不落者剪割亦可。如治对口并脑疽，不必洗去旧药，逐次添药，恐动疮口惹风也。

64712 神功散

【方源】《外科理例·附方》。

【组成】白附子（生用） 黄耆 独活 蒺藜各等分

【用法】上为末。每服二钱，用猪腰子一个，批开入药，湿纸裹，煨熟，空心连腰细嚼，盐汤送下；风癣，酒送下。

【主治】臁腿生疮，浸淫不愈；类风癣（名肾脏风疮），如上攻则目昏花，视物不明；并一切风癣疥癞。

64713 神功散

【方源】《校注妇人良方》卷七。

【组成】五灵脂（炒）一两 莪术 桂心 芸薹子（炒）各半两

【用法】每服二钱，酒水煎服。

【主治】妇人血膈，血滞胸腹作痛。

64714 神功散

【方源】《疠疡机要》卷下。

【组成】黄柏(炒)　草乌(炒)　血竭各等分

【用法】上各另为末,和匀。以漱口水调搽患处。未成者即散,已溃者即消。

【主治】①《疠疡机要》:疮毒未成脓者,及小儿丹瘤。②《小儿痘疹方论·附方》:小儿痘毒肿焮作痛,未成者,或已溃者。

【加减】加乳、没尤妙。

64715　**神功散**

【方源】《古今医鉴》卷十四引何知府方。

【组成】川芎六两　当归六两　升麻六两　甘草六两

【用法】上为细末,取东流水煎三次,每次用水三碗,文武火煎至一碗半,滤下又煎二次,共收药水四碗半听用;又用好朱砂四两,以绢袋悬入瓷罐,加前药水封固,水煮尽为度;取出焙干为末,以纸罗过听用;再将糯米二三合以纸包紧,外用黄泥固济,入火炼红冷定,打碎,取米黄色者研末。每服以朱砂末一钱,米末一钱,炼蜜二匙,好酒二匙,白沸汤一小钟,共一处调匀,用茶匙喂尽取效。痘疹初起,服之可令不出;若见标者,服之毒气即散;陷者,服之即起。

【主治】小儿痘疹。

64716　**神功散**

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】蛤粉　谷精草各一两　绿豆皮　羌活　蝉蜕各五钱

【用法】上为末。每服三钱,以猪肝一具,入药末,线缝,煮汁同服。

【主治】癍疮翳膜眼。

64717　**神功散**

【方源】《准绳·幼科》卷五。

【异名】九味神功散(《痘疹活幼至宝》卷末)、九味神效散(《疡医大全》卷三十三)。

【组成】人参　黄耆　甘草　牛蒡子　红花　生地黄　前胡　紫草　白芍药

【用法】水煎服。

【主治】①《准绳·幼科》:小儿痘作渴。②《疡医大全》:痘初出稠密,红紫或带焦黑色者。

【备考】《种痘新书》有麦冬。

64718　**神功散**

【方源】《玉案》卷五。

【组成】杜仲四两(童便二碗煎干)　橘核一两五钱(同杜仲炒)　黄柏五钱(炒令褐色)

【用法】上为末。每服三钱,空心酒调下。

【主治】肾虚血滞、闪挫等一切腰疼。

64719　**神功散**

【方源】《幼科直言》卷二。

【组成】大黄　山楂肉　石膏　甘草梢　紫草　牛蒡子

【用法】水煎服。一二剂即效。

【主治】痘疮见苗以至起长之日,元气壮实,痘色干红而紫,大小便结塞不通,属大火症,非行利而不能透现者。

【宜忌】元气虚弱,大便通利者,不可用。

64720　**神功散**

【方源】《医级》卷八。

【组成】谷精草　蝉蜕　绿豆皮　猪蹄壳(酥炙)　藜芦各等分

【用法】上为末。将猪肝片批开掺药末,扎好蒸服。

【主治】疹斑疮入目,起星生障。

64721　**神术丸**

《直指》卷七。为《本事》卷三"苍术丸"之异名。见该条。

64722　**神术丸**

《中国医学大辞典》。即《杨氏家藏方》卷三"神术散"改为丸剂。见该条。

64723　**神术汤**

【方源】《圣济总录》卷十。

【组成】苍术(锉碎)四两　甘草　麻黄(去根节)各三两　猪牙皂荚四挺(去皮子)

【用法】上均生用,为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓温服,不拘时候。厚被盖

出汗。

【主治】外伤风邪，百节痠痛，头痛身重，遍体发热，气粗眼疼。

【加减】加葱白三寸，杏仁二枚，豆豉七粒，尤佳。

64724 **神术汤**

【方源】《阴证略例》。

【异名】神术散（《医方类聚》卷六十二引《经验秘方》）。

【组成】苍术（制）二两　防风二两　甘草（炒）一两

【用法】上㕮咀。加葱白三寸，生姜三片，水煎服。

【主治】内伤饮冷，外感寒邪，无汗者。

【加减】吹奶，调六一散三钱；太阳证，发热恶寒，脉浮而紧者，加羌活；太阳证，脉浮紧中带弦数者，是有少阳也，加柴胡；太阳证，脉浮紧中带洪者，是有阳明也，加黄芩。以上三证，约量每服加二钱匕。妇人服者，加当归；太阳寒水司天，加桂枝、羌活；阳明燥金司天，加白芷、升麻；少阳相火司天，加黄芩、地黄（生）；太阴湿土司天，加白术、藁本；少阴君火司天，加细辛、独活；厥阴风木司天，加川芎、防风。

【方论选录】《医方集解》：此足太阳药也。防风辛温升浮，除风胜湿，为太阳主药；苍术甘温辛烈，散寒发汗，辟恶升阳；加甘草者，发中有缓也。

64725 **神术汤**

《岭南卫生方》卷中。为《圣济总录》卷二十一“芎劳汤”之异名。见该条。

64726 **神术汤**

【方源】《伤寒全生集》卷二。

【组成】九味羌活汤加石膏　知母

【用法】加生姜、葱白，水煎服。

【功用】发汗。

【主治】夏月感冒风寒。

【加减】自汗，暑泻，不加葱。

64727 **神术汤**

【方源】《症因脉治》卷三。

【组成】苍术　石膏

【用法】与羌活防风汤同服。

【主治】湿温痠软症。头痛项强，骨节烦疼，两胫逆冷，遍身痠软，有汗者，脉左浮数。

64728 **神术汤**

《张氏医通》卷十三。即《杨氏家藏方》卷三“神术散”改为汤剂。见该条。

64729 **神术汤**

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】杜藿香三钱　制苍术一钱半　新会皮二钱（炒香）　炒楂肉四钱　春砂仁一钱（杵）　薄川朴二钱　清炙草五分　焦六曲三钱

【功用】温中疏滞。

【主治】素禀湿滞，恣食生冷油腻而成湿霍乱，陡然吐泻腹痛，胸膈痞满。

【方论选录】君以藿、朴、橘、术温理中焦，臣以楂、曲消滞，佐以砂仁运气，使以甘草缓其燥烈之性。此为温中导滞，平胃快脾之良方。

64730 **神术汤**

【方源】《伤寒大白》卷一。

【组成】苍术　石膏　防风　干葛

【主治】湿温见风项强。

【加减】症兼太阳少阳，加羌活、柴胡。

64731 **神术汤**

【方源】《伤寒大白》卷四。

【组成】防风　熟苍术　石膏　甘草

【主治】痠病湿热在表。

64732 **神术散**

《中藏经·附录》卷八。为《圣济总录》卷二十一“芎劳汤”之异名。见该条。

64733 **神术散**

【方源】《幼幼新书》卷二十一引《刘氏家传》。

【组成】白术（去芦）　人参　白茯苓（去皮）　石莲肉（去心）　罂粟米　白扁豆（炒）　藿香叶　甘草（炙）各等分

【用法】上为细末。每服半小钱，空心、日午

枣汤调下。

【功用】温养脾胃，消进奶食，匀气清神，调和脏腑。

【主治】小儿病后，脾胃虚弱，时时烦热，恍惚，睡中多惊，气急烦乱。

64734　**神术散**

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【组成】苍术五两(米泔浸一宿)　藁本(去土)　香白芷　羌活(去芦头)　细辛(去叶土)　甘草(炙)　川芎各一两

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，加生姜三片，葱白三寸，同煎至七分，温服，不拘时候；微觉伤风鼻塞，只用葱茶调下。

【主治】①《杨氏家藏方》：四时瘟疫，头痛项强，发热憎寒，身体疼痛；及伤风鼻塞声重，咳嗽头昏。②《张氏医通》：风木之邪，内干湿土，泄利下血，色清稀。

【方论选录】《张氏医通》：风能胜湿，苍术专主木邪乘土，故能治内外诸邪；风木之邪内干土脏，故用羌、藁、芷、辛等风药，兼川芎以引入血分，甘草以调和胃气，胃气散布有权，泄利下血自止。盖汗即血之液，夺其汗则血中之湿热邪气悉从外泄，而无内滞之患矣。

【备考】本方改为汤剂，名"神术汤"(见《张氏医通》卷十三)；改为丸剂，名"神术丸"(见《中国医学大辞典》)。

64735　**神术散**

【方源】《医方类聚》卷六十二引《王氏集验方》。

【组成】苍术(米泔浸，炒)　荆芥穗　藁本(去土)　干葛　麻黄(去根节)　甘草各等分

【用法】上㕮咀。每服四钱，水一盏半，加生姜三片，葱白三根，煎至一盏，热服，轻者一服。汗出愈。

【主治】伤寒伤风，头疼身痛，腰滞腿疼，发热恶寒，无汗。

64736　**神术散**

《医方类聚》卷六十二引《经验秘方》。为《阴证略例》"神术汤"之异名。见该条。

64737　**神术散**

【方源】《医学正传》卷二引罗太无方。

【组成】陈皮二钱　苍术　厚朴各一钱　甘草　藿香　石菖蒲各一钱五分

【用法】上细切，作一服。加生姜三片，大枣一枚，水一盏半，煎至一盏，去滓温服。

【主治】山岚瘴气，四时瘟疫，头痛项强，憎寒壮热，身痛者。

【加减】去菖蒲，加香附一钱，名神术散气散。

【方论选录】①《医方考》：是方也，用苍术之燥，以克制其瘴雾之邪；用厚朴之苦，以平其敦阜之气；菖蒲，辛香物也，能匡正而辟邪；甘草、陈皮，调脾物也，能补中而泄气。太无此方，但用理脾之剂，而解瘴毒之妙自在其中。②《医方集解》：苍术辛烈，升阳辟恶，燥湿解郁；厚朴苦湿，除湿散满，化食厚肠；陈皮理气，通利三焦；甘草和中，匡正脾土。此即平胃散，而重用陈皮为君者也。盖人之一身，以胃气为主，胃气强盛，则客邪不能入，故治外邪必以强胃为先也。加藿香、菖蒲，取其辛香通窍，亦能辟邪而益胃也。

【备考】本方方名，《医方考》引作"太无神术散"。

64738　**神术散**

【方源】《医方类聚》卷七十引《烟霞圣效方》。

【组成】苍术　夜明砂各等分

【用法】上为细末。每服二钱，将獖猪肝以竹刀批开，放药在内，线扎，米泔煮熟，食后和汤服之。

【主治】雀目。

64739　**神术散**

【方源】《永乐大典》卷九八〇引《卫生至宝》。

【组成】白术五钱(以木炭火蜜煮至焦，取出洗净，切片，焙)　天麻　白附子各二钱半　蝎梢三七个

【用法】上为末。量大小米饮调下。

【主治】小儿因吐泻，胃虚生风，作惊痫状。

64740 **神术散**

【方源】《普济方》卷一三一。

【组成】苍术二两（米泔浸，去皮，薄切，用麦麸炒） 川芎 藁本（洗） 荆芥各一两

【用法】上为粗末。每服五钱，以水二盏，加生姜三片，煎至一盏，去滓热服。

【主治】伤寒肌疏多汗。

64741 **神术散**

【方源】《袖珍小儿》卷四。

【组成】前胡 桔梗 干葛 荆芥 台芎 白芷 苍术各五钱 甘草一钱

【用法】上锉散。每服二钱，加生姜一片，水煎服。

【主治】小儿伤风，发热口渴。

64742 **神术散**

【方源】《医学心悟》卷三。

【组成】苍术（陈土炒） 陈皮 厚朴（姜汁炒）各二斤 甘草（炙）十二两 藿香八两 砂仁四两

【用法】上为末。每服二三钱，以开水调下。

【功用】解秽祛邪，除山岚瘴气。

【主治】时行不正之气，发热头痛，伤食停饮，胸满腹痛，呕吐泻利，鬼疰尸注，中食、中恶。

64743 **神龙丹**

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】文蛤（炒）二钱 白龙骨（煅）三钱 白茯神（去皮木）五钱

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温水送下。

【主治】遗精。

64744 **神龙散**

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【组成】胡桐律 雄黄各三两

【用法】上入坩锅子内，以文武火烧，烟尽为度；取出火，以小瓦子盖口，掘地坑子放于内，用新土培，留口出烟；经宿，研细，入真麝香少许。用时先以温浆水漱口，再取药一剜耳子许，掺贴患处。

【主治】走马牙疳。

64745 **神归汤**

【方源】《痘疹传心录》卷十七。

【组成】人参 麦门冬 茯神 当归 甘草

【用法】水煎服。

【主治】小儿心气不足，烦躁多惊。

64746 **神仙丸**

《外台》卷十三。为原书同卷引《古今录验》"五疰丸"之异名。见该条。

64747 **神仙丸**

【方源】《幼幼新书》卷九引《张氏家传》。

【组成】朱砂六钱（用五钱，以一钱为衣） 人参 沉香 全蝎（微炒） 白僵蚕（微炒） 天麻（炙）各半两 天南星一个（重三两者，炮） 川芎一两 附子一个（重六钱者，炮） 五灵脂一两（只用八钱） 乳香一钱半 蜈蚣二条（酒浸，和蛇头一处浸） 白花蛇头 乌蛇头各一个（连皮骨，酒浸三四宿） 花蛇七钱（项后由七寸以后和皮骨一二两，取七钱净肉，连蛇头一处浸） 牛黄 麝香 脑子 没药 血竭 硇砂（细研）各一钱 雄雀一个（去肠胃，纳硇砂，用盐泥固济，文武火煅）

【用法】上为末，以绝好酒为丸，如弹子大。治大人中风瘫痪，每服半丸，早晨用酒磨下；小儿急慢惊风，每丸分为四服，以薄荷酒磨下。

【主治】小儿急慢惊风；兼治中风瘫痪。

64748 **神仙丹**

《普济方》卷九十三。即《杨氏家藏方》卷一"雄仙丹"。见该条。

64749 **神仙方**

【方源】《诚书》卷六。

【组成】大蓝（阴干） 凌霄花 蜀大黄 牙消各一分

【用法】上为末，羊髓为丸。磨化送下。

【功用】令儿吃乳。

【主治】儿百日内无故口唇青不食。

【宜忌】寒证忌用。

64750　**神仙汤**

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】白芷　防风　牛膝　五加皮　当归　连翘　威灵仙　白鲜皮各一两　牙皂　木香　皂角刺　明天麻各三钱　白豆蔻六十个　土茯苓二斤

【用法】上锉为二十剂。水煎，早晚各服一次。服尽除根。

【主治】天疱、杨梅疮；兼治发背、毒疮。

【宜忌】忌食茶、醋、绿豆、豆腐、鸡、羊肉。

64751　**神仙饮**

【方源】《玉案》卷三。

【组成】黄耆　人参　白术　知母　附子各一钱　当归　柴胡　玄参各一钱五分

【用法】水煎，温服。

【主治】阴经喉痹，服凉药反痛者。

64752　**神仙枕**

【方源】《中国医学大辞典》引丁其泰方。

【组成】川椒　桔梗　荆实子　柏子仁　姜黄　吴茱萸　白术　薄荷　肉桂　川芎　益智仁　枳实　全当归　川乌　千年健　五加皮　蒺藜　羌活　防风　辛夷　白芷　附子　白芍药　藁本　苁蓉　北细辛　猪牙皂荚　芜荑　甘草　荆芥　菊花　杜仲　乌药　半夏各一两

【用法】上为细末，绢袋盛之，另用槐木薄板做枕一个，高三寸三分，宽四寸五分，长一尺二寸，如天盖地，一面上钻孔一百二十八个，如梧桐子大，将前药装入枕中，其药每间三五个月一换。百日后诸病消除，精神倍长，如夫妇皆以此作枕，更见奇效。

【功用】种子，除百病。

64753　**神仙枣**

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】银花　归身各一两　甘草三钱　乳香(去油)　五倍子　黄耆　白僵蚕　白芷各五钱

【用法】上以水六碗，煎剩一半；取滓，再以水六碗，煎至一半，前后共成六碗，去滓代水，将红枣二斤煮熟。四五日食完。疮极重者，同时外敷疮药。

【主治】患疮日久体虚。

64754　**神仙枣**

【方源】《喉科指掌》卷一。

【组成】江子霜　白细辛　牙皂　蟾酥　真当门麝香各等分

【用法】上为极细末，用枣一个去核，并将枣肉稍去之，只留薄肉一层作卷筒，将药填内约一分许，两头留孔通气。用时塞鼻孔中(男左女右)，俟嚏则取出，后再塞入一伏时去之。若痰多上壅者，用米饮灌之。

【主治】一切喉风、喉蛾。

64755　**神仙鸭**

【方源】《验方新编》卷十一。

【组成】乌嘴白鸭一只(去净毛，破开，去肠杂，不可用水)　白枣四十九枚(即南枣，去核)　白果四十九个(去壳)　建莲四十九粒(去心)　人参一钱　陈甜酒三大酒杯　好酱油二酒杯

【用法】上各放鸭肚内，装入瓦钵(不用放水)，封紧蒸烂。陈酒送服。

【功用】健脾益精。

【主治】劳伤虚弱。无病者亦可食之。

【加减】如无乌嘴白鸭，可以白毛老鸭代之；无人参，可用玉竹四钱九分；加姜汁少许亦可。

64756　**神仙酒**

【方源】《解围元薮》卷四。

【组成】闹羊花根三斤　生姜四两　红枣六两　醇酒二十碗　酒浆十碗

【用法】上药浸入酒内，煨熟去滓。临卧时服一小杯。

【主治】痛风，遍身僵肿及半身不遂；并治外广疮、寒湿等。

64757　**神仙酒**

【方源】《奇方类编》卷下。

【异名】家常八仙酒(《仙拈集》卷三)。

【组成】川乌（烧存性） 草乌（烧存性） 当归 薄荷叶 淡竹叶 生甘草 良姜 陈皮各一钱二分 干烧酒十斤 甜酒五斤 红砂糖二十两

【用法】先用水、醋将红砂糖调匀，去滓，入酒内，再以绢袋盛药，浸酒内五日。随量饮之。

【功用】久服大有补益。

64758 **神仙酒**

【方源】年氏《集验良方》卷三。

【组成】肥生地黄一两 牛膝五钱 菊花一两 当归一两 干烧酒十斤 甜水五斤 红砂糖二十两 好陈醋二十两

【用法】先以水、醋将红砂糖调匀，去滓，入酒内，再以绢袋盛药浸入酒内。五日后随量饮之。

【功用】添筋力，补益。

64759 **神仙粥**

【方源】《寿世保元》卷四。

【组成】山药（蒸熟，去皮）一斤 鸡头实半斤（煮熟去壳，捣为末） 粳米半升

【用法】上以慢火煮成粥。空心食之。食后用好热酒饮一二杯更妙。

【功用】补虚劳，益气强志，壮元阳，止泄精。

【主治】劳瘵泄精。

【加减】加韭子末二三两尤妙。

64760 **神仙粥**

【方源】《玉案》卷二。

【组成】带皮老姜三两（捣烂）

【用法】上以热酒浸泡。饮酒。饮后出汗，轻者即愈，重者可解一时之急。

【功用】发汗。

【主治】冒雨受寒，身热作饱，不思饮食，头疼者。

【备考】本方方名，据剂型，当作“神仙酒”。

64761 **神仙粥**

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】葱白七条（连根叶） 生姜五大片（捣碎） 白糯米一撮

【用法】上以水三碗，煎清粥二碗，再入老醋半小盏，乘热饮之。待汗大出而愈。

【主治】伤寒阴阳两感，初起发寒热。

【加减】病入肚内饱胀，不思饮食，去糯米。

64762 **神仙煎**

【方源】《鸡峰》卷二十五。

【组成】茯苓 枸杞子 菊花 生地黄 杏仁各四两

【用法】上为细末，酒蜜面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心以温酒、米饮任下。

【功用】乌髭。

64763 **神仙膏**

【方源】《圣济总录》卷一四八。

【异名】膏药（《普济方》卷三一三）。

【组成】铅丹三两（炒令紫色） 清麻油六两 杏仁四十个（不去皮尖，捶破，绵裹） 当归半两（切碎，绵裹） 桃柳枝各二十一茎（俱长一寸）

【用法】上先用慢火煎油，约三时辰，即入杏仁、当归两裹子，候杏仁黄紫色，漉出二味；却入桃柳枝煎，亦如杏仁等时候漉出；别用绵滤过再煎，下铅丹，用柳木篦搅，一向左转不住手，至稠取膏少许滴水中，若直坠下水底，不散在水面，其膏成矣；倾在瓷器中候冷，却以新汲水浸一宿，来晨去水收贮。每取少许，摊贴疮上。

【主治】马汗血入疮。

64764 **神仙膏**

【方源】《普济方》卷四〇六。

【组成】南星 滑石各等分 麝香少许

【用法】上为末，以生地黄汁、铁槽泥调成膏。外敷患处。

【主治】小儿游肿赤痛。

64765 **神白丸**

【方源】《幼幼新书》卷十九引郑愈方。

【组成】天南星 半夏（汤洗七遍）各半两 白僵蚕 白矾（生用）各一分

【用法】上为末，用杏仁七个（去皮尖），巴

豆一粒同研匀，再用去皮生姜汁为丸，如梧桐子大，阴干。每服五丸，暴嗽，以生姜汤吞下；久嗽，嚼胡桃肉、黄蜡各少许吞下。

【功用】利膈下涎，去心胸噎塞。

【主治】小儿心胸噎塞不止，咳嗽。

64766　**神白丹**

【方源】《宣明论》卷三。

【组成】铅白霜一分　轻粉半两　粉霜一两(用白面六钱和作饼子，炙熟，同研)

【用法】上为末，水为丸，如梧桐子大。每服十至十五丸，以米饮送下。

【主治】伤寒积热及风生惊搐，或如狂病，诸药不效。

64767　**神白散**

【方源】《医方类聚》卷二十引《神巧万全方》。

【组成】石膏　白附子(炮)　天南星(炮)　白芷　甘菊花　京芎　天麻各等分

【用法】上为末。每服一钱，先嚼薄荷三五叶，再以温酒调下。

【主治】头风。

64768　**神白散**

【方源】《养老奉亲》。

【组成】白芷二两　甘草一两

【用法】上锉，如骰子大，用慢火一处炒令深紫色，勿令焦黑，放地上出火毒，杵为末。每服一钱半，水八分或一盏，加生姜二片，大枣二个，同煎至六分，通口服。如伤寒时疾，去姜、枣，加葱白三寸，豉五十粒，依前服，如人行五七里已来更服，汗出为妙。

【主治】风气。

64769　**神白散**

【方源】《圣济总录》卷六十九。

【组成】人中白不拘多少

【用法】上刮在新瓦上，用火逼干，研令极细。每服二钱匕，入麝香少许，以温酒调下。

【主治】血汗从肤腠出。

64770　**神白散**

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】半夏(齐州者)一枚

【用法】上为极细末，入龙脑一小皂子许，同研匀。用津唾于手心调令稀稠得所，摊软纸上贴之。即冷如冰，良久有清水出则渐消；如未全愈，再贴，去根本为妙。

【主治】痔疾下部发肿如梅李大，痛硬不能行者。

64771　**神白散**

【方源】《幼幼新书》卷八引《凤髓经》。

【组成】神曲(炙)　人参　茯苓　藿香叶　甘草(炒)　黄耆(蜜炙)各一分　白附子(炮)一钱　大附子一个(炮，去皮尖)

【用法】上为细末。每服半钱，以紫苏汤调下。

【主治】小儿脾困冷泻，多睡不醒，呕逆，心闷乱，喉内生涎。

64772　**神白散**

【方源】《卫生总微》卷十五。

【组成】槐花半两(微炒)　蛤粉一两

【用法】上为细末。每服半钱或一钱，煎柳枝汤调下。

【主治】小儿血妄行，诸吐衄便溺等。

64773　**神白散**

【方源】《宣明论》卷十。

【组成】益元散加麻黄二两(去节)

【用法】上为细末。每服三钱，用蜜少许(无蜜亦可)，温水调下；或欲冷饮者，新井泉水调下亦得，一日三次；解利发汗，每服水一盏，加葱白五寸，豆豉五十粒，煮取汁七分调，并三四服。以效为度。

【主治】伤寒证用益元散不愈或小减者。

64774　**神白散**

【方源】《伤寒广要》卷十一引《卫生家宝》。

【组成】苍术(米泔浸一宿，去皮，焙干)一两半　麻黄一两(去根节)　甘草一两(炙)　防风一两(去芦)　石膏一两(研)　干葛一两　川芎一两　香白芷半两　瓜蒌根半两

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，葱白三寸，煎至七分，热服。如伤风，身

热面赤，脉大，以衣覆取汗，即愈。

【主治】四时伤寒在表，浑身壮热，口苦舌干，恶风无汗。

64775 **神白散**

《儒门事亲》卷十三。为《宣明论》卷十“益元散”之异名。见该条。

64776 **神白散**

《本草纲目》卷十四。即《普济方》卷一四七引《卫生家宝》“圣僧散”。见该条。

64777 **神白膏**

【方源】《得效》卷十九。

【组成】南星　大黄　草乌　白蔹各半两　蚌粉　大柏皮各一两　小赤豆一合

【用法】上为末。用芭蕉头研取油调敷四畔。

【主治】五发未破。

【加减】加乳香、没药尤妙。

64778 **神让散**

《普济方》卷三〇五引《德生堂方》。为《宣明论》卷十五“鬼代丹”之异名。见该条。

64779 **神穴丸**

《圣济总录》卷六。为《幼幼新书》卷十引《灵苑方》“归命丹”之异名。见该条。

64780 **神穴丹**

《幼幼新书》卷十引《灵苑方》。为原书同卷“归命丹”之异名。见该条。

64781 **神圣丸**

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】雌黄　铅丹各一两

【用法】上为细末，以醋一升熬稠为丸，如梧桐子大，与恶实末同收。每服十丸，临卧煎恶实末汤送下。

【主治】风痫涎潮。

64782 **神圣丸**

【方源】《圣济总录》卷三十五。

【组成】黑豆小者二十一粒（水浸，去皮）　砒霜（研）一钱　大枣一枚（煮，去皮核）

【用法】上须于重午七夕日修合，研末为丸，如豌豆大，以丹砂为衣。于发日早晨，将药一丸面北香上度过，用冷茶清送下。

【主治】间日疟。

【宜忌】忌热物一复时。

64783 **神圣丸**

【方源】《幼幼新书》卷二十五引《孔氏家传》。

【组成】胡黄连（去皮）　宣连（去毛）　白芜荑（去皮）　木香　芦荟各一钱　使君子二十枚

【用法】上除芦荟一味外，五味银器内用猪胆汁熬成膏，后入芦荟同丸，如绿豆大。每服五七丸，空心、日午、临卧以米汤送下。

【功用】小儿疳。

64784 **神圣丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷十七。

【组成】乌蛇头（醋浸一宿，炙黄）　蛇黄（火煅，醋淬三遍）　白僵蚕（炒，去丝嘴）　防风（去芦头）　天麻各一两　五灵脂半两　代赭石半两（火煅，醋淬三遍）　全蝎一钱（去毒，微炒）　麝香一分（别研）　朱砂一钱（别研）

【用法】上为细末，糯米煮糊为丸，每一两作四十丸，金箔为衣。一岁一丸，分三服，薄荷汤磨下；急惊，用磨刀水磨下；慢惊，煎荆芥汤磨下，不拘时候。

【主治】小儿急慢惊风，胸膈涎盛，口眼牵引，手足搐搦。

64785 **神圣丸**

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】乌蛇肉（米醋浸，炙）　直僵蚕（炒）　防风　天麻　南星（牛胆制）各半两　五灵脂　代赭石（煅，醋淬）各二钱半　全蝎（焙）　朱砂各一钱

【用法】上为末，粟米糊为丸，如梧桐子大，每服一丸，急惊，荆芥汤送下；慢惊，生姜汤送下。

【主治】惊风，痰盛搐搦，口眼牵引。

64786 **神圣丸**

【方源】《医方类聚》卷一四一引《施圆端效

方》。

【组成】川当归(焙)　枳壳(麸炒,去瓤)　黄耆　陈皮各四钱　甘草(炒)三钱　干姜(炮)一钱半　御米壳(去蒂,蜜炒)二两半

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,细嚼,食前以米饮送下,每日二次。

【主治】泻痢脓血,腹痛后重。

64787　**神圣丸**

【方源】《普济方》卷四〇四。

【组成】无椒盐蒸饼一个(去皮)

【用法】取腊月活兔儿之血，和蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三五丸，以好酒化下，不拘时候。若咽下咽喉，须臾发疮疹红活，大有神效。

【主治】小儿疮疹黑陷倒靥。

64788　**神圣丸**

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】人参　茯苓　大附子各五钱　鹿茸五钱　干姜五钱　粉甘草三钱

【用法】炼砂糖为丸,如龙眼大。泻,以米汤送下;吐,以生姜汤送下。

【主治】脾胃虚寒,泄泻呕吐,遍身寒凉,痘色灰白。

64789　**神圣丹**

【方源】《普济方》卷一九七引《圣惠》。

【组成】大蒜一头(分开四片)

【用法】上纳巴豆一粒,湿纸裹煨熟,去巴豆,入黄丹为丸,如鸡头子大。每服一丸,先发寒者,用东南桃枝七寸煎汤,发日五更面北服;发热者,用冷水送下;未全安,次发又可进一服。

【主治】疟疾。

64790　**神圣丹**

【方源】《大全本草》引《简要济众方》(见《医方类聚》卷一二二)。

【组成】砒霜半钱(研)　黑豆面一钱

【用法】上为细末,滴水为丸,如小豆大,雄黄为衣。每服一丸,未发时,空心面东以新水送下。

【主治】疟疾。

64791　**神圣丹**

【方源】《医方类聚》卷一二三引《经验良方》。

【组成】大蒜一个

【用法】上于端午日用箸头扎一孔,入去壳巴豆一粒,蒜大者,入豆二粒,湿纸裹煨令熟,去豆不用;将蒜去外一重皮,烂研,再入大蒜五个,入辰砂一钱,宿蒸饼为丸,如梧桐子大。当发日服一丸,空心井花水送下。十岁以下,丸如麻子大。

【主治】久疟不愈。

【宜忌】忌三日生冷油腻,仍戒热汤物一时。

64792　**神圣粉**

【方源】《圣济总录》卷一一〇。

【组成】轻粉一分

【用法】先用少许炭灰渗地面如钟大,次烧小木炭十数片,簇定,吹令火盛,即倾粉其上,以新大瓷钟一只盖之,四下速拨灰塞缝,勿令烟透,更滴十数滴冷水于钟底,候冷取起钟;见粉烟飞粘钟内,旋以指点水刮洗下,用两重楮纸裹盛,绞出水银珠子,如赤豆大。用时以指甲挑入不病眼边耳内,须侧卧,摇令药到耳底,以软纸塞耳。当时不痛,即开得眼。或未效,次日再如前法煅,取一豆大,挑入病眼边耳内,立效。

【主治】痘疮入眼睛,上作白翳,遮障不明,刺痛不可忍者。

64793　**神圣散**

【方源】《圣惠》卷四十。

【异名】神金散(《病机沙篆》卷下)。

【组成】麻黄半两(去根节)　细辛半两　干蝎半两(一半微炒,一半生用)　藿香半两

【用法】上为细散。每服一钱,以薄荷酒或荆芥汤调下,不拘时候。

【主治】①《圣惠》:夹脑风,及洗头后伤风,头偏痛甚者。②《普济方》引《十便良方》:脑风,项背怯寒,脑户极冷,头痛不可忍,连眉骨

项彻腮顶痛，并治妇人血气。

【备考】本方干蝎，《医学纲目》作“干葛”。《普济方》引《十便良方》本方用法：每服二钱，煎荆芥、薄荷汤调下，或茶清、薄荷酒调下。

64794 神圣散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】干蛤蟆一枚（五月五日取者，去足肚肠） 独颗蒜一颗（捶碎） 川椒半两（去目）

上入蛤蟆腹中，用春大麦面饼子裹，烧令焦黄色，捣罗为末。

麝香一钱 龙脑半钱 芦荟一分 朱砂二钱雄黄二钱

【用法】上为细散。每服半钱，以粥饮调下，每日三四次。

【主治】小儿疳痢，腹大口干，四肢羸弱，下痢不止。

64795 神圣散

【方源】《圣济总录》卷一五九。

【组成】干猪胎 鲤鱼皮 女人乱发各一两（入瓶子内，烧令焦） 铛墨 伏龙肝（细研）各半两 墨（煅，醋淬三度） 当归（切，焙） 桂（去粗皮） 芍药 白僵蚕（炒） 白芷 白附子（炮） 芎䓖各一两

【用法】上为细散。每服三钱匕，临产腹痛时以热酒调下，便子母俱无恙；治月内诸血疾，则于产后每日空心一服。

【主治】妇人难产及横逆生，并治产后月内诸血疾。

64796 神圣散

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】黄橘皮三钱 白矾一两 甘草二分 川芎半两 黄丹 朱砂各半分 木香一分 米囊子二十个

【用法】上为细末。每服一大钱，用熟水七盏倒流七次，临卧调服。服后将蒜一块，生姜三片，川芎一皂子大，同以湿纸裹，烧焦去纸。烂嚼，以熟水送下。

【主治】泻痢。

64797 神圣散

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】蛇皮（高处得者）二寸

【用法】上在灯焰上烧为灰，入麝香少许，同研细。发前以葱白酒调下。

【主治】疟疾。

64798 神圣散

【方源】《普济方》卷二一一引《海上名方》。

【组成】罂粟壳 乌梅肉 干姜 肉豆蔻各半两

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，加生姜五片，煎至七分，温服，不拘时候。

【主治】寒证泻痢不止。

64799 神圣散

【方源】《普济方》卷二七七。

【组成】杏仁（炒焦） 出衣粉子（炒黄色） 牛粪（烧灰）各等分

【用法】上为细末。冷水调，用翎毛扫之，或用香油调涂。

【主治】汤火所伤。

64800 神圣散

《袖珍》卷二。为原书同卷引《圣惠》“乳香定痛散”之异名。见该条。

64801 神圣散

【方源】《济众新编》卷五。

【组成】枯白矾 石硫黄各一钱五分 黄丹一钱三分 朱砂一钱 胡桐泪三分 轻粉 麝香各一分五厘

【用法】上为末，以白及糊作锭。纳于疮孔。

【功用】生肌合疮。

【主治】诸般恶疮，无名肿毒，及天疱疮。

64802 神圣膏

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】木香一两 雄黄一两（细研） 桂心一两 赤芍药一两 当归一两 人参一两（去芦头） 附子一两（生，去皮脐） 丁香一两 白芷一两 黄耆一两 没药一两 芎䓖一两 防风一两（去芦头） 甘草一两 沉香

一两　细辛一两　乳香一两　白檀香一两　甘松香一两　蜡二两　松脂一两　垂柳枝二两　柏枝三两　黄丹一斤　清麻油三斤

【用法】上锉细，先煎油沸，下甘松、檀香、柳、柏枝，以慢火煎半日，俟色赤黑，即滤去滓；下诸药，文火煎，候白芷色黑，滤出滓；下蜡、松脂令消，以绵滤过；净拭铛，却下药油，入黄丹，再着火煎，不住手搅，候变色黑，滴安水中如珠子即膏成，以瓷盒盛。用时于帛上摊贴，每日早、晚换之。取愈为度。

【主治】发背痈疽，疮肿结硬，痛不可忍。

64803　神圣膏

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【异名】茱萸膏(《普济方》卷二九九)。

【组成】吴茱萸一两

【用法】上为末，用酸醋一大盏，调熬成膏，再入地龙末半两搅匀。每临卧时，先用葱椒汤洗足拭干，用药遍涂两脚底心，或以帛绵系定。次日必减，未减再涂。

【主治】①《圣济总录》：下冷口疮。②《普济方》：咽喉痛。

64804　神圣膏

【方源】《鸡峰》卷二十二。

【组成】蛇蜕皮一分　乌蛇　五倍子各半两　巴豆二十个　雄黄　牙消各一钱

【用法】用生油四两先煎，闻油香即入前四味，候巴豆焦黑色，漉出诸药不用，入雄黄、牙消二味搅匀，别入黄蜡一两同熬，以蜡熔为度。用时贴患处。

【主治】风毒恶疮。

64805　神圣膏

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【组成】当归半两　没药三钱　白及二钱半　乳香三钱　藁本半两　琥珀二钱半　黄丹四两　木鳖子五个(去皮)　胆矾一钱　粉霜一钱　黄蜡二两　白胶三两　巴豆二十五个(去皮)　槐柳枝一百二十条(各长一把)　清油一斤

【用法】上先将槐柳枝下油内煮焦取出，次下其余药物，煮得极焦亦捞出，却将油澄清再熬成膏子。用绯绢摊贴。

【主治】一切恶疮。

64806　神圣膏

【方源】《卫生宝鉴》卷十三。

【组成】车脂不拘多少

【用法】上制成膏。摊纸上如钱大，贴之，二日一换。三五次针自出。

【功用】取针。

【主治】针误入皮肤。

【备考】《金鉴》本方用法：以药膏调磁石末摊纸上贴之。

64807　神圣膏

【方源】《杂类名方》。

【组成】当归半两　杏仁四十九个　沥青一两　木鳖子五个(去壳)　黄丹三两　乳香四钱(另研)　麝香　鹰条　轻粉各不拘多少　桃柳枝(各长三寸)各四十九枝

【用法】用小油半斤，以绵裹当归、杏仁、木鳖子、桃柳枝，于沙石器内文武火熬，却用一枝粗槐稍缚短嫩枝搅之，药焦取出不用；乃离火下黄丹、沥青搅匀，再上火少时，以滴水不散为度，勿令伤火，软硬俱不中；后入乳香、麝香、轻粉、鹰条毕，倾于水盆内凝滞。

【主治】瘰疬及一切恶疮。

64808　神圣膏

【方源】《普济方》卷三一二引《德生堂方》。

【组成】赤小豆　木鳖子(去壳，别研)　蓖麻子(去壳，另研)　羌活　姜黄　草乌　血竭　大黄　知母　白芷　川乌　白及　白蔹　防风各一两

【用法】上为细末。随病大小，用好酒、醋、蜜调。敷伤损处，干再敷。

【功用】止痛接骨。

【主治】跌伤。

64809　神机丹

【方源】《叶氏女科》卷四。

【组成】黄耆(蜜炙)二两　白术(蜜炙)三两　茯苓　白扁豆(炒)　建莲肉(去心)　薏

苡仁(炒) 山楂肉各一两 炙甘草六钱 广陈皮六分 石菖蒲(九节,去皮,桑枝拌蒸)一两六钱

【用法】上为极细末。先用伏翼(即蝙蝠)烧灰,研细,米饮调下五分,每日四五次,急令断乳。随用神机丹,月内小儿每服一分,逐月加一分,周岁儿每服一钱二分;二岁儿每服一钱五分;三岁儿每服二钱,五岁以后每服三钱,白汤调下。间服交泰丹。

【主治】魃病。妇人先有小儿,未能行走,而母复有胎妊,使儿饮此乳,则作魃病,令儿黄瘦骨立,精神不爽,身体痿瘁。

64810 **神芎丸**

【方源】《宣明论》卷四。

【异名】加减三黄丸(《绀珠》卷下)、神芎导水丸(《医学纲目》卷四引《绀珠》)、导水丸(《保命歌括》卷四)。

【组成】大黄 黄芩各二两 牵牛 滑石各四两 黄连 薄荷 川芎各半两

【用法】上为细末,滴水为丸,如小豆大。始用十丸至十五丸,每服加十丸,温水送下,冷水下亦得,一日三次;或炼蜜为丸愈佳,以利为度。若热甚须急下者,便服四五十丸,未利再服,以意消息。三五岁小儿,丸如麻子大。此药至善,常服二三十丸,不利脏腑,但有益无损。

【功用】①《宣明论》:常服保养,除痰饮,消酒食,清头目,利咽膈,宣通结滞,强神健体,耐伤省病,推陈致新。②《医学六要·治法汇》:清利三焦,宣通郁结。

【主治】痰火内郁,风热上侵,烦躁多渴,心神不宁,口舌生疮,咽喉干痛,胸脘痞闷,肢体麻痹,皮肤瘙痒,大便干结,小便赤涩,小儿积热惊风。

①《宣明论》:一切头目眩晕,风热杂病,闷壅塞,神气不和,及小儿积热,惊风潮搐。②《御药院方》:肾水真阴本虚,心火狂阳积甚,以致风热壅滞,头目昏眩,肢体麻痹,皮肤瘙痒,筋脉拘倦,胸膈痞闷;或鼻窒鼽衄,口舌生疮,咽嗌不利,牙齿疳蚀;或遍身多生疮疥,或睡语咬牙,惊惕虚汗;或健忘心忪,烦躁多渴;或大小便涩滞,烦热腹满;或酒过积毒;或劳役过度,一切劳损,神狂气乱,心志不宁,口苦咽干,饮食减少,变生风热诸疾,虚羸困倦,或酒病瘦悴;或脾肾阴虚,风热燥郁,色黑齿槁,身瘦耳焦;或热中烦满,饥不欲食;或瘅成消中,善食而瘦,或消渴多饮而数小便。③《准绳·类方》:湿内甚,目赤肿或白睛黄色。④《张氏医通》:水肿内外俱实者。⑤《金匮翼》:梦遗。

【宜忌】①《宣明论》:脏腑滑泄,重寒脉迟,妇人经病,产后血下不止者,及孕妇不宜服。②《保命歌括》:非气脉实热甚者,不可轻服,常服宜少不宜多。

【临证举例】梦遗 《金匮翼》:一中年梦遗,与涩药不效,改与神芎丸下之,后与猪苓丸遂愈。

64811 **神芎丸**

《宣明论》卷四。为原书同卷“妙功藏用丸”之异名。见该条。

64812 **神芎丸**

【方源】《医统》卷六十三。

【组成】藿香 木香各一钱 当归一钱 升麻二钱 生地黄(酒洗) 生甘草各三钱 黄连(炒) 砂仁各半两

【用法】上为末,蒸饼为丸,如绿豆大。每服一百丸,汤送下。

【主治】食肉多口臭。

64813 **神芎汤**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】升麻 川芎 人参 枸杞子 甘草 远志 黄耆 当归 地骨皮 破故纸 杜仲 白术各四分 生姜一片 莲肉七枚

【用法】水煎温服。如无家莲肉,莲花须亦可。

【功用】补肾,引肾水归源。

【主治】遗精经久,肾虚下陷,玉门不闭,不时漏精。

64814　**神芎散**

【方源】《宣明论》卷三。

【组成】川芎　郁金各二钱　荆芥穗　薄荷叶　红豆各等分

【用法】上为末，入盆消二钱，研匀。鼻内搐三二剜耳许。力慢即加药，病甚兼夜搐。

【主治】风热上攻，头目眩痛，上壅鼻塞眼昏，并牙齿闷痛。

【备考】本方方名，《普济方》引作"神功散"。

64815　**神芎散**

【方源】《医宗必读》卷八。

【组成】青黛二钱五分　蔓荆子　川芎各一钱二分　郁金　芒消各一钱　石膏一钱五分　细辛根一钱　薄荷叶二钱　红豆一粒

【用法】上为细末。搐鼻。

【主治】风热上攻，头痛鼻塞。

64816　**神老丹**

【方源】《幼科指南》卷上。

【组成】牛黄二钱　钩藤(去藤用钩)二钱　全蝎二钱　僵蚕(炒)二钱　雄黄三钱　朱砂二钱　珍珠二钱　梧桐二钱　桑寄生二钱　胆星三钱　琥珀二钱　冰片少许

【用法】上为末，粟米糊为锭，金箔为衣。薄荷、竹叶、灯心汤送下。同服安神丸。

【主治】小儿急惊风病退后，昏睡不醒，心脾二经之邪未除者。

64817　**神灰散**

《圣济总录》卷一六七。为《圣惠》卷八十二"封脐散"之异名。见该条。

64818　**神灰散**

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】苘麻(烧灰)

【用法】黄酒调服。

【主治】小便不通。

64819　**神光汤**

【方源】《普济方》卷三六四。

【组成】川大黄一分

【用法】上为粗末。水半盏，浸一宿，一岁分作两服；余滓，涂顶上，干易之。

【主治】小儿热膈，疳热，闭目不开，并脑疼。

64820　**神吸散**

【方源】《寿世保元》卷三引颜心吾方。

【组成】鹅管石(火煅，好醋淬七次)一钱　余粮石(火煅，醋淬七次)一钱　粉草三分　枯白矾五分　石膏(煅)五分　款冬花五分

【用法】上为细末。每服三分二厘，至夜食后静坐片时，将药放纸上，以竹筒五寸长，直插喉内，用力吸药，速亦不怕，吸药令尽为度，以细茶一口，漱而咽之。

【主治】年久近日咳嗽，哮吼喘急。

【宜忌】忌鸡、鱼、羊、鹅，一切动风发物，并生冷诸物，惟食白煮猪肉、鸡子，戒三七日。宜用公猪肺一副，加肉半斤，栀子一岁一个，炒成炭，桑白皮不拘多少，用之同炒至熟烂，去药，至五更，病人不要开口言语，令人将汤肺喂之，病人嚼吃任用，余者过时再食。

64821　**神曲丸**

【方源】《千金》卷六。

【异名】明目磁石丸(《医方类聚》卷十引《简要济众方》)、磁石丸(《圣济总录》卷一〇九)、千金神曲丸(《三因》卷十六)、千金磁朱丸(《原机启微》卷下)、磁砂丸(《医学入门》卷七)、磁朱丸(《本草纲目》卷九)、内障神方(《惠直堂方》卷二)。

【组成】神曲四两　磁石二两　光明砂一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。饮服三丸，每日三次。

【功用】①《千金》：益眼力，明目，百岁可读细书。②《中国药典》一部：镇心、安神、明目。

【主治】肾阴不足，心阳偏亢，眼目昏花，耳鸣耳聋，心悸失眠，癫痫。

①《圣济总录》：肾脏风虚，眼黑生花。②《原机启微》：神水宽大渐散，昏如雾露中行，渐睹空中有黑花，渐睹物成二体，久则光不收，及内障神水淡绿色，淡白色。③《普济方》：虚劳，

目暗昏闷。④《古今名医方论》引王又原：耳鸣及聋。⑤《古今名医方论》引柯韵伯：癫病。

【宜忌】《外台》：忌生血物。

【方论选录】①《原机启微》：磁石辛咸寒，镇坠肾经为君，令神水不外移也；辰砂微甘寒，镇坠心经为臣，肝其母，此子能令其实也，肝实则目明；神曲辛温甘，化脾胃中宿食为佐。生用者，发其生气；熟用者，敛其暴气也。服药后，俯视不见，仰视渐睹星月者，此其效也。②《古今名医方论》引王又原：磁石直入肾经，收散失之神，性能引铁，吸肺金之气归藏肾水；朱砂体阳而性阴，能纳浮游之火而安神明，水能鉴，火能烛，水火相济，而光华不四射欤？然目受脏腑之精，精资于谷，神曲能消化五谷，则精易成矣。盖神水散大，缓则不收，赖镇坠之品疾收而吸引之，故为急救之剂也。其治耳鸣、耳聋等症，亦以镇坠之功，能制虚阳之上奔耳！③《古今名医方论》引柯韵伯：此病非金石之重剂以镇之，狂必不止。朱砂禀南方之赤色，入通于心，能降无根之火而安神明；磁石禀北方之黑色，入通于肾，吸肺金之气以生精，坠炎上之火以定志，二石体重而主降，性寒而滋阴，志同道合，奏功可立俟矣；神曲推陈致新，上交心神，下达肾志，以生意智，且食入于阴，长气于阳，夺其食则已，此《内经》治狂法也，食消则意智明而精神治，是用神曲之旨乎！炼蜜和丸，又甘以缓之矣。④《千金方衍义》：磁禀北方坎水之精，朱禀南方离火之气，以二味质重，故籍神曲发越其沉着之性，以镇神水之不清。

【临证举例】幻听 《上海中医药杂志》(1981;7：40)：本组7例患者，或为精神分裂症以幻听为突出症状，或系精神分裂症经过治疗后基本症状消失而残留幻听者。用磁朱丸治疗，每次6～10克，每日1～2次，一般以一个月为一疗程(最短7天，最长3个月)。治疗后，显效(幻听消失或大部消失)3例；好转(幻听减轻)3例，无效1例。

64822 神曲丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】神曲一两(微炒令黄色) 干姜半两(炮裂，锉) 槟榔一两 甘草半两(炙微赤，锉) 陈橘皮半两(汤浸，去白瓤，焙) 桂心半两 附子半两(炮裂，去皮脐) 人参三分(去芦头) 当归三分(锉，微炒)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，以生姜、橘皮汤送下，不拘时候。

【主治】脾胃冷热气不和，心腹疞痛，胁肋气滞，不思饮食，四肢少力。

64823 神曲丸

【方源】《圣惠》卷五。

【组成】神曲一两(炒令微黄) 胡椒一分 陈橘皮二两(汤浸，去白瓤，焙) 桂心一两 诃黎勒二两(煨，用皮) 厚朴二两(去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟) 干姜一两(炮裂，锉) 白术一两 附子一两(炮裂，去皮脐) 甘草半两(炙微赤，锉) 当归三分(锉，微炒) 白豆蔻一两(去皮)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，以粥饮送下，不拘时候。

【主治】脾胃气虚冷，胁肋气胀，不思饮食，四肢无力，睡恒不足。

【宜忌】忌生冷、油腻、湿面。

64824 神曲丸

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】神曲三两(炒微黄) 白术一两 附子一两(炮裂，去皮脐) 枳壳一两(麸炒微黄，去瓤) 高良姜一两(锉) 人参一两(去芦头) 吴茱萸一两(汤浸七遍，焙干，微炒) 诃黎勒一两(煨，用皮) 草豆蔻一两(去皮)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，食前煎橘皮汤送下。

【主治】虚劳，脾胃虚冷，饮食不消，腹胁气满。

64825 神曲丸

【方源】《圣惠》卷五十。

【组成】神曲四两(炒微黄) 麦蘖半两(炒微黄) 厚朴二两(去粗皮，涂生姜汁，炙令香

熟）　桂心一两　陈橘皮一两半(汤浸,去白瓤,焙）　诃黎勒皮一两半　干姜一两(炮裂,锉）　槟榔一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸,以生姜汤送下,不拘时候。

【主治】膈气不下食,纵食不能消化。

64826　神曲丸

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】神曲三两(捣碎,以醋少许拌炒微黄）　肉苁蓉一两(酒浸一宿,锉,去皱皮,炙干）　虎胫骨二两(涂酥,炙微黄）　海桐皮一两(锉）　白僵蚕二两(微炒）　芎䓖一两　半夏一两(汤浸七遍,去滑）　红蓝花一两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以温酒送下,每日三次。

【功用】止疼痛,散瘀血。

【主治】伤折。

64827　神曲丸

【方源】《圣惠》卷七十。

【组成】神曲二两　白术一两　附子一两(炮裂,去皮脐）　枳实一两(麸炒微黄）　诃黎勒皮一两　桂心一两　食茱萸一两　木香一两　人参一两(去芦头）　陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙）　桔梗半两(去芦头）　干姜半两(炮裂,锉）

【用法】上为末,以酒煮面糊为丸,如梧桐子大,每服二十丸,食前以生姜汤送下。

【主治】妇人血风,气攻脾胃,腹胁气满,不思饮食。

64828　神曲丸

【方源】《全生指迷方》卷二。

【异名】小神曲丸(《鸡峰》卷二十)。

【组成】神曲(炒)一两　橘皮(洗)二两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如鸡头子大。每服一粒,含化咽津。

【功用】《鸡峰》:消食化气。

【主治】食噎。因饮食之间气道卒阻而留滞,至咽中如核,咽之不下,吐之不入,渐妨于食,其脉短涩。

64829　神曲丸

【方源】《鸡峰》卷十五。

【组成】神曲　大麦蘖　生地黄　牛膝　桑耳一斤　白术　姜黄各八两　当归十四两　桃仁　杏仁各十二两　生姜一斤　橘皮八两

【用法】上切碎,于臼中以木杵之如泥,纳瓶中,以物盖之,封,勿令泄气,蒸于饭米中,饭熟出之,停屋下三日,开出晒干为末。每服方寸匕,渐加至一匕半,酒饮下,每日二次。若不能散,为丸服,每服三十丸。

【功用】令病人能食及驻颜色。

【主治】妇人腹内冷癖血块,虚胀,月经不调,瘦弱不能食,面无颜色,状如传尸病。

【宜忌】初服十日内,忌生冷、难消之物,以助药势;过十日外,即百无所忌,任意恣口食之,唯忌桃、李。服丸时忌桃、李、雀肉、芜荑。

【备考】方中神曲,大麦蘖、生地黄、牛膝用量原缺。

64830　神曲丸

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】五灵脂五两(水飞,去滓,熬成膏）　神曲一两(炒）

【用法】上为细末,将五灵脂熬成膏,入神曲末为丸,如梧桐子大。每服十丸,男子食后酒送下,妇人淡醋汤下。

【主治】肠风下血。

64831　神曲丸

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】神曲(炒）　荜茇　白豆蔻仁　白术　人参(去芦头)各一两　附子(炮,去皮脐）　诃子(煨,去核）　厚朴(姜制,炙)各二两　丁香　沉香　荜澄茄各半两　陈橘皮(去白)三分

【用法】上为细末,煮枣肉为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心米饮送下。

【主治】阴阳不和,脾胃虚弱,气不升降,呕吐泄泻,胁肋刺痛,心腹胀满。

64832　神曲丸

【方源】《普济方》卷四十三。

【组成】神曲（炒黄） 木香 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 甘草 槟榔 青橘皮（去白） 白术 枳壳（麸炒，去瓤） 京三棱（炮）各八两 桂（去粗皮）十二两 干姜（炮）十二两

【用法】上为末，水煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五七丸，温米饮送下，不拘时候。

【主治】中焦胃虚，饮食迟化，气不升降，呕逆恶心，留饮寒痰，癖结动气，胁下逆满，有时而痛，按之有形，或按之有声，膈脘虚痞，食物多伤，噫气酸臭，心腹常痛，霍乱吐逆，烦闷不安。

64833 **神曲丸**

【方源】《普济方》卷一四六。

【组成】神曲（捣，炒黄）一两 干姜（炮） 白术 人参各一两半 枳壳（去瓤，麸炒） 甘草（炙） 大麦蘖（炒黄） 厚朴（去粗皮，生姜汁炙） 杏仁（汤浸，去皮尖双仁，炒黄，另研）各一两 桂（去粗皮）三分

【用法】上除杏仁外，为末，入杏仁同研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下，每日二次。

【主治】伤寒后脾胃虚冷，食不能化。

64834 **神曲丸**

《普济方》卷二〇八。即《百一》卷六引孙盈仲方“断下丸”。见该条。

64835 **神曲丸**

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】神曲一两半 干姜 官桂 白术 当归 厚朴 人参 甘草各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心食前酒或淡醋汤送下，每日二次，发时不时增数。

【功用】磨积。

【主治】泄痢，心腹冷痛。

64836 **神曲丸**

【方源】《普济方》卷二一三。

【组成】神曲 芜荑 吴茱萸各等分

【用法】上熬，生姜自然汁为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以粥饮送下。

【主治】休息痢，日夜不止，腹内冷痛。

64837 **神曲丸**

【方源】《普济方》卷二三七。

【组成】神曲末（炙令黄色）五两 白术一两 附子（炮裂，去皮脐）三两 枳壳（去瓤，麸炒令黄色）一两 甘草（炙，锉） 干姜（炮治） 人参各二两 食茱萸（水净洗，焙干，炒） 桔梗（炒）各一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每日二十丸，渐加至三十丸，空心米饮送下，夜卧再服。

【功用】温脾。

【主治】传尸。多服冷药，旬月未愈，或损脾脏，致食少难消，气满兼利。

64838 **神曲丸**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】神曲三两 苍术 陈皮各一两

【用法】上为末，生姜汁别煮神曲末为糊和丸，如梧桐子大。每服三五十丸，姜汤送下。

【主治】中脘宿食留饮，酸蜇心痛，口吐清水，嗳宿腐气。

64839 **神曲汤**

【方源】《鸡峰》卷十二。

【组成】神曲（炒香） 麦蘖子 半夏曲 五味子各一两（同为末，面四两，以熟水和作饼子，焙干） 木香一钱 甘草一分

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，加姜、枣，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

【功用】温胃破痰，进饮食，消宿谷。

64840 **神曲汤**

【方源】《卫生总微》卷十四。

【组成】神曲一两（微炒） 木香一两 半夏一两（用生姜半斤同杵烂，炒令黄） 芜荑一两 青皮（去瓤）半两（炒） 甘草半两（炙） 白茯苓半两

【用法】上为细末。每服半钱，盐少许，沸汤调温服，不拘时候。

【主治】①《卫生总微》：小儿痰涎壅滞，气不和顺，腹胁满闷。②《普济方》：小儿痰实。

【备考】《普济方》中有姜黄，无芜荑。

64841 **神曲汤**

【方源】《普济方》卷四十三。

【组成】神曲(炒黄)　莱菔子(炒黄)各等分

【用法】上为散。每服三钱,水一盏,煎三四沸,去滓,入麝香少许,再煎一沸,温服,不拘时候。

【主治】三焦滞气。

64842 **神曲汤**

【方源】《观聚方要补》卷一引《医径会解》。

【组成】神曲　山楂　连翘　陈皮　半夏　茯苓　麦芽　萝卜子

【主治】伤于食,身热头疼,噫气作酸,腹硬胀满,粪来逼迫作声,下坠臭甚,如抱坏鸡子秽气,脉来沉实。

【加减】肉积,加草果仁;伤酒,加黄连、葛花、砂仁;气虚,加人参、白术。

64843 **神曲茶**

【方源】《全国中药成药处方集》(南昌方)。

【组成】广藿香四两　川朴二两　砂仁一两五钱　苏叶四两　香附四两　白芷二两　苍术四两　白蔻壳二两　法夏二两　桔梗三两　广陈皮四两　麦芽八两　山楂六两　甘草一两　花槟榔三两　茯苓二两

【用法】上研细面,加六神曲六斤八两,打糊为丸。每服三钱,水煎,去滓服,或加姜一至二片同煎更佳。小儿视年龄及病情酌情减服。

【主治】四时不正之气,感冒发热,头眩咳嗽及伤食腹痛,痞满气痛,呕吐,泄泻痢疾,饮食不进,不服水土。

64844 **神曲酒**

【方源】《得效》卷三。

【组成】神曲一块(约如拳大)

【用法】上烧令通赤,好酒二大盏,淬酒便饮令尽。仰卧少顷即安。

【主治】①《得效》:闪挫腰痛。②《金匮翼》:食积腰痛。

64845 **神曲散**

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】神曲二两(微炒)　木香一两　陈橘皮一两(汤浸,去白瓤,焙)　麦蘖二两(微炒)　草豆蔻一两(去皮)

【用法】上为细散。每服一钱,食前以温酒送下。

【主治】虚劳。脾胃冷弱,腹中气胀满,食不消化。

64846 **神曲散**

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】神曲一两(炒令微黄)　桂心半两　甘草一分(炙)　大麦蘖一两(炒令微黄)　干姜半两(炮裂,锉)　陈橘皮三分(汤浸,去白瓤,焙)

【用法】上为细散。每服二钱,以清粥饮调下,每日三四次。

【主治】食不消化,结成癖癖,令人羸瘦无力,食少。

64847 **神曲散**

【方源】《圣惠》卷七十九。

【组成】神曲三两(微炒令黄)　熟干地黄二两　白术一两半

【用法】上为细散。每服二钱,以粥饮调下,每日三四次服。

【主治】①《圣惠》:产后冷痢,脐下疠痛。②《普济方》:妇人生产多,脐下冷,数痢,瘦不能食,令人腹发花色。

64848 **神曲散**

【方源】《幼幼新书》卷二十四引《张氏家传》。

【组成】神曲　陈橘皮(不去白)　大黄(纸裹,炮熟)　芍药各三铢　桔梗　芎　厚朴(姜制)　枳壳(去瓤,麸炒)　白茯苓各一分　人参四铢　甘草二分(炙)

【用法】上为细末。每服一钱,入生姜一片,如茶法煎服,不拘时候。

【主治】小儿诸般疳。

64849 **神曲散**

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】附子一个 神曲 干姜各三分

【用法】上为细末。每服二钱，空心米饮调下。温酒尤佳。

【主治】中寒，下痢脓血，及妇人漏下。

64850 **神曲散**

【方源】《普济方》卷二一三。

【组成】神曲一升 干姜 细辛 椒目 附子 桂心各一两

【用法】上为散。每服方寸匕，不知加至二三匕，酒调下，每日三次。服此药小便利得止，肿亦消。

【主治】痢后虚肿水肿者，兼治产后虚满者。

64851 **神曲煎**

【方源】《松峰说疫》卷五。

【组成】神曲五钱（炒） 青皮一钱 葛根一钱 枳实一钱五分 红曲一钱五分 芫荽根七条（鲜者更妙）

【主治】瘟疫由食积而发者。

64852 **神朱丹**

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】雄黄一两（研） 古字钱四两

【用法】上烧古字钱令净，为末，于瓶子中布钱末一半，次布雄黄，上以余钱末盖之，固济了，候干，文火养三七日满，即开收，细研，用枣肉为丸，如梧桐子大。每服五丸，以温酒送下。

【功用】暖脏腑，止疼痛。

64853 **神朱散**

【方源】《卫生总微》卷八。

【组成】赤小豆二钱（炒） 槐花二钱（炒） 麝少许

【用法】上为细末。每服半钱或一字，临卧温酒送下，只一服。微利之。

【功用】解疮疹后余毒。

【主治】小儿疮疹。

64854 **神传膏**

《医学纲目》卷十七。即《本事》卷五“神传剪草膏”。见该条。

64855 **神交汤**

【方源】《辨证录》卷四。

【组成】人参一两 麦冬一两 巴戟天一两 柏子仁五钱 山药一两 芡实五钱 玄参一两 丹参三钱 茯神三钱 菟丝子一两

【用法】水煎服。连服十剂，即不忘矣，服一月不再忘。

【功用】大补心肾。

【主治】健忘。心肾两开，对人说话，随说随忘，人述其言，杳无记忆，如从前并不道及。

64856 **神闭汤**

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】白茯苓 紫苏 橘皮 人参各一钱 木香五分 桑白皮一钱五分 生姜七片

【用法】上㕮咀。水煎熟，不拘时候服。

【主治】病人不得卧，卧则喘，水气逆行，上乘上肺，肺得水而浮，使气不通流，脉沉大。

64857 **神灯照**

【方源】《疡医大全》卷三十三。

【组成】紫草 白芷 沉香 北细辛 三奈 乳香 檀香 肉桂

【用法】上为细末，将药卷入纸条内，用麻油、黄蜡各五钱熬化，将药捻施之，燃照痘儿面部周身，一日数照，以解其厲。

【功用】解痘厲，转凶为吉。

【主治】痘疹不起。

64858 **神灯照**

《疡科捷径》卷上。为《痘疹一贯》卷六“神灯”之异名。见该条。

64859 **神守散**

【方源】《解围元薮》卷三。

【异名】独胜散。

【组成】番木鳖（用铜刀刮去粗皮）

【用法】将麻油入瓦罐内煎滚，渐投下木鳖煎之，待三沉三浮，发泡焦黄，取出晒干为末。每服一分，临卧白汤送下。避风待汗干方可起，服至百日，眉生，斑退，肿消，疮敛，如热反增，乃内毒发出，甚妙。一方用药末一两，加甘草末五分更妙。

【主治】蛇皮鱼鳞，邪魅痒风、癞风，一切危重之症及痰火、癫痫。

【加减】各风以此为主方，量加白花蛇、地龙、麝香、蚕蜕、蝉衣、僵蚕、当归等品尤妙。

【备考】如药力凶，以黑豆汤解之，绿豆汤亦可。

64860　神安丸

【方源】《卫生总微》卷十一。

【组成】砒霜一字　龙骨二字(煅)　乌鱼骨三字　赤石脂二字　茯苓三字　黄连(去须)三字　定粉三字　干姜三字(炮)　黄丹三字(火飞)

【用法】上为细末，入麝香少许拌匀，饭和为丸，如黍米大。每服五丸，轻粉汤送下。亦治诸痢，赤者，甘草汤送下；白者，干姜汤送下；赤白杂者，干姜、甘草汤送下。

【主治】小儿休息痢。下五色脓血，如烂鱼肠，无粪，肠中搅痛。

64861　神安散

【方源】《普济方》卷三九八。

【组成】黄耆(捶碎，蜜水炙，锉)半两　甘草(炙，锉)二钱　白茯苓(去黑皮)　人参(去芦)　石莲肉(去心，炒)各一两

【用法】上为细末。每服半两，水半盏，加大枣一枚，煎三五沸，量儿大小加减温服。

【主治】小儿疳痢，烦渴，肌体羸瘦。

64862　神异丹

【方源】《洞天奥旨》卷九。

【异名】神异散(《青囊秘传》)。

【组成】轻粉一钱　儿茶三钱　黄丹二钱　炒黄柏三钱　枯矾五分　冰片三分

【用法】上为末。湿则干掺，干则用麻油调敷。数日即愈。

【主治】燕窝、羊胡疮。

64863　神异散

【方源】《养老奉亲》。

【组成】金银花　天花粉　木鳖各一钱　甘草三分　连翘　黄芩各八分　山栀子七分　川山甲二钱　皂角针三钱　木香五分　大黄三钱

【用法】上锉。水一钟，煎半钟，入黄酒一盏，煎三五沸，空心温服。

【主治】鱼口便毒疮。

64864　神异散

《青囊秘传》。为《洞天奥旨》卷九“神异丹”之异名。见该条。

64865　神异膏

【方源】《济生》卷八。

【组成】全蝎七个(去毒)　皂角一铤(锉，研)　巴豆七个(去壳)　蛇床末三钱　麻油一两　黄蜡半两　轻粉半字　雄黄(别研)三钱

【用法】上先用皂角、全蝎、巴豆煎油变色，去了三味，入黄蜡化开，取出冷定，入雄黄、蛇床末、轻粉和匀成膏。先用苦参汤温洗，以药擦疮疥上。

【主治】一切疮疥。

64866　神异膏

《外科精要》卷三。为《传信适用方》卷三“太上灵应无比神异膏”之异名。见该条。

64867　神异膏

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】黑参　白芷实　露蜂房　杏仁(不去皮)　木鳖仁　男生发(洗，焙)各二钱　蛇退(盐水洗，焙)一钱　肥白巴豆十五粒

【用法】上锉细，用麻油五两，同药入瓷铫浸一宿，慢火煎，更换柳枝搅，候药色焦黑，顿冷炉，生绢滤，再入铫暖，入净虢丹二两，柳枝急搅，候黑，滴入水成珠，入乳香末二钱，拌和，倾入瓷器候凝，覆泥地三日。贴用。

【主治】痈疽发背，恶毒疮疖。

64868　神异膏

【方源】《医方类聚》卷八十三引《吴氏集验方》。

【组成】铅锡　黄丹各三钱　百草霜半两　韶粉二钱　石灰一两半(风化者)　蛤粉一钱　轻粉二钱　赤缴脚半钱(轻粉炉中土粉铺)

【用法】上用饼药调稀稠得所，候干便用。

先以新汲水洗净，次用浆水入好麻油数滴洗髭，揩干，胡桃油润之，冬间加樟脑少许，以竹篦子排髭于小片板上，次用小刷子上药，不要著肉。

【功用】乌髭。

64869 **神异膏**

【方源】《普济方》卷三一三。

【组成】鬼面乌头（不去皮尖） 木鳖子（去壳，不去油） 当归（去芦） 贝母 南星 半夏各一两 白芷 白术各半两

【用法】上为粗末，用真香油六两浸之愈久，煎药赤黑色，绵子滤去滓，再煎油三五沸，入黄丹二两，桃柳枝搅，逐旋下以黑为度，春夏秋宜以罐瓶收之，皮纸摊贴留白。

【主治】痈疽诸肿恶疮，已成未成者。

64870 **神异膏**

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】桂花 苏合油各半两（如无，苏合香丸亦可） 木鳖子 乳香 没药 白及 白敛 当归 杏仁 官桂各一两 丹二斤半 香油五斤 槐柳条半斤

【用法】上除乳、没、苏外，余锉，油内浸，春、秋五，夏三，冬七，新锅内浸，以文武火熬，一顺搅，槐柳黑色，滤滓放温，一面不住手搅入乳、没、苏合香，再熬，微滚三两沸，放温不住手搅，搅掺丹，上火再熬，如此五七次，不住搅，熬令黑，滴水成珠不散，覆地上出火毒。以水净洗贴之。年远月深，喘嗽吐血者，背上贴；泄泻，脐上贴；妇人淋沥，赤白带下，并男子小肠气，丹田贴；奶痈，患上贴；虚极，颈骨贴；牙疼，牙上贴；肚疼，肚上贴；心疼，心上贴。

【主治】一切无名痈肿，打扑伤损，骨肉着毒，刀斧、犬、马、蛇、虫、蜈蚣、蜂毒所伤。

64871 **神异膏**

【方源】《准绳·疡医》卷二。

【组成】雄黄五钱 滑石倍用

【用法】上为末。洗后掺疮上，外用绵纸覆盖相护，凡洗后破烂者，用此贴之。

【主治】痈疽坏烂，及诸疮发毒。

64872 **神异膏**

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】归尾五钱 川芎五钱 赤芍二钱 生地黄四钱 防风五钱 羌活五钱 白芷五钱 玄参五钱 黄耆五钱 官桂三钱 桃仁四十九个 杏仁四十九个 木鳖子十四个 何首乌三钱 牛子五钱 川山甲四钱 蜂房三钱 蛇退二钱 大黄二钱 黄柏二钱 乱发（男者）一团如鸡子大 槐柳皮四十九节（每长一寸）

【用法】上用芝麻油三斤四两，将药入锅内浸，春五、夏三、秋七、冬十日，以桑柴文武火煎油黑色，以穿山甲浮起黑为度，绢滤去滓，再熬油，滴水成珠，陆续下黄丹十四两，柳条搅不住手，成膏，软硬得所，再下乳香、没药各三钱，血竭三钱，降真香末三钱，次冷定，下麝香末二钱，水浸二三日，去火性摊用。诸毒甚者，每日换二三次，中毒换一次。其药力方能胜毒。

【主治】痈疽发背，诸疮毒，不拘已成已溃未溃者，皆可用之。诸疮溃脓后，不长肌肉，不合口者。

64873 **神异膏**

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】木香 川芎 牛膝 生地黄 细辛 白芷 秦艽 归尾 枳壳 独活 防风 大枫子 羌活 黄芩 南星 蓖麻子 半夏 苍术 贝母 赤芍 杏仁 白敛 茅根 两头尖 艾叶 连翘 甘草节 川乌 肉桂 良姜 续断 威灵仙 荆芥 藁本 丁香 金银花 丁皮 藿香 红花 青风藤 乌药 苏木 玄参 白鲜皮 僵蚕 草乌 桃仁 五加皮 山栀子 牙皂 苦参 穿山甲 五倍子 降真香 骨碎补 苍耳头 蝉退 蜂房鳖甲 全蝎 麻黄 白及各一两 大黄 蜈蚣二十一条 蛇退三条

【用法】上用桃、槐、榆、柳、楮、桑、楝七色

树枝，各三七二十一，共俱切粗片，用真麻油十七斤浸药，夏三宿、春五、秋七、冬十宿后，煎药枯油黑为度，用麻布滤去滓，贮瓷器内，另以松香不拘多少，先下净锅溶化后取起，每香二斤，用药油四两，搅匀，软硬得法，仍滤入水缸中，令人扯抽，色如黄金，即成膏矣。肿毒初发，杨梅肿块未破者，俱贴患处；肚腹疼痛，泻痢、疟疾，俱贴脐上，利白而寒尤效；咳嗽哮喘，受寒恶心，胸膈胀闷，面色微黄，心疼气痛，俱贴前心；负重伤力，浑身痛者，贴后心；腰眼痛、小肠气等症，贴脐下。

【主治】一切风寒湿气，手足拘挛，骨节酸疼，男子痞积、妇人血瘕，及腰胁诸般疼痛，结核瘰疬，顽癣顽疮，积年不愈，肿毒初发，杨梅肿块，腹痛泻痢，疟疾，咳嗽哮喘，受寒恶心，胸膈胀闷，面色微黄，心疼气痛，负重伤力，浑身痛，小肠气。

64874　神运丸

【方源】《万氏家抄方》卷一。

【组成】白茯苓半斤　荆芥四两(二味用河水煮干，去荆芥，用茯苓)　白术四两　天门冬半斤　地黄四两　人参四两　川断四两　草龙胆四两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心米汤送下，每日二次。

【主治】癫病。

64875　神攻散

【方源】《卫生总微》卷十五。

【组成】大甘草半两(生末)　晋矾一两(末)

【用法】上拌匀。每服一钱或半钱，新汲水调下。吐出毒物效。

【主治】小儿中蛊毒。

64876　神志丸

【方源】《内经拾遗》卷二。

【组成】茯神(去木)　远志(去骨)　羌活　南星　益智(去皮)　白附子　辰砂(另研)　雄黄(另研)　枯矾(另研)各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后米饮送下，每日二次。

【功用】宁心定志。

【主治】阳厥善怒，服铁洛饮或当归承气汤利痰后者。

64877　神护膏

【方源】《医方类聚》卷一九〇引《修月鲁般经》。

【组成】赤小豆　黄皮　白敛　白芷　天花粉　南星各等分

【用法】上为末，阴用米醋，微红用蜜水，肿用商陆根，阳极用巴豆焦油。围罨患处。

【主治】一切肿毒。

64878　神助丸

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】三棱　草果子仁　川楝子各一两(醋一碗，煮干焙燥)　茴香　萝卜子　栗子内皮各一两

【用法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，虚者三十丸，萝卜汤送下。

【主治】妇人四肢瘦，肚大。

64879　神助丸

【方源】《奇效良方》卷四十。

【异名】葶苈丸。

【组成】大戟(主青水，先从左边胁肿起，根在肝)　葶苈(主赤水，舌根肿起，一云脚根肿起，根在心)　甘遂(微炒。主黄水，腰腹肿起，根在脾)　桑白皮(主白水，从脚肿起，根在肺)　连翘(主黑水，从外肾肿起，根在肾)　芫花(醋炒。主玄水，从面肿起，根在外肾)　泽泻(主风水，从四肢肿起，根在骨)　藁本(主石水，从肾肿起，根在膀胱)　巴豆(去油。主蓄水，从小腹肿起，根在小肠)　赤小豆(主气水，或盛或衰，根在腹)

【用法】上用所主药一两，余者各半两，研为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，茯苓汤送下，每日三次。病痊后便服鸭头丸。

【主治】十种水气，面目四肢遍身俱肿。

【宜忌】忌盐百日外，忌鱼、虾、面食、一切毒物，房事。

64880　神助丹

《普济方》卷二二二引《十便良方》。为《证类本草》卷十引《梅师方》"二虎丸"之异名。见该条。

64881　神助散

《局方》卷八。为《圣惠》卷五十四"神效葶苈散"之异名。见该条。

64882　神助散

【方源】《圣济总录》卷一二七。

【组成】槟榔　黄连（去须）

【用法】上为末，先用活鳝鱼一条，掷于地，候鳝困盘屈，以竹针五七枚贯之。覆疮。良久取视，当有白虫数十如针著鳝上，取去复覆之，如此五六度即已，用药量多少复之。

【主治】瘘疮，十余年不愈。

【备考】《普济方》本方用槟榔、黄连各等分。

64883　神助散

《杨氏家藏方》卷十四。为《理伤续断方》"至真散"之异名。见该条。

64884　神龟散

【方源】《洞天奥旨》卷八。

【组成】大龟二个（一雌一雄）　远志二两　麦冬三两　山萸肉四两　肉桂一两　白术（炒）五两　苍术二两　熟地十两　玄参十两　茯神四两　何首乌十两（生用）　桑椹四两　紫花丁四两　夏枯草五两

【用法】上为细末，将大龟饭锅蒸熟，火焙干为粉，同用蜜为丸。每服三钱，早、晚饭后白滚水送下。一料必痊愈。

【主治】心肾不交，瘰疬久不愈者。

64885　神应丸

【方源】《局方》卷八。

【组成】威灵仙（去土）二十两　当归　肉桂（去粗皮）各十两

【用法】上为末，以酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，加至二十丸，食前温酒或煎茴香汤送下；妇人煎桂心汤送下。

【主治】肾经不足，风冷乘之，腰痛如折，引背膂俯仰不利，转侧亦难。或因役用过多，劳伤于肾；或因寝冷湿，地气伤腰；或因坠堕伤损；或因风寒客搏，皆令腰痛。

【宜忌】孕妇不得服。忌食茗。

64886　神应丸

【方源】《圣济总录》卷十五。

【组成】狐肝二具　乌鸦二只（去嘴足肠肚，共狐肝入瓶内烧作灰）　天麻　白附子　桑螵蛸（炒）　蒺藜子（炒去角）　干蝎（去土，炒）　白僵蚕（炒）各二两　银箔（研）　金箔（研）各五十片　麝香（研）　犀角（镑）　天南星（炮）　蝉蜕（炒）　丹砂（研）各半两　牛黄（研）　龙脑（研）各一分　乌蛇（酒浸，去皮骨，炙）二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十五丸，温酒送下，不拘时候；或煎荆芥人参汤送下，每日二次。

【主治】风痫。吐涎沫，手足瘛疭，心神不定。

64887　神应丸

【方源】《圣济总录》卷五十五。

【组成】石灰（风化者）一钱　干姜一钱

【用法】上为末，滴水为丸，如豌豆大。每服七丸，取葱白一寸刺开，入开口椒七颗，湿纸裹煨熟，细嚼，醋汤送下。

【主治】暴心痛，危笃者。

64888　神应丸

【方源】《圣济总录》卷六十三。

【组成】槐花半升　巴豆五十粒（和皮捶碎）

【用法】上同炒存一分性，为末，面糊为丸，如绿豆大。每服二丸，食后温水送下。

【主治】支饮，胸膈痞闷，饮食迟化。

64889　神应丸

【方源】《圣济总录》卷一九八。

【组成】预知子（去皮）　茯神（去木）各半两　远志（去心）　桂（去粗皮）各一分

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服七丸，每月初二日、初六日用乳香汤送下。

【功用】久久通灵，预知吉凶。

64890　**神应丸**

【方源】《幼幼新书》卷三十九引《庄氏家传》。

【组成】朱砂三钱(精研)　半夏大者三枚(以浆水煮过，研)　石脑油(真者须小，但斟量稀稠抹和得朱砂、半夏二味为度，切勿令稀，旋旋滴少许在乳钵内，研拌二味药)

【用法】上同入乳钵内研令匀腻，丸如豌豆大。每服三丸，空心并食前以酒吞下，每日三次，不过一二日或三四日内自然随大便下来。不取转，不搜觉，但趁逐钱下来。

【主治】小儿误吞钱。

64891　**神应丸**

【方源】《永乐大典》卷九七八引《全婴方》。

【组成】真牛黄　麝香　轻粉各半两　金银箔各一百片　磁石　石绿　朱砂　蛇含石(火煅，醋淬七次)　粉霜　雄黄各一两　石燕二个(火煅，醋淬七次)

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。一岁一丸，薄荷汤化下，入酒少许尤妙；痫病，薄荷自然汁和酒化下。

【主治】小儿急慢惊风及卒中并五种痫疾，或发直目直视，面如桃花，口眼俱闭，或即俱开，喉中作声，汗出如油，惊风下泄，时泻黑色。

64892　**神应丸**

【方源】《百一》卷三。

【组成】好腊茶半两　白矾一两(生用)

【用法】上为细末，蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，腊茶汤送下，取涎自大便出。

【主治】风痫，暗风。

64893　**神应丸**

《百一》卷十三。为《杨氏家藏方》卷十四“救命丹”之异名。见该条。

64894　**神应丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】新柏叶(蒸热，焙干)　槐花(瓦上炒)　鸡冠花(瓦上焙)各等分

【用法】上酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】肠风下血。

64895　**神应丸**

【方源】《内外伤辨》卷下。

【组成】黄蜡二两　巴豆　杏仁　百草霜　干姜各五钱　丁香　木香各二钱

【用法】上先将黄蜡用好醋煮，去滓，将巴豆、杏仁同炒黑，烟尽研如泥，将黄蜡再上火，入小油半两溶开，入在杏仁、巴豆泥子内，同搅，旋下丁香、木香等药末，研匀，搓作挺子，油纸裹了旋丸用。每服三五十丸，食前温米饮送下，每日三次。

【主治】因一切冷物冷水及湩乳酪水所致腹痛肠鸣，米谷不化。

64896　**神应丸**

【方源】《普济方》卷二一〇引《余居士选奇方》。

【组成】厚朴汁三分　川当归四分　枳壳八分　矾(煅)八分　干姜十分　缩砂六分　赤石脂五分　黄连四分　龙骨十分　附子十分(去皮脐尖)　诃子七分　五味子七分　茯苓六分　人参六分

【用法】上为末，醋醪为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心橘皮汤送下，每日三次。

【主治】脾胃气虚，冷痛下痢不止，每食粘物及冷物酒面则泻痢，往往气膨，胸膈满闷，微痛则溏泻，或五更初则下泄。

64897　**神应丸**

【方源】《仙拈集》卷一引《简易方》。

【组成】当归(酒蒸，晒干)　柴胡各一两　知母　川山甲各五钱

【用法】上为细末，酒糊为丸。每服六十丸，先晚茶送下，临发日再服一次。

【主治】疟疾。

64898　**神应丸**

【方源】《普济方》卷九十三引《济生拔粹》。

【异名】神应丹(《医统》卷十一)。

【组成】麻黄五斤(去根节，河水三斗，砂锅

内煎数十沸，去滓，再熬成膏） 甘松 苍术 桑白皮 吴白芷 浮萍草 川芎 苦参各二两 （一方有白术）

【用法】上为末，用麻黄膏子为剂，丸如弹子大。每服一丸，温酒一大盏，研化，临卧服。于不透风处睡，汗出为度，隔五七日，再服一丸。

【主治】风瘫痪，四肢不举，手足麻痹；及卒中风邪，涎潮不利，小儿惊风。

64899 神应丸

【方源】《瑞竹堂方》卷一。

【组成】大黄六两（去皮净） 黄连四两（净） 血竭三两 犀角末二两 仙人盖一个（醋炙黄色） 九肋鳖甲 牛黄二钱 灵矾二两

【用法】上为末，用好醋一斗，入砂锅内，文武火熬醋尽，焙干，再为极细末，酒糊为丸，如弹子大。每服一丸，男子用酒将药化开，空心温服；妇人用红花好酒一盏半煎至七分，去红花滓，将药化开，空心服之。

【主治】五劳七伤。

【宜忌】服药后十日内，忌生冷、酒、肉、面等物。

64900 神应丸

【方源】《普济方》卷二〇七引《瑞竹堂方》。

【组成】黄连二两（一半生用，一半熟用，炒） 吴茱萸（净）二两 罂粟壳一两（去筋木十分净，炒黑色） 木香二两

【用法】上为细末，用陈仓米粉同好米醋糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心米饮送下。

【主治】水泻，肠鸣腹痛，并赤白痢、休息痢，不问远年近日。

64901 神应丸

【方源】《普济方》卷二一〇引《卫生宝鉴》。

【组成】罂粟壳半两 乳香四钱 木香半两（煨） 肉豆蔻一分（面裹煨）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。大人每服二十丸，小儿十丸，煎罂粟汤送下。

【主治】噤口痢，全不进饮食，痢下不时。

64902 神应丸

《普济方》卷三九二引《保婴方》。为《永类钤方》卷二十“剪红丸”之异名。见该条。

64903 神应丸

【方源】《普济方》卷三十八引《经验良方》。

【组成】大黄连（去须净，洗，秤八两，锉碎如黄豆大，分作二份。一份用生姜四两，切作片子，同炒黑色，去姜不用，只用黄连；一份用姜四两，擂烂绞取汁，浸一宿阴干。生姜连皮洗净用最妙）

【用法】上为末，用糕糊为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心米饮送下。

【主治】积年便红。

64904 神应丸

【方源】《普济方》卷三十七。

【组成】水牛角鳃（烧灰） 草耳头 干漆（酒浸一宿，炒令断烟取出）各二两 槐耳一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心热酒送下。

【主治】肠风经年不愈，泻血疼痛。

64905 神应丸

【方源】《普济方》卷三四六。

【组成】王不留行 川山甲（炮） 白药子各等分

【用法】上为末，用好面四两，拌在一处。每服三钱，食后猪肉汤调下。

【功用】下奶。

【主治】产后无乳汁。

【备考】本方方名，据剂型，当作“神应散”。

64906 神应丸

《医级》卷八。为《杨氏家藏方》卷二“五痫丸”之异名。见该条。

64907 神应丸

【方源】《证治宝鉴》卷六。

【组成】大黄 鳖甲 桃仁 当归 生地黄 人参 甘草 黄芩

【用法】韭汁和为丸，朱砂为衣。

【功用】消其瘀血。

【主治】郁痨日久则旧血不去，新血不生，气涩血枯，变为干血劳证。证见肌肤甲错，面目黧黑，咳嗽困倦，偏身黄肿，月事不行。

【宜忌】《证治汇补》：此药只可一服，病深者，一月后再服除根，不可多服。惟少男室女、孀妇可用，若男女交接者禁用。忌荤、冷、油腻物。

【方论选录】《医略六书》：干血内结，阻遏经气而蓄泄无权，故瘀热不化，郁久成劳。男子则遗精，女人则不月焉。大黄荡热启闭，酒制引入血分以通经；人参扶元补气，生用少佐诸药以助力；鳖甲入阴散结；桃仁入血破坚；甘草缓中州之气；黄芩清蒸热之余；当归养血活血，资助生地以滋新血也。此推陈致新之剂，洵为干血内结成劳之专方。丸以韭汁开血结，衣以朱砂宁神室，下以红花通经闭，地骨皮退蒸热，桑白皮清肺气，俱以降火散瘀之童便煎服。

【备考】《证治汇补》本方用大黄四两(醋炙)，鳖甲、桃仁各一两，当归、生地黄各八钱，人参、甘草、黄芩各三钱。用韭汁糊为丸，每丸六钱，朱砂为衣。经闭，红花酒送下；骨蒸，加地骨皮；咳嗽，加桑白皮，俱用童便煎下，少倾饮酒一杯。至午后，当利一二行为验，啜温粥碗许。

64908　**神应丹**

【方源】《鸡峰》卷四。

【组成】附子大者十个

【用法】上用赤小豆一斗半，水三斗，慢火同附子煮，令水尽，拣出附子(去皮脐)，十字切作块子，再同赤小豆五升，水一斗，煮附子至水尽，取附子切片，焙干为细末，入青盐一分，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心盐、酒任下。

【主治】脚气。

64909　**神应丹**

【方源】《宣明论》卷九。

【组成】薄荷叶四钱　甘草四钱　巴豆(灯烧存性)　盆消各二钱　轻粉二钱　豆豉一两(慢火炒)　五灵脂二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一丸，温齑汁送下。续后空咽津三五次，禁饮食少时，觉咽喉微暖效。心腹急痛，温酒下二丸，未效再服，得利尤良；带下，以温酒下二丸，或大便流利再服。

【主治】涎嗽喘满，上攻心腹卒痛，及利下血，兼妇人带下病，一切肋胁痛满。

【备考】方中薄荷叶用量原缺，据《普济方》补。

64910　**神应丹**

【方源】《御药院方》卷一。

【组成】辰砂不以多少

【用法】上研细，水飞过，候干，用猪心血和之得所，以蒸饼剂裹，蒸熟为度，取出就热便丸，如梧桐子大。每服一粒，食后临卧温人参汤送下。不十日取效。

【主治】诸痫。

64911　**神应丹**

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】麻黄十斤(洗净，去土，捣烂，用河水四担浸一宿，砂锅熬至一担，去滓)　贝母(炒，去心)　桑白皮(去土)　紫苏子　款冬花(去枝梗)　桔梗　知母(各二两)　栝楼大者一个　皂角二挺(去皮弦子)

以上八味捣烂，入前麻黄汁内，熬至一半，去滓，澄取清汁，再熬成稠膏。

白茯苓二两(去皮)　紫菀(洗去土)　天麻　人参(去芦头)各一两(为细末)　阿胶(杵碎，炒为末)一两(入药拌匀)

【用法】上以药末搜和前膏，杵熟为丸，如小弹子大。每服一丸，温齑汁化开，临卧时饮之，便去枕仰卧，不许久坐，如不得睡，乃药之效也。

【主治】诸远年喘咳。

64912　**神应丹**

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】狐肝一具　乌鸦一只　鸱枭一个

白矾一两（生） 生犀角一两 野狸一个（去肠肚、皮毛，入新罐内，黄泥固济，炭火煨令焦黄色）

【用法】上为末，酒打糊为丸，如皂角子大，朱砂为衣。每服一丸，温酒送下，不拘时候。

【主治】诸风，心痫病。

64913 **神应丹**

【方源】《得效》卷五。

【组成】砒石一两 绿豆六钱

【用法】上药同煮，以豆烂为度，取出砒石，入黄丹一两，同研烂，用纸做卷五七重，如豆筒；又入砒石、黄丹，以黄泥固济，复烧红为度；又入黄丹一两，面四分，为丸如粟米大，又以黄丹二两为衣。每服二粒，新井花水送下。得效即止。

【主治】肺气喘急，晨夕不得睡，不问新久。

【宜忌】《医统》：忌热物一日。

64914 **神应丹**

【方源】《医方类聚》卷一五二引《居家必用》。

【组成】绵纹大黄半斤（酽米醋一斗，于银石器内，以木炭文武火煮一昼夜，醋干为度，晒干，如无白色，慢火焙干） 血竭半两

【用法】上为细末，无灰好酒打糊为丸，如弹子大，朱砂为衣。每服一丸，妇人用无灰酒一盏，红花一撮，同煎至七分，空心温服，平明时服；男子用青木香少许同煎，无灰酒煮化一丸服。

【主治】虚劳客热，肌肉消瘦，四肢倦怠，五心烦热，口燥咽干，颊赤心怔，日晚潮热，夜有盗汗，胸胁不利，减食多渴，咳唾稠粘，时有脓血，及传尸劳。

【宜忌】忌生冷、腥荤七日。

64915 **神应丹**

【方源】《纲目》卷十七引《乾坤秘韫》。

【组成】生草乌头 生天麻（洗）各等分

【用法】上擂烂，绞汁，倾盆中，砌一小坑，其下烧火，将盆放坑上，每日用竹片搅一次，夜则露之，晒至成膏，作成小锭子。每一锭分作三服，用葱、姜自然汁和好酒热服。

【主治】一切顽风。

64916 **神应丹**

《医统》卷十一。为《普济方》卷九十三引《济生拔粹》"神应丸"之异名。见该条。

64917 **神应丹**

【方源】《古今医鉴》卷十一。

【组成】大黄二两（醋二碗，煮干，晒） 血竭五钱 桃仁五钱 红花五钱

【用法】上为末，和匀，酒糊为丸，如梧桐子大，辰砂为衣。每服七十丸，空心用醇酒送下。

【主治】妇人经脉不行，五心烦热，口燥咽干，颊赤心怯，潮热，胸膈不利，减食多渴，咳嗽，唾稠痰。

64918 **神应丹**

《疡科选粹》卷七。为《儒门事亲》卷十五"万圣神应丹"之异名。见该条。

64919 **神应丹**

【方源】《胎产心法》卷中。

【异名】万全膏。

【组成】蓖麻子七粒（去壳）

【用法】将蓖麻研如泥，入麝一分，再研成膏。涂产母足心，胎下即洗去，迟则恐子肠出也。如子肠出，即移涂产妇顶心，肠即收上，速去之。

【功用】催生。

【主治】难产，并交骨不开。

【备考】此方催生下胎虽速，但药性猛峻，用者慎之。

64920 **神应丹**

《疡医大全》卷八。即《医宗说约》卷六"围药神应丹"。见该条。

64921 **神应丹**

《温氏经验良方》。为方出《证类本草》引《杜壬方》，名见《产育宝庆集》卷上"神应黑散"之异名。见该条。

64922 **神应汤**

【方源】《鸡峰》卷十四。

【组成】草豆蔻二个 枣 乌梅 半夏各

十个 橘皮半个 青橘皮一个 生姜半两

【用法】上以此一料,用泉水三升,于银器内煎至一升半,并将药锉为粗末同煎,不以时,去滓,任意。如发热可冷服,如发寒可热服。

【主治】痎疾。

64923 神应酒

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】茵芋(炙) 附子 天雄(并生用,去皮脐) 丹参 蜀椒(去目并闭口,炒出汗) 踯躅花 甘草(炙) 石菖蒲 桂(去粗皮) 干姜(生用) 乌头(生用,去皮脐) 独活(去芦头) 地骨皮 秦艽(去苗土) 防风(去叉) 芎䓖 人参 当归 白芷 藁本(去苗土) 生干地黄各二两 白鲜皮 栾荆(炙)各二两

【用法】上锉细,以无灰酒二斗,密器中浸,经七日成。每日空腹饮半盏,渐渐加饮。每饮了以饭三两匙压之。每饮一盏,即添一盏浸药,药味尽即止。

【主治】大风疾,及诸风疾。

【宜忌】忌热肉面、鸡、鱼、牛肉、油腻、果子、陈臭豉汁等物。

64924 神应散

【方源】《普济方》卷三〇〇引《肘后方》。

【组成】矾石 (一方加丹少许,同研掺之)

【用法】上烧汁尽取末。着疮中,令恶肉生新肉,细细割去甲角,旬日即愈。

【主治】足大指角急为甲所入肉,便刺作疮,不可着履鞋,脚指湿烂。

64925 神应散

【方源】《普济方》卷三七五引苏东坡方。

【组成】雄黄二两 朱砂一钱 全蝎七个(去毒) 蜈蚣一条(炙) 僵蚕一个(直者,炒)

【用法】上为细末。每用半钱,薄荷汤调服。

【主治】小儿急慢惊风。

64926 神应散

【方源】《圣济总录》卷二十三。

【组成】丹砂(研) 石硫黄(研)各一钱 土消二钱 蛤粉三钱半 人参 白茯苓(去黑皮)各一分

【用法】上为散。每服一钱匕,用脂麻水调下,不拘时候服。

【主治】伤寒阴阳不顺,发躁闷乱,气虚呕逆;霍乱后,烦躁,睡眠不安。

64927 神应散

【方源】《圣济总录》卷五十八。

【组成】滑石(研) 寒水石(研)各半两

【用法】上为散,用生鸡子一枚,凿破,去黄留清,调和药末,令如稠膏,却纳在鸡壳内,以纸封口,用盐泥固济,晒干,炭火内烧令通赤,放冷,去土并壳,取药研令绝细为度。每服大人二钱匕,小儿半钱匕,米饮调下。

【主治】消渴,饮水不休。

64928 神应散

【方源】《鸡峰》卷十八。

【组成】胆矾半两 (一份刀上枯,一份生为末) 铅丹一分

【用法】上为细末。每服半钱,以淡乌梅汤调下。

【主治】痰涎。

64929 神应散

【方源】《卫生总微》卷十三。

【组成】硫黄(栗子大)一块 硼砂(栗子大)一块 诃子一个(去核) 密陀僧(栗子大)一块

【用法】上为细末。每服半钱,乳汁调下。服了时,就有癖处卧少时,当取下黑物效。

【主治】小儿乳癖。

64930 神应散

《产宝诸方》引《济世方》。为方出《证类本草》引《杜壬方》,名见《产育宝庆》卷上"神应黑散"之异名。见该条。

64931 神应散

【方源】《三因》卷七。

【组成】玄胡索 胡椒各等分

【用法】上为末。每服二大钱,酒半盏,水半盏,煎七分,食前温服。

【功用】《医统》引《医学集成》：散气开郁。

【主治】诸疝，心腹绞痛不可忍。

64932 **神应散**

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】罂粟壳（去顶蒂瓤）二两半（用蜜半两许拌罨一二时，炒令紫色） 川干姜一分半（洗炒） 甘草（炒） 人参（去芦，炒） 当归（去芦）各一分

【用法】上为细末。每服三钱，食前米饮调下。

【主治】泻痢。

64933 **神应散**

【方源】《儒门事亲》卷十五。

【异名】神验散（《普济方》卷二九七引《神效方》）。

【组成】牛头角腮一只（酌中者） 猪牙皂角七锭 穿山甲四十九片（或园取，或四方取，或一字取之） 猬皮一两 蛇退皮一条

【用法】上捶碎，盛在小口瓷器内，盐泥固定，日中晒干，瓶口微露出烟，用文武火烧红赤烟微少，取出放冷为细末。如服药日，先一日临卧细嚼胡桃仁半个如糊，用温醇糯酒一盏送下，不语便睡。至次日交五更服药，验病年月远近，每用三钱至五七钱，用水半大碗，醇糯酒半大盏，相合热，和药服之，至辰时再服。又法，依前服药，不须用胡桃仁，久病不过七服。

【主治】肠风痔漏。

【宜忌】忌油腻、鱼、鳖、鸡、兔、猪、犬等物。

64934 **神应散**

《普济方》卷一五四引《家藏经验方》。为《百一》卷三“三圣散”之异名。见该条。

64935 **神应散**

【方源】《妇人良方》卷一。

【组成】桂心不拘多少（甘锅内煅，微存性）

【用法】上为末。每服一二钱，米饮调下。

【主治】妇人血崩不止。

64936 **神应散**

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】吴茱萸不以多少（生用）

【用法】上为粗末。熨烙，却用盐包盖之。

【主治】诸疮肿硬，色白不溃，疼痛不已。

64937 **神应散**

【方源】《朱氏集验方》卷二。

【组成】茯苓 甘草 黄芩 地骨皮各等分

【用法】水煎服。

【主治】四时瘟疫伤寒。

64938 **神应散**

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】玄明粉（生用） 炉甘石（烧通赤为度）各等分

【用法】上同研极细。每用药一粟米粒大，用新水一匙调药点，不拘时候。

【主治】眼暴赤疼痛。

64939 **神应散**

【方源】《医方类聚》卷二一九引《吴氏集验方》。

【组成】明矾三钱（煅） 黄丹半钱

【用法】上研细。每以少许掺之。经夕便干。

【主治】春、夏间脚指叉湿烂。

64940 **神应散**

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】罂粟壳（去梗蒂，锉碎，蜜水炒透） 杏仁（汤泡，去皮尖，炒过） 白胶香（浮者，水煮过，滤干） 人参（去芦） 阿胶（锉碎，炒过） 麻黄（去节存根） 乌梅（和核）各二两 桑白皮（去粗皮，锉碎，蜜水炒透） 款冬花（浮者）各一两 甘草（炙）一两

【用法】上㕮咀。每服二钱，水一大盏，加生姜三片，大枣一枚，煎八分，空心温服，或不拘时候。

【主治】①《活幼心书》：小儿大人虚喘。②《顾氏医径》：小儿久哮不已，寻常汤丸无效者。

【备考】《顾氏医径》有诃子，无乌梅。

64941 **神应散**

【方源】《杂类名方》。

【组成】川芎　防风　升麻　细辛　茯苓　白芷　香附子　荜茇　甘松各等分　石膏比以上加三倍

【用法】上为细末。每晚临卧刷净牙,以指蘸搽,热麻漱去。

【功用】牢牙去风。

【主治】牙疼。

64942　**神应散**

【方源】《得效》卷六。

【组成】金樱草梗　肉豆蔻　诃子　罂粟壳(去蒂萼)　地榆　甘草　当归(去尾)　茯苓　白术　枳壳(去瓤)　乌梅各一两　丁皮　木香各五钱　陈皮一两(取红生血,若红痢勿用)

【用法】上为丸或末。五花痢,用春茶、陈皮煎汤送下;如是末,用蜜一匙,春茶、乌梅煎汤调服。

【主治】痢。

64943　**神应散**

【方源】《脉因证治》卷下。

【组成】大黄(酒浸)一两　桃仁　红花二钱　当归三钱　瓜蒌根二钱　炮穿山甲二钱　柴胡　麝

【用法】热酒调下。

【主治】倾仆瘀血,大便不通者。

【备考】方中柴胡、麝用量原缺。

64944　**神应散**

【方源】《医方类聚》卷一二九引《必用全书》。

【组成】广木香三钱　泽泻　槟榔　椒目各半两　大黄一两半　黑牵牛一两　黑附子一只(重一两者佳,半只湿纸裹,炮裂)

【用法】上为细末。每服五钱,樟柳根自然汁、蜜一大匙,将前附子同擂碎,取汁,放温,五更同药调,面东服。

【主治】十种水气,五蛊、水蛊、血蛊、酒蛊、气蛊,四肢浮肿,腹胀,小便不通,大便涩,黄蕴,不思饮食。

【宜忌】忌盐、酱、蜜、腥腻、房事一年。

64945　**神应散**

【方源】《保命歌括》卷十三引《青囊杂纂》。

【组成】杜仲(姜汁拌炒断丝)　破故纸(炒)各一两　木香一钱

【用法】上为末。每服二钱,空心温酒调下。二三服效。

【主治】腰痛。

64946　**神应散**

【方源】《奇效良方》卷二十四。

【组成】光草乌(炮裂)　细辛(去土)各五钱　好茶一两半

【用法】上为细末。每服半钱,临卧浓茶点服。

【主治】一切头风。

64947　**神应散**

【方源】《医统》卷六十引《医学集成》。

【组成】玄胡索　胡椒　小茴香各等分

【用法】上为末。每服二钱,酒调下。

【功用】散气开郁。

【主治】寒疝,诸疝,心腹痛不可忍。

64948　**神应散**

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】轻粉一钱　鸡内黄二钱　麝香三分　冰片三分　黄柏末二钱　韶粉二钱　五倍末一钱　黄连二钱

【用法】上为末。先用甘草、苦参、猪蹄、薄荷、白芷、防风、荆芥煎汤洗净,拭干,微擦破,将陈菜油、猪胆汁调搽患处。内服当归内托散。

【主治】发须毒。脾胃虚热,心肺邪热上攻禾髎之端,多在承浆之侧,形如羊刺,四边肿硬,痛楚难禁,时流黄水,麻痹增寒壮热。

64949　**神应散**

【方源】《赤水玄珠》卷三十。

【组成】肥皂核(烧存性)五钱(另研为末)　荆芥　何首乌　天花粉　防风　苦参各一两　薄荷叶五钱

【用法】上为末。每日用新鲜白土茯苓八两,雄猪肉四两,入前末药五分,肥皂核末子

一分，共用水七碗，煮烂去滓，其肉听食，汤准茶服，不过十日痊愈。如善食肉者，可作大剂与之。

【主治】杨梅疮。

64950 **神应散**

【方源】《寿世保元》卷六。

【组成】雄黄 枯矾 藜芦(生用) 牙皂(炙黄)各等分

【用法】上为末。每用豆大一粒，吹鼻内。

【功用】吐痰。

【主治】时气缠喉，入喉肿塞，水谷不下，牙关紧闭，不省人事。

64951 **神应散**

【方源】《叶氏女科》卷三。

【组成】生蜂蜜 甜酒酿各一杯 麻油一杯

【用法】上共煎数沸，入童便一杯服。

【功用】《妇科玉尺》：润肠易产。

【主治】难产。破胞已久，胞浆涩尽，产门风进，产路干涩而难产者。

64952 **神应散**

【方源】《外科十三方考》下编。

【组成】肥皂核(烧存性)五钱(另研，此味万不可少) 荆芥穗 北防风 何首乌 天花粉 嫩苦参各一两 白当归 白鲜皮各三钱 金银花五钱 薄荷叶五钱 白蒺藜三钱 净连翘三钱 粉甘草二钱

【用法】上为细末。每日用新鲜白土苓八两，雄猪肉一斤(精肉宜多)，水数大碗，再入前药末五分，肥皂核末子一分，煮烂，滤去滓，其肉听食，其汤则代茶饮，不过十日，即可痊愈。如善肉食者，可作大量予之。善后用阴八味或二妙地黄汤收功，且保永无后患。

【主治】杨毒疮。

【加减】如兼有筋骨疼痛者，可酌加威灵仙、木瓜、苡仁、苍术等同为末。

64953 **神应膏**

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】白及 白蔹 当归 桂(去粗皮)各一分 附子一枚(半两者，去皮脐) 乳香缠半两 东南槐枝 柳枝各二条(各长七寸，锉细) 铅丹三两 巴豆三分(去皮研) 清油六两

【用法】上锉细，于石器内先下油与白及等煎令焦黑，以绵滤去滓，入铅丹、巴豆，慢火熬成膏，先以水一碗，投药入水，其药直入水中，如珠为度，后刮下，入瓷器内收贮。每用少许，量核大小涂贴。

【功用】去恶肉。

【主治】瘰疬已破，疮口浸淫，脓水不绝，及一切恶疮。

64954 **神应膏**

【方源】《圣济总录》卷一三〇。

【组成】栝楼一枚(去皮) 零陵香 藿香 芍药 甘草 黄耆 杏仁(去皮)各一分 白芷三分 龙脑 麝香(并研)各一钱 黄蜡一两半 清油六两

【用法】上除龙脑、麝香外，并锉细，于腊月用油浸七日，却出药，将油炼令香熟，放冷，秤六两，却再入诸药煎令黄，用夹绢袋滤去滓，再入锅内旋旋下蜡搅匀，滴水中成珠即止，去火候温，入龙脑、麝香打匀，倾出热瓷盒内，听用。摩风止痛痒，用薄绢摊贴之；口疮，含化一豆大；风毒气眼睑赤烂，疼痛不可忍者，用药涂之；口面风癣，以药涂擦，热彻为度；耳鼻中肉铃，用纸捻点一豆大，一月取下，并不疼痛。

【功用】除瘢痕，退皯黯。

【主治】一切疮肿，伤损，汤火烧。

【备考】本方方名，《医方类聚》引作“神愈膏”。

64955 **神应膏**

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】牛皮胶一斤(多年陈者，捶碎) 生姜一斤(取汁) 肉桂(去粗皮)一两(为细末)

【用法】上先将胶子铫内用水煎溶，次下姜汁在内，搅熬稀稠得所，即逐渐抄肉桂末在内，慢火搅极匀，倾入瓷罐子内，密封贮。每用药摊于患处，以纸花子三两重盖覆，其痛即

止，渐渐平复。如药熬下多日变硬，再于火上熔动；如大稠，即入生姜自然汁搅匀，如前用之。

【功用】消肿定痛。

【主治】闪扑伤损。

64956 **神应膏**

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】龙泉好光粉二两 真麻油三两

【用法】上慢火同熬，更换柳枝频搅，滴入水成珠，方入白胶末少许，徐徐倾入瓷器，以水浸二日。用纸摊贴。

【主治】痈疽，发背，恶疮。

64957 **神应膏**

【方源】《医方类聚》卷一九二引《吴氏集验方》。

【组成】麻油四两 巴豆十四粒(连皮，不令破) 木鳖七个(连皮，不令破) 妇人头发如枣大

【用法】上慢火熬，候巴豆、木鳖焦黑，取去不用，却入黄丹二两，不住手用柳枝搅，候黑色，滴水中成珠子方住，瓷瓶收。

【主治】疮肿。

64958 **神应膏**

【方源】《医方类聚》卷一九四引《经验秘方》。

【异名】碧霞膏。

【组成】香油一两半 巴豆四十五粒(白净者) 篦麻四十五粒 黄蜡一两 沥青四两 乳香一两(为末) 没药一两(为末) 轻粉三钱 铜青六钱(为末，又名铜绿，滴香油一处研，用柳条调药)

【用法】上用乳香、没药，先研极细末，方用油煎巴豆、蓖麻，候焦黄色，去豆、麻，油再入砂铫，溶蜡、沥青待化，下乳香、没药，用黄草布滤过，再入铫内，方入轻粉、铜青搅匀，倾入水中，捻成锭子。如用时，冬月热水浸冷，令软捻开，如患处大小，于帛上贴；夏月略于口中，待软用。

【主治】发背痈疽。

64959 **神应膏**

【方源】《医方类聚》卷一九四引《经验秘方》。

【组成】沥青三斤 松香三斤 黄蜡四两 没药三两 乳香四两 黄丹四两 五灵脂二两 降真末四两 无名异四两 麝香二钱 蜂窝一钱 巴豆六钱 马庇勃三钱 大黄一钱 黄柏一钱 黄芩一钱 白及一钱 贝母一钱 知母一钱 威灵仙一钱 赤蔹一钱 独行草一钱(乃青木香根) 草乌一钱 地骨皮一钱 黄连一钱 寒水石一钱 天花粉一钱 香白芷一钱 香油一斤 葱汁四两 姜汁六两 米醋半碗

【用法】先下锅，香油、巴豆、黄蜡、松香、沥青；续下锅，大黄、黄连、白芷、黄柏、草乌、黄芩、赤蔹、贝母、知母、独行草、地骨皮、白及、天花粉、姜汁、葱汁、醋、寒水石、威灵仙；另为末，没药、蜂窝、五灵脂、无名异、降真末、乳香、马庇勃，另将黄草布搽为末；又下锅，黄丹、麝香。上药先用香油熬巴豆良久，下黄蜡化，下沥青化，下松香化尽，倾入水中，结成块，再下锅，入醋、葱汁、姜汁，并其余药一处搅匀，尽入乳香、黄丹并无名异等末，并马庇勃、麝香、滴下水中成膏子为度。待用时，摊在好纸上，贴在疮肿处。

【主治】发背痈疽。

64960 **神应膏**

【方源】《医方类聚》卷一九四引《经验秘方》。

【组成】大肥皂角二十挺 乳香一两(研为末) 天南星三钱 草乌头三钱 木鳖子(去壳)三钱 官桂三钱 没药三钱 血竭一钱(另研) 轻粉一钱

【用法】上将皂角微炙过，捶碎，以好陈米醋二升，将皂角煎五七沸，揉去滓，熬成膏，入乳香末搅令匀，次下后项药末令匀，放温。涂于患处约一分厚，用竹篦子先搽药于患处，皮肤热，然后却将药摊平，上以藤纸贴之。其痛立止。

【主治】脚气。

64961 **神应膏**

【方源】《得效》卷十一。

【组成】黄柏一两 真绿豆粉一两半 甘草四两 红花二两

【用法】上为末。生清油调涂两眼四畔。

【功用】护眼，防豆花入眼生翳，令疮痘面上亦少。

64962 **神应膏**

【方源】《普济方》卷六十五引《德生堂方》。

【组成】全蝎二十一个 五倍子五钱 土狗六个 地龙二十一条（去土）

【用法】上为细末，葱白二根，烂捣取汁，调成膏。纸花贴太阳左右穴上。

【主治】牙疼。

64963 **神应膏**

【方源】《医学纲目》卷十八。

【组成】当归一两一钱 赤芍药 大黄各一两五钱 香白芷 官桂各一两 玄参一两三钱 川续断一两二钱 莪术一两 生地一两二钱

【用法】上药锉细，用真香油二斤浸，春五日、夏三日、秋七日、冬十日，入锅内以文武火煎令黑色，滤去滓。如热天用黄丹二十两，冷月十五两，旋旋下丹，不住手搅，试水中沉为度。如漏有孔者，以膏送入孔内，外仍以膏摊贴之；如肠毒、胃毒，为丸服之。

【功用】《济阳纲目》：收敛疮口。

【主治】久漏疮，肠毒，胃毒。

64964 **神应膏**

【方源】《普济方》卷三一五。

【组成】清油三斤 桃枝 柳枝 槐枝各半斤 木鳖子仁半两 当归一两 黄丹一斤 乳香 没药各半两（另研细末）

【用法】上将油慢火熬，续下三枝焦，去滓不用；下木鳖子、当归焦，去不用；冷定，下丹、乳、没药，枝搅丹性绝，再用慢火熬，不住手搅，休溢出，滴水内成珠不散为度，瓷器盛之。旋摊贴之。

【功用】消毒止痛，活血溃脓，去风生肌。

【主治】一切恶疮，亦治杖疮疼痛。

64965 **神应膏**

【方源】《普济方》卷三一五。

【组成】皂荚（肥大者）二十挺 蓖麻一两（为末）

【用法】上将皂荚炙过捶细，好米醋二碗，同煎五七沸，揉去滓，熬成稀膏，入乳末搅匀，次加木鳖、草乌、南星等末匀，熬一沸取下，再入没药、血竭、轻粉匀，放温量患处，约一分厚。纸贴上。

【主治】脚气疼痛不可忍，及寒湿。

64966 **神应膏**

《秘传外科方》。为原书“仙方隔纸膏”之异名。见该条。

64967 **神应膏**

【方源】《医统》卷七十九。

【组成】腊月猪板油五两 黄蜡半斤 铅丹（真者） 自然铜（淬，研） 密陀僧（研）各四两 朱砂一两（另研）

【用法】上用新铛先溶猪油，次下黄蜡子冷处，下铅丹、陀僧、自然铜，缓火再煎，水中滴之不散，更出铛，冷下朱砂搅匀至凝丸，如弹子大，用笋皮视冷收。凡遇木石损伤碎者，用火化开，糊伤处敷上，然后夹定，用此药服时重丸，梧桐子大。每服十丸，葱、酒调下。或伤深者，须填孔中；浅者，油单纸摊贴；甚者，灯心裹木夹之。如药力散，再觉痛，更一服即止，又痛甚者，又贴之。

【功用】接骨止痛。

【主治】跌打刀伤。

64968 **神应膏**

【方源】《医学入门》卷八。

【组成】香油一斤

【用法】上入乱发一团，如鸡子大，于铫中文武火熬至发枯，入杏仁一两，再煎枯黑，滤去滓；入黄耆七钱半，玄参五钱，熬一二时久住火；候火力稍息，入带子蜂房一两，蛇退五钱，以柳木不住手搅，慢火熬至枯黑，滤去滓；

入黄丹五两，不住手搅，滴水成珠，不软不硬，瓷器收贮。随意摊贴。

【主治】诸般痈肿疖毒。

64969　**神应膏**

【方源】《回春》卷五。

【组成】乳香　没药各一两(为末)　皮胶三两　生姜二斤(取自然汁)

【用法】先将生姜汁以砂锅内煎数沸，入皮胶化开，将锅取下坐灰上，方入乳、没末，搅匀成膏。用不见烟的狗皮摊膏药，贴患处。仍用鞋底炙热，时时在膏药上运动熨之。

【主治】痛风，骨节疼痛。

【宜忌】勿犯铁器。

64970　**神应膏**

《东医宝鉴·杂病篇》卷八。为《古今医鉴》卷十五引陈小轩"神雁膏"之异名。见该条。

64971　**神应膏**

【方源】《痧痘集解》卷六。

【组成】雄黄一钱

【用法】上研细。用绵胭脂重汤浸汁令浓，调雄黄末点于疗头上，立时红活。

【主治】痘疔。

【方论选录】盖雄黄能拨毒，胭脂能活血耳。

64972　**神应膏**

【方源】《种福堂方》卷三。

【组成】真阿魏三钱　麝香二钱　朱砂四钱　雄黄　五灵脂　甘草各一两　川乌　草乌各四两

【用法】上将新鲜闹羊花十斤，拣去梗叶，打自然汁入瓦器中煎成膏，如稠糖为度。将药为细末，入闹羊花膏内搅匀，勿令凝底，用大瓷盆几个，每盆将药摊一薄层，置烈日中晒干，取下瓷瓶封固。如遇肿毒，用酒调匀如半干糊，将笔蘸药，先从红肿上面画一圈；待药将干，再画第二层于圈内，与前圈相连，即将酒润旧干圈上；待第二圈将干，再画第三层于圈内，与第二层相连，又将酒润外边干处，每干一层再画进一层，只空当头，如豆大一孔，使毒气从此而出。圈内用酒常润药上，不可间断，至半日乃止。待药自干落，不必洗去，其毒自消。

【主治】痈疽。

64973　**神灵丸**

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】蜀椒(青者，黄柏为衣)

【用法】上禁齿破，临卧白汤送下，生一星者一丸，二星者二丸，随其星之数而咽下。夕用则朝消。

【主治】角膜星翳。

64974　**神灵丹**

【方源】《普济方》卷二五六引《医学切问》。

【组成】杏仁四十九枚　半夏四十九枚　巴豆四十九枚　防风(去芦)　滑石　草乌头(炮)　雄黄　木香　朱砂　百草霜各二钱

【用法】上为末，醋糊为丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服十五丸，量深浅加减服之。喉痹，甘草桔梗汤送下；食牛肉毒，温水送下；泄泻，陈皮汤送下；五淋，灯心汤送下；白痢，干姜汤送下；赤痢，甘草汤送下；解一切毒，甘草汤送下；痈瘟疮毒，气血不消，生姜、升麻汤送下；疥癞疮毒，白蒺藜、甘草升麻汤送下；追取劳虫，空心桑白皮汤送下；脾积，三棱、蓬术煎汤送下；痰嗽，生姜汤送下；酒食所伤，随物送下；脚气，槟榔煎汤送下；血痢，乌梅煎汤送下；打扑损伤，瘀血在内，童子小便送下；十种水气，四肢浮肿，大戟汤送下；一切疟疾，桃柳稍叶七片煎汤送下；大便秘结，麻子仁汤送下。

【主治】喉痹，食牛肉毒，泄泻，五淋，赤白痢，血痢，一切毒，痈瘟疮毒疥癞，劳虫，脾积，痰嗽，酒食所伤，脚气，打扑损伤，瘀血在内，十种水气，四肢浮肿，一切疟疾，大便秘结。

64975　**神灵丹**

【方源】《臞仙活人心方》。

【组成】汉防己五钱　五灵脂一两　蒲黄一两(微炒)　良姜五钱　斑蝥二十个(同良姜炒黄色，去斑蝥不用)

【用法】上为细末，醋糊为丸，如皂角子大。每服一丸，艾醋汤送下。或痛甚，碾为末，调下。

【主治】急心痛。

64976 神灵散

【方源】《圣济总录》卷六。

【组成】粉霜一两（白面少许，滴水和作团子，炙令黄色为度） 丹砂（研）一钱 硼砂（研）一钱 牛黄（研）半钱 龙脑一字（细研）

【用法】上为细散。每服一字匕，煎陈粟米饮调下。

【主治】卒中风，涎潮。

64977 神灵散

【方源】《丹溪心法附余》卷十二。

【组成】焰消一两 黄丹 雄黄各三钱 没药 乳香各二钱

【用法】上为细末。令患人噙温水，用竹筒吹药少许入鼻中。

【主治】偏正头痛，眼痛不止，及破伤风等疾。

64978 神灵散

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】铅白砂 硇砂精各等分

【用法】上和水少许，点眼中。

【主治】眼目肿痛，赤脉纵横及星翳。

64979 神灵膏

【方源】《良朋汇集》卷四。

【组成】绿豆粉四两（炒黄色） 川黄连末一两 麝香 冰片各五分

【用法】上用炼过净蜜四两，共合一处，放净石板上，以铁锤打千锤，收贮瓷器内听用。如点眼，凉水点上；瘙疮，水调搽上；口疮，用绿豆大一粒，含漱咽下。

【主治】口内诸疮，暴发火眼。

64980 神妙丸

【方源】《幼幼新书》卷九引《吴氏家传》。

【组成】蛇退（全，纹细者，瓦上烧灰）半钱 人参（紧实者）一钱 麝半钱 天南星（去皮脐，生）五钱

【用法】上面糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，麝香米饮下，日午夜各一服。

【主治】小儿急慢惊风。

64981 神妙丸

【方源】《续本事》卷二。

【组成】盐 硫黄各等分

【用法】上为末，水调生面为丸，如梧桐子大。每服十五丸，食前用薄荷茶送下；荆芥酒亦得。

【主治】头疼及脑风。

64982 神妙丸

《卫生总微》卷十三。为《鸡峰》卷二十四“神砂丸”之异名。见该条。

64983 神妙丸

【方源】《朱氏集验方》卷十三。

【组成】威灵仙根（和乌豆煮，焙干）

【用法】上为末，酒煮面糊为丸。每服五十丸，空心送下。

【主治】打扑伤损。

【临证举例】金疮 渠当年腰下为金疮所伤，遇春则发，痛入小腹不可忍，用此方疗之神妙。

64984 神妙丸

【方源】《普济方》卷二四二。

【异名】金龙丸。

【组成】赤脚蜈蚣（全者）一条（一方不用） 全蝎二十一个 黑豆三十七粒（不焙尤佳） 地龙（去土，焙） 草乌（生）各半两 （一方有川乌）

【用法】上为细末，糯米糊为丸，如赤豆大。每服七丸，空心麝香冷酒送下，如人行二十里，将荆芥茶一盏投之。服后行如不能动步，则垂脚。如利了，脚肿处便皱，且不疼，但初服时渐麻动，更加二三丸亦可。

【主治】干湿脚气，骨里作疼，或热或肿，或不肿引至膝上，走疰难忍。

【宜忌】初服时忌食热物。

64985 神妙丸

【方源】《回春》卷五。

【组成】硫黄(熔化,倾入水中,捞起研细末)二分 荔枝核一钱五分(砍碎,炒黄色) 川芎(盐水煮,捞起切片)五分 吴茱萸(盐酒炒)一钱 大茴香一钱半 木香 沉香 乳香 橘核各一钱

【用法】上为末,酒糊为丸。每服五十丸,空心米汤送下;酒亦可。

【主治】疝气,小肠气,膀胱气,盘肠气,水肾气,偏坠。

64986 **神妙丸**

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】雄黄 蟾酥 胆矾 半夏各等分 麝香少许

【用法】上为末,用猫儿草捣汁和为丸。用口嗒痛处,令净,用丸散揩擦。

【主治】蝎螫。

64987 **神妙丸**

【方源】《玉案》卷三。

【组成】真沉香一两 阿魏 槟榔 穿山甲 云术各一两五钱 朱砂 雄黄各八钱

【用法】上为细末,醋和为丸,如梧桐子大。每服六十丸,空心姜汤送下。

【主治】疟母积块,作痛发热。

64988 **神妙方**

【方源】《奇效良方》卷五十四。

【组成】油发(烧作灰,存性)

【用法】上为细末。敷之,干则津唾调敷;仍以米饮调发灰,食前服。

【主治】茎头三五孔,小漏疮出血,微脓。

64989 **神妙汤**

【方源】《圣济总录》卷七十九。

【组成】茴香子(炒) 乌药 青橘皮(汤浸,去白,焙) 高良姜各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,用童子小便半盏,酒一盏,同煎至一盏,去滓,稍热服,不拘时候。

【主治】十种水气。

64990 **神妙汤**

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】革薢 栝楼根 甘草(剉) 五倍子 豉 葱白(切)各等分

【用法】上锉碎。每用一二两,以水两碗,煎数沸,盆盛,坐熏痔,候通手洗之。

【主治】痔疾。

64991 **神妙饮**

【方源】《玉案》卷三。

【组成】生地 当归 细辛各一钱五分 骨碎补 防风 赤芍 川芎 槐花各二钱 升麻 知母各一钱

【用法】水煎,温服。

【主治】牙疼不可忍,牵引头面,发热发肿者。

64992 **神妙散**

【方源】《圣济总录》卷一二六。

【组成】牵牛子(炒,半生半熟) 青橘皮(汤浸,去白,焙) 栀子仁 地骨皮 玄参各等分

【用法】上为细散。每服二钱匕,空心糯米饮调下,次日服生犀丸。

【主治】瘰疬,肿痛成疮。

64993 **神妙散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十九。

【组成】豆豉一合(炒焦) 白矾半两(枯过) 腻粉一钱

【用法】上为极细末。先净洗疮,剃去发,以小便一盏,烧秤锤通红,淬入小便中,热洗去疮皮令净,血出无妨,用软帛子拭干,生油涂药敷之。

【主治】小儿头疮,疳肥秃疮。

64994 **神妙散**

【方源】《普济方》卷七十八引《卫生家宝》。

【组成】朴消二两(安豆腐淋过,将瓦盏煅) 辰砂半钱 乳香半钱 玄明粉一分 脑子三字 麝香三字 胆矾半钱 硇砂半钱 南硼砂半钱

【用法】上为细极末。以铜箸点之。

【主治】翳膜障眼。

64995 **神妙散**

【方源】《医方类聚》卷一四一引《经验良方》。

【组成】大黄 人参 枳壳 火麻子各等分

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，白汤送下。

【主治】赤白痢疾。

64996 **神妙散**

【方源】《活人心统》卷三。

【组成】石灰（火煅）

【用法】上为末。量核大小，白果肉捣膏贴之，或蜜调敷。

【主治】郁痰结核，状如瘰疬，红肿在于颈下，身背或痛，寒热。

64997 **神妙散**

【方源】《玉案》卷三。

【组成】当归 生地 母丁香 子丁香 青盐 旱莲草 细辛 没食子 茯神（去皮为末，以桑椹取汁，浸晒九次）各等分

【用法】上为细末，清晨擦牙，即用滚水多漱咽下。未白者，永不白；白者，擦上半载，须发皆黑，齿牙坚牢。

【功用】乌须固齿。

【主治】齿痛。

64998 **神妙散**

《医方易简》卷七。为《景岳全书》卷五十一"神香散"之异名。见该条。

64999 **神妙膏**

【方源】《普济方》卷三一五。

【组成】乳香 没药 头发 大黄 肉桂 当归 玄参 续断 莪术 生地黄 赤芍药 白芷 射干 巴豆 明矾 黄芩 柳枝各半两 香油一斤 黄丹八两 麝香一钱

【用法】上锉，如豆大，油浸一宿，煎柳枝搅令色黑，滤去滓，油再入铫，微冷下丹煎，不住手搅，以黑色、滴水中不散、不粘手为度，下乳、没、麝香搅匀，取出。每用油纸安刀上，摊以药，量大小贴患处。治杖疮，宜中间贴，此膏药用大黄、黄柏皮、黄芩三味焙干为末，鸡子清调涂四边，用皮纸条封，一日一次，换膏药，第三日葱、椒、盐汤熏洗疮。内服乌药顺气散。

【主治】诸般疮疖痈疽，攧伤损及折伤。

【宜忌】忌醋、面、肉。

65000 **神妙膏**

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】甘草 羌活 细辛 黄连 贝母 菊花 当归 枳壳 大黄 白芷 生地 防风 荆芥 木贼 黄芩 川芎 苍术 猪苓 泽泻 白术 薄荷 桔梗 石斛 赤芍药 蔓荆子 草决明 牛蒡子 青葙子 菟丝子 车前子 夏枯草 地骨皮

【用法】上将羊脑、炉甘石四两，用一袋盛了，用煎药入水煮三昼夜，次取起去药，将石入乳汁浸之，又用瓷器上盖一碗，打火半炷香，只用石，细研如面。点眼。

【主治】眼目症。

65001 **神茄汤**

【方源】《疡科选粹》卷五。

【组成】老茄子九个

【用法】上煎汤，以小脚盆一个，用一盖盖上，开一窍，对肛门坐于上，熏之，待水稍温，却于盆内趁热洗之，直待水冷方止。

【主治】痔漏。

65002 **神枣汤**

【方源】《幼科直言》卷四。

【组成】茯神七分 枣仁六分（炒） 白术七分（炒） 当归六分 黄耆七分 沙参七分 百合七分（炒） 白芍七分（炒） 陈皮五分 甘草六分

【用法】水煎服。兼服健脾丸。

【主治】小儿心疳。体虚神弱而多惊悸，面色乍红乍白，瘦弱畏人。

65003 **神枣散**

【方源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】顶大南枣一个（去核） 真铜绿（须铜上刮下者）不拘多少 鳖头一个（煮取净骨，打碎）

【用法】将铜绿、鳖骨填满枣内，将枣合紧

线扎，煅存性，为末。先将秋海棠根叶煎汤洗疮，后用清水调敷。

【主治】痔疮。

65004　神奇散

【方源】《圣济总录》卷一三九。

【组成】麒麟竭(研)　没药(研)　自然铜(煅令紫)　天南星(炮)　干姜(烧灰)　铅丹(炒黑)　腻粉　瓦藓各一分　麝香(研)少许

【用法】上为散，拌匀。每用药贴疮，先以盐水洗过，烧葱研汁涂疮上，然后干掺药贴之。

【主治】刀斧所伤并箭伤，血出不止，诸药贴不住者。

65005　神奇散

【方源】《古今医鉴》卷五。

【组成】当归一钱　川芎七分　白芍药(酒炒)一钱　生地黄二钱　陈皮八分　砂仁七分　半夏(姜制)八分　白茯苓一钱　白术(土炒)　香附(醋炒)一钱　枳实(炒)一钱　乌梅三个　藿香一钱　赤茯苓一钱　槟榔一钱　木通一钱　猪苓一钱　黄芩(炒)一钱　黄柏(酒炒)一钱　知母(人乳拌炒)一钱　赤芍药一钱　天门冬(去心)一钱　麦门冬(去心)一钱　甘草八分

【用法】上锉一剂。用水二钟，煎一钟，入童便一盏服。

【主治】噎食翻胃，三阳枯竭。

65006　神奇散

【方源】《回春》卷八。

【组成】穿山甲三片(土炒)　木鳖子(去壳)三个　牡蛎　大黄各三钱　黄连　黄芩　黄柏　金银花　连翘各一钱半　黄蜡三钱

【用法】上锉一剂。酒、水各半煎，空心服。

【主治】便毒鱼口。

65007　神虎丸

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】乌头(生，去皮脐)　葨菪子　吴茱萸(汤洗七遍)　黑豆(生，去皮)各等分

【用法】上为末，滴水为丸，如梧桐子大。每服十五丸，冷水送下，一日三次。

【主治】大风癞病。

65008　神明丸

【方源】《幼幼新书》卷二十引《仙人水鉴》。

【组成】鼓子花　雄黄　紫石英　远志各二分　槟榔一枚(生)　桃仁(去皮尖)　光明砂各一分　金箔一片

【用法】上为细末，以蟾酥为丸，如麻子大。每日一丸，米饮送下。

【主治】小儿骨热劳，渐渐瘦弱，不能食。

【宜忌】忌果子。

65009　神明散

【方源】《医方类聚》卷五十二引《四时纂要》。

【组成】苍术　桔梗　附子(炮)各二两　乌头四两(炮)　细辛一两

【用法】上为散，绛囊盛。每次佩带方寸匕，一人带，一家不病；有染时气者，每服方寸匕，新汲水调下，取汗便愈。

【功用】辟温疫。

【主治】时气温病。

【宜忌】春分后宜施之。

65010　神明膏

【方源】《医心方》卷五引《古今录验》。

【组成】蜀椒一升半　吴茱萸半升　术五合　芎䓖五合　当归五合　附子十五枚(去皮)　白芷五合　桂一两　苦酒二升半　猪肪五升

【用法】上㕮咀，渍著苦酒中一宿，明旦纳药膏中微火上煎之，三上三下，留定之，冷乃上也，候色黄膏成，以绵合布绞去滓，密封。若腹痛，每服半枣大一个，温酒送下，一日三次；皮肤肿痛，向火摩数百过，一日三次，稍定即止。

【主治】目风烂，赤眵，眦恒湿；风冻疮，目烂赤泡。

65011　神明膏

【方源】《外台》卷十九引苏恭方。

【组成】附子十四枚(小者三十个，炮)　吴茱萸一升(生用)　蜀椒一升半　白芷一升

前胡(切)一升　芎䓖(切)一升　白术(切)一升　桂心三两　当归三两　汉防己(切)一升　细辛二两

【用法】上切，酢淹渍一宿以成，煎猪脂(有牛酥代，尤佳)五升，煎五上五下，去滓。摩肿及不仁处。

【主治】脚气，风痹，手足疼弱，肿胀不仁，鼠漏、恶疮毒，所有腹内绞痛。

【宜忌】忌猪肉、冷水、生葱、生菜、桃、李等。

【加减】风多，去汉防己；肿者，去细辛。

65012 神明膏

【方源】《医方类聚》卷一九五引《千金月令》。

【组成】蜀椒三升　吴茱萸一升　前胡　芎䓖　白芷　白术各一两　当归　细辛各二两　附子三十枚

【用法】上以三年大酢渍一宿，以猪脂肪十斤，煎之三上三下，候白芷黄色成。每服如弹丸一枚，诸风皆摩，肿毒诸疮只涂。

【主治】一切疾风赤痒，耳聋疮肿。

【宜忌】勿令入耳目。

65013 神明膏

【方源】《外台》卷三十一引《广济方》。

【组成】前胡　白术　白芷　芎䓖(并切)　椒(去目)　吴茱萸各一升　附子三十枚(去皮，切)　当归　细辛　桂心各二两(切)

【用法】上药以苦酒渍一宿，令浥浥然，以成炼猪膏一斗，微火煎十沸以来，九上九下，候附子、白芷色黄，绞去滓，膏成。病在外，摩之；在内，每服枣核大，酒送下。

【主治】诸风顽痹，筋脉不利；疥癣，诸疮痒，折伤，被打等。

65014 神明膏

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】栝楼一枚(去皮瓤，只取仁子)　赤芍药　甘草(微炙)　黄耆　杏仁(汤浸，去皮尖)　香白芷　当归(洗，焙)　桃仁(汤浸，去皮尖)各一分　人参(去芦头)　川芎　苍术(米泔浸一宿，焙)　桑白皮各一分　沉香　零陵香　藿香叶(去土)各半两

【用法】上锉细，用清麻油十五两，浸药四十九日，候日满先倾油入银锅中，慢火炼令香熟，放冷却入诸药，以文武火养一日，候药色半焦滤去滓，却用鹅梨三枚(取汁)，黄蜡一两半，麝香一分，细研，并入药内重炼，候油不滚起，乃成膏也，用新绵滤过，待冷入研细生龙脑一分，搅匀，入新瓷器中盛之。若内伤，用药一钱匕，酒化服；口疮，含化少许；恶疮多年不生肌者，先以葱汤洗净，用药敷之；鼻内有肉铃子者，以纸捻子蘸药点之，一月可取之；干湿癣、风痒顽麻，并以药摩之。

【主治】痈疽，发背，一切疮肿，打扑伤损，汤火金疮，干湿癣，风痒顽麻。

65015 神明膏

【方源】《普济方》卷二八四。

【组成】五灵脂不拘多少(微炒)

【用法】上为末，新水调匀，涂于故绯绢上。贴之。

【主治】痈疽、疮疖、毒肿，无头疼痛，或有数头，烦热。

65016 神和散

【方源】《史载之方》卷上。

【组成】草豆蔻　肉豆蔻　陈橘皮　白术各半两　厚朴(去粗皮)　丁香　木香　大芎　蓬莪术各一分　吴茱萸三铢　诃黎勒三铢　芍药十铢

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏，加大枣二个，同煎八分，空心和滓服。

【主治】腹痛，由湿邪所胜。腹满而痛，食减体重，四肢不举，腹鸣肠泄。

65017 神金散

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】黑牵牛四两　延胡索二两　黄丹二钱　甘草一钱

【用法】上同炒令牵牛裂为度，为细末。每服一大钱，食前温酒调下。

【主治】腰痛。

65018　神金散

《病机沙篆》卷下。为《圣惠》卷四十“神圣散”之异名。见该条。

65019　神金散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】川草乌　白芷　赤芍　芙蓉叶　枇杷叶各等分

【用法】上为细末。韭菜叶捣汁调敷。

【主治】跌打损伤，肿痛难忍者。

65020　神金膏

【方源】《圣济总录》卷一三一。

【组成】白及　密陀僧(研)　甘草　黄柏(去粗皮)　黄连(去须)　腻粉各半两　麝香(研)一字

【用法】上为末，用津唾调成膏。以无灰白薄纸，看疮大小，涂纸上贴之，无力即换。

【主治】发背疮。

65021　神受丹

【方源】《普济方》卷一〇〇。

【组成】脑子半字　麝香半字　辰砂一钱　全蝎四个(去毒)　巴豆四粒(不去油)　轻粉半字(一作腻粉)　淡豉五十粒(汤泡，去皮)

【用法】上为细末，以豉膏为丸，如鸡头大。每服一丸，好酒送下，即时吐泻；如不吐泻，再服一丸。泻后白粥补之。七日后再依上服，又七日再三丸，取效。

【主治】五痼，痫风。

65022　神宝丹

【方源】《博济》卷四。

【组成】自然铜半斤　金星矾石　禹余粮石　石膏各一两

上四味，用炭火煅通赤，倾在酽醋内淬，如此凡一七度，放开后为末，入瓷盆内，以汤淘洗二十度，候浮尽，上面黑汁澄净了，只收在底真实药，子瓷器内慢火逼尽水脉后细研，乃用诸药如后：

蔓荆子　威灵仙　茯苓　天竺黄　天仙藤　白僵蚕　铅白霜　蝉蜕(去嘴尖，炒)　白蒺藜　旋覆花　莽草　犀角(镑)　半夏(汤洗去涎七度，麸炒令黄色)　藿香各一分　桑螵蛸　瓜蒂各二十个　赤小豆四十九粒　人参　槟榔(半生半熟)各半两　剑脊乌蛇(酒浸，去皮骨，炙黄，用肉)一两　真虎骨一两(酒浸，炙黄)　白龙砂(以白犬先系定，将粟米喂三日，取其第三日粪，淘取粟米，焙干)一两

上为末，再用下项药：

好朱砂一两(飞)　牛黄　龙脑各一两　麝香　腻粉　乳香各少许

【用法】上为极细末，用前药搅和令匀，用槐胶水煮面糊得所，入铁臼捣熟，丸如弹子大，焙干。每一粒，作十服，豆淋酒磨下，每五服后，浸皂角水磨下；小儿量大小以意加减与服，用薄荷、金银汤磨下。

【主治】大人、小儿一切风疾。

65023　神宝丹

【方源】《普济方》卷三七一引《全婴方》。

【组成】附子(米泔水一盏，生姜半两，研浸三日，次用蛤粉炒制，去皮脐)半两　羌活　朱砂　蝎尾半两　南星二个(各重一两，去皮脐，锉棋子片，酸浆一碗，生姜一分，切片子，煮酸浆水浸，去姜，焙干)半两(牛胆中南星尤妙)　麝香　乳香各一分

【用法】上为末，炼蜜和丸，如鸡头实大。三岁者每服半丸，食前薄荷汤化下。

【主治】小儿或先吐后泻，或先泻后吐，或泻吐俱发之后，变成慢惊者；小儿惊泻，便青腹痛。

65024　神宝饮

【方源】《玉案》卷四。

【组成】苍术　白术　人参各五钱　茯苓　当归　白芍　川芎　槐角(炒黑)各一钱五分　升麻一钱

【用法】水煎，食前服。

【主治】风邪入于胃经，下血鲜紫，及肠胃湿毒，下如豆汁。

65025　神降散

【方源】《直指》卷二十四。

【组成】满尺皂角(去弦核，烧存性)　麻竹

大獐（烧存性） 厚黄柏 鹰爪黄连 瓜樟叶（干） 白芷各等分

【用法】上各为末。先以桑寄生一小把、木槵桑根（取皮）一握、白芷、黄连煎汤，温和，以帛蘸洗患处，候露出尽，拭干，再以麻油调药末，敷之。

【主治】走皮瘫。

【宜忌】谨勿吃醋。

65026 神柞饮

【方源】《胎产心法》卷中。

【组成】生柞树刺枝如小指大一握（水洗净，切碎） 甘草五钱 新汲水一碗半

【用法】用新瓦罐入水与药于内，以纸三层密封，文武火煎八分，温服。不煎滓。凡觉腹疼腰重欲坐草时，即将此药温服一盏，便觉心下开豁；如渴，又饮一盏，觉下重便产，更无横生倒逆之患。若遇横生倒逆，不过三服即正。子死腹中，不过三服即下。能保母子两全。

【功用】催生。

【主治】横逆倒产，死胎在腹。

【临证举例】横产 一妇横产，儿手先出，致胛肿胀。欲截其手，不保其生，屡用催生药不效。以此药浓煎一碗与服，顷刻苏醒。再与一碗，困睡少时，忽云骨节都拆开了，扶起即血水涌下，拔出死胎，全不费力。

65027 神柞饮

【方源】《叶氏女科》卷三。

【组成】生柞枝（洗，锉） 益母草各一两 川芎五钱 当归五钱 人参三分

【用法】水二钟，煎一钟，温服。

【主治】少妇初产，交骨不开，或因临盆太早，用力推逼，儿横腹内，诸药无效者。

【方论选录】《沈氏经验方》：用柞枝取其滑泽，益母动血活血，芎、归养血调气，人参接养母力，自必脱然而生矣。服药后产妇须仰卧片时，待药力通过，交骨自开，儿身顺正，然后扶起临盆，则产母全不费力也。

65028 神柏散

【方源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】柏叶一握（去枝） 葱白（连根）一握

【用法】上同研如泥，用无灰酒一升，同煎一二十沸，去滓温服，不拘时候。如不能饮酒人，须当作四五次服，尽剂乃效。

【主治】中风，不省人事，涎潮口噤，语言不出，手足亸曳。

【备考】得病之日，便服此药，可使风退气和，不成废人。

65029 神柏散

【方源】《松峰说疫》卷五。

【组成】庙社中西南柏树东南枝（晒干）

【用法】上为末。每服二钱，新汲水送下，一日三次。

【主治】瘟疫。

65030 神草汤

【方源】《杨氏家藏方》卷八。

【组成】人参（去头芦） 白术 白茯苓（去皮）各一两 当归（去芦头，切，酒浸一宿，焙干）一两半 黄耆二两 五味子二两 细辛（去叶土）一两 干姜一两（炮） 陈橘皮（去白） 肉桂（去粗皮）一两半 白芍药一两 桑白皮八钱（微炒） 甘草八钱（炙）

【用法】上㕮咀。每服五钱，水一盏半，入生姜三片，乌梅一枚，同煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】肺与大肠俱受风冷，咳嗽喘急，不进饮食，大便泄利，时作寒热。

65031 神草膏

【方源】《疡医大全》卷八。

【组成】蜈蚣节草一大把 盐少许

【用法】捣烂如膏。敷患处。

【主治】发背、对口、一切无名肿毒。

65032 神茧散

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【组成】蚕茧

【用法】上药纳入男子指甲，以满为度，外面用童子发缠裹，烧存性。蜜调，敷之。

【主治】诸痔。

【备考】《古今医鉴》用本方配合内服药：于腊月八日取黑牛胆，入槐角子，以满为度，百日开用，空心酒吞十余粒。

65033　**神砂丸**

【方源】《鸡峰》卷二十四。

【异名】神妙丸（《卫生总微》卷十三）。

【组成】辰砂　腻粉各一两　定粉半两　粉霜一钱半　白丁香半字　麝香少许

【用法】上为末，粟米饭为丸，如绿豆大，捏作饼子，慢火内微炮令紫色。每服一丸，食后粟米饮化下。微利为度。

【功用】《卫生总微》：取虚中积滞，化痰涎乳癖。

【主治】小儿伏惊，积滞在内，痰涎内壅，及奶癖。

【备考】方中麝香用量原缺，据《卫生总微》补。

65034　**神砂散**

【方源】《外科真诠》卷上。

【组成】神砂五分　胡连二钱　儿茶一钱　明雄一钱　轻粉五分　上片二分

【用法】上为细末。

【主治】鼻疳。

【加减】如臭，加百草霜五分。

65035　**神砂膏**

【方源】《医方类聚》卷八十三引《吴氏集验方》。

【组成】针砂不以多少　诃子不以多少

【用法】上先用针砂淘净，直候换水清，去水，以好米醋浸二宿，去醋，慢火焙干，研为末，用时以针砂、荞麦细面各等分，次以米醋、米泔相半，调稀稠得所，小银盂重汤内煮成膏子，临卧以篦子抹药上髭，次以汤泡荷叶裹包，至晓用温汤缓缓洗，髭已变褐色矣。次用诃子分为二份，将多一半以面裹煨熟，去核，为细末，少一半麻油炸黑色，入炭火罨一两宿，去灰，揩擦净，不去核，各研为细末，用时随意量二色诃子对用，又用荞麦面亦对用，次以米醋、米泔相半，调稀稠得所，小银盂重汤内煮成膏，卧时用篦子抹药上髭，如前法，以汤泡荷叶裹之，候晓，以温水缓缓洗之，髭黑如漆。以粗笔上药尤妙，荷叶熟为上，乘热实包之。

【功用】乌髭。

65036　**神品散**

【方源】《喉科紫珍集》卷下。

【组成】白矾五钱　牙皂五钱　黄连（新瓦上炙干）五钱

【用法】上为细末。吹于喉内，有痰任流。

【主治】喉风、喉蛾及一切喉闭。

65037　**神品膏**

【方源】《回春》卷八。

【组成】香油一斤　官粉二两半　黄蜡二两　乳香　没药　孩儿茶　血竭各四钱　胡椒六钱

【用法】先将香油熬滴水不散，方下官粉熬成膏，下黄蜡再熬至滴水成珠，离火，方入细药；疮久者，胡椒加半搅匀，入瓷器内收贮，退火毒，油单纸摊贴。每用先将葱须、花椒、艾、槐条熬水洗疮，净后贴之。

【主治】臁疡疮，历年久不愈者。

65038　**神香散**

【方源】《景岳全书》卷五十一。

【异名】神妙散（《医方易简》卷七）。

【组成】丁香　白豆蔻（或砂仁亦可）各等分

【用法】上为末。每服五七分，甚者一钱，清汤调下；若寒气作痛者，生姜汤送下，日数服，不拘时候。

【功用】《证治宝鉴》：温中散寒。

【主治】①《景岳全书》：胸胁胃脘逆气难解，疼痛，呕哕，胀满，痰饮膈噎，诸药不效者。②《霍乱论》：霍乱因于寒湿，凝滞气逆者。

65039　**神香散**

【方源】《仙拈集》卷一。

【组成】丁香　木香各等分

【用法】上为末。每服五分，白滚水送下。

【主治】胸膈气逆，疼痛胀满，呕哕，痰饮，

诸药不效。

65040 神香散

《医钞类编》卷五。为《景岳全书》卷五十一“荔香散”之异名。见该条。

65041 神保丸

【方源】《苏沈良方》卷四引《灵苑方》。

【异名】遇仙丹（《医学集成》卷三）。

【组成】木香一分 胡椒一分 巴豆十枚（去皮心，研） 干蝎一枚

【用法】上汤释蒸饼为丸，如麻子大，朱砂为衣。每服三丸，心膈痛，柿蒂汤送下或灯心同柿蒂汤送下；腹痛，柿蒂、煨姜汤送下；血痛，炒姜、醋、小便送下；小便不通，灯心汤送下；血痢、脏毒，楮叶汤送下；肺气甚者，白矾、蚌粉各三分，黄丹一分，同研为散，煎桑白皮、糯米饮调下；若小喘，只用桑皮、糯米饮送下；肾气胁下痛，茴香酒送下；大便不通，蜜汤调槟榔末一钱同下；气噎，木香汤送下；宿食不消，茶、酒、浆饮任下。

【功用】①《医便》：消一切生冷积滞。②《医学人门》：宣通脏腑。

【主治】①《苏沈良方》引《灵苑方》：心膈痛，腹痛，血痛，小便不通，血痢，脏毒，喘，肾气胁下痛，大便不通，气噎，宿食不消。②《朱氏集验方》：妇人小腹痛，服诸药不愈者。

【临证举例】①项筋痛 《苏沈良方》引《灵苑方》：熙宁中，予病项筋痛，诸医皆以为风，治之数月不愈，乃流入背膂，久之右注胁，挛痛甚苦。乃合服之，一投而愈，后再发，又一投而愈。②腹痛 《临证指南医案》：郑氏，得食腹痛，上及心胸，下攻少腹，甚至筋胀，扰于周身经络之间，大便欲解不通畅。此乃肠胃气阻，故痛随利减。神保丸一钱。

65042 神保丹

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】川芎 天南星（汤泡七次） 甘松香白芷 藿香叶（洗去土） 香附子（去毛，炒） 牛膝（去芦，酒浸） 桔梗（炒） 防风（去芦） 茴香（淘去沙，炒） 羌活 藁本 麻黄（去节） 当归（去芦，酒浸）各一两 草乌头 大川乌各一两半（并生，去皮尖） 甘草四两（生） 荆芥穗二两 石膏半斤（生）

【用法】上为细末，糯米糊为丸，每以三钱半重作一丸。每丸分作四服，头风，薄荷酒嚼下；喉闭，生姜、薄荷酒送下；妇人血风久瘫，豆淋酒（用黑豆炒熟，以酒投之，去豆，只用酒）送下；伤骨，乳香酒送下；脚上生疮，木瓜酒送下；耳内虚鸣，煨猪肾酒送下；眼肿，菊花酒化下。小儿每丸分作八服。瘫风，先服顺气散，后服此药，瘫风三五日者，服之甚效尤捷。

【主治】左瘫右痪，或一手顽痹，一足不仁，或半身不遂，口㖞，喉肿，及脚上生疮，耳内虚鸣，眼肿。

65043 神须散

《普济方》卷二七七。即《圣济总录》卷一三四“神瑱散”。见该条。

65044 神鬼丹

【方源】《医部全录》卷四三〇引《幼科全书》。

【组成】雄黄 桑寄生 天竺黄 钓藤钩各三钱 全蝎（去足） 牛胆 南星 梧桐泪 僵蚕（炒） 朱砂各二钱 珍珠 牛黄 琥珀各一钱 冰片少许

【用法】上为末，用粟米粉糊为饼，金箔为衣，薄荷、灯心、竹叶汤送下。

【主治】小儿惊痫。

65045 神祐丸

【方源】《儒门事亲》卷十二。

【组成】甘遂（以面包，不令透水，煮百余沸，取出，用冷水浸过，去面，焙干） 大戟（醋浸煮，焙干用） 芫花（醋浸煮）各半两 黑牵牛一两 大黄一两

【用法】上为细末，滴水为丸，如小豆大。每服五七十丸，临卧温水送下。

【主治】①《儒门事亲》：瘴疠疟疾，昏瞀懊侬；胃脘当心而痛；足闪肭痛，肿起热痛如火者。②《医彀》：肿胀。

【临证举例】胃脘痛 《续名医类案》：一教

谕年五十一，因酒食过饱，胃脘作痛，每食后其气自两肩下及胸次，至胃口，痛不可忍，令人将手重按痛处，移时忽响动一声，痛遂止。如是八年，肌瘦如柴，诊之六脉微数，气口稍大有力。以神祐丸一服下之，其痛如失。后以参苓白术散调理复元。

65046　神祐丸

《张氏医通》卷十六。为《宣明论》卷八"三花神祐丸"之异名。见该条。

65047　神祐丸

《女科切要》卷二。为《袖珍》卷三引《圣惠》"舟车丸"之异名。见该条。

65048　神屋散

【方源】《普济方》卷二〇〇引《海上名方》。

【组成】龟壳(烧灰)

【用法】上为细末。每服方寸匕，酒调下。

【主治】久疟。

65049　神珠丸

《赤水玄珠》卷二。为《医学发明》卷七"离珠丹"之异名。见该条。

65050　神珠丹

《医学发明》卷七。为原书同卷"离珠丹"之异名。见该条。

65051　神铃散

【方源】《普济方》卷三〇二。

【组成】大雄鼠一枚(去皮骨，取精肉薄劈，焙干)

【用法】上为细末。每服二钱，热酒调下，不拘时候。若觉箭疮痒，不得抓，忍痒少时，箭头自出。

【主治】箭头在骨内，取不出。

65052　神秘丸

【方源】《外台》卷十三引《古今录验》。

【组成】大黄四两　消石三两(熬)　巴豆(去心皮，熬)　雄黄(研)各二两

【用法】上为末，蜜为丸，如小豆大。每服二丸，食前服，一日一次。

【主治】鬼疰邪忤，飞尸疰击，犬马啮，蜂蛇毒螫。

【宜忌】忌野猪肉、芦笋。

65053　神秘丸

【方源】《医统》卷八十。

【组成】斑蝥(去头足，秫米炒)一分　薄荷三分

【用法】上为末，鸡子清为丸，如梧桐子大。每次空心服二丸，午时服三丸，临卧服四丸，次日空心服五丸，茶清送下。脐下痛，小便取下恶物为效。如小便涩，吃葱、茶少许。

【主治】瘰疬，多年不愈。

65054　神秘丹

【方源】《玉案》卷三。

【组成】真川椒　雄黄　蟾酥　麝香　荜茇各等分

【用法】上为极细末，以枣肉拌药为丸，如黍米大。每次一丸，塞于患处。

【主治】牙疼。

65055　神秘方

【方源】《千金》卷十七。

【组成】橘皮　生姜　紫苏　人参　五味子(一作桔梗)各五两

【用法】上㕮咀。以水七升，煮取三升，分三服。

【主治】气上不得卧。

65056　神秘方

【方源】《奇效良方》卷三十二。

【组成】猪爪甲二枚(烧灰，研细)　麝香当门子一枚

【用法】上为细末。用腊茶清调下。

【主治】喘。

65057　神秘方

【方源】《准绳・疡医》卷二。

【组成】地黄汁一升　松脂二两　熏陆香一两　羊肾脂　牛酥各如鸡子大

【用法】先以地黄汁煎松脂及香令消，即纳羊脂、酥，更用蜡半鸡子大，一同相和，以慢火煎令水尽，膏成去滓，涂帛。贴疮，每日换一二次。

【功用】生肉去脓。

【主治】一切疮已溃者。

65058 **神秘方**

【方源】《玉案》卷三。

【组成】千年矮（即平地木）不拘多少

【用法】上捣碎，酒煎，尽醉，服之即愈。

【主治】诸骨鲠。

65059 **神秘汤**

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】人参 紫苏子 五味子 陈皮 半夏各等分

【用法】上为粗末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，同煎至六分，去滓温服。

【主治】上气不得卧。

65060 **神秘汤**

【方源】《鸡峰》卷十七。

【组成】黄橘皮 桑白皮 人参 紫苏 生姜各半两

【用法】上㕮咀。水三升，煮至一升，去滓，分三次温服。

【主治】喘。

65061 **神秘汤**

【方源】《三因》卷十三。

【异名】神授汤（《妇人良方》卷六）。

【组成】橘皮 桔梗 紫苏 人参 五味子各等分

【用法】上锉散。每服四钱，水一盏，煎六分，去滓，食后服。

【功用】《杏苑》：润肺，疏利壅塞，补肺益气。

【主治】①《三因》：上气，不得卧。②《杏苑》：肺气虚败，壅塞喘息。

65062 **神秘汤**

【方源】《医学发明》卷四。

【组成】橘皮（洗） 生姜 紫苏叶 人参 桑白皮（锉，炒）各半两 木香 白茯苓（去皮）各三钱

【用法】上㕮咀。以水三升，煎至一升，去滓，分三次温服。

【主治】病人不得卧，卧则喘者，水气逆上乘于肺，肺得水而浮，而使气不通流，其脉沉大。

65063 **神秘汤**

【方源】《直指》卷八。

【组成】陈皮 桔梗 紫苏 人参 五味子 槟榔 桑白皮（炒） 半夏（制） 甘草（炙）各等分

【用法】上锉细。每服三钱，加生姜五片，水煎服。

【主治】水气作喘。

65064 **神秘汤**

《普济方》卷一六二。即《三因》卷十三“神秘散”。见该条。

65065 **神秘汤**

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】橘皮（去白） 紫苏 人参 桔梗 桑皮 生姜 五味子各等分

【用法】每服一两，水二钟，煎服。

【主治】瘰疬。

65066 **神秘散**

【方源】《三因》卷十三。

【异名】神秘汤（《普济方》卷一六二）。

【组成】阿胶一两三分（炒） 鸡膍胵一两半 白仙茅半两（米泔浸三宿，晒干，炒） 团参一分

【用法】上为末。每服二钱，空腹时糯米饮调下。

【功用】定喘，补心肾，下气。

【主治】喘。

65067 **神秘散**

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【异名】大圣散（《医方类聚》卷一八〇引《吴氏集验方》）、黑牵牛散（《普济方》卷三九一）、立验大圣散（《医学正传》卷六引《疮疡集》）。

【组成】斑蝥二十八枚（麸炒，去头翅足） 荆芥穗二钱（微炒） 黑牵牛二钱（微炒） 白僵蚕二钱（炒去丝嘴）

【用法】上为细末。每服一钱，五更时热酒

调下。至巳时当取下恶物,永愈。如当日不下,至次日更服一服。或又不下,至第三日五更时,先吃糯米粥一盏,次服药,其毒物决下。如服药后觉小便涩,急煎灯心汤调琥珀末二钱服之,即恶核自小便出。琥珀末须预先研下,准备服。

【主治】瘰疬。

【宜忌】《外科经验方》:若脉牢涩或洪大无力者不可服。

65068　神秘膏

【方源】《普济方》卷三一四。

【组成】生地黄汁五合　防风三分(切,去芦头)　羊肾脂二两　麻油五两　乳香一两　黄蜡二两　乱发半两　当归半两　甘草三分　白蔹半两

【用法】上锉细,以醋拌湿,先以油煎乱发消尽,下地黄汁,煎如鱼目沸,候地黄汁尽,绵滤去滓,却于火上下蜡、香、脂,热搅匀,煎令稠,瓷盒盛。以故帛涂贴,看疮大小,每日换二次。

【主治】一切痈疽、发背已溃后,日夜疼痛不可忍,脓不能出者。

65069　神健散

【方源】《鸡峰》卷五。

【组成】人参　白术　牡丹　桑白皮　当归　柴胡　枳壳　桔梗　甘草　杏仁　旋覆花　泽泻　茯苓　半夏　川芎各等分

【用法】上为细末。每服三钱,水一盏,煎至七分,去滓,食后、空心时温热服。

【功用】解利伤寒。

【主治】伤寒。

65070　神健散

【方源】《普济方》卷三四〇。

【组成】菖蒲　赤石脂各一两　干姜半两

【用法】上为散。每服二钱匕,空心米饮调下,一日三次。

【主治】妊娠下痢,及水泻不止,米谷不消化者。

65071　神效丸

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】芎䓖　羌活(去芦头)各二两　猪牙皂荚五挺(半生半炙)　何首乌(炒,去黑皮)四两　杏仁(汤浸,去尖双仁和皮,研)五十枚

【用法】上除杏仁外,为末,腻粉半两,与杏仁同研极细,用白羯羊肉四两,薄切作大片,先铺绵,次铺肉,将上件药裹了,用线紧系定,入银器内煮,不可犯铁器,约用水一大碗,于药四面各余二指许水,方可用碗合定,煮候泣尽水,去绵不用,和肉杵三五千下,丸如梧桐子大。每服五丸,黑参汤下,一日三次;初服五丸,后逐日每服加五丸,加至五十丸,却逐日每服减五丸,减至五丸止。初服药至第五七日,头痛,牙缝中出涎,是效。

【主治】癞疾。

【宜忌】服药后,只得吃淡粥,候服补药,以次吃淡饭。须忌房室半年。

65072　神效丸

【方源】《普济方》卷三十九引《卫生家宝》。

【组成】黄栀子(隔年者)　大黄(炮)　甘草各等分

【用法】上为极细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,略秘者,食前用白汤送下;秘甚者,煎橘皮汤送下。

【主治】大便秘。

65073　神效丸

【方源】《本草纲目》卷八引《选奇方》。

【组成】密陀僧二两

【用法】上为末,汤浸蒸饼为丸,如梧桐子大。一日五丸,浓煎蚕茧、盐汤或茄根汤或酒送下,日增五丸,至三十丸止,不可多服。五六服后,以见水恶心为度,恶心时以干物压之,日后自定。

【主治】消渴饮水。

65074　神效丸

【方源】《朱氏集验方》卷一。

【组成】川乌一枚(略去皮)　草乌半两(略去皮)　地龙半两(去土)　全蝎四十二个(去

毒） 黑豆四十二粒（去皮） 蜈蚣一条（去头足）

【用法】上焙干为末，入糯米糊为丸，麝香为衣。每服七丸至十丸，用冷酒送下。少顷用荆芥穗些少，先嚼烂，用茶清灌嗽之。

【主治】干湿脚气，骨里疼痛，或肿，或不肿。

65075 神效丸

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】原蚕蛾（取未连者，不以多少，去头足毛羽）一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七丸至十丸，临卧温菖蒲酒送下。

【主治】男子肾气衰弱，阴痿，阳事不举。

65076 神效丸

【方源】《医方类聚》卷一二九引《施圆端效方》

【组成】羌活 白术各半两 陈皮（去白）三分 木香一两 木通 黄耆 桑白皮（切，炒）各三分 黑牵牛（半生半炒，去头末）十两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，风壅痰滞，清头目，生姜汤化下；食积，泄泻痢，枣汤化下；小便涩，灯心汤化下。得利为度，后服米粥三日。

【主治】通身肿满，痰气食积，泄泻痢疾，小便涩。

65077 神效丸

【方源】《普济方》卷一八八引《澹寮方》。

【组成】莲子心七个 江米各半两

【用法】上为细末，细墨研浓汁为丸，如梧桐子大。每服二十丸，新水送下。

【主治】吐血不止，兼劳心吐血。

【备考】本方改为散剂，酒调服，名“莲心散”。

65078 神效丸

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【异名】小槟榔丸（《得效》卷十二）。

【组成】芫花半两（醋浸，炒） 木香 槟榔 三棱（炒）各半两 茯苓 青皮 全蝎 附子（炮） 硇砂（研末） 桂各二钱半

【用法】上将硇砂用水浸瓷盏内，去滓留汤，以瓶炖成膏子，米醋打糊为丸，如绿豆大。每服三十丸，空心温酒送下。

【功用】疏利。

【主治】疝气奔豚，小儿溺秘。

65079 神效丸

【方源】《普济方》卷二九一引《德生堂方》。

【组成】牡蛎（烧灰，为末） 香白芷各四两 甘草节二两

【用法】上为细末，糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，食后酒送下，茶清亦可。为末，酒调服下亦可。

【主治】瘰疬。

65080 神效丸

《普济方》卷一七六。即《杨氏家藏方》卷十“神授丸”。见该条。

65081 神效丸

《普济方》卷二〇〇。为《圣惠》卷五十二“神效方”之异名。见该条。

65082 神效丸

《袖珍》卷一。为《圣济总录》卷七十七“当归丸”之异名。见该条。

65083 神效丸

【方源】《奇效良方》卷十二。

【组成】砒霜（细研） 朱砂（细研） 乳香（细研）各半两 麝香（细研） 阿魏（细研） 安息香 绿豆末 猢狲头骨 虎粪中骨各一分

【用法】上为末，研匀，以蒸饼为丸，如梧桐子大。未发前男左女右手把一丸，便卧一炊时久，便愈。

【主治】鬼疟。

65084 神效丸

《医统》卷六十。为《奇效良方》卷四十七“神效方”之异名。见该条。

65085 神效丸

【方源】《育婴秘诀》卷四。

【组成】大戟 芫花 甘遂（醋炒） 泽泻

葶苈子(炒)　连翘　桑白皮　木香　赤小豆(炒)　黑牵牛(炒,取头末)各等分

【用法】上为末,大枣(蒸,去核)捣如泥为丸,如麻子大。量儿大小,槟榔汤送下。以利为度。得利后,用参苓白术散去甘草补之。

【功用】急下。

【主治】小儿腹胀,五实者。腹紧胀,气上喘,身壮热,脉洪数,大小便秘。

【宜忌】此乃救急之方,不可常用。

65086　**神效丸**

《片玉心书》卷五。为《兰室秘藏》卷中"神功丸"之异名。见该条。

65087　**神效丸**

【方源】《玉案》卷三。

【组成】使君子肉四两(炒)　胆南星二两　槟榔二两

【用法】上为末,炼蜜为丸。每服五六十丸,空心砂糖汤送下。

【主治】好食诸物,停积成黄疸者。

【加减】如好吃生米,加麦芽一斤;好吃茶叶,加茶叶一斤;好吃黄泥,加壁土一斤;好吃黑炭,加黑炭一斤,随其所好加入。

65088　**神效丸**

【方源】《玉案》卷三。

【组成】皂矾八两(加面一斤,和作饼,入火内煨焦为度)　苍术(米泔浸)　厚朴(姜汁炒)　陈皮　甘草各六两　川椒十两(去目及闭口者)

【用法】上为末,用红枣三斤(煮熟,去皮核),胡桃三斤(去壳),同捣成膏,和药为丸,如梧桐子大。每服七八十丸,酒送下。初服时觉此药甘美,服至病将愈,便觉药臭矣。

【主治】男妇大小黄病。

65089　**神效丸**

【方源】《一盘珠》卷八。

【组成】藿香一两　砂仁(微炒)一两　白茯苓一两　赤茯苓一两　煨甘草一两　生甘草一两

【用法】上为丸,每丸重一钱。

【主治】胃虚泄泻,并治呕吐。

【加减】火呕泄者,加竹茹、石膏。

65090　**神效丸**

【方源】《医方易简》卷九。

【组成】当归(酒洗)　川连(酒洗)　象牙末各五钱　净槐花　小川芎(酒洗)　滴乳香各二钱(箬叶去油)　露蜂房一个(槐树上者佳,椒树上者次之,微火炒)

【用法】上为细末,黄蜡二两熔化,入前药末为丸,如梧桐子大。每服五六十丸,空心煎漏芦汤送下。至五日,漏孔内退出肉管,待二三指长,用剪剪去,再退出再剪之,肉管尽出,自然从内生肌长肉。

【主治】久近痔漏。

65091　**神效丹**

【方源】《普济方》卷三七六。

【组成】猪牙皂角(不蛀者)四两(粗锉,用羯羊肝一个,切作片子,用水三大碗,煮数十沸,去肝,用皂角)　半夏(拣大而陈者)四两(用姜汁浸三宿,漉去晒干,每个切作四片,生朱末一两,同于铁铫内同炒,以半夏黄为度,拣出半夏,用朱末别研入药)　天南星二两(生用)　白矾(明者)二两(略枯存性)　黑牵牛二两(炒紫色)

【用法】上为细末,用生姜汁打糊为丸,如黍米大。每服三十丸至四十丸,生姜汤送下。服绝根。大人亦可用。

【主治】小儿诸痫。

65092　**神效丹**

【方源】《准绳·幼科》卷八引《集验方》。

【组成】绿矾(用火煅通赤,取出用酸醋淬过,复煅,如此三次)

【用法】上为细末,用枣肉为丸,如绿豆大,温水送下,一日二三次。

【主治】小儿疳气。

65093　**神效丹**

【方源】《回春》卷八。

【异名】黑舌丹。

【组成】朱砂　雄黄　片脑各五分　乳香

没药 轻粉各三分 血竭三钱 真蟾酥一钱 麝香（当门子者）二分

【用法】上为末，用酥油或乳汁为丸，如扁豆大。每服一丸，噙化，用好酒漱咽下。

【主治】伤寒初起，诸般恶毒，疔疮发背，一切肿毒，遍身痒痛；及伤寒咳嗽，鼻涕，劳嗽久咳，小儿痘疮黑陷不起，喉痹肿痛；及蛊毒，破伤风。

65094 **神效方**

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】人胆 朱砂 雄黄 麝香各等分

【用法】上为细末，以醋煮面糊为丸，如绿豆大。每用绵裹一丸，纳鼻中，即愈。每丸可治二人。

【主治】鬼疟，进退不定。

【备考】本方方名，《普济方》引作"神效丸。"方中人胆，《普济方》作"牛胆"。

65095 **神效方**

【方源】《圣惠》卷五十三。

【组成】浮萍草三两（干者） 土瓜根一两半

【用法】上为细散。每服二钱，以牛乳汁调下，不计时候。

【主治】消中，渴不止，心神烦热，皮肤干燥。

【备考】本方方名，《普济方》引作"神效散"。

65096 **神效方**

《普济方》卷七十七引《十便良方》。为《圣济总录》卷一〇五"鱼胆敷眼膏"之异名。见该条。

65097 **神效方**

【方源】《百一》卷十六引赵百中方。

【异名】松脂散（《得效》卷十九）、神效散（《仁术便览》卷四）。

【组成】水银 甘草 黄柏 黄连 松脂 腻粉 土蜂窠（著壁上者，南方多有之）

【用法】上取水银放掌中，以唾擦为泥，人瓷器中，以生麻油和研，生绢滤如稀饧，和药末再研如稠饧。先以温水洗疮，帛拭干，涂之。一切无名疮，涂一次即愈；有黄水者，涂之随手即干；痒不堪忍者，涂之立止痛；甚者涂之立定。治疥，抓破敷药。

【主治】一切恶疮，医所不识者；亦治疥疮。

【备考】《仁术便览》本方用法：诸药同研，油调敷。

65098 **神效方**

【方源】《永乐大典》卷九八〇引《野夫多效方》。

【组成】大天南星一个

【用法】上用好酒一大盏，碗内浸四十九日取出，后用活蝎四十九个，用竹荚子夹定，教蝎独蜇天南星，令蝎无力动，便换一个蝎又蜇，用四十九个蝎都蜇遍天南星。不用蝎，将南星别干，碗内放定，上用纸数重，封定碗口，用绵紧定纸，放碗在屋梁上阴多时，约自然干取下，不得见日气，研为细末。每服一字或半钱，煎荆芥汤调下，每日三次，不拘时候。

【主治】小儿慢惊风，手足搐搦，诸药不效。

65099 **神效方**

《普济方》卷三四六。为《千金》卷二"甘草散"之异名。见该条。

65100 **神效方**

【方源】《奇效良方》卷十二。

【组成】朱砂（细研） 白芥子 阿魏各一钱 香墨五钱 砒霜一两（酸浆水一碗，于端午日，日未出时，慢火熬如稀糊，便入后药）

【用法】上为末，以砒霜煎和丸，如黍米大。每服一丸至二丸，于未发前冷醋汤送下。

【主治】寒疟。

【宜忌】忌食热物。

65101 **神效方**

【方源】《奇效良方》卷三十五。

【组成】海螵蛸 生干地黄 赤茯苓各等分

【用法】上为细末。每服一钱，用柏叶、车前草煎汤调下。

【主治】血淋。

65102　神效方

【方源】《奇效良方》卷四十七。

【组成】黑牵牛一两(净炒黄色,香熟为度)　舶上硫黄五钱(研末,拌牵牛,须要入内,不见硫黄,将牵牛纸衬于地上一宿)

【用法】上为末,用宿蒸饼糊为丸。每服三十丸,空心盐汤送下。

【主治】肾囊肿大。

【备考】本方方名,《医统》引作"神效丸"。方中舶上硫黄用量原缺,据《医统》补。

65103　神效方

【方源】《奇效良方》卷五十一。

【组成】白矾五两　绿矾三两　黄丹　伏龙肝　猬皮各二两

【用法】上捣碎,入瓷罐子内,用炭火五七斤,烧炭尽为度,候冷取出,研如粉,以面糊为丸,如梧桐子大。每服十丸,食前用米饮送下。

【主治】痔疾下血,日夜不止。

65104　神效方

【方源】《本草纲目》卷四十八引《医林集要》。

【组成】蝙蝠一个　猫头一个

【用法】上俱撒上黑豆,烧至骨化,为末。掺之,干即油调敷。内服连翘汤。

【主治】瘰疬多年不愈。

65105　神效方

【方源】《摄生众妙方》卷七。

【异名】救苦丹。

【组成】红枣三个(去核)　巴豆三粒(去壳)

【用法】上将红枣去核,巴豆填入枣内,文武火煨熟,去枣皮,再入人参三钱(为末),同擂一处,凉一夜,丸如米大。每服五七丸,烧酒送下,立止。

【主治】心气疼及胃脘诸痛。

65106　神效方

【方源】《便览》卷四。

【组成】当归(去尾)一钱半　生地五分　白术一钱二分　陈皮五分　熟地(姜汁炒)五分　柴胡三分　神曲(炒)八分　升麻三分　黄耆(蜜炙)一钱　苍术五分　甘草(炙)五分　白芍(炒)一钱

【用法】水一钟半煎,空心服。

【主治】妇人血崩。

65107　神效方

《疡科选粹》卷六。为《杏苑》卷八"神效散"之异名。见该条。

65108　神效方

【方源】《何氏济生论》卷三。

【组成】蛴螬虫一条(粪堆内及烂草房上皆有。一名土蚕)

【用法】上将虫捏其脊,待虫口吐水,就抹在疮口上。觉麻即汗出。

【主治】破伤风。

65109　神效方

【方源】《惠直堂方》卷二。

【组成】大蒜数个(捣烂)　大黄　皮消各一两

【用法】上捣成膏。贴患处。即消。

【主治】痞积。

65110　神效方

【方源】《同寿录》卷末。

【组成】全蝎(炒)　核桃肉(炒)各等分

【用法】上为末。每服二钱,空心、午后、临卧酒调下,一日三次。

【主治】便痈。

65111　神效方

【方源】《外科集腋》卷八。

【组成】真龙骨一两(火酒煮)　生牡蛎　韭子(炒)　生菟丝各一合

【用法】上为极细末。每服二钱,空心火酒送下。

【主治】无梦滑精,及久遗虚寒。

65112　神效水

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【异名】夏冰。

【组成】消石一钱　胆矾五分　明矾一两五钱　食盐五分

【用法】上药以文火煮，纳壶埋藏于土中，约七日，凝结如青冰。每用少许，融解为水，洗净眼目。

【主治】诸般外障属热者，及顽固星翳，角膜脓溃之类。

65113 神效汤

【方源】《百一》卷五。

【异名】神效散（《朱氏集验方》卷五）。

【组成】不蛀皂角一挺（大者，去皮棱）

【用法】上为两片，去子，每一孔内入巴豆肉一粒，线系定，童子小便浸一宿，火上炙令焦黄色，去巴豆不用，或入一二粒亦不妨，却用真杏仁一合，半夏一合，二味入麻油内煎令拆裂为度，用皂角为细末。每服一字，用干柿半片，蘸药吃，或用白糖亦可，临睡时服。服了不得吃汤水。

【主治】①《百一》：一切嗽。②《朱氏集验方》：一切喘嗽。

65114 神效汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】木香（另磨） 吴茱萸各七分 茴香（酒炒） 玄胡索 益智仁 苍术（米泔浸） 香附 当归 川乌（炮，去皮，减半） 山栀（炒）各一钱 砂仁七分 甘草三分

【用法】上锉，一剂。加生姜三片，灯心一团，水磨广木香调服。

【主治】一切疝气。

【加减】胀闷如痛，加乳香、枳实；有瘀血胀痛，加桃仁、川芎，去益智、山栀；肾气注上，心痛闷欲绝者，加沉香、枳实，去益智、山栀。

65115 神效汤

【方源】《青囊秘诀》卷上。

【组成】当归一两 黄耆一两 人参一两 金银花二两 白芍一两 肉桂一钱 荆芥三钱

【用法】水煎服。一剂而血止，二剂而肉生，三剂而口小，四剂而皮合，再服二剂而痊愈。

【主治】对口疮，阴症溃烂者。并治各处痈毒，凡低陷不作脓而不能收口者。

65116 神效汤

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】人参一钱 防风 白术 黄耆 甘草 熟地 当归 白芍 羌活 附子 牛膝 杜仲各一钱

【用法】加生姜三片，水煎服。

【主治】鹤膝风、附骨疽、腿肿痛。

65117 神效汤

【方源】《家庭治病新书》引《经验良方》。

【组成】海螵蛸 生地 茯苓 侧柏炭各三钱 车前子一两

【用法】水煎服。

【主治】血淋或尿血。

65118 神效散

【方源】《普济方》卷四〇〇引《肘后方》。

【组成】桃上寄生二两

【用法】上为散。每服半钱，以茶点服，每日三次。

【主治】小儿中蛊毒，腹内坚痛，面目青黄，羸瘦骨立，病变无常，及淋露。

65119 神效散

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】槐鹅一两（锉，微炒） 皂荚子仁半两（微炒） 丁香半两

【用法】上为细散。每服一钱，食前以粥饮调下。

【主治】气痔。

65120 神效散

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【异名】鹿角胶丸（《普济方》卷一八八）。

【组成】鹿角胶（炙令燥） 黄柏（去粗皮）各半两 杏仁四十九枚（汤浸，去皮尖，麸炒黄）

【用法】上为散。每服一钱匕，用白面一钱，温水同调下，食后再服。

【主治】①《圣济总录》：吐血、咯血。②《普济方》：吐血后虚热，胸中痞，口燥。

65121 神效散

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【组成】石决明 黄连（去须） 密蒙花各

一两

【用法】上为散。每服二钱匕，食后、临卧熟水调下。

【主治】眼时见黑花，经年不愈，羞明。

65122　**神效散**

【方源】《圣济总录》卷一二一。

【组成】草乌头　青盐　皂荚各一分

【用法】上药于瓦器内烧灰存性。每用一字，揩牙。

【主治】牙缝出血。

65123　**神效散**

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】猪羊靥各三十枚(旋入盐、胆内蘸过，令干，只用盐亦得)　陈橘皮(去白，焙)一两

【用法】上为散。每服二钱匕，空心米饮调下。初结不过数服，觉消不用久服。

【主治】项气瘤结附赘，日渐增长。

65124　**神效散**

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】槐实　皂荚子各一两(以谷糠同炒令香熟，去糠)

【用法】上为散。每服一钱匕，空心、食前煎陈粟米饮调下。

【主治】肠风。

65125　**神效散**

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【组成】抱鸡子壳内白皮不拘多少

【用法】上以木炭火烧为灰，出火毒，为细末。每服一钱匕，以新汲水调下。

【主治】小儿疮疱，欲出不出，虽出不快，及倒靥者。

65126　**神效散**

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】白茯苓(去黑皮)一两　猪苓(去黑皮)二钱

【用法】上药水煎合宜，去猪苓，将茯苓焙干，为散。每服一钱匕，温酒调下，空心、夜卧各一服。

【主治】梦泄。

65127　**神效散**

【方源】《幼幼新书》卷三十引《孔氏家传》。

【组成】芍药　地榆　甘草(炙)　陈皮　黄连　干葛各等分

【用法】上为末。每服一钱，米饮调下，一日三次。

【主治】小儿大肠有血如痢者。

65128　**神效散**

【方源】《本事》卷六。

【组成】白浮石　蛤粉　蝉壳(去头足)各等分

【用法】上为细末。每服三钱，用鲫鱼胆七个调服，不拘时候。

【主治】渴疾，饮水不止。

【方论选录】①《古方选注》：浮石、蛤粉、鲫鱼胆三者，以咸胜苦，以苦胜辛，辛，肺之气味也；佐以蝉蜕轻浮上升，引领三者直达肺经，解热止渴；且浮石、蛤粉之咸，皆平善无过，非但止渴，兼能利水，可无聚水之变幻。世医但以滋阴寒剂救燎原之火，孰知火热既消，反不能消水，转成中满肿胀。②《本事方释义》：白浮石气味咸平，入手太阴；蛤粉气味咸平，入足少阴；蝉壳气味咸甘寒，入足少阴、厥阴；鲫鱼胆为引子，取其咸苦，能引药入里也。病因消渴，饮水不止，以咸平微寒之药制之，则阳气潜伏，阴气自然稍苏矣。

65129　**神效散**

【方源】《三因》卷十二。

【组成】杏仁(去皮尖，炒)一两半　甘草(炙)　旋覆花各三两　白术　莲肉(去心皮)　射干(米泔浸)　前胡　御米(略炒)　百合(水浸，去沫)　白扁豆(略炒)　川芎各三两　人参　白茯苓各四两　神曲(炒)五两　桑白皮(炙)　干葛各六两　桔梗七两

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，加生姜三片，大枣一个，煎七分，食前温服。

【主治】老少喘嗽。

65130　**神效散**

【方源】《三因》卷十六。

【组成】荆芥穗(别为末) 蓖麻(生,去皮,别研)各等分 （一方用朴消,不用荆芥）

【用法】上入生蜜少许为丸,如皂子大。以绵裹含化,急则嚼化。

【主治】喉闭热肿,语声不出。

【备考】本方方名,据剂型,当作“神效丸”。

65131 神效散

【方源】《杨氏家藏方》卷十四。

【组成】江茶 生面各等分

【用法】上为末。用生麻油调涂患处,每日换一次。

【主治】头面汤泼火伤,肌肉虽已平复,遂成瘢痕,鬓发不生。

65132 神效散

【方源】《普济方》卷一五一引《卫生家宝》。

【组成】苍术 麻黄(去筋) 甘草各等分

【用法】上为粗末。每服五钱,水一大碗,煎至半碗,去滓,温服两服;滓再煎,作一服,不拘时候。安即住。

【主治】四时伤寒时气。

65133 神效散

【方源】方出《百一》卷十八引钱季毅方,名见《医方类聚》卷二二四引《胎产救急方》。

【组成】缩砂仁(去膜,熨斗内略炒)

【用法】上为细末。每服二钱,温酒调下;不饮酒人,米饮调下,或盐汤亦得。

【主治】①《百一》:妊孕攧或闪肭。②《医方类聚》引《胎产救急方》:伤损胎动,痛不可忍,漏胎下血,血尽则死,及崩暴下血者。

65134 神效散

【方源】《普济方》卷一七七引《家藏经验方》。

【组成】白芍药 甘草各等分

【用法】上为末。水调服,一日三次。

【主治】消渴。

【临证举例】消渴 昔鄂渚李祐之,尝病渴九年,服药不一,往往止而复作,与苏朴宰交,因授此方,服三四日,疾势顿愈,今年余不作,觉前后所服之药,取效无愈于此者,不当以所用之药平易而忽之也。

【备考】《医统》本方用法:上为粗末,每服三钱,水一盏半,煎八分,不拘时,一日三次,滓复煎,疾止则已。

65135 神效散

【方源】《永类钤方》卷七引《选奇方》。

【异名】黄柏散(《普济方》卷一一〇引《仁存方》)。

【组成】黄柏三钱(为末) 皂角刺灰三钱

【用法】上为末,作一服。温酒调下,晚勿食,空心服。至二更取下虫,并不损人,利后三二日,但进白粥及补气药。

【主治】大风癞疾。

【宜忌】忌猪、鸡、面、动风物。

65136 神效散

《朱氏集验方》卷五。为《百一》卷五“神效汤”之异名。见该条。

65137 神效散

《朱氏集验方》卷十二。为《局方》(宝庆新增方)卷八“神效托里散”之异名。见该条。

65138 神效散

【方源】《施圆端效方》引张君玉方(见《医方类聚》卷一六〇)。

【组成】谷精草一钱 滑石二钱

【用法】上为细末。每用一字,口含水,搐入鼻内,吐了水,口咬竹箸底头,吐出涎为妙。

【主治】心邪狂走,痫病风涎。

65139 神效散

【方源】《普济方》卷四十六引《卫生宝鉴》。

【组成】江茶二两 香白芷半两

【用法】上为细末,水调成膏子,摊在盏内,用巴豆十四个,捶碎,逐个烧烟熏尽为度,阴干为末。每服一大钱,加薄荷七叶,白梅一个,水一盏,煎至六分,临发时服。五七服立效。

【主治】头风。

65140 神效散

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】罂粟壳(去梗蒂,锉碎,蜜水炒)

白芷　乌梅（和核）各一两　乳香　抚芎各半两

【用法】上㕮咀。每服二钱，水一盏，煎七分，空心温服。

【主治】赤白痢，昼夜频数，食减腹痛，小便不利。

65141　神效散

【方源】《医方类聚》卷八十二引《瑞竹堂方》。

【组成】川芎二钱　牡丹皮二钱半（去骨）　滑石二钱（研）　御米壳二钱（蜜炒黄色）

【用法】上㕮咀。每服五钱，加生姜一两，水一盏半，煎至七分，去滓，临卧温服。

【主治】偏正头疼。

65142　神效散

【方源】《得效》卷四。

【组成】南木香　青皮　陈皮　麦蘖（炒）　大枳壳（炮）　京三棱　蓬莪术　神曲（炒）　甘草（炙）各二钱半　北白芍药　川白芷　肉桂（去皮）　玄胡索　破故纸各二钱半　荜澄茄　丁香各一钱

【用法】上锉散。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，枣子一个，煎至七分，空心服；临睡加盐一捻，再煎两沸服。

【主治】远年近日一切脾疼，遇食冷物，或天气寒，阴冷便作，胸间一点痛起，或引入背膂，痛不可忍。

【宜忌】忌面食、豆腐、一切生冷。

65143　神效散

【方源】方出《医学纲目》卷三十六，名见《东医宝鉴·杂病篇》卷十一。

【组成】丁香一粒　蝎一个　辰砂一字　人血一点

【用法】上为末。男用男左手中指血，女用女右手中指血，蘸末擦唇上。

【主治】小儿慢惊风。

65144　神效散

【方源】《普济方》卷三九六引杨氏方。

【组成】赤石脂一两（煅）　白龙骨一两　阿胶二两　诃子肉半两（炮）　木香半两（炮）　黄连半两　干姜半两　甘草半两（炙）（一方有缩砂仁一两）

【用法】上为细末。煎粟米饮调下，大小以意加减。

【主治】久痢并血痢不愈。

65145　神效散

《普济方》卷一七八。即《圣惠》卷五十三“神效方”。见该条。

65146　神效散

【方源】《普济方》卷二一一。

【组成】霜盐梅三个（用黄泥裹，以慢火煨干）

【用法】上为末。米饮汤调下。

【主治】赤白新旧痢疾。

65147　神效散

【方源】《普济方》卷二九五。

【组成】苦参　川椒　苦葫芦　芫荽子　槐花　枳壳　荆芥　金银花　小茴香　白芷　连翘　独活　麻黄　牡蛎（煅）　威灵仙　椿树皮各二两

【用法】上㕮咀。每用五钱，水六七碗，葱白三茎，煎五七沸，先以盆盛药水，上坐，先蒸后洗，却以乌龙膏贴之，临卧时再以药滓熬水如前洗之，如此三五次，夜则以膏药贴之。常服葛花酒蒸香连丸。

【主治】痔漏。多因嗜欲酒色过度，喜怒不常，致生痔漏，或如鼠乳连珠，或粪门肠头肿，流脓漏血，其痛如割，不可忍者。并治肠风下血。

【加减】加老黄茄子二个，尤妙。

65148　神效散

【方源】《普济方》卷三一七。

【组成】伏龙肝

【用法】上为极细末。每服一钱，以东流水调下，一日三次。

【主治】妇人风邪癫狂。

65149　神效散

《普济方》卷三五六。为方出《证类本草》卷

五引杜壬方，名见《产育宝庆集》卷上“神应黑散”之异名。见该条。

65150 神效散

【方源】《奇效良方》卷六十四。

【组成】黄连 郁金 黄柏各一钱 轻粉二分半 白矾五分（枯用）

【用法】上为末。以葱煎汤，先洗净，然后用药掺脐上，一日三四次。

【主治】小儿风脐，水脐肿烂。

65151 神效散

【方源】《保命歌括》卷十三。

【组成】透明雄黄 松县黄丹各二钱 马牙消三钱

【用法】上为极细末。令病人仰卧，用银簪取药少许，点眼大角，缓缓二三次，少顷复旧。

【主治】腰痛不能转侧。

65152 神效散

《便览》卷四。为《百一》卷十六引赵百中方“神效方”之异名。见该条。

65153 神效散

【方源】《回春》卷五。

【组成】胆矾一分

【用法】上为末。温黄酒调下。以吐痰尽为度。

【主治】心痛作酸，及水停心下，作声如雷；又治口眼㖞斜，不省人事。

65154 神效散

《回春》卷八。为原书同卷“斑蝥散”之异名。见该条。

65155 神效散

【方源】《杏苑》卷八。

【异名】神效方（《疡科选粹》卷六）。

【组成】肥皂子四两（打碎，炒焦，为末） 何首乌 荆芥 苦参 天花粉各一两

【用法】上为末。每服一钱，用土茯苓五两，猪脂油二两，水六碗，煎二碗，分作三次服。

【主治】杨梅疮，肿如番花石榴。

【宜忌】忌牛肉、烧酒、茶、铁器。

65156 神效散

《济阳纲目》卷一〇八。为《扶寿精方》“神梭散”之异名。见该条。

65157 神效散

【方源】《简明医彀》卷八。

【组成】川乌（炮，去皮脐） 川黄柏（炙，去粗皮）

【用法】上为末。唾调，唾少，漱口水调，敷患处。四围留头，药干用米泔不住润湿。已成溃烂，先以槐枝、艾叶煎汤洗净，以香油润之，日换一次。脓出无挤，痛减生肌，腐肉自落，不落剪去，不宜用针。

【主治】痈疽、发背，一切疔毒并瘰疬已成未成者。

【宜忌】发背不宜贴膏药。忌怒气、房室、孝服、体气、饮酒人。忌一切发气热毒物。脑疽、对口不必洗，逐次添药，恐进风。

65158 神效散

【方源】《玉案》卷三。

【组成】麦门冬 黄耆 天花粉 白扁豆各一钱五分 枇杷叶 天门冬 乌梅各一钱 甘草五分

【用法】水煎，食前服。

【主治】消渴，形容渐瘦，精神倦怠。

65159 神效散

【方源】《慈幼新书》卷十一。

【组成】金银花 归尾各二钱 紫草 木通 苦参 蝉蜕 白芷 皂角刺 川牛膝各一钱 红花三分 甘草 川乌各三分

【用法】上以土茯苓六两，洗净打碎和药，用水六碗，煎至三碗，早、中、晚各服一碗。疮在下部，先药后饭；疮在上部，先饭后药。凡服药日，必食建猪肉、熟米饭，饮好酒四五杯，使药力宣畅，其疮易愈。

【主治】杨梅疳疮，鱼口便毒，不拘新久。

【宜忌】忌食猪首、肝、肠、牛、羊、驴肉、鸡、鹅、辛辣之物。

65160 神效散

【方源】《医部全录》卷三七二。

【组成】槟榔 蛇床子各一两 全蝎半两

倭硫黄一两五钱

【用法】上药化开硫黄，入荆芥末三钱，滚数沸，候冷加轻粉二钱，冷再碾末，加三柰半两(炒)，共为细末，先将小油滚过，候冷调上药。擦疮上，仍以两手搓药，闻药气。

【主治】干湿脓窠，诸种疥癣。

65161　神效散

【方源】《惠直堂方》卷三。

【组成】硼砂　硇砂　皂矾(明透者)　盐各五分

【用法】上为粗末，入铁杓加水炒干，再炒至绿色为度，又研细末。用时以针将疮刺破见血，以银簪蘸药点入疮口，面糊为膏，摊纸上，贴一二层。二三寸香时，黑者即变红，数日痂落如无。生血或血黑色，急以亲人血滴入，点药，十中可活三四，否则不治。

【主治】疔疮危笃者。

65162　神效散

【方源】《金匮翼》卷五。

【组成】猪牙皂角　霜梅

【用法】上为末。嗃之。

【主治】喉痹，语声不出。

65163　神效散

【方源】《疡医大全》卷十八。

【组成】沉香五钱　芫花(炒)三钱　月季花(即月月红)二钱

【用法】上锉。取大鲤鱼一尾，放尿内游死，将药入鱼腹中，就以鱼肠封固，酒、水各一碗，煮熟服之。

【主治】瘰疬，未破者，或已溃烂，延至两肩胸腋，如茄子大，四五年不愈者。

65164　神效散

【方源】《疡医大全》卷三十六。

【组成】肉桂(去皮)　红花各一钱七分　川乌　草乌各二钱

【用法】上为细末。每服二分，酒调下。伤重者不过三分即愈。

【主治】跌打损伤。

65165　神效散

【方源】《良方合璧》卷上。

【组成】川贝母二钱(去心)　黑元参一钱五分　皂角一钱　射干一钱五分　西河柳一钱(嫩叶)

【用法】上用生荸荠芽一两煎汤，收干在药上，研末。先用皂角七分，研极细末，吹入鼻孔，令自嚏，然后服前末药。二次即愈。一服愈，停后服。

【主治】喉痧。

65166　神效煎

【方源】《仙拈集》卷二。

【组成】薏苡仁(炒熟)一两　柴胡(炒黑)五钱

【用法】水煎服。

【主治】劳症吐血。

65167　神效膏

【方源】《圣惠》卷二十一

【异名】万金神效膏(《医钞类编》卷四)。

【组成】牛皮胶一两(水溶作膏)　芸薹子半两　安息香半两　附子半两(生用，去皮脐)　汉椒半两(生用)

【用法】上为细散，入胶中和成膏。涂纸上，随痛处贴之。

【主治】风走注疼痛，上下不定。

65168　神效膏

【方源】《圣惠》卷五十六。

【组成】芫花一两　芸薹子半两　安息香半两　附子半两(去皮脐)　桂心半两　川椒半两(并生用)

【用法】上为细散，入牛皮胶中，和成膏。涂纸上，随痛处贴之。

【主治】走疰上下。

65169　神效膏

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】当归二两　白芷一两半　乳香三分(细研)　松脂一两　芎䓖一两　白蔹一两半　绯帛灰半两(细研)　乱发灰半两(细研)　甘草一两半　黄丹十两　木鳖子三十枚(去壳)　杏仁一两(汤浸，去皮尖双仁，炙)　木

香一两半 黄蜡二两 麻油二斤

【用法】上先取油安铛内，炼令香熟，将八味药细锉，下油中浸一宿，以文火煎白芷色赤黑，即滤出，次下松脂、蜡、乳香、绯帛、发灰等，更煎令消，以绵滤去滓，都入铛内，下黄丹，不住手搅，变黑光色，滴在水中为珠子，膏成，用瓷器盛。每用以故帛摊贴，每日换二次。

【功用】排脓生肌。

【主治】一切痈疽发背，溃后肌肉不生。

65170 神效膏

【方源】《圣济总录》卷一八三。

【组成】木通(锉) 甘草(炙) 当归(炙，锉) 白芷 防风(去叉) 细辛(去苗叶) 栀子仁 黄连(去须) 黄芩(去黑心)各一分 垂柳枝(锉)二两 铅丹六两 蜡半两 清油一斤

【用法】上除丹、蜡、油外，锉碎，先以油内浸药一宿，于火上煎，候白芷赤黑色，绞去滓再煎，即下丹、蜡，柳篦搅，候变黑色，滴水中成珠子，软硬得所，瓷盒盛。故帛上摊贴，一日二次，以愈为度。

【功用】止疼痛。

【主治】痈疽发背，热毒气结，肿痛坚硬。

65171 神效膏

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】马鞭草 地松(一名皱面草)各一小握(不用根)

【用法】上入陈白梅肉一枚，白矾一大拇指面许，研令极细，取一弹子大，以绵裹作一球子，缀钗头上，其余药即将无灰酒一碗，绞取药汁，细细呷之令尽，如不能饮，亦强呷数口，然后纳绵球子于喉间，旋旋咽其药汁，其骨鲠渐软，当自下去，不然即吐出。

【主治】诸般骨鲠。

65172 神效膏

【方源】《朱氏集验方》卷十二。

【组成】灶灰汁(即是饼药) 蛎壳灰(筛细) 糯米(舂白)

【用法】上先将瓦盆载饼药在日里晒，要得稍温，仍将一把灰、一把米，层层撒在瓦盆内，其灰、米上约留半寸饼药，就把在日里晒；灰、米发变如角黍然，时或添饼药在日里晒。如用药时，取出上件药以淡饼药调之，入钵中研成膏，用手敷在疮上，以早为上。如疮方发肿时，便可敷药，才干便敷，以消散为效，不可中辍；其肿又移在别处，再以药如前敷之，才移便是作效；如疮已聚脓血，则以药敷四畔，只留其头，使之血出，亦以血尽疮口合为度。其疮口或皮肤有破损处，千万不可敷药，痛不可忍。如妇人、小儿只宜用清水或十分淡饼药调之，或以信纸先安在疮上，然后以药敷纸上，更宜斟酌。无日则以火代之，先用饼药在温火上熏热，既入米灰，则不可用火煮。

【主治】痈疽，一切毒疮。

65173 神效膏

【方源】《御院药方》卷十。

【组成】小椒二两(炒黄色) 乳香八钱(另研)

【用法】上为细末，用好醋打面糊调药。涂在痛处上，用纸贴之。

【主治】损扑着，筋骨疼痛。

65174 神效膏

【方源】《医方类聚》卷九十八引《必用全书》。

【组成】皂角一斤(肥大不蛀者，去皮弦，火微焙，木槌捶碎，不犯铁器) 乳香一两(别研)

【用法】上用酽米醋一大碗，挼皂角取浓汁，帛滤去皮滓，银石器中慢火熬成膏子，次入乳香末搅匀，瓷罐收贮。遇肿处敷贴，以纸花盖之。

【主治】风湿脚气肿痛，及疮疡肿毒。

65175 神效膏

《普济方》卷七十八。即《圣济总录》卷一一一“点药神效膏”。见该条。

65176 神效膏

【方源】《普济方》卷二四〇。

【异名】皂角膏。

【组成】不蛀皂角一挺(灰火中煨,去皮核)　平胃散半贴

【用法】上为细末,入平胃散,米醋调敷肿疼处。若甚者,先以铁秤锤煅红,淬米醋中,以热气熏痛处,少定,以蓖麻子数粒研细,贴脚心下,然后敷药。

【主治】脚气,膝肿痛,挛缩不可行。

65177　神效膏

《普济方》卷三一〇。为《医方类聚》卷一八七引《经验良方》"神验膏"之异名。见该条。

65178　神效膏

【方源】《普济方》卷三一四。

【组成】號丹二两　杏仁一两(捶碎)　黄连半两(为末)　清麻油半斤

【用法】上用东南柳枝二十七条,各长五寸,先用油熬焦黑,用绵滤过,次下黄丹,再熬至滴水中成珠子,不散为度,倾入瓷器中,以盆覆阴地上,出火毒再宿。贴患处。

【主治】一切恶疮。

65179　神效膏

【方源】《医统》卷八十一。

【组成】好香油二两　花椒四十九粒　槐枝一寸长者四十九节　黄蜡一两　轻粉二分　枯矾一分

【用法】先看疮大小,用绵纸裁成四方块十二张,四角用小纸捻钉住听用,再以好香油入铜杓,文武火熬,下花椒煎黑取起,次下槐枝煎焦黑取起,次下黄蜡、轻粉、枯矾溶清,却下前纸浸油内令透,不可使焦,取起听用。贴时先将槐枝、葱、椒煎汤,洗疮令透,拭干,将膏纸贴上,外面再以油单纸掩护,以油帛缚定,一日取下,揭去近疮一张,复将煎汤洗净贴上,尽十二张,无不愈者。

【主治】臁疮。

65180　神效膏

【方源】《疡医大全》卷三十。

【组成】松香末四两　炒黄丹二两

【用法】上用麻油四两熬成珠,入上药搅成膏。摊贴。

【主治】热疖。

65181　神效膏

【方源】《文堂集验方》卷三。

【组成】当归一两　生地八钱　白术　川断各六钱　子黄芩(酒炒)　益母草各一两　白芍(酒炒)　黄耆　党参各五钱　生甘草三钱

【用法】用麻油二斤,浸七日,熬成膏,加(原缺)三四沸,入飞过黄丹七钱,(原缺)炒研搅匀,滴水成珠,入井中浸十日取出,红布上摊碗口大。贴丹田上,十四日一换,贴过八个月为妙。

【主治】久惯小产者。

65182　神效膏

【方源】《纲目拾遗》卷七。

【组成】真麻油一斤　藤黄八两　白蜡八两

【用法】先将油入铜锅,次将藤黄捶碎熬透,以麻布滤去滓,加入白蜡,至滴水成珠为度,贮瓷罐,其膏夏老冬嫩为宜。敷之。

【功用】止疼,止血,收口。

【主治】刀斧木石伤及汤火伤,竹木刺入肉,一切诸伤。

65183　神效膏

【方源】《回生集》卷上。

【组成】真川白芥子二斤　穿山甲八两

【用法】用真桐油二斤,入铜锅内,先熬半晌,次入穿山甲熬数沸,再次入白芥子,俟爆止,滤去滓,入飞净炒黑黄丹八两收之,离火,再入麝香末四钱,去火气七日。用时隔汤化开,不可用火。

【主治】痞块。

【加减】加阿魏四两更妙。

65184　神衰汤

【方源】《千家妙方》引黄文东方。

【组成】石决明 12 克　珍珠母 12 克　钩藤 10 克(后下)　菊花 10 克　丹参 10 克　赤芍 10 克　夜交藤 12 克　合欢皮 10 克　淮小麦 12 克　炙甘草 4.5 克　鲜竹叶 10 克

【用法】水煎服，每日一剂。

【功用】平肝潜阳，和胃安神。

【主治】神经衰弱，证属肝阴不足，肝阳上亢，心火偏旺，胃失和降者。

【临证举例】神经衰弱　某女，20 岁，学生。由于学习紧张，以致严重失眠，每晚仅能入睡一小时许，食欲差，嗳气，舌质淡青，脉象弦细。脉症合参，乃肝阴不足，肝阳上亢，心火偏旺，胃失和降。治宜平肝潜阳，和胃安神。服神衰汤 7 剂，夜寐转佳，能入睡 3-4 小时，后以原方去钩藤，加入炒枣仁 10 克，再服 14 剂，睡眠增加，胃纳亦佳。改服补心丸，一月后追访，虽停药多日，但睡眠仍好。

65185　神消散

《朱氏集验方》卷十二。为《外科精要》卷中"洗药神效散"之异名。见该条。

65186　神消散

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】山栀子（盐水炒黑色）一两　益智仁（炒）七钱　橘核（炒）一两　青皮（香油炒）六钱　槟榔一钱　荔枝核八钱　小茴香（盐水炒）一两

【用法】上为细末。每服二钱，烧酒调服；如不用酒，以灯草煎汤，加盐少许调服。

【主治】诸般疝气，外肾肿胀疼痛。

65187　神消散

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】黄芩　蝉退　甘草　木贼各五钱　谷精草　苍术各一两　龙退三条（炒）

【用法】上为末。每服二钱，夜卧冷水调下。

【主治】眼内黄膜上冲，赤膜下垂。

65188　神消散

【方源】方出《奇方类编》卷上，名见《仙拈集》卷一。

【组成】莱菔子四两（用巴豆十六粒同炒）　牙皂一两五钱（煨，去核）　沉香五钱　枳壳（炒）四两（烧酒煮，切片）　大黄一两（酒炒）　琥珀一两

【用法】上为细末。每服一钱，鸡叫时热酒送下，姜皮汤亦可。后服金匮肾气丸收功。

【主治】五种鼓胀。

65189　神消散

【方源】《治疹全书》卷下。

【组成】大黄　倍子各一两　乳香五钱　没药五钱　牛皮胶四两

【用法】上将胶用好醋溶化，拌药末，凝结收贮。凡遇肿毒，取胶药一两，以好醋一钟化开，用新笔乘热蘸围，从大围小，一个时辰，自然痛止毒散。

【主治】疹后痈疽脓未成者。

65190　神益汤

【方源】《诚书》卷十六。

【组成】桔梗　天竺黄　木通　橘红　前胡　羌活各五分　石菖蒲二分　枣仁八分　杏仁（制）七分

【用法】水煎服。

【主治】小儿内吊胎惊。

65191　神通汤

【方源】《名家方选》。

【组成】良姜　丁香　沉香　木香　陈皮　莪术　大腹　吴茱萸　砂仁　干姜　枇杷叶　连翘

【用法】水煎服。

【主治】饮食大过，腹痛无吐下，闷乱痛甚，凡病当危急，诸药不效欲死者。

65192　神通饮

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】川木通二两（锉细）

【用法】上用长流水煎汁，顿服。服后一时许，遍身发痒，或发红丹，勿惧，遍身上下出汗即愈。

【主治】外感风湿之白虎历节风症，遍身抽掣疼痛，足不能履地二三年，百方不效，身体羸瘦者。

65193　神通散

【方源】《卫生总微》卷八。

【组成】地龙（紧者，去土，微炒）一两　朱砂一两（别研）　生干地黄一两（为末）

【用法】上同拌匀。每服一字,煎胡荽酒少许,同温汤调下,不拘时候。

【主治】小儿疮疹倒靥,伏陷不出,毒气稍轻,大小便通利者。

65194　**神通散**

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】朱砂一钱　雄黄五分　沉香一钱　木香一钱五分　巴豆一钱(去油)　郁金一两

【用法】上为末。每服六厘或半分,看人大小以七厘作一服为止,更不可多,茶送下。

【主治】伤寒,危急发狂,并大小便不通,有食腹痛。

65195　**神通散**

【方源】《寿世保元》卷八。

【组成】儿茶末一钱

【用法】上用萹蓄煎汤送下。霎时溲便涌如泉。

【主治】小儿膀胱火盛,小便闭涩不通。

65196　**神通散**

【方源】《玉案》卷六。

【组成】出过蚕蛾(烧灰)　大黄各六钱　穿山甲(炒)　牙皂各五钱

【用法】上为末。每服一钱,酒调下。服之脓血皆从大便中出。

【主治】肠痈,不拘已成未成者。

65197　**神验丸**

【方源】《圣济总录》卷七十七。

【组成】神曲(炒)　吴茱萸(汤浸,焙干,炒)　各一两　黄连(去须,炒)　芜荑(炒)各三分

【用法】上为末,姜汁为丸,如梧桐子大。每服十五丸,食前用温米饮送下。

【主治】冷劳气痢,腹胁疼痛,水谷不消。

65198　**神验丹**

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】白矾二两　砒六钱(上二味碾合一处,炼煅,以色如白粉,全无气味为度)　自然铜(煅红,醋淬,为粉)八钱　乳香(炙去油)　没药(炙去油)　朱砂各五钱　雄黄一钱　轻粉五分　冰片一分

【用法】上用纸裹药面糊为条子。先以软草心探其浅深,依浅深插入漏孔内,每日早、中、晚三次。待其管出,再用生肌散收疤。

【主治】二十四种痔漏。

65199　**神验丹**

【方源】《春脚集》卷二。

【组成】乳香　没药　木香　朱砂各等分

【用法】上为细末。每服二钱,生姜汤调服。

【主治】胃脘痛。

65200　**神验方**

【方源】《圣济总录》卷一四七。

【组成】相思子三七枚

【用法】上为散。每服二钱匕,空心温水调下。服后欲吐,且忍之勿便吐,不可忍即任,便取吐,其毒即快出,少时以稀粥助之。

【主治】中蛊毒。

【备考】本方方名,《普济方》引作"神验散"。

65201　**神验散**

【方源】《圣惠》卷六十一。

【组成】雄黄三分(研为末)　楂子三枚(和核切,阴干为末)

【用法】上先将雄黄末于铫子内,以瓷盏子盖四面,以湿纸封缝,于慢火上烧,以温润物盖盏底,莫令水入,其黄作霜在盏子上,候冷取出,别取长肉膏药不限多少,取其霜并楂子末一起拌和,旋旋摊贴绢上。如疮口深,作纴子引药入疮内。肉从里长出,到疮口愈合。

【功用】长肉,合疮口。

【主治】诸痈肿疮,及冷瘘不干。

65202　**神验散**

【方源】《圣济总录》卷一四一。

【组成】当归(切,焙)一两　白矾二两　桑蛾二两(黄紫色者)　木耳二两

【用法】上为散。每服一钱匕,空心食前粟米粥调下。

【主治】痔疾。

65203　**神验散**

【方源】《圣济总录》卷一六九。

【组成】鲮鲤甲（火炮黄色，全者）二十片 地龙（去土，炒）二十枚，紫草五枚

【用法】上为细散。每服半钱匕，温酒调下。药后用衣盖，即红色出。

【主治】小儿疮子黑色，及出不快。

65204 **神验散**

【方源】《圣济总录》卷一八〇。

【组成】寒食面五钱 消石七钱

【用法】上为末。每用半钱匕，新水调涂在纸花子上，男左女右，夜晚贴脚心。

【主治】小儿口疮烂臭。

65205 **神验散**

《普济方》卷二九七引《神效方》。为《儒门事亲》卷十五"神应散"之异名。见该条。

65206 **神验散**

《普济方》卷二五二。即《圣济总录》卷一四七"神验方"。见该条。

65207 **神验散**

《普济方》卷三五七。即原书同卷"千里马散"之异名。见该条。

65208 **神验散**

【方源】《活人心统》卷三。

【组成】玄胡索五钱（炒） 小茴香五钱 干葛二钱半 炒盐一钱

【用法】上为末。每服二钱，温酒调下。

【主治】小肠疝气。

65209 **神验膏**

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】头醋一斗 不蛀皂荚十挺（去皮子） 芫花二两 白矾一两

【用法】上捶皂荚令熟，并芫花同于净锅内，入醋煎三分之二，以新绢绞去滓，洗锅净入汁，次入白矾，煎如饧，于瓷合内贮之。凡有损处，以好纸摊令匀，外贴，每日换一次。三二次愈。

【主治】跌扑打损。

65210 **神验膏**

【方源】《圣济总录》卷一四三。

【组成】背阴臭椿根（须根不见日者，掘剥取嫩处皮）一斤（锉） 黑豆半升 槐花二两

【用法】上用水五升，于银石器内慢火熬令豆熟为度，续入蜜二两，再煎，候蜜熟倾出，用净瓷石器内盛过，夜露二宿。每服约半盏许，用重汤烫温热得所，旋旋服食，每日食后、临卧各一服。

【主治】肠风下血，令不入食。

65211 **神验膏**

【方源】《鸡峰》卷十六。

【组成】腊月猪脂半斤 葱白二七茎（锉碎）

【用法】上相和煎成膏。每服一匙，热酒调下，不拘时候。

【主治】难产。

65212 **神验膏**

【方源】《医方类聚》卷一八七引《经验良方》。

【异名】神效膏（《普济方》卷三一〇）。

【组成】糯米粉一合 飞罗面一合 马屁孛一碗（即灰菰）

上三味拌和，于生布上筛，下用生姜自然汁半碗，调却入后药：

牛皮胶二两半 酸枣醋一碗

【用法】上先用醋熬牛皮胶化，便入前所调三味药，不住手搅成膏子，以瓷器盛之。每遇磕损，以药膏摊于纸上，贴伤处，却用杉木片夹定，用厚衣服裹之，勿令冷，三两日一换。若只伤筋骨，贴上如火，若筋损骨碎，贴上而痛如虫行为妙。初折伤者，只三次效。

【主治】打扑伤，损筋动骨，不问手足腰背。

65213 **神验膏**

【方源】《疡医大全》卷三十七引周鹤仙方。

【组成】大黄 白蜡各四两 败龟版 当归各三两 松香 乳香各二两 骨碎补 没药各一两 川续断五钱 麝香二钱

【用法】上为细末，用猪板油三两，将白蜡、松香、乳香置在铜锅内，同猪油化开，将前药末入油调匀为膏。贴于夹伤处。第二日即可

行走。

【主治】夹棍伤。

65214　**神梭散**

【方源】《扶寿精方》。

【异名】神效散(《济阳纲目》卷一〇八)。

【组成】当归　白芷　黑牵牛　诃子　荆芥　侧柏叶　威灵仙各等分

【用法】上为细末,临睡擦发内,次早理之。

【功用】去头部风屑垢腻,解结。

65215　**神菖散**

【方源】《顾氏医径》卷五。

【组成】连翘　山栀　菖蒲　茯神　灯心

【主治】邪热攻心,小儿热啼,啼泣遮溺,相应而作,见灯愈啼。

65216　**神黄散**

【方源】《外科精义》卷下。

【组成】黄柏末一斤　黄丹二两(炒紫色)　雄黄一两(另研)

【用法】上为末,研匀。每用新水调如糊,敷扫,以小纸花贴,稍干,以蜜水润之。

【主治】一切热肿,攻焮疼痛。

65217　**神黄散**

【方源】《慈幼新书》卷七。

【组成】大黄一两二钱　姜黄　黄柏各八钱　白及一两　赤芍　花粉各七钱　红花　肉桂各五钱

【功用】定痛内消。

【主治】一切热毒红肿。

65218　**神黄散**

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】神黄一斤(搓热)　雄黄　净硫黄各五钱

【用法】上用河水六升,煮干。温敷疮上,冷即易。敷十余次红润者可治,干枯不红、不知痛,出黑血者死。

【主治】发背,阴毒紫黑,平陷不起。

65219　**神黄膏**

【方源】《肘后方》卷八。

【组成】黄连　黄柏　附子　雄黄　水银　藜芦各一两　胡粉二两

【用法】上为细末,以腊月猪脂一斤,和药调器中,急密塞口,蒸五斗米,下熟出,纳水银,又研令调,密藏之。有诸疮,先以盐汤洗,乃敷上。无不愈者。

【主治】诸恶疮,头疮,百杂疮。

65220　**神捷丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】吴茱萸(汤洗七次)　干姜(炮)　肉桂(去粗皮)　蓬莪术(煨香,切)　附子(炮,去皮脐)　川芎各等分

【用法】上为细末,醋煮面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食前熟醋汤送下。

【主治】急心痛不可忍,浑身手足厥逆,呕吐冷沫。

65221　**神捷散**

【方源】《圣济总录》卷一三六。

【组成】吴茱萸一两　赤小豆四十九粒　白蒺藜一两　白芜荑仁半两　轻粉五钱匕　石硫黄少许(研)

【用法】上为散,令匀。每用半钱匕,以生油调药于手心内摩热,遍揩周身有疥处,便睡,其疥自愈。

【主治】诸疥疮。

65222　**神捷散**

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】菖蒲(切作片子,于面内炒)　赤石脂各一两(大火内煅通赤)　干生姜半两

【用法】上为散。每服二钱匕,空心米饮调下,一日三次。

【主治】妊娠下痢,及水泻不止,米谷不消化者。

65223　**神捷散**

【方源】《圣济总录》卷一七八。

【组成】大枣四个　栀子仁五个　干姜半栗子大

【用法】上并烧黑色,为散。每服半钱匕,米饮调下。

【主治】小儿赤白痢。

65224 神捷散

【方源】《医方类聚》卷七十五引《吴氏集验方》。

【组成】鸭嘴胆矾 明矾 铜青 轻粉（并为细末）各一字

【用法】上以江茶半钱，逐旋和，以新汲水调，呷咽。

【主治】咽喉紧闭作疼，乳蛾。

65225 神捷膏

【方源】《古今医鉴》卷十五引郑中山方。

【组成】香油半斤（先煎） 黄蜡一两 松香五钱

上慢火熬至滴水成珠不散为度，取出候冷，加后药：

乳香三钱 没药三钱 轻粉三钱 血竭三钱 孩儿茶三钱 枯矾三钱 龙骨（火煅）三钱 川椒四钱

【用法】上为细末，搅入煎膏内，瓷器收贮。若遇顽疮，先用花椒、细茶、艾叶浓煎水，频频温洗令净，却用油纸以封刺孔，比如疮口大，俱刺遍伤，药将孔面贴疮上，一日换三次，二日后一日换一次。每换药必须洗净方贴。

【主治】诸般顽疮，及内外臁疮，久年不愈者。

65226 神授丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【异名】面饼丸（《得效》卷七）。

【组成】密陀僧二两（研） 黄连（去须）一两

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服五丸，日加五丸，至三十丸止，临卧用出了蚕的空茧子并茄子根煎汤下。渴止住药。

【功用】止消渴。

【主治】消渴。

【备考】本方方名，《普济方》引作“神效丸”。

65227 神授丸

【方源】《百一》卷六引葛枢密方。

【组成】南木香二钱半 肉豆蔻一两（面裹煨）

【用法】上为细末，煮枣为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，米饮送下，不拘时候。

【主治】脏腑泄泻。

65228 神授丸

《直指》卷九。为《三因》卷十“神授散”改作丸剂。见该条。

65229 神授丸

【方源】《名家方选》。

【组成】大黄 皂角 桃仁 槟榔 雷丸各一钱 安息香一分

【用法】上为末，糊为丸。桃、柳叶煎汁送下。

【主治】劳瘵。

65230 神授丹

【方源】《景岳全书》卷六十。

【组成】枯矾七分 白毯灰三分 麝香一分

【用法】上为末。以竹管吹疮上。

【主治】牙疳。

【备考】《疡医大全》有冰片一分。

65231 神授方

《奇效良方》卷三十九。为《医方大成》卷五“梦中神授方”之异名。见该条。

65232 神授方

【方源】《医统》卷七十九。

【组成】鲜生地黄二斤 糟姜瓜旧糟一斤 生姜四两 赤小豆半斤

【用法】上捣烂，同炒热，以帛裹罨伤处，夹缚定，不三日而安。

【主治】伤筋闪骨痛甚。

65233 神授汤

《妇人良方》卷六。为《三因》卷十三“神秘汤”之异名。见该条。

65234 神授汤

《医林绳墨大全》卷二。为《百一》卷五引《夷坚·已志》第三卷“观音人参胡桃汤”之异名。见该条。

65235　神授散

《苏沈良方》卷九。为《仙授理伤续断秘方》"接骨散"之异名。见该条。

65236　神授散

【方源】《三因》卷十。

【异名】青囊神授散(《医钞类编》卷十三)。

【组成】川椒二斤(择去子并合口者,炒出汗)

【用法】上为末。每服二钱,空心米汤调下。须痹晕闷少顷。如不能禁,即以酒糊为丸,如梧桐子大。每服三五十丸,空心服。

【功用】杀虫。

【主治】①《三因》:诸传尸劳气。②《直指》:痹,肾冷腰痛,外肾湿痒。

【临证举例】传尸劳　昔人尝与病劳妇人交,妇人死,遂得疾,遇一异人云:劳气已入脏。遂与此方,令急服二斤,其病当去。如其言服之,几尽,大便出一虫,状如蛇,自此遂安。续有人服之,获安济者多矣。

【备考】本方改作丸剂,名"神授丸"(见《直指》)。

65237　神授散

【方源】《魏氏家藏方》卷七。

【组成】白鸡冠花　生姜(去皮)各等分

【用法】上于沙盆内烂研,捻作饼子,焙干,为细末,白汤调下,不拘时候。

【主治】大便下血不止。

65238　神授散

【方源】《朱氏集验方》卷十。

【组成】当归　芍药　蓬莪术　神曲　麦蘖　青橘皮　三棱

【用法】上为细末。每服一钱至二钱,温酒送下。一方留神曲作糊为丸,如梧桐子大。

【功用】破血瘕与血积。

【主治】室女月经不调,变生百病。

【备考】本方方名,《普济方》引作"通经散"。

65239　神授散

【方源】《局方》卷九(续添诸局经验秘方)。

【组成】青皮(去白)　桂心　牡丹皮　陈橘皮(去白)　白芍药各五两　红花一两半　百合(水浸洗)　干姜(炮)　甘草(炙)　当归　川芎各二两　神曲(炒)　人参(去芦)　麦蘖(炒)各三两　(一方无红花)

【用法】上为末。每服二钱,水一盏,加生姜三片,大枣一个,煎至七分,空心服。

【主治】产后一切疾病,不问大小,以至危笃者。

【宜忌】孕妇不得服。

65240　神授散

【方源】《普济方》卷二一二。

【组成】陈石榴(焙干)

【用法】上为细末。每服三四钱,米汤调下。

【主治】久痢不愈。

65241　神授散

【方源】《活人心统》卷一。

【组成】草乌一斤或半斤

【用法】上为末,用袋一个,先入豆腐将半,却将末药人在中间,再入豆腐花凑满包起,压干,放锅中煮一宿,其草乌即坚如石,取出晒干,为细末。每服五分,冷风湿气,以生姜汤调下;上木下痹,以葱汤调下;四肢,用酒调下。

【主治】久年痹麻木,或历节走气疼痛,诸风手足不仁。

65242　神授散

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】人牙(酥炙)　苦参各五钱　紫草　生地黄　犀角(镑)　麦门冬(去心)各六钱　黄芩(酒炒)　烧人矢(童男者)各二钱

【用法】上为散。每服一钱五分,醇酒调下,日二次,夜一次。良久痘起光润而恶候除,不能饮酒者,糯米饮调服。

【主治】痘黑陷咬牙,昏热闷乱,烦躁不宁。

65243　神授散

【方源】《全国中药成药处方集》(吉林、哈尔滨方)。

【组成】红花一两　没药三钱　当归一两　儿茶三钱　雄黄三钱　白芷三钱　肉桂一钱　乳香五钱　朱砂一钱　川军五钱　血竭四钱

梅片四分 麝香四分

【用法】上除麝香、梅片、朱砂各另细研外，余均研为细面，于一处调匀，用玻璃瓶贮存之。每服二钱，用黄酒或童便为引。

【功用】活血散瘀，消肿止痛。

【主治】跌打损伤，青紫肿疼，瘀血不散，终酿溃烂。

【宜忌】忌食生冷油腻。孕妇忌服。

65244 神授膏

【方源】《理瀹》。

【组成】黄柏 赤芍 红花 乳香 没药各五钱 生地 当归 白芷各四钱 蓖麻仁二钱 马钱子七个 蝉蜕三钱 蜈蚣十一条 蛇蜕一大条 全蝎十五个 男发一团

【用法】上用麻油熬，铅粉收膏。贴患处。

【主治】无名肿毒，痈疔疮疖。

65245 神蛎散

【方源】《卫生总微》卷十五。

【组成】大牡蛎（于腊日、端午日用黄泥裹，煅通赤，放冷，去泥）

【用法】上为细末。每服半钱，取活鲫鱼煎汤调下。只一二服愈。

【主治】一切诸渴。

65246 神蛇酒

【方源】《秘传大麻风方》。

【组成】白花蛇一条（去头尾） 黑蛇一条（去头） 僵蚕一两（炒） 川乌 白芷 生熟地 玄参 白术各一两 苦参五两 荆芥 防风 石菖蒲 细辛 天麻各一两 浮萍 当归 秦艽 海桐皮 麻黄 狗脊 牛膝 葶苈 草乌 苍耳子 木瓜 灵仙 胡麻 白芍 人参 马鞭草 枳壳 肉桂 蛇床 枳实 皂角 白鲜皮 五味子 肉苁蓉 木鳖子 五加皮各三两 土茯苓 青葙子 金银花各一两 薄荷三两 全蝎一两 蜈蚣三十条（去头） 桑寄生 白茯苓 蝉退（去头足） 甘草各二两 连翘三两

上为饮片，先用元米七升，酿成白酒浆，匀作四坛盛之，听用。又用水二斗，放入酒糟一升，另用大坛盛之，将前二蛇及药俱入坛封口，早煮至晚，取出待冷，开入四坛酒浆内。另将蛇取出，去皮骨，焙干，听用。又加下药：

血竭 乳香各一两 没药五钱 沉香 檀香 雄黄 辰砂 穿山甲各一两 麝香二钱 牛黄二钱 阿魏二钱

【用法】与前二蛇共为细末，搅匀，四坛内封固，又煮一时。服一杯后泻六七次，方可吃饭。已后将稀粥补之，早、晚各一次。

【主治】三十六种麻风，肌肤麻木，遍身瘙痒，瘾疹瘾疹，面上游风如虫行，紫白癜风，眉落鼻崩，脚底穿烂，肉死痒痛，一切瘿瘤疬串，无名肿毒，梅花烂疮，并痛风。

65247 神清散

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【组成】檀香 人参 羌活 防风各十两 薄荷 荆芥穗 甘草各二十两 石膏（研）四十两 细辛五两

【用法】上为末。每服二钱，沸汤点服。

【功用】消风壅，化痰涎。

【主治】头昏目眩，脑痛耳鸣，鼻塞声重。

65248 神清散

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】川芎 薄荷 羌活 附米 藁本 防风 荆芥 川乌 枳壳 石膏 白芷 甘草 细辛 麻黄各等分

【用法】上为末。每服三四钱，食后清茶葱白汤送下。

【主治】风毒伤胞睑，眼生翳膜，日渐细小。

65249 神液丹

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】食盐 银朱 硇砂精

【用法】上为细末。用一小粟粒许点眼。

【主治】诸般内障，及干燥眼。

65250 神绿散

【方源】《保婴撮要》卷四。

【组成】全蝎（去足翅）不拘多少 青薄荷（焙干）

【用法】上为末。每服半钱，薄荷汤调下。

【主治】小儿夜啼。

65251　**神散汤**

【方源】《洞天奥旨》卷十四。

【组成】金银花八两　当归二两

【用法】上以水十碗，煎金银花至二碗，再入当归同煎，一气服之。

【功用】散毒。

【主治】痈疽初起。

65252　**神雁膏**

【方源】《古今医鉴》卷十五引陈小轩方。

【组成】羊粪(烧黑枯，存性)

【用法】上为末，雁油调搽。一二次即愈。

【主治】白秃头疮。

【备考】本方方名，《东医宝鉴·杂病篇》引作“神应膏”。

65253　**神掌膏**

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】巴豆　腻粉各半两　硫黄龙眼大一块子

【用法】上研匀，滴水成膏。用时作饼子，以绵裹数重，贴脐中，以带子勒之。初更用药，至中夜觉身似火热，水从小便下，候四更肿消，去药，然后服调气药补元散。

【主治】十种水气。

65254　**神锋散**

【方源】《仙传外科集验方》

【异名】替针膏。

【组成】饼药　针水　白丁香七粒　硇砂一字

【用法】上用针水调匀，敷贴患处。

【主治】痈疽发背。

【备考】方中饼药、针水用量原缺。

65255　**神御散**

【方源】《百一》卷五引华宫使方。

【组成】御米壳(去顶蒂隔，蜜炙，细锉)四两　款冬花(去枝)　佛耳草　甘草(炙)　人参　陈皮(去白)　阿胶(蛤粉炒)　杏仁(去皮尖双仁，麸炒)各一两

【用法】上为末。每服五钱，水一盏半，加生姜三片，肥乌梅一个(拍碎)，同煎至七分，去滓温服，不拘时候，临卧服尤妙。

【主治】痰盛喘乏，咳嗽不已。

65256　**神犀丸**

《全国中药成药处方集》(武汉方)。为《医效秘传》卷一“神犀丹”之异名。见该条。

65257　**神犀丹**

【方源】《医效秘传》卷一。

【异名】神犀丸(《全国中药成药处方集》武汉方)。

【组成】犀尖六两　生地一斤(熬膏)　香豉八两(熬膏)　连翘十两　黄芩六两　板蓝根九两　银花一斤　金汁十两　元参七两　花粉四两　石菖蒲六两　紫草四两

【用法】上用生地、香豉、金汁捣丸，每丸重三钱。开水送下。

【功用】《北京市中药成方选集》：清热解毒。

【主治】瘟疫，邪热入营，津涸液枯，寒从火化，壮热旬日不解，神昏谵语，斑疹，舌绛干光圆硬。

【备考】《全国中药成药处方集》本方用法：每服三钱，一日二次。小儿酌减。

65258　**神犀饮**

【方源】《感证辑要》卷四。

【组成】犀角尖八分(磨、冲)　鲜石菖蒲根一钱　鲜生地五钱　银花三钱　连翘二钱　丹皮二钱　益元散三钱(荷叶包)　黄郁金一钱　香豉三钱(炒)　金汁一杯(冲)

【用法】地浆水煎服。

【主治】霍乱热毒炽盛，逼乱神明，昏狂烦躁，扬手掷足，甚则循衣撮空。

65259　**神犀散**

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】犀牙(打碎，倾银罐煅红)一两　香木鳖五钱(锉碎，煎汁淬牙一次)

【用法】上独将犀牙为末。每服三分，酒调下。暖睡微汗。

【功用】疏痘祛斑。

【主治】痘如蚕种，黑斑将危。

【宜忌】病三日半可用，迟则不及；稍轻者六七日亦可用。

65260 **神楼散**

【方源】《痘疹会通》卷三。

【组成】白芍 白术 山药 山楂 肉桂 云苓 人参 黄耆 甘草 熟地 鹿茸

【主治】痘疹将靥。

65261 **神感丸**

【方源】《魏氏家藏方》卷一。

【组成】破故纸二两（新瓦上炒香） 地龙（去土） 干木瓜 川乌头各一两（生用） 荆芥穗半两

【用法】上为细末，用好醋煮面糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，盐酒、盐汤任下。如腰脚之疾，食前服；如膈上风痰，食后服，不得食热物。

【主治】腰疼脚气，及左瘫右痪，卒中风痰，外肾冷疼。

65262 **神雷汤**

【方源】《回春》卷四。

【组成】芜荑仁五分 雷丸（白者）五分 鹤虱一钱 木贼 黄芩 防风 茄子各五分 当归（酒洗） 龟版（酒洗） 鳖甲（酒洗） 蝉退 蚕退各三分 小枳实（酒洗）三分、大黄少许 皂角刺二十个（用黄蜡三钱炒）

【用法】上作一服，用水一大钟，加乌梅一个，竹叶七片，无灰酒半钟，煎至八分，空心温服。用干煎精猪肉压之。服至八服，筋根出虫，后去皂角刺、蝉退不用。外用生肌药白龙骨五分、赤石脂五分。二味用鸡腿胵皮包，入猪蹄角内火煅过，去胵角不用，将二味为末，入前汤药内，每帖加二味药一钱，再服四帖除根。

【主治】痔漏。

【宜忌】忌酸辣、鸡鱼、面筋、发毒动风之物。酒亦少用。忌烧酒，节欲色，戒恼怒。

65263 **神照散**

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】木香 白茯苓（去黑皮） 芎藭 人参 独活（去芦头） 蒺藜子（炒，去角） 黄耆（锉）各一两一分 附子（炮裂，去皮脐） 远志（去心）各三分 萆薢 茵芋各一两 栀子仁二两

【用法】上为末。每服一钱匕，加至二钱、三钱匕，空心、日午、夜卧温酒调下。

【主治】中风昏塞，肢体不收，口眼㖞僻。

65264 **神锦散**

【方源】《圣济总录》卷一〇三。

【组成】桑灰一两 黄连半两

【用法】上为末。每用一钱匕，沸汤浸，澄清洗之。

【主治】赤眼，昏涩肿痛。

65265 **神愈散**

【方源】《医统》卷六十二。

【组成】细辛 白芷 防风 羌活 当归 半夏 川芎 桔梗 陈皮 茯苓各等分

【用法】上锉。加薄荷三钱、生姜，水煎服。

【主治】①《医统》：肺热，鼻流浊涕，窒塞不通。②《寿世保元》：鼻不闻香臭。

65266 **神愈膏**

《医方类聚》卷一九三。即《圣济总录》卷一三〇“神应膏”。见该条。

65267 **神解丸**

【方源】《御药院方》卷二。

【组成】朱砂（研） 硇砂（研） 黄蜡各等分

【用法】上熔蜡和成剂，旋为丸，如绿豆大。每服一丸，冷水送下，如人行一二里地，投以热葱醋粥，汗出解。

【主治】内外所伤，骨节疼痛，壮热憎寒，头疼，身体拘急。

65268 **神解汤**

【方源】《古今医鉴》卷十四。

【组成】柴胡一钱半 干葛一钱 川芎八分 白茯苓八分 麻黄（去节）八分 升麻八分 防风八分 甘草五分

【用法】上锉一剂。以水一钟半，先将麻黄滚，去白沫，后煎至八分，热饮。覆被卧，取出汗、腰痛止为度，不止再进一剂。免出肾经之

痘。

【主治】小儿发热，欲出痘，腰痛。

65269　**神解散**

《寿世保元》卷二。为《此事难知》卷上“九味羌活汤”之异名。见该条。

65270　**神解散**

【方源】《寒温条辨》卷四。

【组成】白僵蚕（酒炒）一钱　蝉蜕五个　神曲三钱　金银花二钱　生地二钱　木通　车前子(炒，研)　黄芩(酒炒)　黄连　黄柏(盐水炒)　桔梗各一钱

【用法】水煎，去滓，入冷黄酒半小杯，蜜三匙，和匀，冷服。

【功用】《古今名方》：清热透邪，解毒泻火。

【主治】温病，初觉增寒体重，壮热头痛，四肢无力，遍身痠痛，口苦咽干，胸腹满闷者。

65271　**神塞丸**

【方源】《外科大成》卷三。

【组成】麝香一分　沉香三分　白矾一钱　糯米五十粒

【用法】上为末，糊为丸，如梧桐子大。薄绵裹之，如左耳出血，塞右鼻，右耳出血，塞左鼻；如左鼻出血，塞右耳，右鼻出血，塞左耳；两耳出血，塞两鼻，两鼻出血，塞两耳。

【主治】耳内出血及鼻衄。

65272　**神寝丸**

【方源】《妇人良方》卷十六引施少卿方。

【组成】通明乳香半两(别研)　枳壳一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心时温酒吞下，一日一次。怀孕九个月以后，临入月时方可服。

【功用】瘦胎，滑利易产。

【主治】产难。

65273　**神瑱散**

【方源】《圣济总录》卷一三四。

【组成】赤石脂

【用法】上为散。生油调涂之。

【主治】汤火所伤，热毒疮疖。

【备考】本方方名，《普济方》引作“神须散”。

65274　**神酿丸**

【方源】《解围元薮》卷三。

【组成】苍术八两　草乌三两　杏仁　川芎　白芷　半夏各二两(一方有乳香、没药、麝香、地龙各五钱)

【用法】上锉，用生姜二斤，葱一斤，捣汁拌湿，以药铺入瓶内，封好，埋土中，春三、夏五、秋七、冬九日，取出晒干，加猴姜、木香、牛膝、红花各二两，当归、草薢、茄根各四两，共为末，老酒糊丸，如梧桐子大。每服六十丸，酒送下，一日三次。

【主治】历节痛风，筋骨走痛。

65275　**神橘丸**

【方源】《简明医彀》卷三。

【组成】神曲(炒)　橘皮　苍术各等分

【用法】上为细末，神曲糊丸。每服百丸，姜汤送下。

【主治】中脘宿食留饮，酸蜇心痛，口吐酸水。

65276　**神翳散**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】真蛤粉　谷精草各一两

【用法】上为末，每服二钱，用生猪肝一片(如三指大)，批开糁药在上，卷定，以线缚之，用浓米泔一碗，煮熟为度。取出稍冷，细嚼煮肝，米泔送下。

【主治】目内翳障，及疹疮后余毒不散，目生翳膜，隐涩多泪。

【宜忌】忌炙煿毒物。

【加减】或加石燕、槟榔，磨刺尤妙。如小儿疳眼，加夜明砂等分。

65277　**神髓膏**

【方源】《何氏济生论》卷二。

【组成】无病牛髓(去筋膜)　胡桃八两(捣烂，去皮)

【用法】上捣匀，入川蜜四两，盛瓷器内，重汤煮一炷香为度。每用鸡子大一块，空心时白汤调服。少卧片时，似觉有汗，此药行经络也。

【功用】补中填髓，益气润容，除渴宁嗽。

【主治】劳伤。

【备考】方中牛髓用量原缺。

65278 **神火灵丹**

【方源】《喉科心法》卷下。

【组成】石膏五两（煨，尿浸，愈久愈好） 三仙丹八钱 漂净朱标五钱

【用法】上为细末，收贮听用。麻油调敷。

【功用】拔毒收口。

【主治】各种疮疡溃后，新久烂腿，及烂皮疔等。

65279 **神术煮散**

【方源】《百一》卷七。

【组成】苍术六两 当归 厚朴（姜制）各二两 人参一两 白芍药 川芎 陈皮各半两

【用法】上㕮咀。每服三钱，水一盏半，加生姜五片，大枣二个，煎至八分，去滓，食前热服。

【主治】感寒。

65280 **神术煮散**

【方源】《医方类聚》卷五十六引《修月鲁般经》。

【组成】甘草二两 苍术四两 厚朴四两 石菖蒲二两 藿香半两 陈皮半斤（一方无菖蒲，有香附）

【用法】每服四钱，加生姜、大枣同煎，空心服。

【功用】辟岚气，去湿寒，导滞气，益元阳。

【主治】山岚瘴气。

【加减】感冒，头痛壮热，蒸以葱、豉；痰疟，加半夏；霍乱，加五苓；理气，加木香、槟榔；和血，加当归四物；腿膝痛，加牛膝；下部之疾，加炒茴香；妇人诸气，加枳壳桔梗汤。

65281 **神仙术煎**

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】术（新从山刨出者）不计多少

【用法】上去苗洗净，木臼中熟捣，新布绞取汁，如此三两遍，汁出尽为度，于银器或瓷器中煎令如饧。每旦服一合，温酒调下，随性空吃尤佳，久服。

【功用】轻身益气，祛风寒，不饥渴，百病皆除。

【宜忌】忌桃李雀肉。

65282 **神仙红雪**

《鸡峰》卷四。为《脚气治法总要》卷下“红雪”之异名。见该条。

65283 **神仙金丸**

《普济方》卷二七三引《经验良方》。为《医方类聚》卷一七九引《经验秘方》“仙方万金丸”之异名。见该条。

65284 **神仙眼药**

【方源】《中藏经·附录》卷八。

【组成】秦皮三钱（去粗皮，锉细） 乳香一块（如枣大） 胡黄连三钱 灯心一握（七寸长） 枣子三个 斑蝥一个（去翅头足） 古老钱七文（不锉）

【用法】上为粗末，入无釉器中（砂器尤佳），用井华水一大碗，熬去半碗，用绵绢挤过，再将滓以水半瓷碗，煎取一盏，入挤过汁同煎，汁入新碗中，熬似稠粥样，入小瓷盒中或角盒中盛，将空青并硼砂一块（如两豆大，飞过，熬干。空青不熬）再研，入脑子（多不妨）、麝香少许，四味同入药膏内，搅匀。每点一粟米许在眼眦头，将手揶匀，仰面，候药微涩过，将沸盐汤用软帛片蘸洗。

【主治】眼疾。

65285 **神仙紫雪**

【方源】《斑疹备急》。

【组成】黄金一百两 寒水石 石膏各三斤 犀角（屑） 羚羊角各十两（屑） 玄参一斤 沉香（镑） 木香 丁香各五两 甘草八两 升麻六两（皆㕮咀）

【用法】上以水五斗，煮金至三斗，去金不用，入诸药再煎至一斗，滤去滓，投上好芒消二斤半，微火煎，以柳木篦搅勿停手，候欲凝，入盆中，更下研朱砂、真麝香各三两，急搅匀，候冷，贮于密器中，勿令见风。每服一钱，温水化下；小儿半钱一字；咽喉危急病，捻少许干

咽之。

【功用】①《斑疹备急》:消痘疱麸疹。②《鸡峰》:解一切热毒。

【主治】①《斑疹备急》:大人小儿一切热毒,胃热发斑,痘疱麸疹,伤寒热入于胃发斑,小儿惊痫涎厥,走马急疳,热疳,疳黄,疳瘦,喉痹肿痛,及疮疹毒攻咽喉,水浆不下。②《鸡峰》:脚气毒攻内外,烦热,狂易叫走。

65286　**神圣饼子**

【方源】《宣明论》卷十五。

【组成】乌鱼骨一两(五月五日前先准备下)　莴苣菜一握　青蓟草一握　石灰四两

【用法】上以五月五日,日未出,本人不语,将取三味同杵烂,次后下余药味,杵得所,抟作饼子,晒干。用时旋刮敷之。此药上后无脓,退痂便愈。

【主治】一切打扑金石刀刃伤损,血出不止者。

【备考】《医统》无石灰,有韭菜一握。

65287　**神圣饼子**

【方源】方出《永类钤方》卷十一,名见《普济方》卷四十六。

【组成】玄胡索七枚　青黛二钱　肥牙皂(去皮子)二斤

【用法】上为末,水调,圆成饼子,如杏仁大。令病者仰卧,以水化开,灌入男左女右鼻中,闻见药到喉少酸,令病者坐,却咬定铜钱一个于当门齿上,当见涎出成盆而愈。

【主治】①《永类钤方》:头痛不可忍者。②《奇效良方》:牙痛,赤眼,脑泻,耳鸣。

65288　**神圣热药**

【方源】《御药院方》卷七。

【组成】白花蛇肉　黑乌蛇肉　紫色雄黄各二钱　锦纹大黄半两

【用法】上四味,各生用,为细末。大人每服三四钱,水一盏半,同煎三五沸,食后稍热服,病重者,每日三四服;若十岁以下小儿,每服一钱半至二钱,煎服同上法。

【主治】时疾。

【备考】本方方名,《普济方》引作"裹白散"。

65289　**神圣眼药**

【方源】《儒门事亲》卷十五引郭助教方。

【组成】蕤仁一两　金精石二两　银精石二两　炉甘石四两(烧)　赤石脂一两　滑石二两　密陀僧二两　高良姜三两　秦皮一两　黄丹一两(飞过)　铜绿三钱　硇砂三钱　硼砂一钱半　乳香三钱　盆消少用　青盐　脑子　麝香以上并少用之

【用法】上用东流水三升,先入蕤仁,次下余味等,白沙蜜一斤,熬至二升,以线绢细滤过澄清,入前药搅之。匀点。

【主治】目疾。

65290　**神曲饼子**

【方源】《幼幼新书》卷十引《孔氏家传》。

【异名】丙丁膏(《幼幼新书》卷十引《孔氏家传》)、丙丁散(《卫生总微》卷五)。

【组成】天南星　乌蛇各三钱　天麻　麻黄(去节)各半两　全蝎一分半　白附子三钱半　白僵蚕四钱　大附子一枚(炮裂,去皮脐)

【用法】上为末,水一升,浸三日,布滤去滓,寒食面一斗和匀,踏作片子,用楮叶罨七日,取出,用纸袋吊起,十四日可用。丙日作曲,丁日治药。治小儿吐泻过后,精神困顿多睡,不吃乳食,四肢逆冷,欲变惊,以神曲四两,龙、麝少许,每服量多少,以温水调下;若已变痫,哭声如鸦,而色青黄,手足瘛疭,咽中不利,加朱砂、龙、麝并曲服之;变痫滑利,即以蜜丸曲末鸡头大,温水化下。

【主治】吐泻过后,精神困顿多睡,不吃乳食,四肢逆冷,欲变惊,或已变痫,哭声如鸦,面色青黄,手足瘛疭,咽中不利,或变痫滑利。

65291　**神应围药**

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】雄小活鲫鱼七个　鲜山药四两　大葱头(连须)二十一个(共捣烂)　千年陈石灰半斤　生南星　生半夏　白及　赤芍(细

末)各一两

【用法】上和匀阴干，再研为细末。临用之时，蜜水调敷四围，外用绵纸掩之。

【主治】气血不和，壅遏为疮，高肿赤痛，及痰郁寒湿为疮者。

65292 **神应妙方**

【方源】《集验良方》卷二引朱渊停方。

【组成】鲜鲫鱼一尾　阳春砂仁一两　洋糖一撮

【用法】上同捣烂如泥，去骨，入蚌壳内。合于脐眼上，用布一幅捆好。一周时脐中有黄水流出，其病松快即愈。病深者未能全消，照前法再敷，以愈为度。

【主治】黄疸病。

65293 **神应参丹**

【方源】《医方类聚》卷一四九引《简易方》。

【组成】炼朱砂末八两　灵砂末　代赭石末各二两

【用法】上为极细末，用糯米末一两、人参末半两拌停，用热白汤和作饼二个，于汤内煮，令浮熟，取出，斟酌搜和，令稀稠得所，丸如小麻子大，顿在桑柴炭灰盘内，候三日，去灰，用新麻布袋打令光色。每服五粒，人参、北枣汤送下。病势重者，可服二十粒。

【主治】心肾亏盈，神气欲脱，咳嗽痰喘，咯血气急，寒热往来，形容瘦弱，风痰潮厥，肠滑泄利及一切虚证。

【备考】炼朱砂法：辰广二州朱砂，块颗如黑豆大者八两，分为三处，人参三十两亦分为三处，却用银锅或年深古铁锅，注溪水或湖水令满，安顿蒸笼于上，笼内用细密竹筛为礶，先将人参在内，次入朱砂三重间之，然后用炭一百五十斤，分为三处，每一昼夜，用炭五十斤，水五桶，水干渐添，至天明，取人参、朱砂出，拣其朱砂，每粒用木槌击为二三片，再用人参十两，仍旧如前安顿蒸，自午至天明，如是三日，满足取出，用水澄洗朱砂令净。却用硫黄一两、草茶一两，各为细末，先用硫黄末顿在熟铁铫内，麸炭火慢慢熔成汁，次以蒸了朱砂搾在汁内，炒停，候硫黄为烟，却用草茶末分三次掺在朱砂上，炒令停，存硫黄性为度，去茶焦末，净拣朱砂作末。其所择烂人参，日中晒干，雨则火焙，别为细末，枣汤调下，大治一切渴疾及伤寒过经无汗。炼代赭石法：丁头代赭石末三两，先用硫黄二钱为末，米醋调涂赭石上，次用盐泥固济，炭火三斤，煅硫黄化为烟，却去泥，取出赭石，再用米醋浸一时，久用火煅，醋淬，凡三次，别研为末。

65294 **神应黑散**

【方源】方出《证类本草》卷五引《杜壬方》，名见《产育宝庆集》卷上。

【异名】乌金散(《产育宝庆集》卷上)、神应散(《产宝诸方》引《济世方》)、黑散(《产宝诸方》)、催生药(《洪氏集验方》卷五)、催生如神散、催生黑散、二神散(《妇人良方》卷十七)、神应黑神散、神效散、白芷散(《普济方》卷三五六)、催生黑于散(《丹溪心法附余》卷二十一)、催生如圣散(《准绳·女科》卷四)、黑神散(《济阴纲目》卷十)神应丹(《温氏经验良方》)。

【组成】百草霜　白芷各等分

【用法】上为末。每服二钱，童子小便、醋各少许调匀，更以热汤化开服。不过二服即愈。

【功用】①《产宝诸方》：催生顺道。②《妇人良方》：固血。

【主治】逆生，横生，瘦胎，妊娠、产前、产后虚损，月候不调，崩中。

65295 **神应膏药**

【方源】《普济方》卷一五四。

【组成】川乌　马蔺子　官桂　干姜　杜仲　木鳖子(去壳丝油，另研)五钱　没药五钱(另研)　乳香三钱(另研)　破故纸(炒)五钱

【用法】上为细末。醋糊调药末，敷贴腰上，纸盖，绵帛栓住，日换三二次。

【主治】腰痛。

65296 **神兑金丸**

【方源】《青囊秘传》引《临证指南》。

【组成】黄丸：白丑二两　大黄二两　雄黄三钱　黄连三钱　神曲五钱　胆星五钱

青丸：青黛一两　神曲五钱　熟石膏一两　滑石一两　胡黄连三钱　黑丑二两　大虾蟆一只(泥包煨存性，研细末)

【用法】以上丸药，分黄、青两种，俱用生研，将虾蟆炭各半分匀和入，水泛为丸，如米粞之大小。每岁各一丸，匀服，早晚各进一次。

【主治】小儿百病。

65297　**神妙痧药**

【方源】《串雅外编》卷三。

【组成】北细辛三两　荆芥六钱　降香末三钱　郁金一钱

【用法】上为末。每用一茶匙，放舌上，冷茶送下或津咽下。

【主治】痧证。

65298　**神明白散**

《圣济总录》卷二十二。为《肘后方》卷二"老君神明白散"之异名。见该条。

65299　**神明白膏**

【方源】《肘后方》卷八。

【组成】当归　细辛各三两　吴茱萸　芎䓖　蜀椒　术　前胡　白芷各一两　附子三十枚

【用法】上切，煎猪脂十斤，炭火煎一沸即下，三上三下，白芷黄膏成，去滓，密贮。看病在内，酒服如弹丸一枚，一日三次；在外，皆摩敷之；目病，如黍米大，纳两眦中，以目向风，无风可扇之；疮、虫齿，亦得敷之。

【主治】中风恶气，头面诸病，青盲，风目，烂眦，鼻塞，耳聋，寒齿痛，痈肿疽痔，金疮癣疥，缓风冷者。

65300　**神明白膏**

【方源】《千金》卷七。

【异名】白膏(《普济方》卷三一五)。

【组成】吴茱萸　蜀椒　芎䓖　白术　白芷　前胡各一升　附子三十枚　桂心　当归　细辛各二两

【用法】上㕮咀，醇苦酒于铜器中淹浸诸药一宿，以成煎猪膏十斤，炭火上煎三沸，三上三下，白芷色黄为候。病在腹内，温酒服如弹丸一枚，一日三次；目痛，取如黍米纳两眦中，以目向风，无风可以扇扇之；诸疮、痔、龋齿、耳鼻百病，皆以膏敷；病在皮肤，炙手摩病上，一日三次。

【功用】《普济方》：清头风。

【主治】中风恶气，头面诸病，青盲，风目，烂眦，管翳，耳聋，鼻塞，龋齿，齿根挺痛，及痈、痔、疮、癣、疥等。

65301　**神明青膏**

【方源】《千金》卷七。

【组成】蜀椒五合　皂荚　黄芩　石南　黄连　雄黄　桂心　藜芦各三铢　白术　芎䓖　大黄各七铢　乌头　莽草　续断各五铢　泽泻七铢　半夏　当归各十二铢　干地黄十一铢　萎蕤　细辛各十铢　附子　桔梗各二铢　干姜六铢　人参五铢　戎盐杏子大一枚

【用法】上㕮咀，以苦酒一斗渍之。羊髓一斤，为东南三隅灶，纳诸药，炊以苇薪。作三聚新好土，药沸即下，置土聚上，三沸三下讫，药成，以新布绞去滓。病在外，火炙摩之；在内，温酒服如枣核，一日三次，稍稍益，以知为度；鼻中干，灌之并摩服。

【主治】鼻中干。

65302　**神健饮子**

【方源】《女科百问》卷上。

【组成】赤芍　白术各二两　赤茯　当归　肉桂　鳖甲　川芎　枳壳　柴胡　黄耆　秦艽　桔梗　橘红　甘草各一两　木香

【用法】上㕮咀。每服三钱，水二盏，加生姜五片，大枣一枚，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

【主治】妇人荣卫失调之寒热。

【备考】方中木香用量原缺。

65303　**神效乌膏**

【方源】《圣惠》卷六十三。

【组成】清油一升　黄耆一两(锉)　木通一两(锉)　杏仁一两(汤浸，去皮尖双仁，研)

皂荚一挺（不蛀者，去皮子，生锉）　乱发如鸡子大

【用法】上药先以油浸一宿，明旦以文火煎，待药滓微烧黑，绵滤去滓，都入铛更煎，入蜡月炼成猪脂五两、黄丹七两（炒令紫色），入前油中煎，以柳木篦不住手搅，待黄丹消尽，油面清，次下炼成松脂一两、舶上柴鉎末一两，入毕，不停手搅，时时滴少许漆器上试，看凝不粘手，去火，下麝香一分（细研），搅令匀，倾入瓷盒中收之。一切疮肿，故帛上贴之；未作头者，贴之当消；如已成头，当自穴矣；疮肿焮痛及金疮折伤，火炙乘热贴之，即定；肠痈，作丸如梧桐子大，每服十丸，空腹以温酒送下。

【主治】一切疮肿，金疮折伤，肠痈。

65304　**神效白膏**

【方源】《圣惠》卷六十八。

【异名】神效当归膏（《局方》卷八吴直阁增诸家名方）、当归膏（《医统》卷七十九）。

【组成】白蜡一两　麻油四两　当归一两（半）（生锉）

【用法】上药先将油煎当归令焦黑，滤去滓，次入蜡候消，相次急搅之，放冷入瓷盒中收。每使时，以故帛子涂贴。

【功用】《局方》：敛疮口，生肌肉，拔热毒，止疼痛。

【主治】①《圣惠》：汤泼火烧疮，疼痛甚者。②《局方》：汤火伤，初起瘭浆，热毒侵展，焮赤疼痛，毒气壅盛，腐化成脓。

【备考】本方方名，《普济方》引作"白膏"。方中白蜡，《局方》作"黄蜡"。

65305　**神效灰煎**

【方源】《外台》卷二十九引《广济方》。

【组成】炭灰三升

【用法】汤拌令湿彻，以热汤溃，令半日后，还以汤淋之（稍稍点汤，不得太速下，即灰汁不验），候汁下得三二升，即纳一小铛中煎，令一两沸，即别取一两石灰（风化者为佳，恐中湿者，须熬令极热）纳灰汁中和煎，以杖箅搅之勿住手，候如煎饼面，少许细细取成膏，急泻著一瓷器中，搅令冷，不然，须臾干燥不堪用。常候此煎十分有一分堪久停。但有伤损，肉色须臾变赤黑色，痛如火烧状，若灸瘢发焮，经二十余日，病自然脱落，无瘢痕。

【主治】疣赘，赤黑疵痣靥，秽疮疽，息肉结瘤。

【宜忌】疮未愈间，忌小豆、姜，纵有瘢，亦不凸出。

65306　**神效伤膏**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】片松香（葱叶汁煮）二两　乳香、没药　儿茶　血竭　阿魏　洋樟（冲入）　龙骨　轻粉（收入）各一两五钱　黄白占各一两五钱　降香三两

【用法】上为末，将猪板油一斤，熬去滓，入黄、白占烊化，再入余药，搅匀，候凝。摊贴。

【主治】跌打损伤，瘀血停滞，作痛难忍者。

65307　**神效灸饼**

【方源】《杂病广要》引《疠疡全书》。

【组成】广木香一钱五分　白芷一钱　麝香一分（共末）　蓖麻子四两（去壳）

【用法】上捣为一饼。放患处，用新布五层盖饼上，将纸卷大筒，蘸麻油火，于布上掼之，觉痛即止。

【主治】鹤膝风及湿气痛风。

65308　**神效疔膏**

《刺疔捷诀》。为《华氏医方汇编》卷二"消疔丸"之异名。见该条。

65309　**神效奇方**

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】蒲黄一钱（炒）　皂荚一钱（炒黑）　黄连三分（炒）　槐角一钱（炒黑）　棕灰五分　槐花二钱（炒黑）

【用法】柏叶捣汁，和药煎服。

【主治】肠风下血。

65310　**神效奇方**

《千金珍秘方选》。为原书"化毒膏"之异名。见该条。

65311 神效疟丹

《普济方》卷二〇〇。即《三因》卷六“经效疟丹”。见该条。

65312 神效药茶

【方源】《卫生鸿宝》卷一。

【组成】建曲 楂炭 滑石 麦芽各四两 杏仁 陈皮各二两半 葛根 青皮 乌药 薄荷 防风 香薷 藿香 淡芩 木通 苏梗 羌活 白扁豆 泽泻 苍术 白芷 苍耳 大黄 钩藤 半夏(制) 枳壳 蔓荆子 槟榔 荆芥 甘草 独活各二两 川芎 升麻 柴胡 木瓜 大青叶各一两半 草果仁 麻黄(去节) 细辛 厚朴 苏木各一两 鲜姜六两

【用法】上药炭火煎浓,用雨前茶叶十五斤,将药汁拌收,烈日中晒五六日,干透,贮瓷瓶内。每服三钱,阴阳水煎服。小儿及虚弱减半。

【主治】外感风寒暑湿,身热头痛,时疫疟痢,霍乱吐泻,伤食饱胀,心口急痛。

【宜忌】孕妇忌服。

65313 神效饼子

【方源】《朱氏集验方》卷十二。

【组成】山慈姑 五倍子 草乌(烧存性) 木鳖子(焙干)各半两 駹丹二钱

【用法】上为细末。先用鸡子作饼,热敷疮上,候冷取出,敷药其上。数日间,疮干连皮脱去。疮干,即用麻油调敷。

【主治】一切毒疮。

65314 神效乾丹

【方源】《纲目拾遗》卷二引《演揲儿集》。

【组成】天雄三钱(去皮尖) 雄精三钱 鸦片三钱 蟾酥三钱 母丁香(大者)四粒 人参三钱 樟脑(瓦上升净霜)三钱 乳香 没药(去油)各五分 倭硫黄三钱

【用法】上为细末,用绢罗裹外。麝香二钱,研极细,另包。将白及(不拘多少,以敷用为度)放碗内,用滚水泡开,将白及装入绢袋内,拧汁去滓。再用苏合油三钱同白及汁和药调匀,将麝香末洒上,做成锭,放瓷盒内阴干,或将口封固,略晒。俟干研擦。

【功用】坚阳益肾种子,强筋力,和血脉。

65315 神效眼药

【方源】《疡医大全》卷十一。

【组成】蕤仁(上白者佳,去净油)二钱 冰片一分 硼砂三钱 真牛黄 麝香各五厘

【用法】上为极细末。骨簪蘸点。

【主治】内障。

65316 神效截药

【方源】《普济方》卷三九〇。

【组成】川常山(末) 飞罗面各等分

【用法】上和匀,用好酒调,九蒸九晒,捣丸如绿豆大。每取二三十丸,临发日,五更桃、柳汤下。

【主治】小儿疟疾。

65317 神效癣药

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】斑蝥五钱 百部二两 槟榔 土荆皮 枫子肉 白及 川椒各一两

【用法】烧酒浸透,每日用鹅毛搽敷七八次即愈,擦之亦可。

【主治】阴阳顽癣,无论远年近日诸般癣疮。

65318 神效癣药

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】硫黄 樟脑 陀僧

【用法】上为细末。麻油调和,布包擦之。每日吃生长生果一百,二十日痊愈。

【主治】蛇皮风癣。

65319 神验白散

【方源】《圣惠》卷九。

【组成】白附子半两 附子半两(去皮脐) 半夏一分 干姜一分 天南星一分 皂荚子仁一分(皆生用)

【用法】上为细散。每服一钱,入生姜半分,以水一中盏,煎至六分,不计时候,和滓热服。当有汗出便愈。

【功用】发汗。

【主治】伤寒。

65320 **神验点方**

【方源】《医部全录》卷三七五。

【组成】桑柴灰 枣树灰 黄荆灰 桐壳灰各二升半

【用法】上以沸汤淋汁五碗许，澄清，入斑蝥四十个，穿山甲五片，乳香、脑子不拘多少，约五碗，煎作二碗，用瓷器盛之，乳香、脑子候冷方入。临用时入新石灰调成膏，敷瘤上，干，以清水润之。

【主治】瘤赘。

65321 **神验椒丹**

【方源】《医便》卷一引许真人方。

【组成】真正川椒二斤半（拣去枝目，切勿用闭口者）

【用法】上用釜一只，覆子地上，四围用刀画记，去釜，用炭火烧红其地，用米醋泼地，将纸摊椒在上，以釜盖之，良久取出，为末，用炼蜜一斤四两为丸，如梧桐子大。每服十五丸，空心酒送下，半年加至二十丸，一年后加至二十五丸止。

【功效】暖下元。

【主治】五劳七伤，诸虚百损，并诸虫积。

【宜忌】忌五辛、葱、蒜。

65322 **神人阿魏散**

【方源】《医学纲目》卷五引《济生》。

【异名】阿魏散（《永乐大典》卷八〇二一引《普济经验加减方》）。

【组成】阿魏三钱 青蒿一握（研） 东北方桃枝一握（细切） 甘草如病人中指许大（细锉）

【用法】上以童便二升许，隔夜浸药，明旦煎取一大升，分为三服，每次调入槟榔末三钱，空心温服，如人行十里，更进一服。服至一二剂即吐出虫子，或泻出，更不须服余药；若未吐利，即当尽服，病在上则吐，病在下则利，皆出虫如马尾、人发即愈。服药后觉五脏虚弱，魂魄不安，即以白茯苓汤补之。

【主治】骨蒸传尸等寒热羸劳，困倦喘嗽。

【宜忌】服药后忌油腻、湿面、生冷硬物。

65323 **神人解毒汤**

【方源】《痘疹会通》卷三。

【组成】当归 生地 川芎 丹皮 红花 赤芍 桔梗 连翘 木通 甘草

【用法】加竹叶二十片，灯心三十根，水煎，热服。

【主治】痘疹见点三日，身热腮红，皮焦毛燥，点粘红燥，渴欲饮水，睡卧不宁，小便赤涩。

65324 **神子荆芥散**

【方源】《普济方》卷八十五引《海上方》。

【组成】黄芩 栀子 羌活 细辛 车前子 升麻各三钱 防风 荆芥 桑皮各二钱半 知母 连翘各二钱 川芎一钱半 甘菊花二钱 旋覆花一钱 甘草半两 柴胡三钱半 赤芍药四钱

【用法】上锉散，分为五股。水煎服。

【主治】诸色眼疾。

【加减】眼血多，去羌活，加独活三钱、生地黄二钱半、当归（去须）二钱半；火烧痛者，乃热多，加大黄二钱（锉），一服后微利去热；眼青睛上生点者，加白蒺藜（炒香，用砖二片，磨去刺），木贼（去节）一两（去节）针刺痛者，乃是气眼，加枳壳二钱、紫苏子三钱半；眼角痛者，加白芷二钱、石膏末三钱，同前药煎服。

65325 **神化利机丸**

【方源】《普济方》卷一九三引《海岱居士秘方》。

【组成】泽泻一两二分半 椒目一两半 昆布 海金沙三两 木香半两 茴香五分（炒） 滑石一两 苦葶苈一斤（酒浸一宿，焙干）

【用法】上为末，用水一盏煎黄柏末成膏为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温酒送下。服药得利则减。

【功用】利小便，调荣卫，利胃气。

【主治】阴阳不分，热结于中，胃气不能运，湿气乘虚而入于奇经八脉，以致腹胀水气，遍

身作肿，旦食不能暮食，食则胀满，小便赤涩，大便结硬，淋涩癃闭等。

【备考】方中昆布用量原缺。

65326　神方夺命丹

【方源】《普济方》卷二七五。

【组成】透明雄黄一两　肥巴豆一百二十粒（不去油心）　金鼎砒一两半　黄蜡四两（熔开）

【用法】上药各为极细末，入蜡中搅匀，取出火，重汤泡匀为丸，如小麻子大。量老幼加减服之。每服五十丸，多至二百丸，临睡温熟水送下。不动，其丸经过脏腑，只下清黄黑水则病去；如药未下，再服则药病俱下矣。

【主治】疔肿，痈疽，发背，诸恶疮，及食牛马肉发黄者。

【备考】煅金鼎砒法：将透明砒四两，敲作米粒块，用黑铅一斤熔化，水中扑作珠子；先铺珠一层，次铺砒一层，层层相间，入角罐中，铅珠盖面，黄泥饼子又盖面上，其饼用箸杵十数窍，饼四缘略用泥固定，罐口须空一二寸；水鼎颠倒覆口，铁线扎定，须做把手提挈，略固口缝，安平地上，城砖围煅，下开四窍通风，一层熟火，一层生炭，层层相铺，平药处即止；又发火自上面下煅之通红，或提出或寒炉取出，其铅熔坠在下，其砒将在上，可得四两半。

65327　神方验胎散

【方源】《医学纲目》卷三十五引王海藏方。

【异名】验胎散（《女科指掌》卷二）。

【组成】真雀脑芎一两　当归（全用）七钱

【用法】上为细末，分作二服。浓煎好艾汤一盏调下，或好酒调服亦得。待二三个时辰间，觉腹脐微动，仍烦，即有胎也，动罢即愈，安稳无虞；如不是胎，即不动，所滞恶物自行，母亦安也；如服药不觉效，再煎红花汤调下。

【主治】妇人三二个月月经不行，疑是两身，却疑血滞，心烦，寒热恍惚。

65328　神方脚气丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】橘皮四两（去白）　干生姜二两

【用法】上以蜜半斤，炼化，去上沫，下药在内熬成膏，可丸即丸，如梧桐子大。每服三十丸，姜汤送下，不拘时候。

【主治】脚气。

65329　神水万应膏

【方源】《急救应验良方》。

【组成】麝香三分　冰片五分　明雄黄三钱　乳香二钱　没药二钱　血竭二钱　豆砂（即好朱砂）一钱　生大黄三钱　陈石灰三钱（愈陈愈妙，不陈恐贴时作痛）

【用法】上为细末，先用黄明胶八两，盛入钵内，隔水燉化，将末药和入调匀，用新笔蘸药摊于矾纸上，候干收贮。视伤痕之大小长短，将膏药剪用，用时以热水微浸使软，贴之。贴后不必更换，俟伤愈膏药自落，毫无疤痕。

【主治】①《急救应验良方》：刀伤，殴伤。②《千金珍秘方选》：伤痕及远年疮疖。

65330　神功一圣膏

【方源】《青囊秘传》。

【组成】硇砂　蓖麻子（去壳）各等分

【用法】水调，外敷。

【功用】发散。

【主治】诸毒。

65331　神功七宝丹

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】腽肭脐三两　黑附子（炒）三两　阳起石（火烧通赤，研）二两　钟乳粉二两　鹿茸（去毛，涂酥炙）三两　龙骨二两　沉香一两　麝香半两

【用法】上为细末，再入麝香研匀，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心温酒送下。

【功用】补益真元，固精实髓，通畅百脉，悦泽颜色，久服延年益寿，强力壮神。

65332　神功八味丸

【方源】《朱氏集验方》卷十引梁国佐方。

【组成】苏子降气汤　八味丸

【用法】以苏子降气汤下八味丸。

【主治】中年妇人气冲心，小腹痛，饮食不

纳，脉沉紧，左尺虚，遍药不效者。

65333 神功内托散

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】当归二钱 白术 黄耆 人参各一钱五分 白芍 茯苓 陈皮 附子各一钱 木香 甘草（炙）各五分 川芎一钱 山甲（炒）八分

【用法】上加煨姜三片，大枣二个，以水二茶钟，煎至八分，食远服。

【主治】痈疽、脑项诸发等疮，至十四日后，当腐溃流浓时不作腐溃，且疮不高肿，脉细身凉者。

65334 神功内托散

【方源】《玉案》卷六。

【组成】人参 白术各二钱 白芍 当归 附子 陈皮 穿山甲 木香各一钱二分 川芎 枳壳 皂角刺 黄耆各一钱

【用法】上加生姜三片，水煎八分，食前服。

【主治】悬痈，日久不溃，高硬肿痛不可当者。

65335 神功托里散

《外科发挥》卷二。为《局方》卷八（宝庆新增方）"神效托里散"之异名。见该条。

65336 神功至宝丹

【方源】《纲目拾遗》卷九引王秋泉方。

【组成】苦参一斤（为末） 鹅毛（香油炒存性）六两

【用法】上用黄米糊为丸，朱砂为衣。随病上下，茶汤送下，一日二次。

【主治】溜脓肥疮，脓窠疮，痢痢头，遍身风癞瘾疹疥癣，瘙痒异常，麻木不仁，诸风手足瘦痛，皮肤破烂，阴囊痒极，并妇人阴痒湿痒。

【宜忌】戒暴怒、房劳、炙煿、发毒之物。

65337 神功异宝丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】附子一只（大者，生，去皮脐） 赤小豆（生） 雄乌豆（生） 川独活 青盐（别研） 川楝子（取肉，炒） 破故纸（酒浸一宿，炒）各一两 川萆薢 黑牵牛（生用）各半两 牛膝七分半（酒浸一宿） 川乌头二钱半（生，去皮） 草乌头二分半（生，去皮） 地龙十四条（如前者，去土） 舶上茴香七钱半（去土，炒） 蟑螂十四条（头尾全者，去土，切下顶盖，去子并瓤，瓦上焙） 蜈蚣（赤足者，葱袋叶裹，醋炙）二条 熟艾二两 大木瓜二只

【用法】将青盐、熟艾拌入在木瓜内，用顶盖定蒸十数次，烂为度，研成膏，再入少许无灰酒煮面和为丸，如梧桐子大。每服十五丸，十日后加五丸，至三十丸止，空心温酒或熟水送下。

【主治】年深日近干湿诸般脚气。

65338 神功助化丸

《中国医学大辞典》。即《医学纲目》卷二十五引罗知悌方"神功助化散"改为丸剂。见该条。

65339 神功助化散

【方源】《医学纲目》卷二十五引罗知悌方。

【异名】太无神功散（《医医偶录》卷二）。

【组成】地萹蓄五钱 瞿麦穗五分 大麦蘖五钱 神曲二钱半 沉香一钱半 木香一钱半 甘草五分 大黄二两

【用法】上为细末，依分两和匀。男以甘草、淡竹叶二味等分煎汤，妇人用红花、灯心、当归等分煎汤，黄昏时无灰酒同调服，且酒多子汤。大小便见恶物为度。

【主治】腹中痞块，不拘气血食积所成。

【宜忌】忌油腻、动气之物，及房事一月。

【备考】本方方名，《医灯续焰》引作"太无神功助化散"。改为丸剂，名"神功助化丸"（见《中国医学大辞典》）。

65340 神功沃雪汤

【方源】《梅氏验方新编》卷七。

【组成】当归最重者八两，轻者二两 白芷重者四两，轻者一两 夏枯草重者二两 姜蚕重者一两，轻者二钱五分

【用法】上与水、酒各半煎服。颈以上加川芎，膝以下加牛膝，余者不加。

【主治】一切无名肿毒。

65341 **神功妙贴散**

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】大南星(圆白者)　蓖麻子仁各四钱　五倍子(淡红者)　白芷(削片)　姜黄　半夏(生)　贝母　白及各二钱　没药　乳香各三钱　花蕊石散二帖

【用法】上为细末，以井水入蜜调。疮色黯晦者，先用姜汁从晕边抹收入里，留中间如钱大贴膏药；若疮开大，可用纱布摊药，将旧茶笼内白竹叶尾剪两片如疮势(久年篷仰上竹叶亦得)，先贴药上，然后贴疮，竹叶出水，藉药以行之。凡敷药须是细末则不痛。

【功用】收晕敛毒，使脓血化为水出。

【主治】痈疽。

65342 **神功活命汤**

《疮疡经验全书》卷四。为《女科万金方》“神仙活命饮”之异名。见该条。

65343 **神功黄耆汤**

《中国医学大辞典》。即《兰室秘藏》卷上“神效黄耆汤”。见该条。

65344 **神功麻仁丸**

《普济方》卷二八三。为《脚气治法总要》卷下“神功丸”之异名。见该条。

65345 **神功紫霞丹**

【方源】《疡医大全》卷七引太医院方。

【组成】大蜈蚣一条(去头足，放瓦上焙脆)　麝香二分

【用法】上为细末，瓷瓶收贮。每用少许，掺疮顶上，以膏盖之。其头即溃，并不疼痛。

【主治】痈疽。

65346 **神功辟邪散**

【方源】《时疫白喉捷要》。

【组成】粉葛二钱　生地四钱　木通二钱　连翘二钱　僵蚕三钱　浙贝三钱　黄芩二钱　牛子二钱　麦冬三钱(去心)　银花二钱　蝉蜕一钱　马勃二钱(绢包煎)

【用法】生青果三个为引。

【主治】白喉重者。

65347 **神术平胃散**

【方源】《症因脉治》卷一。

【组成】苍术　防风　甘草　石膏　知母　厚朴　广皮

【主治】外感胃脘痛属热者。心下忽绞痛，手足虽冷，头额多汗，身虽恶寒，口燥舌干，大便虽泻，溺色黄赤，脉浮数者。

65348 **神术泻肺汤**

【方源】《症因脉治》卷二。

【组成】苍术　石膏　桑皮　地骨皮　桔梗　甘草

【主治】湿热壅肺，气促咳嗽，脉沉数。

65349 **神术散气散**

《医学正传》卷二。即原书同卷引罗太无方“神术散”去菖蒲，加香附一钱。见该条。

65350 **神仙一块气**

【方源】《普济方》卷一八二。

【组成】川大黄(生)四两　白牵牛(生)三钱　黑牵牛(生)三钱　巴豆(去皮)五钱

【用法】上为细末，面糊为丸。每服一丸，空心姜汤或白汤送下。

【主治】气血流滞，下元虚寒，尿不通，四肢肿满，或疝气攻冲，四肢腹肋刺痛。

65351 **神仙一块气**

《回春》卷三。为《扶寿精方》“一块气”之异名。见该条。

65352 **神仙一块气**

【方源】《良朋汇集》卷一。

【组成】巴豆　莪术　杏仁　川椒　胡椒　官桂　青皮　陈皮　大茴香　干姜　良姜　川芎　牵牛各等分

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大。每服一丸，用红枣一枚(去核)，将药入内包裹，临卧时嚼烂服之，不用引送。

【主治】五积六聚，滞食滞水，心胸胀满，倒饱嘈杂，呕吐酸水，气闷不通，胃脘疼痛。

65353 **神仙一块痛**

【方源】《幼科指掌》卷三。

【组成】三棱　蓬术(醋炒)　青皮　陈皮　香附(四制)　木香　砂仁　姜黄　川乌　丁

香 黑牵牛 巴霜（面炒，即去面）各等分（一方有大黄）

【用法】上为末，米糊为丸，如绿豆大。每服三五七丸，酒送下。

【主治】小儿气、食、风寒、积块胸腹痛者。

65354 神仙一把抓

【方源】《疡医大全》卷三十七。

【组成】黄丹一两 潮脑五钱

【用法】上为末。以蜜调匀，涂患处。立刻止痛，好后无痕。

【主治】汤、火烧伤并杖疮。

65355 神仙一点散

【方源】《普济方》卷八十六引《海上方》。

【组成】清白碱不拘多少（以七数为则，去边头不用）

【用法】上取纯干净者，以好厚纸七层包了，拴缚挂在当风处，待风化，四十九日取下，要干研细。用时取半粒绿豆大点眼。

【主治】一切眼疾，诸药不效者。

65356 神仙一黄散

【方源】《冯氏锦囊·杂症》。

【组成】硫黄 黄丹（炒） 川白芷各等分

【用法】上为细末。用少许吹鼻中。十余次即止。

【功用】温补其精血。

【主治】小儿脑冷，鼻孔中出浆水，日久不愈，气息甚恶者。

65357 神仙一袋烟

【方源】《外科十三方考》。

【组成】猩红一钱 百草霜四钱 铅粉一钱

【用法】上为末，混入丝烟内，或卷入卷烟中。如吸烟法吸之。口流涎水而愈。

【主治】杨梅结毒。

65358 神仙七星散

【方源】《良朋汇集》卷二

【组成】地肤子 嫩松枝 巨胜子 黄精 嫩柏叶 蔓荆子 桃胶各等分

【用法】上药九蒸九晒，为末。每服二钱，空心白滚水送下。

【功用】补益。

65359 神仙七精散

【方源】《圣惠》卷九十四。

【异名】七精散（《圣济总录》卷一九八）。

【组成】地黄花（土之精）八两 白茯苓（天之精）八两 车前子（雷之精）五两 竹实（太阳之精）一两三分 桑寄生（木之精）五两 甘菊花（月之精）五两 地肤子（星之精）八两

【用法】上为细散。每服三钱，每旦以井华水调下，阳日一服，阴日二服。

【功用】《圣济总录》：除百病，明耳目，延年却老。

【备考】方中竹实用量原缺，据《圣济总录》补。

65360 神仙八味丸

《圣济总录》卷一八五。为《圣济总录》卷五十二“威灵仙丸”之异名。见该条。

65361 神仙九气汤

《得效》卷三。为《百一》卷四“不老汤”之异名。见该条。

65362 神仙九气汤

【方源】《增补内经拾遗方论》卷三引《保生备录》。

【组成】姜黄 香附（炒）

【用法】上为细末。每服五六钱，空心淡盐汤调服；或以温酒调服。

【主治】肤胀。

65363 神仙刀箭药

【方源】《奇效良方》卷五十六。

【组成】桑叶（阴干）

【用法】上为末。干贴。或用鲜者，熨干为末，敷之。

【主治】金疮。

65364 神仙三黄丸

【方源】《圣济总录》卷一八五。

【组成】生地黄三十斤（木臼捣取自然汁） 生干地黄（焙） 熟地黄（焙）各一斤（为末） 鹿角胶（炙燥，为末） 大麻仁（研） 干漆（捣

末，点醋炒，烟尽为度)各四两　甘草(炙，锉)　杏仁(去皮尖双仁，研)　蜜各半斤

【用法】上为末，先将无灰酒一斗、生地黄汁及蜜于银器内用慢火煎，以柳枝搅，将欲成膏，便入诸药同熬，候可丸即丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至五十丸，空心、食前面东温酒送下。

【功用】平补换骨，延年驻颜。

65365　神仙万亿丸

《古今医鉴》卷十六。为原书同卷引张三峰方"神效仙方万亿丸"之异名。见该条。

65366　神仙万应膏

【方源】《普济方》卷三一四。

【组成】穿山甲三钱　当归　大黄各半两　黄芩　黄皮　玄参各三钱　川芎半两　木鳖子　知母　贝母　白薇　白蔹　羌活　独活　降真　苏木　柴胡　芒硝　赤芍药　苦杖　防风　桔梗　蜀葵花　瓜蒌　椿皮　槐枝　柳枝　竹枝　野紫苏叶　天南星　续断　荆芥　黄耆　苦参　草乌　商陆　甘草各三钱　官桂半两　薄荷　车前草　桃仁　杏仁　槐花　苍耳　芒消　地榆　刘寄奴　葛根　通草　泽兰　桑桂　黄栀子各三钱

【用法】上锉，用好香油二斤或三斤，除薄荷、车前草外，诸药俱入油中，煎至焦黄色，临熟下薄荷、车前草，熬一二沸，滤去滓；以油入铫内煎，候油七分热下黄丹一斤，用槐枝条不住手搅成膏，于水内滴试，以不散为度；然后入乳香、没药各一两搅匀，倾入钵，候凝定，却入水中出火毒旬日。

【主治】一切疮肿伤折。

65367　神仙万灵散

【方源】《普济方》卷二八九。

【组成】银花一两半　皂角针　穿山甲　白芷　天花粉　甘草节　当归尾　防风　藿香　赤芍药各半两　乳香(别研)　没药各三钱(另研)

【用法】上㕮咀。每服一两，与水一盏、无灰好酒一盏同入于砂石器内，瓷碟盖口，纸条糊缝，文武火煎至重车行十里远，药香为度。热服。药后饮好酒数杯，厚衣被，汗出为效。滓再煎服。病重者，不过三服。

【主治】发背疔疮，一切恶疮。

【加减】久病气衰者，加黄耆半两。

65368　神仙万金丸

《百一》卷十二。为《三因》卷十四"禹余粮丸"之异名。见该条。

65369　神仙小圣丹

《济阳纲目》卷六十四。为《回春》卷四"神仙小圣药"之异名。见该条。

65370　神仙小圣药

【方源】《回春》卷四。

【异名】神仙小圣丹(《济阳纲目》卷六十四)。

【组成】红铅半盏(真女首经更佳，二三次出者次之，其色红黄为上，纯红者为中，紫黑者不用)　朱砂五钱(用辰州豆片者佳，有精神为最)

【用法】先将红铅拌入朱砂放瓷盆内，日晒月照四十九日毕，飞仙池文武火升三炷香，其药透蔑过一边，冷定开看，与金箔相似，用鸡翎扫下约一分八厘为上等；其次一分二厘，以乌金纸包，入小眼药罐内，以黄蜡封口，外以尿胞皮通身包裹，仍放大瓶内，以棉絮塞紧，仍用竹叶尿脬紧扎，用络以长绳引入井中去火毒，四十九日取出，用好乳香末半分研细末，以人乳二三滴将圣药和匀作三丸。用人乳送下。即归室中静养三七日，然后方许出门动作。

【功用】乌须发，延寿。

65371　神仙飞步丸

【方源】《古今医鉴》卷十。

【组成】当归一两　川芎八钱　白芍一两五钱　生地黄一两　黄柏(酒炒)二两　知母一两　苍术一两　牛膝一两　木瓜一两　杜仲一两　薏苡仁一两　防风七钱　防己七钱　威灵仙七钱　羌活七钱　桃仁七钱　红花七钱　黄连(酒炒)一两　肉桂三钱　黄芩(酒

炒）一两 陈皮一两 半夏（姜汁炒）一两 白茯苓一两

【用法】上为末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，空心盐汤送下。

【主治】脚膝疼痛。

65372 神仙飞步丹

【方源】《袖珍》卷一。

【组成】苍术八两 草乌四两（不去皮尖） 杜芎 香白芷各二两

【用法】上㕮咀，用生姜四两，连须葱四两捣细，和药拌匀，以瓷器筑药于内，令实，纸封瓶口，勿令出气，春三夏二秋七冬九日，取出晒干或焙干，与姜、葱一同为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服十五丸，加至二十丸，空心茶、酒任下。

【主治】男子诸风湿瘫。

【宜忌】忌热物，孕妇勿服。

65373 神仙不老丸

【方源】《寿亲养老》卷四。

【异名】神仙不老丹（《济阳纲目》卷六十四）。

【组成】人参（新罗者，须是团结、重实、滋润，去芦头，刷洗净，焙干，薄切，焙燥）二两 川牛膝（长三四尺而滋润者，去苗，刷洗净，焙干，寸截，用酒浸一宿，焙燥）一两半 川巴戟（色黑紫，沉重大而穿心者佳，若色带黄而浮轻者非，洗刷净，焙干，细切，酒浸一宿，焙燥）一两 川当归（大茎其稍如马尾状，滋润辛温芳香者，去芦头，刷净洗，焙干，细切，用酒浸一宿，焙燥）二两 杜仲（截之多丝者，削去粗皮，只取其肉，如去肉桂之法，然后刷洗净，焙干，横理锉碎如豆，用麦面炒令丝断色黄，去面别磨）一两半 地黄（冬节前采，以水浸沉者为是，以其肥者捣取汁，浸令浃，蒸毕，焙干，色黑味甘为度，用时以生干、熟二种焙干，酒浸一宿，滤出，竹刀细切，焙干，各称一两，忌铁器）二两 菟丝子（小如芥子，极坚硬者佳，大而轻者非，用新布揾起，挪洗，焙干，以酒浸一宿，滤出，将温汤淋去酒，焙燥，别磨）二两 柏子仁（色红而滋润者，去壳取仁，细研，临时和入众药）一两 石菖蒲（紧细节密者，去毛，刷洗净，焙干，细切，焙燥）一两 枸杞子（色白而肥润，去蒂洗净，焙干，用酒浸一宿，焙干）一两 地骨皮（色黄，入手轻者佳，重者非，略去浮皮，净洗，焙干，薄切，焙干）一两

【用法】上不可晒，只用慢火焙，若太燥则又失药气，只八分干，即于风前略吹，令冷热相激，便十分燥，取净称份量，磨如细散，火日炼蜜为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心、食前、临卧以盐酒、盐汤任下。

【功用】驻颜，乌髭发，大能温养荣卫，补益五脏，和调六腑，滋充百脉，润泽三焦，活血助气，添精实髓。

【宜忌】忌食葱白、薤白、芦菔、豆粉及藕、诸般血。

65374 神仙不老丹

【方源】《医方类聚》卷一五三引《经验秘方》。

【异名】不老丹（《普济方》卷二二三）。

【组成】莲子一斤（酒浸三日，炒干） 白茯苓半斤（去皮） 藕节一斤半（洗净，晒干） 枸杞子半斤 干熟地黄四两 九节菖蒲四两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心好酒或白汤送下，每日三次。

【功用】令耐老无病，髭须如漆，颜色若童。

65375 神仙不老丹

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】牛乳一瓶 干山药末四两 无灰好黄酒一大钟 童子小便一大钟（去头尾）

【用法】上共和一处入钟，重汤煮，以浮沫出为度，取出。每用一小钟，温服，每日三次。

【功用】补益。

65376 神仙不老丹

《济阳纲目》卷六十四。为《寿亲养老》卷四“神仙不老丸”之异名。见该条。

65377 神仙不老汤

《普济方》卷二六七引《余居士选奇方》。为《百一》卷四"不老汤"之异名。见该条。

65378 **神仙不卧散**

《普济方》卷一四七引《德生堂方》。为《伤寒标本》卷下"不卧散"之异名。见该条。

65379 **神仙不醉丹**

【方源】《回春》卷二。

【组成】白葛花 白茯苓(去皮) 小豆花 葛根 木香 天门冬(去心) 缩砂仁 牡丹皮 人参(去芦) 官桂 枸杞子 陈皮 泽泻 海盐 甘草各等分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如弹子大。每服一丸,细嚼,热酒送下。一丸可饮酒十盏,十丸可饮酒百盏。

【功用】令饮酒不醉。

65380 **神仙五子丸**

【方源】《医方类聚》卷一五三引《经验秘方》。

【组成】覆盆子 五味子 枸杞子 蛇床子 菟丝子(酒浸三日) 干山药 熟地黄 巴戟(去心) 白茯苓(去皮) 续断 苁蓉(酒浸二日) 牛膝(酒浸三日,焙) 肉桂 槟榔 附子(炮)各一两 木香 沉香 乳香(另研) 没药(另研) 破故纸(炒) 木鳖子(去壳) 萆薢各半两 茴香一两(盐炒,去盐) 枳实二两

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,空心温酒送下。服至一月,气力俱壮,皮肤滑润,冬不至冷,夏不至热。

【功用】令白发返黑,活血驻颜。常服强阴气,补元肾,益子息。

【主治】男子失精,肌肉陷下,形色俱脱,骨蒸虚劳,诸风变易,脾胃久虚,全不思食,四肢怠惰,夜梦泄精,阴囊肿痛,湿润瘙痒。

65381 **神仙五子丸**

【方源】《医方类聚》卷一五三引《烟霞圣效方》。

【组成】覆盆子 五味子 蛇床子(醋拌浸,炒干用) 菟丝子(酒浸三日,焙干用) 巴戟(去心) 白茯苓 续断 肉苁蓉 牛膝(二味酒浸二宿,焙干) 枸杞子 干山药 熟干地黄(细切,焙干用) 肉桂(去皮) 槟榔 黑附子(炮裂,去皮)各一两 枳实一两(麸炒) 干姜一两(炮)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二十丸至三十丸,空心温酒送下。服药十日气力生,半月阳气胜,二十日精髓坚,一月气力俱壮,皮肤滑润,冬不冷,夏不热,白发再黑,壮若童颜,妇人服之,肌体温润。

【功用】生气力,坚精髓,温润肌肤,耐寒热,乌发,驻颜。

65382 **神仙太一丹**

【方源】《博济》卷五。

【组成】朱砂一两(辰州者为上,不用夹砂石者) 紫石英一两 铁引粉一两 雄黄一两 砒霜半两(用信州者) 银箔二十片 金箔二十片 太阳元精半两 麝香一两(别研) 端午日南行猪粪(烧灰后称)一两

【用法】先将难研者研细后,于端午日清早更各细研了,却一处同研令极匀,候午时用三五家粽子尖,面向南搜剂为丸,如鸡头子大。凡遇大患时,每丸可疗二人;小可疾病,每丸可分为三服。

【主治】诸病医药所不及者。

65383 **神仙太一膏**

《局方》卷八(吴直阁增诸家名方)。为《百一》卷二十"太一膏"之异名。见该条。

65384 **神仙太乙丹**

《外科经验方》。为《百一》卷十七"神仙解毒万病丸"之异名。见该条。

65385 **神仙太乙膏**

【方源】《鲁府禁方》卷四。

【组成】黄柏 防风 玄参 赤芍 白芷 生地黄 大黄各五钱 血竭三钱 当归八钱 肉桂三钱 槐枝三十寸 柳枝三十寸 桃枝三十寸

【用法】共合一处,用真麻油四斤浸药,春五、夏三、秋七、冬十日,用桑柴火熬令油褐

色，滤去滓，再熬至滴水成珠，下淘炒过黄丹二斤，搅千余遍，待冷，入地埋三日去火毒。摊贴。

【主治】打扑伤损，遍身疼痛，一切痈疽，恶疮疥癣，及筋骨疼痛。

65386 神仙太乙膏

【方源】《秘传大麻疯方》。

【组成】首乌 当归 白芷 黄连 大黄 荆芥 玄参 生地 川芎各一两 乳香 没药各三钱 乱发三钱

【用法】麻油一斤，入前药煎枯，去滓，下黄丹六两，煎成膏。贴破疮，再服固本汤；鹅口疯，形如鹅口，血色转黄，宜服通圣散，再用神仙太乙膏。

【主治】鹅口疯，形如鹅口，血色转黄者。

65387 神仙巨胜丸

【方源】《圣济总录》卷一九九。

【组成】巨胜（酒浸一宿，九蒸九晒） 牛膝（酒浸，切，焙） 巴戟天（去心） 天门冬（去心，焙） 山芋 熟干地黄（焙） 柳桂（去粗皮） 酸枣仁 覆盆子 菟丝子（酒浸，别捣，焙干） 远志（去心） 菊花 人参 白茯苓（去黑皮）各一两

【用法】上拣择净，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心温酒送下。服至一月身轻体健，万病不侵。

【功用】轻身壮阳，却老还童，去三尸，下九虫，除万病。

65388 神仙巨胜丸

《普济方》卷二二一。为原书卷二二三引《德生堂方》“神仙巨胜子丸”之异名。见该条。

65389 神仙止血散

【方源】《普济方》卷三〇三。

【组成】龙骨一两（五色，紧者） 诃子一两 白石脂半两 苎麻叶半两（系五月五日午时采来阴干者）

【用法】上为细末。水调服之。

【功用】止血。

【主治】金疮血不止。

【备考】《奇效良方》本方用法：每服一钱半，食远水调服之。

65390 神仙化铁丹

【方源】《普济方》卷六十四。

【异名】圣化仙丹。

【组成】香白芷（大块不蛀者）三两 贯仲（拣净，末）一两 木兰花（树生者）一两 京墨（好者）一钱 金星石 银星石各半两 山豆根（去梗）一两 水仙根（干者）一两 木香半两 乌芋（即荸荠，干者）一两 象牙屑 玳瑁屑 犀角屑各三两 墨煤（净者）一两

【用法】上为细末，以头面雪水糊为丸，如龙眼大，朱砂为衣，悬当风处阴干。每用一丸，含化。

【主治】一切骨鲠。

65391 神仙化痞膏

【方源】《回春》卷三。

【组成】当归 川芎 赤芍 黄连 黄芩 黄柏 栀子各一钱 红花 肉桂 丁香 生地黄 草乌 巴豆（去壳）各五钱 大黄二两 苏木 川乌各一两 穿山甲二十片 蜈蚣六条 白花蛇一条（一两） 桃枝 柳枝 枣枝各二寸

【用法】上锉细，香油二斤浸五七日，桑柴慢火熬至焦黑色，去滓，起白光为度，放冷，滤净澄清取一斤半，再入锅，桑柴火熬至油滚，陆续下飞过黄丹（炒黑色）一两，烧过官粉一两，水飞过，炒褐色密陀僧一两，仍慢火熬极沸止，再加嫩松香四两，黄蜡半斤，熬至滴水成珠，用厚绵纸时时摊药，贴自己皮上试之，老嫩得所，方住手离火，待微温下后细药：松香（先以油少许入锅熔成汁入膏方佳）、乳香一两（箬叶炙过），没药一两（炙），血竭五钱（咀之如蜡，嗅之作栀子味方佳），天竺黄三钱，轻粉三钱，硇砂一钱半，胡黄连三钱，阿魏五钱（取豆大，火化滴铜器上，上头变白者佳），麝香一钱，十味共为细末，陆续入膏内，不住手搅匀，以冷为度，铲出以温水洗去厚腻，埋在阴地二十一日，去火毒，狗皮摊膏。先

以白酒煮朴消洗患处,良久方贴药,时时炭火烤热,手摩熨之。同时宜多服药饵,不可专恃贴药。

【主治】积聚,痞块。

【宜忌】忌厚味生冷、房欲怒气。

65392　**神仙化痞膏**

【方源】年氏《集验良方》卷三。

【组成】刘寄奴草四两　当归　川芎　白芷　黄柏　胡黄连　苏木　川乌各二两　肉桂　丁香　巴豆肉　草乌各一两　大黄　蜈蚣　穿山甲各三两　白花蛇一条　桃枝　柳枝各三十寸

【用法】上用香油二斤浸五日,桑柴慢火熬黑色,去滓,放冷,滤清净,取一斤半,再入锅内熬至滴水成珠,下飞过黄丹三两,陀僧二两,仍慢火熬至沸止;再下黄蜡八两,熬至滴水成珠,方离火候微冷;再下去油乳香一两,去油没药一两,番硇砂一钱五分;麝香、轻粉各二钱,血竭五钱,阿魏五钱,陆续搅入膏内,以冷为度。用桑皮油纸摊贴,以热手摩之。

【主治】痞疾、积块。

65393　**神仙化痞膏**

【方源】《理瀹》。

【组成】大黄　黄柏　当归　秦艽　三棱　醋莪术各三钱　全蝎梢　炮甲片各十四个　木鳖仁七个　蜈蚣五条　(一方无黄柏,有黄连、巴豆、芦荟,阿魏各三钱,冰片一钱)

【用法】用麻油二斤四两浸熬,炒黄丹收,入乳香、没药各五钱,风化硝三钱,摊膏。先用姜擦过,再贴患处,贴后炒盐布包熨于膏上,或烘儿鞋,或热手熨皆可。三日热止,七日腹痛止,十日便脓血愈。

【主治】积痞气块,身热口疳,腹痛,便脓血。

【加减】治马刀瘰疬,加琥珀,麝香。

65394　**神仙化痰丸**

【方源】《百一》卷五。

【组成】天南星　半夏各四两(二味与生姜四两、皂角四两用水五升同煮,水尽去姜及皂角不用)　丁香一两　橘红二两

【用法】上为细末,白水面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后生姜汤送下。

【主治】嗽,风秘。

65395　**神仙化癖丸**

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】芦荟　青黛　木香　厚朴(姜炒)　陈皮(去白)　槟榔各一钱　使君子(去壳)　胡黄连　山楂肉　香附(水浸)　三棱(煨,醋炒)　莪术(煨,醋炒)各二钱　人参　白术各三钱　水红花子　神曲(炒)　麦芽(炒)各四钱　阿魏(为糊)一钱　甘草(炙)六分

【用法】上为末,将阿魏一钱以水研开,和面糊为丸,如绿豆大。每服四五十丸,米饮、白汤任下。

【主治】小儿癖疾。

65396　**神仙化癖膏**

【方源】《便览》卷三。

【组成】大黄三两　木鳖子二十一个　穿山甲十片　归尾五钱　白芷五钱　巴豆仁二百五十个　栀子五钱　莪术三钱　蓖麻子仁一百二十个　防风五钱　三棱三钱　官桂三钱　胎发一块(如无,少年亦可)　槐柳枝各二十寸

上药入油,先炸至老黄色,去滓取净油二十四两,入飞过黄丹十两,熬至滴水成珠,下火待温,再入后细药末。

全蝎十个(炙)　蜈蚣二条　红娘子二钱　斑蝥二钱　片脑五分　硇砂三钱　阿魏五钱　硼砂三钱　血竭三钱　芦荟三钱　雄黄三钱　乳香五钱　没药五钱　蟾酥二钱　黄蜡三钱　松香五钱　麝香三钱　轻粉二钱　酥油一两

【用法】上用柳条一顺手搅匀,收瓷罐内。先熬皂角、皮消水洗搓病上良久,再用葱根搓搽良久,用绢帛摊贴患处。

【主治】积聚。

65397　**神仙化癖膏**

【方源】《寿世保元》卷八。

【异名】清凉化痞膏（《何氏济生论》卷五）、化痞膏（《杂病源流犀烛》卷十四）。

【组成】真香油二斤四两 秦艽五钱 三棱五钱 黄丹一斤二两（水飞过，炒紫色） 黄柏五钱 穿山甲十四片 当归三钱 莪术五钱 全蝎十四个 大黄三钱 蜈蚣五钱 木鳖子七个

将药入油内熬黄色为度，滤去滓，捣烂待用，油冷时下黄丹，用文武火熬，槐、柳条不住手搅，出黑烟气，熬至滴水成珠，手试软硬适度方可离火，次将后项细药并入捣烂粗滓内。

真阿魏二两 乳香五钱 没药五钱 麝香一钱 皮消三钱（风化为末）

【用法】上调匀，以瓷器内盛之。用时坐水中熔开（不可火上化），用狗皮摊贴患处，每个重七钱。贴三日止热，七日觉腹微痛，十日大便下脓血为验。

【主治】癖积气块，身体发热，口内生疳。

【宜忌】忌生冷、腥荤、发物百日。

【加减】如有马刀疬子疮，加琥珀一两。

65398 神仙长春散

【方源】《瑞竹堂方》卷三。

【异名】神仙常春散（《普济方》卷七十），长春散（《奇效良方》卷六十二）。

【组成】皂角一斤（去皮弦，虫蛀不用） 食盐四两（二味同烧炼） 香附子四两（净，炒，去毛） 青盐四两（研） 牛蒡子四两（炒） 莲花蕊一两 藿香一两 旱莲草一两 麝香一分（研） 脑子一分（研） （一方无香附子）

【用法】上将皂角锉碎，用小瓦盆二个，上盆底钻小孔三个，下盆装一重皂角，一重食盐，四两都装盆内，相合泥固，炭火煅炼，烟青为度，取出与前药碾细，入麝香、脑子，同为细末。每日早晨、临睡刷牙。

【功用】牢牙，黑髭发，至老不白。

【主治】牙齿动摇疼痛，牙宣。

65399 神仙乌云丹

【方源】《古今医鉴》卷九引吴侍郎方。

【组成】何首乌半斤（入砂锅内，以黑豆同蒸半日，去豆，用好酒浸七日，晒干，再蒸浸，七次） 破故纸（酒洗）一斤（砂锅内炒黄色） 旱莲汁二两（如无汁，旱莲为末亦可） 槐角子二两（为末） 胡桐泪（即木律，为末）二两

【用法】上为细末，以枣肉二斤、核桃仁半斤共一处捣为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心盐汤送下。共服三个月，勿断一日。

【功用】乌须黑发，返老还童，壮筋骨，补真精，固元阳。

65400 神仙乌麻酒

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】乌麻子五斤（微炒）

【用法】上捣碎，以酒二斗浸经宿。随性饮之。

【功用】补五脏，久服延年不老。

【主治】虚劳。

65401 神仙风药酒

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】秦归身一两 大川芎一两 片白术（去芦）五钱 白茯苓（去皮） 大川乌（炮）各五钱 软防风五钱 荆芥穗五钱 羊角天麻五钱 全蝎（炒）二钱 香白芷五钱 北细辛五钱 何首乌五钱 新草乌五钱 威灵仙五钱 金叉石斛五钱 川牛膝（去芦）五钱 川独活五钱 羌活五钱 麻黄节三钱 石楠藤五钱 薏苡仁一两 川干姜五钱 赤桂五钱 尖槟榔五钱 宣木瓜五钱 真石乳五钱 明没药二钱 川续断五钱 白苍术（米泔炒）一两 嫩黄耆五钱 两头尖五钱 南木香二钱 汉防己五钱 桑寄生五钱 赤茯神五钱 骨碎补五钱 甘草节三钱 虎骨胫（煅，乳浸）五钱

【用法】上合一处，用生头酒五斤，文武火熬熟，去火毒。早晚随量饮酒。

【主治】虚寒之鹤膝，不能动履，肿痛难当，及风湿麻木。

65402 神仙六子丸

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】菟丝子一两（细，酒浸一宿，焙）

金铃子一两　枸杞子一两　覆盆子一两　五味子一两(焙)　蛇床子一两(炒)　何首乌一两(酒浸一宿,焙)　地骨皮三两(酒浸一宿,焙)　木瓜一两　舶上茴香二两(盐炒)　熟地黄三两(焙)　牛膝三两(酒浸一宿,焙)

【用法】上为细末,用浸菟丝子酒澄清作面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心食前温酒送下,日进一服。

【功用】常服养精髓,养气血,壮筋骨,补肾水,滑肌肤,驻容颜,黑髭鬓。

【主治】男子气血衰败,未及年五十之上,髭鬓斑白,或年少人髭鬓苍黄。

【宜忌】忌萝卜、生韭、薤、蒜菜。

【加减】如要疾黑,前药内加人参、茯苓、石菖蒲各一两。药后百日内变黄白色如黑漆。

65403　神仙水花丸

【方源】《幼幼新书》卷二十五引《仙人水鉴》。

【异名】紫微夫人青黛长生散。

【组成】消石一分　波斯青黛　青葙子　青木香　葵花　凌霄花　远志　柴胡　代赭　金牙石　元精各二分　蜣螂二枚　槟榔一枚(生)　橘皮(去瓤)　水蛭各二七个　虎睛一枚

【用法】上为细末,分为二份,一份炼蜜为丸,如麻子大,一岁以下,每服三二丸,清水送下;一份为末,二岁以下,每服一字,米饮送下。

【主治】孩子三岁内疳气,身如金色,瘦悴不下食,多不成肌肉,渐渐黑瘦,食入口即吐,时寒时热。

65404　神仙玉女粉

【方源】《御药院方》卷十。

【组成】益母草

【用法】上药每用少许,早、晚洗患处。

【功用】退皴皱,令人皮肤光泽。

【主治】皯䵳。

65405　神仙玉粉丹

【方源】《幼幼新书》卷二十八引《张氏家传》。

【组成】精明舶上硫黄一斤(去砂石尽)

【用法】上打碎,用猪猪肚七个,旋采桑根白皮三斤,寸锉;将猪肚一个净洗,只以硫黄实之,用麻线缝合,以水二斗先将桑根白皮一斤同煮一伏时,其余猪肚亦用慢火养之,不得令冷;候煮满一伏时,别以猪肚换之,又用白皮纳一斤同煮再一伏时;又换猪肚、桑白皮,过三伏时,不换白皮,只换猪肚,共煮七伏时,水耗以热汤添,不得用冷水,候满七伏时取出,用温水淘净,研至细,候烈日日中晒极热,再研,煮糯米粉糊为丸,如梧桐子大。每服十丸至十五丸,空心米饮送下。

【功用】驱除宿冷,补一切虚。

【主治】小儿、成人冷积暴泻。

65406　神仙四神丹

【方源】《鸡峰》卷二十九。

【组成】朱砂　水银　硫黄(舶上者)　雄黄　雌黄(不夹石者)各一两

【用法】上为细末,用仙灵脾捣末二两,放在昆仑纸上,先用绢一片撮四神末,微用蜜和令成块,去绢片,轻掂药块安在前面有仙灵脾药纸中心,包裹一周匝,外用皂麻线缠之,子地坑内以新瓦末或砖末三升,铺盖与地平,上面瓦末厚四指许,四伴上簇火,十二斤好炭煅之,不得煽,火尽取出,去纸,药裹如新铁色者佳,细研,水浸蒸饼为丸,如梧桐子大。每服一二丸,空心冷水吞下。痔疾,艾叶煎汤送下一丸;血崩,艾叶煎汤人药少许送下;大风,大麻仁汤送下;阴毒伤寒,煎麻黄汤送下;肺痨咳嗽,地骨皮汤送下;水泻,陈仓米汤送下;白痢,生姜汤送下;脾胃气,京枣汤送下;妇人众疾,盐汤送下;冷劳疾,新汲水送下;虚弱,温酒送下;腰腿冷痛,草薢汤送下;气痢,青橘皮汤送下;霍乱,木瓜汤送下;赤痢,甘草汤送下;赤白痢,干姜甘草汤送下;一切风痛,醋汤送下;丈夫众疾,茅香汤送下。

【功用】久服延年,轻身耐老,乌髭鬓,润颜色,强筋骨,进饮食。

【主治】痔疾，血崩，大风，阴毒伤寒，肺痨咳嗽，水泻，脾胃气，妇人众疾，冷劳疾，虚弱，腰腿冷痛，气痢，霍乱，赤白痢，一切风痛，丈夫众疾。

【宜忌】忌葵菜、乳饼。

65407 **神仙四倍丸**

【方源】《普济方》卷三四五引危氏方。

【组成】人参一两　白术二两　川当归三两(洗净)　熟干地黄四两(洗净)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，米饮嚼下。如不欲嚼，则为丸，如梧桐子大，每服五十丸，空心米饮或温酒送下。

【功用】常服驻颜补血，养气安神，开胃进食。

【主治】妇人产后血气不足，颜色痿黄。

65408 **神仙外应膏**

【方源】《回春》卷二。

【组成】川乌一斤

【用法】上为细末，用隔年陈醋入砂锅内慢火熬如酱色成膏。先用升麻、皮消、生姜煎水洗患处，然后敷药。如病有一年，敷后一日发痒；如病有二年，二日发痒，痒时令人将手拍痒处，以不痒为度。

【主治】①《回春》：左瘫右痪，筋骨疼痛，手足拘挛。②《疡医大全》：湿痰流注。

【宜忌】不可见风。

65409 **神仙失笑散**

【方源】《本草纲目》卷九引张三丰方。

【组成】百年陈石灰(为末)四两　蜂蜜三两

【用法】上拌匀，盐泥固济，火煅一日，研末。擦牙。

【主治】风虫牙痛。

65410 **神仙生牙丹**

【方源】《奇方类编》卷上。

【组成】鼠骨四两(人乳浸一日，阴干，为末)　柏子仁(去油)八两　枸杞子八两　少壮血余(皂夹水洗净，八罐煅成灰)八两　山茱萸八两(酒蒸)　远志四两(甘草水泡，去骨)　石菖蒲四两　鹿角霜八两　灵砂四两(人乳煮过)

【用法】上为细末，鹿角胶为丸，如梧桐子大。每服百丸，子时酒送下。

【功用】生牙。

65411 **神仙训老丸**

【方源】《寿亲养老》卷四。

【异名】神仙补老丸(《医学入门》卷七)。

【组成】生干地黄　熟干地黄各五两　川椒十两(不去核)　牛膝五两(酒浸，为末)　大黑豆一升(生用)　干山药五两　赤白何首乌各十两　肉苁蓉五两　枸杞五两　藁本十两(洗)

【用法】上将白何首乌为末，放水甑内，早晨蒸，日出晒，夜间露，如此九蒸、九晒、九露，数足焙焦为末，酒糊为丸，如梧桐子大。空心温酒或盐汤送下。

【功用】补下元，光泽皮肤，常服延年益寿，气力倍常，齿落再生，发白再黑，颜貌如婴儿。

【宜忌】忌萝卜。

【备考】《医学入门》本方用法：每服五十丸。

65412 **神仙训老丸**

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】何首乌(雌、雄)一斤　山茱萸　菟丝子　当归(酒洗)　白茯苓　地骨皮　甘州枸杞子(去核)　川芎　天门冬(去心)　麦门冬(去心)　淮生地黄　淮熟地黄　川牛膝(酒洗)　远志　甘菊花　山药　甘草(炙)　肉苁蓉(酒浸洗)　杜仲(酒炒去丝)　酸枣仁　补骨脂　生黑豆末　桑椹子各四两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服六七十丸，空心温酒送下。

【功用】益元补阴，黑须发，坚齿，童颜不老。

65413 **神仙立效散**

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】半两钱　自然铜各等分

【用法】上用火煅醋淬七次，以酥为度，去

火毒，为细末。将患所折骨处用软旧衣片或袋衬裹，外用杉木板阔一寸许者数片周边裹了，外用带缚，须是宽急得所，太急则缚住血脉，恐药不行；每用一字，用生姜自然汁少许，调在药内，或手心内，令患人服之，即用无灰酒一盏送下。一服定疼，二服接骨，三服平复，却更用乌金散调理。

【功用】接骨。

【主治】骨头内损。

65414　**神仙必效丸**

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】阿胶(炙令燥)二两　当归(切，焙)　乌贼鱼骨(去甲)　白芍药　刘寄奴各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，加至五十丸，空心米饮送下。

【主治】便血无度。

65415　**神仙列仙散**

【方源】《济阳纲目》卷十一。

【组成】木香　沉香　茴香(微炒)　槟榔各一钱　萹蓄二钱　瞿麦五钱　麦芽一两半　大黄(微炒，焙)一两

【用法】上为末。每服三五钱，五更热酒调下，能饮者，多饮二三杯不妨。仰面卧，手叉胸前，至天明取下，大便如鱼脑，小便如血为效。

【主治】饮酒所伤，以致遍身疼痛，腰脚强跛，手足顽麻，胃脘疼痛，胸膈满闷，肚腹膨胀，呕吐泻利，酒食停久，及积聚，黄疸，热臓。

【宜忌】忌食生冷硬物及荤腥，只啖米粥。

65416　**神仙夺命丹**

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】石燕子一枚(火烧令红，醋淬七次)　母丁香一钱半　水磨雄黄二钱　酒蜡半两　鳖血一蛤蜊壳

【用法】上为细末，五月五日日未出时合药，将酒蜡、鳖血同化开为膏子，次入余药和成丸，如绿豆大。每用一丸，装在钩子上，钩上系绯线一丈二尺，再用雪膏少许裹缠药丸，令患人先吃膏二口，后用一口同药吞下，良久，线动用力拽出，急以铁钳投热油铛内煎。

【功用】钓传尸劳虫。

65417　**神仙夺命丹**

【方源】《丹溪心法附余》卷九。

【异名】雄黄二豆丸(《赤水玄珠》卷四)、二豆回生丹(《回春》卷三)、二豆回香丹(《东医宝鉴·杂病篇》卷五)。

【组成】乌梅十三个(水浸，去核)　硇砂二钱　雄黄二钱　乳香一钱　百草霜五钱　绿豆　黑豆各四十九粒

【用法】上将乌梅杵烂，余药为末，入梅再捣和匀为丸，如弹子大，以乳香少加朱砂为衣，阴干。每服一丸，空心噙化，待药尽，烙热饼一个，擘碎入热茶泡食之，无碍为验，过三五日依法再服一丸即愈。

【主治】肝气郁结，噎食，呕吐，翻胃，便秘。①《丹溪心法附余》：噎食。②《医学入门》：七情气郁呕吐，或噎食不通，大便秘结，粪如羊屎。③《回春》：翻胃。

【宜忌】《回春》：忌油腻、盐、酸、怒气、房劳。《济阳纲目》：忌一切鱼、鹅、鸡、羊、生冷、油腻及一切发热之物。

【备考】《医学入门》有硼砂，无硇砂。

65418　**神仙夺命丹**

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】南薄荷叶一两　天南星(汤泡透，切片，姜汁炒)五钱　姜蚕三钱　南羌活五钱　荆芥穗二钱　川椒(去目)一钱　辽细辛二钱　牙皂(刮去皮弦)八两　石脑油(真者)二两　硼砂一两

【用法】上将前八药入瓷盆内，用好酸酱水四碗浸泡(春、秋五日，夏三日，冬七日)，临熬时滤去滓，存净汁，入银锅或铜锅内，用桑柴火熬，以槐柳枝频搅；熬数十沸，方入石脑油、硼砂，再熬成膏，形如琥珀色，乘热摊于厚连四纸上，干收贮。临用时剪方寸一块，以温浆水溶化盏内，用二苇筒吹入二鼻孔中，良久，吐痰涎即省，若吹之太重，或药水太热，致鼻出血勿惧，即饮淡盐汤一二口便止。

【主治】中风，痰厥，气厥，牙关紧，不省人

事。

65419 **神仙夺命散**

【方源】《幼幼新书》卷十引郑愈方。

【组成】人中白一两　麝香一钱　蜈蚣（全者）一条　盆消二钱

【用法】上为细末。每用少许，搐鼻。

【主治】小儿惊风吊眼。

65420 **神仙百解散**

【方源】《普济方》卷一四七引《卫生家宝方》。

【组成】白术　茯苓各二两　藿香叶（去土）　橘皮（去瓤）　甘草（炙）　半夏（擘破，生姜汁制）　厚朴（姜汁蘸炙）各三两

【用法】上先将厚朴、半夏为粗末，用生姜四两烂研，同厚朴、半夏一处拌匀，于净器中淹一宿，次日焙干，却人前五味药，共为粗末。每服四钱，水一盏半，加生姜五片或七片，煎至七分，去滓热服，伤寒并吃二服。无论百病，初觉意思不快，便先进一二服。

【功用】常服宽中进食。

【主治】四时伤寒，八般瘖气，山岚瘴疟，浑身壮热憎寒，或中暑，或风疾灌注，曲挛手足，咽喉噎塞，十种膈气，不思饮食，冷物伤脾，脏腑不调，妇人产前产后及小儿一岁有病。

65421 **神仙百解散**

【方源】《局方》卷二（续添诸局经验秘方）。

【异名】神仙截伤寒四季加减百解散。

【组成】山茵陈　柴胡（去芦）　前胡（生姜制，炒）　人参　羌活　独活　甘草　苍术（米泔浸，锉，炒）　干葛　白芍药　升麻　防风（去苗）　藁木（去芦）　藿香（去梗）　白术　半夏（姜汁制）各一两

【用法】上为细末。每服三钱，水一盏半，加生姜三片，大枣二个，煎至一盏，热服，不拘时候，并进二服。如要表散，加葱白三寸，淡豆豉三十粒，同煎服，以衣被盖复，汗出而愈。

【功用】①《局方》（续添诸局经验秘方）：常服辟瘟疫。②《普济方》：调中顺气，祛逐寒邪，调顺三焦，解表救里，温润肺经，升降阴阳，进美饮食。

【主治】①《局方》（续添诸局经验秘方）：伤寒遍身疼痛，百节拘急，头目昏痛，肢体劳倦，壮热憎寒，神志不爽，感冒瘟疫瘴气。②《普济方》：伤寒在表，未传入经，发热恶寒，腰痛；已传经络，胸满短气，肢体烦疼，目睛微痛，耳聋，口燥咽干，或渴不渴，手足自温，或肢厥自利，或不自利，小便反快；或头面感寒，风伤腠理，头痛项强，发热，憎寒，鼻流清涕，咳嗽痰涎；或风湿相搏，骨节烦疼，身体沉重，洒淅恶风，时自汗出等，不问伤寒、伤风、中暑、中暍，食蒸头疼，气逆胸满，失饥吐逆，眩晕恶心，及已经汗后不解，下之不当，吐之不中者。

【加减】立冬、立春以后不加减；立夏以后，一料加柴胡一分，赤茯苓、当归各半两；立秋以后减柴胡一分，不用当归、茯苓，加干姜（炮）、肉桂（去粗皮）各一分、麻黄（去节）半两。

65422 **神仙百解散**

【方源】《普济方》卷三五五。

【异名】生料五积散。

【组成】甘草　苦梗各六分　款冬花四分　麦门冬　生地黄各半三分　葱白一握　豉二合

【用法】上㕮咀。水二升，煮取八合，去滓，食后分二次服。

【主治】产后感风伤寒，咳嗽多痰，唾粘。

65423 **神仙回脓散**

【方源】《胎产指南》卷八。

【组成】蒲公英　天花粉　金银花　连翘　白芷　甘草

【用法】上用酒水各半煎，饱服。

【主治】乳痈。

【加减】吹乳，加防风；久破烂，加人参、黄耆。

65424 **神仙回脓散**

【方源】《盘珠集》卷下。

【组成】大黄（炒）　白芷　木香　沉香　没药　蛤粉　穿山甲（炙）

【用法】每服一丸，重一钱五分，参汤送下。

【主治】产后恶露不下，流注四肢腰背等处，久必肿起作痛；或儿枕痛久不已，腹胀大，或转侧作水声，或脓从脐出与大便出者。

【备考】本方方名，据用法，当作"神仙回脓丸"。

65425　神仙延寿丹

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【异名】延龄丹。

【组成】天门冬二两(去心)　远志二两(去骨)　山药二两(去苗)　巴戟二两(去骨)　赤石脂一两(炒)　车前子一两(炒)　石菖蒲一两(炒)　柏子仁一两　泽泻一两　川椒一两(去目)　熟地黄一两　生地黄一两　枸杞子一两　白茯苓一两　覆盆子一两　杜仲一两(炒去丝)　菟丝子一两(酒炒)　肉苁蓉四两(炒干)　川当归一两　川牛膝一两(酒洗)　地骨皮一两　五味子一两　山茱萸一两　人参一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，清晨温酒或盐汤送下。服至百日后颜色永无衰朽，发白返黑，虽是八十老人，阴阳强健，目视十里，气力不衰，常行远地不乏。

【功用】养血黑须鬓，延年益寿。

65426　神仙延寿酒

【方源】《回春》卷四。

【组成】生地黄二两　熟地黄二两　天门冬(去心)二两　麦门冬(去心)二两　当归二两　牛膝(去芦，酒洗)二两　杜仲(去皮，酒和姜汁炒)二两　小茴(盐酒炒)二两　巴戟(水泡，去心)二两　枸杞子二两　肉苁蓉二两　破故纸(炒)一两　木香五钱　砂仁一两　南芎二两　白芍(煨)二两　人参五钱　白术(去芦油)一两　白茯苓(去皮)二两　黄柏(酒炒)三两　知母(去毛，酒炒)二两　石菖蒲五钱　柏子仁五钱　远志(甘草水泡，去心)一两

【用法】上锉，用绢袋盛药入坛内，用酒六十斤，煮三炷香为度，取出，埋土中三日夜，去火毒。每随量饮之。

【功用】和气血，养脏腑，调脾胃，解宿醒，强精神，悦颜色，助劳倦，补诸虚。久服百病消除。

【主治】虚人有热者。

65427　神仙延寿酒

《寿世保元》卷四。为原书同卷"延寿瓮头春"之异名。见该条。

65428　神仙延寿酒

【方源】《杂病源流犀烛》卷八。

【组成】补骨脂　熟地　生地　天冬　麦冬　人参　川芎　当归　白芍　茯苓　木香　砂仁　菖蒲　远志　柏子仁

【用法】上以酒三十斤煮。

【主治】老人气血两亏，下体痿弱，不善食而成痨者。

65429　神仙延龄丹

【方源】《鲁府禁方》卷二。

【组成】旱莲(取汁，晒干成膏子)半斤　破故纸(炒香，为末)一斤　五加皮(酒浸一昼夜，晒干)　赤茯苓(去皮，乳浸，牛乳可代)　生地黄二斤(酒浸一昼夜，取汁，晒成膏子)　红枣(去皮，煮熟)　生姜二斤(取汁，晒干成膏子)　杜仲(去皮，炙炒去丝，为末)　核桃仁(去皮)各半斤　川芎　枸杞(去蒂，酒浸)各四两　没石子　蜂蜜(炼老熟)各二两　细辛一两

【用法】上除桃仁、红枣、蜜外，其余各为细末，将桃仁、红枣、蜜煮熟为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，酒或盐汤送下。服二十日后，退白生黑，久服延年。

【功用】使衰返壮，折骨复坚，生瘢痕，耳聪目明，益寿延年。

【主治】瘫痪，五劳七伤，颜色枯干，身体羸瘦，妇人久不成胎，男子精神减少，行步艰难，筋骨疼痛。

【备考】按：方中五加皮、赤茯苓、红枣用量原缺。

65430 神仙导气散

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】甘遂二两半 木香一两半（锉碎）

【用法】上入水二升，一处文武火熬令干，为细末。每服二钱，用猪腰子一只，入药末在内，以湿纸裹煨熟，细嚼，临卧温米饮送下。

【主治】小肠气发作，疼痛不可忍，及脚气。

【宜忌】忌甘草三日。

65431 神仙导水丸

【方源】《普济方》卷三十九。

【组成】木香 当归 枳壳（炒） 黄芩 黄连 青皮 陈皮 槟榔 香附子各一两 三棱 莪术各半两 大黄 黄柏 牵牛末各三两

【用法】上为末，水糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温饭饮送下，不拘时候。

【主治】上盛下虚，水火不能升降，大便秘涩，小便不通，赤眼口疮，便红泻血，吐血，泄痢不止，诸积气块，小儿脾疾，妇入经脉不通，男子打扑伤损。

65432 神仙如意丸

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】砒二两（别研） 黄丹五钱（研，炒） 草乌头五钱（生，去皮尖，为末） 朱砂一分（别研，一半入药，一半为衣） 巴豆十二枚（去皮，不去油） 木鳖子六枚（去壳，别研，生用） 雄黄五钱（别研） 黄蜡二两 沥青二两（别研）

【用法】上前七味研匀，次熔黄蜡、沥青二味，滤过，与前药末搜和为丸，如鸡头子大，以朱砂为衣。每服一丸，心痛及脾寒痁疾，烧铁淬醋汤送下；久痢，脱肛及休息痢，脾虚泄泻，以陈艾心七枚，枣三个，干姜皂子大一块，水一盏，煎至半盏送下；寒热气块，嚼干柿，用白汤送下；一切酒食伤，生姜汤送下；赤白痢，烧干姜灰半钱，温米饮调送下；眼多冷泪不止，煎椒盐汤送下；暑气并热嗽，乳糖、生姜汤送下；小便冷淋，茴香、木通酒调海金砂末一钱送下；男子小肠气，炒茴香盐酒送下；妇人赤白带下，烧秤锤淬醋送下；血崩及血瘕，烧秤锤淬酒送下；月事不匀，当归、红花汤送下；小儿急慢惊风，丸如黄米大，一周岁儿，每服三丸，急惊，金银薄荷汤送下，慢惊，金银汤送下；小儿泻痢，丸如绿豆大，每服一丸，以艾心三枚，大枣一个，干姜一豆大，水一盏，煎至三分送下。

【主治】一切风劳气冷，心腹积滞，脾寒痁疾，脓血泻痢，咳嗽，目疾，心痛，久痢脱肛，脾虚泄泻，寒热气块，一切酒食伤，暑气并咳嗽，小便冷淋，男子小肠气，妇人赤白带下，血崩，血瘕，月事不匀，小儿急慢惊风。

【宜忌】久痢脱肛、休息痢、脾虚泄泻愈后一月，只可食淡粥。

65433 神仙更生散

【方源】《普济方》卷二〇四。

【组成】丁香二钱半 蓬术二钱半 木香一钱 官桂一钱半 干姜一钱一分（炮） 缩砂十个 诃子肉四个 草果一个 甘草四钱 川芎一钱 神曲一钱一分 巴豆七粒（捣成膏）

【用法】上为末，和巴豆令匀。每服一匙，沸汤送下。

【功用】顺阴阳，化痰宽胃，止呕吐，进饮食。

【主治】五膈、五噎。因忧思劳伤食气，阴阳不和，气滞为病，结于胸膈咽嗌，而致胸膈痞闷，呕逆吞酸，噎塞妨闷，饮食不下，作痛，肋下支满，饮食减少，四肢无力，气不升降。

65434 神仙佐经汤

【方源】《医方类聚》卷六十二引《经验秘方》。

【组成】麻黄（去根节） 干葛 北柴胡 桂心 北防风 川羌活 厚朴（姜制） 北细辛 汉防已 枳壳（麸炒） 白茯苓 黄芩 半夏（汤洗七次） 白姜（炮） 甘草（炙） 小草（远志苗） 麦门冬（去心） 香白芷 川当归 川芎 白术 人参 白芍药 川独活各一两

【用法】上㕮咀。每服五钱，水二盏，加生姜三片，枣子一个，煎至一盏，去滓，空心服。

【功用】常服消痰下气，却风湿，去肿满，美食，令人不虚。

【主治】寒暑流注足三阳经，手足拘急疼痛，行步艰难，头目晕肿，关节掣痛，憎寒发热，有汗恶风，卒中昏塞，大小便秘涩，腹痛，呕吐下痢，恶闻食气，腿髀顽麻，缓纵不能随行，热闷心烦，惊悸气上，脐下冷痛，喘满肩息，精神不美。

【加减】有汗，去麻黄，加牡蛎少许；无汗，去桂心，加陈皮、前胡、升麻各少许；大便秘涩，加大黄、竹沥；喘嗽，加杏仁、桑白皮、紫苏；肿满，加泽泻、木通。以上所加之药并等分。

65435　神仙住喘汤

【方源】《嵩崖尊生》卷七。

【组成】黑丑(头末)一钱　明矾三分　皂角四分　木香三分　人参一分

【用法】上用莱菔汁调下。十服愈。

【主治】痰甚喘。

【备考】方中明矾用量原缺，据《杂病源流犀烛》补。

65436　神仙返魂丹

【方源】《圣济总录》卷二〇〇。

【组成】丹砂　雄黄　雌黄各三两

【用法】上先细研雄黄、雌黄二味，用竹筒盛，埋北方地中，三日取出，先倾出一半，当心置丹砂(亦研令细)，却用倾出一半盖之，又用云母粉(用绢袋子揉洗出，晒干)塞筒子口，埋地内，只露筒口，用炭火子筒口畔围之，缓缓烧三七日，养化成水为度，倾药水盛铜器内，垂井中五日，无井只用深盆中盛水三四寸，更置大豆半斤在内，即安药器子水上，浸五日亦得，然后逐夜于露下露之，日出时收，候药水赤色，可丸即丸，如胡麻子大，密收贮。若有人猝死者，安在口中即活；常人服者，每月旦日服一丸，可终生无病。若中毒药，其毒自吐出。

【功用】起死扶衰，延龄却老。

65437　神仙快活丸

【方源】《普济方》卷二十五。

【组成】桂花二钱　木香　丁香　青皮　陈皮各一分　官桂二分　荜澄茄一分　肉果一分　砂仁四钱　良姜五分　白果一钱　白芷二分　甘松四分　广三棱四分　檀香一分　沉香一分　茯苓六分　香附子五分　麝香一分　益智六分　大椒十个　红豆四个　藿香一两

【用法】上为细末，甘草膏子为丸，捻作丁香饼子。

【主治】脾胃不和，气不升降，腹胀肠鸣，反胃吐食，呕吐酸水，不思饮食，心腹痞闷，水谷不消，渐成泄痢，酒食所伤，小儿奶癖。

65438　神仙沉麝丸

《局方》卷三(宝庆新增方)。为《苏沈良方》卷四"沉麝丸"之异名。见该条。

65439　神仙补老丸

《医学入门》卷七。为《寿亲养老》卷四"神仙训老丸"之异名。见该条。

65440　神仙灵宝膏

【方源】《百一》卷十六。

【异名】灵宝膏(《回生集》卷下)、灵宝丹(《疑难急症简方》卷四引《玉历》)。

【组成】瓜蒌五个(取子，细研)　乳香五块(如枣子大，细研)

【用法】上以白沙密一斤同熬成膏。每服二三钱，温酒化下，每日二次。

【主治】发背，诸恶疮。

65441　神仙灵砂丹

【方源】《圣济总录》卷二〇〇。

【异名】灵砂(《局方》卷五续添诸局经验秘方)、灵砂丹(《得效》卷四)、灵砂丸(《医统》卷十四)、灵妙丹(《医宗必读》卷九)。

【组成】水银四两　硫黄一两半

【用法】上先熔开硫黄即投水银，以铁匙炒作青砂子，称定四两，如重再炒，去尽黄乃已；方用煅药盒子一只，口差小者，入青砂在内，用新茶盏一只，底差大，平净而厚者，盛新汲

水七分许，安盛砂盒上，以细罗赤石脂末水拌作泥，厚粘外缝令周密，盒下坐熟火猛炎得所，微扇熵之，盏中水耗旋添，令常有水，约半日许，令火自冷，取出盏底成灵砂一簇，打下称得多少，未尽者再用火依前熵之，砂成以绢袋盛，水煮三五沸，或浸半日，滤干细研如粉，水煮半夏糊为丸，如梧桐子大。每服一丸，空心井水送下。直到中脘，旋下丹田，当觉温暖。

【功用】①《圣济总录》：延年益寿，悦颜色，坚脏腑，壮腰脚，益血固精。②《局方》（续添诸局经验秘方）益精养神，神气明目，安魂魄，通血脉，止烦满，杀邪魅，久服通神，轻身不老。

【主治】①《局方》（续添诸局经验秘方）：五脏百病，营卫不交养，阴阳不升降，上盛下虚，头旋气促，心腹冷痛，翻胃吐逆，霍乱转筋，脏腑滑泄，赤白下痢。②《得效》：痰涎壅盛，诸虚痼冷。

【宜忌】①《圣济总录》：忌羊血。②《局方》（续添诸局经验秘方》：忌猪、羊血，绿豆粉，冷滑之物。

【备考】《局方》（续添诸局经验秘方》本方用法：糯米糊为丸，如麻子大。每服三丸，空心枣汤、米饮、井华水、人参汤任下。

65442 神仙附益丹

【方源】《古今医鉴》卷十一引徐宪副方。

【异名】神仙附益丸丹（《济阴纲目》卷六）、附益类仙丹（《医略六书》卷二十七）。

【组成】香附米一斤（童便浸透，取出，水洗净，露一宿，晒干，再浸，再露，再晒，如此三次，用好醋浸透过宿，晒干为末） 益母草十二两（东流水洗净，烘干为末）

【用法】上用香附四两，北艾一两，煮汁三分，醋七分，将前二味和合为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心、临卧淡醋汤送下。

【主治】妇人不孕，脉涩滞者。

①《古今医鉴》：妇人百病。②《济阴纲目》：血虚不孕。③《医略六书》：无孕，脉涩滞者。

【方论选录】《医略六书》：血凝子络，气滞于经，故天癸不调，不能媾精而孕子焉。香附理血中之气，力能解郁调经；益母调冲任之血，性善生新去宿。艾汤以丸之，温酒以行之，使子宫温暖，则血活气行而经脉融和，天癸如度，岂有不孕之妇乎？

65443 神仙坠痰丸

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】黑牵牛一斤（取头末四两） 皂角（无虫蛀者，去皮弦，酥炙黄色，去子净）一两六钱 白矾一两二钱

【用法】上为细末，清水为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，渐加至百丸，空心温酒送下。病重者，五日、十日一服；病轻者，半月、一月一服。久服永无瘫痪之疾。

【功用】《普济方》：下痰。

【主治】①《瑞竹堂方》：痰壅，胸痞气凑。②《东医宝鉴·内景篇》：痰饮诸病。

65444 神仙妙应丸

【方源】《普济方》卷三八〇。

【组成】槟榔二两 黑白牵牛二两 大黄一两 使君子半两 芜荑半两 雷丸半两 鹤虱半两 干漆五钱半（去烟）

【用法】上为细末，用皂角四两，去皮弦子，切碎，热水浸泡，搓揉，浓水滤过，和面为丸，如粟子大，或粟豆大。随儿大小，每服一二百丸，五更葱白熬汤送下，枣儿压之。次早大便见其得病根源之物。年十岁服二三钱。

【主治】疳脾癥瘕，气积成块，或如小黄瓜，横担腹肚，胁左右青筋明现，腹鼓急，手足瘦小，形貌焦枯黄黑，发直口干，虫积。

65445 神仙鸡鸣丸

【方源】《齐氏医案》卷三。

【异名】鸡鸣丸。

【组成】知母（去毛） 贝母（去心） 杏仁（去皮） 款冬（炒） 甜葶苈（隔纸炒） 甘草 法子 北味（炒） 广皮（去白） 桔梗（炒） 鸡苏（晒） 天冬（去心） 粟壳（炒） 旋覆花 沙参（炒） 东阿胶（面炒珠，无真正者，以黄明胶代之）各一两

【用法】上为极细末，炼白蜜为丸，如弹子

大。每服一丸，用乌梅二枚，大枣三个，泡浓汤，细嚼送下，小儿一丸分四服。或以乌梅、枣肉、白蔻仁各一两，焙干，同前药磨末为丸，生姜汤送下。

【主治】诸般咳嗽。

【临证举例】咳嗽　曾治淯水范三才患咳唾，痰血相兼，治愈已三载。一日忽感风寒，咳嗽，医家误用滋阴之药，酿成吐血不止，此新疾也，先宜发散，继以滋阴方为合法，今误早为滋阴，闭其肺窍，乃勉强以人参败毒散四剂，服之其咳愈剧，遂与鸡鸣丸，令每夜细嚼三五粒，日服补中汤，加麦、味，不数日而咳嗽如失，血亦不吐，遂服六味都气丸而康。

65446　神仙青娥丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八引胡应诚方。

【组成】肉苁蓉(洗)　川牛膝(洗，去芦)　川萆薢各二两　川椒(去目)　山茱萸(取净)　船上茴香各一两(用好酒浸，春夏三日，秋冬六日，滤出，焙干)　川楝子(作四片，麸炒)三两　破故纸四两(麸炒)　胡芦巴(麸炒)　白茯苓(去皮)各二两　附子一只(七钱重者，炮，去皮脐)

【用法】上为细末，用前浸药酒煮面糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，空心盐酒送下；干湿脚气，木瓜汤送下；妇人诸疾血气，煎艾醋汤送下。

【功用】延年不老，乌髭，治口齿，活血驻颜，大壮筋骨，补虚损。

【主治】一切虚损，干湿脚气，妇人诸疾血气，一切小肠气，膀胱疝气。

65447　神仙拈痛散

【方源】《审视瑶函》。

【异名】拈疼散(《眼科阐微》卷四)。

【组成】生明矾(拣上白明透者佳，研极细如粉样)

【用法】上用鸡蛋清共矾粉调匀。以鹅翎毛蘸药搽肿眼胞疼痛之处。如干再搽数次，其痛即止。

【主治】一切暴发火眼，疼痛昼夜不止。

65448　神仙固本酒

【方源】《东医宝鉴·杂病篇》卷九引《仙方》。

【组成】牛膝八两　何首乌(粗末)六两　枸杞子(捣碎)四两　天门冬　麦门冬　生地黄　熟地黄　当归　人参各二两　肉桂一两

【用法】上用糯米二斗，白曲二升，蒸熟和药末，酿如常法。

【功用】令白发变黑，返老还童。

65449　神仙固真丸

《普济方》卷三十三。为《普济方》卷二二六引《十便良方》"固真丹"之异名。见该条。

65450　神仙固真丹

【方源】《百一》卷十五。

【组成】禹余粮　石中黄　赤石脂　紫石英　石燕子各一两(炭火煅通红，以米醋三升淬尽为度)　龙骨(瓦上火煅)　牡蛎(盐泥固济，火煅令白)各一两

【用法】上为末，将白茯苓四两、人参二两、青盐一两为末，人无灰酒适量打糊拌和众药为丸，如鸡头子大，以朱砂为衣。每服二至三丸，食前、空心、临卧酒或盐汤送下。

【主治】遗泄不禁。

65451　神仙固真丹

【方源】《普济方》卷二一九。

【组成】苍术一斤(切片，米泔水浸)　川乌一两(炮，去皮尖，切片)　青盐一两　川楝子(去核)　当归　枸杞子一两　茴香(炒)　破故纸(同术炒黄)　菟丝子(酒浸)　地黄各一两(切细，焙干)

【用法】上为末，同术一斤细末，酒和为丸，如梧桐子大。每服三十丸，男子以酒送下，女子醋汤送下。

【主治】男子元阳气虚，妇人七伤，日渐瘦弱，饮食无味，小肠膀胱清精寒湿，小便并多，妇人胎前产后诸般冷疾，赤白带下血崩，子宫久冷，面色痿黄，四肢倦怠。

【备考】方中川楝子、当归用量原缺。

65452　神仙败毒散

【方源】《摄生众妙方》卷八。

【异名】神仙排脓散（《回春》卷八）。

【组成】大黄一两二钱（酒浸一宿，晒干，为末） 白芷六钱 沉香 木香 乳香 没药 川山甲各五钱

【用法】上各为细末。每用实者不过三钱，虚者二钱半，临睡时好酒送下。服后禁饮食汤水，五更觉腹中疼痛三五度，稀温粥补之，次早大便，不动元阳，只去毒。

【主治】诸恶毒，风毒，疔疮，花疮，小儿恶疮，气滞腹胀，妇人月经不通。

【备考】《回春》：服此药内有穿山甲，恐令人作呕，须慎之，即嚼生葱可止。

65453 神仙钓骨丹

【方源】《古今医鉴》卷十六引徐通府方。

【组成】朱砂一钱 丁香一钱 血竭五钱 磁石五钱 龙骨五钱

【用法】上为末，黄蜡三钱为丸，朱砂为衣。每服一丸，香油煎，好醋吞下；如要吐，用矮荷（即红内消）煎好醋吃，后用浓茶任服。如无矮荷，用桐油代之。其骨自随药带下或吐出。

【主治】骨鲠。

【备考】《济阳纲目》有砂仁。

65454 神仙备急丹

【方源】《魏氏家藏方》卷二引庆元府慈应大师方。

【组成】沉香（略炒） 木香（湿纸裹，炮） 槟榔 白姜（泡，洗） 石菖蒲（酒浸一宿） 朱砂（别研） 牡蛎粉 桃仁（去皮尖，炒，别研） 磁石（火煅，酸醋淬七次，别研，水飞，令极细） 阿魏（酒化） 硫黄各半两（别研） 茴香（淘去沙，炒） 缩砂仁 红豆（炒） 禹余粮石（火煅，米醋淬七次，别研，水飞，令极细） 当归（去芦，炒） 神曲（炒） 附子（炮，去皮脐）各七钱半

【用法】上为细末，研桃仁为膏，和入酒煮阿魏糊丸，如梧桐子大。每服三十丸或四十丸，空心煎姜汤送下。

【主治】脾肾气，时作雷鸣，腹胁胀满，不美饮食，胸膈隘滞，秘利不时，及暴下呕逆。

65455 神仙珍珠散

【方源】《医方类聚》卷八十九引《经验秘方》。

【组成】生朱砂一钱 真麝香半钱 白矾半两 真珠七粒（未穿者尤佳）

【用法】上为细末。每服一钱，百沸白汤一口许调匀服之。

【主治】心脾气疼。

65456 神仙茯苓膏

《圣惠》卷九十四。为《千金》卷二十七"茯苓膏"之异名。见该条。

65457 神仙药应丸

【方源】《普济方》卷八十六。

【组成】陈皮 生地黄（男用熟，女用生） 人参各一钱 母丁香四个 公丁香三个

【用法】上用生姜汁调面饼，裹前药置火内煨，候面熟药香取出，去面，将内药安石臼内，用北枣三十个合舂，分作十丸。先用一丸细嚼，用无灰酒吞下，每日二次。药后将棉被重盖出汗透，旋去被，五日有效。

【主治】一切眼疾。

65458 神仙轻脚丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】远志（去心） 楮实子（炒） 巴戟（去心） 白茯苓（去皮） 五味子（去枝） 杜仲（锉，姜制，炒去丝） 舶上茴香（炒） 菟丝子（淘去泥，酒浸一宿，研成饼） 覆盆子（北地坚实者尤佳） 芡实（干者，去壳） 山茱萸（去核）各一两 干山药 肉苁蓉（酒洗，去皴皮，切片，再用酒浸一宿，焙） 宣木瓜（去瓤，切片，焙） 萆薢各一两半 牛膝（酒浸，锉，再用酒浸一宿，焙干）二两

【用法】上为细末，用北枣肥好不破者二百个，蛇床子四两水煮令熟，去蛇床子，用枣子（去皮核取肉）搜药末杵丸，如梧桐子大。每服三十丸或五十丸，空心温酒送下。

【功用】壮筋骨，延年益气。

【主治】脚弱，不能久行久立。

65459　神仙修真丸

《普济方》卷二二二。即《朱氏集验方》卷八“神仙修真丹”。见该条。

65460　神仙修真丹

【方源】《朱氏集验方》卷八。

【组成】鹿角霜十两　附子五两(炮)

【用法】上为细末，以鹿角胶半升熬化为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒或炒茴香汤送下。

【功用】益精补髓，壮筋骨，明眼目，补暖脏气，去一切风。

【备考】本方方名，《普济方》引作“神仙修真丸”。

65461　神仙保命丹

【方源】《伤科补要》卷四。

【组成】牛黄　冰片五钱　麝香　白芷　穿山甲　蛤粉一两(煅)　乳香　胡椒二两　自然铜二两　大黄四两　没药　归尾　桃仁　苏木　五灵脂　红花　赤芍　木香　五加皮　血竭　青皮　无名异　甜瓜皮各二两(炒)　大戟　千金子(去油净)四两　地鳖虫一升(焙干)　土豆根五钱　山茨菇一两　朱砂五钱

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大，朱砂为衣，再用金箔为外衣，晒干，入瓷瓶内封固，不可泄气。每服一丸，重者二丸，老酒送下。

【主治】跌打损伤，痈疽发背。

【备考】方中牛黄、麝香、白芷、穿山甲、乳香、大戟用量原缺。

65462　神仙保真丸

【方源】《杨氏家藏方》卷十。

【组成】川楝子(去核，炒)一两　蓬莪术(煨，切)半两　肉豆蔻(去核，面裹煨香)　木香半两　槟榔三枚　当归七钱半(焙)　神曲半两(炒香)　茴香(拣选一半炒香，一半生用)半两　附子一两(炮裂，去皮脐，令取细末)　硇砂(光明不夹石者，用无灰酒一大建盏，将硇砂入酒内，于银石器内慢火熬化开，滤去滓，放冷，将附子细末再打糊)三分

【用法】上除附子、硇砂外为细末，将熬下附子、硇砂糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心、食前细嚼炒桃仁七枚，同药用温酒一盏送下，盐汤亦可；如大痛时，并进二服。

【主治】真元不足，脏气虚弱，触冒寒气，闭塞下元，心腹绞痛，自汗厥逆，及奔豚发痛，上下有声，腹急胀。

65463　神仙追毒丸

《外科精要》卷中。为《百一》卷十七“神仙解毒万病丸”之异名。见该条。

65464　神仙追毒丹

【方源】《普济方》卷二五六。

【组成】大黄　芒消　牛蒡各一两半

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大，朱砂、血竭为衣。童子小便化开，空心温酒送下。

【主治】疔疮。

65465　神仙活血丹

【方源】《医方类聚》卷二一〇引《施圆端效方》。

【异名】神仙活命丹(《普济方》卷三三三)。

【组成】当归(焙)　桂　荆三棱　木香　穿山甲(炮焦)　鲤鱼鳞　蒲黄　芍药各一两　水蛭(锉，石灰炒)　虻虫(去头翅足，炒)各半钱

【用法】上为细末，糯米粥为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服十丸，食前温酒送下。

【主治】妇人血气凝滞，月信不来，日渐羸瘦。

65466　神仙活命丹

《普济方》卷三三三。为《医方类聚》卷二一〇引《施圆端效方》“神仙活血丹”之异名。见该条。

65467　神仙活命丹

《温氏经验良方》。为原书“回生丹”之异名。见该条。

65468　神仙活命汤

【方源】《喉科心法》卷下。

【组成】龙胆草二钱　京元参八钱　马兜铃三钱(蜜炙)　板蓝根三钱　生石膏五钱

炒白芍三钱 川黄柏一钱五分 生甘草一钱 大生地一两（当用鲜者） 全瓜蒌三钱 生栀子二钱

【主治】①《喉科心法》：白喉。②《白喉治法抉微》：白喉初起，极疼且闭，饮水即呛，眼红声哑，白点立见，口出臭气者；或已延误二三日，症已危急；或误服表药，现出败象，非轻剂所能挽回者。

【宜忌】此汤太苦寒，非极重之症以及误服禁忌之药渐见败象者不可轻用。

【备考】《白喉治法抉微》本方用法：重者日服三剂，俟病稍减，仍服养阴清肺汤。

65469 神仙活命汤

【方源】《梅氏验方新编》卷一。

【异名】神仙活命饮（《喉证指南》卷四）。

【组成】龙胆草一钱 金银花二钱 黄芩三钱 生地四钱 土茯苓五钱 生石膏三钱 木通二钱 马勃三钱（绢包煎） 车前子二钱 浙贝母三钱 蝉蜕一钱 僵蚕三钱

【用法】上用生青果三个，水煎服，急喉险症，须每日三四剂，少则不效。

【主治】白喉重者，风热喉痛，或红或肿。

65470 神仙活命饮

【方源】《女科万金方》。

【异名】秘方夺命散（《袖珍》卷三）、真人活命散（《痈疽神秘验方》）、仙方活命饮（《校注妇人良方》卷二十四）、真人活命饮（《摄生众妙方》卷八）、神功活命汤（《疮疡经验全书》卷四）、十三味败毒散（《医方考》卷六）、真人夺命饮（《惠直堂方》卷三）、当归消毒饮（《医林纂要》卷十）。

【组成】穿山甲 甘草 防风 没药 赤芍药各一钱 白芷六分 归梢 乳香 贝母 天花粉 角刺各一钱 金银花 陈皮各三钱

【用法】用好酒三碗，煎至一碗半。若上身，食后服；若下身，食前服，再加饮酒三四杯，以助药势，不可更改。

【功用】①《袖珍》：消肿，化脓，生肌。②《寿世新编》：消肿止痛，化脓解毒，散瘀消痰。

【主治】一切热毒痈疽疮疡，红肿热痛，脓已成或未成者。

①《袖珍》：一切痈疽，无名恶疮。②《外科发挥》：一切疮疡，未作脓者，已成脓者，发背，脑疽，鬓疽，臀痈，脱疽，瘰疬，杨梅疮，便痈，囊痈，乳痈。③《保婴撮要》：热毒疮疡；一切疮毒肿痛，或作痒寒热，或红丝走彻，恶心呕吐，痘疔痘毒，痘疮焮痛。④《会约》：疮肿色赤，壮热焮痛。

【宜忌】①《痈疽神秘验方》：忌酸薄酒、铁器，服后侧睡觉，痛定回生。②《外科启玄》：忌豆芽、莱粉、油腻等物。③《医方集解》：若已溃后不可服。

【方论选录】①《医方考》：防风、白芷解表而泄其热；乳香、没药散血而消其毒；穿山甲、皂角刺能引诸药至有毒之处；金银花、赤芍药能解热毒于瘀壅之中；痰中诸热，贝母、天花粉可除；气血不调，甘草、陈皮、当归可疗。②《古今名医方论》：穿山甲以攻坚，皂刺必达毒所，白芷、防风、陈皮通经理气，而疏其滞；乳香定痛和血，没药破血散结，赤芍、归尾以驱血热，而行之以破其结；佐以贝母、花粉、金银花、甘草一以豁痰解郁，一以散毒和血，其为溃坚止痛宜矣。③《医方集解》：金银花散热解毒，痈疮圣药，故以为君；花粉清痰降火，白芷除湿祛风，并能排脓消肿；当归和阴活血，陈皮燥湿行气，防风泻肺疏肝，贝母利痰散结，甘草化毒和中，故以为臣；乳香调气托里护心，能使毒气外出不致内攻；没药散瘀消肿定痛，故以为佐；穿山甲善走能散，皂角刺辛散剽锐，皆厥阴、阳明正药，能贯穿经络直达病所而溃壅破坚，故以为使；加酒者，欲其通行周身，使无邪不散也。

65471 神仙活命饮

【方源】《丹溪心法附余》卷十六。

【组成】金银花一两五钱 皂角刺一两 贝母（去心） 天花粉各四钱 当归尾 滴乳香 大黄各五钱 没药 木鳖子（去壳） 甘草 穿山甲（用蛤粉炒黄，去粉，净） 赤芍药

各三钱　防风(去芦)　香白芷各二钱半　橘皮(去白)一钱半

【用法】每服五钱，水煎服，量病上下服之。

【主治】痈疽，发背、发脑、发鬓、发胁，疖毒，骑毒肿，肚痈，腿痈，附骨痈疽，恶疮，恶漏疮，血块气块，面目手足浮肿。

【加减】老人及体虚者，加生黄耆半两；脏腑闭涩者，服九宝饮。

65472　神仙活命饮

《喉证指南》卷四。为《梅氏验方新编》"神仙活命汤"之异名。见该条。

65473　神仙济阴丹

【方源】《普济方》卷三二八。

【组成】败姜　青皮　陈皮　三棱　蓬术各一两　乌头一升(以上六味先以米醋二升煮，焙干为度)　熟地黄　生地黄　赤芍药　当归　白芍药　刘寄奴　姜黄　肉桂　蒲黄各半两

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前姜酒送下。子宫久冷，或少腹痛，每服三四十丸，细嚼，炒姜酒送下；肠风食毒，下血不住，以槐花、刘寄奴各等分为细末，空心米汤送下。

【功用】常服升降阴阳，温暖血海。

【主治】妇人胎前产后，一切积气，血块，血癥，血瘕，血晕，血虚，血闷，血壅，血崩，血淋，血竭，赤白带下，月事不调，脐腹疼痛，腰膝沉重，干呕恶心，不思饮食，五心烦热，四肢倦怠，或寒热，呕吐酸水，头目晕眩，遍身隐痛，坐卧不安，经络凝滞，荣卫不调，气血虚弱，变成血劳热，面黄肌瘦，梦中惊悸，虚怯盗汗，或产后有失调理，至天阴雨下，浑身疼痛，或子宫久冷，或少腹痛，室女经脉不行，肠风食毒，下血不住。

65474　神仙养气丹

【方源】《传信适用方》卷二引沈德器方。

【组成】代赭石一斤(火煅赤，醋淬十数遍)　紫石英　禹余粮各半斤(火煅赤，米醋淬数遍)　赤石脂半斤(不须醋淬)

上为细末，水飞极细，入坩锅内封口，盐泥固济候干，用炭三十斤煅，火尽为度，再研细如粉。

天雄(炮裂，去皮脐)　附子(炮，去皮脐)肉豆蔻(湿面裹，炮香，去面)　丁香　沉香胡椒　破故纸(炒香)　乳香(别研)　没药(别研)　钟乳粉(别研)各一两　(一方去丁香、胡椒，入当归、血竭各一两)

【用法】上为细末，用粽子入少汤研开为丸，如鸡头子大，或差小亦可。每服三四丸，甚虚者，每服一二十丸，空心温酒或温汤送下。

【功用】补虚养五脏，接气助真阳。

【主治】男子五劳七伤，肾气冷惫，精耗髓竭，耳鸣目眩，腰膝冷痛，小便频数，怔忡健忘，神思不乐；妇人血海虚冷，脐腹疼痛，经候愆期，赤白带下，久无子孕，虽孕不成；及脾胃虚弱，浮肿气满，全不思食，肠鸣切痛，大便滑泄，新病瘥后，气短力微，真气不复，形容憔悴等证属虚寒者。

65475　神仙既济丹

【方源】《魏氏家藏方》卷六。

【组成】人参(去芦)　石菖蒲(米泔浸一宿)　鹿茸(燎去毛，酥炙)　柏子仁　远志(去心)　菟丝子(淘净，酒浸，研成饼)　巴戟(去心)　鹿角胶(酒化旋入)　牛膝(酒浸一宿，去芦)　白茯苓(去皮)　当归(酒浸一宿，去芦)　五味子(去枝)　诃子(炮，去核)　金樱子　生干地黄(洗净)各一两　鹿角霜四两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大，朱砂、麝香为衣。每服三十丸，空心、食前温酒送下。

【功用】令心肾之气互相交养，气血荣盛，精血神全，久服精神健壮，轻身延年。

【主治】日以事物交战，损心劳神，神动气散，兼饮食过度，嗜欲无节，亏损精神，气动神疲，阴阳交错，水火不济，精神恍惚，肢体烦疼，夜梦阴交，遗精白浊，以致气衰血弱。

65476　神仙既济丹

【方源】《摄生众妙方》卷二。

【组成】人参二两五钱 白茯苓二两五钱 当归一两五钱(用身,酒洗) 干山药一两五钱 山茱萸肉一两五钱 川牛膝一两五钱(酒洗) 柏子仁一两五钱 生地黄一两五钱(酒洗,另捣) 杜仲一两五钱(酒制,炒断丝) 枸杞子一两五钱 龙骨末一两五钱(火煅,另研) 菟丝子二两(酒浸,炒,另研) 五味子一两 远志一两(去心) 石菖蒲一两 天门冬一两(汤泡,去心) 麦门冬一两(去心) 熟地黄一两(酒浸,另捣)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服八十丸,空心淡盐汤送下。

【功用】补养。

65477 神仙既济丹

【方源】《古今医鉴》卷七。

【组成】山药(酒蒸)三两 牛膝(酒洗)三两 杜仲(酥炙)二两 巴戟(汤泡)二两 五味子二两 白茯苓二两 枸杞(酒洗)二两 小茴(盐水炒)二两 苁蓉(酒洗)二两 山茱萸(酒蒸,去核,晒干)二两 石菖蒲(去毛)二两 远志(甘草水泡,去骨,晒干)二两 黄柏(酒炒)四两 知母(去毛,酒炒)二两 生地(酒蒸)二两 熟地(酒蒸)二两 麦冬(去心)二两 人参(去芦)二两 菟丝子(酒煮烂,捣成饼,晒干)二两 甘菊(酒洗)二两 山栀子(炒黑)二两 广橘红一两 天冬(汤泡)二两 当归(酒洗)二两 龙骨(火煅)二两

【用法】上为末,炼蜜和枣肉为丸,如梧桐子大。每服七八十丸,空心淡盐汤送下。

【功用】补诸虚百损,五劳七伤,滋肾水,降心火,补脾土,添精髓,益气和血,壮筋骨,润肌肤,聪耳明目,开心益智,强阴壮阳,延年益寿。久服坎离相济,阴阳协和。

65478 神仙退云丸

【方源】《医学纲目》卷十三引李东垣方。

【异名】视仙退翳丸(《脉因证治》卷下),经验神仙退云丸(《直指附遗》卷二十)。

【组成】川芎 当归各一两半 犀角(酒洗) 枳实 川楝 蝉壳 甘菊 薄荷叶(不见火)各半两 瓜蒌仁(生者)六钱 蛇蜕 蜜蒙花 荆芥穗各二钱(此三味与甘草同焙干,去甘草不用) 地骨皮(洗) 白蒺藜(微炒,去刺) 羌活 生地(酒洗,焙干)各一钱 川木贼一两半(去节,童便浸一宿,焙干)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每一两分作十丸。日进二三丸,食后米泔汤调服;妇人,当归汤送下;有气者,木香汤送下。

【主治】①《医学纲目》引李东垣:一切翳晕,内外障,昏无睛者。②《医钞类编》:阴虚有热,眼生翳膜。

65479 神仙退云丸

【方源】《医方类聚》卷七十引《经验秘方》。

【组成】白蒺藜一两半(炒) 川椒一两半(炒) 川芎一两半 当归一两半 楮实半两 黄连半两 蝉壳半两 薄荷叶半两 瓜蒌根六钱 地骨皮一两 甘草花 荆芥 密蒙花 蛇蜕各三钱(以上四味用甘草先熬,水浸过,焙干) 蔓荆子二两(炒) 木贼二两(去节,用童子小便浸二宿,焙干)

【用法】上为细末,炼蜜为丸,每两作十丸。每服一丸,每日二次。眼睛青盲者,当归汤送下;气障眼,木香汤送下;眼常昏者,好酒送下;头风眼昏,茶汤送下;小儿痘疮成翳,谷精草汤送下。

【主治】眼睛青盲,气障眼,眼常昏,头风眼昏,小儿痘疮成翳。

65480 神仙退云丸

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十二。

【组成】酒当归一两半 木贼草(去节,童便浸,焙) 川芎 荆芥穗 密蒙花 地骨皮 甘菊 白蒺藜 羌活各一两 川椒七钱半 蔓荆子 花粉 枳实 薄荷 草决明 炙甘草各五钱 蛇壳 蝉壳 黄连各三钱

【用法】蜜为丸,每两作十丸。

【主治】赤脉翳,初从外眦入内者。

65481 神仙退风丹

【方源】《百一》卷十。

【组成】知母　贝母　乌梅肉　海桐皮　金毛狗脊(去毛)各等分

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、日中、临卧各一服。每夜第一次睡觉时，急于头边取三十丸便服，并用羊蹄根自然汁送下。一百日皮肉渐皆复旧。

【主治】大风疾。

【宜忌】大忌酒、房事及一切发风之物，只吃淡粥，半年后无所忌。

65482　神仙退翳丸

《脉因证治》卷下。为《医学纲目》卷十三引李东垣方"神仙退云丸"之异名。见该条。

65483　神仙索金丹

《普济方》卷三五五。为《医方大成》卷九引徐同知方"神仙索金散"之异名。见该条。

65484　神仙索金散

【方源】《医方大成》卷九引徐同知方。

【异名】神仙索金丹(《普济方》卷三五五)。

【组成】金藤　川牛膝　当归　川芎　麻黄　玄胡索(炒)　官桂　神曲　荆芥　粉草　赤芍药　熟地黄　雄墨豆各二两

【用法】上为末。温酒或当归、童子小便任下。

【功用】逐恶血，生新血，止肚痛。

【主治】妇人产后，血晕血虚，血积不散，寒热往来，膈不快，气喘，不进饮食，骨节疼痛，生血肌疮。

65485　神仙换肌丸

【方源】《外科大成》卷四。

【组成】蝉蜕(焙)　僵蚕(焙)　防风　片芩(酒炒)　何首乌各一两　栀子(酒炒)八钱　白芷八钱　荆穗七钱　羌活七钱　地肤子五钱

【用法】上为末，酒糊为丸，如绿豆大。每服三二十丸，茶清送下。

【主治】皮肤风热，如蚤虱叮咬，痒不可忍。

65486　神仙换骨丸

《中国医学大辞典》。为《解围元薮》卷三"神仙换骨丹"之异名。见该条。

65487　神仙换骨丹

【方源】《医学启源》卷中。

【组成】槐角(炒黄熟)　桑白皮(去皮)　川芎　苍术(泔浸，去皮)　白芷　蔓荆子(去花)　人参　威灵仙　何首乌　防风各二两　苦参　五味子　香附各一两　麝半两(别研)　麻黄十斤

【用法】将麻黄去根、苗、节，用河水三石三斗三升，熬至六升，滤去麻黄，澄清，再熬至二升半，入其余药末，每一两三钱作十丸，朱砂为衣。每服一丸，以酒一盏浸至晚令溶化，临卧服。

【主治】气血凝滞，荣卫郁结，风热湿气相搏筋骨之间，内舍偏虚，发为不遂之病，气感八风，血凝五痹，筋挛骨痛，瘫痪偏枯，一切风证。

65488　神仙换骨丹

【方源】《解围元薮》卷三。

【异名】神仙换骨丸(《中国医学大辞典》)。

【组成】大黄　白芷　槐花　川芎　防已各一两　乳香　没药　木香　沉香各三钱　苍术二两　细辛　苦参各一两五钱　紫萍三两　麝香五分　草乌一两一钱(五钱炒，三钱生，三钱炒黑)　(一方去苍、麝，加当归、防风、花蛇、木鳖子)

【用法】上为末，用去节麻黄半斤煎膏加蜜为丸，如弹子大，约重二钱，朱砂为衣。每服一丸，临卧葱酒磨服。

【主治】鼓槌风，软瘫，干风瘸瘟，麻木痿困倦败。

【宜忌】避风。

65489　神仙换骨丹

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】菟丝子(酒制)五钱　破故纸(酒炒)二钱半　金铃子(酒蒸，去核)五钱　川续断五钱　胡芦巴(酒炒)五钱　远志(甘草水泡，去心)五钱　五味子二钱半　鹿茸(酥炙)二钱半　龟版(酥炙)五钱　甘松五钱　杜仲(酒和姜汁炒)五钱　山柰二钱半　益智仁

（炒）五钱 柏子仁（炒）五钱 防风（去芦）五钱 杏仁（去皮尖）五钱 木通五钱 滑石（酥炙）五钱 三棱（煨）二钱半 莪术（煨）五钱 韭子一钱半 地骨皮五钱 五加皮五钱 何首乌二钱半 牡丹皮五钱 青藤五钱 石楠藤五钱 紫金皮一钱半 木贼五钱 海桐皮五钱 红豆五钱 白蒺藜（炒）五钱半 乳香二钱半 没药五钱 龙骨（煅）三钱 虎胫骨（酥炙）五钱 血竭二钱半 朱砂一钱半 麝香一钱三分 自然铜（煅）三钱 黄芪（蜜炙）五钱 人参五钱 白术二钱半 粟壳（去瓤秸，炒）五钱 川芎五钱 赤芍五钱 白芍五钱 红内消二钱半 熟地黄（酒蒸） 茯苓二钱半 茯神二钱半 苍术（米泔浸）五钱 陈皮五钱 乌药二钱半 香附五钱 当归（酒洗）二钱半 枳壳五钱 枳实五钱 白芷五钱 厚朴（姜汁炒）二钱半 麻黄二钱半 吴茱萸五钱 大茴二钱半 小茴（酒炒）二钱半 荆芥五钱 羌活五钱 独活五钱 牛膝（酒洗）五钱 木瓜五钱 半夏（姜制）五钱 南星（姜制）五钱 僵蚕（炒）五钱 全蝎（酒洗）二钱半 天麻二钱半 细辛二钱半 藿香五钱 干姜五钱 良姜五钱 川乌（姜炒）二钱半 巴戟（去心）五钱 青盐二钱半 肉桂五钱 附子（姜炒）二钱半 连翘五钱 桔梗五钱 青皮五钱 天雄（姜炒）二钱半 草果二钱半 丁香二钱半 砂仁五钱 肉苁蓉（酒洗）五钱 肉豆蔻（去油）二钱半 白豆蔻二钱半 木香二钱半 甘草（蜜炙）二钱半

【用法】上为末。每服二钱，好酒研入生姜调服，用鸡子压之。新疼，用被盖出汗；如伤损肿痛，用生姜、葱白、生地黄各五钱，红糟一碗，研捣取汁，入香油一碗，和匀，将木梳烘热，蘸药末放伤处，即服前药。

【主治】一切虚损疼痛，伤损肿痛。

【备考】方中熟地黄用量原缺。

65490 神仙秘诀丸

【方源】《普济方》卷一九二。

【组成】酸皮 青皮 陈皮 三棱 巴豆 五灵脂 大黄 神曲 乌梅 大戟 芫花 甘遂 葶苈 杏仁 淡豆豉各一两

【用法】上㕮咀，炒烟微起，为细末，醋糊为丸，如绿豆大。每服七丸，量虚实加减，五更生姜汤送下；百物所伤，仍用伤物汤送下。

【主治】水气浮肿，黄疸。

【宜忌】忌甘草。

65491 神仙秘宝丹

【方源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】白花蛇头一枚（酒浸三日，焙干） 乌蛇头一枚（酒浸三日，焙干） 赤足蜈蚣二条（酒浸三日，炙） 附子一枚（重六钱者，炮，去皮脐） 白花蛇项后肉（离项七寸后取二两，酒浸三日，去皮骨，焙干）七钱 朱砂六钱（别研，纳二钱入药，四钱为衣） 白僵蚕半两（直者，炒，去丝嘴） 雄雀一枚（去毛肛肠，入硇砂一钱，用泥固济，晒干，用文武火煅，青烟出为度，别末） 全蝎（去毒，炒） 天麻（去苗） 天南星（炮） 人参（去芦头） 沉香各半两 五灵脂八钱（炒，别末） 川芎 脑子（别末） 乳香（别研） 没药（别研） 牛黄（别研） 血竭 麝香（别研）各一钱

【用法】上为细末，入脑子等末，拌研极匀，用好无灰酒和丸，每一两作十五丸，朱砂为衣。每服一丸，空心温酒磨下；小儿急慢惊风者，以一丸分作四服，薄荷汤磨下。

【主治】一切中风，左瘫右缓，手足亸曳，牙关紧急，口眼㖞斜，语言謇涩，昏塞如醉，或痛连骨髓，或痹袭皮肤，瘙痒顽痹，血脉不行，及小儿心肺中风，涎潮抽搦，妇人产后中风。

【备考】方中硇砂，《普济方》作"硼砂"。

65492 神仙透空丸

【方源】《洪氏集验方》卷三。

【组成】天麻一两（洗） 香白芷一两 半夏一两（生用） 天南星一两 干姜四钱（生用） 川芎二两（洗） 地龙半两（捶，洗，去土净） 川乌一两（生用，去皮尖） 草乌一两（生用，去皮尖） 细辛半两 甘草二两（生用） 白附子半两

【用法】上为细末，以药末一两入白面一两，用新汲水为丸，每一两分作十丸，于新板上排定，日内晒干，如合，须是伏中合。

【主治】偏正头疼，恶心；产后体虚伤风，憎寒头痛，洗头沐浴伤风，壮热头痛，痰厥头痛，肾厥头痛，虚眩，项筋紧急等一切头痛。

65493　**神仙透骨丹**

【方源】《永类钤方》卷二十二。

【组成】当归四两　川独活三两　乳香　白胶半两(熔过用)　生熟地黄各一两　自然铜(醋淬)半两　侧柏叶四两(酒蒸，焙)　肉桂半两　石楠藤二两

【用法】上为细末，糯米糊为丸，如弹子大，国丹为衣。每服一丸，炒松节或番降节酒送下。看损上下服；亦可丸如梧桐子大，每服三十丸，前药加松条节、好土朱、荆芥、桔梗各二两；治脚气入骨痛，木瓜浸酒，黑豆炒烟起浸酒服。

【主治】骨断八分，脚气入骨痛。

【备考】方中乳香用量原缺。

65494　**神仙透骨丹**

【方源】《济阳纲目》卷七十五。

【组成】小茴香　胡椒(炒)　破故纸各二两　杜仲(炒)　白牵牛　黑牵牛各一两　川乌(炒)三两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，白汤送下。

【主治】腰腿痛不可忍。

65495　**神仙透膜汤**

【方源】《疮疡经验全书》卷四。

【组成】红曲(酒席中染色者，南货店有之)三钱　红花一钱　人参二钱　穿山甲(炮)二钱　蝉蜕一钱　黄耆一钱五分　白术(土炒)一钱　当归头七分　甘草五分　肉桂五分

【用法】水一钟，加姜、枣各三枚，大米一撮，煎服。

【主治】痘发不起。

65496　**神仙消痞丸**

《普济方》卷三九一。即《局方》卷十(续添诸局经验秘方)"秘传神仙消痞丸"。见该条。

65497　**神仙通气散**

【方源】《广嗣要语》。

【组成】蛤蚧一对(要全者，炙)　母丁香二钱　沉香二钱　胡椒五钱　大茴香五钱　广木香三钱　麝香一钱

【用法】上为细末，用大淡虾米一斤，净取半斤，用好烧酒半杓浸透，滚药末在上，入瓷罐盛之，再加好烧酒入罐浸之，慢火煮六七个时辰，候冷定取出，晒干收贮，勿令出气。行房时用好酒送下二三枚，后用淡醋汤解之。

【功用】广嗣。

65498　**神仙通隘散**

【方源】《寿世保元》卷六引贾兰峰方。

【组成】白硼砂二钱　孩儿茶一钱　蒲黄六分　青黛一钱　牙消六分　枯矾六分　白滑石一钱　片脑二分　黄连末五分　黄柏末五分

【用法】上为细末。吹喉中。

【主治】咽喉肿痛，生疮声哑，危急之甚，及虚劳声嘶喉痛。

【备考】《齐氏医案》无"白滑石"，有"潮脑"二分。

65499　**神仙黄矾丸**

《外科精要》卷上。为《备急灸法》"矾黄丸"之异名。见该条。

65500　**神仙排脓散**

《回春》卷八。为《摄生众妙方》卷八"神仙败毒散"之异名。见该条。

65501　**神仙接骨丹**

【方源】《朱氏集验方》卷十三。

【异名】神仙接骨膏(《普济方》卷三一五)。

【组成】黄丹(飞过)　密陀僧　自然铜各四两　辰砂　血竭　乳香　没药各一两　黄蜡　白矾(飞过)　腊月猪脂各十三两

【用法】上用新锅子先下脂溶，滤去筋膜，次下蜡，成油，去锅于冷处，再下密陀僧、黄丹，自然铜末，以慢火煎至滴水不散，便出锅子冷处；下诸药，用柳木篦子搅匀，入瓷器中，

再不住手搅至凝为丸，如弹子大，候极冷收入通油新瓷盒内，永不败坏。每服一弹，作十五丸，热葱酒吞下；如已绝不能吞，即以热葱酒磨灌，但下喉即自省人识痛，病人痛亦定，仍取十丸，入少油火炙软，摊于帛上，贴痛伤处；如伤损处大，用二丸以上。此药不沾粘肉，即以寻常胶粘膏药。

【主治】一切折伤，不问内外轻重，虽已无气，但心头尚暖者。

【备考】方中辰砂、血竭、乳香用量原缺，据《普济方》补。

65502 神仙接骨丹

【方源】《疡科选粹》卷八。

【异名】接骨丹（《伤科汇纂》卷七）。

【组成】自然铜（烧红醋淬七次） 古塚铜钱（火煅醋淬）各等分

【用法】上为细末。伤重者每服一二分。多服则骨突出矣。

【主治】跌伤骨折。

65503 神仙接骨膏

《普济方》卷三一五。为《朱氏集验方》卷十三“神仙接骨丹”之异名。见该条。

65504 神仙救人丸

【方源】《魏氏家藏方》卷十。

【组成】风化石灰一钱一字 泥矾三钱一字 真胆矾（枯） 白矾 腻粉各二钱

【用法】上为极细末，入脑子、轻粉少许，再研。先用汤洗两腋，却以药末一钱，浓米醋调，涂之。三五次即可除根。

【主治】体气，不问三二十年者。

65505 神仙救生散

《观聚方要补》卷十。即《本草纲目》卷二十三引《全幼心鉴》“神仙救苦散”。见该条。

65506 神仙救苦丸

【方源】《回春》卷二。

【组成】麻黄（去节，研细，热水浸，取汁） 甘草（炙，去皮，温水浸，取汁）各四两 赤芍（洗去土，温水浸，取汁）四两 朱砂一两五钱（红大颗者，研细，水飞过） 雄黄（去夹石，红朗大颗者，研细，水飞过）一两五钱 升麻（微炒，研细，温水浸，取汁） 人参（去芦，研碎，温水浸，取汁） 当归（用身，研细，水浸，取汁） 柴胡（研碎，温水浸，取汁）各一两

【用法】上各阴干，共盛一处，用温水搅匀，以细绢滤过三遍，将汁盛于瓷罐内，上以绵纸固之，置之不近湿、不通风处，仍阴干取下为细末，停分两处，临后时一半入石膏（研细，水淘净）、枳实（研细，温水浸，取汁）各五钱（春、夏用）；一半入桂枝（研细，温水浸，取汁）、细辛（研细，温水浸，取汁）各五钱（秋、冬用），醋糊为丸，如黍米大。每服一丸，以好鲜明雄黄五分于碗内研细，人井花凉水与药同研送下，水洗雄黄，务要吃尽。药后焚香三寸，自然汗出立愈。如伤寒汗后变为杂症者，每服二丸，内外兼表，仍出汗自愈。

【主治】四时伤寒，不论日期远近，阴阳表里，内外虚实，半表半里，男女老幼。

65507 神仙救苦丹

【方源】《万氏家抄方》卷四。

【组成】川椒二斤半（拣去枝目闭口者）

【用法】先将釜一口覆于地上，四围用刀划记，取去釜，用炭火烧红其地，将米醋泼地，用纸摊椒在上，以釜盖之，良久取出，用炼蜜一斤四两，调椒末成膏为丸，如梧桐子大。每服十五丸，半年加至二十丸，一年后加至二十五丸，清晨温酒送下。

【主治】五劳七伤，诸虚百损及虫积。

【宜忌】忌五辛。

65508 神仙救苦丹

【方源】《寿世保元》卷八引益藩方。

【组成】白附子五钱（山东者佳） 天竺黄二钱 全蝎二钱 胆星一两 僵蚕（炒）一两 肉豆蔻五钱 诃子（面包煨，去核）五钱 麝香一分 射干五钱 蒲公英五钱 朱砂一钱 雄黄二钱 川黄连二钱

【用法】上为细末，煎膏为丸，如龙眼大，金箔为衣。滚水化下；如痘初出，葱白汤送下。

【主治】痘初起，三五日热不出，又泻又嗽，

喉咙痛,腰痛,或痘或惊,惊风泄泻,咳嗽痰喘。

65509 **神仙救苦散**

【方源】《医方类聚》卷七十三引《医林方》。

【组成】盆消一钱 骷髅石(烧)一钱 没药少许 良姜一钱

【用法】上为细末。临用加乳香少许,噙水,搐鼻。

【主治】头疼牙痛。

65510 **神仙救苦散**

【方源】《本草纲目》卷二十三引《全幼心鉴》。

【组成】罂粟壳半两(醋炒,为末,再以铜器炒过) 槟榔半两(炒赤,研末)

【用法】上药各收,每用等分,赤痢,蜜汤送下;白痢,砂糖汤送下。

【主治】小儿赤白痢下,日夜百行不止。

【备考】本方方名,《观聚方要补》引作"神仙救生散"。该书本方用法:赤白痢,砂糖、蜜同煎汤,食前调化服。

65511 **神仙救命丹**

【方源】《疮疡经验全书》卷二。

【组成】珍珠一钱 麝香一钱 冰片三分 胆星末五钱 枳实一钱 蟾酥六分 蛤粉一钱 巴豆霜五分 全蝎末一钱 甘草末一钱

【用法】上各为细末,和匀,米粉糊为,如梧桐子大。每服二三钱,空心或酒或蜜汤送下。其痰从大便中出尽为度,如不行再服,即行,以薄粥补之。

【主治】痰注。六气七情所感,痰不能流行,结于一处,伏行经络之间,背生痰注,其形或圆或歪或如米袋,坚硬如石。

【宜忌】硬处活动如绵,人参内托散服大半,方可服此下行药,否则有损无益。宜清心寡欲,戒恼免忧,忌油腻、生冷、蒜茄等物。

【备考】如泻不止,另用甘草七分,黄连一钱五分、苍术(炒)二钱、白术二钱(土炒)、猪苓、泽泻各一钱、车前子、炒芍、炒芩、茯苓各一钱五分、人参、莲肉各二钱,水二钟,姜三片,枣二个,水煎服,即愈。

65512 **神仙救命丹**

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】龙头草(水洗净,晒干,好酒拌蒸,晒干,为末)一钱 人中白(年久者,煅)三钱 珍珠 蟾酥 雄黄各一钱 寒水石五钱 辰砂 石膏各二钱 牛黄 麝香 冰片各五钱

【用法】上为末。每服一钱,犀角磨水调下。

【功用】退火解毒。

【主治】火证危痘。

65513 **神仙常春散**

《普济方》卷七十。为《瑞竹堂方》卷三"神仙长春散"之异名。见该条。

65514 **神仙减水法**

【方源】《普济方》卷一七九。

【异名】斩龙剑子手。

【组成】人参 知母 天花粉 苦参 宣连 扁豆 浮萍 麦门冬各一两 黄丹少许 黄耆一两

【用法】上为细末。每服一钱,新汲水调下。

【主治】三焦虚热,三消渴疾,不问日夜,饮水无度。

65515 **神仙断下丸**

《永类钤方》卷十三引《管见大全良方》。本方中有"黄连断下丸"、"木香断下丸"、"香连断下丸"。各详专条。

65516 **神仙琼玉膏**

《观聚方要补》卷二引《卫生家宝》。为《洪氏集验方》卷一引铁翁先生方"琼玉膏"之异名。见该条。

65517 **神仙楮实丸**

《宣明论》卷十二。为《圣惠》卷九十八"楮实丸"之异名。见该条。

65518 **神仙雄黄丸**

【方源】《圣济总录》卷一九九。

【异名】雄黄丸(《医统》卷四十六)。

【组成】雄黄 松脂各等分

【用法】先择雄黄如鸡冠色,不杂砂石者,研为极细末,次以松脂和为丸,如弹子大。每

服一丸，每旦以酒研送下。服至十日，腹中三尸百虫自下，面上紫黑皆除；服至一月，百病自愈，耳目聪明。

【功用】去三尸百虫，美颜色，明耳目。

65519 神仙紫花丸

【方源】《医学正传》卷六。

【组成】白花蛇（一具，出蕲黄州，黑质白纹，龙头虎口，背上二十四个方胜花，尾尖有一佛指甲，新鲜者佳，蛀腐者不堪用，去头尾各四五寸，并一两为率，连皮骨用）一两五钱　何首乌　荆芥穗　威灵仙各四钱　麻黄（连根节）二钱　胡麻子一钱　蛇床子二钱

上细切，同蛇用无灰酒一大碗，浸一宿，去蛇皮骨，通晒干，仍还原酒内，再浸再晒，酒尽为度，待晒极干，共为细末，另包。

木香　沉香各二钱五分　人参一两　当归七钱五分　明天麻　猪牙皂角各五钱　麝香一钱五分　乳香　没药各一钱　明雄黄　辰砂各五分（大块者佳）　肉豆蔻一枚（煨）　定风草（即天麻）二钱半　还瞳子（即草决明）一两

上麝至辰砂五味，各另研极细，不见火，其余草木味亦另研，细罗过，连前五味和匀另包。

防风（去芦）　羌活　甘草　细辛　川芎　独活　苍术（米泔浸一宿）　枇杷叶（去毛筋，焙干）　白芍药　白蒺藜　金银花　五加皮　香白芷　苦参各五钱　胡麻子　白附子（米泔浸，炒）　麻黄　川牛膝　草乌头（米泔浸，炮）　川乌（米泔浸，炮）　石菖蒲各二钱五分

上为细末，另包。

【用法】用新鲜大枫子三斤，去油黄色者及壳，以瓷罐一个盛之，少入无灰酒，以皮纸竹箬重重包口，勿令泄气，顿滚汤中，勿令没罐口，外以物盖锅口，密封固，文武火蒸，候黑烂为度，杵无渣滓成油，分作三份；每一份入第二号药八钱重，第一号药六钱重，第三号药一两五钱重，和匀，加糯米饭捣极胶粘为丸，如梧桐子大，晒干，勿见火。每服二十丸，渐加至五六十丸，鸡鸣时、午时、临卧时各一服，茶清送下。轻者，一料可愈；重者，二三料除根。

【主治】①《医学正传》：疠风及诸般恶疮，风疮。②《中国麻风病学》：麻风，麻木不仁，筋脉枯萎。

【宜忌】忌房劳，咸酸，酒醋，糟腌，猪羊鸡马驴肉，鱼腥煎煿，水果，五辛，姜椒大料，辛辣热物，荞麦绿豆之类，其余肉味，病愈后一年可食，但猪羊鸡肉，终身用忌。

【加减】鼻塞声重者，麝香倍用。

【备考】《疡医大全》有赤芍、牛蒡子、石决明、无白芍药、川牛膝、草决明。

65520 神仙紫金丸

【方源】《产宝诸方》。

【组成】生地黄三两（大而圆者，以新铫子盛，用炭火一秤煅通赤，钳铫子出火，急倾入醋二升，候冷取，研如粉）　针砂五两（真者，水淘净，控干，入生铁铫子同禹余粮三两一处，用酽醋二升煮，醋干，并铫子用炭火一秤煅赤，倾在净地上冷，研如粉）　羌活　木香（炒）　白茯苓（去皮）　牛膝（去苗，酒浸一宿，焙干）　川芎　肉豆蔻（炮）　舶上茴香　蓬莪术（炮）　白术（炒）　桂（去皮）　干姜（炮）　青皮（去白，炒）　京三棱（炒）　陈皮（去白）　白蒺藜　附子（炮制）　当归（去芦须，浸，炒）各半两

【用法】上为细末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心、食前温酒或白汤送下。虚人壮人均用诸药，壮入减半，病自小便去后，每日一服，别以温和调气补脾胃血气药将理。

【功用】逐阴固阳，扶危正命。

【主治】十种水气，足膝浮肿，上气喘满，小便不利者。

【宜忌】忌盐数月。

65521 神仙紫金锭

《济阳纲目》卷九十。为《丹溪心法附余》卷二十四“太乙神丹”之异名。见该条。

65522　**神仙紫金膏**

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】生姜一斤半(和皮细锉)　皂角四两(不蛀者,细锉)　细辛(去叶土)一两　香白芷一两(锉)

【用法】上捣烂为膏,用河水调和得所,将铁铫子先用猪脂擦铫子内后方入药,以碗盖定,用湿纸条塞碗缝,然后用纸筋泥固缝,不令出气,慢火养一伏时,以手按碗足上,常以通手为度,取出研细,入瓷器收。每用杖子挑药少许,于白髭处熟擦令热,即摘去白髭,用药再擦,肉热即止。后生黑者,永不变白。

【功用】乌髭鬓。

65523　**神仙紫霞丹**

【方源】《普济方》卷二六五引《余居士选奇方》。

【组成】朱砂一两　天南星、半夏各等分(为末)

取一小粉盒子,先将前末药一钱铺在下,再安朱砂放中,上又以末药一钱盖头顶,次用赤石脂(为末)水调糊缝口,外用铁线扎定,以六一盐泥固济,厚一寸许,六七日后先以慢火养半日,后用火煅通红为度,候冷取出,研为末。次用:

禹余粮四两　钉头代赭石二两　紫石英一两(上用火煅通红,以好醋淬七遍)　赤石脂三两(生用)　硫黄(醋煮干)一两　附子二个(炮制,去皮脐)　海螵蛸一两(去壳)

【用法】上为细末,再用乳钵研无声为度,次用新糯米粽烂研为丸,如黍米大,盛于新布袋中,将桂府滑石打作片子,同药打光,瓷盒盛之。每服二至五丸,空心煎浓枣汤送下。

【功用】久服壮元阳,益真气。

【主治】妇人子宫久冷,血海虚惫。

【宜忌】忌猪、羊血。

65524　**神仙紫霞杯**

【方源】《遵生八笺》卷十七。

【组成】硫黄八两　雄黄五钱　乳香三钱　没药三钱　辰砂五钱　血竭二钱　沉香二钱　麝香三钱　檀香三钱　降香一两　牙香二两　茅香一两　人参　附子　川乌　川芎　当归　肉桂　破故纸　肉苁蓉　黄精　白芷　枸杞　芍药

【用法】上㕮咀,先用油一斤浸诸药三二日,次将药熬煎至焦黑色,滤去滓;再复油锅化溶硫黄,倾出上面清油,却将锅底硫黄倾入水盆内,洗去泥土砂石,仍将原油化硫黄,周而复始三次,又倾出上面油,存黄,另倾出称,每一两硫黄,用铜勺化开,入前麝香末三分,搅匀;先以小酒杯一个,用纸封口紧,中开一孔,将化开硫黄药倾入酒杯内一荡,做酒杯一只,如此倾做数个(做法如浇响糖相似),令定。酌酒用。

【功用】令百病消,身体健,返老还童。

【备考】方中人参、附子、川乌、川芎、当归、肉桂、破故纸、肉苁蓉、黄精、白芷、枸杞、芍药用量原缺。

65525　**神仙黑散子**

《小儿病源》卷一。为《圣惠》卷八十二"黑散子"之异名。见该条。

65526　**神仙感应丸**

【方源】《济阴纲目》卷十四。

【组成】神曲(炒)三钱　人参　枳壳(麸炒,去瓤)各一钱　赤石脂　熟地　白术各二钱

【用法】上为细末。每服三钱,空心米饮调下。三二服立止。

【主治】产后因食荤味早而作泻痢者。

【宜忌】如不因食荤者,不可服。

【方论选录】食荤早而致泄者,脾胃必薄,故用参、术。而神曲为化食之用,枳壳佐之,赤石脂固之,是矣。而熟地何为也?大抵肾者胃之关也,产后肾虚不能固,故用之欤。

【备考】本方方名,据剂型,当作"神仙感应散"。

65527　**神仙照水膏**

《三因》卷十六。为《圣济总录》卷一一一"水

照丸”之异名。见该条。

65528 神仙解毒丸

【方源】《医方类聚》卷一六四引《急救仙方》。

【组成】青黛 自然铜 野茨菇（田内生者） 贯众 川芎 尘粉壁土 黄连 桃根（去皮，用骨，焙干，别研） 槟榔 赤小豆 绿豆 新砖 新瓦（砖瓦须用新出者，经水者，先置厕中浸二七，又于流水中浸二七，晒干，别研）各二两 甘草节一两

【用法】上为末，用锡器磨水和药，却用糯米粉煮落汤糍为丸（煮糍时，以在水中浮为度），如弹子大，磨水服。

【功用】解毒。

65529 神仙解毒丸

《医方类聚》卷一九六引《王氏集验方》。为《百一》卷十七“神仙解毒万病丸”之异名。见该条。

65530 神仙解毒丸

《普济方》卷二五一引《经验良方》。为《得效》卷十“神效解毒丸”之异名。见该条。

65531 神仙解毒丸

【方源】《回春》卷八。

【组成】白矾不拘多少

【用法】上溶化作丸，如绿豆大，朱砂为衣。每服十丸，用连须葱七八根，水煎至二碗送下。汗出立愈。已成者不伤，未成者即消。

【主治】一切疔疮，发背，鱼口，诸般恶疮，无名肿毒初发。

65532 神仙解毒丹

【方源】《宋氏女科》。

【组成】茯苓 远志 全蝎 僵蚕 羌活 防风 荆芥各一钱 胆星二钱 石菖蒲二钱 汉防己八分

【用法】上为末，面糊为丸，辰砂为衣。每服五十丸，薄荷汤送下。

【主治】产后诸症，不能言语者。

65533 神仙解语丹

【方源】《妇人良方》卷三。

【异名】解语丹（《永类钤方》卷十一）。

【组成】白附子（炮） 石菖蒲（去毛） 远志（去心，甘草水煮十沸） 天麻 全蝎（酒炒） 羌活 白僵蚕（炒） 南星（牛胆酿，如无，只炮）各一两 木香半两

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大，量入辰砂为衣。每服二十至三十丸，生姜、薄荷汤吞下，不拘时候。

【主治】心脾经受风，言语蹇涩，舌强不转，涎唾溢盛；及淫邪搏阴，神内郁塞，心脉闭滞，暴不能言。

65534 神仙解语丹

《杂病源流犀烛》卷十二。为《医学纲目》卷十引王海藏方“解语丸”之异名。见该条。

65535 神仙辟温汤

【方源】《鸡峰》卷五。

【组成】黄明乳香一小块

【用法】每年腊辰前一日，用乳香合聚子乳钵内，顺日研极细，于腊日五更初起旋汲井花水，先取数滴在乳钵内，香末如泥，然后添水调匀。五更每人呷一茶脚许，老小任意加减。

【功用】辟温，服之无疫疠之疾。

65536 神仙碧玉膏

【方源】《外科正宗》卷三。

【异名】碧玉膏（《医部全录》卷三七六）。

【组成】轻粉一两 杭粉一两 白占五钱 乳香 没药各三钱 樟冰二钱

【用法】用公猪净熟油五两，同白占熬化，倾入碗内，入上药和匀，水内顿一时取起。临用抿脚挑膏，手心中捺化，摊油纸上，用葱汤洗净疮，对患贴之。

【主治】①《外科正宗》：结毒溃烂臭秽，疼痛不敛，及风臁等疮。②《医部全录》：冻风。皮肉损烂，脓水淋漓，痒痛不止者。

65537 神仙碧霞丹

【方源】《御药院方》卷十。

【异名】碧霞丹（《广笔记》卷三）。

【组成】铜绿一两半（为衣） 当归 没药各二钱 白丁香 血竭 片脑 硼砂 麝香

各一钱　马牙消　南乳香各半钱　黄连三钱

【用法】上为细末,熬黄连膏子为丸,如鸡头子大。每用一丸,用新汲水半盏,于瓷盒子内浸,点眼,可洗四十日。大病不过一月,小病半月,冷泪三日见效。

【主治】①《御药院方》:目内障。②《广笔记》:内外障,暴赤眼,眵泪,昏花,翳膜。

65538　**神仙碧霞丹**

《东医宝鉴·杂病篇》卷七为《百一》卷十一"碧霞丹"之异名。见该条。

65539　**神仙聚宝丹**

【方源】《女科百问》卷上。

【异名】琥珀朱砂丸(《济阴纲目》卷三)、聚宝丹(《女科秘要》卷一)。

【组成】木香(研令末)　琥珀(别研)　当归　没药(别研)各一两　滴乳一分(别研)　麝香一钱(别研)　辰砂一钱(别研)

【用法】上为细末,和滴冷熟水为丸,每两作十五丸。每服一丸,温酒磨下。胎息不顺,腹内疼痛,一切难产,温酒和童便磨下,不拘时候;产后血晕,败血奔心,口噤舌强,或恶露未尽,发渴面浮,煎乌梅汤和童便磨下;产后气力虚羸,诸药不效,和童便磨下;室女经候不调,每服半丸,温酒磨下。

【功用】常服安心神,去邪气,逐败血,养新血,令有子。

【主治】妇人血海虚寒,外乘冷风,搏结不散,积聚成块,或成坚瘕,及血气攻注,腹胁疼痛,小腹急胀,或时虚鸣,呕吐痰沫,头旋眼花,腿膝重痛,面色痿黄,肢体浮肿,经候欲行,先若重痛,或多或少,带下赤白,崩漏不止,惊悸健忘,小便频数,或下白水,时发虚热,盗汗羸瘦,胎息不顺,腹内疼痛,一切难产,产后血晕,败血奔心,口噤舌强,或恶露未尽,发渴面浮,产后气力虚羸,室女经候不调。

65540　**神仙聚宝丹**

【方源】《普济方》卷三七四引《保集方》。

【组成】全蝎二三个　珍珠三钱　朱砂五钱　防风五钱　天麻五钱　蚕五钱　白附子五钱　半夏三钱　南星三钱半　蝉壳三钱(法治)　麝香一钱　金箔十五片

【用法】上为末,用粟米粥为丸,如鸡头子大。每服一丸,用薄荷汤磨化下;惊风痰实,加南星末同研化下;惊风内钓,用钩藤汤化下。

【主治】小儿一切惊风内钓,腹肚紧硬,夜啼发热,目睛上视,手足搐掣,角弓反张,忽然倒地,不省人事,及急慢惊风。

65541　**神仙聚宝丹**

【方源】《女科切要》卷五。

【组成】熟地　川芎　乳香　五灵脂　琥珀　当归　硫黄　花蕊石　良姜　黑龙　百草霜

【用法】童便磨下。

【主治】难产。

65542　**神仙蜡矾丸**

《奇效良方》卷五十四。为《备急灸法》"矾黄丸"之异名。见该条。

65543　**神仙摩腰丹**

《普济方》卷一五四。为《御药院方》卷八"摩腰丹"之异名。见该条。

65544　**神仙醒酒方**

【方源】《保命歌括》卷三十四。

【异名】神仙醒酒丹(《寿世保元》卷二)。

【组成】葛花五两　赤小豆花　绿豆花各一两　家葛根(捣碎,水澄粉)八两　真柿霜四两　白豆蔻末五钱

【用法】上各为细末,用生藕汁为丸,如弹子大。每用一丸,嚼而咽之。

【功用】解酒毒,醒酲。

65545　**神仙醒酒丹**

《寿世保元》卷二。为《保命歌括》卷三十四"神仙醒酒方"之异名。见该条。

65546　**神仙凝雪膏**

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】白茯苓三十六斤(锉,水煮一日)　松脂二十四斤(炼了者)　松子仁十二斤

【用法】上为末,将白蜜二硕四升纳铜器釜中,微火煎之一日一夜;次第下药,搅令相得,微火养之,七日七夜止,可丸即丸,如樱桃大。

每服七丸，食前酒送下，每日三次；若欲绝谷，顿服取饱，即不肌。

【功用】轻身明目，老者还少。

【宜忌】忌食米醋物。

【备考】本方方名，据剂型，当作“神仙凝雪丸”。

65547 神圣大易膏

【方源】《普济方》卷二九一。

【组成】小油半斤 生地黄 当归 川芎 赤芍药 香白芷各四两 黄丹四两

【用法】上为粗末。择水日将上件药末油浸一宿，用文武火熬过，以净好绵滤去滓，再熬，黄丹一钱旋旋点之，用槐柳条搅截焦头，再熬尽黄丹为度。滴水成珠使用。

【主治】瘰疬。兼治八十种恶疮。

65548 神圣内托散

【方源】《普济方》卷二八三。

【组成】没药一钱（鲜明者） 大黄一斤 甘草半斤 牡蛎四两 山栀子二钱 乳香五钱

【用法】上为粗末。每服五钱，水一大盏，煎至三五沸，去滓，入蜜半匙，调匀温服；年壮力盛人加至一两，水一小盏，煎服。未成者散，已成者脓血自消。后宜以十六味流气饮，调理血气复常。

【主治】痈疽。

65549 神圣化脾丸

【方源】《普济方》卷三八〇引《德胜堂方》。

【组成】京三棱（炮） 广茂（炮） 青皮（去白） 陈皮（去白）各五钱 沉香二钱 木香三钱 檀香二钱半 槟榔二钱半 脑子半钱 全蝎二钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如绿豆大。二岁至四岁者三丸；五岁至八岁者五丸；九岁至十二三岁者七丸，食前用白曳刺马溺半盏，水中浸后送下。服后食积推下便软，二服后渐消，三服去病七分，然后用药磨脾去积。

【功用】顺气进食。

【主治】小儿脾疳。积聚成块，在皮膜外者，发热发渴，乳食不进，日渐羸瘦，服诸药不效者。

65550 神圣北庭丸

【方源】《妇人良方》卷七引《灵苑方》。

【组成】北庭（去砂石，研） 没药 木香 当归各一分 芫花 莪术各半两 巴豆（去皮膜心）四十粒

【用法】上先研北亭、没药、巴豆如粉，用好米醋三升同煮为稀膏，然后将余四味为细末，入于膏内搜合成块，用新瓦盒盛之，丸如绿豆大。每服只五丸，临时加减丸数，用酒、醋各半盏煎数沸，通口服。不得嚼破，仍须吃尽酒、醋，立愈。或男子血气，亦依前方服食；如急喉闭者，男左女右，以一丸鼻中嗅之立愈。

【主治】妇人积年血气，攻刺心腹疼痛不可忍者，及多方医疗未愈；或治男子血气；急喉闭者。

65551 神圣代针散

【方源】《宣明论》卷十三。

【组成】乳香 没药 当归 香白芷 川芎各半两 元青一两（去足翅）

【用法】上为细末。每服一字，病甚者半钱，先点好茶一盏，次掺药末在茶上，不得吹搅，立地细细急呷之。

【主治】①《宣明论》：心惊欲死者。小肠气搐，得如角弓，膀胱肿硬；一切气刺虚痛，并妇人血癖、血迷、血晕、血刺、血冲心，胎衣不下，难产，一切痛疾。②《医方类聚》引《经验良方》：一切厥心痛，小肠疝气，痛不可忍。

【宜忌】《医方类聚》引《经验良方》：孕妇勿服。

65552 神圣当归散

【方源】《幼幼新书》卷十引郑愈方。

【组成】当归 甘草 滑石 通草各一分 大黄 芍药各二钱

【用法】上为细末。每服二钱，水一盏，生姜三片，薄荷五叶，灯心少许，同煎至五分，小儿分数服，大人作一服。

【主治】惊风痫病，咽喉有涎，四肢壮热，大

小便秘涩，兼心神乱者。

65553 **神圣光生散**

【方源】《普济方》卷八十五。

【组成】蒙花　木贼　白芷　细辛　干姜　麻实　川芎　羌活　苍术　甘菊花　荆芥　黄芩　甘草　藁本　石膏各等分

【用法】上为末。每服二钱，食后临卧蜜水调下，或茶水、泔水亦可，每日三次。

【功用】明目退翳，祛风清热。

【主治】羞明怕日，眼生翳障黑花，拳毛倒睫，偏正头痛及脑风，胸热，心脏积热。

65554 **神圣光明饼**

【方源】《良朋汇集》卷三。

【组成】羚羊角(镑)　白犀角(镑)　密蒙花　生地　熟地　独活　藁本　草决明　栀子(炒)　川芎　细辛　蔓荆子　苍术各五钱　木贼　甘草　白蒺藜　槐花　黄连　荆芥　青葙子　羌活　芒消　白附子(煨)　赤石脂　夜明砂(淘净末)各一两　大麻子　大黄各二两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大，重二钱。每服一丸，冷茶研化下。重者十丸即好。

【功用】通大肠之火，祛除燥结。

【主治】诸般目疾疼痛，日久渐细，云膜遮睛，远不视物，并一切难治眼疾。

65555 **神圣自利膏**

【方源】《普济方》卷一四三引《德生堂方》。

【组成】黄连二两(碾末)　巴豆半两(带壳与黄连和匀)

【用法】上为细末。作三次用，葱白自然涎汁调成膏，敷贴脐上，高半寸厚。不时大便自利。如不通，再上，行即止。

【主治】伤寒及诸证大便闭，结连不通，腹肚胀满疼痛；及病者体虚，不欲服药通利者。

65556 **神圣羊肝饼**

【方源】《穷乡便方》。

【组成】人参　木香　白芷各三钱　石决明(火煅)　白术　全当归各五钱

【用法】上为细末，用黄腊一两五钱，熔开和药，共捏成十饼，每一饼用山羯黑羊肝一具，竹刀批开去净白筋膜，将一饼火烘，再捏数片薄饼入肝内，麻皮缠住，用二和淘粟米泔水砂锅煮熟，连汤服之。即愈，重者不过二三饼。如不肯服，晒干为末，和麦面于砂锅中烙焦饼食之。

【主治】三、四岁以下小儿疳积，发稀，眼涩，腹大者。

65557 **神圣吹喉散**

【方源】《鸡峰》卷二十一。

【组成】螺儿青　白僵蚕　焰消　甘草各二两

【用法】上为细末，用腊月内牛胆一个，取出汁，同药拌匀，却盛在胆内，于透风处阴一百日外，取出研细。每以一字或半钱，用筒子吹在喉内。

【主治】走马喉闭，及喉闭肿痛。

65558 **神圣药师饼**

【方源】《普济方》卷一九七。

【组成】人言一钱半　雄黄一钱半　白面七钱半　干胭脂一钱

【用法】上为极细末，滴水和为饼子，如棋子大，计九十饼，作三十服。每服三饼，临卧细嚼，冷水送下。

【主治】疟疾。

【宜忌】忌湿面、荤腥、生硬、生冷物。

【备考】干胭脂用量原缺，据《奇效良方》补。

65559 **神圣香茸散**

【方源】《苏沈良方》卷四引《五脏论》。

【异名】神圣香薷饮(《圣济总录》卷四十)、黄连香薷饮(《伤寒标本》卷下)、黄连香薷汤(《卫生宝鉴·附遗》)、香薷饮(《回春》卷二)、四味香薷饮(《医方集解》)、四物香薷饮(《成方便读》卷三)。

【组成】香薷穗(经霜者)一两半　新厚朴(取心)二两　川黄连二两　白扁豆一两(焙)

【用法】先用姜汁四两，一处杵黄连、厚朴二味，令细，炒成黑色，入香薷、扁豆二味，都

为末。每服五钱，水一盏，酒一盏，共煎至一盏，入瓷瓶内，蜡纸封，沉入井底，候极冷，一并服二服。

【功用】《医方集解》：散暑和脾。

【主治】①《苏沈良方》引《五脏论》：霍乱吐泻、转筋腹痛。②《卫生宝鉴·补遗》：伏暑引饮，口燥咽干，或吐或泻；及脏腑冷热不调，饮食不节，或食腥荤生冷过度，或起居不节，露卧湿地，当风取凉、风冷之气归于三焦，传于脾胃，脾胃得冷，不能消化水谷，致真邪相干，肠胃虚弱，吐利，心腹疼痛，霍乱气逆，发热头痛体疼，虚烦，或转筋拘急疼痛，四肢逆冷，脉欲绝，或烦闷昏塞而欲死者。

【方论选录】①《医方考》：暑，阳邪也，干于脾则吐利，干于心则烦心。香薷之香，入脾清暑而定吐利；黄连之苦，入心却热而治烦心；暑邪结于胸中，非厚朴不散；暑邪陷于脾胃，非扁豆无以和中；然必冷服者，经所谓治温以清，凉而行之是也。②《医方集解》：此手少阴、手足太阴、足阳明药也。香薷辛温香散，能入脾肺气分，发越阳气，以散皮肤之蒸热；厚朴苦温，除湿散满，以解心腹之凝结；扁豆甘淡，能消脾胃之暑湿，降浊而升清；黄连苦寒，能入心脾，清热而除烦也。

65560 神圣香姜散

【方源】《博济》卷三。

【异名】借气散（《圣济总录》卷七十六）、香姜散（《三因》卷十一）、姜黄散（《寿亲养老》卷四）。

【组成】宣连一两（匀锉如豆大） 生姜四两（匀锉如黑豆大）

【用法】上二味一处，以慢火炒令干，姜脆深赤色即止，去姜取出，只要黄连，研为细末。每服二钱，空心腊茶清调下，甚者不过两服即愈。

【主治】①《博济》：久患脾泄泻。②《圣济总录》：脓血痢。

【备考】①《圣济总录》：本方用黄连、生姜各一两。②本方方名，《证类本草》引作“神圣香黄散”。

65561 神圣香黄散

《证类本草》卷七。即《博济》卷三“神圣香姜散”。见该条。

65562 神圣香薷饮

《圣济总录》卷四十。为《苏沈良方》卷四引《五脏论》“神圣香茸散”之异名。见该条。

65563 神圣复气汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】干姜（炮） 黑附子（炮）各三分 防风 人参 郁李仁（另研）各五分 当归身六分（酒洗） 半夏（汤洗） 升麻各七分 藁本 甘草各八分 柴胡 羌活各一钱 白葵花五朵（去心，剪碎）

【用法】上作一服。水五大盏，煎至二盏，入黄耆一钱、橘红五分、草豆蔻仁（面裹煨熟，去皮）一钱，同煎至一盏，再入下项药：黄柏三分（酒浸）、黄连三分（酒浸）、枳壳三分、生地黄三分（酒洗），此四味预一日另用新水浸；又以华细辛二分，川芎细末三分，蔓荆子三分，作一处，浸此三味并黄柏等；煎正药作一大盏，不去滓，入此所浸之药，再上火同煎至一大盏，去滓，空心热服，于月生月满时食，隔三五日一服，如病急，不拘时候。

【主治】复气乘冬足太阳寒水、足少阴肾水之旺，子能令母实，手太阴肺实反来克土，火木受邪，腰背胸膈闭塞疼痛，善嚏，口中涎，目中泪，鼻中流浊涕不止，或如息肉，不闻香臭，咳嗽痰沫，上热如火，下热如冰，头作阵痛，目中溜火，视物𥆨𥆨，耳聋耳鸣，头并口鼻大恶风寒，喜日晴暖，夜卧不安，常觉痰塞，咽膈不通，口不知味，两胁缩急而痛，牙齿动摇不能嚼物，脐腹之间及尻臀足膝不时寒冷，前阴冷而多汗，行步欹侧，起居艰难，麻木风痹，小便数，气短喘喝，少气不足以息，遗失无度；及妇人白带，阴户中大痛牵心，面色黧黑；男子控睾，痛引心腹，或面色如赭，食少，大小便不调，烦心霍乱，逆气里急，腹不能努。或肠鸣，脐下筋急，肩胛大痛，此皆寒水来复火土之雠

也;又治啮颊啮唇舌、舌根强硬等证。大抵肾元与膀胱经中有寒,气不足者,并宜服之。

【宜忌】宜食肉,不助经络中火邪也,忌肉汤。

65564　神圣复明丸

【方源】《医方类聚》卷七十引《经验秘方》。

【组成】羌活　独活　羚羊角　石决明　草决明　当归　生地黄　熟地黄　细辛　密蒙花　川芎　木贼　白蒺藜　枳实各半两　苍术一两　赤芍药　川椒各二钱半　甘菊花半两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,食后茶清送下。

【主治】青朦遮暗,内外障,不见分明。

65565　神圣换肌散

【方源】《主机微义》卷十五。

【组成】白僵蚕二钱　白矾一钱半　砒(生)　斑蝥(去翅足)　草乌头　青黛各一钱　麝少许

【用法】上为极细末。干掺些小于疮口内,用膏药盖护,其恶肉化为脓水。

【功用】《准绳·疮医》:追蚀死肉。

【主治】瘰疬、顽疮。

【宜忌】《准绳·疡医》:非顽急者勿用。

65566　神圣接骨丹

【方源】《丹溪心法附余》卷十六。

【组成】水蛭(用糯米于砂锅内炒黄,去末)三钱　菟丝子　发灰　好绵灰　没药　乳香　血竭各一钱　半两钱一文(烧七次,醋淬七次,另研)　麝香一钱(另研)

【用法】上为末。每服三钱,热酒调下,损在上食后服,损在下空心服。约车行六七里,闻骨作声。

【主治】打扑伤损,跌折肢体。

【宜忌】忌听钟鼓砧杵之震动声,忌食驴肉。

65567　神圣辟瘟丹

【方源】《古今医鉴》卷三。

【组成】苍术倍用　羌活　独活　白芷　香附　大黄　甘松　三奈　赤箭　雄黄各等分

【用法】上为末,面糊为丸,如弹子大,黄丹为衣,晒干。用时焚之。

【功用】预防瘟疫。

65568　神机万灵膏

【方源】《同寿录》卷四。

【组成】真麻油四斤　槐　柳　桃　榴　椿　杏　楮树枝各二枝　两头尖　白芷　赤芍　大黄　川连　人参　穿山甲　白芍　草乌　苦参　川芎　当归各二两　杏仁　生地　川椒　胎发　槐子　黄柏(去皮)各一两　熟地一两　巴豆(去皮壳)一百二十粒　木鳖子(去皮壳)五十个　蓖麻子仁一百二十个(去皮壳)

【用法】上锉,入油锅内浸,春五日,夏三日,秋七日,冬十日浸足,然后入铜锅熬煎,以药枯焦为度,起锅候冷,生绢滤去滓净,再将药油入锅熬煎,用槐柳枝不住手搅,加入黄丹(水飞净,火焙七次,燥者)二斤,子油内慢火熬,滴水成珠为度,再加入净明黄松香十二两,研末搅匀,取起锅片时,减火性,乃下真阿魏一两(试法:将阿魏搽在铜器上,次日看铜色变白者真),沉香、丁香、麝香、广木香、血竭各一两,又乳香、没药各三两(出汗),共研极细末,入油内搅极匀,用凉水一大桶,将药投入水中,一日一换,浸七日夜,拔去火性,收入瓷瓶内。用时取少许,隔汤炖化,量大小摊贴。五劳七伤,贴肺俞、肩井并三里、曲池穴,火烘双手熨百余下;肩背腰膝两足寒湿疼痛,脚气穿心疼痛,贴患处;男子阳痿不起,阴痿瘦弱,遗精白浊,元气虚冷,女人子宫冷闭,赤白带下,贴两阴交穴、关元穴;男女赤白痢疾,贴丹田穴,膏内加入捣细木鳖一个;男女痞块,先用面作圈围痞处,圈内入皮消一两,用重纸盖,上以熨斗盛火熨之,令纸热透进,然后去消并面圈,将膏贴患处,火烘双手熨百余下,令汗出,膏内加捣细木鳖一个;左瘫右痪,加捣细木鳖一个,贴丹田穴,仍服此药三丸,好

酒送下；偏正头风，头痛，贴脐内；舌胀，贴心中肺俞并心坎下三寸；酒后呕吐，酒积、转食、暗风，贴肺俞兼心坎下二寸许；风寒、风热咳嗽、痨病，贴肺俞穴；胸膈不利，气喘不息，贴肺俞穴；妇女月经不通，贴陶康二穴骨上；胎不安，先将此膏贴脐内，再用一膏加入捣细木鳖一个，贴丹田穴；春三月患伤寒，或已过日期，用此膏贴脐上心坎下，如未过日期，用此膏二两半，贴脐中，手熨令汗出；夏三月伤寒，走黄结胸，用此膏二两，贴心坎下；秋三月伤寒，兼赤白痢，用此膏二两，贴脐中；冬三月伤寒，兼赤白痢，用此膏二两半，贴脐中；打扑血凝，贴疼处，手熨热即止；犬咬及蛇、蝎伤，贴伤处，不必熨；痈疽，发背、疔疮，一切无名肿毒，初起一二日内，贴患处，手熨出汗即消，若四五日肿硬有脓，亦以此贴之，易于出脓收口；干湿疥癣、瘙痒、风疹，贴脐中，手熨出汗即安；癞疮肿痛，膏内加捣细木鳖一个，贴脐中，手熨出汗即愈；凡疮疖，随大小贴之；小儿癖疾，以此贴患处，手熨觉腹热即止，或贴脐上亦可；此膏能治万病，皆对患处及脐中贴之，无不应验，贴后火烘双手熨百余下更妙。

【主治】五劳七伤；肩背腰膝两足寒湿疼痛，脚气穿心疼痛；男子阳痿不起，阴痿瘦弱，遗精白浊，元气虚冷，女人子宫冷闭，赤白带下；赤白痢疾；痞块；左瘫右痪；偏正头风、头痛；舌胀；酒后呕吐，酒积，转食，暗风；风寒、风热咳嗽，痨病；胸膈不利，气喘不息；妇女月经不通；胎不安；伤寒，走黄结胸，兼赤白痢；打扑血凝；犬咬及蛇蝎伤；痈疽、发背、疔疮，一切无名肿毒初起；干湿疥癣，瘙痒，风疹；癞疮肿痛；疮疖；小儿癖疾等。

65569 神芎上清丸

【方源】《育婴秘诀》。

【组成】大黄　黄芩各二两　滑石四两　薄荷叶　川芎各半两　桔梗　黄连　甘草各二钱半

【用法】蜜为丸，如芡实大。每服一丸或二丸，滚白汤化下。

【功用】清利头面，利咽膈。

【主治】一切热证。

65570 神芎导水丸

《医学纲目》卷四引《绀珠》。为《宣明论》卷四"神芎丸"之异名。见该条。

65571 神曲五味散

【方源】《外台》卷二十五。

【组成】曲末一升　干姜六两　丁香　豆蔻各四两　高良姜五两

【用法】上为散。初服一方寸匕，日再服，稍稍加至二三匕良，以饮下之。

【主治】脓痢，腹刺痛，便不大稀，但大便兼脓，遇冷而剧。

65572 神曲白术丸

《鸡峰》卷十二。为《圣惠》卷五"白术丸"之异名。见该条。

65573 神曲半夏汤

【方源】《不知医必要》卷三。

【组成】党参（去芦，米炒）三钱　白术（净，炒）　半夏（制）各二钱　神曲（炒）　山楂　茯苓各一钱五分　陈皮（去白）一钱　炙草七分　生姜三片

【用法】水煎服。

【功用】消食兼补。

【主治】饮食不节人噎膈。

【加减】大便结，加当归；痰涎多者，加泡吴萸六分。

【备考】一老医云：此症宜饮牛乳，或同姜汁、蔗汁、陈酒服均佳。若徒服香燥之药，以取快一时，破气而燥血，是速其死也。

65574 神曲豆蔻丸

【方源】《洪氏集验方》卷五。

【组成】神曲半两（炒）　肉豆蔻三枚（面裹煨）　麦糵半两（炒）　宣连半两（去须）　史君子十四枚（去壳）　芜荑仁一分　芦荟一分（合研）

【用法】上为细末，用猪胆汁浸，面糊为丸，如黍米大。每服二十丸，空心饭饮吞下。

【主治】小儿疳气，羸弱，脏腑虚怯，及滑泄

不止，饮食减少，腹胀寒热，面黄肌瘦，引饮无度。

65575 **神曲补中丸**

【方源】《杨氏家藏方》卷六。

【组成】神曲五两(炒)　干姜三两(炮)　川椒(炒出汗，去目)三两

【用法】上为细末，别用神曲末三两煮糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温米饮送下。

【主治】脾胃虚寒，饮食迟化，胸膈痞闷，腹胁胀满，口苦无味，恶心咽酸，倦怠嗜卧，滑泄下利。

65576 **神朱石膏丸**

【方源】《圣济总录》卷十六。

【组成】石膏(烧)二两　芎藭一两　龙脑少许(研)

【用法】上为细末，面糊为丸，如樱桃大，丹砂为衣。细嚼一丸，食后茶、酒任下。

【主治】头痛。

65577 **神传剪草膏**

【方源】《本事》卷五。

【异名】仙传膏(《串雅内编》卷四)。

【组成】剪草一斤(婺州者)

【用法】上洗净为末，入生蜜一斤，和为膏，以器盛之，不得犯铁，九蒸九晒，日一蒸晒。每服四匙，五更用匙抄药和粥服，良久用稀粟米饮压之，药冷服，粥饮亦不可太热，或吐或下皆不妨。如久病肺损咯血，只一服愈，寻常咳嗽血妄行，每服一匙可也。

【主治】劳瘵吐血损肺，及血妄行。

【方论选录】《本事方释义》：剪草气味苦寒，入手太阴、手足厥阴，痨瘵而致久咳吐血不止，损伤及肺，血溢妄行，此方虽近似丹方，亦是培土生金之法。

【备考】本方方名，《医学纲目》引作"神传膏"。

65578 **神异一搽光**

【方源】《普济方》卷四〇八。

【组成】白芷四两　硫黄三两　白矾(枯)一两　樟脑一两

【用法】上为细末，生油或猪膏调成膏。先以皂荚、葱白煮，洗净患处，于疮上搽药。再如此上三五次，克日见效。

【主治】小儿诸般疥、白秃疮、肥烂疮痒痛，如水流者。

65579 **神异四七膏**

【方源】《仙传外科集验方》。

【组成】乳香　没药　防风　羌活　白芷　赤芍　当归　宣连　肉桂　皂角　五倍子　巴豆(去壳)　木鳖子　国丹　蓖麻子　无名异　槟榔　水粉　轻粉　枫香　荜茇(一方用乌药)　松香　黄蜡各等分　桃柳槐枝　蜡膏　清油

【用法】上除乳、没、麝、轻、粉、丹另研外，先用清油煎诸药令焦，方下枫香、松香、黄蜡、蜡膏，又熬令溶，用绢滤去前药，却下国丹、水粉再熬令紫色，然后下乳、没、麝、轻末，用桃柳槐枝不停手搅匀，滴水不散为度，将瓦器收贮，出火毒方用。

【功用】止血生肉合口。

【主治】一切痓疮、恶疮、毒疮，久不愈者。

【备考】据用法，方中当有麝香，疑脱。

65580 **神异红药丹**

【方源】《秘传打损扑跌药方》。

【组成】山羊血五钱　金花石五钱(醋制九次)　琥珀五钱(用豆腐制)　人参三钱　五铢钱二钱(醋制二十次)　兔骨五钱(酥油炙)　没药五钱(去油)　麝香一钱

【用法】上为细末。每服三分，用酒调服。

【主治】跌打损伤。

65581 **神异香连丸**

【方源】《证治宝鉴》卷八。

【组成】黄连一斤　赤茯苓　猪苓　白扁豆　泽泻　三棱　莪术　厚朴各一两　枳壳一两　陈皮　砂仁各五钱　当归一两五钱　白芍　川芎各七钱五分　苍术一两二钱

【用法】上除黄连外，用水煎浓汁，去滓再熬，入连浸，晒干为末听用。另用吴茱萸十两

（水泡去毒），同连炒燥，如金色为度，去萸不用，再加木香五钱、肉果二两（面裹煨熟），共为末，黄米糊丸，如绿豆大。每服二钱五分，看虚实大小加减，红痢，槐角汤下，白痢，陈皮汤下。

【主治】痢后遍身疼痛，手足拘挛，不能举动下床者。

65582 **神异透骨膏**

【方源】《普济方》卷三一三。

【组成】露蜂房（细剪至极碎） 杏仁（去皮尖）各五钱 清油十两 穿山甲四钱 当归一两 木鳖子八枚（去壳） 白胶香四钱（明者） 蛇蜕五钱（淡盐水洗浸） 虢丹四两 连须葱十茎 乳香 没药各二钱 男子乱发（洗净）如鸡子大（用童男女者）

【用法】上用清油浸药一宿，慢火熬诸药黑色，生绢帛滤去滓，复将所滤油慢火上再熬，却将黄丹入油，长柳枝、槐枝不住手搅，候有微烟起，即提起药铫，滴水面上，凝结成珠，膏成矣，搅无烟，却入乳、没、丹搅匀，倾瓷器内，新汲水一日一换，将药器放水内三日，出火毒，此膏可加玄参半两，黄耆四钱。

【功用】消肿定痛生肌。

【主治】远年近日，一切恶疮、毒注疮等。

65583 **神异温风丹**

【方源】《三因》卷二。

【组成】麻黄五两（不去节，择净生用） 人参 白术 干姜（炮）各二两 茯神 附子（炮，去皮脐） 白胶香（别研） 甘草（炙）各两半 乳香（别研） 全蝎（炒）各一两

【用法】上将麻黄细锉，用水五升，熬去半，入蜜六两，又熬成膏，入前件药末为丸，如弹子大。每服一丸，温酒送下，每日三次。

【主治】中风一切诸疾。

65584 **神医七液丹**

【方源】《痧证汇要》卷一。

【组成】滑石十二斤（研细，以生甘草三十两，泡汤浸漂飞，以甘草汤尽为度，研极细，晒干，以后七液次第拌此，晒干） 鲜萝卜汁（拌制过滑石晒干，以下同） 鲜佩兰叶 鲜紫苏叶 鲜藿香叶各三十两 鲜侧柏叶三十两（此难取汁，先将生藕汁浸，同捣烂，方绞得出汁，亦拌滑石，晒干） 荷叶（取新嫩者，同上法） 生大黄片三十两（用无灰陈绍酒一斤，浸汁捣拌，晒干）

【用法】每服三钱，小儿减半，仓卒不能取药引，即开水化亦可；外证可用葱汁调涂；痢疾红者，用黑山栀一钱，白者用姜三片，煎汤化服；痛痢、噤口痢，用广木香（磨）五分，开水化服；疟疾，用生姜三大片，姜制半夏一钱，煎服；烂喉痧并一切证，白滚汤化服。

【主治】瘟疫，疟痢，烂喉痧证，斑疹伤寒，时毒痈疽，一切疮毒，暑风卒忤，霍乱吐泻，诸般痧气。

65585 **神龟滋阴丸**

【方源】《医学纲目》卷十七。

【组成】龟版（炙）四两 知母（酒炒）二两 锁阳（酒洗）一两 黄柏（炒赤）二两 枸杞子 五味子各一两 干姜（炮）半两

【用法】上为末，清水为丸，如梧桐子大。每服七十丸，空心盐汤送下。

【主治】①《医学纲目》：舌纵，口角流涎不止，口目㖞斜，手足痿软。②《杂病源流犀烛》：膏粱之人，湿热伤肾，脚膝痿弱。

65586 **神应七宝丹**

【方源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】常山 陈皮 青皮 槟榔 厚朴各二两 甘草三两 草果五两

【用法】上为细末，水泛小丸。每次三钱，白开水送下。

【主治】诸疟，不论先热后寒，头痛口苦，心烦作渴，乏力少食。

【宜忌】忌食生冷油腻之物。

65587 **神应八宝丹**

【方源】《扶寿精方》。

【异名】八宝丹（《医学入门》卷七）。

【组成】芦甘石（煅，用童便浸七次，煅七次为灰研细，水飞）一两 黄丹（研细，水飞）一

梳往来搔之。

【主治】男子、妇人气聚，左右胁下及冲胸，伏梁，或血块，或气结，酒色过度，有伤五脏致死，精神短少，肢体羸弱，并小儿大人，一切痞疾。

65592 **神应化浆汤**

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】人参 黄耆 当归各一钱 山楂 糯米 笋尖各二钱 肉桂八分 枸杞八分 象牙三钱 木香（乳汁磨）半杯

【用法】水二钟，煎一钟，入好酒一钟，不拘时候服；或加梅花一钱，只服一剂，浆必满足。

【主治】痘，浆不行。

65593 **神应乌玉丹**

【方源】《中藏经·附录》。

【异名】乌玉丹（《百一》卷十四）、神应黑玉丹（《局方》卷六吴直阁增诸家名方）、乌玉丸（《魏氏家藏方》卷七）、神应黑玉膏（《卫生宝鉴》卷十七）、黑玉丹（《万氏家抄方》卷三）。

【组成】棕榈 乱发各二两 猪蹄甲十四个（须后脚者） 猬皮四两 牛角腮三两 苦楝树根二两半（洗净） 槐角一两半 雷丸 芝麻各一两（拣净） 真麝香二钱 滴乳香半两

【用法】上除乳、麝二香别研细外，并细锉，入藏瓶或沙盒子，不固泥，用熟炭火煅；烟才尽，便去火，入二香同研匀，无灰醇酒打面糊为丸，如梧桐子大。每服八粒，先细嚼胡桃一枚，空心、晚食前以温酒吞下，每日二次；如病甚，每日三次。切忌服别药。不过三两日，永除根本。

【主治】久新肠风、痔瘘，着床头痛不可忍，肠内有虫者。

65594 **神应白玉膏**

【方源】《外科真铨》卷上。

【组成】老蟾蜍二只 大鲫鱼一只 巴豆一两 蓖麻仁一两

【用法】用油一斤，煎枯去滓，熬至滴水成珠，离火少倾，入轻粉二两，水粉六两，搅匀成膏。

【功用】化腐生肌。

【主治】一切无名肿毒。

65595 **神应夺命丹**

【方源】《痘疹心法》卷二十二。

【组成】辰砂（择墙壁镜面者，白纱囊盛之，用升麻、麻黄、紫草、连翘四味，同纱囊放沙罐内，入新汲水，以桑柴火煮一昼夜，取出辰砂，研细，仍将煮砂药汁重纸滤去滓，水飞取末，待下听用）二钱 麻黄（不去根节，酒蜜拌，炒焦黑色）八分 蝉蜕（水洗净，去足翅）三分 紫草（酒洗）五分 红花子五分 穿山甲（酒炙拌）五分 真蟾酥三分

【用法】上为细末，用醋酒拌丸，作十粒。周岁者半丸，二岁者一丸，服至三丸，热酒化服，厚盖取汗，汗出痘随出也。

【主治】①《痘疹心法》：痘疹。②《景岳全书》：痘疹，风邪倒陷，及痘毒人里。

65596 **神应夺命丹**

【方源】《痘疹金镜录》。

【组成】劈砂一两 升麻 麻黄各五钱 紫草 连翘各一两

【用法】劈砂囊于白纱内，外配升麻、麻黄、紫草、连翘四味，同入纱囊中，于砂锅内用新汲水将桑柴火煮一昼夜，取出，辰砂研末，仍将煮砂药汁将绵滤清，晒干为末听用。

【主治】痘疮毒盛，透发不起者。

65597 **神应夺命汤**

【方源】《一盘珠》卷九。

【组成】辰砂（研，水飞过）二钱 蝉退（去头足）三分 紫草（酒洗）三分 红花五分 蟾酥三分 穿山甲五分 麻黄（去根节，蜜酒炒）五分

【主治】痘触寒邪，黑陷不起。

65598 **神应回光散**

【方源】《急救仙方》卷三。

【组成】木贼 白芷 甘草 青箱子 楮实子 草决明 羌活 石决明 川乌（炮） 白蒺藜 蝉蜕各等分

【用法】上为末。每服一钱，食后茶汤调下；酒调亦可。

【主治】障翳赤眼，胬肉攀睛。

65599　神应异功散

《外科正宗》卷一。为《小儿痘疹方论》"十二味异功散"之异名。见该条。

65600　神应乳香丸

【方源】《洪氏集验方》卷三。

【组成】安息香一分(酒浸，晒三日，去滓，研为膏)　诃子一钱　乳香一分(酒少许，化开，晒三日，再用火焙溶令干，研为末)　没药一分(研为末，用安息香膏子和匀，用生杏仁不以多少，烧令烟出，上焙膏子一日，干为度)

【用法】上为细末，滴水为丸，如绿豆大。每服五丸、七丸，空心食前乳香汤送下，每日三次，加至三五十丸。

【主治】诸般恶痢，腹中搅刺，日夕频并，危恶不愈。

65601　神应养真丸

《外科理例》。为《三因》卷三"神应养真丹"之异名。见该条。

65602　神应养真丹

【方源】《三因》卷三。

【异名】神应养真丸(《外科理例》)。

【组成】当归(酒浸)　天麻　川芎　羌活　白芍药　熟地黄各等分(一法有木瓜、熟阿胶等分，无羌活)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如鸡子黄大。每服一丸，木瓜、菟丝子浸酒送下；脚痹，薏苡仁浸酒送下；中风，温酒米汤送下。

【主治】厥阴肝经脚气，为四气浸袭肝脏，左瘫右痪，涎潮，昏塞，半身不遂，手足顽麻，语言蹇涩，头旋目眩，牙关紧急，气喘，自汗，心神恍惚，肢体缓弱，上攻头目，下注脚膝，荣气凝滞，遍身疼痛。兼治妇人产后中风，角弓反张；堕车落马，打扑伤损，瘀血在内。

65603　神应消风散

《医宗金鉴》卷七十三。为《医方类聚》卷二十四引《急救仙方》"消风散"之异名。见该条。

65604　神应救苦丹

【方源】《回春》卷八。

【组成】大川乌(略炮)　肥草乌(略炮)　苍术　青皮(去瓤)　生地黄　西芎　枳壳(麸炒)　白芍各五钱　五灵脂二两

【用法】上为细末，酒糊为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，热酒送下，汗出即效。若为小丸亦可，不饮酒者，冬月热水送下。

【主治】诸风百毒。头风肿痛，心腹痛、脚跟痛、疝气痛、手背痛、遍身骨节痛、破伤风痛、捧疮痛、痈疽发背及一切恶疮痛。

65605　神应黑玉丹

《局方》卷六。(吴直阁增诸家名方)。为《中藏经·附录》"神应乌玉丹"之异名。见该条。

65606　神应黑玉膏

《卫生宝鉴》卷十七。为《中藏经·附录》"神应乌玉丹"之异名。见该条。

65607　神应黑龙丸

《同寿录》卷三。为《三因》卷十八"黑龙丹"之异名。见该条。

65608　神应黑神散

《普济方》卷三五六。为方出《证类本草》卷五引《杜壬方》，名见《产育宝庆集》卷上"神应黑散"之异名。见该条。

65609　神应普济丹

【方源】《春脚集》卷三。

【组成】川大黄五两(一酒制，一姜制，一盐浸，一白矾浸，浸透，九蒸九晒)　元参(净)三两(盐水浸透)　紫苏三两(净末)　葛根三两　柴胡三两　香薷三两　连翘二两五钱　羌活二两　白芷二两五钱　防风二两　荆芥二两　黄芩二两(生一半，酒炒一半)　藿香二两　枳壳二两　天花粉二两　薄荷一两五钱　赤芍一两五钱　生草一两五钱(麸炒)　威灵仙一两(酒炒)　细辛六钱

【用法】上为细末，用嫩青蒿尖捣汁，和陈仓米糊为丸，重三钱，随症用引：时行瘟疫，斑点紫黑，舌唇紫黑，急用生大黄二三钱、石膏一二钱煎引；斑疹名红布者，多肿咽喉，此丸

死一生之症也，速用牛蒡子三钱、乌梅二钱、青黛三钱、桔梗三钱、甘草一钱，煎汤剂饮，再以此药为引，泡丸服之；头痛发热无汗，葱姜引；身热有瘢点，而发疹者，升麻为引；时行瘟疫，大头瘟者，牛蒡子、青黛为引；疟疾，常山、草果为引；痢疾、水泻、腹痛，木通为引；孕妇身热发狂，麦冬、竹叶为引；伤寒发热恶寒者，葱、姜为引。

【主治】时行瘟疫，斑点紫黑，舌唇紫黑；斑疹，咽喉肿，身热有斑点而发疹者；伤寒发热恶寒，头痛无汗；大头瘟；疟疾；痢疾、水泻腹痛者；孕妇身热发狂者。

65610 神灵枯药膏

【方源】《医方类聚》卷一八三引《修丹鲁般经》。

【组成】白脑子一钱（即人言） 白矾四两（二味煅） 朱砂一钱（通明者） 樟脑半钱（三味后入）

【用法】上用铜铁器，先将白脑子打碎为末在下，后用矾盖在上，用文武火煅令干，须是毒物煅之，毒尽从烟去，然后放在地上出火毒，连下后三味，却为末，用蜜或自津液调。用篦子调药搭痔，每日三次。黄水出尽，自然焦黑，十日半月可安。

【主治】痔漏。

65611 神妙千金丸

《卫生家宝产科备要》卷三。为《产乳备要》“千金丸”之异名。见该条。

65612 神妙五枝膏

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】川乌 草乌 防风 白芷 当归 熟地黄 木鳖子（去壳） 穿山甲 大黄 甘草各六钱 槐、桃、柳、椿、楮（用枝）各一寸 血余一握

【用法】上锉，用香油一斤，入药用文武火煎至焦枯，滤去滓，将油再煎，随入黄丹（炒见火星为度）半斤，柳条搅不住手，滴水成珠为度，去火略待少时，入乳香一两、没药六钱、朱砂二钱、轻粉二钱，亦徐徐搅入内，倾碗中，坐水出火毒。腰痛贴痛处；咳嗽贴肺俞二穴；痞块贴块上；诸般疮毒随大小贴之。

【主治】腰痛，咳嗽，痞块及诸般疮毒。

65613 神妙乌髭方

【方源】《普济方》卷四十九引《卫生家宝》。

【组成】酸石榴一个

【用法】于石榴上匀钉小铁钉四十九个，遇夜安顿在露地或屋上，至晓即收在屋下，勿令见日色，露三夜毕，取出去钉子，每一钉窍内，塞一丁香，每取出一个钉，便塞丁香，用纸裹石榴，以好米醋和黄泥，固济石榴，顿在风道略干，以炭火簇烧，令通红为度取出，移在一净地上，候冷去泥净，取烧过者石榴，碾为细末，早、晚揉牙，须令擦得牙齿热，以使药力行。至十日永无白发，更无虫牙。若青春人用此药，一世更无白者，如摘白须后，以生姜汁擦，遂生黑者。

【功用】乌髭发。

65614 神妙六逸丸

【方源】《洪氏集验方》卷一。

【组成】石菖蒲（九节者） 菟丝子 地骨皮 远志 生干地黄 牛膝各二两

【用法】上锉，用酒浸之，春、夏五日，秋、冬七日，慢火焙干，捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸至五十丸，空心温酒送下。服至百日，老却少容；服至一年，发如漆；过二年，颜如童子；三年骨髓坚实；四年精神爽清。

【功用】老换少壮，轻身强记，驻颜悦色，发白变黑，开心中迷忘，聪明耳目。

【方论选录】石菖蒲能开心孔，聪明耳目，益智不忘，出音声，治耳聋，高志不老；菟丝子补不足，益气力，坚筋骨，主口苦燥渴，久服轻身延年；地骨皮主五脏邪气，燥热消渴，裨益真气，久服轻身，坚筋骨，不老，耐寒暑；远志补不足，除邪气，益精神，注智，聪明耳目，去皮肤中热，久服轻身不老，好颜色，益心；生干地黄填骨髓，长肌肉，去胃中宿食，补五脏，通血脉，益气力，利耳目；牛膝能助人筋骨，偏治腰疼，益真气，变白发，久服轻身不老，耐

寒暑。

65615　**神妙龙骨散**

【方源】《幼科指掌》卷一。

【组成】龙骨二钱　黄丹一钱　枯矾一钱　麝香少许

【用法】上为细末。外敷。

【主治】小儿初生月后,脐中有汁不愈者。

65616　**神妙生肌散**

【方源】《古今医鉴》卷十五。

【组成】乳香一钱　没药二钱(二味用灯草同研)　孩儿茶一钱　血竭一钱　赤石脂一钱　海螵蛸一钱　轻粉三分　龟版(炒)一钱　鳖甲(炒)一钱　硼砂二钱　水银一钱　黑铅一钱

【用法】将银、铅同煎化,将前药各为末,入银、铅于内,研极细。撒疮上。

【主治】痈疽发背,诸般疮毒,溃烂疼痛。

【加减】初起,加黄柏一钱;作痒,加白芷一钱。

65617　**神妙列仙散**

【方源】《丹溪心法附余》卷三。

【组成】木香　沉香各一钱　茴香(微炒)　槟榔各一钱　萹蓄三钱　大黄一两(微焙炒)　麦芽一两半　瞿麦五钱

【用法】上为末。每服三钱或五钱,五更热酒调下,能饮者多饮二三杯不妨。仰面卧,手叉胸前,至天明取下,大便如血为效。

【主治】饮酒所伤,以致遍身疼痛,腰脚强跛,手足顽麻,胃脘疼痛,胸膈满闷,肚腹膨胀,呕吐泻利,及酒食停久而成积聚,黄疸热跛。

【宜忌】忌生冷硬物及荤腥,只吃米粥。

65618　**神妙夺命丹**

【方源】《保婴撮要》卷三。

【组成】青蒿节内虫(七月内取)

【用法】上药入朱砂、麝香为丸,如麻子大。每服三五丸,生姜汤送下。

【主治】小儿惊风。

65619　**神妙防风散**

【方源】《普济方》卷三七四引《保生集》。

【组成】防风一钱　细辛二钱　僵蚕二钱　白附子一钱(火炮)　朱砂一钱　地龙三钱(灰炮)　荆芥一钱　木香一钱　全蝎三钱(火焙)　蝉壳一钱　蜈蚣三钱(火炮)　天麻一钱　麝香一钱　甘草二钱　白芷一钱　辰砂二钱　人参一钱　金箔少许　轻粉少许

【用法】上为细末。每服一字,用灯芯煎汤调下;有痰,生姜汤送下。

【主治】小儿一切惊风搐搦,诸般恶候。

65620　**神妙观音散**

【方源】《幼幼新书》(人卫本)卷二十三引《家宝》。

【组成】白扁豆　石莲肉(炒,去心)　人参(焙)各一分　茯苓一钱半(焙)　甘草(炙)　香白芷　绵黄耆(捶碎,用蜜水拌,炙)　木香(炒)各一钱　神曲二钱

【用法】上为末。每服婴孩一字,二三岁半钱,四五岁一钱。用水一药注或半银盏,枣子半片,煎十数沸服。

【功用】补虚,调胃气,进乳食,止吐泻。

【主治】《局方》(淳祐新添方):小儿外感风冷,内伤脾胃,呕逆吐泻,不进乳食,久则渐渐羸弱。

【备考】本方方名,原书古籍本作"观音散"。

65621　**神妙佛手散**

《校注妇人良方》卷十二。为张文仲引徐王效方(见《外台》卷三十三)"神验胎动方"之异名。见该条。

65622　**神妙沉香丸**

【方源】《博济》卷二。

【组成】丁香一分　沉香一分　乳香一钱半　阿魏少许　肉桂半两(去粗皮)　舶上茴香半两(炒)　槟榔二枚(冬加二枚)　肉豆蔻二枚(夏加二枚)　荜茇半两　巴豆十五个(去皮心,不出油,另研)

【用法】上为细末,研入巴豆、阿魏令匀,煮白米饭为丸,如绿豆大。每服五丸,生姜汤送

下；如胸膈气不和，及元脏冷气上攻，迷闷，加至十丸，温酒送下；常服茶汤任下。要微动，以意加服之。

【功用】消化滞气，调顺三焦，空胸膈，理脾元，大能化酒食毒。

65623 神妙驱风散

《洪氏集验方》卷三。为《证类本草》卷十三引《博济》“神效驱风散”之异名。见该条。

65624 神妙松金散

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】松香（上等明净者）

【用法】上为极细末。先以凤尾草煎汤洗净患处，再以此散干敷患处，一日三次，须守至一月。

【主治】坐马痈成漏者。

65625 神妙奇效丹

【方源】《全国中药成药处方集》（济南方）。

【组成】云苓 白术各五两 泽泻 黄连各二两 木香一两 川朴二两 米壳三两 粉草二两 白石脂八两 滑石一斤 椿皮二斤 黄耆三两 江米五两 干姜二两 禹余粮八两

【用法】上为细末，水泛为丸，如绿豆大。每服二钱，米汤送下。

【主治】久痢水泻。

【宜忌】忌羊肉烧酒，辛辣厚味。

65626 神妙拔根方

【方源】《外科正宗》卷二。

【组成】蟾酥条

【用法】用披针当顶插入知痛处方止，随用蟾酥条插至孔底，每日二条膏盖。三日后，加添插药，其根高肿作疼，外用神灯照法，助阴为阳。插、照七日，其疮裂缝流脓，至十三日其根自脱。如日多根深蒂固不能脱者，披针取之，内用玉红膏。不脱者自脱，不敛者自敛。

【主治】脑疽、发背阴症，初起不肿高、不焮热，灸不痛者。

65627 神妙乳砂丹

《校注妇人良方》卷十七。为《妇人良方》卷十七“催生神妙乳朱丹”之异名。见该条。

65628 神妙宜气丸

【方源】《普济方》卷三八〇。

【组成】蓬莪术（炮） 赤芍药 川当归 鳖甲（米醋炙焦为度，去裙）各等分

【用法】上为细末，面糊为丸，如麻子大。一岁二十丸，熟水送下。

【主治】小儿疳热久蒸，肌肉消瘦，形容憔悴，神情不乐，饮食虽多不生肌肉。

65629 神妙追毒煎

《圣济总录》卷一二七。为《博济》卷五“追毒膏”之异名。见该条。

65630 神妙绝疟汤

【方源】《脉因证治》卷上。

【组成】木通（川者） 秦艽（去芦） 穿山甲（炙） 常山各等分 辰砂半钱（另研） 乌梅七个 大枣七个

【用法】上以水三盏，煎至半，入酒一盏，再至半，先服枣，次服药。

【主治】疟疾。

65631 神妙起痌散

【方源】《疡科选粹》卷六。

【组成】土萆薢五两 金银花一两 皂角刺 川椒 牛蒡子 郁金 当归 黑铅三两

【用法】以铅溶化，入水银五钱，研为粉，分五份，前药亦分五贴。每贴水二盏，煎一盏，去滓，入铅粉，再煎至八分，滤净服。初服一贴，要出汗，另用金银花一两，防风、荆芥、川椒各五钱，煎水二斗，避风熏洗，取汗为效。患二三十年者，只四料四汗痊愈。

【主治】杨梅疮结毒。

65632 神妙痧药方

【方源】《种福堂方》卷二。

【组成】北细辛三两 荆芥六钱 降香末二钱 郁金一钱

【用法】上为末。每用一茶匙，放舌上，冷茶送下，或津唾咽下。

【主治】痧症。

65633 神妙槐胶丸

【方源】《圣济总录》卷七。

【异名】槐胶丸(《普济方》卷九十三)。

【组成】槐胶半斤(细捣,好酒五升浸一宿,后入锅内煎,滤汁一升)　苏枋木四两(细锉,用长流水五升,煎至一升,滤过,与槐胶汁相和,次入后药)　丹砂(研)　阿魏(研)　乳香(研)　没药(研)各一分(以上六味,将后四味再研匀,入前二味药汁内,慢火再熬数沸,住火,次入后药)　白花蛇(一全条,酒浸一宿,取肉炙)一两半　天麻　天南星(炮)　白附子(炮)　附子(炮裂,去皮脐)各一两　甘草(炙)二两

【用法】上将后六味为末,与前药膏和捣五七百杵,丸如弹子大。每服半丸,生姜酒嚼下,每日三四次。

【主治】摊缓风。

65634　神妙橡实散

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】橡实二两　干楮叶一两(炒炙)

【用法】上为细散。每服一钱,煎乌梅汤调下,不拘时候。

【主治】水谷痢,无问老少,日夜百余行。

65635　神拨还光丸

【方源】《医方类聚》卷六十七引《修月鲁般经》。

【组成】龙胆□两(去皮)　汉防已　砂仁　胡麻子(去土)　黄芩　川芎各二两　枳实　木贼　甘草　车前子各一两　甘菊三两　薄荷一两半

【用法】上为末,蜜为丸,如弹子大。每服一丸,食后细嚼,茶清送下。

【主治】一切眼疾。

65636　神明白术散

《普济方》卷一四八。为《肘后方》卷二"老君神明白散"之异名。见该条。

65637　神明补心丹

【方源】《御药院方》卷六。

【组成】远志(去心)　紫石英(飞研)　石菖蒲各八钱　熟地黄　白茯苓(去皮)各半两　麦门冬(去心)　卷柏(去根土)　人参(去芦头)　丹参　黄耆　白术　泽泻　山茱萸　防风　秦艽　桔梗各四钱　柏子仁　川姜各二钱半　干山药　白蔹　芍药　石膏(飞研)　铁粉(飞研)　神曲(炒)　当归　半夏(生姜制)　牡丹皮各二钱　朱砂(研飞)四钱

【用法】上为细末,入朱砂令匀,炼蜜和丸,每两作十丸,朱砂为衣。每服一丸,煎人参汤化下,温酒亦得,不拘时候。

【主治】心气不足,神志不定,恍惚多惊,虚烦少睡,心情沉默,恶闻人声,一切心虚之证。

65638　神明度命丸

【方源】《千金》卷十一。

【组成】大黄　芍药各二两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服四丸,每日三次。不知,可加至六七丸,以知为度。

【主治】久患腹内积聚,大小便不通,气上抢心,腹中胀满,逆害饮食。

65639　神明椒菊丸

【方源】《普济方》卷八十三引《家藏方》。

【组成】川椒一两　甘菊二两　生地黄(洗)一升

【用法】上生地黄控断水脉,入木臼内烂捣,或砂盆内烂研,以绢袋绞取自然汁,可得十二两以上,去滓不用;将川椒、甘菊入地黄汁内,浸少时漉出,俟水脉断,人慢火焙之,约八九分干,再人地黄汁,再漉再焙,如此以汁尽为度,焙令透干,木臼内捣为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三十丸,以温水送下。半月取效,见二三分,服药百日收全功。

【主治】目睛失明,而睛不损者,或十分不见,以及冷泪及睑紧睑肿,肝虚肝热肾风攻注眼目及患昏花。

65640　神药治枣儿

【方源】《普济方》卷一〇〇引《德生堂方》。

【组成】皂角一斤(去皮弦,锉碎)　麻黄(去节)三分　肥枣一升　好京墨三钱

【用法】上用大砂锅一个,可盛水二斗者,

以皂角、麻黄、京墨三药，入砂锅内熬，煎水至五六碗，滤去滓，再将药水熬成膏二碗，却下枣在膏内，慢火熬令干，则药味皆入枣中，用瓦瓶盛，纸盖瓶上。每日吃枣一枚，至三个五个为度。吃后，次早风痰涎皆从大便中下。

【主治】诸风痫危急之证。

65641 神砂一粒丹

【方源】《宣明论》卷十三。

【组成】附子（炮） 郁金 橘红各一两

【用法】上为末，醋、面糊为丸，如酸枣大，以朱砂为衣。每服一丸，男子酒送下，妇人醋汤送下。

【主治】一切厥心痛，小肠膀胱痛，不可止者。

65642 神砂抱龙丸

【方源】《医灯续焰》卷十六。

【组成】胆星四两 朱砂（水飞）五钱 麝香五分 雄黄二钱五分 天竺黄一两（一方加金箔十张）

【用法】上为极细末，甘草膏和丸，朱砂为衣。

【主治】小儿惊风，风寒痰喘。

65643 神砂益元散

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】滑石（飞过）六两 甘草（为末）一两 神砂 木通 车前 牛子各五钱

【用法】上为末，将神砂另乳成灰尘，然后与诸药末和匀同研。以灯心汤调服。

【主治】痘，壮热发惊搐，狂言谵语。

65644 神砂辟瘟丸

【方源】《松峰说疫》卷五。

【组成】神砂一两（研细）

【用法】白蜜和丸，如麻子大。每服二十一丸，用井花冷水吞下。

【功用】辟瘟。

【宜忌】忌荤一日。

65645 神香圣术煎

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】冬白术五钱（炒香） 紫猺桂一钱 公丁香二分 川姜二钱（炒黄） 广陈皮一钱（炒） 白蔻仁六分

【用法】水煎服。

【功用】热通脾肾。

【主治】寒湿霍乱。因恣食生冷油腻，及过用克伐，或寒中太阴，致伤脾肾之阳，上吐下泻，胸膈痞满，胁肋胀痛，气怯神倦，甚至眶陷腡瘪，四肢厥冷，小便清白，大便有生菜汁腥气，舌苔白滑，或黑润胖大，脉微似伏，证及危笃者。

【加减】呕甚者，加生姜汁一瓢，冲；筋吊者，加酒炒木瓜二钱，络石藤五钱。

【方论选录】何秀山：方以白术、干姜为君，暖培脾阳；即臣以肉桂温肾；佐以陈皮和中；妙在使以丁、蔻兴发气机，以速姜、桂通阳之烈性。此为热通脾肾，寒湿霍乱之主方。

65646 神香苏合丸

【方源】《全国中药成药处方集》（杭州方）。

【组成】苏合香油二两 金银香一两 公丁香 广木香 贡沉香 生香附 犀角尖 飞朱砂各二两 滴乳香（制）一两 生于术二两 梅冰片 麝香各五钱

【用法】上为细末，将金银香酒烊化成膏，和苏合香油，加炼白蜜打丸，每丸潮重五分，蜡壳封固。每服一丸，小儿酌减。中风昏迷，用薄荷汤化服；霍乱吐泻，用淡姜汤化服；惊风抽搐，用钩藤灯心汤化服，或用开水化服亦可。若瘟疫流行时，绢袋盛佩胸际，可避秽毒。

【功用】避秽开窍，祛痰行气。

【主治】小儿急惊，抽搐吐乳，目窜上视，牙关紧闭，痰涎潮壅，危急诸症。并治男妇中风痰厥，昏迷僵仆，寒证气闭，霍乱吐泻，时气瘴疟。

65647 神保既济丹

【方源】《直指小儿》卷二。

【组成】硫黄 焰消 五灵脂 青皮 陈皮 半夏曲（炒）各等分

【用法】上将硫、消夹研，用瓷器熔汁，倾出，候冷再研细，旋入诸药末拌和，粟米糊为丸，如麻子大。每服三丸，食前米饮送下。

【功用】分阴阳，平冷热，定吐泻，豁痰涎。

【主治】小儿慢惊。

65648　**神禹硫凿丸**

【方源】《普济方》卷二二六引《卫生家宝》。

【组成】吴茱萸六两(拣)　茴香(拣)　苍术(锉)　陈橘皮(锉)　青盐各四两　川椒(去子及闭目者)　厚朴(锉，先去皮)　干姜(锉)各三两(上以水一盏，同于瓷器内煮，水尽为度，取出焙干)　附子(炮，去皮脐)　枳实(去瓤，麸炒焦黄)各六两　木瓜四两(干者)　川乌(炮)　赤茯苓各三两　木香一两半　天雄(如无，以大附子代之)　椒目(炒)　木通(炮)　石硫黄(舶上者，去沙石，别研)各三两　阳起石二两半(真者，酒煮半日，别研极细)

【用法】上为细末，然后入阳起石、硫黄二味拌匀，生姜自然汁打面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，温酒或米汤饮送下。

【功用】壮元气，补脾肾，逐痰饮，除湿肿。

【主治】元气衰少，膀胱津液虽藏而不化，又遇上焦有寒，不能引导阴阳，开通闭塞，决渎之官，自失所司，水道无从而出，又与气相壅，停留膈间，久而为饮，渐渍脾土，脾即得湿，而化郁蒸淫于肢腹，上浮于肺，肾尤虚者，则独乘于下部，是以令人素盛而今衰瘦，膈间常有水声，胁肋胀闷，上气喘急，四肢沉重，遍身浮肿，或遍疰腰脚，小便减少，饮食不思。

65649　**神秘七星散**

【方源】《疡科选粹》卷六。

【组成】防风　皂角刺　天门冬　黄芩　瓜蒌仁　金银花各五分　当归　熟地黄　薏苡仁　木瓜　紫花地丁　白鲜皮各一钱　木通一钱　土茯苓四两　甘草三分

【用法】上水三钟，煎二钟，分二次服。服过四贴，去木瓜、木通、紫花地丁、白鲜皮四味，减土茯苓二两五钱，加桔梗七分，照前煎服。先服四贴，复加减三贴，七日全愈。

【主治】杨梅疮。

【宜忌】忌椒、酒、牛肉。

65650　**神秘万灵丹**

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】何首乌(去皮，用黑豆九蒸九晒，忌铁器)　川当归(酒浸)　两头尖各五钱　川乌(去尖，用火炮)　草乌(去尖，用火炮)　大茴香　川芎　人参(去芦)　防风(去芦尾)　白芷　荆芥穗　桔梗(米泔浸)　麻黄(水煮四沸，去节)　炙甘草　天麻各二两　白术(米泔浸)　木香(不见火)　辽细辛　血竭(另研)各五钱　苍术半斤(米泔洗过，入酒浸一宿，晒干，为末)

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼黄酒送下；产后伤寒中风，体如板者，用麻黄汤送下。

【主治】妇人一切胎前产后诸般病症，三十六种冷血风，八十二种风疝病，乳中风，淋血，胎孕不安，死胎不下，胎衣不下，产后腹内搅痛，脐下如刀刺者；胎前产后，赤白带下，呕逆填塞，心气烦满；经脉不通，或来频并，饮食无味，面赤唇焦，手足顽麻，遍身生黑点血瘤者；及产后伤寒中风，体如板者。

65651　**神秘万金膏**

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】草乌　川芎　大黄各六钱　当归　赤芍　白芷　连翘　白及　白敛　乌药　官桂　木鳖子各八钱　杨柳桃桑枣各四钱(一方加苦参、皂角各五钱)

【用法】上为散，用真麻油二斤，浸药一宿，用火煎至药焦色，以生丝绢滤去滓不用，将油再入锅内，以文武火熬至滴水成珠不散，方下飞过黄丹十二两，要炒过，陆续下匀，滴水成珠不散为度。后入乳香、没药末各四钱，搅匀听用。风寒湿气所侵，跌扑闪挫损伤，一切疼痛，皆贴患处；心腹痛，俱贴痛处；哮吼咳嗽，贴背心；泻痢，贴脐上；头痛眼痛，可贴太阳穴；一切无名肿毒，疔疽发背，疮疖湿毒，肿疮臁疮，始觉时便贴患处即消，已成亦能排脓长肉止痛。

【功用】消肿排脓，长肉止痛。

【主治】风寒湿气所侵,跌扑闪挫损伤,一切疼痛,心腹痛,哮吼咳嗽,泻痢,头痛眼痛,及一切无名肿毒,疔疽发背,疮疖湿毒,肿疮臁疮。

【备考】本方加苏合香三钱,名"万应紫金膏"。

65652 **神秘左经汤**

《得效》卷九。为《三因》卷三"大料神秘左金汤"之异名。见该条。

65653 **神秘沉香丸**

《准绳·类方》卷二。为原书同卷引《养生主论》"滚痰丸"之异名。见该条。

65654 **神秘浸酒方**

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】何首乌一两 石菖蒲一两 生地黄七钱 明天麻七钱 白附子五钱 白茯苓五钱 苍耳子一两(炒,研细) 五灵脂五钱(炒) 牛膝七钱 天南星七钱(姜汁炒) 二蚕沙五钱(炒) 当归七钱 苍术五钱(米泔水浸炒) 半夏七钱(姜汁炒) 红花五钱 光草乌末五钱 陈皮五钱(去白) 防风五钱 汉防己五钱 芍药五钱 甘草三钱 黄柏五钱 木瓜七钱 川芎五钱 桑树上络藤一两

【用法】上㕮咀,以布袋盛,悬入坛内,无灰好酒一斗,瓶口封固,重汤水煮五炷香。不拘时候,饮醉为妙。

【主治】左瘫右痪,半身不遂,口眼歪斜,一切诸风,疼痛不可忍者。

65655 **神秘陷脉散**

【方源】《外科精要》卷中。

【组成】黄耆 人参 川芎 当归(酒洗) 赤芍药 粉草 地骨皮 五加皮 忍冬叶 橘红各一两 乳香 没药各五钱

【用法】上每服五七钱,水酒各半煎,连进五七服。

【功用】托里消毒,行气破血。

【主治】疮疡。

65656 **神翁地仙丹**

【方源】《医方大成》卷三。

【异名】地仙丹(《普济方》卷二四一)。

【组成】天仙子一两 川椒二两(去子并开口者) 木鳖子四两 白胶香五两(煮过,别研) 五灵脂三两(陈黑色好者,用好酒浸,投水淘去,绢滤过,晒干) 黑牵牛六两 黑豆八两 草乌七两(小而坚实者洗净,用盐在油中并炒,令色焦黄,折裂候冷,以纸布之类揩令净) 赤土(即土朱)九两

【用法】上为末,同入白胶香、木鳖子末,用隔年好醋打面糊为丸,如梧桐子大。每服三十丸,茶清或酒送下,病甚者频进。

【主治】风痹脚气。

65657 **神效七宝膏**

【方源】《丹溪心法》卷四。

【组成】蕤仁(去油心膜) 白硼砂 朱砂 片脑

【用法】蜜调成膏,点眼。

【主治】暴发眼,热壅有翳膜者。

65658 **神效七厘散**

【方源】《救伤秘旨》。

【组成】乳香(去油) 没药(去油) 红花各一钱五分 儿茶二钱四分 朱砂一钱二分 血竭一两 冰片 麝香各一分二厘

【用法】上为极细末,瓷瓶收贮,勿令泄气,贮久更妙。每服七厘,不必多服。

【主治】金疮。

【宜忌】孕妇忌之。

65659 **神效八味散**

【方源】《元和纪用经》。

【异名】如意散(《洪氏集验方》卷五)。

【组成】甘草(炙)二两 黄芩 大豆黄卷各四两 干姜 吴茱萸 麻子仁 大麦(炒,一方以粳米代之)各四两 桂心七钱半

【用法】上为末。每服方寸匕,空心、食前酒或暖水送下。

【功用】易产。

【宜忌】须入月方得服,过三十日动作宜谨,勿上厕,恐不觉堕地。

65660 **神效八珍散**

【方源】《诚书》卷六。

【组成】牛黄 珍珠(乳炙) 象牙(烧灰) 血竭 儿茶 冰片 人中白 红绒(烧灰) 枯矾 马蹄(烧灰)各等分

【用法】上为极细末。敷患处。

【主治】诸口疳。

65661 **神效八厘散**

【方源】《集验良方·续补》。

【组成】硼砂三钱(要白如雪者) 辰砂二钱(漂净) 当归二钱 沉香二钱 木香二钱 丁香二钱 甘草二钱 生军二钱 巴豆霜一钱

【用法】上为极细末,瓷瓶收贮,勿泄气。每服八厘,加生姜一片,滚水冲服。片刻即下大便而愈。至重者,再用八厘,无不全愈。

【主治】各种痢疾。

65662 **神效九分散**

【方源】《春脚集》卷四。

【异名】九分散(《理瀹》)。

【组成】马钱子四两(去毛皮) 麻黄四两(去节) 乳香四两(去油) 没药四两(去油)

【用法】上为极细末,收瓷瓶内,勿令泄气。遇有受伤人,即与准九分,以无灰老酒调服;外伤处破者,干上;若未破只见青肿,用烧酒调涂。服药后如觉胸中发闹,周身发麻,此是药力行动,勿恐;若受伤甚重,服药不见动静,过一个半时辰,再用无灰酒调服九分;再服后仍无动静,再过个半时辰,再服九分。如此敷服,无论何样重伤,皆能起死回生。

【主治】跌打损伤,无论青肿,错折破烂。

【宜忌】孕妇忌服。此药药力甚大,服者万不可过九分。

65663 **神效三仙散**

【方源】方出《苏沈良方》卷九,名见《仙拈集》卷四。

【组成】决明子不以多少(为末) 水银 轻粉各少许

【用法】上同为散。先以物擦破癣上,再以散敷之。

【主治】癣,日久者。

65664 **神效三良散**

【方源】《普济方》卷三三一。

【组成】吴茱萸(墨豆同炒) 寒食面 干姜(炮)各一两

【用法】上为散。每服二钱,食前温酒调下,每日三次。

【主治】妇人五色带下不止。

65665 **神效三妙散**

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】硫黄 雄黄各一钱 胡椒八分

【用法】上为末。香油调搽。

【主治】脓窠疮。

65666 **神效大通丸**

【方源】《圣惠》卷四十九。

【组成】川乌头二两(炮裂,去皮脐) 砒黄一分(细研) 巴豆一两(去皮心研,纸裹压去油) 芫花一两(醋拌炒令黄) 杏仁一两半(汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 麝香一钱(细研) 黄丹一分(炒令紫色) 猪牙皂荚一两(去黑皮,涂酥,炙令焦黄,去子) 自然铜一两(细研,别用)

【用法】上为末。入研了药令匀,用黑豆面和丸,如绿豆大,以研了自然铜末滚过。每服三丸,空心煎生姜、橘皮汤送下。

【主治】癥瘕。

65667 **神效万灵膏**

【方源】《寿世保元》卷九。

【组成】当归 川芎 赤芍 生地黄 熟地黄 防风 羌活 独活 连翘 山栀 黄连 大黄 玄参 苦参 白芷 两头尖 皂角 桔梗 白及 白蔹 红牙大戟 五倍子 山茨菇 天花粉 官桂各六钱 蓖麻子六十个 木鳖子四十个 杏仁四十个 巴豆肉四十个 穿山甲十片

【用法】上为散,用真麻油二斤四两,发余四两,入药浸,春、秋三日,夏二日,冬五日,油药放铁锅内,文武火熬,用槐柳枝长寸许,各

三十根，同熬焦色，用麻布滤去滓，再放油锅内熬，滴水成珠不散，倾出瓶内，秤准油二斤，下山东黄丹一斤，松香二两，姜汁煮过黄蜡二两、桐油三两，熬至不老不嫩，冷了下乳香、没药、血竭、孩儿茶、阿魏、百草霜各三钱，麝香五分或一钱，轻粉三钱，马齿苋膏三钱，俱为细末，药油将好投下，早了恐泄药气，再熬，不粘手为度；将膏药埋土内三四日，出火毒，瓷瓶内收贮，随意摊贴。倘膏嫩，加杭粉，不拘多少，不粘手为度。

【主治】诸疮肿毒。

65668 神效万金丹

《丹溪心附附余》卷二十二。即《普济方》卷三七四引《瑞竹堂方》"万金丸"见该条。

65669 神效千捶膏

【方源】《慈幼新书》卷十一。

【组成】松香一斤（熔化，滤净，下水缸中，多使人抽拔至白色莹亮，待干研末） 木鳖子（去壳） 杏仁（泡，去皮尖） 蓖麻子（去壳） 大枫子（去壳）各半斤 铜绿（另研） 蛇床子 穿山甲（锉碎，炒） 樟脑（另研） 胆南星 白芷 面粉 半夏各二两 川乌 甘草节 草乌各一两 五倍子 闹羊花 红芽大戟 金线重楼 乳香 没药（二味另研） 孩儿茶 血竭 轻粉 雄黄各五钱 龙骨 青竹蛇 山慈菇 甘遂各四钱 白花蛇小半条 僵蚕 麝香（另研）各一钱二分 蜈蚣六条 癞虾蟆半个 全蝎 阿魏 莪术 三棱各二钱五分

【用法】葱汁、姜汁、柏油、桐油等分制净，将各药研细筛过，人油汁拌匀，放臼内杵三千下，令稠润成膏，如干渐加油汁，摊布贴之，不可见火。如日久放干，以温水烊开摊上，略烘柔软贴之。加麝香少许贴脐上，立止泄泻。

【功用】止痛内消。

【主治】小儿一切无名肿毒；泄泻。

65670 神效千捶膏

【方源】《医宗金鉴》卷六十二。

【异名】千捶膏（《药奁启秘》）。

【组成】土木鳖（去壳）五个 白嫩松香（拣净）四两 铜绿（研细）一钱 乳香二钱 没药二钱 蓖麻子（去壳）七钱 巴豆肉五粒 杏仁（去皮）一钱

【用法】上合一处，石臼内捣三千余下，即成膏；取起，浸凉水中。用时随疮大小，用手捻成薄片，贴疮上，用绢盖之。

【功用】《北京市中药成方选集》：活血消肿，化坚止痛。

【主治】①《医宗金鉴》：疮疡，疔毒初起，并治瘰疬，大人臁疮，小儿蟮拱头。②《北京市中药成方选集》：疮疡初起，红肿坚硬，瘰疬结核，臁疮溃烂，经年不愈。

【备考】本方方名，《北京市中药成方选集》引作"瘰疬千捶膏"。

65671 神效天麻汤

【方源】《卫生宝鉴》卷九。

【异名】天麻汤（《杏苑》卷八）。

【组成】胡麻半升（研） 天麻二两 乳香七钱半（研）

【用法】上为末。每服五钱匕，腊茶调下，每日三次，服半月。两腰眼灸四十壮。

【主治】疠风。

【宜忌】忌动风物。

65672 神效开结散

【方源】《校注妇人良方》卷二十四。

【异名】开结散（《本草纲目》卷五十）。

【组成】沉香 木香各二钱 橘红四两 珍珠四十九粒（入砂锅内以盐泥封固，煅赤取出去火毒用） 猪靥肉子四十九枚（用豚猪者，生项间如枣子大）

【用法】上为末。每服一钱，临卧酒调，徐徐咽下。患小者三五服，大者一剂可愈。

【主治】瘿块。

【宜忌】忌酸咸油腻滞气之物。

65673 神效木瓜汤

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】吴茱萸（陈者，以沸汤泡七次，炒）四两 干木瓜（细锉，焙干）三两半 橘叶

(洗,焙干,切)四两　大腹子二两半(细锉)

【用法】上锉,如米粒大,拌和。每服二钱半,水二盏,先浸一食久,然后以慢火煎至八分,去滓,澄清汁七分盏,温服,早、晚食前及临卧时各一服,计三服,先服此药约半月余,后服牛膝丸。

【功用】疏导毒气。

【主治】脚气。由风湿毒气乘虚攻注下经所致者。

65674　神效木香丸

【方源】《奇效良方》卷四十。

【组成】木香　沉香各二钱　砂仁　苦葶苈(炒)　益智　连翘各三钱　桑皮　白牵牛(半炒)　椒目　枳壳(麸炒)　木通　黑牵牛(半炒)　陈皮　青皮　泽泻　大黄各半两　槟榔　胡椒各一钱　甘遂四钱

【用法】上为细末,米醋糊为丸,如梧桐子大。每服五钱,空心五更初嚼葱白汤送下,消上;次服橘皮汤送下,消中;第三服桑白皮汤送下,消下;尚有余肿,沉香汤送下。

【主治】二十四种蛊病。

【宜忌】忌盐、酱。

65675　神效木香散

【方源】《圣惠》卷九十三。

【组成】木香半两　诃黎勒三分(煨,用皮)　龙骨一两　黄连一两(去须,微炒)　赤芍药一两(微炒)　当归一两(锉,微炒)

【用法】上为粗散。每服一钱,以水一小盏,煎至五分,去滓温服,不拘时候。

【主治】小儿水谷痢,腹痛。

65676　神效五彩散

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】明矾五钱　黄柏(烧者)二钱(生者)二钱　胆矾三分　铅丹五分

【用法】上为细末。用水和解,上火微温,涂抹眼胞上,日数回。

【主治】风眼疫眼,其他胬肉,肿痛者。

65677　神效太一丹

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】禹余粮四两(火烧令赤,于米醋内淬,如此七遍后,捣研如面)　乌头一两(冷水浸一宿,去皮脐,焙干,捣罗为末)

【用法】上药相和,用醋煮面糊为丸,如绿豆大。每服五丸,食前以温水送下。

【主治】冷劳,大肠转泄不止。

65678　神效太乙膏

【方源】《普济方》卷三一四。

【组成】熟地黄　大黄　白芷　黄耆　甘草　当归　防风　白芍药　桂　玄参各一两

【用法】上为末。用麻油二斤,浸药数日,用慢火同熬煎,滤去药末,然后入好黄丹一斤,煎三两沸,试滴水内成珠为度。每用摊纸上贴患处。

【主治】一切痈疽恶疮。

65679　神效太乙膏

《保婴撮要》卷十六。为《百一》卷二十"太一膏"之异名。见该条。

65680　神效太乙膏

【方源】《医学启蒙》卷五。

【组成】白砒一钱　轻粉　乳香各二钱　没药四线　麝香一钱　黄丹五两　麻油一斤　葱七枚

【用法】上依法熬膏,罐盛旋用。

【主治】瘰疬。

65681　神效内伤丸

【方源】《梅氏验方新编》卷六。

【组成】巴豆霜　甘草粉各三钱

【用法】以饮糊为丸,如麻子大,朱砂为衣。每服七丸,茶、酒送下。

【主治】瘀血内凝,烦闷疼痛者。

65682　神效化痈散

【方源】《医方简义》卷五。

【组成】当归二钱　炒白芍一钱　炒青皮八分　柴胡一钱　茯苓三钱　夏枯草三钱　鹿角霜一钱　菊花二钱　青橘叶十片

【用法】水煎服。

【主治】妊妇乳痈。

65683　神效手把丸

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】猢狲头骨半两 虎头骨半两 猫儿头骨半两 砒霜一分（细研） 恒山一两（锉） 朱砂一分（细研） 乳香三分（细研） 麝香一分（细研） 白芥子一分 蜈蚣一枚 阿魏一分

【用法】上为末。炼蜜为丸，如皂荚子大。以绯绢裹一丸，男左女右，臂上系之。发时解下，男左女右，以手把之，时时就鼻嗅之。四五度效。

【主治】鬼疟。疟疾发作无时节，或一日三两度寒热，或两日一度发动，心神恍惚，喜怒无恒，寒则颤掉不休，热则燥渴不止。或愈而复作，或减而更增，经久不瘥，连绵岁月者。

65684 神效牛黄丸

《普济方》卷一一四。为《圣惠》卷二十五“牛黄丸”之异名。见该条。

65685 神效乌头煎

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】生乌头五斤（以河水浸三日，不住换水） 黑豆一斗（净淘） 生姜半斤

【用法】上细锉，以水一石，煎取三斗，去滓，以生绢滤过，复煎如稀饧，以新瓷瓶盛。每日半茶匙，空心以温酒调下；至半月后，渐添至一茶匙，不可多服。

【主治】一切风。

65686 神效乌金丸

【方源】《全国中药成药处方集》（吉林、哈尔滨方）

【组成】天麻一两三钱 没药 归尾 赤芍各一两半 木香一两 草霜三两 京墨 益母膏各二两 川芎一两半

【用法】上除益母膏后入外，余为细末，炼蜜为丸，每丸二钱一分重，外用大赤金为衣，丸用绵纸包裹，外用蜡皮封固，贮于瓷坛中。每服一丸，黄酒或白开水送下。

【功用】平肝顺气，疏通经血，逐瘀生新，消化结聚。

【主治】肝瘀气滞，瘀血闭经，恶露不下，积聚，癥瘕。

【宜忌】忌食腥辣；孕妇忌服。

65687 神效乌金散

【方源】《玉机微义》卷十五引郭氏方。

【异名】首功玄黑散。

【组成】苍耳头（五月五日午时收） 小草乌头 火麻头 木贼（去节） 虾蟆头 桦皮节（酥炙） 麻黄（去根、节）各等分

【用法】上晒干，同入瓷器内，盐泥固济，炭火内从早煅至申分，如黑煤色为度，碾为末。每服二钱，病重者三钱，用热酒调下；未汗，再一服。如汗干，却服解毒疏利之药。

【主治】痈疽疔肿，时毒，附骨疽，诸恶疮；或疮黑陷如石坚，四肢冷，脉细，或时昏冒谵语，循衣烦渴，危笃者。

65688 神效乌金膏

【方源】《保婴撮要》卷十五。

【组成】巴豆仁（炒黑）

【用法】研如膏。点于患处；疮疡肉死不腐，涂之即腐，未死涂之即生；若初起肿痛揉点数处，其毒顿消；若患顽疮，元气无亏，久不收敛，内有毒根者，以纸捻蘸纴之即敛。

【功用】去腐消毒敛疮。

【主治】疮疡初起肿痛；或肉死不腐，以及患顽疮元气无亏，久不收敛，内有毒根者。

65689 神效六宝散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】炉甘石 乳香 没药 血竭 黄连各一钱 轻粉五分 冰片一分

【用法】上为末。先以米泔水洗净患处，再敷。

【主治】下疳。

65690 神效火龙膏

【方源】《摄生众妙方》卷四。

【组成】生姜自然汁二碗（用大铁钓熬作一碗） 牛皮胶（明亮者）二两（用一盏水熬化） 麝香（真正者）二钱（研细）

【用法】将胶汁倾入姜汁内，再煎待稠粘，将麝香末搅入，俟温暖适宜，却量手足湿痛处

长短阔窄均匀摊开冷定，自不粘贴衣被，不必用油纸，七八日后渐次脱去，如前法再熬贴。不过六七次自愈。

【主治】湿症，手足湿痛。

65691 **神效水银丸**

【方源】《圣惠》卷四十九。

【异名】水银丸(《普济方》卷一七五)。

【组成】水银半两　硼砂半两　腻粉二分　定粉二分　消石一分

【用法】上为末，候水银星尽为度，用枣瓤和丸，如酸枣大。却用枣一枚去核，安一丸在内，以面裹，烧面令黄色，去面取药枣，温水嚼下。

【主治】脏腑气虚，饮食不节，生冷过度，不能消化，与脏气相搏，结聚成块，压伏于腹胃之间，盘牢不移，岁数弥久，渐渐增长，而致厌食，不计年月。

65692 **神效打板膏**

【方源】《种福堂方》卷四。

【组成】乳香　没药各(去油)三两　轻粉　血竭各三钱　冰片三分　麝香一分　樟脑二钱　黄蜡一两二钱　猪板油(熬，去滓，净油)三两　儿茶二钱

【用法】上为细末，将油蜡同化成膏。贴患处，昼夜流出恶水，即时苏醒。

【主治】死血郁结，呃逆不食，并夹棍伤烂。

65693 **神效平胃散**

《保命歌括》卷十九。为《医方类聚》卷十引《简要济众方》"平胃散"之异名。见该条。

65694 **神效东风散**

【方源】《医钞类编》卷八引《普门医品方》。

【组成】川连　黄芩　白芍　楂肉各一钱二分　枳壳　槟榔　厚朴(炒)　青皮各八分　归尾　地榆(炒黑)　甘草各五分　红花(酒洗)　木香　桃仁(去皮尖，炒)各三分

【用法】水煎服。

【主治】痢疾初起，赤白相兼，腹痛后重。

【宜忌】忌汗、下、分利、收涩。

【加减】单白者，去当归、地榆、红花、桃仁；大便结滞，去黄连，加煨大黄。

65695 **神效左经丸**

【方源】《景岳全书》卷五十六。

【组成】苍术(米泔浸)　草乌(去皮)　葱白　干姜各四两(上捣烂，装入瓶内，按实，密封瓶口，安于暖处三日，取出晒干，入后药)　金毛狗脊　藁本　白芷　破故纸(酒浸，焙干)　抚芎　小茴香(炒)　穿山甲(炮)　牛膝(酒浸)各二两　川乌(炮)　木瓜　白附子　虎胫骨(酥炙)　乳香(炙)　没药(炙)各一两(另研)

【用法】上为末，酒糊为丸，如小豆大。每服三四十丸，空心酒送下。

【主治】诸风寒湿痹，麻木不仁，肢体手足疼痛。

【加减】此方加当归六两更佳。

65696 **神效龙脑膏**

【方源】《博济》卷四。

【异名】龙脑膏(《普济方》卷三七四引《全婴方》)。

【组成】生龙脑一钱(研)　腻粉一分　水银半两(用腊茶半钱，好酥一块如枣大，以水银一处揩磨调和，杀研之)　天南星二钱(洗，去皮脐，湿纸裹，熟灰内煨，研)　石脑油(冬用)一两(夏用一分)

【用法】上为末，以石脑油和丸，如绿豆大。一至四岁，每服一至二丸，煎乳香汤送下，不得化破，服后三五顿食久，取下恶物痰涎即效。

【主治】小儿惊风搐搦，痰塞在心，戴眼直视，或眼不开，口噤，四肢或冷或热，大便或秘或泄。

65697 **神效四仙汤**

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】陈麻黄　甘草各二钱　细茶一撮　生白果七粒(去壳，将肉捣碎)

【用法】热服取汗。

【功用】定喘。

【主治】喘急欲死者。

65698 神效四圣散

《医钞类编》卷二十一。为《直指》卷二十三“四圣散”之异名。见该条。

65699 神效生肌散

【方源】年氏《集验良方》卷六。

【组成】龙骨（煅）一钱 海螵蛸一钱 没药（炙去油）一钱 乳香（炙去油）一钱 象皮（煅）一钱 真轻粉一钱 真血竭一钱 赤石脂（煅）二钱 冰片三分 珍珠六分（豆腐煮，研无声） 麝少许

【用法】上为极细末，瓷器收贮，封口。每用少许，掺上疮口。

【主治】顽疮不收口。

65700 神效生肌散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】乳香 没药 血竭 儿茶各一钱 珍珠 龙骨各五分 冰片 象皮各三分

【用法】上为极细末，贮瓶，塞口。

【功用】生肌。

【主治】肿毒溃烂。

【加减】有水，加龙骨；欲速收口，倍珍珠。

65701 神效生肌散

《梅氏验方新编》卷六。为《痈疽验方》“生肌散”之异名。见该条。

65702 神效生肌散

【方源】《外科方外奇方》卷二。

【异名】生肌散（《集成良方三百种》）。

【组成】煅石膏四钱 赤石脂 乳香 没药 轻粉 煅龙骨各二钱 血竭一钱 儿茶一钱五分 冰片五分 红升丹五钱

【功用】化毒生肌。

【主治】《集成良方三百种》：疮内脓将尽者。

【备考】《集成良方三百种》本方用法：共研极细，搽患处，以膏药盖之。

65703 神效白术丸

【方源】《普济方》卷一六五引《卫生家宝》。

【组成】半夏八两（汤泡，洗七次，去滑） 神曲六两

【用法】上为细末，生姜自然汁和作饼子，以纸裹，当风处候干；用面一两，白术一两，同为末，生姜自然汁为丸，如梧桐子大。每服三十丸，姜汤送下，不拘时候。

【主治】痰壅喘嗽，不下饮食。

65704 神效白龙丸

【方源】《摄生众妙方》卷五。

【组成】白矾（飞过）不拘多少

【用法】上为细末，用好醋（飞过）面糊为丸，如鸡头子大。每服一丸，红痢，甘草汤送下；白痢，姜汤送下，如不止，再服一二丸，即止；霍乱症，姜汤送下；疟疾，用东南桃心七个煎汤送下。

【主治】痢疾，霍乱，疟疾。

【宜忌】忌荤腥、油腻、煎炒之物。

65705 神效白散子

【方源】《得效》卷十四。

【组成】大川乌（去皮脐） 南星 半夏 白附子各一两 羌活（去芦） 黄芩各五钱

【用法】上锉散。每服三钱，加生姜五片，水一盏半，煎服。

【主治】产后痰血结滞，发为潮热，心胸如火，烦躁口干，诸药不效。

65706 神效瓜蒌散

《妇人良方》卷二十三。即《集验背疽方》“栝楼散”。见该条。

65707 神效瓜蒌散

《普济方》卷二八六。为《直指》卷二十三“四圣散”之异名。见该条。

65708 神效瓜蒌散

【方源】《寿世保元》卷七。

【组成】大瓜蒌（黄熟者）一个（连皮子瓤，重重纸包火煨，捣烂，每一剂半个） 白芷一钱五分 玄参二钱 升麻五分 归尾二钱 桔梗一钱 连翘二钱 柴胡一钱 青皮一钱 天花粉一钱五分 穿山甲（炒）一钱 川芎八分 知母一钱 木通一钱 木鳖子二个 元胡索二分

【用法】上锉一剂。水煎，温服。

【主治】妇人乳肿作痛,欲成痈毒。

65709　**神效瓜蒌散**

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】当归　贝母　白芷梢各一钱　花粉八分　香附六分　瓜蒌仁　甘草节各六分　青皮　乳香　没药各五分　山甲一钱　川芎四分

【用法】水酒煎,分二服。

【主治】吹乳。

65710　**神效地黄散**

【方源】《普济方》卷三十二引《杨氏家藏方》。

【组成】地黄五两　丁香一两　苁蓉二两(酒浸)　蛇床子二两　枣子三两　黄精二两半　菟丝子　木香半两　远志二两　白茯苓二两　蛤蚧三两(一对)　人参一两　川楝子一两(炒)　青盐一两(炒)　茴香二两三钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服空心温酒送下。服七日见效。

【主治】男子肾脏虚损,阳事不举。

65711　**神效夺命丹**

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】朱砂三钱(为衣)　枯矾一钱　蜗牛二十个(焙干)　血竭二钱　轻粉二钱(上二味全研)　蟾酥一钱(同研)　铜绿一字

【用法】上用小儿母乳汁和丸,如梧桐子大,朱砂为衣。遇此病令患人自嚼生葱一二根,烂吐出,裹药一丸在内,吞下前药,却以热酒三二杯送。如重车行十里路,遍身汗出,视天气,斟酌衣被盖易汗出,毒气肿自消。如病人昏沉,人代嚼葱白如前服。

【主治】一切发背、疔疽,及破伤风、阴证伤寒。

65712　**神效达生散**

【方源】《经验百方》卷上。

【组成】苏梗一钱五分　当归一钱(酒洗)　白芍二钱(酒炒)　甘草三分　川芎一钱(酒炒)　大腹皮一钱(黑豆汁洗)　枳壳一钱(麸炒)　白术一钱(土炒)　陈皮八分　川贝二钱(去心)　葱头二个

【用法】水煎服。孕至三月后常服之。

【主治】久惯小产。

【加减】临产前一月加秋葵子六分(炒),临盆时加秋葵子一钱,催生如神。

65713　**神效百子丸**

【方源】《女科指掌》卷二。

【组成】明净硫黄一两

【用法】铜铫内甘草汤煮一日,取出阴干,研极细末,面糊为丸,如梧桐子大,约二百粒。每遇妇人月经过后,每服二十五丸,空心酒送下,次日服三十五丸,又次日服四十丸,一百丸尽,交合成胎矣。如此月经复行,再如前服一百丸,必然有孕,可服清热养血之剂。

【功用】求嗣。

【主治】妇人无子。

65714　**神效托里散**

【方源】《局方》卷八(宝庆新增方)。

【异名】神效散(《朱氏集验方》卷十二)、托里散(《医学正传》卷六引《疮疡集》)、神功托里散(《外科发挥》卷二)、金银花散(《外科发挥》卷五)、四妙汤(《医宗说约》卷六)、四金刚(《串雅内编》卷二)。

【组成】忍冬草(去梗)　黄耆(去芦)各五两　当归一两二钱　甘草(炙)八两

【用法】上为细末。每服二钱,酒一盏半,煎至一盏,若病在上食后服,病在下食前服。少倾再进第二服,留滓外敷,未成脓者内消,已成脓者即溃。

【主治】痈疽发背,肠痈,奶痈,无名肿毒,焮作疼痛,憎寒壮热,类若伤寒,不问老幼虚人,并皆治之。

65715　**神效当归膏**

《局方》卷八(吴直阁增诸家名方)。即《圣惠》卷六十八“神效白膏”。见该条。

65716　**神效当归膏**

《校注妇人良方》卷二十四。为《外科枢要》卷四“当归膏”之异名。见该条。

65717　**神效回生膏**

【方源】《医方类聚》卷一七六引《瑞竹堂方》。

【组成】槐 柳 桃 榆 桑 枸杞（树条嫩者）各二十条（每条长二寸）

上将六件树条，剥取嫩皮，用清油三升，文武火于大砂锅内煎，令嫩皮津液尽为度，将油滤过。

白芷 白及 白蔹 当归 大黄 黄柏 赤芍药 杏仁 蓖麻子各一两半

将上药锉碎，再下于前油内浸透，又用慢火煎炒，去药滓，再用油滤过。用黄丹十二两，分作三次下，于油内熬令黑色，将筋觜蘸药油滴水内不散为度。

血竭 雄黄 乳香 没药各五钱 轻粉三钱

【用法】上为极细末，放油微温，下前药于油内，以瓦罐盛之，盖口，埋土内三日，去火毒。任意摊贴患处，二日外自觉病退。

【主治】痈疽疖毒，远近臁疮，打扑跌折伤损，暗毒发背，刀斧所伤，箭头在肉，蛇犬所伤，并皆治之。

65718 **神效回疔丸**

【方源】《大生要旨》。

【组成】百草霜一两 没药五钱 白蜡五钱 松香（去尽节）一两 真乳香五钱 黄蜡五钱 云绿五钱 麻油一两

【用法】先将松香熬存性，揭起冷透，研末，另将麻油文火煎一滚，入乳香、没药在麻油内熬一滚，再入黄白蜡熬开搅和，再将云绿、松香同熬一滚，后入百草霜并熬不住手搅，将药揭起，以滴水成珠为度，每丸约重四分。凡有生疔即将此丸呵软贴患处，是疔即粘住，当即回散。

【主治】疔疮，发背腿痈，未成可散，已成可以提脓生肌。

【宜忌】忌荤腥、生冷、辛辣等味。

65719 **神效回疔膏**

【方源】《普济方》卷二七三。

【组成】桑柴 枣 柳柴 谷桿草 施风草 荞麦稭各一斤 鸡粪 石灰各四两五钱

【用法】上除石灰外，俱烧灰，用滚水淋汁一二碗，熬至半盏，用锅底煤相调成膏。如疮不破，将疮拨破搽之，不过三度全可。

【主治】诸般疔疮、恶疮、瘤痔。

65720 **神效朱砂丸**

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】朱砂一分 定粉一分 粉霜一分 巴豆一分

【用法】上同研如面，用水浸蒸饼和丸，如绿豆大。每服二丸，空心以冷酒汤送下。

【主治】久赤白痢不愈，日夜度数无恒。

【宜忌】忌食热物。

65721 **神效血竭膏**

【方源】《杨氏家藏方》卷十二。

【组成】香白芷 白蔹 川芎 黄蜡（熔去滓，净者） 甘草（炙）各四两 当归（洗，焙） 丁香 干蟾各半两 木鳖子二十八枚（去壳） 鼠头二枚（腊月者佳） 绯绢一尺（烧灰）黄丹十两 室女发一两 杏仁九十八枚（研，不去皮尖） 没药一两半（研） 乳香二两半（别研） 血竭一两半（别研）

【用法】上除黄蜡、黄丹、乳香、没药、血竭外，其余药并细锉，用好酒拌湿，淹一宿，倾在铛内，入清油二斤，慢火煎，候药黑色滤去滓，别入净铛内，慢火煎少时即入黄蜡，候熔，次以黄丹作两次下，以柳枝不住手搅，滴入水中成珠子为度，方下乳香、没药、血竭，搅匀候冷，以净瓷器收之。如患发背未结脓者，取旧艾一小把，水三斗，煮十沸，放温洗疮，后用膏子一钱，分作三服，温酒化下，仍外贴之，脓即随药出；如患肠、肺痈疽恶疖，用半两分五服，甘草汤化下；妇人血劳，用膏子丸如梧桐子大，每服十丸，用生姜、地黄汁和童子小便送下；破伤风并伤折内损，每服十丸，并用温酒送下。丸时以蛤粉衬手。

【主治】痈疽、发背、一切恶疮，不问年月深浅；及软疖成脓，蛇、虎、犬、蝎、汤火、刀斧损伤，破伤风并伤折内损，及妇人血劳。

65722　神效杀疳丸

《普济方》卷三九八。为原书同卷"天灵丹"之异名。见该条。

65723　神效产灵丹

【方源】《全国中药成药处方集》(西安方)。

【组成】当归　首乌　两头尖　白术　广木香　细辛　血竭各五钱　人参　川乌　草乌　大茴　川芎各二钱　肉桂一两半　沉香六钱　琥珀一两　防风　白芷　荠穗　桔梗　麻黄　炙草各二两　苍术半斤

【用法】上为细末，炼蜜为丸，二钱重，朱砂为衣。每次一丸，陈黄酒送下。服后覆卧。

【主治】妇人产后，代谢机能衰弱，血循环发生障碍，恶露不下，或下之不尽，胸腹胀闷，两胁刺痛，头目眩晕；及产后虚怯，感冒风寒，恶寒发热，头身疼痛。

【宜忌】无瘀血而内燥热者不宜服。

65724　神效决明散

【方源】《圣惠》卷三十三。

【组成】决明子三两　蔓荆子三两(蒸三炊久，每度晒干)

【用法】上为细散。每服二钱，食后以温水调下。

【主治】积年失明，成青盲。

65725　神效麦面汤

【方源】《景岳全书》卷五十九。

【组成】麦面(炒黄色)一钱　防风　白术(炒)　牡蛎(煅，醋淬)　黄耆(蜜炙)一钱半

【用法】水一钟半，枣二枚，煎八分，调服辰砂妙香散。

【主治】心虚盗汗。

65726　神效豆蔻丸

【方源】《卫生宝鉴》卷十九。

【组成】神曲(炒)　麦糵(炒)各半两　肉豆蔻(面裹煨)三两　黄连半两　芦荟二钱半(研)　使君子十个(去皮)

【用法】上为末，豮猪胆汁为丸，如黍米大或梧桐子大。每服二三十丸，空心、食前米饮送下。

【主治】小儿脾疳瘦弱，或泄利无度。

65727　神效赤金锭

【方源】《遵生八笺》卷十八。

【组成】焰消八两　黄丹一两　白矾一两　雄黄五分　朱砂三分

【用法】上为细末，陆续投于铁锅内熬成膏，用茶匙挑在板上，成条用之。一切无名肿毒，恶疮初起，水磨涂之；眼目昏花，赤肿火眼，点眼两角即效；乳蛾喉闭，口中含化五分；蛇蝎伤涂之，立止疼痛；黄水疮、漆疮、绞肠痧、急心痛，点眼角即愈。

【主治】一切无名肿毒、恶疮初起，眼目昏花，赤肿火眼，乳蛾喉闭，蛇蝎伤，黄水疮，漆疮，绞肠痧，急心痛。

65728　神效护心散

【方源】《嵩崖尊生》卷十二。

【组成】僵蚕　山甲　大黄　牙皂(去皮弦)　木鳖(炒焦，去毛，土炒)各等分

【用法】上为末。每服一钱，热酒送下。如呕出再服。待药存住，则毒不攻心，一切肿毒未成可散。

【主治】疔毒攻心，恶心不食，并一切肿毒。

65729　神效吹口药

《种福堂方》卷三。即《外科正宗》卷二"神效吹喉散"。见该条。

65730　神效吹喉散

【方源】《外科正宗》卷二。

【异名】神效吹口药(《种福堂方》卷三)、吹喉散(《外科传薪集》)。

【组成】薄荷　僵蚕　青黛　朴消　白矾　火消　黄连　硼砂各五钱

【用法】上为细末，腊月初一日取雄猪胆七八个，倒出胆汁，用小半和上药拌匀，复灌胆壳，以线札头，胆外用青缸纸包裹，将地挖一孔，阔深一尺，上用竹竿悬空横吊，上用板铺以泥密盖，候至立春日取出，挂风处阴干，去胆皮青纸，瓷罐密收，每药一两加冰片三分，同研极细。吹患上。

【主治】缠喉风闭塞，及乳蛾喉痹，重舌木

舌。

65731 神效佛手散

【方源】《跌损妙方》。

【组成】鹿茸 当归 苁蓉 禹余粮 菟丝饼 桑螵蛸 紫石英 熟地 白芍 川芎 干姜 复盆子 酸枣仁 五味子 琥珀 茯苓各等分

【用法】上为末。加生姜三片，大枣一个为引。

【主治】金疮重伤，筋骨断折将死者。

65732 神效肚痛丸

【方源】《疮疡经验全书》卷五。

【组成】黄蜡 飞丹各一两 巴豆仁七枚 杏仁四十九粒（去皮尖，二味研烂）

【用法】将蜡熔化，加丹为丸。每服七丸，姜汤送下。

【主治】腹痛。

65733 神效疔毒丸

【方源】《青囊秘传》。

【组成】雄黄 大黄 巴豆各三钱

【用法】杵烂，面糊为丸，如风仙花子大。轻者每服九丸，重者二十一丸，极重者三十丸。

【主治】疔毒。

【宜忌】宜慎用。

65734 神效沃雪汤

《准绳·伤寒》卷七。为《三因》卷六"沃雪汤"之异名。见该条。

65735 神效沉香丸

【方源】《广笔记》卷二。

【异名】聚宝丸。

【组成】真沉香二钱 真麝香八分 血竭一钱五分 乳香一钱五分 缩砂仁二钱 木香二钱 玄胡索一钱 没药五分

【用法】上为细末，糯米糊为丸，如弹子大，用辰砂一钱五分为衣。烧酒磨服。男妇腹疼及诸气作痛，产后气血攻心，用陈酒磨服；如热气痛，葱汤嚼下；小儿天吊作痛，啼叫不已，葱汤磨服。

【主治】男子胃脘寒痰结阻，翻胃呕吐，饮食不通；男妇腹痛，诸气作痛，产后气血攻心；小儿天吊作痛，啼叫不已。

65736 神效补天丹

【方源】《全国中药成药处方集》（吉林、哈尔滨方）。

【组成】制替五两 巴戟四两半 枸杞 熟地各四两 杜仲 白术 白芍 人参 故纸 菟丝饼各三两 块苓 远志各二两半 边桂 枣仁 萸肉 龙骨 当归各二两 柏仁 五味 附子 复盆子各一两半 鹿胶三钱 黑驴肾一具 砂仁二两

【用法】先将驴肾用滑石烫焦，再合诸药一处碾细，炼蜜为小丸，如梧桐子大，包于纸袋内严封，贮于瓷罐内。每服二钱，早、晚空腹各服一次，白水或淡盐汤送下。

【功用】补气养血，添精壮阳。

【主治】气虚血亏，百病蜂起，瘦弱难支，纳入便溏，气息微弱，动则作喘，腰酸瘘软，健忘怔忡，自汗眩晕，痳而不实；并治肾虚阳瘘，肾虚滑精，阳瘘不举，举而不坚，见色自泄，精汁清冷，缺乏子嗣。

【宜忌】忌食生冷，相火盛者勿服。

65737 神效阿魏散

【方源】《摄生众妙方》卷六。

【组成】天竺黄二钱 阿魏二钱二分 芦荟二钱 番木鳖一个 白僵蚕二钱 孩儿茶三钱 甘草三钱 大黄一两 穿山甲七片（炒焦）

【用法】上为极细末。每服三钱，好酒调服。如重车行十里许时浓血化即愈。

【主治】①《摄生众妙方》：痞疾。②《便览》：积聚。

【备考】《便览》有莪术二钱。

65738 神效附子丸

【方源】《校注妇人良方》卷七。

【组成】黑附子（重一两四五钱，端正底平尖园）一枚

【用法】上灰火炮皮裂，入生姜自然汁内，浸润晒干，再炮，再入汁浸润，仍晒再炮，用尽

姜汁半碗为度,却去皮脐为末,以人参煎膏为丸,如黍米大。每服数丸,津唾咽下。胃气稍复,饮食稍进,投以温补之剂。

【主治】脾肾虚寒,呕吐,或翻胃噎膈。

65739　神效鸡清丸

【方源】《普济方》卷二〇七引《瑞竹堂方》。

【组成】木香二两　黄连二两半　肉豆蔻十枚(大者,生)

【用法】上为细末,取鸡子清搜药作饼子,于慢火上炙令黄色变红,稍干,再为末,面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心米饮汤送下。

【主治】一切泻痢。

【方论选录】《活幼口议》:木香、黄连一阴一阳药,木香善导水利气脉,黄连厚肠胃,二味君臣相佐,阴阳相须,加之豆蔻温和脏腑,止泻痢功效弥良。凡儿患泻与痢,不问证轻重,并宜搀先与服,不问脏腑冷热,愈多愈效。然鸡清为物有毒,是以毒气引药致效,若去此一味,其功不作矣。

65740　神效驱风散

【方源】《证类本草》卷十三引《博济》。

【异名】祛风散(《圣济总录》人卫本卷一〇六)、驱风散(《圣济总录》文瑞楼本卷一〇六)、神妙驱风散(《洪氏集验方》卷三)。

【组成】五倍子一两　蔓荆子一两半

【用法】上为末。每服二钱,水二盏,铜石器内煎及一盏,澄滓,热淋洗,留滓二服,又依前煎淋洗。

【功用】明眼目,去涩痒。

【主治】风毒上攻,眼肿痒涩,痛不可忍者,或上下睑眦赤烂,浮翳瘀肉侵睛。

65741　神效松脂散

【方源】《嵩崖尊生》卷十。

【组成】黄香十二两

【用法】上为细末,用水十碗,入铜锅内煮一时辰,离火候温,即下手在水内,将香扭拔数次,冷定取出,再研再煮,如此九次,其香即酥,瓷器收贮,不可泄气。每服三钱,空心滚黄酒调下。

【主治】一切疠风,并大麻风。

【宜忌】服药后其毒从大小二便而出,预先令人在空野之地,挖一深坑,如病毒行,解在坑内,俟毒行尽,即用土盖之,恐毒染人。毒行之后,需用淡饭静心养之,不可用厚味动火发疾。并忌生冷腥荤诸般发物,大忌房事,如犯之则不可救。

65742　神效虎肚丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】虎肚一具　川朴片十五两　大戟四两　杜酥五钱

【用法】烧酒米糊为丸,金箔为衣。每服三四钱。

【主治】命门火衰,脾胃虚寒,不能克化水饮,致成寒水膨胀者。

65743　神效明目汤

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】细辛二分　蔓荆子五分　防风一钱　葛根一钱五分　甘草二钱　(一方加黄耆一钱)

【用法】上㕮咀,作一服。水二盏,煎至一盏,去滓,稍热临卧服。

【主治】眼棱紧急,致倒睫拳毛,及上下睑皆赤烂,睛疼昏暗,昼则冷泪常流,夜则眼涩难开。

【备考】本方方名,《医林纂要》引作"防风明目汤"。

65744　神效明目汤

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】干葛　黄连　黄芩各五分　蔓荆子　防风　甘草各四分　细辛三分

【用法】水一盏半,葱一根,煎七分,临卧稍热服。

【主治】眼棱紧急,拳毛倒捷,两睑赤烂,疼痛昏涩,夜则难开,眵泪满眼。

65745　神效乳砂丹

【方源】《济阴纲目》卷十。

【组成】明乳香(为末)

【用法】以猪心血为丸，如梧桐子大，朱砂为衣，日干。每服一丸，嚼碎冷酒下，良久未生，再服；或以莲叶蒂七个，水煎，化服二丸，良久未生，再服；如胞浆先干，胎不得下，急服大料四物汤，滋其血气，并浓煎葱汤熏洗产户，更用油烛涂产户内，却服前药；如产死不下，用朴消五钱，滚汤调下，或平胃散一服送下；如胞衣未下，酒、水服一丸，即下；产门不开，用加味芎归汤送服二丸。

【主治】难产。

65746 神效乳香膏

【方源】《中藏经·附录》

【异名】金露。

【组成】芝麻油四两 黄丹一两半 乳香二分 羊同骨髓四两 麝香少许 （一方用没药一分代乳香）

【用法】上药合一处，入瓷器内，用文武火熬之成膏，用绵滤过，入瓷盒收之，入黄蜡半两。

【功用】生肌止痛。

【主治】一切疮肿。

65747 神效金珠丸

【方源】《圣济总录》卷六十八。

【组成】丹砂半两 金箔四片 蚯蚓三条

【用法】先将丹砂、金箔研细，后将蚯蚓同研为丸，如小皂子大。每服一丸，冷酒送下，不嚼。

【主治】吐血。

65748 神效金黄散

《良朋汇集》卷五。为《外科正宗》卷一“如意金黄散”之异名。见该条。

65749 神效金髓丹

【方源】《圣惠》卷二十八。

【组成】吴茱萸三斤

【用法】以新水淘一百遍，日中晒干，以浓酒五升煮茱萸，以酒尽为度。以炭火烧地令赤，以酒二升淋地，将茱萸摊在地上，以盆合之，以灰四面焙之，勿令泄气，一宿取出，以文火炒令干，捣罗为末，以醋煮枣肉和研为丸，如绿豆大。每服二十丸，加至三十丸，空心及晚食前以生姜汤送下。

【主治】冷劳及冷气诸疾。

【备考】本方方名，《普济方》引作“金髓丹”。

65750 神效定痛丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】破故纸（炒） 茴香（淘去砂，炒） 延胡索各一两（炒） 黑牵牛半两（炒）

【用法】上为细末，研蒜膏子为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心、食前细嚼胡桃酒送下。

【功用】定痛。

【主治】腰痛不可忍，坐立不得。

65751 神效参术散

《会约》卷十五。为《局方》卷六（续添诸局经验秘方）“神效参香散”之异名。见该条。

65752 神效参苓散

《嵩崖尊生》卷九。为《局方》卷六（续添诸局经验秘方）“神效参香散”之异名。见该条。

65753 神效参香散

【方源】《局方》卷六（续添诸局经验秘方）。

【异名】参香散（《医统》卷八十九）、神效参苓散（《嵩崖尊生》卷九、神效参术散（《会约》卷十五）。

【组成】白扁豆（炒） 人参 木香各二两 茯苓（去皮） 肉豆蔻（去皮）各四两 陈皮（去白） 罂粟壳（去蒂）各十二两

【用法】上为细末。每服三大钱，温米饮调下，不拘时候。

【主治】①《局方》（续添诸局经验秘方）：脏气虚怯，冷热不调，积在脏腑，作成痢疾，或下鲜血，或如豆汁，或如鱼脑，或下瘀血，或下紫黑血，或赤白相杂，或成五色，里急后重，日夜频并，脐腹绞痛，甚不可忍，及噤口，疳蛊，时瘟诸痢。②《会约》：产后泄泻，及痢疾日久，积秽已去，滑泄不止。

65754 神效胡桃酒

【方源】《普济方》卷二四九。

【组成】胡桃(好者)一枚

【用法】火内烧成灰,细研。以热薄荷酒调下。

【主治】小肠气,及妇人外痈。

65755　**神效胡粉丸**

【方源】《局方》卷六。

【异名】胡粉丸(《圣济总录》卷七十六)。

【组成】胡粉　乌贼鱼骨　阿胶(炒焦如珠子)各四十两　白矾(煅)　龙骨(洗)各八十两　密陀僧二十两

【用法】上为末,以粟米饭为丸,如梧桐子大。每服二十丸至三十丸,空心温粟米饮送下。

【主治】肠胃虚滑,下利无度,赤白相杂,脐腹㽲痛,里急后重,减食羸瘦,或经久未愈者。

65756　**神效点金丹**

【方源】《普济方》卷三〇九。

【组成】苍术　红曲末　香附子　白芷　草乌各一两

【用法】上为末,水糊为丸,如鸡头子大。每服五丸,或酒或茶盐送下。

【功用】接筋骨。

【主治】折伤。

【宜忌】不可多服,恐麻人。

65757　**神效贴凹散**

《幼幼新书》(人卫本)卷九引《张氏家传》。即原书古籍本同卷"贴凹散"。见该条。

65758　**神效贴灸膏**

【方源】《医方类聚》卷一九四引《御医撮要》。

【组成】白芷　黄耆　细辛　防风　芎䓖　芍药　没药　乳香　零陵香　血余各二两　黄丹六两　黄蜡半两　真油十六两

【用法】上㕮咀,绵裹纳油铛内,慢火煎,滴水中成珠不散,以绵滤去滓,次入黄丹、黄蜡,以柳篦搅不住手,成黑色放冷看硬软,没药、乳香别细研纳膏中,更搅成膏。

【主治】汤火伤。

65759　**神效种子丸**

【方源】《外科传薪集》。

【组成】大熟地二两四钱　肉苁蓉二两四钱　萆薢四钱　灯草五尺　木香二两四钱　山萸肉二两四钱　荜澄茄二两　大茴香二两　马蔺实(阴干,研)八分　干漆二两　巴戟肉二两　蛇床子一两四钱　龙骨二两　全当归一两　牡蛎粉二两　母丁香二两　桑螵蛸二两二钱　全蝎(去尾)五钱　茯苓一两半　蜘蛛十四个　威灵仙二两　菟丝子二两　沉香二钱　车前子二两　木通二两四钱　远志肉二两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如绿豆大。每服一二钱,清晨开水送下。

【功用】种子。

【备考】每于经期转时,服汤药一剂。煎方如下:桂枝三分,白芍二钱,甘草二钱,姜皮三钱,再加玉盆二钱,枣二枚。

65760　**神效复生丸**

《寿世保元》卷八。为《鲁府禁方》"复生丸"之异名。见该条。

65761　**神效便毒方**

【方源】《医统》卷八十一。

【异名】神效祛毒散(《疡科选粹》卷四)。

【组成】当归尾二钱　甘草节五分　木鳖子一个　穿山甲一钱(炒黄)　皂角刺五分　直僵蚕一钱　蜈蚣一条(炙,去头足,为末,调入汤中)

【用法】上酒、水各一盏,煎至一盏,以大黄末三钱、朴消二钱、蜈蚣末三味,置盏内将热药冲入和匀,通口空心服,用葱汤漱口,再吃葱汤尤妙。辰时服药,巳时必泻下脓血恶物,走十数次方效,再服和中解毒汤二贴。

【主治】便毒。

65762　**神效保命丸**

《中国医学大辞典》。为《卫生总微》卷六"神授至圣保命丹"之异名。见该条。

65763　**神效追风丸**

【方源】《解围元薮》卷三。

【组成】当归　麻黄　羌活　白术各五钱

荆芥二两五钱 白芍 黄芩 僵蚕 川芎各一两 人参三钱 蒺藜 胡麻 防风各二两 没药 乳香各二钱五分 麝香四分 苦参皮六两 大枫子肉四两

【用法】上为末，黄米粉、酒糊为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，早晚温酒送下。

【主治】癞麻疙瘩，热风，干风，一切危笃等症。

65764 神效追命散

【方源】《续本事》卷二。

【组成】川大黄（实者） 皂角刺各半斤 川郁金五两

【用法】上为细末。每服三大钱，用真大枫子油入无灰酒温调药末，临睡时服。脏腑转时，只就地上取下虫，如疾多年，其虫色黑，日近者，其虫色赤，隔三二日再服，直候无虫，方是病愈，即止其药，只服平常风药及诸补药。

【主治】大风。

【宜忌】六十日内用清斋，戒房色，歇却一切俗念，亦不可嗔怒。

65765 神效鬼哭膏

【方源】《普济方》卷三一三。

【组成】香油五斤 柳、槐、桑、杞枝四两半 苏木 降真节各四钱 甘草三钱 防风二钱 川乌二钱 草乌二钱 半夏二钱 黄柏一钱半 槐花二钱 红花四钱 厚朴二钱 黄连五钱 蓖麻三钱 江子二钱 牙草四钱 天花粉二钱 川楝二钱 当归须三钱 川椒二钱 南星四钱 五加皮二钱 杜当归四钱 穿山甲二钱 苍术二钱 白及二钱 木鳖子二钱 槟榔二钱 川芎二钱 贝母二钱 白芷二钱 妇人油头发

【用法】上将前药同五枝一处入油，熬至药成炭黑色，用铁笊篱捞去滓，离火候稍温，下黄丹三十五两，用槐条搅匀，再入火略滚一二沸，药锅离火，再下乳香、没药、血竭末各一两，搅匀，用生麻布滤入别器内，将麝香一两研，轻粉七钱半在锅内和匀，候经一宿用。

【主治】杖疮不疼不发无痕，及痈疽，远年恶疮肿毒、风寒暑湿、疼不可忍者。

【备考】方中"妇人油头发"用量原缺。又用法中所言"五枝"，而组成中只有柳、槐、桑、杞四枝，疑脱。

65766 神效胜金丹

【方源】《全国中药成药处方集》（吉林、哈尔滨方）。

【异名】琥珀胜金丹。

【组成】香附十六两 川芎一两半 丹皮二两半 当归一两半 玄胡一两半 牛膝二两半 远志一两半 熟地四两半 赤芍一两半 白术一两半 白薇四两 白芍一两半 炙草七钱半 白石脂一两 藁本三两 茯苓二两半 乳香一两 没药一两 赤石脂一两 白芷一两半 贡桂二两半 山参一两半 琥珀五钱 朱砂五钱 鹿茸二两

【用法】琥珀、朱砂均各另研，余药均一处研细，调匀，炼蜜为丸，大赤金为衣，每丸重二钱一分，除包装外，用瓷坛保贮。每服一丸，白水调服。

【功用】温补，收涩，益气，养血。

【主治】气血虚脱，中气微弱，自汗形消，面色苍白，爪枯肤燥；经血暴崩或点滴不断，腰酸腿软，头晕气短；积湿浸带，带脉不宣，带下赤白，腰酸腿痛；子宫寒冷，血分虚弱，经血不调，久不受孕。

【宜忌】干血痨及瘀血实症均忌用。

65767 神效胜金膏

【方源】《普济方》卷三一五。

【组成】清油三斤 黄丹一斤半 当归一两 白及 黑牵牛各半两 木鳖子六十枚（去壳、油） 独活一两 川牛膝半两 川楝子八钱 清藤半两 猪牙皂荚半两 松枝 桃枝 槐枝 柳枝 石榴枝

【用法】上药依法煎制。

【主治】疮疖痈疽，打扑伤损。

【备考】方中松、桃、槐、柳、石榴枝用量原缺。

65768 神效活络丸

【方源】《中药制剂手册》引广州陈李济制药厂方。

【组成】蕲蛇(酒炙)三两　甘草(炙)三两　大黄(酒制)三两　草豆蔻(炒)三两　黄芩三两　白芷三两　川芎(酒蒸)三两　藿香三两　白附子(制)三两　麻黄三两　香附(酒醋炒)三两　羌活三两　何首乌(酒蒸)三两　沉香三两　熟地黄三两　威灵仙二两四钱　天麻(姜制)三钱　当归二两四钱　僵蚕(姜水炒)三两　葛根二两四钱　青皮(醋炒)一两五钱　玄参一两五钱　白术(土炒)一两五钱　天竺黄一两五钱　虎骨(酒炙)一两五钱　茯苓一两五钱　赤芍(酒炒)一两五钱　细辛一两五钱　龟版(醋炙)一两五钱　骨碎补一两五钱　豆蔻(炒)一两五钱　木香三两　黄连(炒)九钱　全蝎七钱二分　地龙肉(炒)九钱　秦艽一两五钱　防风四两五钱　肉桂三两　桑寄生一两五钱　朱砂二两五钱　没药(醋炙)二两四钱　血竭一两二钱　乳香(醋炙)一两五钱　安息香一两五钱　松香七钱五分　冰片四钱二分　牛黄四钱二分　丁香一两五钱　犀角四分七厘五毫　麝香三分

【用法】以上熟地黄、当归单放，朱砂至麝香十一味单包，将朱砂研为极细粉，犀角锉研为细粉，麝香、牛黄、冰片先后研细过 100～120 目细罗，乳香、没药、血竭、松香、安息香分别轧为细粉，丁香轧细，熟地黄、当归用酒蒸透，干燥后与蕲蛇等三十七味，共轧为细粉，和匀过 80～100 目细罗，炼蜜为丸。每丸重一钱二分，每服一丸，每日二至三次，温开水送服，噙化亦可。

【功用】舒筋活络，祛风豁痰。

【主治】风痰入络引起突然中风，痰厥，左瘫右痪，肢体麻木，以及痿软无力，痹症疼痛，手足拘挛。

【宜忌】孕妇忌服。

65769　神效活络丹

【方源】《普济方》卷一一四引《德生堂方》。

【组成】乌蛇(去皮骨)半两(酒浸)　麻黄二两(一半去节)　木香二两　白芷二两(去土)　细辛一两半(去土)　全蝎(新者)一两　赤芍药一两　当归一两半(去芦)　两头尖二两(刮去皮，一半小油浸，微炒)　防风二两半(去芦)　川芎二两　干葛一两半　没药一两(另研)　血竭一两(另研)　朱砂(水飞)一两(另研)　乌犀末半两(镑)　地龙半两(去土)　甘草半两(炒，去土)　丁香(净)一两　僵蚕一两(炒)　乳香一两(另研)　麝香一两(另研)　片脑二钱半(另研)　官桂二两　草豆蔻(净)二两　羌活(净)二两　天麻二两　香附子一两　玄参二两　人参一两　牛黄二钱半(另研)　藿香二两(去土)　威灵仙一两半(酒浸)　何首乌二两(酒浸)　沉香一两　天竺黄一两(另研)　川附子一两(炮裂，去皮脐)

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每药一两半重，作十丸，如弹子大，用金箔为衣。早晨空心、临卧各服一丸，细嚼烂，好酒送下。若治男子妇人卒暴中风，不省人事，倒地不能起坐，诸药不效，此药二丸，好酒一大盏，化开灌下；如口眼㖞斜，语言蹇涩，身体麻痹，口噤失音不语，痰涎壅盛，筋脉拘挛，手足不能屈伸，骨节疼痛不能转侧，精神昏愦，临卧一丸，细嚼，或烂研，好酒咽下便睡，觉有汗受汗，无汗将病手背随即舒拳，至天明起，用人扶搀行动，至早饭后依前扶搀行动，至日西再服一丸，可痊；又治妇人产后暗风，洗头偏头风，旋晕欲倒，用药一丸，细嚼，或研开，好酒咽下即愈；破伤风，用二丸细嚼，热酒送下，半时不省，再服一丸，汗出为效；治内外一切伤寒，温酒嚼一丸亦可，以汗出为验；凡人年四十以上者常服，间二三服一丸，永无诸风之证。

【主治】风疾。凡男子妇人卒暴中风，不省人事，倒地不能起坐，或口眼㖞斜，语言蹇涩、身体麻痹，口噤失音不语，痰涎壅盛，筋脉拘挛，手足不能屈伸，骨节疼痛不能转侧，精神昏愦；或妇人产后暗风，洗头偏头风，旋晕欲倒，或破伤风，或内外一切伤寒。

65770 神效活络丹

【方源】《外科理例·附方》。

【组成】官桂 羌活 麻黄（一半去节） 贯众 白花蛇（酒浸） 甘草（炙） 草豆蔻 天麻 白芷 两头尖（去皮油浸，微炒） 零陵香 黄连 熟地黄 黄芩 何首乌（酒浸） 大黄 木香各二两 赤芍药 细辛（去土） 天竹叶（另研） 没药（另研） 朱砂（水飞，另研） 乳香（另研） 丁香 白僵蚕（炒） 虎骨（酒炙） 玄参 龟版（酒炙） 人参 黑附子（炮，去皮脐） 乌药 青皮 香附子 茯苓 安息香（另研） 白豆蔻 白术 骨碎补 沉香各一两 威灵仙（酒浸） 全蝎（新者） 葛根 当归各一两半 麝香 乌梢蛇（去皮骨，酒浸） 乌犀屑（地龙去土） 松香脂各五钱 血竭七钱半（另研） 防风二两半 牛黄二钱半（另研） 冰片二钱半（另研） （一方无白花蛇、零陵香、黄连、黄芩、熟地黄、大黄、虎骨、龟版、乌药、安息香、青皮、白豆蔻、骨碎补、茯苓、白术、松香脂，有藿香）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如弹子大，每药一两半作十丸，金箔为衣。每服一丸，细嚼，温酒茶清漱下，临卧、空心各一丸，随症上下，食前后服；头痛，茶送下；男妇卒暴中风，不省人事，㖞斜口噤，失音，涎盛，拘挛，临睡烂研一丸，好酒化下便睡觉，有汗将病人手背随即舒拳，天明用人扶行，早饭、日西再服一丸，可痊；产后暗风及破伤风，内外一切伤寒，人年四十以上，间二三日服一丸，永无风疾。

【主治】男妇卒暴中风，不省人事，㖞斜口噤，失音，涎盛，拘挛，或产后暗风及破伤风，内外一切伤寒。

65771 神效活络丹

【方源】《慈禧光绪医方选义》。

【组成】虎胫骨三钱 胆星八钱 防风六钱 半夏六钱 羌活六钱 川芎六钱 全蝎六钱 广红六钱 苍术六钱 川贝六钱 白附子六钱 独活六钱 桂枝六钱 当归六钱 乌药六钱 香附六钱 茯神六钱 石菖蒲六钱 麻黄二两四钱 牛黄一钱七分 沉香四钱六分 川附子三钱二分 钩藤一两 白芷一两 牛膝一两 天麻一钱六分 麝香一钱 冰片一钱二分 苏合油一两 僵蚕一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，蜡皮封固，每丸重二钱。每服一丸，用温酒送下，白开水、茶清送亦可。

【功用】舒肝活血，除湿化痰。

【主治】风湿诸痹，肩臂腰膝筋骨疼痛，口眼歪斜，半身不遂，行步艰难，筋脉拘挛。

65772 神效济生散

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】北细辛 广木香各二斤 香薷三斤 广郁金 降香各八两

【用法】上为极细末。每服五分，老幼及虚人减半，茶清调下，重则加倍。

【功用】理气辟秽，调和阴阳。

【主治】脾胃受湿，发为急痧，或霍乱吐泻，形寒发热，胸痞腹痛。

65773 神效宣脑散

【方源】《普济方》卷五十七。

【组成】川郁金 川芎 青黛（水飞） 薄荷 小黄米各三分

【用法】上为细末。每服少许，冷水噙之。取黄水鼻中下。

【主治】鼻渊。

65774 神效祛毒散

《疡科选粹》卷四。为《医统》卷八十一“神效便毒方”之异名。见该条。

65775 神效退管丸

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】槐角四两 地龙（去泥，醋炒）二两 白丁香（酒炒）二两 珍珠（煅）一钱二分 象牙屑（煅）一两 管仲（炒）二两 蝉退八个（去足翅） 良姜一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心白汤水送下。服至十三日管自落，二十日全愈。

【主治】痔管。

65776 **神效退翳散**

【方源】《普济方》卷七十八。

【组成】当归 川芎 大黄 草决明 龙胆草 薄荷 黄连 黄芩 防风 荆芥 栀子各等分

【用法】白翳大者,用黄酒煎;赤障,用白水煎。

【主治】白翳,赤障。

65777 **神效桂附丸**

【方源】《外科精要》卷下。

【组成】桂心 附子(炮,米醋浸淬三五次,去脐,火干) 厚朴(姜制) 粉草(炙) 白术(炒)各一两 木香一钱 乳香(另研)二钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服二三十丸,空心米汤送下。

【主治】阳气虚,冷漏诸疮。

65778 **神效桔梗汤**

【方源】《外科启玄》卷十二。

【组成】桔梗一钱 贝母 知母 桑白皮 瓜蒌仁 当归 百合 杏仁 地骨皮 苡仁 枳壳 玄参 青黛 紫菀 麦冬各七分 甘草三分

【用法】上㕮咀,作一剂。以水二钟,姜皮五分,煎煮,食后服,不拘时候。

【主治】肺痈。咳而胸膈隐痛,两胁肿满,咽干口燥,烦闷多渴,时出浊唾腥臭。

【加减】喘,加苏子、莱菔子;肺虚咳,加人参、阿胶;热燥,加黄芩、栀子;有脓血,加合欢皮、茅根;便秘,加酒煮大黄;心烦咳痛,加朱砂、红枣;咳引咽嗌,加桔梗、玄明粉。

65779 **神效桦皮散**

【方源】《永类钤方》卷七。

【组成】桦皮 杏仁 皂角刺 胡桃十二枚 山栀子(上五味烧灰)各三钱 穿山甲(黄土炒)三钱 乳香 没药各三钱(酒浸,别研,调和) 麝香少许

【用法】上前六味并作末,却加下三味,可作六服,酒调,猛进二服。即见效。

【主治】便痈初发。

65780 **神效破棺散**

【方源】《普济方》卷六十三。

【组成】胆矾 铜绿 白僵蚕 马牙消各等分

【用法】上为末。每用一字,竹筒吹入喉中;如走马喉闭,牙关紧急,不省人事,用铁物斡开口,以冷水调一字灌之。

【主治】咽喉疮毒肿痛。

65781 **神效换肌丸**

【方源】《婴童百问》卷八。

【异名】换肌丸(《医林纂要》卷九。

【组成】川黄连(炒) 鳖甲(酒炙) 肉豆蔻(煨) 使君子 神曲(炒) 麦芽(炒)各半两 麝香半钱 诃子肉一钱半

【用法】上为末,面糊为丸,如芥子大。米汤送下,量儿大小加减。

【主治】小儿脾疳,肌瘦,潮热盗汗,饮食易伤,脏腑不调,泄泻糟粕不化,头大腹急。

65782 **神效透关散**

【方源】《活幼口议》卷二十。

【异名】透关散。

【组成】荜澄茄不拘多少

【用法】上为细末。每以少许吹入鼻中,于食后频数吹之。

【主治】小儿斑疮,初作眼患,痛涩羞明怕日,出泪频多;或已觉渐成白翳子。

65783 **神效酒煎散**

【方源】《外科精要》卷下。

【组成】人参 没药(另研) 当归尾各一两 甘草 栝楼一个(半生半炒)

【用法】上以酒三碗,煎二碗,分四服;滓焙干,加当归末一两,酒糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,用浸药酒送下。

【功用】消毒活血。

【主治】一切疮疡。

【备考】方中甘草用量原缺。

65784 **神效消疔散**

《青囊秘传》。为《华氏医方汇编》卷二“消疔丸”之异名。见该条。

65785 **神效消疬丸**

【方源】《疡医大全》卷十八。

【组成】大熟地二两 泽泻 白茯苓 山药 山萸肉各一两 玄胡索 牡丹皮 牡蛎各一两二钱 （一方用玄参，无玄胡索）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三钱，白汤送下。

【主治】瘰疬。

65786 **神效消核散**

【方源】《医级》卷九。

【组成】全蝎三十个 守宫一对（煅末） 雄黄三钱（飞研） 蛤粉一两 丝瓜筋三个（炒炭，研）

【用法】先将全蝎纳胡桃壳内，用麻扎合，和黄泥作泥丸，火煅去泥，取炭合诸药末，研匀，瓷瓶收贮。每服三分，子食后用夏枯草汤调下，当间服加味逍遥散。

【主治】妇人肝经郁火，注流颈项结核，久则成串。

65787 **神效消痞散**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】白信块

【用法】上为末。大者多至五分，小者减之，入大布膏药内，将药位于中心，再将小纸膏剪去边，刺小孔，满贴布膏上，然后贴上患处。不令白信着肉，防皮肤起泡。

【主治】疟母。

65788 **神效益母丸**

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】益母草十两 生地四两 阿胶三两 白术 香附 当归 白芍 川芎 荆芥 陈皮 郁金 蕲艾 地榆炭各二两 木香一两

【用法】蜜为丸。

【主治】妇人胎前产后十八般大病。一应经水不调，久不生育；胎动不安，临产艰难，胎衣不下，血晕不醒，恶露不尽，死胎不下，种种危险之症；及室女月事不调，将成骨蒸劳者。

65789 **神效桑鸡丸**

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】桑鸡一两（微炒） 槐鸡一两（微炒） 猬皮一两（微炒） 乱发灰半两 黄牛角䚡一两（烧灰） 白矾（石矾灰）一两 枳壳一两（麸炒微黄，去瓤）

【用法】上为末，煮槐胶和丸，如梧桐子大。每服十丸，食前煎槐枝汤送下。

【主治】痔疾，下血不止。

65790 **神效桑枝炙**

【方源】《外科枢要》卷四。

【组成】桑枝

【用法】桑枝燃火，着吹熄焰，用火灸患处片刻，日三五灸；若腐肉已去，新肉生迟，宜灸四畔。

【功用】未溃则解热毒，止疼痛，消瘀肿；已溃则补阳气、散余毒、生肌肉。

【主治】阳气虚弱，发背不起，或瘀肉不溃；阴疮、瘰疬、流注、臁疮、恶疮久不愈者。

【备考】阳症肿痛甚，或重如负石，初起用此法，出毒水，即内消；其日久者用之，虽溃亦浅，且无苦楚。

65791 **神效黄矾丸**

《校注妇人良方》卷二十四。为《备急灸法》“矾黄丸”之异名。见该条。

65792 **神效黄耆汤**

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【异名】黄耆汤（《医学入门》卷八）。

【组成】蔓荆子一钱 陈皮（去白）五钱 人参八钱 炙甘草 白芍药各一两 黄耆二两

【用法】上㕮咀。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，临卧稍热服。

【主治】浑身麻木不仁，或头面手足肘背或腿脚麻木不仁；及两目紧急缩小，羞明畏日，隐涩难开，或视物无力，睛痛昏花，手不得近，或目少精光，或目中热如火。

【加减】如小便淋涩，加泽泻五分；如有大热证，加酒洗黄柏三分；如麻木不仁，虽有热不用黄柏，只加黄耆一两；如眼缩急，去芍药；

如麻木甚者，加芍药一两。

【宜忌】眼缩急者，忌酒、醋、面、大料物、葱、韭、蒜辛物。

【备考】本方方名，《中国医学大辞典》引作"神功黄耆汤"。

65793　神效黄耆汤

《疡科心得集》卷上。为《普济方》卷二八九"黄耆汤"之异名。见该条。

65794　神效硇砂丸

【方源】《圣惠》卷七。

【组成】硇砂三分　雄黄一分　朱砂一分　黄丹一分(微炒)　麝香三钱　巴豆十枚(去心研，纸裹压去油)

【用法】上件药都入于乳钵内，顺日研半日，用煎醋浸，蒸饼为丸，如绿豆大。每服以温酒送下五丸，不拘时候服。

【主治】肾脏冷气卒攻，脐腹疼痛甚者。

65795　神效硇砂丸

【方源】《圣惠》卷七十一。

【组成】硇砂一两　水银一两　琥珀一两　朱砂一两　麝香一分　硫黄一分

【用法】上以硫黄水银结成砂子，都研令极细末，用酒煎狗胆一枚为膏，为丸如梧桐子大。每服以温酒送下五丸。

【功用】行经脉，利血气。

【主治】妇人血气攻心腹疼痛。

65796　神效硇砂丸

【方源】《圣惠》卷九十八。

【组成】硇砂半两　消石一分　青盐半两　白矾一两　黄丹一两

【用法】上为末，用瓷瓶子盛，固济瓶口，以炭火七斤，煅令通赤，放冷取出，细研，以面糊为丸，如绿豆大。每日空心以粥饮送下十丸。

【主治】水脏惫伤，久积风冷。

65797　神效接骨丹

【方源】《普济方》卷三〇九引《卫生家宝》。

【组成】南乳香　没药　南白胶　密陀僧四两(研)　香白芷　红豆　大豆　赤芍药　当归(水洗三遍)　水蛭　瓜子仁各等分　自然铜(火烧通红，醋淬红，烧如银为度)

【用法】上为细末，黄蜡为丸，如弹子大。每服一丸，用黄米酒一盏，煎开和滓温服；年少者又一服，老者加减服，病在上食后，病在下食前服。

【主治】筋折骨损，及寒温脚腿疼，或一切恶疮，疼痛不止。

65798　神效救命丹

【方源】《鸡峰》卷二十七。

【组成】朱砂一两　麝香半两　雄黄　黄丹各二钱半　巴豆二分(去皮油)　斑蝥二钱半(去头足，一半生一半炒用)　蜈蚣二条(一生一熟上七味各细研)　苦药子二钱半　山豆根一两　续随子二钱半(去皮，生用)

【用法】上为细末，和匀，用糯米煮糊为丸，如十斤鱼眼大。每粒可救男五妇三。凡初中毒，便令人嚼生黑豆取验，急将药用真腊茶清送下一丸，须臾，患人自觉心头如断皮条之声，其毒从目口鼻出或大便下，中毒未久即血，久即成虫，更将药净洗收之再用；一切蛇、蝎、蜈蚣、马汗毒伤，以药点好醋磨汁，涂之立解。常于端午日修合，不及于九月九日亦得。

【功用】解中毒。

【主治】诸蛇毒，蛊毒，一切药毒。

【宜忌】大忌酒肉毒物一月。

65799　神效第一方

【方源】《医统》卷九。

【组成】桑枝灰一斗

【用法】热汤淋取汁，洗头面，次用大豆及绿豆浆添热水三日一浴，一日一洗面；却用侧柏叶蒸晒干，白胶香各等分，为细末，滴水为丸。每服五七粒，温水送下，每日三次。

【主治】厉风恶疾，鼻梁崩塌，遍身溃烂。

65800　神效鹿胎丸

【方源】《全国中药成药处方集》(吉林、哈尔滨方)。

【异名】百补鹿胎丸。

【组成】萸肉　革薢　熟地　生地　寸冬　五味　小茴　故纸　盆子　鹿胶　杜仲　怀

牛膝 青盐 柏仁 归身 巴戟 远志 锁阳 苁蓉 菟丝饼 巨胜 酒母 酒柏 川椒各五钱 仙茅 枸杞 黄精 云苓 人参 山药各一两 首乌二两 鹿胎一具

【用法】将鹿胎洗净晒干，合诸药一处碾细，炼蜜为丸，重二钱一分，大赤金为衣，用棉纸包之，外用蜡皮封固，贮于玻璃瓶或瓷坛中。早晚各服一丸，枣汤为引，或淡盐汤为引。

【功用】补肾填精，调月经，温子宫，益气养血。

【主治】肾虚阳痿，月经不调，子宫寒冷，虚劳。

【宜忌】君相火盛，血热者忌服。

65801 神效麻仁丸

《外科精要》卷中。为《脚气治法总要》卷下"神功丸"之异名。见该条。

65802 神效清目饮

【方源】《疯门全书》。

【组成】白菊花二钱 白蒺藜一钱半 蔓荆子一钱半 荆芥穗一钱半 绿升麻五分 麻黄一钱（表证轻者不用） 灵仙一钱 石菖蒲五分 何首乌二钱 苦参一钱（无癣不用） 黑栀仁一钱 枯黄芩一钱 小川连一钱 肥知母一钱 条甘草六分

【主治】麻风及麻风攻目。

65803 神效清震汤

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】羌活一钱 荆芥 牛蒡子 防风 葛根 柴胡 赤芍 独活 白芷 前胡 川芎各八分 升麻 甘草各六分 薄荷七分

【用法】加生姜、葱，水煎服。出汗。

【主治】天行瘟疫，头面肿盛，咽喉不利，舌干口燥，憎寒壮热。

65804 神效剪红丸

【方源】《准绳·类方》卷八。

【组成】一上末：槟榔（生，研细，取净末）一斤（以二两为母，余十四两上第一次，以一等罗筛过，取齐晒干）

二上末：商陆（即樟柳根，白者可用，赤者杀人） 金毛狗脊 贯众各四两（以上三味和一处，研极细末，上第二次，以二等罗筛过，取齐晒干） （一方不用贯众，则虫出来犹未死也）

三上末：三棱（醋煮） 莪术（醋煮）各八两 青木香 西木香各四两 雷丸（醋煮）二两半 南木香二两（以上六味和一处，研极细末，上第三次，以三等罗筛过，取齐）

四上末：大黄（铡碎，酒浸，晒干，研细，取净末）一斤（上第四次，以四等罗筛，取齐晒干）

五上末：黑牵牛（半生半炒，研细，取头末）一斤（上第五次，以五等罗筛过，取齐晒干） （一方有枳壳一斤为母，有藿香四两，和入诸香）

【用法】上作五处，另研极细末，要作五次上末，却用茵陈半斤，大皂角一斤煎汁，滤净，法水为丸，如绿豆大，晒干后用丁香末一两，或加芦荟末一两亦妙，以前净汁煎一滚，洒入丸药，旋摇令光莹为度，再以阿胶二两（生），以前汁熬溶，洒入丸药，旋摇光莹，晒干。壮人每服五钱，弱人每服四钱，五更以茶清吞下，小儿减半。若病浅，即一服见效；若源深，更须再一服。

【功用】宣导四时蕴积。春宣积滞，不生疮毒；夏宣暑湿，不生热痢；秋宣痰饮，不生瘴疟；冬宣风寒，不生瘟疫。

【主治】一切虫积。凡因饮酒过度，食伤生冷，致使脾胃不和，心膈胀满，呕恶咽酸，常吐清水，面色萎黄，不进饮食，山岚瘴气，水肿、蛊胀，齁船咳嗽，痰涎壅滞，酒积、食积、气积、气块，反胃噎膈，呕逆恶心，肠风，痔漏，脏毒，酒痢，累蕴积热上攻，头目下生疮癣，妇人血气，寒热往来，肌体羸弱，月经不调，赤白带下，鬼气鬼胎，产后诸疾；小儿五疳，虫积，误吞铜铁，误食恶毒等物。

【宜忌】此药温和，不动元阳真气，亦无反恶。孕妇休服。

【备考】药后用马桶盛粪于野地看之，庶见

药功易辨，或虫、或积、或如烂鱼冻，或作五色等积。若一次未见虫积，更看第二三次下来，此即是病根。有积消积，有气消气，有虫取虫，有块消块。若病根去，其病自消。

65805 **神效琥珀散**

【方源】《圣惠》卷五十八。

【组成】琥珀半两　磁石半两(烧酒淬七遍，细研，水飞过)　桂心半两　滑石半两　葵子半两　川大黄半两(锉碎，微炒)　腻粉半两　木通半两(锉)　木香半两

【用法】上为细散。每服二钱，食前以葱白、灯心汤调下。

【主治】石淋，水道涩痛，频下沙石。

【备考】本方方名，《观聚方要补》引作"琥珀散"。

65806 **神效斑蝥丸**

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】斑蝥一分(去头足翅，糯米拌炒，令米黄为度)　连翘二两　乌蛇三分(去皮骨，酒浸一宿，炙令黄)　玄参三分　漏芦三分　荏子三分　空青三分(烧过，细研)　川大黄一两(锉碎，微炒)　牛蒡子一两半(微炒)　黑豆黄二分

【用法】上为末，入空青研令匀，炼蜜为丸，如绿豆大。每服五丸，渐加至十丸，空心及夜卧时以温酒送下。

【主治】风瘘赤肿，脓汁不止。

65807 **神效葶苈散**

【方源】《圣惠》卷五十四。

【异名】神助散(《局方》卷八)、葶苈散(《圣济总录》卷七十九)。

【组成】甜葶苈三两(隔纸炒令紫色)　牵牛子二两半(微炒)　猪苓二两(去黑皮)　泽泻二两　椒目一两半(微炒)

【用法】上为细散。取葱白三茎(切)，以浆水一大盏，煎取半盏，入清酒半盏，搅令匀，稍热空腹，调下三钱，以人行五里已来，即煮浆水粥，切入葱白，煮令烂熟，更入清酒五合，搅匀，面向东，热吃令尽。至午后来，或小便下三五升，或大便通利，气喘即定，肿减七分，隔日后再服，百日内切好将息。

【主治】十水之病，百方不愈，面目四肢俱肿，气息喘急，寝卧不得，小便渐涩，肿胀气闷，水不入口，垂命欲死。

【宜忌】不得吃盐及诸面食。

65808 **神效煮兔方**

【方源】《圣惠》卷九十六。

【异名】煮兔方(《普济方》卷二五八)。

【组成】兔一只　新桑根白皮半斤(细锉)

【用法】上剥兔去皮及肠胃，与桑根白皮同煮，烂熟为度，尽力食肉，并饮其汁，即效。

【主治】消渴。

65809 **神效煮酒方**

【方源】《摄生众妙方》卷四。

【组成】五加皮三两　宣木瓜三两

【用法】上用无灰酒三大壶，入小瓷瓶内，将前药㕮咀，亦入瓶内，坐放滚锅中，待酒数沸取出，冷一宿。每次空心饮六七杯。不过五七瓶，无不愈者。

【主治】湿证。

65810 **神效越桃散**

【方源】《保命集》卷中。

【组成】大栀子三钱　高良姜三钱

【用法】上和匀。每服三钱，米饮或酒调下。其痛立效。

【主治】诸下痢之后，阴阳交错，不和之甚，小便利而腹中虚痛不可忍者。

65811 **神效紫金丹**

【方源】《普济方》卷一六九。

【组成】硇砂　轻粉　雄黄　干漆　信　豆粉霜

【用法】上药每一钱，用黄蜡三钱，烂研为丸，朱砂为衣。每日早晨先服香油四两，带须葱白三茎，再服药一丸，米饮汤送下。

【主治】积聚疼痛。

65812 **神效紫金膏**

【方源】《保命集》卷下。

【组成】轻粉　雄黄　铜青　川芎　龙脑

麝香　黄连　青盐　海螵蛸　当归　硇砂　乳香　血竭各五分　朱砂　硼砂各三钱　没药一钱　炉甘石二两（童便制七次）　黄丹二两　白丁香二分

【用法】上为极细末，白砂蜜一斤，先将黄连末熬，后下炉甘石、黄丹，用槐枝搅不住手，煎如紫色，用瓷器盛，用油纸七片封口，窨土内去火，七日方用。点眼。

【主治】黄肿。

65813　神效喝起散

【方源】《博济》卷一。

【组成】鳖甲（洗净，醋炙令黄）　柴胡（去苗）　秦艽　牡丹皮　附子（炮，去皮脐）各等分

【用法】上为末。每服三钱，用豮猪石子一个，去筋膜，以葱白一寸、椒末一钱，同研如糊，入碗与药相和，用童便一小盏，煎三五沸，人药末，搅匀，盏盖子盖之，放温服。

【主治】劳证。背胛劳倦，肢节酸疼，多困少力，饮食无味，面黄体瘦，或发寒热。

65814　神效黑神丸

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】雄黄　硫黄　水银（与硫黄结为砂子，研）　朱砂　金星礜石　太阴玄精　白石英　紫石英　悉蔺脂　阳起石　曾青　定粉　黄丹　滑石各一两

上为细末，入固济了瓶子内，盖上钻一窍子，盖口以六一泥固济令密，先以文火养一复时，令出阴气尽，以泥塞窍，后以大火烧令通赤，待冷，用湿土培瓶子一日，出火毒毕，取出细研，入后药：

乌蛇肉二两（酒浸，炙微黄）　天麻二两　天南星一两（炮裂）　麻黄二两（去根节）　犀角屑一两　桂心一两　白附子一两（炮裂）　干蝎二两（微炒）　牛黄一两（研细）　麝香半两（细研）　白龙脑半两（细研）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服一丸，以豆淋酒送下。

【主治】一切风。

【宜忌】忌猪、鸡、毒滑、动风物。

65815　神效黑神丸

【方源】《鸡峰》卷十九。

【组成】好虢丹一两（用绢裹扎定，甑中以盏䓠之，蒸升炊了，取出于地下用碗覆盖少时，尽热毒气为度）

【用法】上用好京墨研浓如稀糊，搜和为丸，如梧桐子大。如少壮人，每服五七丸；年耄，三二丸，渐加丸数。服之不渴，更不得再服，然后服补药。

【主治】三焦渴疾。

【宜忌】大忌房室及炙煿之物。

65816　神效猬皮散

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】猬皮一枚（炙黄）　川椒三分（去目及闭口者，微炒去汗）　附子三分（炮裂，去脐皮）　当归三分（锉，微炒）　露蜂房三分（微炙）　地榆三分（锉）　木通三分（锉）　苦参一两（锉）　斑蝥半两（以糯米拌炒，令米黄为度，去头足翅）　鲮鲤甲四枚（炙令黄）　桂心半两　细辛半两　樗鸡三分（炒黄）　川大黄一两（锉碎，微炒）　蜈蚣一枚（微炙）　雄黄一两半（细研）　蛇床子一两　蛇蜕皮半两（烧灰）　蜥蜴一枚（炙黄）　薏苡仁三分　䕡茹一两　牡丹三分　龙胆三分（去芦头）　鸡骨一两（炙黄）　土瓜根三分　藿芦三分　白蒺藜三分（微炒，去刺）

【用法】上为细散。每服一钱，食前以温酒调下，以愈为度。

【主治】狼瘘，出脓水不绝，寒热，肢节烦疼。

65817　神效滋肾丸

【方源】《嵩崖尊生》卷六。

【组成】龟版（炙）四两　知母　黄柏（酒炒）各二两　枸杞　五味各一两　炮姜二两

【用法】上为丸。盐汤送下。

【主治】舌纵流涎，手足软弱，属水亏者。

65818　神效善应膏

《医方类聚》卷一九四引《经验良方》。为《卫

生宝鉴》卷十三“善应膏”之异名。见该条。

65819　**神效楸叶煎**

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】楸叶十五斤(秋分前后取)

【用法】上用水一石，于净釜中煎楸叶，取汁三斗；又重换锅，煎至一升，已成煎矣，盛于不津器中。凡患者，取麻油半合，蜡一分，酥一栗子大，同消如面脂，又取杏仁七粒，生捣如膏，米粉二钱，同入面脂中搅令匀，先涂疮上，经两日以来，净拭去，以篦子匀涂楸叶煎满于疮上，仍用软帛裹之，两日一度，拭去旧药，更上新药，不过五六上。已作头者，便生肌平复；如未穴，即内消。

【主治】瘰疬成瘘。

【备考】本方方名，《普济方》引作“楸叶煎”。

65820　**神效槐鸡丸**

【方源】《普济方》卷二九八引《圣惠》。

【组成】槐鸡一两(微炙)　猬皮一两(微炙)　乱发半两(微炙)　白矾灰一两　黄牛腮一两(烧灰)　枳壳一两(麸炒微黄，去瓤)

【用法】上为细末，煮胶为丸，如梧桐子大。每服十丸，食前煎槐子枝汤送下。

【主治】血痔。

65821　**神效感应丸**

【方源】《永类钤方》卷十二引《浙方混元邓山房方》。

【异名】化铁丹《永类钤方》卷十二引《浙方混元邓山房方》)、邓山房感应丸(《玉机微义》卷二十)、邓山感应丸(《医统》卷三十三)。

【组成】黑角沉　木香　檀香　全丁香　陈皮　青皮　黄连　砂仁　香附子　制半夏　三棱　莪术(并煨)各一两(净，为末)　肥乌梅肉一百文重　巴豆三百粒(肥白者，去衣膜心)

【用法】上用瓷器盛巴豆，上以乌梅肉盖之，以陈米醋浸，与乌梅肉平于甑上蒸极烂，以巴豆红色为度，却擂二味极烂，次用糯米粽和前药，捣千百杵，以黑色为度，众手丸如萝卜子大。每服十丸，宿食，陈皮汤送下；气滞，茴香汤送下；酒后呕吐，淡姜汤送下。

【功用】消宿食，除积滞。

【主治】宿食，气滞，酒后呕吐。

【宜忌】常服不动脏腑。

65822　**神效暖脐膏**

【方源】《慈禧光绪医方选议》。

【组成】肉桂一两五钱(去皮)　丹皮八钱　黄耆　党参　归身　生地各二两　白芍　茯苓　附子(炙)　木鳖子各一两(去壳)　荆芥　防风　麻黄　桂枝　柴胡　前胡　升麻　葛根　苏叶　薄荷　羌活　独活　白芷　藁本　川芎　细辛各五钱　(一方有麝香五钱)

【用法】上以真麻油三斤，生姜四两、葱头四两(切碎)，入油内慢火熬焦，去滓滤净汁，将油秤准，每油一斤，入飞净黄丹半斤，慢火熬至老嫩得所，以瓷器收盛，七日后方可用。

【功用】镇疼止泻，祛风散寒，健肠胃，暖肚。

【主治】受寒受冷，腹痛腹胀，呕吐酸水；及久不孕育，腰骶疼痛。

65823　**神效催生丹**

《卫生家宝产科备要》卷六。为《局方》卷九“催生丹”之异名。见该条。

65824　**神效解毒丸**

【方源】《得效》卷十。

【异名】神仙解毒丸(《普济方》卷二五一引《经验良方》)。

【组成】青靛花六两　大黄　山豆根各四两　朴消一钱　黄药子二两半　白药二两半　自然铜四两　贯众　山栀子　宣连　楮实子　山茨菇各二两半　白滑石一斤十二两　铅光石　芭蕉自然汁

【用法】上为末，糯米糊和药一千杵，阴干，一料可作一千丸，却用铅光石打光。诸般骨鲠，每服一丸，井水磨下，作势一吞即下；颔腮焮肿，咽喉飞疡，清油调水磨化服；酒毒肠风下血，薄荷汤送下；赤眼肿痛，井水送下；金蚕

蛊毒，黄连水送下；蛇、犬、蜂螫、蜈蚣毒，用水磨涂伤处；误吞竹木棘刺，井水送下；诸般恶毒，用新汲水送下。

【主治】诸般骨哽；领腮焮肿、咽喉飞疡；酒毒肠风下血；赤眼肿痛；金蚕蛊毒；蛇、犬、蜂螫、蜈蚣毒；误吞竹木棘刺；诸般恶毒。

【备考】收藏年深，愈见神效。方中芭蕉自然汁用量原缺。

65825 **神效解毒散**

【方源】《保婴撮要》卷十三。

【组成】金银花一两　甘草节五钱　黄耆　皂角刺（炒）　当归各三钱　乳香　没药各二钱

【用法】上为散。每服二钱，酒煎，温酒调服亦可；婴儿病，乳母亦服。

【功用】消肿散毒。

【主治】一切疮疡初起，肿痛者，或已溃仍肿，毒不解者。

【加减】如疮已溃，肿痛已止者，去乳、没金银花，倍加黄耆、甘草。

65826 **神效解毒散**

【方源】《外科启玄》卷十一。

【组成】老人齿　紫河车　穿山甲（炙）　蜈蚣（炙，去头足）　真玄明粉各等分

【用法】上为细末，用好酒调服取汗。如疔疮，每服三钱，用苍耳子二钟酒煎送下；如发背痈疽，每服三钱，葱煎酒送下；如肿毒疖子，每服一二钱，酒送下；如痘疔毒，看人大小，加减一钱、一钱半，芫荽酒送下。

【主治】诸毒恶疮，疔疮发背，痈疽肿毒，疖子，痘疔毒。

65827 **神效解毒膏**

【方源】《痘学真传》卷七。

【组成】血余二两　当归　生地　大黄　五倍　蓖麻子各一两

【用法】用麻油一斤熬至四、五两去滓，加黄蜡二两，溶化，搅匀摊膏，备用。

【主治】痘毒。

65828 **神效槟苏散**

【方源】《观聚方要补》卷二引《简易普济良方》。

【组成】槟榔三钱　苏叶梗　防风　羌活　当归　木瓜各二钱　乳香　没药各一钱半

【用法】加姜、葱，水、酒煎，入片糖一指大，溶化热服，酒随量饮为度。绵被盖脚痛处，待药力寻到，痛处汗出，避风，以有汗为愈。

【主治】脚气。

65829 **神效截疟散**

【方源】《全国中药成药处方集》（呼和浩特方）。

【组成】槟榔　青皮　柴胡　川朴　常山　陈皮各四两　草果　生甘草各二两　苍术四两

【用法】上为细末服。

【功用】截疟。

65830 **神效赛空青**

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】犀黄　月石各二分　麝香五分　廉珠　蕤仁霜各一钱　琥珀　熊胆　海螵蛸各一钱五分　冰片　辰砂各三钱　甘石六两　地栗粉二两

【用法】上为细末，用川连汁调，装鹅毛管听用。用时纳入眼眶，遍擦润泽；或以人乳调点亦可。

【主治】七十二种眼疾。

65831 **神效熊胆丸**

《济阳纲目》卷一〇一。为《医说》卷三引《夷坚志》“熊胆丸”之异名。见该条。

65832 **神效蝎尾散**

【方源】《圣惠》卷八十五。

【异名】蝎尾散（《幼幼新书》卷九）。

【组成】蝎尾二十一枚（生用）　白附子尖二十枚（生用）　腻粉一钱（研入）　附子尖二七枚（生用）　半夏底七枚（汤洗去滑）　天南星底七枚（生用）　乌头尖七枚（去皮，生用）

【用法】上为细散。每服半字，以薄荷汤调下。若儿在百日内者，一字可分为四服。如要作丸，即以枣肉为丸，如绿豆大，每服一丸，以

马蔺草汤送下。

【主治】小儿急惊风。

65833　**神效墨附丸**

【方源】《万氏家抄方》卷五。

【异名】墨附丸《医学入门》卷八)。

【组成】香附子一斤(去毛,作四份,一份好酒浸,一份米泔浸,一份童便浸,一份醋浸,各浸一日夜)　艾绵四两(用醋二大碗,同香附一处煮干,石臼内杵以烂为度,捻作钱样厚大饼,以新瓦炭火焙干,捣为末)　白茯苓(去皮,净)　当归(去芦,净,酒浸一宿)　人参(去芦)　川芎(大实者,去土,净)　熟地(用淮生地酒浸,九蒸九晒)　上等微墨(火煅,醋淬)各一两　木香五钱

【用法】上为末,醋糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,空心好酒送下。

【主治】妇人久无子,经事不调,及数堕胎者。

65834　**神效瘰疬方**

【方源】《金鉴》卷六十四。

【组成】白胶香　海螵蛸　降真香(心无土气者)各等分

【用法】上为末,温水调稠,薄纸摊贴。

【功效】疏滞消肿止痛。

【主治】瘰疬初起。

65835　**神效瘰疬膏**

【方源】《全国中药成药处方集》(呼和浩特方)。

【组成】生半夏　生甘遂各二两　生马钱子四钱　生穿山甲　生牙皂各三钱　血竭花(另兑面)二钱

【用法】上将前五味用香油六两炸枯,去滓,入黄丹收膏后,再人血竭面化匀。如患瘰疬,量大小摊于布上贴之,惟摊膏时兑麝香少许。

【主治】瘰疬。

65836　**神效嚟峒丸**

【方源】《全国中药成药处方集》(杭州方)。

【组成】西牛黄　梅冰片　麝香各二钱五分　真阿魏　明腰黄各一两　大黄　粉儿茶　天竺黄　参三七　上血竭　乳香(去油)　没药(去油)各二钱　山羊血五钱　藤黄(隔汤煮十余次,去红色浮沫,沉底杂物,用净者)二两

【用法】以上各取净粉,将藤黄烊化,加炼白蜜为丸,每重六分,蜡壳封固。每服一丸,重则二丸,温酒化服。盖被取汗。外症用浓茶抹敷患处。

【主治】痈疽发背,恶疮瘰疬,跌仆损伤,瘀血内攻,昏晕不省,以及蛇蝎蜂毒,一切无名肿毒。

【宜忌】忌一切生冷、发物。

65837　**神效蟾酥丸**

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】蟾酥一两(切片,用乳二两,卯时瓷器放水内煮,午时合)　雄黄一两　朱砂　硼砂各五钱　麝香一钱

【用法】上为末,酒糊为丸,如梧桐子大。轻用一丸,重用二丸,热酒送下。盖暖取汗即愈。端午日合更效。

【主治】痈疽、发背、疔毒、恶疮。

65838　**神效麝香丸**

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】麝香半两(细研)　朱砂一两(细研,水飞过)　牛黄半两(细研)　天麻一两　羌活一两　芎䓖一两　独活半两　防风一两(去芦头)　干蝎一两(微炒)　白僵蚕一两(微炒)　甘菊花一两　天南星三分(炮裂)　败龟二分(涂酥,炙微黄)　白花蛇三分(酒浸,去皮骨,炙微黄)　桂心三分　附子三分(炮裂,去皮脐)　木香三分　蔓荆子一两　人参三分(去芦头)　地龙一两(微炒)　海桐皮三分(锉)　干姜半两(炮裂,锉)　当归三分(锉,微炒)　虎胫骨三分(涂酥,炙令微黄)

【用法】上为末,炼蜜为丸,如小弹子大。每服一丸,以暖酒或薄荷姜汤研下。

【主治】一切风,及肢节走痛不可忍者。

【宜忌】忌生冷、毒滑物、鸡、猪肉。

65839　**神效麝香散**

【方源】《百一》卷九。

【异名】麝香散（《备急灸法》）。

【组成】草乌头（用大者，炮裂，去皮脐尖，锉如麻豆大，入盐再炒焦黄） 华阴细辛（去土叶）各二两 草茶四两（微碾，勿令细）

【用法】上为细末。每服一大钱，茶清调下，临卧或食后服之。

【主治】偏正头痛，夹脑风，连眉项颈上彻腮顶疼痛不可忍者。

【备考】本方名神效麝香散，但方中无麝香，疑脱。《备急灸法》本方用法，每服一钱，入麝香少许，蜡茶清调下。

65840 **神验无比散**

【方源】《传家秘宝》卷下。

【异名】无比散（《活人书》卷二十一）、救生散（《医方考》卷六）。

【组成】朱砂一两（真好者，先研如粉） 牛黄 麝香 生龙脑 轻粉各一两（细研）

【用法】上为散，瓷盒内密收。小儿每服一字，大人每服半钱，用水银少许，生取小豮猪儿尾上血三二滴同新汲水少许调服。先宁稳得睡，然后取转下如烂鱼肠、蒲桃涎、穗涎、臭秽物便安。小儿奶汁调尤妙。

【主治】小儿痘疮恶候出不快，及黑疮子，一切恶候。

【方论选录】《医方考》：痘之为物，外感秽气则陷而入，内食秽物则凸而出。故猪血、牛黄、麝香原皆秽物，可以起痘；乃马牙消者，所以攻结毒；朱砂、腻粉者，所以攻结热；冰片则神于行滞而已。是方也，为热毒倒入脏腑，不得已而用之，以少卧时许，取下恶物如鱼脑为吉，然非平剂也。

65841 **神验木香丸**

《幼幼新书》（人卫本）卷二十九引《庄氏家传》。即原书同卷（古籍本）“木香丸”。见该条。

65842 **神验乌龙丹**

【方源】《证类本草》卷十引《梅师方》。

【异名】大圣丹（《百一》卷三）、乌头丸（《医方类聚》卷二十三引《王氏集验方》）、乌龙丸（《普济方》卷九十五）、乌龙丹（《仙拈集》卷一）。

【组成】川乌头（去皮脐） 五灵脂各五两

【用法】上为末，加龙脑、麝香研令细匀，滴水为丸，如弹子大。每服一丸，先以生姜汁研化，次用暖酒调服，一日二次，空心、晚食前服。

【主治】瘫缓风，手足亸曳，口眼㖞斜，语言蹇涩，步履不正。

65843 **神验乌头丸**

【方源】《圣济总录》卷七。

【组成】乌头（生，去皮脐） 五灵脂各五两 麝香（研）一分

【用法】上先以二味为细末，入麝香同研令细匀，滴水为丸，如杏核大。每服一丸，先用生姜自然汁研化，次以暖酒调下，早、晚食后服五七丸，便能行走，十丸可以举手。

【主治】中风手足亸曳，口眼㖞斜，语言蹇涩，步履不正。

65844 **神验白前汤**

【方源】《圣济总录》卷六十七。

【组成】白前（去苗）三分 半夏（汤洗去滑，生姜汁制，切，焙）一两 紫菀（去土苗，焙干）三分 麻黄（去根节）一两 厚朴（去粗皮，涂生姜汁，炙三度，焙干） 人参各三分 甘草（炙，锉）半两 桂（去粗皮） 杏仁（汤泡去皮尖双仁，炒）各三分

【用法】上为粗末。每服五钱匕，加生姜半分（拍碎）、枣二枚（擘）、水二盏，煎至一盏，去滓温服，每日三次。

【主治】上气及诸气逆。

65845 **神验百子丸**

【方源】《墨宝斋集验方》卷上。

【组成】何首乌（赤白相半，先用米泔水浸二日夜，或竹刀、铜刀去粗皮，切成片，略晒爽，莫犯铁物，用黑芝麻拌匀蒸一次，晒干去芝麻，再用乌羊肉切成片，去筋膜油腻拌匀蒸一次，去羊肉晒干，再用极好无灰酒浸湿蒸一次，四用黑豆一层，首乌一层，又蒸一次，去豆

晒干。蒸法俱用砂锅柳甑拌匀，蒸透熟为度，晒干，拣净，用石磨磨成细末，以一斤为祖）熟地黄　天门冬(二味用生姜自然汁浸二日夜，晒干待用)　人参(去芦，净末)五钱　生地黄　麦门冬(二味用无灰酒浸一日，夜取出再用米泔水浸一日夜，取出晒略干)

上四味，俱用石磨磨如泥浆，用杏仁(去皮尖)煎汤，化开前药，滤出滓再磨，磨尽如澄水粉样，待澄清，撇去清水，将药粉晒干细末各一两

白茯苓(去粗皮，为末，用童便泛去浮筋，用泥底者浸一夜，晒干末)四两　地骨皮(去骨，无灰酒浸一日，滤出，为细末)一两　牛膝(去芦，无灰酒浸一日夜，滤出，为细末)二两

【用法】上为细末，用无疾好妇人养男孩的好乳汁六两，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，用无灰好酒送下，晨昏各进一次。

【功用】广嗣。

【宜忌】忌诸般血、豆腐、萝卜、大蒜、莲蓬、藕、败血之物。

65846　**神验朱砂丸**

【方源】《圣惠》卷五十二。

【组成】光明砂半两(细研)　恒山一两　杏仁十枚(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄)

【用法】上为末，研入朱砂令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大。未发前每服十五丸，以粥饮送下。欲发时再服。

【主治】心疟。

65847　**神验防风汤**

【方源】方出《千金》卷七，名见《外台》卷十八。

【组成】防己　蜀椒　细辛　桂心　麻黄　石膏各一两　独活　防风　黄芩　茵芋　葛根　芎䓖　芍药　甘草各一两　生姜　茯苓各三两　乌头二枚

【用法】上㕮咀。以竹沥一斗，煮取四升，去滓，分六服，一日一夜服尽，其间可常作赤小豆饮。

【主治】脚弱，脉沉细。

【宜忌】《外台》：忌海藻、菘菜、猪肉、冷水、生葱、生菜、醋物。

65848　**神验疔毒丸**

《古方汇精》卷二。为《疡医大全》卷三十四“疔疮丸”之异名。见该条。

65849　**神验虎骨丸**

【方源】《圣惠》卷四十四。

【组成】虎胫骨二两(涂酥，炙令微黄)　桑寄生一两　黄耆三分(锉)　枳壳三分(麸炒微黄，去瓤)　牛膝一两(去苗)　白茯苓一两　熟干地黄一两　石南一两　桂心一两　防风三分(去芦头)　羌活三分　酸枣仁三分(微炒)　当归三分(锉，微炒)

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，食前以温酒送下。

【主治】一切风湿腰痛。

65850　**神验金丝膏**

【方源】《百一》卷二十。

【异名】金丝膏(《普济方》卷三一四)。

【组成】清油半斤　白胶香(赤、白)各七钱半　韶粉半两　腻粉(冬季用)七个(夏季用)八个(临安所卖者)

【用法】上为细末，入在油内，用银器文武火熬，以向南柳枝系作小把子搅成膏，如琥珀色，于白碗底上试，以不散为度。如汤烫火烧并金疮，以鸡翎扫之；如久患恶疮，用口含浆水洗净，或以面圈疮口，倾药在内，痛立止；如刀斧所伤，倾药在患处。

【功用】定疼止血。

【主治】烫烧伤，金疮，恶疮，刀斧所伤。

65851　**神验治痔方**

【方源】《急救仙方》卷四。

【组成】信半钱　白矾一两　朴消一两　没药半钱　乳香半钱　麝香少许　绿矾一两

【用法】上用铁铜锅，先以信铺锅底，以白矾覆之，又以绿矾覆之，又以消覆之，以火炙之，候成水，投乳香、没药搅匀，候干如石，放地上一宿出火毒，研末，方入麝同研，加片脑少许，研极细。用唾调涂敷疮口上四边，一日

三次，其痔自然焦落。

【主治】痔疮。

65852 神验胎动方

【方源】《张文仲方》引《徐王效方》（见《外台》卷三十三）。

【异名】芎藭散（《圣济总录》卷一五五）、当归汤（《圣济总录》卷一五九）、佛手散（《本事方》卷十）、琥珀散（《卫生家宝产科备要》卷三）、圣功川芎汤（《卫生家宝产科备要》卷七）、催生神妙佛手散（《妇人良方》卷十二）、芎藭汤（《普济方》卷三二八）、神妙佛手散（《校注妇人良方》卷十二）、芎归汤（《摄生众妙方》卷十一）、芎归散（《张氏医通》卷十六）、归芎汤（《医学心悟》卷五）、芎归饮（《纲目拾遗》卷三）。

【组成】当归六分 芎藭四分

【用法】上切。以水四升，酒三升半，煮取三升，分三服。若胎死即出。血上心腹满者，如汤沃雪。

【功用】养血活血，祛瘀止痛，催生。

①《圣济总录》：安胎止痛。②《卫生家宝产科备要》：缩胎催生。化恶血，生好血。③《普济方》：调益营卫，滋养血气。④《摄生众妙方》：补血活血，生新逐败。⑤《纲目拾遗》：引血归经。

【主治】妊娠伤胎，胎动不安，腹痛出血，或子死腹中；及产后血虚，恶露不绝，血崩、发热；金疮跌打损伤失血过多，血晕。

①《张文仲方》引《徐王效方》：胎动。②《圣济总录》：妊娠腹痛不可忍；及子死腹中血气不清。③《本事方》：妊孕五七月，因事筑磕著胎，或子死腹中，恶露下，疼痛不止，口噤欲绝，④《卫生家宝产科备要》：产后血虚迷闷，眩晕耳鸣，不省人事，胸膈不快，恶心呕逆，血崩口噤，头痛发热，如伤寒证者。⑤《妇人良方》：伤胎、崩中、金疮、拔牙去血过多，昏晕欲倒者。⑥《普济方》：诸疾气血虚羸，短气，腹中疼痛，面体少色，心松惊悸，虚烦汗出，时发寒热，倦久无力。⑦《医学心悟》：产后瘀血停积，阻碍新血，不得归经，恶露不绝，腹痛拒按。⑧《纲目拾遗》：失血涌吐。因饱食用力，或因持重努伤脉络，并治跌扑堕打而伤脉络，令人大吐者。

【备考】①《圣济总录》本方用法：上为散，每服二钱匕，温酒调下，不拘时候，②《本事方》：口噤灌之，如人行五里再服，不过三二服便生。妊孕五七月，因事筑磕著胎，用此药探之，若不损则痛止，子母俱安；若胎损立便逐下。

65853 神验柴胡散

【方源】《中藏经·附录》。

【组成】土柴胡（不以多少，去芦，洗净，炙黄色，不令太焦，亦不须银州者）

【用法】上为末。每服二钱，水一盏，入地骨皮指面大二片子，同煎至七分，食后温服。如虚瘦，但空心服补药，食后煎下数服，时时如水饮之。

【主治】大人、小儿骨热，夜间如蒸。

65854 神验黄连丸

【方源】《外台》卷二十五引《近效方》。

【组成】黄连一两 茯苓二两 阿胶一两（炙）

【用法】上先捣黄连、茯苓为末，以少许水溶阿胶，和为丸，众手丸之，晒干，量患轻重，每服三四十丸，空腹以饮送下。渐渐加至六十丸，不过五六服必愈。常用之极效。

【主治】痢疾，无问寒热。

65855 神验黄柏散

【方源】《圣济总录》卷一八二。

【异名】黄柏散（《普济方》卷四〇五）。

【组成】黄柏（去粗皮，蜜炙） 郁金各一两 陈橘皮（汤浸，去白，炒） 人参 葛根（锉）各半两

【用法】上为散。每服半钱匕，用温水调下，量儿大小加减，每日三二次。

【主治】小儿一切痈肿毒，诸风热。

65856 神验清化丸

【方源】《万氏家抄方》卷三。

【组成】天门冬(去心)　麦门冬(去心)　怀山药各二两　白茯苓(乳浸)　生地黄(酒洗)　熟地黄(用生地酒九蒸九晒)　苡仁(用小绢袋盛,饮锅内蒸熟)　黄柏(盐水浸)　知母(汤浸去皮,盐水炒)各一两　五味子　甘草各五钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服五十丸,早盐汤送下,晚滚汤送下。

【主治】肌肉消瘦,发热,手足心热,干咳,阴虚火盛,新久怯症。

65857　**神验续骨丸**

《遵生八笺》卷十八。为《苏沈良方》卷九引《灵苑方》"续骨丸"之异名。见该条。

65858　**神验稀痘丹**

《疡医大全》卷三十三。为《赤水玄珠》卷二十七"稀痘仙方"之异名。见该条。

65859　**神验犀角丸**

【方源】《圣惠》卷六十六。

【组成】犀角屑三分　麝香半两　甘草半两(炙令微黄)　生黑豆黄半两　斑蝥一分(去头足翅,以糯米拌炒,令米黄为度,去米)

【用法】上为末,炼蜜和丸,如绿豆大。每服十丸,空心以粥饮送下。其病根,当从小便中出。

【主治】蛴螬瘘。

65860　**神验锦鸠丸**

《原机启微》卷下。为《局方》卷七"锦鸠丸"之异名。见该条。

65861　**神验熏药方**

【方源】《圣惠》卷六十。

【组成】鳗鲡鱼半斤(五月五日采,晒干,捣为末)　蜣螂三枚(为末)

【用法】上取成熟艾和药末,以青布捲之,安瓷瓶中,着火烧,坐向瓶上熏之。其虫及恶汁并出,不复再发。

【主治】痔瘘,积年不可者。

65862　**神验熏药方**

【方源】《疡医大全》卷八引吴龚相方。

【组成】如意草(即犁头草)　金银花各五钱　桑叶三钱　三角峰(又名爬壁蜈蚣,系枫树上藤,其藤系三个叶儿)一两

【用法】上药入大砂锅内,入水煎滚,纸封罐口,以棉花将病人好肉包盖,再取门板,量毒大小,上下开一洞,令病人仰卧,毒露在外,将罐口纸亦开一洞,对毒熏之。药气直透毒内,自有恶水流出必多,如此三熏,毒散自愈。如未愈,再熏一次;如已溃烂,亦宜此法熏之,若攻出数头,以葱头煎洗;有腐肉或疮口燥,用猪蹄汤洗之,以膏盖之。

【主治】痈疽。

65863　**神验噎膈方**

【方源】《良方集腋》卷上。

【组成】威灵仙二两(水浸一宿取出,捣汁)　食盐一钱五分　狗宝末三分

【用法】上药共调和,炖温服。服之少顷,病者觉上焦胸膈之间气机旋扰作动,勿令呕,次日仍用威灵仙二两,浸之隔宿,如前捣汁,入食盐一钱五分,刮入狗宝末四分,调服之,觉动处略下;第三日仍如前法再用威灵仙二两,绞汁入食盐一钱五分,狗宝末五分,调服,少停,动更下,则大便下黑血痰涎。下之后正气虚耗。必须预备三剂,服之则气机通利,病即愈矣。

【主治】噎膈。

【宜忌】愈后必得食淡一年,庶不再发,倘不能食淡,再发不治矣。

65864　**神授一匕散**

《本草纲目》卷十四。即《医说》卷三引《类编》"一服饮"。见该条。

65865　**神授万金丹**

《医方类聚》卷一二七引《澹寮方》。为《三因》卷十四"禹余粮丸"之异名。见该条。

65866　**神授卫生汤**

【方源】《外科正宗》卷一。

【组成】羌活八分　防风　白芷　穿山甲(土炒,研)　沉香　红花　连翘　石决明(煅)各六分　金银花　皂角刺　归尾　甘草节　花粉各一钱　乳香五分　大黄(酒拌炒)

二钱（脉虚便利者不用）

【用法】水二碗，煎八分，病在上部，先服药，随后饮酒一杯；病在下部，先饮酒一杯，随后服药，以行药势。

【功用】宣热散风，行瘀活血，解毒消肿，疏通脏腑。

【主治】痈疽发背，脑疽对口，丹瘤，瘰疬，恶毒疔疮，湿痰流注及一切疮症已成未成者。

【备考】药性平和，功效甚速，诚外科首用方也。

65867 **神授卫生汤**

【方源】《同寿录》卷四。

【组成】川羌活八分 象牙五钱

【用法】上为细末，黄蜡四两溶开，入鱼胶搅匀，再和入药末为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心酒送下。

【主治】一切肿毒，无论大小，已未成脓，及瘰疬。

65868 **神授卫生汤**

【方源】《疡科心得集》卷中。

【组成】白芷 天花粉 连翘 牛蒡子 荆芥 甘草节 防风 金银花 归尾 川贝母 乳香 没药

【功用】解毒、消毒，清热、活血、止痛。

【加减】大便秘结，热甚者，加酒炒大黄。

65869 **神授卫生散**

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】羌活 白芷 穿山甲（炒） 石决明（煅） 乳香 没药 大黄（生）各一两 沉香五钱 防风 蝉退 僵蚕各五钱

【用法】上为末。每服五钱，用归尾一两，黄酒二碗，煎八分，调服。预用金银花一两，煎汤一小碗，随用漱口咽下，盖卧汗下，任其自然。

【主治】痈疽发背，脑疽，丹瘤，瘰疬，恶毒疔疮，湿痰流注；及外科一切疮症，不论阴阳表里虚实，未成已成者。

65870 **神授五公散**

【方源】《万氏家抄方》卷四。

【组成】大五倍子一个 蜈蚣一条（去头足）

【用法】将五倍子开一孔，入蜈蚣，湿纸包，煅存性，为末。先以葱汤洗疮净，掺之，再用膏药贴之，每日一换。

【主治】诸疮久不收口者，并漏孔及痔疮。

65871 **神授太乙散**

【方源】《百一》卷七。

【异名】太一十神散（《普济方》卷一三六引《广南卫生方》）、太乙十神散（《普济方》卷一五一）。

【组成】川升麻 白芍药 紫苏叶 香附子 干葛 香白芷 陈皮 川芎 青皮 甘草各等分

【用法】上为粗末。每服三大钱，水一盏半，生姜三片，煎至八分，去滓，通口服，不拘时候，连进二服。

【主治】四时气令不正，瘟疫妄行，人多疾病，及阴阳两感，风寒湿痹。

【加减】如发热头痛，加连须葱白三寸同煎；如中满气噎，加枳壳数片；产妇、婴儿、老人皆可服之。

65872 **神授太乙散**

【方源】《医方类聚》卷六十二引《经验秘方》。

【组成】青皮（去瓤） 川芎（不蛀，新者） 白芷（不蛀，新者） 桔梗（去芦） 枳壳（麸炒，去瓤） 柴胡（去芦） 陈皮（去白） 香附子（炒，去毛净） 苍术（去芦皮） 防风（去芦，不蛀者） 藁本（去土） 甘草（不去皮尖） 细辛（去土） 藿香叶（去土） 赤芍药 羌活各一两 干葛（有粉者，不蛀） 升麻 紫苏叶（去枝土）

【用法】上为粗末。小儿五岁以上，每服三钱，新水中盏半，生姜三片，枣三个，葱白三根，同煎七分，去滓，通口服一大盏，滓再煎；十岁以上，每服半两，新水二大盏半，生姜五片，枣五个，葱白五茎，同煎七分，去滓，通口服二大盏，滓再煎；大人每服七钱半，新水三大碗，生姜七片，枣七个，葱白七根，煎七分，

去滓,通口服二大碗;病势甚者,先嚼葱、姜引子,用碗内药热气额上熏,徐徐通口,一气热服,滓再煎,热服二大碗,并进二服,前疾立愈。

【主治】四时瘟疫流行,不问阴阳两感,头痛壮热憎寒,拘尽急痛,无问大人小儿孕妇,久病肚热胸痞痰嗽,悉皆治之。

【宜忌】时毒,头面项颈腮腋皆肿,咽痛者,忌辛热物。

【加减】如久发热,胸痞肌瘦,去姜葱,新水依上煎,温服三服;久患头痛身疼,每服加川芎、白芷、赤芍各一钱,姜葱依上煎,热服;时毒,头面项颈腮腋皆肿,咽痛,去引子,白新水,加鼠粘子、荆芥穗、防风、加葱中节三茎,同煎,温食后服,并进三五服,消减立安;小儿疮疹未分,葱白减,姜枣同煎,去滓温服;出快,一身皆痛,依时气伤寒治法,用引子,更加桂、白芷、赤芍,依上煎服;头风、头痛,上壅风热,加荆芥穗、茶芽、葱白同煎,不用姜枣;妇人月事不调,发热,加炒净香附子、白芍、荆芥穗、乌梅同煎,无时;身有大疮举作,加牛蒡子、金银花、荆芥穗各三钱,加人前药同煎,去引子,连热服三大碗,汗出立消;散疮顶津润,得用生矾末,频掺上散,速修配,如法服饵。

65873 神授乌金散

【方源】《医方类聚》卷二三四引《王岳产书》。

【组成】鲤鱼皮 猪肝衣 头发(三件煅过) 白僵蚕 桂心 白附子 当归 香墨 灶突土膜 灶门膜各等分

【用法】前三件(煅过,出火毒)为细末,后七味为散,却同前三味混和。每服二钱,难产,榆皮汤送下,木通草亦得;儿枕,小便送下;恶露不下,酒送下;血运,小便送下;血风抽掣,人参汤送下;伤寒,热水送下;产后乍见鬼神,桃仁汤送下;血风不识人,米囊花煎汤送下;产后四肢浮肿,马粪汁送下;一切疾并用酒送下。

【主治】产后一切诸疾。难产、儿枕痛,恶露不下,血晕,血风抽掣,伤寒,产后乍见鬼神,血风不识人,产后四肢浮肿。

65874 神授目露丹

【方源】《良朋汇集》卷一。

【组成】干糖糟头六两 生姜四两

【用法】上药共捣成饼,或焙或晒干,每两入炙甘草二钱,研末。每服二钱,沸汤入盐少许,不拘时候,代茶服。随愈时时可服。

【主治】噎。

65875 神授羊肝丸

《济阳纲目》卷一〇一。为《医说》卷四引《类说》“羊肝丸”之异名。见该条。

65876 神授乳香饮

【方源】《医说》卷三引《夷坚·己志》。

【组成】酒浸虎骨 败龟 黄耆 牛膝 萆薢 续断 乳香

【主治】坠梯折伤腰。

65877 神授定痛丸

【方源】《普济方》卷二四二。

【组成】草乌头六钱(去皮脐,醋浸,冬十数余日,换好醋晒干) 无名异二钱 硫黄三钱

【用法】上为末,薤白汁为丸,葱白亦可。每服二十丸,井花水送服。十日后十五丸,二十日后十丸,三十日病除后,时时服十丸。每月制服。

【主治】干湿脚气。

【宜忌】忌豆腐。

65878 神授枳壳丸

【方源】《集成良方三百种》。

【组成】枳壳一两 玉竹三钱 桂枝五钱 车前子三钱(研细) 云苓四钱 青皮七钱 陈皮七钱 佩兰叶六两(洗净) 荆芥五钱 干荷叶一两

【用法】上为细末,另用黑枣四两(去皮核),煎成浓糊,捣合群药为丸,如梧桐子大。每服三钱,开水送下,轻者一服,重者二服;如兼红痢,藕节汤送下。

【主治】瘟疫腹痛吐泻,手足麻木。

65879 神授香苏散

《保命歌括》卷六。为《局方》卷二（绍兴续添方）“香苏散”之异名。见该条。

65880 **神授香附汤**

【方源】《普济方》卷二八四。

【组成】香附（杵去皮，生姜汁浸一宿，晒干）

【用法】上为末。每服一钱半，米饮调下；或紫苏、甘草煎汤调下。进数服肿硬自消，有脓即出。毒气证亢，便急用。

【主治】痈肿结硬，聚毒作痛。

65881 **神授保生丹**

《丹溪心法附余》卷一。为原书同卷“续命丹”之异名。见该条。

65882 **神授高青丸**

【方源】《养老奉亲》。

【组成】高良姜　青木香各一两

【用法】上二味为末，煮枣肉为丸，如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，干姜汤送下。

【主治】老人脾脏泄泻，心气不和，精神倦怠，不思饮食。

65883 **神符玉粉丹**

【方源】《圣惠》卷九十五。

【组成】水银二两　黑铅一斤

【用法】于一新铁铛中，销铅成水，以白矾末二钱，入一小竹筒内，当铛中心下之，看沸定，即以小竹管，盛水银入铛中，送令到白矾上，以火养铅，常令成汗，候五日后，必有物出，向铅面上如金蚊子，即以物收之，候尽即止，秤知两数，研为末，入硫黄等分，结成砂子，更研如粉，入瓶密固济，候干，常以火四两，灰厚三寸，养至六十日，沸开，依前取出，细研入瓶，更养六十日，看紫色，即更固济，以火煅令通赤，待冷取出，以浓甘草汤沃之，候干，细研如粉，以饭和丸，如绿豆大。每日一丸，空心津送下。若养至一年，火力与小还丹同。

【功用】久服延年驻颜。

65884 **神散元珍丹**

【方源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】明矾（煅熟存性，不碎）如绿豆大

【用法】以桂圆肉包之，日服一粒。治痔以手搓之。虽重症服之，百日断根。

【主治】痔疾。

65885 **神散阳痈汤**

【方源】《洞天奥旨》卷五。

【组成】天花粉五钱　生甘草五钱　茯苓五钱　车前子五钱　贯仲五钱　羌活二钱　黄芩三钱　紫菀三钱　生地一两　柴胡一钱

【用法】水煎服。一剂即消大半，二剂全消。

【功用】消散阳痈。

【主治】背疽、阳痈初起。

【宜忌】溃后不可用。

65886 **神惠小灵丹**

【方源】《串雅补》卷一。

【组成】番木鳖二两（水煮胀，去皮毛，用麻油二两煤黄色）　甲片（麻油炒）一两　草乌（姜炒）六钱　乳香　没药　雄黄各五钱　蟾酥二钱　麝香二分

【用法】上为细末，酒为丸，如萝卜子大。每服七分，陈酒送下。勿令见风，出汗为妙。如见风发吐，以黄泥水煎饮即解。

【主治】附骨痈疽，诸毒疔肿。

65887 **神蟾谷精丹**

【方源】《卫生总微》卷十三。

【组成】干蟾三枚（五月五日取者，酥炙黄）　谷精草三两（入一瓶内，盐泥固封，慢火煅通赤）　胡黄连半两　皂角三寸（烧灰）　瓜蒂半两　母丁香半两（以上先为末）　粉霜一分（研）　芦荟一分（研）　麝香一分（研）

【用法】上同拌匀，以猪胆汁和丸，如黍米大。每服十丸，温米饮送下，不拘时候。

【主治】小儿诸病有虫下如丝，或如马尾，甚者便至危殆者。

65888 **神龙抱珠灵膏**

【方源】《膏药方集》引《外科枢要》。

【组成】乳香五钱（箬上烘去油）　没药五钱（箬上烘去油，研细）　大黄二两　肉桂二两（去皮，研极细末）　土木鳖二两（去壳，净）

真阿魏三钱(切薄片)　白芷梢二两　血余二两　麻黄绒(用麻黄四五两,入臼内捣成绒,筛去粗皮滓渣,再捣再筛,务令极细)二两　归身二两　羌活二两　元参二两(去芦)　赤芍二两　生地三两　轻粉四两　黄丹四十两(水飞过,盐矾炒干成紫色,研极细)　桃　柳　槐　桑　枣枝各七枝(每枝长一寸)

【用法】将前十六味药中的十味粗药用麻油六斤半浸三日,先将血余熬溶后,再投各药熬至黄枯浮起,滤去药滓;次下黄丹熬至滴水成珠,将锅提起,停片刻,将细药(肉桂、乳香、没药、轻粉、阿魏)趁热放下,不住手搅匀,使黑如漆、明如镜,入水试不老不嫩为度;趁热投入大水缸内浸七日,捞起切块,油纸包裹,收贮。临用摊贴。

【主治】风寒暑湿,恶疮大毒,跌扑闪挫,五劳七伤,背心肩臂腰膝酸疼。

65889　神仙一井金丸

【方源】《杨氏家藏方》卷九。

【异名】神仙一井金丹(《普济方》卷二二一)。

【组成】牛膝三两(酒浸一宿,焙)　肉苁蓉三两(酒浸一宿,切,焙)　川椒(炒)　白附子(炮)　附子(炮,去皮脐)　乌药　何首乌(同黑豆半升煮,豆熟为度,去豆不用)各二两　木鳖子(去壳)　萆薢(黑豆半升同煮,豆熟为度,去豆不用)　舶上茴香　防风(去芦头)　白蒺藜(炒,去刺)　覆盆子　绵黄耆(蜜炙)　赤小豆　骨碎补(去毛)　金毛狗脊(去毛)　全蝎(去毒,微炒)　五味子　青矾(火飞,枯尽)　地龙(去土,炒)　天南星(炮)　羌活(去芦头)各一两

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,煎五味子酒送下,空心、食前、日午各一服。

【功用】补益真元,大壮腰脚;久服髭鬓不白,牙齿牢壮,美进饮食,明目聪耳,行步轻快。

【临证举例】乌发　《普济方》:余在淳安,主簿李渊云乃祖通判公,少服一井金丹,至老发不白。后在都城访杨五倅,问先和王晚年发不白所服何药?答曰:某未尝知。遂向老药童叩之,云:先和王常服一井金丹。后卢陵见前柳守赵鼎,六十余年,髭发皆不白,众以为润泽者,仆仔细视之,非是染者,渠云:自然如此。继过豫章,其人作酒官,托邱倅叔献询叩,渠云:大人平生,只服一井金丹,方知此药之妙。

65890　神仙一井金丹

《普济方》卷二二一。为《杨氏家藏方》卷九"神仙一井金丸"之异名。见该条。

65891　神仙巨胜子丸

【方源】《普济方》卷二二三引《德生堂方》。

【异名】乌金丸(原书卷二二一)、神仙巨胜丸(原书卷二二一)。

【组成】生地黄　熟地黄　何首乌各四两　巨胜子(九蒸九晒)二两　人参　肉苁蓉(酒浸)　牛膝(酒浸)　菟丝子(酒浸)　天门冬(去心,酒浸)　破故纸(酒浸,炒)　巴戟(去心,酒浸)　干山药　五味子　楮实(炙)　覆盆子(净)　鹿茸(嫩红色者,生用)　柏子仁(去壳,另研)　酸枣仁(去壳,另研)　白茯苓　西枸杞各一两　核桃十枚(去壳取仁,另研烂后,入药内再研匀)

【用法】上为细末,用枣一斤,去皮核煮熟研烂,与药末和匀为丸,如梧桐子大。每服五七十丸,空心以温酒或盐汤送下,服后干物压之,丸数任意加减。

【功用】滋血气,壮元阳,髭发反黑,安魂定魄,改易容颜,通神仙,延寿命,生骨髓,扶虚弱,展筋骨,润肌肤,补益丹田,接养真气,活血荣颜,百病永除,根本坚固,水火既济,常服身体轻健,气力倍加,行走如飞。

【临证举例】种子延年,昔有一老人,耳聋目昏,年至七十无子,服此药后,齿落更生,发白再黑,二妻生一十三子,寿至一百余岁。

65892　神仙巨胜子丸

【方源】《普济方》卷二二二。

【异名】巨胜子丸（《北京市中药成方选集》）。

【组成】熟地黄 生地黄 何首乌各四两 牛膝（酒浸三日） 官桂（研） 枸杞子 肉苁蓉（酒浸三日） 菟丝子（酒浸三日） 人参 天门冬（酒浸三日） 茯苓（去皮） 巨胜子（焙，去皮） 天雄（去皮脐） 覆盆子（炒） 山药 楮实 川续断 柏子仁 酸枣仁 破故纸（炒） 巴戟（去心） 五味子 广木香 韭子 鸡头实 莲蕊 莲肉各一两

【用法】上为细末，加胡桃十个研细，春、夏炼蜜为丸，秋、冬枣肉为丸，如梧桐子大。每服二十丸，渐加至三十丸，空心以温酒或盐汤送下，每日二次。服一月元气充足，六十日白发变黑，一百日容颜改变，目明可黑处穿针，冬月单衣不寒。

【功用】安魂定魄，改易容颜，通神仙，延寿命，补髓驻精，益气，治虚弱，展筋骨，润肌肤，头白再黑，齿落更生，耳聋复聪，目视有光，心力无倦，行疾如飞，寒暑俱不能侵，能除诸病。

【主治】《北京市中药成方选集》：气虚血亏，肾寒精冷，遗精白浊，腰腿无力。

【加减】如无天雄，可以附子（去皮脐）代之；久服，去天雄、用鹿茸。

【备考】《医统》有甘菊花八钱；《北京市中药成方选集》无天雄、胡桃，有香附、菊花。

65893 神仙巨胜子丸

【方源】《普济方》卷二二四。

【异名】益寿丹。

【组成】黄精 木通 当归 黄耆 莲子 广木香 枸杞子 肉苁蓉（酒浸） 熟地黄（酒浸） 何首乌 人参 破故纸（酒浸） 柏子仁 巴戟（酒浸，去皮） 山茱萸 巨胜子（煎，去皮，燥干） 干山药 菟丝子（酒浸） 杜仲（酒浸） 酸枣仁 五味子（酒浸）各二两 天雄一对 石菖蒲（酒浸） 楮实子 甘菊花 牛膝（酒浸三日） 小茴香（炒）各一两 川乌头（炮） 白茯苓 覆盆子 远志（去心，酒浸，焙） 天门冬（酒浸，去皮）各一两

【用法】上为细末，春、夏炼蜜为丸，秋、冬枣肉为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下，每日二次。服至一月，真气完成；至五十日，头白再黑；百日，颜如童子。

【功用】除百病，补真气，乌发，驻颜，耐寒，种子，延年益寿。

【主治】耳聋眼暗，诸病。

【加减】如无天雄，可以附子代之。

65894 神仙附益丸丹

《济阴纲目》卷六。为《古今医鉴》卷十一引徐宪副“神仙附益丹”之异名。见该条。

65895 神仙金不换膏

【方源】《全国中药成药处方集》。

【组成】僵蚕 青皮 独活 川附子 防风 生草乌 何首乌 白鲜皮 秦艽皮 穿山甲 半夏 生川乌 青风藤 马钱子 桃仁 生虎骨 天麻 归尾 良姜 威灵仙各七钱 生姜 韭菜 生蒜 青葱各二具

【用法】用香油七斤半将上药炸枯去滓，熬之滴水成珠，加章丹三斤四两凉透，再将细药（乳香六钱、没药六钱、公丁香五钱、官粉一两三钱、冰片五分、木香八分，共研极细末）搅入膏内。临用化开，摊贴患处。

【功用】散风，活血，止痛。

【主治】手足麻木，腰腿疼痛及跌打损伤。

65896 神仙服百花方

【方源】《圣惠》卷九十四。

【异名】服百花方（《奇效良方》卷二十一）。

【组成】桃花（三月三日采） 蒺藜花（七月七日采） 甘菊（九月九日采） 枸杞叶（春采） 枸杞花（夏采） 枸杞子（秋采） 枸杞根（冬采）各等分

【用法】上阴干为散。每服二钱，以水调下，一日三次，久服。

【功效】轻身长寿。

65897 神仙服黄精膏

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】黄精一石（去须） 干姜末三两 桂心末一两

【用法】先将黄精以水淘洗令净，切碎，蒸令烂熟，压取汁，于大釜中煎之，去其游水讫，入干姜末与桂心末更煎之，看其色郁然黄，便止，待冷，盛于个津器中。每日空腹取药二合，与暖酒五合相合服之，日再服弥佳。二十日内，浑身旧皮皆脱，颜色变少，须发皆变；若纳黑豆黄末服之，即可绝粒。

【功用】乌发驻颜，补益延年，疗万病，辟谷。

65898　神仙服蒺藜方

【方源】《圣惠》卷九十四。

【异名】神仙饵蒺藜方(《济阳纲目》卷六十八)。

【组成】蒺藜一石(七八月熟时收采，晒干，先舂去刺)

【用法】上为细末。每服二钱，以新汲水调下，日进三服，勿令中绝。服一年后，冬不寒，夏不热；服至二年，老返少，头白再黑，齿落更生；服至三年，身轻延寿。

【功用】耐寒热，返老还童，乌发，轻身延寿。

65899　神仙服蜂房丸

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】蜂窠(完整者，九月十五日平旦时取)

【用法】上蒸，阴干百日，为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，酒送下，每日三次。

【功用】老人服之，颜如十五童子。

65900　神仙枸杞子酒

《圣惠》卷九十五。为《医心方》卷十三引《极要方》“枸杞子酒”之异名。见该条。

65901　神仙耐寒热方

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】白矾(烧灰)　白石脂　丹砂(细研)　磁石(捣细，研，水飞过)各四两

【用法】上为末，松脂为丸，如梧桐子大。每服四丸，平旦吞服。服至百日，夏可重衣，冬可单衣。

【功用】耐寒暑。

65902　神仙种子奇方

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】巴戟肉二两五钱　菟丝子(酒制)二两　鹿茸(酥炙，去毛)一两(须真茄茸)　吴茱萸　白及　白茯苓各一两　大附子(童便浸三日，切片，阴干)五钱　牛膝(酒洗，去芦)　细辛各五钱　菖蒲　厚朴(姜炒)　桂心　人参　白蔹　没药各四钱　当归三钱　乳香二钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五七十丸，空心以黄酒或盐汤送下。壬子日修合，男女每日服之。

【功用】种子。

【宜忌】不可过服，恐成双胎。

65903　神仙饵胡麻膏

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】胡麻膏一斗　韭头一斤

【用法】上以慢火煎，令韭焦黄，去韭。每日以温酒调下二合。服之百日，去皯䵟，肌肤充盈；二百日，老者变少；三百日，延年益寿；久服不已，长生。

【功用】去皯䵟，充盈肌肤，益寿延年，老人复少。

65904　神仙饵蒺藜方

《济阳纲目》卷六十八。为《圣惠》卷九十八“神仙服蒺藜方”之异名。见该条。

65905　神异瘊火膏子

【方源】《鲁府禁方》卷一。

【组成】生地黄四斤　熟地黄　核桃肉　红枣肉　莲肉　柿霜　山茱萸(去核)各一斤　甘枸杞　胡黄连　人参　知母　贝母　银柴胡　诃子肉　牡丹皮　地骨皮　山药　黄芪　黄芩　黄柏　陈皮　白沙参　杏仁(去皮尖)　桔梗　黄菊花　五味子　白芍　栀子　香附　松花　天门冬(去心)　麦门冬(去心)　厚朴(姜炒)　枳壳(去瓤)　当归　白术(去芦)　桑白皮　天花粉　瓜蒌仁　白茯苓　乳香　没药　玄胡索　玄明粉　鹿角胶　粟壳　柏

子仁各四两 梨汁五斤 藕汁二斤 五加皮六两

【用法】上用甜水一大锅，将生熟地黄煮熬稠浓，至十碗收起，又用水一大锅再煮熬，待稠浓至十余碗汁时再收起，将二黄用冷水磨细，绢袋滤滓；将上煎调药下锅，用水一大桶，煮一次，收水十碗，如此将药煮熬五次，取水五十碗；将前二黄汁与诸药汁和匀，用细绢袋滤去滓，以净药水下铜锅，用文武火熬成膏子，下蜂蜜五斤熬一二沸，再下松花、玄明粉、白矾、乳香、柿霜、梨、藕，已成膏子熟美，用瓷罐盛之，勿令泄气。每日早晨以滚水和食三钱，不拘食之前后。仍将诸药滓为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服五十丸，滚水送下，不拘时候。

【主治】痰火。

65906 **神效大活络丹**

《经验各种秘方辑要》。为《兰台轨范》卷一引《圣济》"大活络丹"之异名。见该条。

65907 **神效五食汤丸**

《卫生宝鉴》卷十四。为《圣济总录》卷七十二"五食丸"之异名。见该条。

65908 **神效风气膏药**

【方源】《摄生众妙方》卷三。

【组成】当归 川芎 芍药 防风各三两 羌活 独活 红花 连翘各二两 五灵脂 川乌各一两五钱 蝉蜕五钱 官桂四两 生地黄 熟地黄 乳香 没药 阿魏各一两 荆芥穗二两

【用法】上为末，用麻油一斤文武火煎成膏，外用白瓷器收起；又用米醋、姜汁、葱汁各二大碗共一处，文武火煎成膏，又用瓷器盛起；用好松香一斤半，文武火煎化，方下醋、姜、葱汁，合成用槐棍打匀，又文武火煎一次，量加麻油药汁，后加乳香、没药、阿魏。

【主治】诸风。

65909 **神效未沤麻散**

【方源】《圣惠》卷八十。

【组成】未沤麻一握（去土，一尺以上取收，及时阴干） 赤芍药三分 芎䓖三分 当归三分（锉，微炒） 甘草三分（炙微赤，锉） 茯神三分 乱发一两半（烧灰） 陈橘皮一两（汤浸，去白瓤，焙）

【用法】上为粗散。每服四钱，以水一中盏，加生姜半分，煎至五分；次入酒二合，更煎三五沸，去滓温服。

【功用】产后预防百病。

【主治】产后血晕。

【备考】本方方名，《普济方》引作"未沤麻散"。

65910 **神效光明眼药**

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】麝香三分 冰片一钱五分 制甘石一两 地栗粉五钱

【用法】上为细末。用时点入眼角内。

【功用】消肿止痛。

【主治】云翳山障，胬肉攀睛，迎风流泪，昏花气蒙，风火烂眼，并治七十二种目疾。

65911 **神效使君子丸**

【方源】《圣惠》卷八十六。

【组成】使君子 没石子 木香 胡黄连 黄连（去须） 天灵盖（涂酥，炙令黄） 熊胆（细研） 芦荟（细研） 诃黎勒皮 阿胶（捣碎，炒令黄燥） 仙灵脾各半两 麝香一分（细研）

【用法】上为末，用水浸蒸饼为丸，如麻子大。每服三丸，粥饮送下，每日三次。

【主治】小儿一切疳。

【备考】本方方名，《普济方》引作"使君子丸"。

65912 **神效绞肠痧散**

【方源】《观聚方要补》卷三引《证治大还》。

【异名】诸葛散。

【组成】朱砂 雄黄 明矾 枪消各三钱 麝香 冰片各二分 荜茇三厘 金箔十二张

【用法】上为细末（五月五日午时合药），盛瓷瓶内。男左女右点清明穴眼潭内。

【主治】山岚瘴毒，中恶。

65913 **神效接骨奇方**

【方源】《跌损妙方》。

【组成】当归 白芷 草乌各三钱(上为末,先以酒调服二钱,一觉麻,揣正骨断处,再以糯米粥、牡蛎粉调涂患处) 乳香 没药 当归 白芍 川椒各五钱 自然铜二钱

【用法】上为细末,将黄蜡二两溶化,入前末搅匀,为丸。酒服数次。

【功用】接骨。

65914 **神效膏滋眼药**

【方源】《饲鹤亭集方》。

【组成】犀黄 麝香各五分 冰片三分 珍珠 琥珀 熊胆 月石 蕤仁霜 辰砂各一钱 甘石一两 地栗粉四钱

【用法】上加川连,熬膏。用时以人乳调点眼角内,数次即愈。

【主治】风火一切目疾,赤肿疼痛。

65915 **神验摩风毒膏**

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】牛膝(去苗) 赤芍药 当归 白术 白芷 川椒(去目) 厚朴(去粗皮) 雷丸 半夏 桔梗(去芦头) 细辛 吴茱萸 附子(生,去皮脐) 木香 大腹皮 槟榔各一两 酥二两 野驼脂 野猪脂各五两

【用法】上锉细,以酒浸一宿,先煎猪脂,然后入诸药,从平旦至日入,以慢火煎之,其膏即成;以绵滤去滓,却入铛中,然后下酥及驼脂,待稍冷,收于瓷器中。每服如枣大,于患处摩之,仍须避风;若腹痛,即取药如弹子大,空心酒化服。

【主治】风毒积年,气脉不宣通,四肢挛急,肌肉顽痹,腹中百病。

65916 **神功消毒保婴丹**

《摄生众妙方》卷十。为《痘疹心法》卷二十二“消毒保婴丹”之异名。见该条。

65917 **神仙一醉忍冬汤**

【方源】《疡医大全》卷七。

【组成】银花藤 蒲公英各一两 没药(去油) 乳香(去油) 雄黄各二钱

【用法】上加酒一瓶,封固,煮千余沸;再加白蜜四两,生葱七根,再煮数沸,去葱。尽量饮醉,以大蒜压之。取汗即愈。

【主治】痈疽肿疡。

65918 **神仙万病解毒丸**

《中国医学大辞典》。为《百一》卷十七“神仙解毒万病丸”之异名。见该条。

65919 **神仙太一火煅丹**

【方源】《圣济总录》卷二〇〇。

【组成】圣知子(煎,掠取白花,焙干,研)二斤 绛矾(细研)五两 消石五两(细研,分作十份,每一度煅入一份) 麻油一百两(分作十份,每一度煅入一份)

【用法】上先将矾盐入消一份拌和研匀,用麻油十两和了,入固济五升瓶内,将瓦盖瓶,以炭火十斤煅,焰绝炭尽为度;取出细研,更入消一份,油一份,准前用炭十斤煅尽,如此十度,计用炭一百斤足;后取药捣罗为末,旋取少许,细研,汤浸蒸饼为丸,如梧桐子大。每服十丸,渐加至二十丸,空心冷水送下。

【功用】轻身延年,久服众疾皆愈,髭发如漆,筋骨轻健,耳目聪明。

65920 **神仙太乙紫金丹**

《古今医鉴》卷十六。为《百一》卷十七“神仙解毒万病丸”之异名。见该条。

65921 **神仙中品黄龙丹**

【方源】《圣济总录》卷二〇〇。

【组成】赤石脂十两 黄牛乳汁三升 乳香(通明者)一斤 白砂蜜一斤 甘草三两(末) 白粳米三斗五升(分作五次炊药,以熟为度)

【用法】上将赤石脂研末,以生绢夹袋子贮之,于甘水净盆内浸半日,以手在水中揉摆,候澄下,刮入纸箱中,控干,取五两精细者入银盒内盛之,第一次,于上七日淘米七升,如炊饭相似,安药在内炊之,饭熟为度,夜中去其盒盖,露之星辰下一宿;第二次,于月望日依前法炊之,亦去其盒盖,夜露月明中一宿;第三次,于二十四日早晨,依前法炊之,去其

盒盖，于日中晒之，要取日月星辰之气足；第四次，先将牛乳三升入大盒内，于慢炭火上逼令如鱼眼沸，下乳香候化，次入前三次炊之赤石脂末，用柳木篦搅令匀，倾于乳钵内细研，复入盒中，依前用米七升，安盒在内炊之，米熟为度；第五次，以蜜二斤入盒内，依前慢火逼之如鱼眼沸，即下前药，不住手用柳木篦搅匀，入甘草末三两，同熬令带湿便住；再用米七升，安药盒在内炊之，米熟为度，取盒于新水盆内浸半日，取出于净处顿。初服时，选天德日欲明时，空心焚香，面东七拜，以好酒调下一匙许。

【功用】延年益寿，使四气调和，经络无滞，脏腑通快，精神清爽，除一切风劳气冷大病。

65922 神仙少卧益力方

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】术 麻黄（去根节） 甘草各一两

【用法】上为细散。每服二钱，食后以东向水、日半以南向水、暮以西向水调服。

【功用】益气力。

【主治】《普济方》引《卫生家宝方》：四时伤寒时气。

65923 神仙团参阿胶散

【方源】《观聚方要补》卷二引《叶氏录验方》。

【组成】御米壳 阿胶各一两 人参 黄耆各半两

【用法】加生姜、大枣，水煎服。

【主治】五色恶痢，状如鱼脑，或如豆汁。

65924 神仙伏火内固丹

【方源】《圣济总录》卷二〇〇。

【组成】丹砂一两 锡蔺脂一两

【用法】上以浆水二碗同煮，水尽为度；用沙盒子一枚，将煮过砂用蜜滚过，使白附子末再滚为衣，却用黑附子末水调裹砂在心中，上下用蜀椒铺底盖满盒子，又用油调蛤粉固济口缝，外用盐泥纸筋封固，俟干用炭火五斤煅；火尽候冷取出，用纸裹丹砂，入地窍埋一宿，取出研细末，以糯米糊为丸，如梧桐子大。每日服一丸，清净冷水送下。久服无毒。

【功用】补精育神，延年悦色。

65925 神仙延年除风散

【方源】《圣济总录》卷一八六。

【异名】除风散（《普济方》卷二二〇）。

【组成】白术 甘菊花 白茯苓（去黑皮） 天门冬（去心）各一两 天雄（炮裂，去皮脐） 半两

【用法】上为细散。每服一钱匕，空心食前温酒调下，每日二次。

【功用】延年却老，驻颜色，益气血。

【主治】八部诸风。

65926 神仙延寿药酒丹

【方源】《古今医鉴》卷二。

【组成】人参（去芦） 白术（土炒） 甘草（炙） 白茯苓各三两 当归 川芎 白芍药（炒） 生地黄（姜汁炒） 熟地黄 枸杞子 肉苁蓉（酒洗） 何首乌（米泔浸） 牛膝（去芦） 天门冬（去心） 麦门冬（去心） 砂仁（炒）各二两五钱 川椒（去梗目） 川乌（去皮脐） 草乌（圆者，泡） 乌药各一两 五加皮 虎胫骨（酥炙） 枳壳（炒） 干姜（泡） 厚朴（姜汁炒） 陈皮（去白） 沉香 茴香（盐酒炒） 香附（童便浸，炒） 羌活 独活 防风（去芦） 白芷 麻黄（不去节） 细辛（酒洗） 半夏（制） 苍术（米泔浸，炒） 五味子 破故纸（炒） 桂各二两 红枣（去核） 酥油 蜂蜜各八两 胡桃肉（汤泡，去皮）

【用法】上锉，绢袋盛之，用烧酒一大坛，浸三昼夜，置锅中重汤煮三时许，取出，埋土内泄火毒。每日饮一二杯，随病之上下以定空心或食后。酒将饮尽，复以药滓晒干为末，酒为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空心酒送下。

【功用】追万病，补诸虚，和胃养丹田，益精壮筋骨，安和五脏，定魄宁魂，返老还童，延年益寿。

【主治】久近风邪，左瘫右痪，语言蹇涩，手足拘挛，紫白癜风，风寒暑湿四气交攻，身体

虚羸,腰疼膝痛,耳聋眼瞶,下部诸虚;女子经血不调,脐腹绞痛,胸膨胁胀,呕吐恶心,子宫虚冷,赤白带下。

【备考】方中胡桃肉用量原缺。

65927 **神仙补益固真丸**

《普济方》卷二二六引《十便良方》。为原书同卷"固真丹"之异名。见该条。

65928 **神仙驱毒一扫丹**

【方源】《疡医大全》卷八。

【组成】雄黄 朱砂各二钱 牛黄 麝香各二分

【用法】上为极细末。用猪胆汁调敷患处。外用桐油纸捻点,著近毒处照之,须冷气透出毒外自愈。

【功用】散毒止痛,初起扫之即消,已溃扫之即愈。

【主治】一切痈疽发背,无名肿毒,赤紫丹瘤,缠喉风证。

65929 **神仙服茯苓面方**

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】白茯苓五斤(去黑皮,细锉) 甘草五两(细锉)

【用法】上以水六斗,先煎甘草至三斗,去滓澄清,却入釜中,纳白蜜三升,好牛乳九升,相合,以慢火煎茯苓,令乳、蜜汁尽,出之;及热,按令散,拣择去赤筋,又熟挼令如面,阴令极干。初服三钱,以水调下,稍稍任性加之,每日四五次。

【功用】延年。

【宜忌】忌食米、醋物。

65930 **神仙驻颜延年方**

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】枳实 熟干地黄 甘菊花 天门冬(去心,焙)各二斤

【用法】上为细散。每服三钱,空心温酒调下,每日二次。

【功用】令众病皆除,身轻目明,颜色悦泽,延年益寿。

65931 **神仙饵菟丝子方**

【方源】《圣惠》卷九十四。

【异名】服菟丝子方(《奇效良方》卷二十一)。

【组成】菟丝子一斗(以酒一斗,浸良久,漉出晒干;又浸,令酒尽为度)

【用法】上为细散。每服二钱,温酒调下,后吃三五匙水饭压之,每日三次,至三七日更加至三钱。

【功用】令人光泽,三年后老变为少,去风冷,益颜色,久服延年。

65932 **神仙益寿二气丹**

【方源】《圣济总录》卷二〇〇。

【组成】丹砂二两 水银一两(同研) 百合花 夜合花 干菊花 槐花各不拘多少(同为末)

【用法】取一小瓷盒,先将四花末置于盒中至一半,次入丹砂,水银紧捺,更用知母末盖,合定,赤石脂固缝,盐泥固济,候干,置一砖上用醋灰裹定,以炭三五斤煅顶,火炭尽为度,候冷取出细研,油单裹之,垂入井水中浸三宿出火气,次取出,蒸三遍出水气,再用枣肉为丸,如绿豆大。每服一二丸,酒送下。

【功用】延年,久服身中更不出虫虱。

【主治】诸般气疾。

65933 **神仙解毒万病丸**

【方源】《百一》卷十七。

【异名】神仙追毒丸、圣后丹、玉枢丹、解毒丹、万病丸、紫金锭(《外科精要》卷中)、神仙解毒丸(《医方类聚》卷一九六引《王氏集验方》)、圣援丹(《普济方》卷二八三)、神仙解毒万病丹(《奇效良方》卷六十九)、太乙丹、紫金丹、神仙太乙丹(《外科经验方》)、万病解毒丹(《医学入门》卷七)、神仙太乙紫金丹、万病回春丹(《古今医鉴》卷十六)、追毒丸(《准绳·疡医》卷一)、万病解毒丸(《寿世保元》卷十)、卫生宝(《摄生秘剖》卷三)、解毒万病丹(《兰台轨范》卷一)、太乙玉枢丹(《霍乱论》卷下)、太乙紫金锭(《理瀹》)、神仙万病解毒丸(《中国医学大辞典》)。

【组成】文蛤三两（淡红黄色者，捶碎，洗净） 红芽大戟一两半（净洗） 山茨菇二两（洗） 续随子一两（去壳秤，研细，纸裹压出油，再研如白霜） 麝香三分（研）

【用法】上将前三味焙干，为细末，入麝香、续随子研令匀，以糯米粥为丸，每料分作四十丸（于端午、七夕、重阳日合，如欲急用，辰日亦得）。痈疽、发背未破之时，用冰水磨涂痛处，并磨服，良久觉痒，立消；阴阳二毒，伤寒心闷，狂言乱语，胸膈壅滞，邪毒未发，及瘟疫，山岚瘴气，缠喉风，入薄荷一小叶，以冷水同研下；急中及癫邪，喝叫乱走，鬼胎鬼气，并用暖无灰酒送下；自缢、落水死，头暖者，及惊死、鬼迷死，未隔宿者，冷水磨灌下；蛇、犬、蜈蚣伤，冷水磨涂伤处；诸般疟疾，不问新久，临发时煎桃柳汤磨下；小儿急慢惊风，五疳五痢，与薄荷小叶用蜜水同磨下；牙关紧急，磨涂一丸，分作三服，如丸小，分作二服，量大小与之；牙痛，酒磨涂及含药少许吞下；汤火伤，以东流水磨涂伤处；打扑伤损，炒松节无灰酒送下；年深日近太阳头疼，用酒入薄荷杂磨，纸花贴太阳穴上；诸般痫疾，口面喎斜，唇眼掣眨，夜多睡涎，言语蹇涩，卒中风口噤，牙关紧急，筋脉挛缩，骨节风肿，手脚疼痛，行止艰辛，应是风气疼痛，并用酒磨下。

【功用】《古今医鉴》：解诸毒，疗诸疮，利关窍。

【主治】一切药毒，恶草、菇子、菌蕈、金石毒，吃自死马肉、河豚发毒，痈疽发背未破，鱼脐疮，诸般恶疮肿毒，汤火所伤，百虫、犬、鼠、蛇伤，时行疫气，山岚瘴疟，急喉闭，缠喉风，脾病黄肿，赤眼疮疖，冲冒寒暑，热毒上攻，或自缢死，落水及打折伤死，但心头微暖未隔宿者，急中及癫邪，喝叫乱走，鬼胎鬼气，诸般疟疾，小儿急慢惊风，五疳五痢，新久头痛，风气疼痛等。

【宜忌】孕妇不可服。

【方论选录】《医统》：其方用五倍子消毒杀虫解风为君；山茨菇、千金子、大戟皆驱逐走泄为臣；佐以麝香升散，用之以治痈疽实非所宜，果见脏腑有积毒，或异虫缠滞深固而体气不虚者亦快药，但戒勿轻用耳。

【临证举例】劳瘵 昔有一女子，久患劳瘵，命垂旦夕。此病为血尸虫所噬，磨一粒服之，一时久吐下小虫千余条，一大者正为两段。后只服苏合香丸，半月遂愈如常。

65934 神仙解毒万病丹

《奇效良方》卷六十九。为《百一》卷十七“神仙解毒万病丸”之异名。见该条。

65935 神仙敷毒失笑饼

【方源】《疡医大全》卷八。

【组成】黄泥一大块（煨熟） 连须葱一大把 蜂蜜一钟 雄黄三分

【用法】上杵烂，作一饼。乘热敷毒上。如干了则再敷，一二次自愈。

【主治】初起一切痈疽大毒。

65936 神圣牛黄夺命散

【方源】《丹溪心法》卷五。

【组成】槟榔半两 木香三钱 大黄二两（面裹煨熟，为末） 白牵牛一两（一半炒，一半生用） 黑牵牛（粗末，一半生用，一半炒）

【用法】上为细末，入轻粉少许。每服三钱，蜜浆水调下，不拘时候。微利为度。

【主治】小儿惊风，惊而有热者。

【备考】方中黑牵牛用量原缺。

65937 神圣辰砂南星丹

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】天南星四十九个（一般大者） 活蝎四十九个（五月五日取）

【用法】将上药同盛于一瓦器中，用盐泥固济外边周密，吊于净室中，至腊日取出，拣曾被蝎蜇过之天南星用之（以有小窍子为验），将可用南星以酒浸一宿，焙干为末，再用好辰砂一分，真牛黄、麝香、龙脑各一钱研细，一处拌匀，以生姜汁为丸，如梧桐子大。每服一二丸，煎入参、薄荷汤化下，不拘时候。

【主治】小儿诸痫发搐。

65938 神机万应秘传膏

【方源】《摄生众妙方》卷八。

【组成】香白芷　两头尖　赤芍药　白芍药　生地黄　熟地黄各五钱　当归一两(一个)　蓖麻子五十粒　木鳖子五十个　巴豆五十个　乳香　没药　五灵脂　阿魏各五钱　穿山甲(大者)五个(炙黄,为末)　黄丹一斤(飞过,炒至黑色)　槐枝(用木许筋大)四十八根　柳枝(与槐同)四十八根　香油二斤(真者)

【用法】先将巴豆以上诸药切为细片,乳香以下诸药研为细末,将香油二斤放瓷罐中,入巴豆以上药浸之,春五日、夏三日、秋七日、冬十日,浸毕取出,入铜锅内,并入槐、柳枝,文武火熬至槐、柳枝黑色为度,用细绢滤去药滓,再入黄丹在油内同熬,外以槐枝一尺(比筋大者)频频搅之,看火色将好,油已成膏,滴水如钱,方入乳香以下诸药末,愈加频频搅良久,至药提起有细丝三五七根、尺长不断,然后盛入二三小瓷罐内,放土地内以受五行之气月余方可用。用时以绢绫摊之为上,纸次之,凡用贴疔疮,以火焙手熨三百度,发背等疮二百度,无名肿毒一百五十度,臁疮、对口一百三十度,风气一百七十度,癣疥一百度,余不拘。

【主治】一切疔疮,发背,无名肿毒,臁疮,对口,风气,癣疥。

65939　**神明还命牛黄丸**

【方源】《普济方》卷三七六。

【组成】牛黄二大豆大(为末)　白石脂　龙骨各一两半　桂心　寒水石　大黄各二两半　牡蛎　栝楼各二两　石膏(碎)　消石各三两

【用法】上为末。每用三指撮末,水二升,煎至五合,临时入牛黄末,分为三服,每日三次。

【主治】小儿痫。

65940　**神经性皮炎药水**

【方源】《中药制剂手册》。

【组成】羊蹄根一两　生半夏一两　生南星一两　生川乌一两　生草乌一两　闹洋花八钱　荜茇八钱　细辛五钱　蟾酥八钱　土槿皮一两

【用法】将羊蹄根至蟾酥等九味,共轧为3号粗末,土槿皮另外轧碎;先将土槿皮粗末用4倍量85%乙醇按渗漉法提取,收取滤液100毫升,加蒸馏水调至含醇量为50%,与羊蹄根等粗末搅匀;加入50%乙醇1000毫升,浸润48小时后进行渗漉,收集滤液为1000毫升,过滤静置,取上清液装瓶。用前先以温开水洗净患处,用毛笔蘸药涂抹五至六遍,日涂二至三次。

【功用】去风、止痒、杀菌。

【主治】顽癣,厚皮癣(神经性皮炎)及各种癣疮。

【宜忌】本品为外用药,切勿入口,破皮处和阴部、肛门及其周围,不宜涂用。

65941　**神效万应剪金丹**

【方源】《袖珍》卷三。

【异名】万应剪金丹(《寿世保元》卷十)。

【组成】老阳子(江子)三十五粒(不去皮油)　老阴子(杏子。不去皮油)　陈皮金(去白)　青皮木各三钱(去瓤)　半夏(水烫七次)九粒　乌梅七个(全用)　丹火二两(水飞七次,去粗)一两　黄蜡(生用二两,溶,水洗去粗)一两半　枳壳(罗去瓤)　黄连(罗去须)各三钱　乳香　没药(炙)各二钱　木香(蒸)二两　槟榔二十一个　粟米五钱

【用法】上将黄蜡溶开,入众药和匀,杵千百下作一块,再分一半药末,以油单纸收,临用旋丸,如梧桐子大。每服十丸,血痢,甘草汤送下;白痢,干姜汤送下;红白痢,草、姜汤送下;赤痢,椿根皮汤送下;噤口痢,莲肉、山药、防风、粟米汤送下;落马、折伤、血闷,酒送下;霍乱吐泻,干姜汤送下;水泻,五苓散送下;一切风疾,升麻汤送下;咳嗽,桔梗、杏仁汤送下;痢鱼脑脓汁,食脏汤加附子一片送下;寸白虫,槟榔汤送下;心疼,酒送下;头痛、腰痛、打伤、冷气冲心、下元虚,并用酒送下;时气,井水送下;大小便不通,木通茶汤送下;脐下

疼，芥菜汤送下；五劳七伤，猪胆汤送下；一切疮痛，萝卜汤送下；气痛，宿食不消，生姜汤送下；产后痢，当归汤送下；小儿吊惊风，汉防己汤送下；血风劳，史君子汤送下；口吐清水，诃子汤送下；肠痛，葱白汤送下；蛔虫咬心，槟榔汤送下；阳毒伤寒，栀子、黄连汤送下；阴毒伤寒，附子、枣儿汤送下；浑身壮热，沙糖水送下；虚热，柴胡、竹茹汤送下；寒热，乌梅汤送下；上焦虚热，大黄汤送下；脾胃寒痛，热酒送下。

【主治】诸痢，霍乱吐泻，一切风疾，心疼，头身疼痛，咳嗽，五劳七伤，宿食不消，水泻，时气伤寒，落马折伤，小儿惊风，蛔虫寸白虫，脾胃寒痛，小儿惊风，二便不通，热病，一切疮痛。

65942 神效无比牛黄丸

【方源】《圣惠》卷二十五。

【组成】牛黄半两（细研） 朱砂一两（细研，水飞过） 麝香一分（细研） 龙脑一分（细研） 附子一两半（炮裂，去皮脐） 羌活一两 白僵蚕一两半（微炒） 白附子一两（炮裂） 干蝎一两（全者，微炒） 芎䓖一两 天南星一两（炮裂） 当归一两 桂心一两 木香一两 天麻一两 防风一两（去芦头） 槟榔一两 独活一两

【用法】上为末，入研药令匀，炼蜜为丸，如樱桃大。每服一丸，薄荷酒研下；薄荷、葱、茶下亦得。

【主治】一切风。

65943 神效仙方万亿丸

【方源】《古今医鉴》卷十六引张三峰方。

【异名】神仙万亿丸（《古今医鉴》卷十六）、万亿丸（《回春》卷七）。

【组成】朱砂 巴豆（不去油）各五钱

【用法】酒煎五钱寒食面，丸如黍米大。每服三五丸，外感风寒发热，姜、葱汤送下，出汗；内伤生冷饮食，茶清送下；心痛，艾醋汤送下；肠痛，淡姜汤送下；霍乱吐泻，姜汤送下；赤痢，茶清送下；白痢，淡姜汤送下；赤白痢疾，姜茶汤送下；疟疾寒热，姜汤送下；心膨气胀，姜汤送下；伏暑伤热，冷水送下；诸虫作痛，苦楝根汤送下；大便闭结，茶送下；小便不通，灯心汤送下；积聚发热，茶送下；咳嗽喘急，姜汤送下；小儿急慢惊风，薄荷汤送下。

【主治】小儿诸病。外感风寒发热，内伤生冷饮食，心痛，肠痛，霍乱吐泻，赤白痢，疟疾寒热，心膨气胀，伏暑伤热，诸虫作痛，大便闭结，小便不通，积聚发热，咳嗽喘急，小儿急慢惊风。

65944 神效夺命还真丹

《解围元薮》卷三。为《医方类聚》卷二十四引《施圆端效方》“夺命还真丹”之异名。见该条。

65945 神效观音救苦丹

【方源】《冯氏锦囊·杂症》卷十九。

【异名】观音救苦丹（原书目录）。

【组成】麝香一钱 朱砂二钱 硫黄三钱

【用法】上各为细末，先将硫黄化开，次入朱、麝同化，倾入瓷器内；候干再研末，隔火化开，候干，切作如粞、如米大，贮瓷瓶内，慎勿出气，珍藏听用。用时将药置患处（重者用药米粒大，轻者用药粞粒大），以灯火点着，候至火灭，连灰罨于肉上，立见痊愈，只须一壮，不必复灸；若患处阔大，连排数壮，一起灸之（此药灸时不甚热痛，灸后并不溃脓）。

【主治】①《冯氏锦囊》：一切风寒湿气，流注作痛，手足蜷挛，小儿偏搐，口眼㖞斜，妇人心腹痞块攻疼，不问年深月久。②《外科全生集》：小疖。

【备考】本方方名，《卫生鸿宝》卷一引作“观音救苦针”，有蟾酥、冰片各一分。

65946 神效杖疮恶疮膏

【方源】《普济方》卷三〇五引《永类钤方》。

【组成】黄芩二两（水飞） 清油六两 白胶香四两 净黄连半两 槟榔六个 杏仁十个（生用） （一方加桃仁、乳香、没药）

【用法】作膏用。

【主治】杖疮、恶疮。

【加减】有损,加白胶香。

65947 **神效种子鱼肚丸**

【方源】《惠直堂方》卷一。

【异名】鱼肚丸(《惠怡堂方》卷一)。

【组成】鱼肚(蛤粉炒至无声,去蛤粉,加酥少许,炒过)一斤 菟丝子(酒水煮成饼,晒)二两 真北沙苑(隔纸炒)三两 真白莲须三两 归身(酒洗)三两

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服三钱,清晨开水送下,男女皆服。二十以上,服至四两受孕;三十者,服至半斤;四十者,服至一斤;五十者,服至一料;六十者,多服亦能生子。

【功用】种子。

【宜忌】忌食鱼、羊、火酒。服药时以保精为上,二十外者,五日一御女;三十者,十日;四十者,一月;五十者,一季,愈久愈妙。

65948 **神效复元通气散**

【方源】《仙传外科集验方》卷六。

【组成】当归三两 甘草一两 生地黄半两 黄耆一两 白芍一两 天花粉一两 熟地黄半两 金银花二两

【用法】上㕮咀。每服五钱,水一盏半,煎至一盏,去滓,随证上下,食前后温服,初觉发时,连进三服。

【主治】一切恶疮痈疽,疔疮肿痛。

65949 **神效保产无忧方**

《寿世新编》。为《医学心悟》卷五“神验保生无忧散”之异名。见该条。

65950 **神效秘传立胜散**

【方源】《鸡峰》卷二十七。

【异名】立胜散(《直指》卷二十五)。

【组成】川椒 豆豉各十粒

【用法】上二味入口烂嚼,吐在手心中,次将天南星末调匀得所。涂所伤处,手擦微热,自有黄水出尽,未愈,更作此药。

【主治】中蛇、蜈蚣、蝎、蜂、蜘蛛、射工、沙虫等毒。

65951 **神效消毒保婴丹**

《寿世保元》卷八。为《痘疹心法》卷二十二“消毒保婴丹”之异名。见该条。

65952 **神验化毒五虎丹**

【方源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】炙牛角 炙羊角 炙甲片各二钱 角刺三钱 生大黄十二两

【用法】上将牛、羊、甲片三味,湿纸包煨焦,取净末,同角刺、大黄净末研匀。每服五钱,弱者三钱,绍酒送下。候泻,宜于空地上,利完,将土掩之,恐恶气害人。间二日再一服,甚者不过三服。后服珠黄十宝丹,以愈为度。

【主治】杨梅结毒疮。

65953 **神验保生无忧散**

【方源】《医学心悟》卷五。

【异名】神验保产无忧散(《医方简义》)、神效保产无忧方(《寿世新编》)。

【组成】当归(酒洗)一钱五分 川贝母一钱 黄耆八分 白芍(酒炒)一钱二分(冬月用一钱) 菟丝子一钱四分 厚朴(姜汁炒)七分 艾叶七分 荆芥穗八分 枳实(面炒)六分 川芎一钱三分 羌活五分 甘草五分

【用法】水二钟,加生姜三片,煎至八分,空腹温服。妇人临产,先服一二剂;或遇横生倒产,甚至连日不生,速服一二剂,应手取效。

【功用】令儿易生,救孕妇产难,保子母安全。

【方论选录】新孕妇人,胎气完固,腹皮紧窄,气血裹其胞胎,最难转动,此方用撑法焉。当归、川芎、白芍养血活血者也;厚朴去瘀血者也,用之撑开血脉,俾恶露不致填塞;羌活、荆芥疏通太阳,将背后一撑,太阳经脉最长,太阳治而诸经皆治;枳壳疏理结气,将面前一撑,俾胎气敛抑而无阻滞之虞;艾叶温暖子宫,撑动子宫,则胞胎灵动;川贝、菟丝最能运胎顺产,将胎气全体一撑,大具天然活泼之趣矣;加黄耆者,所以撑扶元气,元气旺则转运有力也;生姜通神明去秽恶,散寒止呕,所以撑扶正气而安胃气;甘草协和诸药,俾其左宜右有,而全其撑法之神者也。

【备考】《寿世新编》云本方专治一切产症，有胎即能安胎，临产即能催生。不拘月份，凡胎动不安，腰痠腹痛，一服即安，再服全愈；临盆艰危者，一服即生；横生逆产，六七日不下及胎死腹中，命在须臾者，亦二服即下；怀孕者七个月，即宜预服，七个月服一剂，八个月服二剂，九个月服三剂，十个月亦服三剂，临产时服一剂，断无难产之患。惟已产之后，此药一滴不可入口，切勿误服。预服者空心服，临产及胎动不安并势欲小产者，皆临时热服，如人虚弱，再加党参一二钱或加高丽参更妙。本方终为保产起见，而非安胎正品，盖仍能安胎者，或由体虚偶因风寒油滞，以致胎气不安，得此微微发散消导诸味，入调补气血药中，故亦获效，如专恃为安胎药，则不可矣。

65954 神验保产无忧散

《医方简义》。为《医学心悟》卷五“神验保生无忧散”之异名。见该条。

65955 神验摩风麝香膏

【方源】《圣惠》卷六十七。

【组成】麝香一两（细研） 虎胫骨一两 细辛一两 防风一两（去芦头） 独活一两 桂心一两 当归一两 芎䓖一两 白芷一两 白僵蚕一两 生干地黄一两 白及一两 白术一两 川椒一两半（去目） 附子一两（去皮脐，生用） 旋覆花一两 赤芍药一两 连翘一两 甘菊花一两 木鳖子一两（去壳） 天南星一两 栝楼根一两半 乌蛇一两半 牛膝一两（去苗） 踯躅花一两 甘松香一两 石斛一两（去根） 野驼脂十两 棘针二两 蜡五两 腊月猪脂二斤 醋三升 好酒二升

【用法】上净洗，晒干，锉细，人酒、醋中浸三宿，滤出阴干，却入腊月猪脂，驼脂内，以慢火煎，候白芷黄焦，则药成，以绵滤去滓，入麝香末调匀，以瓷盒盛。用时先火上熁手心，点药摩痛处五七度，并以温酒调药半匙服之。

【功用】软筋骨，润皮肉，止疼痛。

【主治】伤折，蹉跌筋骨，黯肿疼痛，及伤外风，风毒偏风，口面不正，但是伤风等。

65956 神授东华益算膏

【方源】《臞仙活人方》。

【组成】五枝膏二两 净沥青一斤 净黄香半斤 乳香末一两 没药一两 轻粉二钱 黄蜡一两 血竭末二钱 麝香末一钱 安息香末 黄丹各一两 瓜绿末二两（极细）

【用法】先熬五枝膏（以桃枝、柳枝、槐枝、榆枝、桑枝、枸杞皮各五升，锉碎，用长流水一担，同熬至五分，去滓，加当归末四两，慢火熬成膏，滴水中不散为度），将川芎、白芷入油同煎（春夏用油四两，秋冬用油六两），油熟去药，下沥青、黄香、黄蜡溶开，次下五枝膏，用槐枝搅二百余次，下乳香、没药、血竭、轻粉、安息香、黄丹，再搅二百余次，下麝香、瓜绿，再搅三百遍，滴水盆内浮者为度，将药倾于水盆内，浮者似青荷叶为度，沉香色者再熬，拔扯二百余遍，搭成鸡子大块，水盆内浸一宿，捞出控干，用纸托盘内放之，冬温处、夏凉处。用时以绯红绵帛可疮大小津唾摊贴，勿留口，不见火；如贴脑疽、发背溃烂之处，先用槐枝、葱白煎汤洗净患处，而后摊贴，三五日一换。

【主治】一切无名恶疮，诸药不效者。

【宜忌】煎熬此药，勿犯铁器。

65957 神授至圣保命丹

【方源】《卫生总微》卷六。

【异名】至圣保命丹（《直指小儿》卷二）、保命丸（《婴童百问》卷三）、神效保命丸（《中国医学大辞典》）。

【组成】全蝎十四个（青色者） 朱砂（水飞）二钱（好者） 麝香半钱 防风（去芦并叉枝）一钱 金箔十片（研） 天麻二钱 白僵蚕（去丝嘴，直者）一钱 白附子二钱（好者） 天南星一钱 蝉壳（去土泥）二钱

【用法】上为细末，粳米饭为丸，如樱桃大，以朱砂为衣。每服初生儿半丸，周晬儿一丸，三五岁有急候者二丸，五七岁至十岁常服只一丸，乳汁或薄荷水化下。

【功用】镇心神，退惊痫，安魂定魄，祛风逐

邪，化涎消痰。

【主治】一切惊痫、风痓、中风，并胎惊内吊，腹肚坚硬，夜啼发热，急慢惊风，恶候困重，上视搐掣，角弓反张，倒仆不省，昏愦闷乱。

65958　神治诸般风气灵膏

【方源】《扁鹊心书·神方》。

【组成】红砒一斤

【用法】上入罐化汁，将金头蜈蚣、全蝎末投砒内，以砒不起烟为度；又以砒用槐角子一斗，煮三昼夜，水干为度；上以土筑实封固，火煅锅通红，死砒脆白化成汁，用砒一两，配金液丹一两，共研为末，摊于膏药，贴患处。

【主治】诸般风气。

65959　神效取虫青桑枝散

【方源】《奇效良方》卷二十二。

【组成】青桑枝　柳枝　桃枝　梅枝各七茎(并长四寸许)　青蒿一小握　石榴皮　赤箭　鬼臼各半两

【用法】上以童子小便一升，加葱白七茎(去头叶)，煎至一半，去滓；另入安息香、阿魏各一分，再煎至一盏，去滓。调辰砂末半钱、槟榔末一分、麝香一字，分作二服调下，五更初一服，五更三点一服。至巳时必取下虫，红者可救，青黑者不治，见有所下，即进软粥饭，温暖将息。

【主治】痨瘵。

【宜忌】不可食硬物及生冷等物。

65960　神仙大验备急黑神丸

【方源】《圣济总录》卷五。

【组成】雄黄(研)　硇砂(研)　丹砂(研)　硫黄(研)　水银各一两

先以慢火于生铁铫内溶硫黄销，次倾入水银，急以火箸搅，焰起即离火以湿布搭灭，候冷刮取，与上三件同捣研；取一湖南烧药罐子，先用六一泥固济待干，入上末，实按令平，连盖子泥四缝，只留一寸缝不泥；合慢火匀养一复时，加火近罐子烧令通赤，缝中有烟焰出，急抽火令入按盖子急泥合缝周遍，用净筛土窨定药罐子，不得令露透出药气，上以大盆合之；次日取出药捣罗，用湿重帛包裹，以净湿土内窨盆合，出火毒三日三夜，逐日起盆微洒水，日满取药，再研如粉，入后药末。

犀角(镑)　鹿茸(酥炙，去毛)各一两　牛黄(研)半两　天竺黄(研)　升麻　天麻　干蝎(酒炒)各一两　木香半两　阿胶(慢火炙燥)二两　天南星(牛胆煮一复时，晒干)一两(上除研药外，捣罗为末)

【用法】上为末，用青州大枣蒸熟，去皮核，研膏为丸，如梧桐子大(合此药宜三月三日、五月五日，或腊日)。每服二至三丸，用豆淋酒、生姜汁去滓研药，斡开口灌下；如人行五里，更一服；连三服，汗出解。

【主治】中风、急风，牙关急，口噤不开。

【宜忌】宜食生姜酒、粟米粥。

【备考】本方方名，《普济方》引作“备急黑神丸”。

65961　神仙太乙至宝万全膏

【方源】《医方类聚》卷一九四引《经验秘方》。

【组成】当归　大黄　玄参　赤芍药　没药　肉桂　白芷　生干地黄　乳香各半两

【用法】上切如松子大，用香油一斤浸药，春五日、夏三日、秋七日、冬十日，然后以文武火于砂锅内熬白芷赤黄色为度，绢绵滤去滓，将油再熬得所，下黄丹半斤，以柳枝搅，至滴油在水中不散成珠，看硬软不粘手，即用瓷器盛之。如摊时，用小器内分药，于文武火上化开摊之；如作丸，令如鸡头大，蛤粉为衣，煎汤使酒送下；蛇虎蝎犬、汤火刀斧所伤，并可内服外贴；发背，先以温水洗疮，拭干，用绵子摊膏药贴之，以温水下一丸；久远瘰疬，摊贴，温水下一丸；诸瘘疮，盐汤洗贴，酒下一丸；打扑损伤，外贴，橘皮汤下一丸；腰膝疼痛，外贴，盐汤下一丸；妇人血气，木通甘草汤下一丸；赤白带下，酒下一丸；吐血，桑白皮汤下一丸；风赤眼，贴太阳穴，栀子汤下一丸；咳嗽咽喉肿，绵裹一粒，含化；一切风劳病，柴胡汤下一

丸；一切疮疖并肿痛疮，及诸般疥疮，别炼入油少许，打膏令匀涂之；诸疾度其情而用之。

【主治】八发痈疽，一切恶疮，不问远年近日，已未成脓，蛇虎蝎犬、汤火刀斧所伤，发背，久远瘰疬，诸瘘疮，诸般疥疮，腰膝疼痛，妇人血气，赤白带下，吐血，风赤眼，咳嗽咽喉肿，一切风劳病。

65962 神仙六甲飞伏雄黄丹

【方源】《鸡峰》卷二十九。

【组成】上等雄黄九两

【用法】上为根细末，人于砂盒子内填实，上作一坑子，入生蜜四两，于蜜上放如莲于大六块防风，盖子合定，用盐泥七斤入纸同和熟软，固济盒子，阴干；于平地上作一地炉，深三尺二寸，阔三尺，内坐药盒子，再用细灰一斗盖之硬炭二十斤，分四次烧之，须及一伏时火尽为度；候冷打开盒，其蜜或作数重，或重上须有雄黄，故曰飞伏也；其丹深紫为上，青亦妙，为极细末，其香如鸡黄（无雄黄之气也），酒糊为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心温酒送下。

【功用】杀诸虫毒，去精邪，久服令人长寿。

【主治】真阳不足，五脏气虚，肠风恶痢，百节之内大风积聚，妇人产后一切危证。

65963 神仙服蒺藜子延年方

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】蒺藜子三斗

【用法】上不限州土，不问黑白，但取坚实者，舂去刺，净簸采拣，蒸一炊久，晒干，捣为细散。每服三钱，食后以酒或清水调下，服后以三五匙饭压之，每日二次。

【主治】一切风气，野鸡痔恶疮癣，男子阴汗疝气，妇人发乳带下。

【加减】如觉冷，取附子五两（炮裂，去皮脐），捣为散，与蒺藜末相和令匀服之。

65964 神仙养命驻颜草还丹

【方源】《医方类聚》卷二〇四引《修真秘诀》。

【组成】川乌头一斤（净洗七遍，去皮脐） 枸杞根一斤（冬月取，净洗，锉） 何首乌一斤（净洗） 威灵仙一斤（净洗，并控干） 黑豆一斗

【用法】取甑一只，先入黑豆之半铺底，次纳四药，而后将豆之另一半盖于药上；将药甑谨密盖覆，慢火蒸一伏时，取药细切，其豆不用，焙干为末，以无灰酒糊为丸，如梧桐子大。每服三十丸，空腹、午、晚以温酒、盐汤任下。本方应于岁除日躬亲修合。

【功用】补精华，益骨髓，黑髭鬓，养神延寿，令邪气不侵凌，筋力不衰老、血脉通畅、神色不变。二十岁服之，一生容颜如故；中年服之，百年如故，五脏常安，四肢无疾，温黄寒热不侵。

【宜忌】忌犬肉，一生不可吃。

65965 神效大红朱砂千捶膏

【方源】《经验方》卷上。

【组成】白嫩松香八两 铜绿二钱 土木鳖十个（去壳） 杏仁二钱（去皮） 巴豆肉十粒 没药四钱 蓖麻仁一两四钱（去壳） 乳香四钱 漂朱砂一两 铅粉一两 樟冰一两

【用法】先将松香、巴豆肉、蓖麻仁、杏仁四味捣烂如泥，再入乳香、没药、铅粉、铜绿、木鳖五味捣匀，再入樟冰、朱砂二味，捣成膏，愈捣愈红，愈粘愈妙。

【功用】令疮疡未成即消，已成即溃，已溃即拔毒去腐。

【主治】疮疡疔毒，臁疮瘰疬，蟮拱头。

65966 神效四时加减养肺汤

【方源】《鸡峰》卷十一。

【组成】紫菀 五味子 干姜 款冬花 半夏 人参 糯米 杜仲 白术 桂各一两 柴胡 茯苓 甘草 陈皮 丁香 细辛 射干 山药 独活 防风 钟乳各半两

【用法】上为粗末。每服二钱，水一大盏，加生姜三片，大枣一个，同煎至五分，去滓稍热服，不拘时候。

【主治】肺气不足，病苦气逆，胸腹满，咳逆上气抢喉，喉中闭塞，咳嗽短气，自惊，或笑，

或歌,或怒无常,或干呕,言语过多,触风邪便发咳嗽,四时往来不愈。

【加减】夏、秋,柴胡、独活、射干、细辛减半;久嗽虚寒人,加蜀椒一分。

65967 **神仙令诵书气力不衰方**

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】松脂四斤(桑柴灰炼二十遍止) 白蜡一斤 羊脂二斤 白蜜二斤 饧糖四斤

【用法】上入于铜器中,以慢火煎,可一炊时为度,盛于不津器中。每服一鸡子大,温酒调下,每日三次。

【功用】令诵书气力不衰。

65968 **神仙服槐子延年不老方**

【方源】《圣惠》卷九十四。

【组成】槐子(十月上巳日采)

【用法】上以新瓷器盛之,以盒合盖其上,密泥勿令走气,二七日开,去皮。从月初日服一粒,以水送下,日加一粒,直至月中,每日却减一粒为度,终日复始。

【功用】令人可夜读细书,延年益气力。

65969 **神仙截伤寒四季加减百解散**

《局方》卷二(续添诸局经验秘方)。为原书同卷"神仙百解散"之异名。见该条。

冠

65970 **冠心灵**

【方源】《古今名方》引北京冠心病防治组方。

【组成】红花 川芎 栝楼 细辛 荜茇

【主治】冠心病心绞痛。

65971 **冠军丸**

《千金翼》卷十。为原书同卷"务成子萤火丸"之异名。见该条。

65972 **冠心Ⅰ号**

【方源】《古今名方》引北京冠心病防治组方。

【组成】丹参30克 赤芍 川芎 红花 降香各15克

【功用】行气活血,祛瘀通络。

【主治】冠心病、胸闷不适,或有胸前疼痛,心悸,气憋等。

【现代研究】①抑制血小板聚集作用 《心脏血管疾病》(1974;3:259):实验结果表明,冠心病病人在服药后二至三个月ADP诱导血小板的聚集滴度较服药前明显下降;给一组家兔静脉注射冠心Ⅰ号后30分钟、60分钟和90分钟,ADP诱导血小板的60秒的聚集和最大的聚集程度较给药前均有减低,而另一组给生理盐水后,ADP诱导的血小板聚集程度较给水前有所增加,两组有非常显著的差异。②扩张血管、解除平滑肌痉挛及增加小鼠心肌营养性血流量的作用 《中西医结合杂志》(1982;3:176):先给小白鼠冠心Ⅰ号注射液,后滴肾上腺素的7/10动物肠系膜微动脉血流未停止,3/10微动脉未收缩;冠心Ⅰ号与肾上腺素同用,可推迟血流停止时间,并使恢复时间缩短;先给肾上腺素,后滴冠心Ⅰ号对血流变化影响不显。实验观察表明冠心Ⅰ号对肾上腺素引起的小白鼠肠系膜微循环障碍有预防及对抗作用。

65973 **冠心苏合丸**

【方源】《中药制剂手册》引上海中药制药一厂方。

【组成】檀香二十一两 青木香二十一两 乳香(炙)十两零五钱 朱砂十两零五钱 冰片十两零五钱 苏合香十两零五钱

【用法】上除苏合香外,共为极细末,炼蜜为丸,每丸重五分,蜡皮封固。每次1丸,一日三次,口含服或咀嚼后咽服;也可于临睡前或发病时服用。

【功效】芳香开窍,理气止痛。

【主治】冠状动脉病变引起的心绞痛,心肌梗塞,胸闷等症。

【宜忌】《中国药典》:孕妇禁用。

【临证举例】①心绞痛 《新医药学杂志》(1975;2:28):应用本方治疗心绞痛118例,其中轻度75例,中度33例,重度10例。经治疗后,显效40例,好转70例,无效8例,总有

效率为93.2％。其中对重度心绞痛亦有不同程度的疗效。本组心电图资料完整者86例，疗前心电图不正常者74例，疗后显效2例，好转8例，显效率为13.5％。②银屑病 《中成药研究》(1982;2：26)：应用本方治疗78例寻常型银屑病，其中45例单独采用本方治疗，33例采用冠心苏合丸加活血方进行治疗。结果单用冠心苏合丸其有效率为75％，显效率为37.8％；冠心苏合丸加活血方则疗效有所提高，其有效率为87.9％，显效率为45.5％。随访16例，复发率为3/16。③胃痛 《浙江中医杂志》(1983;9：396)：用本方治疗185例胃痛，其中男72例，女113例。一般每次1粒，于饭前服用，一日三次，药后十分钟后疼痛缓解。结果显效(服药一次疼痛缓解，一天后疼痛消失)者147例；有效(服药一天后疼痛减轻、三天后痛止者)27例；无效(服一次后只能缓解一时，一天反复多次)者11例，此11例中7例伴有胆结石，1例嵌顿性疝，3例胃癌。

65974 冠心通络丸

【方源】《古今名方》引谭曰强经验方。

【组成】丹参20克　旋覆花　杏仁　茯苓　茜草　干地龙　薤白　法半夏　山楂炭　五灵脂各10克　生蒲黄15克　陈皮　建菖蒲　远志肉各5克　琥珀末　甘草各3克

【用法】将丹参、蒲黄、菖蒲、远志、茯苓研细末，过筛，余药水煎二次，去滓过滤浓缩混合，制小丸或制片。每次10丸，每日3次。

【功用】活血通络，理气宽胸，宣痹止痛，定悸安神。

【主治】冠状动脉硬化，心肌供血不足，胸闷气短，心悸心痛等。

【宜忌】孕妇忌用。

扁

65975 扁豆汤

【方源】《外台》卷六引《广济方》。

【组成】扁豆叶一升　香薷叶一升　木瓜一枚　干姜一两

【用法】上四味，以水六升，煮取二升五合，绞去滓，分三次温服，服别相去如人行六七里。

【主治】霍乱吐痢。

65976 扁豆汤

【方源】《圣济总录》卷一一七。

【组成】扁豆(炒)　蒺藜子(炒)各二两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，水一盏半，煎至一盏，去滓服，每日三次，不拘时候。

【主治】心脾肠热，口舌干燥生疮。

65977 扁豆散

【方源】方出《千金》卷二十，名见《普济方》卷二〇一。

【组成】扁豆　香薷各一升

【用法】上以水六升，煮取二升，分服。单用一味亦得。

【主治】霍乱。

65978 扁豆散

【方源】《叶氏女科证治》卷二。

【组成】白扁豆一两(生用)

【用法】上为细末。每服二三钱　新汲水调下；口噤者，撬开灌之。

【功用】解毒行血。

【主治】毒药伤胎，败血冲心，闷乱喘汗而死者。

65979 扁豆散

【方源】《嵩崖尊生》卷八。

【组成】扁豆　生姜各一钱　枇杷叶　人参　白术各五分　白茅根七分半　槟榔二分　贝母六分

【用法】生地汁、藕节汁、好墨汁调服。

【主治】咯血初得，不嗽而咯出血。

65980 扁豆粥

【方源】《圣济总录》卷一九〇。

【组成】扁豆茎(切，焙)一升　人参二两

【用法】上二味，以水三升，先煮扁豆茎令熟，下人参，煎至二升，去滓取汁，煮粟米一合为粥，与乳母食，临乳儿时，先捋去少许冷乳汁，然后乳儿，母常食此粥佳。

【主治】小儿霍乱。

65981　**扁金丹**

【方源】《幼幼新书》卷十一引《陈防御方》。

【组成】白花蛇肉(制焙)　防风　蜈蚣(全赤者)　乳香各半两　全蝎　朱砂　天南星(烧)　大草乌(烧)各一两半　麝香一钱　牛黄半钱

【用法】上为末,炊饼为丸,如梧桐子大,捏扁。每服三饼,荆芥汤化如稀糊,抹口中渐咽下,候一时更进。

【主治】胎风诸痫,手足瘛疭,目睛上视,颈项紧急强直,或摇头弄舌,牙关紧急,口吐痰沫,反拗多啼,精神不宁,睡卧多惊,吐利生风,昏塞如醉。

65982　**扁柏丸**

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】生侧柏叶一斤(用白矾四两,入铜锅内,水五六碗,煎干为度,晒干,炒焦枯)　青州柿饼十个(烧灰)　旧陈棕(烧存性)二两　血余炭一两　槐花四两(炒焦)

【用法】上为末,炼蜜为丸。每服三钱,空心白酒送下,每日三次。以止为度。

【主治】痔漏、肠风、脏毒等下血,及吐血、血崩等症。

65983　**扁柏散**

【方源】《普济方》卷一八九。

【组成】沿街草　栀子叶　地竹　扁柏各等分

【用法】先将蒜、姜,水研一浅钟饮之,令睡,随后将四件,用水二碗,煎至一浅碗服。

【主治】男子衄血。

65984　**扁银丸**

【方源】《本事》卷十。

【组成】青黛三大钱　水银一皂角子大(同黑铅炒,结成沙子)　寒食面　黄明胶(炒令焦,为末)各二钱　轻粉(炒)五钱　雄黄(水飞)　粉霜　朱砂各一钱(水飞)　巴豆二十一个(去皮膜油)　脑　麝各少许

【用法】上为细末,滴水为丸,如麻子大,捏令扁,晒干,瓷合盛。一岁一丸,随意加减,煎皂子汤送下,不得化破。

【主治】小儿急慢惊风积痼。

【备考】本方方名,《医学纲目》引作“褊银丸”。

65985　**扁鹊油剂**

【方源】《普济方》卷四〇三。

【组成】生甘草末

【用法】煎汤,入清油,用桃柳枝搅如蜜,量大小增减与儿服。微利为度。

【功用】预解胎毒。

【宜忌】如痘疹已出见红点者,不可服。

65986　**扁鹊丁香散**

【方源】《医学心悟》卷二。

【组成】丁香五个　柿蒂五个　甘草(炙)五分　干姜一钱

【用法】上为末。沸汤点服,与附子理中汤同服。

【主治】呃逆。三阴中寒,胃气欲绝而呃者,其证厥冷恶寒,下利清谷。

65987　**扁鹊三豆饮**

【方源】《妇产科学》。

【组成】赤豆一两　黑大豆一两　绿豆五钱　金银花五钱　生甘草一钱

【主治】先兆子痫。

65988　**扁鹊玉壶丸**

《普济方》卷二二六。为《圣惠》卷九十八“通灵玉粉”之异名。见该条。

65989　**扁鹊玉壶丸**

【方源】《古方选注》卷中。

【组成】硫黄八两

【用法】凡硫黄八两,配真麻油八两,将硫黄打碎,入冷油内炖炉上,炭火宜微勿烈,以桑条徐调,候硫溶尽即倾入大水缸内,急撩去上面油水,其色如金,取缸底净硫秤见若干两,仍配香麻油若干两,照前火候再溶、再倾,连前共三转;第四转用真棉花核油,配硫若干两,照前火候再溶,再倾入大水内,急撩去上面油水,其色如绛;第五转,用肥皂四两,水中

同煮六时；第六转用皂荚四两，水中同煮六时，拔净制硫之油，搀去其水，其色如硫火之紫；第七转用炉中炭灰，淋碱水制六时；第八转用水豆腐制六时，拔净皂碱之性；第九转用田字草捣汁（田字草出水稻田中，其叶如田字，八九月采），和水制六时；临用研如飞面，凡净硫一两，配炒糯米粉二两，或水法或湿捣为丸。每服以硫三分为准，渐加至一钱，温开水送下。

【功用】《中药成方配本》：补火扶阳。

【主治】阴寒恶疾，命门火衰，阳气暴绝，寒水膨胀。

65990 扁鹊玉壶丹

《中藏经》卷下。为《圣惠》卷九十八“通灵玉粉”之异名。见该条。

65991 扁鹊四圣散

【方源】《痘学真传》卷七。

【组成】紫草　白芍药　黄耆　木通各等分

【主治】痘在七八朝盛浆未足，火毒未解之际。

【方论选录】紫草凉血解毒，白芍实腠以养血，黄耆补气以助浆，恐气血滞而不行，再用木通流走关节，令心家之火泄于小肠。

65992 扁鹊曾青丸

【方源】《古今录验》引殷仲堪方（见《外台》卷十二）。

【异名】曾青丸（《外台》卷十二引《古今录验》）。

【组成】曾青二分　寒水石三分　朴消二分　茯苓三分　大黄三分　附子三分（炮）　巴豆二分

【用法】上各异捣，下筛，巴豆、消相合，捣六千杵，次纳附子捣相得，次纳茯苓捣相得，次纳大黄捣相得，次纳曾青捣相得，次纳寒水石捣相得，次纳蜜和捣千杵。大人服大豆大二丸；小儿五岁以下如麻子大一丸；二、三岁儿如黍米大一丸，如服药以薄粉粥清下。当覆卧令汗出。吐下气发作服二丸，霍乱服三丸，泄痢不止服一丸可至二丸。

【主治】久寒积聚，留饮宿食。

【宜忌】忌猪肉、冷水、芦笋、大酢。

65993 扁鹊陷冰丸

【方源】《肘后方》卷八。

【组成】雄黄　真丹砂（别研）　矾石（熬）各一两（将生矾石三两半烧之）　鬼臼一两半　蜈蚣一枚（赤足者，小炙）　斑蝥（去翅足）　龙胆　附子（炮）各七枚　藜芦七分（炙）　杏仁四十枚（去尖、皮，熬）

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如小豆大。腹内胀病，中恶邪气，飞尸游走皆服二丸；若积聚坚结，每服四丸，取痢，泄下虫蛇五色；若蛊注病、中恶邪、飞尸游走，皆服二三丸，以二丸摩痛上；若蛇、蜂百病，中溪毒、射工，其服者，视强弱大小，及病轻重加减服之。

【主治】腹内胀病，中恶邪气，飞尸游走，积聚坚结，并蛊注、中恶，蛇蜂百毒，中溪毒、射工。

弭

65994 弭痛丸

【方源】《圣济总录》卷五十六。

【组成】五灵脂　木香　当归（切，焙）　高良姜（炮）　蓬莪术（炮）各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服二十至三十丸，空心煎木香汤送下。

【主治】九种心痛。

既

65995 既济丸

【方源】《魏氏家藏方》卷六。

【组成】鹿茸（燎去毛，酥炙）　沉香（不见火）　白术（炒）　五味子（去枝）　山药　补骨脂（炒）　远志　白茯苓（去皮）　续断　车前子（酒浸）　牛膝（酒浸，去苗）　覆盆子　舶上茴香（炒）　熟干地黄（洗）各二两　白龙骨（黑豆蒸，去豆，火煅，水飞）　鹿角胶（蚌粉炒成珠）　巴戟（去心）各三两　大附子（炮，

去皮脐）　菟丝子(淘洗，酒浸，焙，再炒)　仙灵脾(去刺，酒浸，切，焙，微炒)　肉苁蓉(酒浸，去皮土)　杜仲(去皮，姜制，炒去丝)　莲子肉(炒)　桑螵蛸(酒浸，炙黄)　山茱萸(去核)各四两　麝香半两(别研)

【用法】上为细末，糯米饭为丸，如梧桐子大。每服五十丸，食前温酒、盐汤送下。

【主治】心肾气虚，客热上燥，神水下泄，阴阳不和，清浊相干，下元虚惫，腰脚疼重，心神不宁，水脏滑泄，饮食不进。

65996　既济丸

【方源】《魏氏家藏方》卷六。

【组成】磁石(火煅，醋淬七次)　破故纸(炒)各二两　鹿茸(燎去毛，酥炙)　当归(酒浸，去芦)　附子(炮，去皮脐)　莲子肉(去心)各一两　沉香三分(不见火)　续断一两半(酒浸)　乳香(别研)　酸枣仁(去壳，炒，别研)　木香(湿纸裹，煨)　石菖蒲(去毛，酒浸)　朱砂(别研)　柏子仁(别研)各半两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心食前温酒、盐汤、米饮任下。

【主治】心肾气虚，客热上燥，神水下泄，阴阳不和，清浊相干，下元虚惫，腰脚疼重，心神不宁，水脏滑泄，饮食不进。

65997　既济丸

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】大附子(炮)一钱　人参一钱　真麝香一分

【用法】上为末，饭为丸，如梧桐子大，麝香为衣。每服七丸，灯心汤送下。

【主治】关格，吐利不得，脉沉，手足微厥。

【方论选录】《法律》：脉沉细，手足厥冷，全是肾气不升，关门不开之候，参、附固在所取，但偏主于阳，无阴以协之，亦何能既济耶？且以麝香为衣，走散药气，无繇下达，即使药下关开，小便暂行，其格必愈甚矣！

65998　既济丸

【方源】《医统》卷三十五。

【组成】黄连(切如豆大)四两　生姜二两(切成粗丝，同黄连炒至姜燥)

【用法】上为细末，醋打硬糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，白汤送下。

【主治】一切泄泻不止。

65999　既济丸

【方源】《古今医鉴》卷八。

【组成】菟丝子(酒制)　益智仁(炒)　白茯苓　韭子(炒)　肉苁蓉(酒洗)　当归　熟地黄各五钱　黄柏　知母(各盐酒、炒)　牡蛎(煅)　石枣(酒蒸，去核)各三钱　五味子一钱

【用法】上为末，面糊为丸。每服百丸，空心盐汤送下。

【主治】小便不禁。

66000　既济丸

【方源】《采艾编翼》卷二。

【组成】麦冬(去心)一两半(另捣膏)　五味子五钱　菟丝子(淘去沙，酒煮一日，捣烂，捏作饼，晒干，研末)八钱　淮地黄(酒浸透，九蒸九晒，另捣膏)一两　远志七钱　山药(去皮，盐水炒)八钱　茯神(去木)一两　甘草(水煮，去心)七钱　枣仁

【用法】上除麦冬、地黄、枣仁另捣膏外，其余药物共为细末，再入前膏捣匀，以荷叶蒸饭为丸，如梧桐子大。每早服一钱五分，白滚水送下，临卧再服一钱；服五六日后，歇一二日再服。

【主治】内伤。

【备考】方中枣仁用量原缺。

66001　既济丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】杜仲炭二十两　熟地二十两　小茴香(炒)二十两　天冬二十两　盐知母二十两　茯苓二十两　菊花二十两　九菖蒲二十两　菟丝子二十两　麦冬二十两　当归二十两　栀子(炒)二十两　生地二十两　远志(炙)二十两　苁蓉(炙)二十两　人参(去芦)二十两　巴戟肉(炙)二十两　龙骨(煅)二十两　五味子(炙)二十两　山萸肉(炙)二十两

山药三十两　杞子二十两　牛膝三十两　橘皮十两　盐黄柏四十两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，每丸重三钱。每服一丸，温开水送下，一日二次。

【功用】滋补肾水，益气降火。

【主治】肾亏气虚，腰痛耳鸣，虚火上升，遗精盗汗。

66002 既济丸

【方源】《全国中药成药处方集》(武汉方)。

【组成】熟地　生地　山萸肉　天冬　麦冬　白芍各四两(炒)　五味子　当归身　黄柏各三两(盐水炒)　党参四两　苁蓉　枸杞子　茯苓　茯神　丹皮　泽泻　枣仁　远志各三两

【用法】上药干燥，混合碾细，按净粉量加炼蜜45～50%迭成小丸，每钱不得少于二十丸。每服三钱，温开水送下。

【主治】口燥舌干，骨蒸发热，五心烦躁，自汗盗汗，夜梦遗精等症。

66003 既济丹

【方源】《传信适用方》卷二。

【组成】朱砂一两　附子四个(每个重六钱以上。去皮脐，生，各切下顶，剜空心，中安朱砂在内，以前顶子盖定，用线扎)　木瓜(大者)二个(去皮瓤，切开顶，入朱砂附子四个在内，以木瓜原顶子盖之，线扎定，烂蒸讫，取出附子，切作片，焙干为末。辰砂别研细。木瓜研如膏)　鹿茸二两(作片，酥炙)　当归(洗，焙)一两　远志二两(去心，焙干)　菟丝子(水淘，酒浸，烂研成膏，焙干为末)一两半　柏子仁(别研)一两　沉香一两　杜仲(去粗皮)一两半(酒浸一宿)　巴戟(去心)一两　肉苁蓉(切细，酒浸一宿，焙)一两　黄耆(蜜炙)一两　五味子(去皮)一两半　牛膝(去苗，锉，酒浸，干)一两　石斛(去苗，酒浸一宿，干)一两

【用法】上为细末，用茯神、干山药各一两，为细末，酒煮作糊，同木瓜膏及诸药末为丸，如梧桐子大。每服五十丸，空心米饮送下；温酒或菖蒲盐汤送下亦可。

【功用】令水火既济，久服秘精益神，永无膏淋、白浊、遗精之患。

【主治】诸虚不足，膀胱肾经瘤败，阴阳不交，致生诸病。

66004 既济丹

【方源】《普济方》卷二一七引《卫生家宝》。

【组成】天门冬(去心)　麦门冬(去心，焙干)　泽泻　桑螵蛸(蜜炙)　海螵蛸(蜜炙)　牡蛎(煅)　龙骨　黄连(去须)　远志(去心)　鸡膍胵(炒)各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，朱砂为衣。每服三十丸，空心、食前灯心或枣汤送下，一日三次。

【主治】水火不济，肾虚不能摄精，心有所感，白浊遗精，虚败不禁，腰脚无力，日渐羸弱。

66005 既济丹

【方源】《百一》卷四。

【组成】嫩鹿茸三两(酥炙)　牛膝(酒浸一宿)　肉苁蓉(酒浸一宿)　熟干地黄(酒浸，蒸)　当归(去芦，酒浸一宿)　柏子仁(别研入)　枸杞子(酒浸一宿)　酸枣仁(微炒，别研)　沉香(别研)　山药(炒)　远志(用甘草半两煮，去甘草不用)　茯神各一两半　附子二两半(炮，去皮脐)

【用法】上焙干，为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心、食前温酒、盐汤送下。

【功用】升降水火，育神益血，久服延年，令人不老。

66006 既济丹

【方源】《朱氏集验方》卷八。

【组成】磁石(好者，煅，醋淬，研碎，水飞)　辰砂(蜜者尤妙)　酸枣仁　入参各二两　乳香半两

【用法】上为细末，神曲糊为丸，如梧桐子大。每服三五十丸，灯心、枣汤送下，不拘时候。

【功用】升降心肾。

66007 **既济丹**

【方源】《朱氏集验方》卷八。

【组成】灵砂　阳起石(煅)　钟乳粉　磁石(煅)　鹿茸　茯神各一两　沉香半两　朱砂一钱(为衣)

【用法】上为细末，面糊为丸，如绿豆大。每服二十丸，空心，枣汤送下。

【主治】心肾不交。

66008 **既济丹**

【方源】《普济方》卷一九七引《经效济世方》。

【组成】附子一两(炮，去皮，炒)　朱砂半两

【用法】上为末，以半夏面末作糊为丸，如梧桐子大。疟发日，面东取气一口，以井花水吞下一丸，默想药至丹田。

【主治】疟疾。

66009 **既济丹**

【方源】《解围元薮》卷四。

【组成】白砒二钱(绿豆腐煮半日)　人中白六两(醋煅七次)　明雄黄五钱　朱砂四钱

【用法】上为末。每服半分，空心以大黄、黑牵牛各五分煎汤送下。七日后追出异虫，从大便出，用荆芥汤洗澡，则虫皆坠缸底；如身上觉痒，用白及煎汤服药，经十四日，则面黑肿皆退。

【主治】三十六种危恶大疯。

66010 **既济丹**

【方源】《摄生众妙方》卷九。

【组成】干姜　黄连各等分

【用法】上为末。搽患处。流涎即愈。

【主治】口疮。

66011 **既济丹**

【方源】《孙氏医案》卷一。

【组成】鹿角霜　当归　白茯苓各二两　石菖蒲　远志各一两五钱　龙骨　白石脂各一两　益智仁五钱

【用法】上为末，干山药打糊为丸，如梧桐子大。每服七八十丸，空心白汤送下。

【主治】妇女久患白带，变为白崩。

66012 **既济汤**

【方源】《易简方》。

【组成】半夏半两　麦门冬一两　甘草　人参各四钱　竹叶五片　熟附

【用法】每服四钱，水二盏，加生姜五片，煎至一盏半，去滓，入粳米百粒再煎，米熟，去米温服。

【主治】①《易简方》：下利发热者。②《医统》：霍乱后虚烦不得眠。

【备考】方中熟附用量原缺。

66013 **既济汤**

【方源】《玉案》卷四。

【组成】人参一钱　甘草三分　竹茹　麦门冬　半夏　粳米各二钱

【用法】加生姜五片，水煎服。

【主治】霍乱，虚烦不得眠。

66014 **既济汤**

《证治宝鉴》卷二。为《直指附遗》卷十五“六物汤”之异名。见该条。

66015 **既济汤**

【方源】《救偏琐言》卷十。

【组成】荆芥穗　麻黄(去根，蜜炒将黑，地上出火气)　干葛根　石膏　川黄连　大黄　蝉蜕　牛蒡

【用法】加生姜二片、胡荽一钱，以阴阳水煎服。

【主治】小儿出痘，火毒太盛，时值隆冬而闭塞者。

66016 **既济汤**

【方源】《张氏医通》卷十六。

【组成】竹叶石膏汤加熟附子三五分

【主治】上热下寒。

66017 **既济汤**

【方源】《医醇賸义》卷四。

【组成】当归二钱　肉桂五分　沉香五分　广皮一钱　泽泻一钱五分　牛膝二钱　瞿麦二钱　车前二钱　苡仁四钱　葵花子四钱

（炒，研，同煎）

【功用】理气行水。

【主治】寒气上逆，水气窒塞不通，以致膀胱胀，少腹满而小便癃。

66018 **既济汤**

【方源】《衷中参西》上册。

【组成】大熟地一两 萸肉一两（去净核） 生山药六钱 生龙骨六钱（捣细） 生牡蛎六钱（捣细） 茯苓三钱 生杭芍三钱 乌附子一钱

【主治】大病后阴阳不相维系，阳欲上脱，或喘逆，或自汗，或目睛上窜，或心中摇摇如悬旌；阴欲下脱，或失精，或小便不禁，或大便滑泻。一切阴阳两虚，上热下凉之证。

【临证举例】①大便滑泻 一人，年二十余，禀资素羸弱，又耽烟色，于秋初患疟，两旬始愈。一日大便滑泻数次，头面汗出如洗，精神颓愦，昏昏似睡。其脉上盛下虚，两寸摇摇，两尺欲无，数至七至。延医二人皆不疏方。愚后至，为拟此汤（既济汤），一剂而醒，又服两剂遂复初。②心疼 友人张某某，曾治一少年，素患心疼，发时昼夜号呼。医者屡投以消通之药，致大便滑泻，虚气连连下泄，汗出如洗，目睛上泛，心神惊悸，周身瞤动，须人手按，而心疼如故。延医数人皆不敢疏方。张某某投以此汤（既济汤），将方中萸肉倍作二两，连服两剂，诸病皆愈，心疼竟从此除根。

66019 **既济门冬散**

【方源】《活人心统》卷下。

【组成】麦门冬（去心）七分 知母（炒）七分 石韦六分 甘草梢 泽泻五分 冬葵子六分 滑石 五味子

【用法】水一钟半，入灯心一撮煎服，滓再煎。

【主治】五淋。

【备考】按：方中沙滑石、五味子、甘草梢用量原缺。

66020 **既济玉关丸**

【方源】《朱氏集验方》卷八。

【组成】真辰砂一两 滴乳香半两 法酒一升（以上三味用银器慢火煮令极干，刮下为末，却入附子罐内） 大附子四只（生，去皮脐。作罐子，留顶盖，却将煮了辰砂等匀在附子罐内，附子肉亦入在内，有余粉留在木瓜内不妨，以原顶盖定，线扎） 宣州花木瓜两只（大者，中分作两片，去皮瓤，却将扎定附子四只，分入木瓜内，以竹簪定，用大麦坐木瓜蒸之，候两时辰，木瓜香熟，却取出附子切作片，焙干。其辰砂别研令细，木瓜别研为膏） 补骨脂（去毛，炒） 熟地黄（酒浸） 菟丝子 杜仲（姜炒）各一两半 鹿茸 川当归 远志 柏子仁 沉香 巴戟 肉苁蓉 牛膝 北五味 石斛 绵耆各一两

【用法】上为细末，令匀，以山药、茯苓各一两为细末打糊（或以末入木瓜），与木瓜膏同和为丸。每服五七十丸至一百丸，温酒或盐汤送下。

【功用】壮真元，益心气，既济水火。

【主治】忧思过度，心肾不足，水火不能交养，神志不宁。

66021 **既济补真丹**

【方源】《魏氏家藏方》卷六。

【组成】大附子二只（生，去皮脐，每只作四片） 阳起石（酒煮三日，研如粉）一分 伏火灵砂一分（研细如粉） 天雄一对（每只劈作四片，生，去皮，同附子入青盐半两，以水三升同煮，令水尽为度，切，焙干用） 磁石（连吸五七针者，火煅红，醋淬十四次，研细如粉，水飞，去赤浊水）半两（别研） 鹿茸（燎去毛，酥炙） 麋茸（燎去毛，酥炙） 舶上茴香（炒） 补骨脂（炒） 川当归（酒浸一宿，去芦） 牛膝（酒浸一宿，去芦）各一两 钟乳粉 荜澄茄 夜明砂 肉豆蔻（面裹煨） 枸杞子 杜仲（去皮，盐炒） 丁香各半两（不见火） 菟丝子二两（淘净，酒浸三宿，焙干）（前药共为细末） 腽肭脐（酒浸，研） 沉香（不见火） 神曲（炒）各半两（并为细末） 麝香半钱（别研）安息香一分（酒化，别研） 羊髓二两（研

烂)肉苁蓉一两(先去咸,研令极烂)　羊石一对(去筋膜,研烂)

【用法】将后八味用水二升,同于银石器内重汤熬,不住手搅成膏,和前药末为丸,如梧桐子大。每服百丸,空心食前,盐汤或温酒送下。

【功用】补诸虚不足,升肾水以制心火,降心火以暖肾水,交感阴阳,既济关元,生真精,和中焦,使上下升降,百骸安和,温暖脾胃,健壮脚膝,明目聪耳,添精补髓,益寿延年。

【主治】眼昏力弱,肤腠不密,脏腑不实,真阳虚惫,血弱气耗。

【宜忌】忌食羊肉。

66022　既济固真丹

【方源】《朱氏集验方》卷八。

【组成】北五味子　白茯苓　附子　沉香　龙骨　苁蓉(酒浸一宿,如无以鹿茸酥炙代之)各一两　益智仁　柏子仁(去壳,炒)　补骨脂(炒)　酸枣仁(去壳,炒)　金铃子(去核,炒)　红椒(去目)　当归(酒浸)　川巴戟(去心)各半两　菟丝子(酒浸,合研)一两半

【用法】上为细末,酒糊为丸,如梧桐子大,以辰砂末三钱为衣。每服五十至七十丸,空心盐、酒任下。

【功用】壮阳固气,温脾益血。

【主治】水火不济,精神恍惚,头目昏暗,阳道痿弱,阴湿多汗,遗沥失精,脾胃虚怯,心肾不宁。

66023　既济清神饮

【方源】《普济方》卷一一九。

【异名】既济清神散(《医统》卷二十一)。

【组成】桔梗　黄芩　川芎　当归　茯苓　羌活　白术　山栀子各一两　薄荷　甘草　知母各半两

【用法】上㕮咀。每服五钱,以水一盏半,煎至七分,去滓,入蜜调服。

【功用】益肾水,降心火,清上实下。

66024　既济清神散

《医统》卷二十一。为《普济方》卷一一九"既济清神饮"之异名。见该条。

66025　既济解毒丸

《宣明论》卷四。为原书同卷"栀子金花丸"之异名。见该条。

66026　既济解毒丸

《宣明论》卷九。为原书同卷"人参散"之异名。见该条。

66027　既济解毒丸

【方源】《古今医鉴》卷四。

【组成】黄连(去毛)　黄芩(去梗)　黄柏(去皮)　山栀(去壳)　知母(去毛)　连翘(去壳)　玄参(去老根)　柴胡(去毛)各等分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服百丸,灯心汤送下。

【主治】诸经客热,心肾二火炽焰。

66028　既济解毒丹

【方源】《活幼心书》卷下。

【组成】净黄连五分　黄柏(去粗皮)　黄芩(净者)　大黄各二钱半　肉桂(去粗皮)　枳壳(锉片,麸炒,清油润透一宿,焙干)　白茯苓(去粗皮)各二钱　甘草(生用)七钱

【用法】上除桂不过火,余药锉,焙,仍同桂共为末,滴水乳钵内熟杵为丸,如绿豆大,带润以水飞朱砂为衣,阴干。每服三十至五十丸,用麦门冬熟水送下,不拘时候;吐血、溺血,栀子仁煎汤送下;儿小者,薄荷汤磨化投服。

【主治】小儿中热,睡中咬牙,梦语,惊悸不宁;或吐血、溺血,口渴引饮,手足动摇。

66029　既济解毒汤

【方源】《卫生宝鉴》卷二十三。

【组成】大黄(酒蒸)　黄连(酒制,炒)　黄芩(酒制,炒)　甘草(炙)　桔梗各二钱　柴胡　升麻　连翘　当归身各一钱

【用法】上㕮咀。以水二盏,煎至一盏,去滓,食后温服。

【主治】上热头目赤肿而痛,胸膈烦闷不得安卧,身半以下皆寒,足胻尤甚,大便微秘。

【宜忌】忌酒、湿面、大料物及生冷硬物。

【加减】大便利，去大黄。

【方论选录】以黄芩、黄连苦寒，酒制炒亦为因用，以泻其上热，以为君；桔梗、甘草辛甘温上升，佐诸苦药以治其热；柴胡、升麻苦平，味之薄者，阳中之阳，散发上热以为臣；连翘苦辛平，以散结消肿，当归辛温和血止痛，酒煨大黄苦寒，引苦性上行至巅，驱热而下以为使。

【临证举例】上热下寒　中书右丞姚公茂，六旬有七，宿有时毒，至元戊辰春，因酒病发，头面赤肿而痛，耳前后肿尤甚，胸中烦闷，咽嗌不利，身半以下皆寒，足胫尤甚。由是以床相接作炕，身半以上卧于床，身半以下卧于炕，饮食减少，精神困倦而体弱。诊得脉浮数，按之弦细，上热下寒明矣。遂处一方，名曰既济解毒汤。投剂之后，肿消痛减，大便利。再服减大黄。慎言语，节饮食，不旬日良愈。

66030　既济解毒汤

《医方类聚》卷五十六引《修月鲁般经》。为方出《肘后》卷二名见《外台》卷一"黄连解毒汤"之异名。见该条。

66031　既济豁痰汤

【方源】《杂症会心录》卷上。

【组成】生地三钱　白芍一钱（炒）　茯神三钱　钩藤三钱　丹皮一钱五分　当归二钱　柏子仁二钱　枣仁二钱（炒，研）　龟版四钱

【用法】水二钟，入竹沥十匙，煎服。

【主治】头痛厥逆，痰聚胞络，目定口噤，手足冷不过肘膝，属阴虚有火者。

【方论选录】《证因方论集要》：肾阴不足而阴火冲逆者，以生地甘寒泻肾火，丹皮辛凉泻胆火；归、芍益血，即以熄内风；茯神、柏子、枣仁入心包络，钩藤、竹沥可以清热缓急。病属于火，火炽风生，以此主之。

费

66032　费氏代参丸

【方源】《丁甘仁家传珍方选》。

【组成】全当归　川牛膝　白术　党参　秦艽　青陈皮各八两　云苓　白芍　丹参各一斤　金毛脊十两八钱　川断一两六钱　独活　砂仁各一两二钱。

【用法】上为细末，水为丸。

【主治】筋骨疼痛，中风。

屋

66033　屋土散

【方源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】瓦上陈土　炒黄柏　生甘草

【用法】上各为细末。用蜜与醋同调，外涂患处。

【主治】胡漏丹。乃肝经虚火外发，从阴上起红肿。

【备考】《外科真诠》本方用量：瓦上陈土三钱，炒黄柏三钱，生甘草二钱，并有上片三分。

66034　屋龙丸

【方源】《圣济总录》卷九十七。

【组成】屋龙尾　伏龙肝　墨（烧令烟断）　当归（切，焙）各一两　皂荚子仁（炒）半两

【用法】上为末，面糊为丸，如梧桐子大，阴干。每服三十丸，空心、食前煎生姜艾叶汤送下。

【主治】大便下血，腹内痛不可忍。

退

66035　退云散

【方源】《幼幼新书》卷二十五引《谭氏殊圣方》。

【组成】草决明　土瓜根　大黄（炮）　玄参各半两　甘草（炙）　宣连　矜矜石（即井泉石是，研）各一分

【用法】上为细散。每服一钱，水一盏，同煎至七分，五度与吃。

【主治】小儿疳眼，畏光，啼不住。

66036　退云散

【方源】《回春》卷五。

【组成】当归　生地　白菊花　谷精草

木贼　羌活　石决明　大黄(酒炒)　蔓荆子　白芷　黄柏　连翘　龙胆草各一钱　蝉退七个

【用法】上锉一剂。水煎,食远服。

【主治】翳蒙瞳子。

66037　**退云散**

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】红珊瑚　珍珠　辰砂　硼砂各等分(俱生用)

【用法】上为极细末。每日点二次。

【主治】痘疹后目生翳。

66038　**退风汤**

【方源】《幼幼新书》卷四引《婴童宝鉴》。

【组成】猪胆　苦参　防已　黄连　甘草　白及　藁本　杉　柏　枫叶

【用法】煎汤,浴儿。

【功用】退风。

66039　**退风散**

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【组成】防风一钱　荆芥五分　薄荷七分　僵蚕(炒)五分　天麻(酒洗)一钱　白芷一钱　麻黄一钱　茯苓一钱　当归身一钱　甘草(炙)五分

【用法】上锉一剂。加生姜七片,煎服。

【主治】破伤风,不省人事,角弓反张。

66040　**退火丹**

【方源】《赤水玄珠》卷二十七。

【组成】六一散一料　雄黄(飞过)三钱　缠豆藤(烧存性)一钱

【用法】用紫草、木通、蝉蜕、地骨皮、红花、大力子、羌活、片芩、灯心煎汤,候冷调下。

【功用】解毒稀痘。

【主治】痘初出标,大热不退,或稠密成片者。

66041　**退火丹**

《景岳全书》卷六十三。为《痘疹心法》卷二十三"退火回生丹"之异名。见该条。

66042　**退火丹**

【方源】《痘疹仁端录》卷十四。

【组成】滑石(制过)九分　辰砂一钱半　人中白三钱　犀角末二分　羚角末二钱(二味并用灯心汤磨汁倾纸上,下铺稻草灰,放纸灰上,收去水,晒干,用鹅翎扫下净末听用)　胭脂胚一钱半　甘草一钱半

【用法】上为极细末。每一两加冰片三分。

【主治】痘疹血热毒重者。

66043　**退邪汤**

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】熟地一两　何首乌(生用)一两　当归五钱　鳖甲五钱　茯神五钱　山药五钱　白芥子三钱　柴胡五分　人参三钱

【用法】水煎服。一剂轻,二剂又轻,四剂全愈。

【功用】补阴散邪。

【主治】疟疾。足少阴肾经之疟,发疟之时,寒热俱盛,腰痛脊强,口渴,寒从下起,先脚冷,后由腿冷至脐,由脐冷至手而止,其颈以上则不冷。

66044　**退血散**

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】当归　赤芍药　木贼　防风　细辛　龙胆草各等分

【用法】上㕮咀,白水煎。先乘热熏眼,后温服。

【主治】目赤,色似胭脂。

66045　**退创散**

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】地马梢根　白马骨　铁马鞭　头形花根　鸡屎子　诈死子　马蹄金　山茄根　狗骨根　对节金惊根

【用法】上水煎,入酒和服。

【主治】马蜞,满身疮,人转动不便。

66046　**退阴丸**

【方源】《圣济总录》卷二十七。

【组成】硫黄半斤(生)　太阴玄精石(煅)三两

【用法】上研为细末,水浸炊饼为丸,如梧桐子大。每服五十丸,热艾汤送下,每日三次。

【主治】伤寒伏阴气,手足厥冷,肌肤不热。

66047 **退阴汤**

《圣济总录》卷二十一。为《博济》卷一"退阴散"之异名。见该条。

66048 **退阴散**

【方源】《博济》卷一。

【异名】退阴汤(《圣济总录》卷二十一)。

【组成】川乌头(炮) 干姜各半两

【用法】上为粗散,炒令转色,放冷,再捣细末。每服一钱,水一盏,盐一捻,煎半盏,去滓,温服,连吃三服。若小小伤冷,每服一匙,入正元散,盐一捻;若阴毒伤寒咳逆,煎一服,细细热呷,立止。

【主治】阴毒伤寒,手足逆冷,脉息沉细,头痛腰重。

66049 **退赤丸**

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】生地黄 草决明 黄芩 当归 白术 木通 连翘 甘草各等分

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服四十丸,淡竹叶煎汤吞下。

【主治】目赤。

66050 **退赤汤**

【方源】《普济方》卷七十四引《千金》。

【组成】干艾叶(烧灰)二钱 宣连二钱(为末) 古铜钱十文

【用法】上入大盏内,百沸汤泡了,放冷澄定,取上清者,以水隔盏浸令冷,以所浸泡铜钱点之。一日内取愈。

【主治】眼暴赤。

66051 **退赤汤**

《眼科菁华》卷上。为《审视瑶函》卷三"退赤散"之异名。见该条。

66052 **退赤散**

【方源】《葆光道人眼科龙木集》。

【组成】生地黄 木通 甘草 栀子各等分

【用法】上为细末。每服二钱,食后用竹叶汤调下,每日三次。

【主治】肝实而血盛,血气上冲,流注于目,致目赤而不痛。

66053 **退赤散**

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】黄芩 黄连 白芷 当归 赤芍药 栀子 桑白皮 木通 桔梗 连翘

【用法】水煎,食后服。

【主治】睑生偷针,因阳明胃经之热毒上充于眼目所致者。

66054 **退赤散**

【方源】《银海精微》卷下。

【组成】大黄 黄芩 黄连 白芷 当归 赤芍药 栀子 桑白皮各等分

【用法】水煎服。

【主治】眼睑停瘀血者。

66055 **退赤散**

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】山栀子一两 当归(酒浸)五钱 大黄(煨) 甘草(炙)各二钱

【用法】上为散。每服三钱,水一盏半,煎至七分,去滓,温服。

【主治】目赤。

66056 **退赤散**

【方源】《审视瑶函》卷三。

【异名】退赤汤(《眼科菁华》卷上)。

【组成】桑白皮(蜜制) 甘草 牡丹皮(酒洗) 黄芩(酒炒) 天花粉 桔梗 赤芍药 归尾 瓜蒌仁(去壳油,为霜)各等分

【用法】上为细末。每服二钱,麦门冬去心煎汤调下。

【功用】清肺散血。

【主治】因热客于肺,肺气不清,血热妄行,不循经络,白睛上下左右,但见一片或一点红血,俨似胭脂者。

66057 **退赤散**

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】生地 9 克 木通 3 克 酒黄芩 银花 赤芍各 9 克 牡丹皮 6 克 桑皮 3 克

【功用】清心肺,平肝。

【主治】心火侵肝，眦部赤脉侵入风轮，引起青睛生翳或昏暗者。

【方论选录】方中生地、木通清心泻火，银花、酒黄芩清肺解热，赤芍、牡丹皮凉血活血以退赤，秦皮清肝明目以退翳。

66058 **退赤露**

【方源】《眼科锦囊》卷四。

【组成】黄连　人乳汁

【用法】上浸点，或煎点，或加朴消亦可。

【主治】疫眼上冲眼目，属热者。

66059 **退金丸**

【方源】《古今医鉴》卷六。

【组成】青矾

【用法】砂罐一个，装上药令八分满，外以盐泥固济，炭火煅令通红，去泥埋土中，以彻去火毒，将砂罐及矾俱为末，水打面糊为丸，如梧桐子大。每服二三十丸，肉汤送下，滚汤亦可，每日三次。

【主治】黄肿及癖疾发热。

【宜忌】忌鱼腥、面筋等发物。

66060 **退金丹**

【方源】《寿世保元》卷三。

【组成】苍术(酒炒)八两　香附八两　青皮(去瓤)三两　陈皮四两　良姜一两　厚朴(姜炒)三两　乌药四两　三棱(煨)三两　莪术(煨)一两　青矾八两(用百草霜同炒)

【用法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸，米汤送下。

【主治】黄肿，腹中有积块胀满者。

66061 **退肿汤**

【方源】《种痘新书》卷十二引张氏方。

【组成】苍术　厚朴　陈皮　香附　木香　赤茯苓皮　大腹皮　泽泻　猪苓　木通　姜皮　山楂　神曲　牛子

【主治】痘后浮肿。

66062 **退肿散**

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】大南星(圆白者)　半夏(生)各半两　赤小豆　五倍子　白芷　贝母各二钱半

【用法】上为细末。蜜醋调敷。

【主治】痈疽肿毒。

66063 **退肿膏**

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】芙蓉叶　地薄荷　耳草叶　泽兰叶　金桐叶　赤牛膝　大黄(另研末)各等分

【用法】上砍烂。敷贴伤处，中间留孔出气，用泽兰叶荡软贴住，冬月用芭蕉叶，一日一换药，用茶洗伤处。若伤处浮肿，用小青叶捣敷，后用尻池叶、地薄荷捣敷后，痛不住，用葛叶、毛藤叶、枫叶尾砍敷贴。

【功用】止痛。

【主治】头脑破伤损，或跌破，或刀斧伤，或被杖棒打破及别处伤。

66064 **退毒饮**

【方源】《直指》卷二十三。

【异名】退毒散(《赤水玄珠》卷三十)。

【组成】穿山甲半两(蘸法醋炙焦)　木猪苓三钱(法醋微炙)

【用法】上为末。每服二钱，食前老酒调下；次以法醋煮肥皂，研膏敷之。

【主治】便毒肿结。

66065 **退毒散**

【方源】《直指》卷二十二。

【组成】木鳖子(去油)　大南星　半夏(生)　赤小豆　白芷　草乌(连皮尖)各等分

【用法】上为细末。硬则法醋调敷，热焮则蜜水调敷。

【主治】痈肿。

66066 **退毒散**

《赤水玄珠》卷三十。为《直指》卷二十三“退毒饮”之异名。见该条。

66067 **退毒散**

【方源】《痘疹传心录》卷十五。

【组成】鹳鸟嘴(烧存性)　水龙骨(煅)各等分

【用法】上为末。酒调涂。立退，如溃亦消。

【主治】时毒。

66068 **退毒散**

【方源】《外科证治全书》卷三。

【组成】黄连 银花 连翘 甘草 赤芍 当归 牛膝 桔梗 黑山栀 薄荷 木通各等分

【用法】用新汲水煎，滓再煎，食远服。乳母亦宜药，戳分增减，量精神强弱服之。服本方前，先用软棉帛蘸甘草汤拭净，再用绿豆粉一两，轻粉一钱五分，漂砂一钱，冰片一分，或再加牛黄一分，研为极细末，将金汁或雪水、甘草、灯心汤调，鹅毛蘸敷上。

【主治】小儿猴子疳。从肛门或阴囊边红晕烂起，渐至皮肤，不结靥，或眼梢口旁亦红。

【宜忌】切忌洗浴。

66069 退热汤

【方源】《圣济总录》卷八十七。

【组成】柴胡（去苗） 青蒿（干者） 甘草（炙，锉） 知母（焙） 龙胆（去苗） 麦门冬（去心，焙）各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕，用童便一盏半，葱白三寸，薤白三茎，桃柳心各五枚，同浸经一宿，平旦煎至一盏，去滓，空心顿服之，至夜再服。

【主治】急劳。四肢烦疼，手足心热，憎寒，饮食不得，口干心躁。

66070 退热汤

【方源】《圣济总录》卷一五六。

【组成】人参 甘草（炙） 黄芩（去黑心）各二两 当归（切，焙） 芍药 栀子仁 防风（去叉） 柴胡（去苗）各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎取七分，去滓，食后温服。

【主治】妊娠虚烦懊热。

66071 退热汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【组成】黄耆一钱 柴胡七分 生甘草 黄连（酒制） 黄芩 芍药 地骨皮 生地黄（去血热） 苍术各五分 当归身 升麻各三分

【用法】上㕮咀，作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，食远温服。

【主治】表中虚热，或遇夜则甚。

【加减】如身体力困者，加麦门冬、五味子各五分，人参、甘草各一钱。

66072 退热汤

【方源】《眼科菁华》卷上。

【组成】黄芩 黄连 知母 黄柏 丹皮 甘草 木通 生地 白芍 当归

【主治】白睛赤丝密布。

66073 退热饮

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】五味子 黄连 黄芩 车前子 栀子 石膏 连翘 龙胆草 玄参 防风 黄柏 地骨皮 茺蔚子

【用法】水煎，食后服。

【主治】脾胃壅热，睑生风粟，如麻如米，甚如杨梅之状，摩擦瞳仁，黑睛有翳，久久渐昏，流泪不止。

【宜忌】忌动风动血之物。

66074 退热散

【方源】《准绳·疡医》卷六。

【组成】山布瓜根 景天草 泽兰叶 地薄荷 鱼桐根皮

【用法】上捣烂。冷敷伤处。

【功用】退寒热。

【主治】跌磕打伤大指中指。

66075 退热散

【方源】《审视瑶函》卷三。

【组成】赤芍药 黄连（炒） 木通 生地黄 炒栀仁 黄柏（盐水炒） 黄芩（酒炒） 当归尾 甘草梢 丹皮各等分

【用法】上为末。每服五钱，白水二钟，煎至八分，去滓热服。

【主治】赤丝虬脉。白珠有丝脉纵横，或稀密粗细不等，久而不愈。

66076 退热膏

《普济方》卷七十三引《十便良方》。为《证类本草》卷十三引《梅师方》“苦竹沥方”之异名。见该条。

66077 **退疳丸**

【方源】《圣济总录》卷一七二。

【组成】胡黄连　黄连(去须)　大黄各半钱　陈橘皮(汤浸,去白,焙)　苦楝根各一分(上五味同为末,用猪胆汁和药,却入胆内线缝定,水二碗,煮水尽,取药出)　青黛(研)　使君子(去壳)　丹砂(研)　芦荟(研)各一分　麝香(研)半钱

【用法】上将后五味别研为末,用前猪胆内药,和匀为丸,如绿豆大。每服十丸,米饮送下,不拘时候。

【主治】小儿惊疳,心忪惊悸,面黄肌瘦,口舌生疮,多困目涩。

66078 **退陷散**

《医方类聚》卷二六四。为方出《圣济总录》卷一六九,名见《卫生总微》卷八"人齿散"之异名。见该条。

66079 **退黄丸**

【方源】《袖珍》卷三。

【组成】香附末四两　平胃散四两　针砂四两(炒三次)

【用法】上为末,醋糊为丸。量大小加减,白汤送下。

【主治】积聚发黄。

66080 **退黄丸**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】青矾二两　平胃散六两

【用法】青矾锅内溶化,入陈黄米四升,用醋拌匀,慢火炒令烟尽为度,加入平胃散同炒少顷,去火毒;水肿合四苓散一料同炒,为末,醋糊为丸,如梧桐子大。每七十丸,空心临卧陈米饮送下。

【功用】退黄。

【主治】黄病。

【宜忌】忌糯米、油、面、生冷、硬物。

【加减】夹气肿者,加樟树皮五钱,木香二钱,香附二两;夹血肿及产后肿者,加四物汤一料。

66081 **退黄汤**

【方源】《辨证录》卷十一。

【组成】山药一两　芡实一两　黄柏二钱　车前子一钱　白果一枚

【用法】水煎服。连用四剂,无不全愈。

【主治】任脉湿热,带下色黄,宛如黄茶浓汁,其气带腥。

【方论选录】盖山药、芡实专补任脉之虚,又能利水,加之白果引入任脉之中,更为便捷,所以奏功甚速。至所用黄柏清肾中之火,肾与任脉相通,同群共济,解肾中之火,即解任脉之热矣。

66082 **退黄散**

【方源】《普济方》卷一四〇引《博济》。

【组成】石膏　牙消　川大黄　山栀子　红雪　甘草各等分

【用法】上为末。每服一钱,水一盏,入寒水石末少许,同煎至八分,温服。

【主治】伤寒汗后余毒未解,皮肤黄色。

66083 **退黄散**

【方源】《回春》卷二。

【异名】茵陈退黄散(《寿世保元》卷二)。

【组成】柴胡　升麻　茵陈　龙胆草　黄连　黄芩　栀子　黄柏　木通　滑石　甘草

【用法】上锉。加灯草一团,水煎服。外用生姜捣烂,时时于黄处擦之,其黄自退。

【主治】伤寒发黄,身目俱黄如金色,小便如浓黄柏汁,诸药不效者。

【加减】大便实,加大黄;目睛黄,倍龙胆草;虚弱,加人参。

66084 **退斑饼**

【方源】《外科证治全书》卷四。

【组成】黑母牛粪

【用法】捻作小饼,炭火煨半熟,乘热贴患处,一时取去。

【功用】退斑痕。

【主治】杨梅疮愈后有斑痕者。

66085 **退痛膏**

【方源】《点点经》卷一。

【组成】苎麻根四两

【用法】水酒糟一碗，与上药共捣如泥，敷痛处包紧。勿令风吹，痛立止，一日为度。

【主治】脚痛。

66086 **退痰丸**

【方源】《圣济总录》卷十七。

【组成】人参 赤茯苓（去黑皮） 干姜（炮） 半夏（汤洗七遍，去滑）各一两

【用法】上为末，以粟米饭和丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心生姜汤送下，日午再服。

【主治】风痰壅盛，每日早晨多喜呕吐。

66087 **退管丸**

【方源】《灵药秘方》卷下。

【组成】露蜂房十个 鳖一个（重十二两，煅） 野猪尾 茧退 人指甲 凤凰衣 蝉退各四两 牛黄三钱

【用法】上药除牛黄，俱要酒洗，各煅成末，面糊为丸。每服三钱，空心酒送下，量人虚实用。

【主治】痔漏。

66088 **退管丸**

【方源】《仙拈集》卷四。

【异名】除痔丸（《验方新编》卷七）、退管丹（《中国医学大辞典》）。

【组成】当归 黄连 象牙末各五钱 川芎 槐花 乳香各一钱 露蜂房（槐、椒树上者佳）一个

【用法】上为末，黄蜡二两熔化为丸，如梧桐子大。每服五六十丸，空心漏芦汤送下。至五日漏眼内退出肉管，待三四分长，用剪剪去，再退出，再剪，内管尽出，自然从内生肌长肉。

【功用】退痔管。

66089 **退管丸**

【方源】《疡科心得集·家用膏丹丸散方》。

【组成】炙蜂房（研）一两五钱 真象皮（炙黑，研）二两 粉儿茶（研）四两 猪脚壳（炙黑）一两五钱 明乳香（去油，研）一两五钱 刺猬皮（炙黑）一两五钱 生人脱（浸晒，炙黑，研）二两 胡连（焙）四钱 黑没药（去油）一两五钱 生矾（研）二两 象牙屑（焙黄，研）六两 瓜血竭（研）四两

【用法】上为细末，炼蜜、黄蜡溶化打糊为丸，如梧桐子大。每服三钱，空心陈酒送下。

【主治】痔漏。

66090 **退管丸**

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】辰砂（另研） 人指甲（麸炒） 蝉蜕（洗，炒） 象牙屑各一钱 制乳香 制没药 枯矾各八两 油角灯三钱（麸炒，取庙内年深破琉璃灯底为妙）

【用法】上为末，研匀，用黄蜡三钱与诸药搅和，乘热作丸，如绿豆大。初服十丸，逐日渐加一丸，加至十六丸止，用无灰酒送下。

【主治】一切痈疽，远近漏管。

【加减】上身加川芎六分，下身加牛膝六分，煎汤送药，药完管退。

【宜忌】管退后，忌葱百日。

66091 **退管丹**

《中国医学大辞典》。为《仙拈集》卷四“退管丸”之异名。见该条。

66092 **退管散**

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】黄荆条上子（炙燥）

【用法】上为末。每服五钱，拌黑糖，陈酒送下，至管出乃止。

【主治】痔疮漏管。

66093 **退管散**

【方源】《外科传薪集》。

【组成】猪肺管一个（不可伤，将管上油膜去净，以瓦焙干） 鹅管石一钱 白砒四分 枪消三分

【用法】上为细末，以葱水面浆为药条，插入管内，如此三次，其管退出。

【主治】漏管。

66094 **退管散**

【方源】《青囊秘传》。

【组成】雄鸡足胫一对（去爪，用雌黄塞入胫孔内，以满为度，将黄泥包好，煨存性，去

泥）　蛤蟆一只(以芦荟二钱纳入腹中，以黄泥包好，煨存性，去泥）

【用法】上为细末。每用一钱，加月石二分二厘，麝香一分，梅片一分，小膏药贴之。

【功用】退管。

66095　退膜丸

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【组成】熊胆半两(研）　牛胆汁一合　猪胆五枚(取汁）　牵牛子一两(炒）　黄连(去须)一两　栀子仁一两　车前子半两　决明子半两(炒）　枸杞半两　甘草一两(炙）

【用法】上除牛胆、猪胆汁外，同为末，用二胆汁和丸，如梧桐子大。每服五十丸，食后荆芥汤送下。

【主治】阳气炎上，血脉贯冲，目赤肿痛，睑眦生疮，暴生丁翳，渐染睛轮，视物羞涩，紧急难开。

66096　退膜丸

《普济方》卷八十。为《圣济总录》卷一一〇"决明丸"之异名。见该条。

66097　退翳丸

【方源】《幼幼新书》卷二十五引《龙木论》。

【组成】黑参　防风各一两　细辛　石决明　车前子各半两　桔梗　黄芩各一两半

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心茶送下。

【主治】小儿眼疳外障。

66098　退翳丸

【方源】《秘传眼科龙木论》卷三。

【组成】白芷　细辛　五味子　枳壳各一两(去瓤，麸炒）　牡蛎　茺蔚子各二两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心米饮汤下。

【主治】混睛外障。因毒风在肝，积血睑眦之间，初患之时，先疼后痒，碜涩泪出，怕日羞明，白睛先赤，发歇无定，渐渐眼内赤脉横立遮睛，如隔纱看物，难以辨明。

66099　退翳丸

【方源】《秘传眼科龙木论》卷六。

【组成】黑参　防风　人参　茯苓　石决明　细辛　黄芩　桔梗　车前子各一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服十丸，空心茶送下。

【主治】小儿疳眼外障。

66100　退翳丸

【方源】《准绳·类方》卷七。

【组成】蝉退　白菊花　夜明砂　车前子　连翘各五钱　黄连一两　蛇退一条(炒）

【用法】上为末，米泔煮猪肝为丸，如梧桐子大。每服三十丸，薄荷汤送下。

【主治】一切翳膜。

66101　退翳丸

【方源】《回春》卷五。

【组成】当归　川芎　白蒺藜各一两　地骨皮　川椒(去子)七钱　菊花　羌活　密蒙花　蔓荆子　荆芥各一两　薄荷　蛇退　瓜蒌根　楮实子　黄连　甘草各三钱　木贼二两(童便浸一宿）

【用法】上为末，炼蜜为丸，每一两作十丸。食后服，每日二次。有翳者，米泔水送下；睛暗，当归汤送下；气障者，木香汤送下；妇人血晕，当归薄荷汤送下。

【主治】眼疾，诸般翳障，昏暗。

【宜忌】忌荤腥、面食等物。

【备考】方中地骨皮用量原缺。

66102　退翳丸

【方源】《眼科全书》卷三。

【组成】青葙子　蒺藜　木贼草　谷精草　草决明　蝉退　密蒙花　牛蒡子　防风　归尾　龙胆草　赤芍各一两　夏枯草　陈皮各七钱　夜明砂五钱　犀角二钱　石决明一两

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，酒送下，不拘时候。

【功用】退翳。

【主治】冰翳内障。由肝脏积热，久久成内障，其翳如冰，瞳仁渐大。

66103　退翳丸

【方源】《同寿录》卷二。

【组成】防风 胆草 赤芍 连翘 木贼 枳壳各二两 山栀 黄芩各三两 川芎一两五钱 蔓荆二两 草决三两 石决二两（另研） 谷精三两 槟榔二两 黄柏一两五钱 甘菊二两 生地四两 当归二两 柴胡一两五钱 黄连一两 蝉退一两五钱 羌活一两五钱

【用法】上为末，水为丸。菊花汤下。

【主治】打伤眼睛。

66104 退翳丸

【方源】《全国中药成药处方集》（北京方）。

【组成】当归 香附 防风 草决明各三十二两 蝉蜕八两 玄参六十四两 青皮十六两 连翘三十二两 菊花六十四两 蛇蜕八两 白芷三十二两 川芎二十两 枳壳六十四两 密蒙花十六两 柴胡三十二两 薄荷十六两 黄芩三十二两 郁金十六两 蒺藜六十四两（炒） 木贼草六十四两 赤芍三十二两 橘皮三十二两 谷精草八两

【用法】上为细末，水泛小丸，滑石为衣，闯亮。每服二钱，温开水送下，一日二次。

【功用】消障退翳，散风明目。

【主治】火眼外障，血翳贯睛，视物不清，羞明涩痛。

66105 退翳汤

【方源】《诚书》卷七。

【组成】柴胡 甘草 黄耆各三钱 羌活 黄连 升麻 五味子 归身各二钱 防风一钱半 黄芩 黄柏（酒炒） 芍药 龙胆草（酒洗）各五钱 石膏二钱五分

【用法】上取三钱，水煎服。

【功用】退翳。

66106 退翳汤

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】防风 6 克 谷精草 9 克 木贼 蝉蜕各 6 克 当归 车前子 枸杞子各 9 克

【功用】养肝明目，宣散退翳。

【主治】翳已年深日久，呈现滑涩坚沉者。

【方论选录】方中防风为风药之润剂，性浮升散，甘缓不峻，意欲表散坚沉之翳；木贼、谷精草、蝉蜕明目退翳；当归、枸杞子滋补肝肾以明目；车前子固肾明目以育阴。

66107 退翳散

【方源】《百一》卷九。

【组成】真蛤粉（别研细） 谷精草（生，令为细末）各一两

【用法】上为末。每服二钱，用生猪肝一片三指大，批开，掺药在上，捲定，再用麻线扎之，浓米泔一碗，煮肝熟为度，取出放冷。食后、临睡细嚼，却用原煮肝米泔送下。

【主治】目内翳障，或疮疹后余毒不散。

【宜忌】忌一切毒物，不可食鸡、鸭子。

66108 退翳散

【方源】《秘传眼科龙木论》卷三。

【组成】石决明 大黄 细辛 黄芩 车前子各一两 防风二两 芍药一两半

【用法】上为末。每服一钱，以水一盏，煎至五分，食后去滓温服。

【主治】玉翳浮满外障。因毒风上冲入脑，积热在于肝膈之间，致令眼内有翳如玉色相似，遮满瞳人。

66109 退翳散

【方源】《永乐大典》卷一一四一二引《眼科诀髓》。

【组成】蛇退五条 海螵蛸二两 粉草半两

【用法】上为末，米饮为丸，如绿豆大。每服十五丸，米饮送下。

【主治】小儿浮翳。

66110 退翳散

【方源】《万氏家抄方》卷六。

【组成】人参 牛蒡子各等分

【用法】上为末。每服一钱，糯米饮送下。

【主治】痘疮人目。

66111 退翳散

【方源】《医统》卷六十一。

【组成】人退 蝉退 蛇退 凤退（焙）各五分 木通 木贼各二钱 麝香一分

【用法】上为细末。浮翳者可用吹之,即翳膜自起,灯心捲去三五次,以尽为度。

【主治】一切翳膜。

66112 **退翳散**

【方源】《银海精微》卷上。

【异名】猪肝散。

【组成】真蛤粉 谷精草 夜明砂

【用法】上为细末,用猪肝二两切开,掺药子内,以麻扎定煮,水冷,将肝同药细嚼,煮肝本汁咽下。

【主治】小儿痘疹入目,疼痛泪出,怕日羞明难开,久发变为白膜。

【宜忌】忌诸般毒物。

66113 **退翳散**

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】人参 玄参 白茯 黄耆 五味子 羌活 细辛 车前子

【用法】水煎。食后服。

【主治】撞刺生翳外障。

66114 **退翳膏**

【方源】《兰室秘藏》卷上。

【组成】蕤仁 升麻各三分 连翘 防风 青皮各四分 甘草 柴胡各五分 当归身六分 荆芥穗一钱(水半盏别浸) 生地黄一钱半 黄连三钱

【用法】上用水一碗,入前药煎至半碗,去滓,更上火煎至半盏,入荆芥水二匙,入蜜少许,再上火熬匀。点之。

【主治】黑白翳。

66115 **退热饮子**

【方源】《医方类聚》卷六十五引《龙树菩萨眼论》。

【组成】人参六分 地骨皮六分 羚羊角六分 升麻四分 玄参八分 防风八分 黄芩四分 决明子八分(捣) 茯苓六分

【用法】上以水七升,煎取二升半,食后分三次温服。服了皆须仰卧,高支腰卧。

【主治】因患后体弱,起早劳冲风,眼暗生花。

66116 **退热饮子**

【方源】《秘传眼科龙木论》卷三。

【组成】防风 黄芩 茺蔚子 桔梗各二两 大黄 黑参 五味子 细辛各一两

【用法】上为末。以水一盏,散一钱,煎至五分,食后去滓服之。

【主治】因大肠壅滞致使膜入水轮外障。

66117 **退热饮子**

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】茺蔚子 知母 大黄 茯苓 五味子 人参 芒消各一两 车前子一两半

【用法】上为末。每服一钱,以水一盏,煎至五分,食后去滓温服。

【主治】睑生风粟外障。

【宜忌】先宜三五度镰洗出血,再服本方。

66118 **退管神方**

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】块藤黄五钱 白及二钱(研) 象皮二钱(炙,研) 乳香二钱(制,研) 没药二钱(制,研)

【用法】用羊血一碗煮藤黄百沸取出,去羊血,将藤黄晒干,同诸药共研细末,又加黄蜡少许烊糊前药,捏成条,阴干,插入管内。

【主治】一切漏管,并红痈痔管。

66119 **退管验方**

【方源】《医林绳墨大全》卷九。

【组成】白砒六分(豆浆煮过) 白矾四分 水银四分

【用法】上为极细末,用乌鸡一只煮熟,取两足骨(去髓)入药在内,用罐封固,打火一香,取出为末。以纸粥糊为条,插入管内,其管自出。

【主治】痔漏。

66120 **退管锭子**

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】灵药二钱 白丁香一钱半 雄黄一钱 蟾酥一钱 轻粉 乳香 没药各五分 麝香二分 蜣螂三个(煅存性)

【用法】上为末,饭为条,灯草粗二寸长,阴

干，收用。外漏用此二三次，硬管即出。如追透通肠，亦可以穿线。

【主治】诸疮漏。

66121 **退翳神方**

【方源】《疡医大全》卷十一。

【组成】木贼草（火煅） 石决明（火煅） 谷精草（火煅）各一两 黑羊肝一具（用铜刀切片，放蒸笼内蒸熟，以麻线串挂，阴干，不可经铁器）

【用法】上为细末。每早、晚用红糖汤调下。

【主治】内障。

66122 **退翳神方**

【方源】《眼科秘书》。

【组成】白果外青皮 核桃外青皮各等分

【用法】二皮焙干为末，入姜汁、澄粉少许，以猪胰子捶成膏。点眼去云。

【功用】退翳。

66123 **退翳膏子**

【方源】《医学纲目》卷十三。

【组成】荆芥穗一钱 黄连三钱 生地黄一钱半 甘草五分 归身六分 连翘四分 柴胡梢五分 升麻三分 防风四分 蕤仁三分 青皮四分 细辛一分

【用法】上先用水半盏，浸荆芥一处，次将黄连、生地、甘草三味，用水一大碗，煎至半碗，再下余七味，同煎至一盏，去滓，更上火熬至半盏，入荆芥水二匙，入蜜少许，再煎令匀。点之。

【主治】黑白翳。

66124 **退气散血饮**

【方源】《审视瑶函》卷五。

【组成】大黄 当归身 乳香 没药 连翘 穿山甲 白芷各等分

【用法】上锉。白水二钟，煎至八分，去滓，食远服。

【功用】退气散血。

【主治】目内障。

【备考】若气盛者，欲行针拨内障之际前二三日，先服本方数剂，平其五脏，弱者不必服之。

66125 **退火回生丹**

【方源】《痘疹心法》卷二十三。

【异名】退火回生散（《医方考》卷六）、退火回生汤（《简明医彀》卷六）、退火丹（《景岳全书》卷六十三）。

【组成】滑石一钱 辰砂一钱 冰片三厘

【用法】上为细末。每服一分，冷水调下。得睡少时，神安气宁，痘转红活。

【主治】①《痘疹心法》：痘中狂妄。②《医方考》：痘证血热枯涩者。

【方论选录】《医方考》：火炎则水干，是故枯涩。用滑石、辰砂导去其热，此灶底抽薪之意；入冰片者，欲其速达而无壅滞也。

66126 **退火回生丹**

【方源】《种痘新书》卷十二。

【组成】滑石一钱 朱砂二分 冰片二厘 人中黄五分

【用法】上为末。灯心汤调服，睡少时，神安气宁痘即转红活。

【主治】痘大热烦渴红紫，惨暗，惊搐狂谵。

【加减】体弱者，加人参三分同煎。

66127 **退火回生汤**

《简明医彀》卷六。为《痘疹心法》卷二十三“退火回生丹”之异名。见该条。

66128 **退火回生散**

《医方考》卷六。为《痘疹心法》卷二十三“退火回生丹”之异名。见该条。

66129 **退邪消食饮**

【方源】《石室秘录》卷三。

【组成】陈皮一钱 甘草五分 白芍三钱 六曲五分 枳壳五分 厚朴五分 栀子一钱 茯苓一钱 麦芽二钱

【用法】水煎服。必待其饥饿之时，始可与服，若正饱之时服之，徒滋满闷。

【主治】伤寒火退邪散，胃气初转，一得食而胃气转闭，不可复开者。

66130 **退血止痛散**

【方源】《古今医鉴》卷十六。

【异名】退血止疼痛饮(《回春》卷八)。

【组成】归尾　赤芍药　生地黄　白芷　防风　荆芥　羌活　连翘　黄芩　黄连　黄柏　大黄　栀子　薄荷　枳壳　桔梗　知母　石膏　车前子　甘草各等分

【用法】上锉一剂。水煎服。

【主治】杖后肿痛,瘀血不散,气血攻心,或憎寒壮热。

66131　退阴如圣散

【方源】《医方类聚》卷一四一引《医林方》。

【组成】白芍药二两　陈皮一钱　干姜半钱　良姜半钱

【用法】上为细末。每服三钱,食前白汤调下。

【主治】水痢,脉微而迟。

66132　退红解毒汤

【方源】《痘疹会通》卷四。

【组成】紫草　丹皮　甘草　连翘　川连　防风　木通　北柴胡　地骨皮　赤芍　桔梗　荆芥　红花　蝉退　栀子　羌活　炒芩　糯米

【用法】竹叶、石膏同引,水煎服。

【主治】发热三四日不退,放标大小不等,或红斑、紫斑,黑赤焦枯,或腰疼。

【备考】本方在放标七日之内可用。

66133　退疔夺命丹

【方源】《回春》卷八。

【组成】防风八分　青皮七分　羌活一钱　独活一钱　黄连一钱　赤芍六分　细辛八分　僵蚕一钱　蝉退四分　泽兰叶五分　金银花七分　甘草节一钱　独脚莲七分　紫河车(一名金钱重楼)七分

【用法】上锉。每服五钱,倍金银花一两、泽兰一两(少用叶)、生姜十片,同捣烂,好酒旋热泡之,去滓热服;不饮酒者,水煎亦可,然后用酒水各一半,煎生姜十片,热服出汗。病退减后,再加大黄五钱同煎,热服,以利二三次,去除毒。

【主治】疔疮。

【加减】若有脓,加何首乌、白芷梢;在脚,加槟榔、木瓜;要通利,加青皮、木香、大黄、栀子、牵牛。

66134　退肿束胎方

【方源】《医略六书》卷二十八。

【组成】白术二钱(生)　枳壳二钱(炒)　泽泻一钱半　葶苈二钱　茯苓三钱

【用法】水煎,去滓,温服。

【主治】怀孕肿胀喘急,脉沉滑者。

【方论选录】妊娠脾土不健,湿热上干,肺气不能通调水道,故肿胀喘急,小水不快焉。白术健脾土以化湿热,枳壳束胎元以泻滞气,葶苈子清利肺气,建泽泻通利水道,白茯苓渗湿气以清子室也。水煎温服,俾脾气健运,则肺气通调而湿热自化,喘急无不退,肿胀无不除,其胎孕有不安者乎?

66135　退肿消毒散

《便览》卷二。为《医方大成》卷十引汤氏方“退肿塌气散”之异名。见该条。

66136　退肿消核散

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】艮脚根四两　紫金皮　樟柳根各一两

【用法】上为末,用毛屎梯叶、生地黄、苦薄荷、金脑香、金凤尾、地薄荷、赤葵子、尻池叶,不拘二三味取汁擂,米泔水入醋少许调匀,暖刷。

【主治】一切无名肿毒及结核赤肿者。

66137　退肿集贤丸

【方源】《奇效良方》卷四十。

【组成】商陆　猪苓　汉防己　苦葶苈　椒目　滑石　海金沙　黑牵牛(取末)　大腹皮　续随子(去油)　赤茯苓各一两　巴豆二十七粒(去油)　黄连半两(净)

【用法】上为细末,煨蒜捣为丸,如梧桐子大。每服二十五丸,五更温服,每两日一次。初服商陆汤,次服赤小豆汤,三服用木瓜汤送下。

【主治】诸肿。

66138 **退肿塌气散**

【方源】《医方大成》卷十引汤氏方。

【异名】退肿消毒散(《便览》卷二)。

【组成】萝卜子 赤小豆 陈皮 甘草(炙)各半两 木香(炮)一分

【用法】上㕮咀。每服二钱。水一小盏,姜、枣煎服。

【主治】积水,惊水,或饮水过多,停积于脾,四肢肿而身热。

66139 **退毒定痛散**

【方源】《接骨入骱全书》。

【组成】连翘 花粉 防风 荆芥 羌活 独活 川芎 银花 当归 川断 乳香 没药各八分 甘草三分

【用法】水、酒各半,煎八分,食远服。

【主治】破指染伤风。

66140 **退热人参汤**

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】人参二两 玄参 白茯苓(去黑皮) 黄芩(去黑心) 五味子 羌活(去芦头) 细辛(去苗叶)各一两 车前子一两半

【用法】上为粗末。每服三钱匕,水一盏,煎至七分,去滓,食后温服。

【主治】目撞刺,赤肿痛,生障翳。

66141 **退热宁神汤**

【方源】《杏苑》卷三。

【组成】柴胡二钱 黄芩一钱 黄连六分 甘草(生)五分 山栀仁 人参 酸枣仁 麦冬 茯神各一钱

【用法】上锉一剂。水煎热,食前或不拘时候服。

【主治】身热神昏,昼夜不眠。

66142 **退热补中汤**

《杏苑》卷五。为原书卷四"退热清气汤"之异名。见该条。

66143 **退热补气汤**

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】人参 黄耆各一钱五分 柴胡一钱 黄芩八分 青皮 木香各四分 川芎五分

【用法】上㕮咀。水煎熟,食前温服。

【主治】肥人胁下痛,发寒热,属气虚者。

66144 **退热明目方**

【方源】《普济方》卷八十一。

【组成】千里光 甘草

【用法】煮作饮服。

【主治】目昏暗。

66145 **退热和血汤**

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】桃仁 红花 山栀 大黄(酒洗)各五分 当归尾 柴胡各一钱 川芎 赤芍药 青皮各七分

【用法】上㕮咀。水煎熟,食前温服。

【主治】瘦人因瘀血胁下痛,寒热多怒者。

66146 **退热茺蔚散**

《秘传眼科龙木论》卷五。为《圣济总录》卷一一二"茺蔚子散"之异名。见该条。

66147 **退热消毒散**

【方源】《准绳·疡医》卷五。

【组成】鸡屎子 鸡距根 水圹根 臭木待 白根子 山乌豆 苦花子 紫金藤 金脑香 吉面消 连义大青 落鸦爪藤 大叶小青 过山龙梗 大叶金凉伞

【用法】加薄荷,水煎服。

【主治】无名肿毒发热者。

66148 **退热清气汤**

【方源】《医学入门》卷七。

【组成】柴胡 陈皮 茯苓各一钱 半夏 枳壳各八分 香附七分 川芎五分 砂仁七粒 木香 甘草各三分

【用法】加生姜三片,水煎,温服。

【主治】气逆身热,中脘痞满。

66149 **退热清气汤**

【方源】《杏苑》卷四。

【异名】退热补中汤(原书卷五)。

【组成】黄耆一钱 人参 甘草各一钱 橘皮 当归各八分 白术六分 升麻 柴胡 干葛各四分 黄柏(炒) 黄芩 白芍药各五

分　红花三分

【用法】上㕮咀,水煎熟,食前热服。

【主治】气逆身热,中脘痞满;及五心烦热,虚热日晡发作,自汗倦怠。

66150　退热清凉散

【方源】《圣惠》卷八十五。

【组成】白药一分　甘草一分(炙微赤,锉)　郁金一分　黄芩一分　天竹黄一分(细研)　朱砂半两(细研,水飞过)　麝香半分(细研)

【用法】上为细散。每服半钱,以温水调下,不拘时候。

【主治】小儿壮热欲发痫。

66151　退管收功丸

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】胡黄连一两　穿山甲(麻油四两炙脆)　石决明(煅)　槐花(炒)各五钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服一钱,空心白滚水送下。

【主治】痔疮漏管。

【加减】如漏,四边有硬肉突起,加蚕茧二十个(炒焦为末),和入前药内,早、晚日进二服。至重者亦愈。

66152　退翳车前散

【方源】《眼科全书》卷五。

【组成】车前　五味　赤芍　细辛　玄参　白茯　人参　大黄(酒蒸,晒)　桔梗各等分

【用法】水煎,食后服。

【主治】飞尘入眼外障。

66153　退翳圣饼子

【方源】《永乐大典》卷一一四一二引《眼科诀髓》。

【组成】川芎　羌活　防风　白蒺藜　石膏　菊花　蛇退(炙黄)　楮实子　青木香　木贼　苍术(泔浸)　青葙子　旋复花　石决明各等分

【用法】上为末,炼蜜为丸,如小钱大。食后冷水嚼下。

【功用】退翳。

66154　退翳羊肝丸

《疡医大全》卷十一。即《医说》卷四引《类说》"羊肝丸"。见该条。

66155　退翳鸡肝散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】夜明砂　雄黄　威灵仙　谷精草　蛤粉各一钱

【用法】上为末。每用鸡肝一具,入药末五分,掺肝内,入砂锅内煮服。

【主治】小儿疳,肝脏积热损目。

66156　退翳复明丸

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】人参五钱　枸杞子　防风　蒺藜(炒,去刺)　肉苁蓉(酒洗)　菟丝子(酒煮)　赤芍各一两五钱　青葙子　石斛草　木贼草　谷精草　密蒙花　石决明(煅)　熟地　白芍　玄参各一两　蝉蜕　薄荷各七钱　草决明(炒)　甘菊各五钱　夜明砂三钱　羚羊角　犀角各二钱

【用法】上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服四十丸,食后白汤送下。

【功用】退翳复明。

66157　退翳猪肝散

【方源】《仙拈集》卷三。

【组成】密蒙花　谷精草　蝉退(去足翅)　望月砂各一两

【用法】上为末。雄猪肝一个,竹刀剖开,将药末掺入砂锅蒸熟,食肝尽,一料全愈。

【主治】疳症、痘症坏目。

66158　退血止疼痛饮

《回春》卷八。为《古今医鉴》卷十六"退血止痛散"之异名。见该条。

66159　退热桔梗饮子

《秘传眼科龙木论》卷四。为《圣济总录》卷一〇六"桔梗汤"之异名。见该条。

66160　退翳海螵蛸膏

【方源】《永乐大典》卷一一四一二引《眼科诀髓》。

【组成】海螵蛸不拘多少(去粗皮)

【用法】上为末,将乌鸡子一个,煮熟,去壳

黄，用白和螵蛸成膏，炉内煅通红为度，取出，研入脑子麝少许为末。灯心点五七次，候赤白，却用冷水洗，良久再点之。

【主治】肺受病，双障黄赤膜遮睛，不分昼夜。

陟

66161 陟厘丸

【方源】《千金》卷十五。

【组成】水中陟厘五两　汉中木防己六两　紫石英三两　厚朴一两　陇西当归四两　黄连二两　三岁醇苦酒五升　上好豉三升

【用法】上以苦酒二升渍防己令极润，出之，留苦酒；以利刀切防己，厚令一分，须厚薄均匀；将板瓦置炭火上，瓦上铺厚纸，防己放上炙，依次翻动，使其色槁燥；再渍入余苦酒中，又出之，放瓦上熬之，如此以熬尽苦酒为度，勿令火猛，徐徐熬令极燥，与前药各为末；以余二升苦酒渍豉一宿，明旦以瓦盆盛之，以一盆覆盖，上置土五升，蒸之，使土气通流，豉熟出之，于盆中研豉，以新布绞取浓汁，和诸药为丸，如水中鸡头子大，分置于囊中，悬令阴干，便以蜡密封，勿令见风尘。每服三丸，平旦、昼、暮各一服，平旦以井华水送下，余时以水送下；初服药时，饮食宜少，药后食饮消，腹中调和者，可服一次；病愈者，则二三日一服；病重未效者，可日服四五次。

【主治】百病，下痢及伤寒身热，头痛目赤，四肢烦疼不解，协热下痢；或医已吐下之，腹中虚烦，欲得冷饮，饮不能消，腹中急痛，温食则吐，乍热乍冷，状如温疟；或小便不利，气满呕逆，下痢不止。

【宜忌】忌热食、生鱼、猪肉、蒜、生菜、酒、辛物、诸肥腻难消食物。

【加减】有风病，加防风一两；人虚羸，加石斛一两；宿有下痢，肠胃虚弱者，加太乙余粮二两半（取石中黄软香者）；妇人产后疾，加硫黄二两；小便黄赤不利，加蒲黄一两。

【方论选录】《千金方衍义》：陟厘生水中，蒙茸如发，而性甘温，能利水散邪，犹浮萍之利水发汗也；紫石英治心腹咳逆邪气；汉防己治风寒温疟，除邪利大小便；厚朴治中风伤寒头痛恶寒；当归治咳逆上气，温疟寒热；黄连治肠澼腹痛下利，皆《本经》主治。尤妙在苦酒酸收防己、香豉之性，以尽缓收之力。此方不特时师所昧，并不识陟厘为何物也。

66162 陟厘丸

【方源】《圣惠》卷五十九。

【组成】陟厘三两　吴矾三两　绿矾二两　白矾一两半　黄丹一两半　石灰三两　赤石脂一两半　白石脂一两半　定粉一两半

【用法】上为末，入瓶子内烧，一复时取出，研令细，以面糊为丸，如梧桐大子。每服二十丸，空心粥饮送下，晚食前再服之。

【主治】肠滑，下肠垢。

66163 陟厘丸

【方源】《圣惠》卷七十五。

【异名】定神丸（《圣济总录》卷一五四）。

【组成】陟厘三分　熟干地黄一两　人参三分（去芦头）　当归三分（锉，微炒）　白龙骨三分　赤石脂三分　禹余粮三分（烧，醋淬七遍）　厚朴一两（去粗皮，涂生姜汁，炙令香熟）　赤芍药半两　吴茱萸半两（汤浸七遍，微炒）

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十丸，粥饮送下，不拘时候。

【功用】保胎，安定神思。

【主治】①《圣惠》：妊娠胎动，腹痛下血。②《圣济总录》：妊娠惊胎。

除

66164 除风丸

【方源】《杨氏家藏方》卷一。

【组成】天南星一两半（生）　川芎一两　白附子二两半　半夏二两半（生）　天麻（去苗）　白僵蚕（炒，去丝嘴）　防风（去芦头）各一两半　石膏二两　白花蛇（酒浸，去皮骨，取肉，焙干）一两　蝎梢（去毒，炒）一两半

【用法】上为细末,生姜自然汁打面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食后、临卧以生姜汤送下。

【主治】中风瘫痪,口眼㖞斜,四肢不收,肌肉顽痹,头目旋运。

66165　除风汤

【方源】《圣济总录》卷一〇九。

【异名】防风汤。

【组成】防风(去叉)　黄耆(锉)　茺蔚子各二两　桔梗　五味子　细辛(去苗叶)　大黄(锉,炒)各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕,水一盏,煎至七分,去滓,食后温服,一日二次。

【主治】眼生胬肉侵睛,及外障已钩割熨烙者。

【备考】方中黄耆,《金鉴》作"黄连"。

66166　除风汤

【方源】《秘传眼科龙木论》卷一。

【组成】羚羊角　车前子各二两　芍药　人参　茯苓　大黄　黄芩　芒消各一两

【用法】上为末。每服一钱,以水一盏,煎至五分,去滓,食后温服。

【主治】五风变内障,头旋偏痛,瞳人结白,眼目失明。

【备考】《张氏医通》有蝎尾(醋泡)三分,余药各用一钱。

66167　除风汤

【方源】《秘传眼科龙木论》卷四。

【组成】防风二两　犀角　大黄　知母　黄芩　黑参各一两　桔梗　羚羊角各一两半

【用法】上为末。每服一钱,以水一盏,散一钱,煎至五分,去滓,空心温服。

【主治】睑生风粟外障,眼睑皮肉上下有肉如粟粒相似,唯多泪出涩痛,如米隐一般;积久年深,翳膜昏暗,渐渐加重。

66168　除风汤

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】防风　细辛　桔梗　茺蔚子　黄芩　大黄　五味子　薄荷　石膏　黄柏　草决明

【用法】水煎,食后服。

【主治】脾胃壅热,肝膈气充胞睑内,壅肉壅起,烂湿眵粘,胞肉胶凝。

66169　除风汤

【方源】《眼科全书》卷四。

【组成】羚羊角　山犀角　防风　知母　黄芩　玄参　荆芥　桔梗　大黄　朴消　黄连

【用法】上为末。水煎服。

【主治】睑生风粟外障。

66170　除风汤

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】细辛　僵蚕　白芷　藁本　羌活　独活　细茶　花粉各等分　葱头七个

【用法】水煎。先熏后吃。

【主治】偏正头痛日久,渐成内障。

66171　除风散

【方源】《圣济总录》卷十八。

【组成】防风(去叉)　蝎梢(炒)各一两　白花蛇头二枚(酒浸,炙)

【用法】上为散。每服一钱匕,温酒调下。

【主治】紫癜风。

【备考】本方方名,《普济方》卷一一二引作"防风散"。

66172　除风散

【方源】《圣济总录》卷一一二。

【组成】防风(去叉)二两　车前子　藁本(去苗土)　细辛(去苗叶)　五味子各一两　芎䓖　桔梗(锉,炒)各一两半

【用法】上为散。每服一钱匕,空心、食前以米饮调下。

【主治】外物撞刺目睛,胞睑肿痛。

66173　除风散

《普济方》卷二二〇。为《圣济总录》卷一八六"神仙延年除风散"之异名。见该条。

66174　除风散

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】白矾三钱　川椒一钱　艾叶二钱

青盐一钱

【用法】水煎，熏洗。

【主治】炎性睑肿，眼睑暴发赤痒，肿胀如杯。

【加减】痒甚，加蛇床子。

【临证举例】炎性睑肿　韩某某，男，工人。忽然眼胞肿胀，赤疼流泪，按其脉，左关弦数，右关细数，视其目，眼胞肿胀坚硬，气轮之上起红泡，热泪长流。此乃脾经湿热，肝火旺盛所致。用尖刀从小眦穿至大眦之边，微出血，外以除风散洗罨，内服消毒饮，二剂而轻。

66175　除风膏

《卫生总微》卷五。为原书同卷"麝香饼子"之异名。见该条。

66176　除邪丹

【方源】《鸡峰》卷二十五。

【异名】创丹。

【组成】漏芦一两（九蒸）　干姜　附子各一两　巴豆（三两，以水一碗煮尽，就炒作声，再用河水浸七日，去皮取肉，去油尽）一两

【用法】上除巴豆霜外，为细末，同巴豆霜研匀，每一料用灵砂一字，同研匀，以水煮面糊为丸，量人虚实大小丸之，用橘皮汤送下。如新合成，只服一丸，药旧则加数丸，产后妇人亦可少服。

【主治】诸疾百病。

66177　除饮丸

【方源】《普济方》卷一六六引《卫生家宝方》。

【组成】天南星　半夏（二味同锉细，以生姜自然汁浸一宿，同姜汁慢火炒干为度）　青皮（汤浸，去白）　陈皮（汤浸，去白）　紫苏子　赤茯苓　枳壳（汤浸，去瓤，麸炒）　桔梗（炒）各四两　槟榔　干姜（炮）　高良姜（锉细，同巴豆十四粒捶碎，同炒焦黄色，用纸包定，安土地上候冷，去巴豆）　缩砂仁　白扁豆　大腹皮（蜜炙）各二两

【用法】上为细末，用神曲半斤，麦蘖半斤，以生姜自然汁煮糊为丸，内不得着水，丸如梧桐子大。每服五七十丸，以生姜汤送下，不拘时候。

【主治】一切久积痰癖停饮及中酒。

【加减】心痹，怔忪惊悸，加石菖蒲四两，远志（去心）二两；夜不得眠，梦泄，白浊，加酸枣仁、龙骨各二两，用朱砂为衣，参麦门冬汤送下。

66178　除饮汤

【方源】《魏氏家藏方》卷二。

【组成】附子（生，去皮）一两　白附子二钱　天南星（炮）　白术（炒）　白茯苓（去皮）各半两

【用法】上为粗末。每服半两，水二盏，生姜二十片，同煎至八分，去滓，空心通口服。

【主治】痰饮。

66179　除疟汤

【方源】《济阳纲目》卷二十三。

【组成】柴胡　茯苓　白术各一钱　陈皮　半夏（泡）　黄芩　甘草　干葛　苍术（米泔浸，炒）　川芎各五分

【用法】上锉。加生姜三片，水煎服。

【主治】初疟。

【加减】饮食不思，加麦芽、青皮、山楂各五分；阳分汗多，加人参、黄耆各七分，去干葛；阴分，加酒炒芍药一钱，归身、生地黄各八分，或用升麻四分；寒痰停饮，加草果仁；痰盛，加贝母、知母（炒）；截疟，加青皮、常山、槟榔、贝母各一钱；久疟邪微、潮热，加四君、四物，去干葛、苍术、川芎。

66180　除泡散

【方源】《种痘新书》卷三。

【组成】滑石（飞过）四两　白术　白芷各一两

【用法】上为末。以银针挑破其痘，令去清水，将此末掺之，内服实浆散。

【主治】痘有水泡者，或痘有湿烂流水出。

66181　除毒丸

【方源】《圣济总录》卷一二五。

【组成】巴豆（铁串穿，灯上烧，去心）　大

黄末各半两

【用法】上为末，端午日粽子为丸，如绿豆大。每服三丸，空心以冷茶送下，良久以热茶投之。下多，以冷粥止之。

【主治】瘰瘤，服海蛤散后。

66182　除毒丹

【方源】《卫生总微》卷十二。

【组成】鬼臼一两(去毛)　苦参半两(锉)　青葙子半两　草龙胆(去芦)半两　硫黄一分　绯绢一分　干蟾一分　白矾一分

【用法】上锉，拌一处，并烧存性为末，炼蜜和丸，如麻子大。每服十丸，磨沉香汤送下，不拘时候。

【主治】疳蛔不愈，传染兄弟姊妹。

66183　除毒散

【方源】《杨氏家藏方》卷二十。

【组成】香白芷不以多少

【用法】上为细末。每服三钱，用麦门冬煎汤调下。

【主治】蛇伤。

66184　除疯丸

【方源】《秘传大麻疯方》。

【组成】枫子一斤(酒浸，秋冬五日，夏三日，研碎入药)　人参五钱　防己　没药各一两　官桂五钱　白芍一两　荆芥一两　防风一两五钱　当归一两　独活二两　羌活　玄胡索　大黄各一两　蝉退七钱　苍术一两　半夏一两五钱　姜黄　麻黄　干姜各一两五钱　甘草一两五钱　柴胡　枳壳　石楠叶各一两　黑丑一两五钱　杏仁(去皮尖)　乌药　地骨皮　乳香　陈皮各一两　黄芩　胡麻(炒)各二两　香蛇一两　黄柏　苦参各二两　穿甲七钱五分　黄连六钱五分　甘菊二钱二分　灵仙五钱　蔓荆子一两(炒)

【用法】上为末，老米粉为丸。每服五十丸，空心以酒送下，一日三次。

【主治】大麻疯。

66185　除根丸

【方源】《秘传大麻疯方》。

【组成】羌活　独活各六两　两头尖三两　寸香五钱　草乌二两　胡麻半斤　荆芥　苍术各七两　灵仙六两(酒洗)　石菖蒲六两(酒洗)　木通三两　当归八两　虎骨二两半(炙)　苦参一斤　藁本六两　僵蚕二两　蝉退半斤(酒洗)　白芷六两　杜仲五两(盐水炒)　连翘六两　蒺藜半斤(去刺)　朱砂七钱七分　黄芩　生地各六两　枫子肉二两(炒)　升麻四两　风藤五两　首乌六两　天麻五两　牛膝半斤　全蝎六两　细辛四两　川芎三两　山栀半斤　蔓荆子六两　苍耳子半斤(取肉)

【用法】上为末，老米粉为丸。每服二钱，好酒送下，白汤亦可，一日三次。

【主治】三十六种疯疾。

66186　除根散

【方源】《医方类聚》卷一六六引《吴氏集验方》。

【组成】川楝子(去皮)　槟榔各一钱　轻粉一字　芜荑三钱　黄丹二钱

【用法】上为末，作一服。取石榴根煎酒调下，须五更初服；先以熟肉嚼取汁吃，却服药，同吃则吐。

【主治】寸白虫。

66187　除根散

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】当归五钱　蝉退　僵蚕　天龙　大黄各一钱　石蟋虮(此草叶)五钱　老蜘蛛二个(放瓦上，以酒钟盖定，用火煅干存性，研)

【用法】上为末。每服一钱，空心调下。

【主治】肠痈。

66188　除原散

《医学入门》卷七。为《医学正传》卷二“溯源散”之异名。见该条。

66189　除热方

【方源】《外台秘要》卷十五引《深师方》。

【组成】龙骨　大黄　干姜各四两　牡蛎三两(熬)　滑石　赤石脂　白石脂　桂心

甘草(炙)各三两

【用法】上为末,韦囊盛。大人三指撮,以井华水二升,煮三沸,药成,适寒温,大人服一升,未满百日服一合,未能饮者,绵裹箸头纳汤中,著小儿口中以当乳汁;热多者,一日四次。

【主治】大人风及小儿惊痫、瘈疭,日数十发。

【宜忌】忌海藻、菘菜、生葱。

66190 **除热汤**

【方源】《卫生总微》卷三。

【组成】白芷根苗 苦参各等分

【用法】上为粗末。用清浆水煎,更入盐少许,以浴儿,浴毕用粉粉之。

【主治】小儿于立夏之后,有病身热者。

66191 **除热饮**

【方源】《圣济总录》卷一一一。

【异名】除热饮子(《秘传眼科龙木论》卷三)。

【组成】黄芩(去黑心) 玄参 桔梗(去芦头,炒) 知母 芒消 防风(去叉) 茺蔚子 大黄各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕,水一盏,煎至七分,去滓,空心、食后温服。

【主治】①《圣济总录》:丁翳毒热。②《秘传眼科龙木论》:肝、心毒热,上攻睛瞳而致钉翳根深,外障,睛中翳黑硬如钉子之形,其证疼痛赤涩,泪出羞明。

66192 **除热饮**

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】大黄 知母 防风 黄芩各一两 黑参 茺蔚子 菊花 木贼各一两半

【用法】水煎,食后服三贴。

【主治】小儿疳伤眼目,疼痛羞明不开,乌睛上青翳如黑珠子,或白膜遮睛。

66193 **除热饮**

【方源】《眼科全书》卷五。

【组成】黄连 黄柏 黄芩 玄参 防风 知母 连翘 柴胡 龙胆草 蔓荆子 桔梗 茺蔚子

【用法】水煎,食后服。

【主治】劳伤肝心二经,或性躁急促之人,啼哭含情之妇,情欲强制,郁伤于肝心,而致钉翳根深,赤涩难开,痛牵头脑,泪出,羞明怕日,钉入翳深,接引黄仁。

【加减】热甚,加大黄、朴消。

66194 **除热粉**

【方源】《圣济总录》卷一七四。

【组成】寒水石(碎) 芒消 滑石(碎) 石膏(碎) 赤石脂(碎) 木香 大黄(锉) 甘草(锉) 黄芩(去黑心) 防风(去叉) 芎䓖 麻黄根各等分

【用法】上为末,以蛤粉一升,药末三合,相和,再筛。粉儿,每日三次。

【主治】小孩胃热,身体微黄。

66195 **除积汤**

【方源】《点点经》卷三。

【组成】当归 山楂 神曲 三棱(醋炒) 砂仁 槟榔 莪术(醋炒) 陈皮 枳实 酒军 茵陈 腹皮 (一本有朴消)

【用法】麦芽引。

【主治】酒伤黄肿,气喘发咳,小腹肿满、膨胀,有积结而服药不效,攻下之后,用本方调理。

66196 **除疳散**

【方源】《圣济总录》卷一七三。

【组成】丁香 生犀角(末)各半钱 苦楝根(有子者良,赤者不用,阴干为末) 鹤虱各半两 密陀僧 白槟榔(炮,锉)各一分

【用法】上为散。每服一钱匕,米汤调下,每日三次,虫自出。

【主治】五疳,吐虫,腹胀羸瘦。

66197 **除疳散**

《百一》卷十九。为《圣济总录》卷一七二“天南星散”之异名。见该条。

66198 **除疳散**

【方源】《麻症集成》卷三。

【组成】煅人中白 煅文蛤 烧蚕蜕纸

铜青

【用法】共研粉。用米泔水洗净敷之,以平为度。

【主治】牙疳臭烂。

66199 除疸丸

【方源】《感证辑要》卷四。

【组成】倭硫黄三两　净青矾一两

【用法】上为细末,水泛为丸,姜半夏粉一两为衣。每服一钱,或一钱半。

【主治】阴黄,黄而昏暗如熏黄色,而无烦渴热象者。

66200 除烦汤

【方源】《嵩崖尊生》卷十四。

【组成】四物汤倍白芍、生地,加胡黄连一钱。

【用法】水煎服。

【主治】经水过多,五心烦热,日晡潮热。

66201 除痔丸

【方源】《仙拈集》卷四。

【组成】没药　血竭各五钱　蜂房(焙)　蝉退　木香　麝香各一钱

【用法】上为末,溶黄蜡一两,为丸如黄豆大。每服一丸,以烧酒送下。

【主治】痔漏。

66202 除痔丸

《验方新编》卷七。为《仙拈集》卷四"退管丸"之异名。见该条。

66203 除痔丸

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】夏枯草　槐花　连翘　粉甘草各四两　西红花一两　金银花一斤

【用法】前五味共碾极细面,再加金银花煎浓汁蜂蜜膏,和炼蜜为丸,每丸二钱重。每服一丸,白开水送下。

【功用】清热利湿,止血生肌。

【主治】痔疮,痔漏,痔出血,肛痛,肛痒,脱肛,肛门湿疹,肛门破裂。

【宜忌】忌辣腥刺激品。

66204 除痛丸

【方源】《杨氏家藏方》卷五。

【组成】木香　乳香(别研)　沉香　藿香叶(去土)　肉桂(去粗皮)　青橘皮(去白)　枳实(麸炒,去瓤)　吴茱萸(汤洗七次)　京三棱(煨香,切)　蓬莪茂(煨香,切)各半两　黑牵牛四两(取一出细末一两半余不用)　麝香一钱半(别研)　陈橘皮(去白)半两(锉,用巴豆去壳二两,炒令紫色,去巴豆不用)

【用法】上为细末,入麝香乳香别研匀,水煮面糊为丸,如梧桐子大。每服五十丸,食后以温生姜汤送下。

【主治】中焦积寒,心腹疼痛,呕吵清水,自汗短气。

66205 除痛丸

【方源】《全国中药成药处方集》(沈阳方)。

【组成】盔沉　青皮各三钱　苯腹炭五钱　台乌四钱　木香五钱　川楝子　香橼　油朴各三钱　当归　香附各一两　油桂三钱　十开蔻一两　明没药七钱　紫苏　白檀香各三钱　砂仁四钱　内金五钱　苏合油一钱

【用法】上为极细末,炼蜜为丸,二钱重。每服一丸,白开水送下。

【功用】通气止痛,镇静神经。

【主治】肝气逆满,两肋胀痛,胃脘胀痛,诸疝肿痛,胸膈刺痛,妇人经痛,腰腿疼痛,吐血肋痛。

【宜忌】忌辣腥刺激食物。

66206 除痛散

【方源】《医级》卷九。

【组成】当归　川芎　黄耆　肉桂　独活　牛膝　没药　灵脂　甘草　(一方有白术)

【主治】产后骨节烦疼,发热头重,胸闷气微,腹胀,恶露不行,四肢不举。

66207 除湿丸

【方源】《杨氏家藏方》卷四。

【组成】甘遂(锉碎,炒黑色)　大戟(锉碎,炒黑色)　威灵仙　赤芍药各一两　防风(去芦头)半两　白面半两　干胭脂一两

【用法】上除白面、胭脂外,并为细末,次研

胭脂，同面诸药研匀，滴水为丸，如梧桐子大，晒干，沸汤内煮浮，漉出再晒干。每服二十丸至三十丸，食前以温熟水送下，或生姜汁浸汤放温送下。

【主治】脚气，肿满疼痛，行履艰难，大便不通，小便赤涩。

【宜忌】忌茶。

66208 除湿丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】当归（酒浸，去芦） 防风（去芦） 川芎 川萆薢 威灵仙 肉桂（去粗皮，不见火） 杜仲（锉，姜制，炒去丝） 大川乌头（炮，去皮脐） 藁本 神曲（炒） 白术（炒）各半两 附子八钱（炮，去皮脐） 乳香二钱（别研） 没药三钱（别研）

【用法】上为细末，酒糊为丸，如梧桐子大。每服二十丸，空心以温酒或淡醋汤送下。

【功用】轻健腰脚。

【主治】筋骨诸疾，诸风。

66209 除湿丸

【方源】《普济方》卷一一八引《家藏经验方》。

【组成】黑牵牛一斤（炒，带性） 破故纸四两 赤芍药四两 钱子地龙四两（去土，以上为末） 白胶香四两（另研）

【用法】上用不蛀皂角三十梃，挪取浆，入砂钵内慢火熬成膏，和药丸，如梧桐子大。每服四十丸，空心以盐汤送下，才利便止。

【主治】中湿，足不能举。

【宜忌】老人、虚人不宜服。

【临证举例】中湿 临安南山昭庆院文僧正者，凿山为文室，设榻其中，久之为湿气所逼，半年足不能举，因得此药乃能行。余在淳安忽左足沉重，恐是湿气，依方制服，洞下即愈。

66210 除湿丸

【方源】《嵩崖尊生》卷九。

【组成】枳实 白术 茯苓 神曲各五钱 红花一钱五分 莱菔二钱五分

【用法】饭为丸。

【主治】伤湿面。

66211 除湿丸

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】威灵仙一两 猪苓一两 栀仁一两 黄芩一两 黄连一两 连翘一两 归尾一两 泽泻一两 紫草一两五钱 茜草根一两五钱 赤苓皮一两五钱 白鲜皮二两 粉丹皮一两 干生地二两

【用法】上为细末，水泛为丸，如绿豆大。每次一至二钱，一日二次，温开水送下。

【功用】清热凉血，除湿利水，祛风止痒。

【主治】急性湿疹、牛皮癣、婴儿湿疹、单纯糠疹、多形红斑等。

66212 除湿丹

【方源】《宣明论》卷七。

【组成】槟榔 甘遂 威灵仙 赤芍药 泽泻 葶苈各二两 乳香 没药各一两（另研） 黑牵牛半两 大戟二两（炒） 陈皮四两（去白）

【用法】上为细末，面糊为丸，如梧桐子大。每服五十丸至七八十丸，食前以温水送下。

【主治】①《宣明论》：诸湿客搏，腰膝重痛，足胫浮肿，筋脉紧急，津液凝涩，便溺不利，赤瘾疹，疽痈发背，疥癣走注，脚气，疮疖。②《儒门事亲》：妇人腰胯疼痛、两脚麻木，恶寒喜暖者。闪肭膝踝足腕大痛及枚疮落马，坠堕打扑等。

【宜忌】①《宣明论》：服药前后，忌酒一日，药后亦忌湿面。食温粥补暖。②《赤水玄珠》：中病即止，虚弱者当慎。

【备考】《普济方》引《经验良方》有青皮，无葶苈。

66213 除湿丹

【方源】《准绳·类方》卷二。

【组成】神佑丸加乳香 没药

【主治】水肿。

【备考】考原书此处神佑丸指三花神佑丸，即大戟、甘遂、芫花、牵牛、大黄、轻粉。

66214 除湿汤

【方源】《女科万金方》。

【组成】槟榔　甘遂　威灵仙　赤芍药　葶苈　半夏　厚朴　苍术　藿香　陈皮　白茯苓　白术

【用法】每服五钱，加生姜五片，大枣一枚，煎服。

【主治】诸湿，腰膝肿疼，项颈浮肿，筋骨紧急，精液凝滞。

66215 除湿汤

《三因》卷九。为《金匮》卷中"甘草干姜茯苓白术汤"之异名。见该条。

66216 除湿汤

【方源】《百一》卷三。

【组成】白术　白茯苓　苍术(米泔浸)　藿香叶(去土)　甘草　橘红　厚朴　半夏各一两　附子六钱(炮)　生姜二两

【用法】厚朴、半夏、生姜一处捣作饼子，焙干，同众药为粗末。每服三钱，水二大盏，加生姜十片，煎至一盏，不拘时候。

【主治】①《百一》：一切中湿，自汗，淅淅恶风，翕翕发热，阳虚自汗，呼吸少气，风湿，风温，表实里虚，表虚里实，腠理开疏，气道壅塞，虚汗，盗汗，目黄身肿，小便不利，胸膈溢满，腰疼体痛，呕吐涎沫。②《准绳·类方》：治寒湿所伤，身体重著，腰脚酸疼，大便溏泄，小便或涩或利，中湿，伤湿，疟。

66217 除湿汤

【方源】《普济方》卷一一八。

【组成】平胃散加半夏曲(炒)　藿香　白茯苓　白术各等分　(一方去白术，用赤茯苓)

【用法】用水二盏，加生姜、大枣，水煎服。

【主治】寒湿所伤或脾虚停湿，身体重着，腰脚痠痛，面足浮肿，腹胀痞满，大便溏，小便涩，及湿疟，泄痢。

①《普济方》：寒湿所伤，身体重着，腰脚酸痛、大便溏泄，小便涩闭。②《增补内经拾遗》：大病后，及疟痢疮疥后，脾土虚弱，一身之间，惟面与双足浮肿，早起则面甚，晚来则足甚。③《张氏医通》：湿热痞满不食。④《医略六书》：脾虚停湿，腰脚肿重，泄泻溺涩，脉缓者。⑤《金匮翼》：坐卧卑湿，或冒雨露，或著湿衣而伤湿、发热恶寒、身重自汗，骨节疼痛，腰脚痹冷。⑥《中国医学大辞典》：伤食兼湿。

【方论选录】《医略六书》湿滞伤脾不能健运，而湿流关节，气闭不行，故腰脚肿重，泄泻溺涩焉，苍术燥湿强脾，厚朴散滞消肿，陈皮理气和中，藿香温中快胃，白术燥脾湿以健中，半夏理脾湿以醒胃，茯苓渗脾湿，甘草缓中州，生姜以温散寒湿也，使湿散脾强，则肿退泻除，而小便亦利矣。此除湿健中之剂，为湿滞伤脾肿泻之专方。

66218 除湿汤

《医统》十七。为《直指》卷十三"治要除湿汤"之异名。见该条。

66219 除湿汤

【方源】《医统》卷八十八。

【组成】人参　白术　苍术　茯苓　半夏　厚朴(姜炒)　陈皮　藿香　大腹皮(洗)　甘草(炙)各等分

【用法】上㕮咀。水煎服，不拘时候。

【功用】《冯氏锦囊》：助脾去湿。

【主治】小儿寒湿所伤，手足软弱，不能抬举疼痛，吐泻。

66220 除湿汤

【方源】《片玉痘疹》卷十。

【组成】羌活　苍术　防风　木通　猪苓　泽泻　白术　赤芍　官桂

【用法】水煎服。

【功用】内渗其湿，外燥其表，令好收靥。

【主治】①《片玉痘疹》：痘疮，如初饮冷水，浸湿脾胃以致收靥不齐者。②《金鉴》：痘当收敛之时，有因湿盛而不得收敛者，其现证轻则有孔漏浆，重则遍体溃烂，肚腹胀、小便短。

66221 除湿汤

【方源】《回春》卷五。

【组成】人言二两

【用法】水煮滚热，再用毡片剪如底样五六片，入内同煮，令汁干为度，取出毡片，晒干或焙干。裹脚板上，出汗，如毡湿透，再换一片，出令汗尽即已。

【主治】风湿凝住，脚气疼痛。

66222 除湿汤

【方源】《明医指掌》卷四。

【组成】厚朴（姜汁拌，炒） 苍术（米泔浸，炒） 半夏各一钱 藿香叶三分 陈皮 茯苓 白术各五分

【用法】加生姜、大枣，水煎，温服。

【主治】痢疾病久，所下若鼻涕、冻胶，脉迟弱，形体虚怯，四肢倦怠。

66223 除湿汤

【方源】《济阳纲目》卷二十八。

【组成】茯苓一钱 桔梗 枳壳（麸炒）各八分 半夏 桑白皮 杏仁（去皮尖） 甘草（炙）各五分

【用法】上锉。加生姜二片，水煎服。

【主治】诸咳嗽。

【加减】伤风致咳，鼻流清涕，加防风、羌活、薄荷、荆芥、苏叶各一钱；肺受火邪、痰壅口干，加黄芩一钱、黄连七分；肺受湿痰，身重，加苍术、防己、山栀（炒）各五分；寒喘痰嗽，加麻黄七分；恶寒多汗，加桂枝、防风；风寒，加南星、竹沥半盏，姜汁少许；痰气咳嗽，加苏子、贝母各一钱；日晡咳者，火浮于肺，加五味子七粒，知母（炒）一钱，五倍子七分；久嗽，气虚血少，加参、耆、归身、款冬花、紫菀；午后阳虚咳嗽，加知母、川柏（俱蜜水蒸）四分，当归、生地、竹沥、姜汁、天门冬、贝母各等分；嗽若有血，加清血凉血之剂。

66224 除湿汤

【方源】《玉案》卷三。

【组成】茯苓 泽泻 茵陈 猪苓各八分 黄芩 黄连 知母 天花粉 白术各六分 防己 陈皮 青皮 苍术各三分

【用法】水煎，空心服。

【主治】黄疸内热，呕吐而渴，欲饮冷水，身体面目俱黄，小便不利。

66225 除湿汤

《金鉴》卷三十九。为《内外伤辨》卷十“除风湿羌活汤”之异名。见该条。

66226 除湿汤

【方源】《一盘珠》卷一。

【组成】苍术 白术 白苓 甘草 干姜 橘红 丁香各等分

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】中湿。

66227 除湿汤

【方源】《杂病源流犀烛》卷二十九。

【组成】半夏 苍术 厚朴 藿香 陈皮 甘草 白术 茯苓 木瓜 槟榔 白芷 生姜 大枣

【用法】水煎服。

【主治】腿、股、膝、膑、胫、足病之因于湿者。

66228 除湿汤

【方源】《眼科纂要》卷上。

【组成】连翘 滑石 车前 枳壳 黄芩 川连 木通 粉甘草 陈皮 白茯苓 荆芥 防风

【用法】水煎服。

【主治】风弦赤烂外障，脾胃湿热甚者。

66229 除湿饮

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】苍术（炒） 白术（炒） 骨皮 白鲜皮 白附子 五加皮 僵蚕（炒） 秦艽 连翘 白芷 羌活各一钱 防风一钱 蝉退三钱 生草一钱

【用法】生姜为引，水煎服。

【主治】身受潮湿，遍体发痒，或起疙瘩，或成疥疮。

66230 除湿酒

【方源】《中医正骨经验概述》。

【组成】虎胫骨三钱 防己三钱 独活二钱 云苓三钱 杜仲三钱 萆薢三钱 晚蚕砂三钱 松节三钱 茄根四钱 木瓜四钱

苍耳子四钱　枸杞子四钱　秦艽三钱　桑枝五钱　牛膝一钱　狗脊三钱　续断三钱　伸筋草三钱　豨莶草四钱　白酒五斤

【用法】虎胫骨酥炙为面，防己等十八味药共研粗末，再将虎胫骨面混入粗面中，用消毒纱布包好，用绳悬于酒中泡两周备用(冬季泡一月)。内服，每次三至五钱，一日两次。

【功用】除湿通经。

【主治】风寒湿痹。

【宜忌】孕妇禁用。

66231　除湿散

【方源】《内外伤辨》卷下。

【组成】神曲(炒黄)一两　茯苓七钱　车前子(炒香)　泽泻各五钱　半夏(汤洗)　干生姜各三钱　甘草(炙)　红花各二钱

【用法】上为极细末。每服三钱匕，食前以白汤调下。

【主治】伤马乳并牛羊酪水，一切冷物。

66232　除湿散

【方源】《医方类聚》卷一六九引《施圆端效方》。

【组成】苦参　何首乌　荆芥穗　蔓荆子　薄荷各一两　白芷　天麻　川芎　防风(并生用)　乌蛇(酒浸一宿，焙干)各半两

【用法】上为细末。每服三钱，茶、酒调下，不拘时候，一日三次。六日一浴，令汗出血气宣通，一月肤泽如故。

【主治】一切风毒疥癣，瘙痒，状如风癞。

66233　除湿膏

【方源】《寿世保元》卷二。

【组成】广胶三两　生姜半斤(捣汁)　乳香　没药(取末)各一钱半

【用法】上入铜勺内，火上熬化，移在滚汤内顿，以筋搅匀，入花椒末少许，再搅匀，摊厚纸或绢上。贴患处，用鞋底烘热熨之。

【主治】中湿，遍身骨节疼痛。

66234　除湿膏

【方源】《理瀹》。

【组成】羌活　草乌　苍术　防风　黄柏　灵仙　甘遂　大戟　葶苈　半夏　川芎　厚朴　槟榔　泽泻　白芥子　赤苓各二两　黑丑(煅)　白术　蓖麻仁　赤芍　乳香　没药　黄芩　陈皮　皂角　栀子　生姜各一两　或加大黄　黄连

【用法】油熬，黄丹收，滑石四两，松香六两，搅。内症贴脐，外症贴患处。

【主治】通治湿热。

66235　除湿膏

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】香油六斤四两　白蜡一斤十四两　生地　黄柏各三两　川椒　防风　甘草　大黄各二两　当归三两　生马钱子一斤四两

以上八味药料，用香油炸枯去滓滤净，将白蜡兑入溶化，待温浓时再兑：

冰片面二两　铜绿面三两　轻粉面四两　红粉面二两　青黛面四两　煅蛤粉三两

【用法】搅匀成膏，五钱重，装盒。涂抹患处。

【功用】解毒杀菌，消肿止痛。

【主治】湿疮臁疮，黄水疮，干湿疥癣，流脓流水，疼痒不止。

66236　除痰丸

【方源】《御药院方》卷五。

【组成】天南星(炒)，半夏(汤洗七次)各二两　蛤粉(微炒)一两　皂角大一挺(去皮弦子，用水一大盏揉汁)

【用法】上除皂角汁，三味共为细末，调面糊和丸，如梧桐子大。每服三十丸，渐加至五十丸，食后以生姜汤送下，临卧更进一服。

【主治】宿饮不消，咽膈不利，咳嗽痰涎，头目昏运。

【宜忌】忌甜物。

66237　除源散

《东医宝鉴·杂病篇》卷四。为《医学正传》卷二“溯源散”之异名。见该条。

66238　除瘟散

【方源】《普济方》卷三六九。

【组成】大黄　朴消(研)各一分　牵牛粉

半两 槟榔二个

【用法】上为末。每服半钱，临卧煎黄芩汤调下。

【主治】三十六种夜热昼凉，瘟病候。

66239 **除癣汤**

【方源】《医统》卷五十五。

【组成】防风 白芷 连翘 黄连 柴胡 甘草 蝉退 当归 生地黄 赤芍药各等分

【用法】用水二钟，加葱白三寸，煎八分，食远温服。出汗。

【主治】风癣。

66240 **除匶丸**

《种痘新书》卷十。为《痘疹全书》卷十二"黄连阴匶丸"之异名。见该条。

66241 **除根搽药**

【方源】《疮疡经验全书》卷一。

【组成】苋菜（阴干烧灰）三钱 铜绿二钱 枯矾二钱 轻粉一钱 雄黄一钱 鸡内金二钱 麝香二分 孩儿茶二钱

【用法】上为细末，麻油调搽，明日再用，甘草汤洗净，再烙如前，以平为度，后用生肌散。

【主治】茧唇久不愈者。金银烙铁烫毕随将药搽之。

66242 **除热饮子**

【方源】《杨氏家藏方》卷三。

【异名】除渴饮子（《普济方》卷一二〇）。

【组成】甘草（炙） 陈小麦 麦门冬 赤茯苓（去皮） 干葛 灯心 木通 人参各等分

【用法】上㕮咀。每服五钱，水一盏半，入竹叶数片，煎至一盏，去滓，食后温服。如发渴细细呷之。

【主治】心经客热，小便不通，口燥烦渴。

66243 **除热饮子**

《秘传眼科龙木论》卷三。为《圣济总录》卷一一一"除热饮"之异名。见该条。

66244 **除热粉散**

【方源】《幼幼新书》卷十五引《婴孺方》。

【组成】雷丸三两 牡蛎 桂心各一两

【用法】为粉。粉儿身。

【主治】伤寒，余热不退。

66245 **除渴饮子**

《普济方》卷一二〇。为《杨氏家藏方》卷三"除热饮子"之异名。见该条。

66246 **除管金丹**

【方源】《疡科遗编》卷下。

【组成】含水石一钱半（杵） 白砒一钱半（杵） 蟾酥五分 小红鼠八分（炙） 乳香一钱半（制） 没药一钱半（制） 冰片一分 阉鸡脚筒骨二根

【用法】先将鸡骨剜空，即以白砒、含水石装入骨内筑紧，外用盐泥固济阴干，瓦上炙焦存性，再同诸药共研极细末，用桃花绵纸撚成条，蘸薄浆糊粘药末在纸条上，阴干，收贮瓷器内。临用插入疮孔内，一日易七次，其管即退，新肉自生矣。

【主治】一切久远痔漏虚管。

66247 **除风导赤散**

【方源】《张皆春眼科证治》。

【组成】茅根9克 木通1.5克 地肤子3克 荆芥1.5克 甘草3克

【功用】清心胃，除湿热，祛风止痒。

【主治】眦帷赤烂（眦部睑缘炎）。以两眦部睑弦及皮肤溃烂为特征，往往浸渍两眦引起血轮发红，自觉发痒微痛。

【方论选录】茅根清心胃，导湿热下行；木通清心利小肠，兼通血脉；地肤子除风清热，且能祛风止痒；荆芥疏风散邪，且有退赤之功；甘草清心益脾，又能缓急止痛。

66248 **除风荆芥汤**

【方源】《圣济总录》卷十五。

【异名】荆芥汤（《普济方》卷四十六）、八风散（《普济方》卷四十七）。

【组成】荆芥穗 芎䓖 防风（去叉） 独活（去芦头） 甘草（炙，锉） 麻黄（去根节）各一两 人参二两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，加

生姜三片，薄荷三叶，同煎至七分，去滓，食后温服，临卧再服。

【主治】首风。头目昏弦，肢体疼痛，手足麻痹，上膈烦闷，或发寒热。

66249　除风益损汤

【方源】《原机启微》卷二。

【组成】熟地黄　当归　白芍药　川芎各一钱　藁本　前胡　防风各七分

【用法】作一服。水二盏，煎一盏，去滓，大热服。

【主治】眼目外伤，睛珠突出及血虚生翳膜，产后目痛。

①《原机启微》：目为物所伤，及亡血过多之病。②《伤科汇纂》：眼目被物撞损，及拳手打伤，睛珠突出，及血虚生翳膜。③《中国医学大辞典》：产后目痛。

【加减】伤于眉骨，加黄连；伤于䪼，加柴胡；伤于额交巅，耳上角及脑，加苍术；伤于耳后耳角耳前及伤于颊，加龙胆草；伤于额角及巅，加五味子；凡伤甚者，从权倍加大黄；眵多泪多，羞涩赤肿，加黄芩。

【方论选录】以熟地黄补肾水为君，黑睛为肾之子，此虚则补其母也；以当归补血，为目为血所养，今伤则目病，白芍药补血又补气，为血病气亦病也，为臣；川芎治血虚头痛，藁本通血去头风，为佐；前胡、防风通疗风邪，俾不凝留，为使。

66250　除风清脾饮

【方源】《审视瑶函》卷四。

【组成】广陈皮　连翘　防风　知母　元明粉　黄芩　玄参　黄连　荆芥穗　大黄　桔梗　生地各等分

【用法】上锉。白水二钟，煎至八分，去滓，食远服。

【主治】①《审视瑶函》：粟疮症。②《金鉴》：脾经风热，睑生风粟椒疮，泪多难睁，沙涩摩睛疼痛，粟疮如粟，其形黄软；及脾经湿热，椒疮如椒，其形红硬。

66251　除风解毒汤

【方源】《眼科临证笔记》。

【组成】二花一两　公英八钱　生地一两　归尾四钱　赤芍三钱　防风三钱　石膏八钱　连翘四钱　牛蒡子三钱(炒)　薄荷三钱　菊花四钱　黄芩三钱　甘草一钱

【用法】水煎服。外涂三白散。

【主治】风赤疮痍症(沙眼胞性湿疹)。初起赤疼，眵多流泪，隐涩羞明，睑肿而痒，重则眼睑内生粟疮。

【临证举例】风赤疮痍症　董某某，男。外感风邪，忽觉头痛目赤，晨起眵多粘连，六脉皆数，关脉略带浮大，两目赤肿，热泪不止。此乃脾经风火上冲于脑。先刺合谷、上星、睛明、太阳，以泻其热；再用三白散涂之，内服除风解毒汤，四剂后，泪止肿消。

66252　除邪清肺汤

【方源】《会约》卷十五。

【组成】当归二钱　白芍(酒炒)一钱半　前胡一钱半　半夏　陈皮　杏仁　茯苓　甘草各一钱　荆芥穗八分　麻黄(留节)四五分

【用法】加生姜、大枣为引，热服。

【主治】产后肺胃风寒，寒热咳嗽。

【加减】有汗者，去麻黄，加桂枝八分。

66253　除昏退翳丸

【方源】《济阳纲目》卷一〇一。

【组成】当归　川芎　木贼　天麻　甘菊花　白蒺藜　黄连　藁本　羌活　独活　青葙子　楮实子　荆芥　苍术　夜明砂　甘草各三钱

【用法】上为细末，炼蜜为丸，或饼或丸，每丸重一钱。每服二丸，临卧细嚼，米饮送下。刻日见效。

【主治】目内障。

66254　除疟胜金丸

【方源】《重订通俗伤寒论》。

【组成】酒炒透常山四两　草果　槟榔　制苍术各二两

【用法】上为细末，水法为小丸，外用半贝丸料为衣。每服二十至三十丸，清脾饮送下。

【功用】温利积水，消化顽痰。

【主治】痰疟因风寒而发，初起恶寒无汗，头身俱痛，继即往来寒热，发有定时，深者间日一发，极深者三日一发，发冷时形寒战慄，齿龂龂然有声，面头手足皆冷，甚则口唇指甲皆青，发冷过期，即发大热，皮肤壮热色赤，头甚痛，呼吸粗，渴欲饮冷，神倦嗜睡，或心烦懊侬，少则二三时，多则四五时，周身大汗，诸证若失，依此反复而作，累月经年，缠绵难愈，舌苔白滑而腻，甚或灰腻满布，脉沉弦而迟，胁下无痞块而轻者。

66255 除疮落靥膏

《囊秘喉书》卷下。为《杂病源流犀烛》卷二十八"犀角膏"之异名。见该条。

66256 除疫救苦丹

《验方新编》卷十五。为《仙拈集》卷一"除瘟救苦丹"之异名。见该条。

66257 除桂建中汤

【方源】《普济方》卷一九八。

【组成】黄耆一两半 白芍药一两 甘草二钱半

【用法】上为末。每服三钱，水一盏半，加生姜、枣子煎，入饴糖少许，再煎化，空心服。

【主治】脾疟。

66258 除热三黄丸

【方源】《外台》卷十三引《古今录验》。

【组成】大黄 黄芩 黄连 当归 茯苓 桂心 干姜 芍药各二分 栀子一十四枚(擘) 柴胡三分

【用法】上捣筛，炼蜜为丸，如小豆大。每服三丸，食前服。不知，增至十丸，欲取微利，以意增之。

【主治】骨热，身多疮，瘰疬，痈肿。

【宜忌】忌生葱、醋物、猪肉、冷水。

66259 除热结肠丸

【方源】《千金》卷五。

【组成】黄连 柏皮 苦参 鬼臼 独活 橘皮 芍药 阿胶各半两

【用法】上为末，以蓝汁及蜜为丸，如小豆大。日服三丸至十丸。(冬无蓝汁可用蓝子一合舂蜜和丸)

【主治】小儿热，下黄赤汁沫及鱼脑杂血，肛中疮烂，坐䘌生虫。

【方论选录】《千金方衍义》：痔疮内蕴湿热，外显血燥，结肠丸专泄湿热，仅以鬼臼杀毒邪，独活以散风热。

66260 除热清肺汤

【方源】《张氏医通》卷十五。

【组成】石膏三钱 黑参 生地黄 赤芍 贝母 栝楼根各一钱 麦门冬(去心)一钱半 甘草五分

【用法】水煎，温服。

【主治】麻疹尽透，而壮热咳嗽，大便秘结。

66261 除热清肺汤

【方源】《麻科活人》卷二。

【组成】麦冬 黄芩 石膏 玄参 生地黄 贝母 赤茯苓

【功用】清肺金，泻心火。

【主治】①《麻科活人》：麻疹粒头焦者。②《郑氏瘄科保赤金丹》：瘄症初起而多嚏者。

【加减】壮热，加地骨皮、黄连；气粗，加炒葶苈子、栝楼霜；便闭，加当归、火麻仁、枳壳。

66262 除热清肺汤

【方源】《麻症集成》卷四。

【组成】川贝 杷叶 尖生 瓜蒌 桑皮 麦冬 元参 赤芍 花粉 甘草

【主治】麻疹，风促痰鸣，热邪阻道，不得发越。

66263 除热蒺藜丸

【方源】《千金》卷二十三。

【组成】蒺藜子 大黄各一两 败酱一分 桂心 人参 附子 薏苡仁 黄连 黄耆 鸡骨 当归 枳实 芍药 通草各三分

【用法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三丸，食前以饮送下，每日三次。不知，益至五丸。

【主治】妇人乳肿痛。

【方论选录】《千金方衍义》：方用大黄、黄

连解热，桂心、附子散结，人参、黄耆固本，当归、芍药和营，败酱、薏苡败脓，枳实、通草利窍，尤赖蒺藜破除恶血，鸡骨引入厥阴也。

66264　**除热蠲痛汤**

《金匮翼》卷六。为《准绳·类方》卷四"除湿蠲痛汤"之异名。见该条。

66265　**除眩四物汤**

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归身(酒洗)　川芎　赤芍　生地黄各一钱　羌活八分　细辛五分　藁本七分　蔓荆子一钱　白芷一钱　甘草三分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】头目昏眩。

66266　**除病银屑丸**

【方源】《普济方》卷三七八。

【组成】银屑一针　紫菀　细辛　麻黄(去节)　黄芩各一分　人参　大黄　甘草(炙)各三分　牛黄四铢

【用法】上为末，炼蜜为丸，如小豆大。每服二三丸。

【主治】发痫，虽已愈，而根源不断，至长不除。

66267　**除烦四物汤**

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归(酒洗)　川芎　赤芍　生地　天花粉各一钱　五味子十个　麦门冬(去心)　前胡　干葛各八分　淡竹叶十个　人参七分　石膏一钱

【用法】上锉。水煎服，不拘时候。

【主治】虚损，面上心中时或烦热。

66268　**除烦宁燥汤**

【方源】《不居集》上集卷十六。

【组成】生地二钱　麦冬三钱　枣仁二钱　人参一钱　茯神一钱　知母一钱五分　五味子三分

【主治】劳烦过度，忧虑伤神，血少液枯，肾衰水涸，而致虚劳烦热，内热口渴，神昏躁妄，脉虚数无力。

【方论选录】麦冬、五味、人参、生脉散也，生津液而补接元气，同知母以清金水之化源；烦热者则神不宁，心血必亏，以生地、麦冬、枣仁、茯神补血安神。

66269　**除烦清心丸**

【方源】《玉案》卷五。

【组成】知母　黄连　天冬各一两　麦冬一两五钱　朱砂三钱

【用法】上为末，荷汁汤为丸，朱砂为衣。每服二钱，空心以白滚汤送下。

【主治】胆怯心惊，烦躁口苦。

66270　**除消气瘰丸**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】金果榄十六两　昆布八两　海藻八两　海胆八两　海燕八两

【用法】上为细末，用冷开水泛为小丸，朱砂二两、滑石八两五钱为衣闯亮。每服二钱，温开水送下，一日二次。

【功用】顺气和肝，消坚散结。

【主治】肝郁气滞，瘰疬结核，坚硬不消，肿胀疼痛。

66271　**除秽四物汤**

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归身(酒洗)一钱　南芎五分　白芍(酒炒)一钱　槟榔七分　半夏(汤泡，姜汁炒)一钱　干姜(炒)五分　桔梗五分　枳壳(去瓤，麸炒)七分　青皮(去瓤)七分　金沸草五分　陈皮一钱　青木香五分

【用法】上锉。加生姜三片，水煎服，不拘时候。

【主治】胃气不和，生呕，不进饮食，无物吐出者。

66272　**除秽靖瘟丹**

【方源】《松峰说疫》卷二。

【组成】苍术　降真香　川芎　大黄各二钱　虎头骨　细辛　斧头木(系斧柄入斧头之木)　鬼箭羽　桃枭(小桃干在树者)　白檀香　羊踯躅　羌活　甘草　草乌　藁本　白芷　荆芥　干葛　猬皮　山甲　羚羊角　红枣　干姜　桂枝　附子　煅灶灰　川椒

三柰 甘松 排草 桂皮各一钱（共为粗末） 明雄二钱 朱砂二钱 乳香一钱 没药一钱（四味另研）

【用法】上和，将药末装入绛囊，约二三钱，毋太少，阖家分带，时时闻嗅，已病易愈，未病不染。

【功用】除秽。

【主治】瘟疫。

66273 除痛解毒饮

【方源】《续名家方选》。

【组成】羌活 木通各一钱 忍冬 土骨皮 大黄 防风各七分 甘草二分

【用法】水煎服。

【主治】痛风走注，骨节疼痛。

66274 除湿二陈汤

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】陈皮 半夏 茯苓 秦艽 薏苡仁 麦冬 甘草各等分

【用法】加生姜一片，灯心二十根，水煎，食远服。

【主治】臀痈，上马下马。

66275 除湿木瓜汤

【方源】《医部全录》卷一九五。

【组成】苍术 白茯苓 白术 甘草 木瓜 薄桂 泽泻 薏苡仁 柴胡 青皮 蝉蜕 当归 白芍 生地黄 乌药 牛膝 黄柏 知母 防风

【主治】跟疽。

【加减】如痛，加乳香；虚，加人参、黄耆；冬加附子。

66276 除湿去痺汤

【方源】《摄生众妙方》卷四。

【组成】南木一钱二分 黄柏（盐炒）一钱二分 威灵仙（酒洗）八分 山楂子一钱 当归尾（酒洗）八分 香白芷一钱 草薢一钱 汉防已八分 木瓜一钱 川独活一钱 南星（火炮）八分 牛膝（去芦，酒洗）八分 红花五分 全蝎（炒，去刺）五分 厚朴（姜汁炒）七分 秦艽（去芦，酒洗，焙）七分

【用法】水二钟，加生姜三片，大枣一枚，煎至一钟，空心热服；次早晨服滓。如效，后复发，将此方倍秤，为末，炼蜜为丸，如弹子大。每嚼一丸，空心酒送下；白汤亦可。

【主治】十指顽木，屈伸直强，行步蹇难。

【宜忌】如夏时，勿宜赤足。

66277 除湿四物汤

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归（去头，酒洗） 川芎 赤芍 生地 赤茯苓（去皮） 苍术（米泔浸，炒） 猪苓 泽泻 木通 防风（去芦） 羌活各等分 甘草减半

【用法】上锉。水煎服，不拘时候。

【主治】感湿气，遍身骨节疼痛，四肢困倦。

66278 除湿压热饮

【方源】《银海精微》卷上。

【组成】细辛 苍术各一两 防风 知母 茺蔚子各一两半 桔梗二两 大黄 黄芩 栀子仁 朴消

【用法】水煎服。

【主治】拳毛倒睫。

【备考】方中大黄、黄芩、栀子仁、朴消剂量原缺。

66279 除湿达原饮

【方源】《松峰说疫》卷二。

【组成】槟榔二钱 草果仁五分（研） 厚朴一钱（姜汁炒） 白芍一钱 甘草一钱 栀子五分（研） 黄柏五分（酒炒） 茯苓三钱

【主治】瘟疫兼湿。

【加减】如兼三阳经症，酌加柴、葛、羌活。此方分两不过大概，临床加减用之。

【方论选录】瘟而兼温，故去知母而换黄柏，以燥湿，且能救水而利膀胱；去黄芩换栀子，泻三焦火而下行利水；加茯苓利小便而兼益脾胃；三者备而湿热除矣。再加羌活等风药，亦能胜湿，除湿散温，一举两得。

66280 除湿巡经丸

【方源】《魏氏家藏方》卷八。

【组成】好川椒

【用法】用大木瓜一个，切一顶盖，去子及瓤，将椒末实填于内，再以前顶合定，外以纸封缝，于饭上蒸令烂熟，去外皮，将药并此木瓜一并研细如膏为丸，如梧桐子大，焙干。每服三五十丸，加至七八十丸，空心以温酒送下，一日三次。

【功用】祛寒治湿，生肾水，轻腰脚，寻痛定疼。

【主治】一切脚气。

66281　除湿羌活汤

《回春》卷二。为《内外伤辨》卷中“除风湿羌活汤”之异名。见该条。

66282　除湿补气汤

【方源】《兰室秘藏》卷下。

【异名】清神补气汤(原书同卷)、清阳补气汤(《医学纲目》卷十二)。

【组成】升麻六钱　苍术四钱　酒黄柏　柴胡　黄耆各三钱　酒知母　藁本　生甘草　当归各二钱　五味子　陈皮各一钱五分

【用法】上锉，如麻豆大。每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，空心服。待少时，以早饭下之。

【主治】两腿麻木，沉重无力，多汗，喜笑，口中涎，下身重如山，语声不出，右寸脉洪大者。

66283　除湿补气汤

《医学纲目》卷十二。即《兰室秘藏》卷下“导气汤”。见该条。

66284　除湿补气汤

【方源】《蒿崖尊生》卷十二。

【组成】黄耆三钱　黄柏六分　陈皮一钱半　泽泻　升麻各一钱　白芍二钱半　生甘草二钱　生芩四钱　炙草半分　五味子五十个

【用法】水煎。稍热服。

【主治】暑天热伤元气，手麻木。

66285　除湿虎潜丸

【方源】《何氏济生论》卷一。

【组成】虎胫骨一两　川萆薢二两　香附　天麻二两　防己二两　桑寄生二两　黄柏二两　木瓜二两五钱　白茯苓一两五钱　五加皮一两五钱　川牛膝二两五钱　防风二两　当归二两　独活二两　钗石斛一两五钱　茅术一两五钱　秦艽一两

【用法】豨莶膏为丸。每服三钱，空心以开水送下。

【主治】中湿为痹。

66286　除湿固本膏

【方源】《疡医大全》卷二十八。

【组成】人参(另研)　大熟地　黄耆　五加皮(去粗皮)各五钱　大附子(去皮脐)　当归　川续断　川牛膝　尺桂(如无，厚桂代)各三钱　杏仁(去皮尖)　白芷(去稍)各一钱五分

【用法】上用麻油一斤，熬至药枯，滤清去滓，将油复入净锅内，入人参末，文火熬至滴水成珠不散，入炒过飞黄丹七两，收之，倾入水内，拔去火毒，瓷罐密贮，临用摊贴。

【主治】一切风湿，筋骨疼痛。

66287　除湿和血汤

《外科发挥》卷七。为《兰室秘藏》卷下“升阳去热和血汤”之异名。见该条。

66288　除湿定痛散

【方源】《杏苑》卷七。

【组成】黄柏(酒炒)　威灵仙(酒炒)各五钱　苍术　羌活　甘草各三钱　陈皮　白芍药各一钱

【用法】上为细末。每服二钱，以沸汤入生姜汁一蛤壳调服。

【主治】酒湿痰痛风。

66289　除湿胃苓汤

【方源】《外科正宗》卷四。

【组成】防风　苍术　白术　赤茯苓　陈皮　厚朴　猪苓　山栀　木通　泽泻　滑石各一钱　甘草　薄桂各三分

【用法】水二钟，加灯心二十根，煎八分，食前服。

【主治】①《外科正宗》：脾肺二经湿热壅

遏,致生火丹,作烂疼痛。②《金鉴》:缠腰火丹(俗名蛇串疮)属湿者,色黄白,水疱大小不等,作烂流水,较干者多疼。

66290 **除湿养荣汤**

【方源】《医学传灯》。

【组成】当归 川芎 白芍 熟地 牛膝 杜仲 木瓜 苡仁 续断 黄芩 石斛 五加皮

【功用】除湿养荣。

【主治】湿从下受,微肿而痿弱。

66291 **除湿养荣汤**

【方源】《医学传灯》。

【组成】当归 川芎 白芍 熟地 黄芩 知母 木瓜 苡仁 续断 五加皮 牛膝 杜仲 车前子 独活 防风 秦艽

【主治】干脚气,不红不肿,但骨内酸痛,治之余邪不解者。

66292 **除湿逐丹汤**

【方源】《辨证录》卷十。

【组成】防风三分 苍术三钱 赤茯苓五钱 陈皮五分 厚朴一钱 猪苓一钱 山栀子三钱 甘草三分 白术三钱 薄桂三分

【用法】水煎服。

【主治】肺脾湿热,满身发斑,色皆黄白,斑上有水流出,时而作疼,久之皮烂。

66293 **除湿蠲痹汤**

《杂病源流犀烛》卷十三。为《准绳·类方》卷四"除湿蠲痛汤"之异名。见该条。

66294 **除湿健脾汤**

【方源】《回春》卷三。

【组成】白术(去芦,炒)一钱五分 苍术(米泔浸,炒)一钱 白茯苓(去皮)一钱 白芍(醋炒)一钱 当归八分 厚朴(去皮,姜炒)六分 陈皮八分 猪苓 泽泻各七分 柴胡 升麻各五分 防风(去芦)六分 甘草(炙)四分

【用法】上锉。加生姜三片,大枣一枚,水煎,早、晚热服。

【主治】久泻,色苍而齿疏,倦怠,食减下坠。

【加减】久泻,加南星(面包煨)七分。

66295 **除湿消风饮**

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】当归四钱 川芎二钱 赤芍三钱 黄柏三钱 栀子三钱 胡黄连三钱 茵陈三钱 蕤蕤仁三钱 苍术二钱(炒) 防风二钱 白芷二钱 土茯苓三钱 薄荷二钱 泽泻三钱 草决明三钱 甘草一钱

【用法】水煎服。

【主治】迎风赤烂症(溃疡性睑缘炎)。

【临证举例】迎风赤烂症 李氏,女。因操劳过度,内伤肝肾,外感风沙,两目常常赤烂生黄痂,隐涩羞明,屡用桑叶熏洗,不能痊愈,按其脉,太阴细数而厥阴弦数,是知脾经有湿,肝经有火,而不正之风上攻于目,发生赤烂,迎风则甚。先将太渊、睛明、肝俞等穴略刺,外敷一扫光,内服除湿消风饮,五六剂而大轻,又将上星、丝竹空、攒竹轮刺,按前方再加地肤子三钱,乌梅三个,苦参二钱,七剂而赤烂全消。

66296 **除湿消胀汤**

【方源】《杏苑》卷六。

【组成】白术一钱五分 茯苓一钱 猪苓 泽泻各七分 厚朴 陈橘皮 瞿麦 扁蓄各五分 白豆蔻 木香 甘草各三分 木通四分 缩砂仁七枚 生姜三片

【用法】上㕮咀。水煎,滤清,以一蛤壳磨沉香浓汁和服。

【主治】久病虚人,水肿胀急。

66297 **除湿消毒饮**

【方源】《济阳纲目》卷八十三。

【组成】白术三钱 苍术(酒浸一宿) 黄连 茯苓 羌活 防风 泽泻 苦参各一钱 龙胆草七分 甘草六分

【用法】上锉。水煎服。

【主治】湿毒疠风。

66298 **除湿益气丸**

【方源】《内外伤辨》卷下。

【组成】枳实(麸炒黄色)　神曲(炒黄色)　黄芩(生用)　白术各一两　萝卜子(炒熟去秽气)五钱　红花三分

【用法】上为极细末,荷叶裹烧饭为丸,如绿豆大。每服五十丸,白汤送下,量所伤多少服之。

【主治】伤湿而,心腹满闷,肢体沉重。

66299　除湿清火汤

【方源】《证因方论集要》卷三。

【组成】广皮　半夏　枳壳　厚朴　大黄　黄连　赤芍　丹皮

【主治】虫,由木盛乘虚侮脾,昼时小腹苦痛,饮食不思,便闭不解。

【方论选录】痛本属虫而燥气逼之,便闭不解。用广皮、半夏以除脾湿,枳壳、厚朴以除脾滞,大黄以除久闭之热,黄连、赤芍、丹皮以清心肝二经之火,大便通而腹痛止矣。

66300　除湿清火汤

【方源】《眼科临症笔记》。

【组成】当归六钱　赤芍三钱　黄芩三钱　栀子三钱　苍术三钱(炒)　茵陈三钱　夏枯草三钱　胡黄连三钱　地肤子三钱　连翘三钱　甘草一钱

【用法】田三七五分为末,上药煎水冲服。外用化腐生肌散。

【主治】阴阳漏症(泪囊炎),肿胀赤痒,大眦清黄液常流。

66301　除湿清热散

【方源】《洞天奥旨》卷九。

【组成】茯苓二钱　炙甘草一钱　白术一钱　白芷五分　蒲公英二钱　泽泻一钱　猪苓一钱　苍术一钱　羌活五分　天花粉一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】燕窝疮,羊胡疮。

66302　除湿清痢饮

【方源】《慈航集》卷下。

【组成】车前子一两　赤苓三钱　炒枳壳一钱五分　炒厚朴一钱五分　槟榔一钱五分　甘草一钱五分　滑石三钱(引)　川连一钱　广木香一钱五分

【用法】水煎服。

【主治】夏秋之间,湿热盛,先泻后痢,腹中疼痛,里急后重之极,不痢不可忍,欲痢不得痢,口渴饮水,小便艰涩,小肠作胀,脉弦数而滑。

66303　除湿散风汤

【方源】《会约》卷十三。

【组成】苍术二钱　黄柏(炒)一钱半　川牛膝二钱　羌活　独活　防己　防风　甘草　木瓜　陈皮各一钱

【用法】取穿山甲(土炒成珠)五六片为引,水煎服。

【主治】胃风受湿,致为脚气,痿弱,筋骨疼痛。

66304　除湿解毒汤

【方源】《洞天奥旨》卷十一。

【组成】白术五钱　山药五钱　薏仁五钱　金银花一两　肉桂三分　泽泻二钱　乌梅根一把

【用法】水煎服。

【主治】湿毒足疮。

66305　除湿解毒汤

【方源】《赵炳南临床经验集》。

【组成】白鲜皮五钱　大豆黄卷四钱　生苡米四钱　土茯苓四钱　山栀子二钱　丹皮三钱　金银花五钱　连翘四钱　地丁三钱　木通二钱　滑石块五钱　生甘草二钱

【功用】除湿利水,清热解毒。

【主治】急性女阴溃疡,急性自家过敏性皮炎,急性接触性皮炎,下肢溃疡合并感染。

66306　除湿解毒汤

【方源】《中医症状鉴别诊断学》。

【组成】土茯苓　薏苡仁　草薢　车前子　大豆黄卷　泽泻　板蓝根　赤芍

【主治】湿毒浸淫,指缝湿烂及皮肤糜烂,湿毒血瘀痤疮。

66307　除湿蠲痛汤

【方源】《准绳·类方》卷四。

【异名】除热蠲痛汤（《金匮翼》卷六）、除湿捐痹汤（《杂病源流犀烛》卷十三）、除湿蠲痹汤（《类证治裁》卷五）。

【组成】苍术（米泔浸，炒）二钱 羌活 茯苓 泽泻 白术各一钱半 陈皮一钱 甘草四分

【用法】水二钟，煎八分，入姜汁、竹沥各三二匙服。

【主治】痹症，湿邪偏重，身体沉重痠痛，天阴加重或发作。

①《准绳·类方》：痛痹。②《景岳全书》：风湿痛痹。③《张氏医通》：身体沉重痠痛，天阴即发。

【加减】在上痛，加桂枝、威灵仙、桔梗；在下痛，加防己、木通、黄柏、牛膝。

【备考】按：《灵验良方汇编》有威灵仙、桂枝。

66308 除湿蠲痛汤

【方源】《济阳纲目》卷七十八。

【组成】羌活 苍术各一钱 当归 川芎 白芷 防己 黄柏 南星各八分 威灵仙 红花各六分 桂枝五分

【用法】加生姜三片，水煎，食远服。

【主治】湿热流注经络，四肢百节流布走痛，红肿或死血。

66309 除湿蠲痛汤

【方源】《便览》卷一。

【组成】苍术一钱五分 羌活一钱 茯苓一钱 泽泻一钱 白术一钱 陈皮八分 防己七分 木通七分 黄柏（盐酒炒）七分 牛膝（酒焙）八分 槟榔五分 大腹皮（酒洗）五分 甘草三分

【用法】上水二钟，煎至一钟，临服入姜汁三茶匙。

【主治】中湿。

66310 除湿蠲痹汤

【方源】《重订通俗伤寒论》引林羲桐经验方。

【组成】杜苍术 赤苓各二钱 生于术 泽泻 广皮各一钱半 川桂枝八分 拌研滑石四钱（包）

【用法】先用酒炒桑枝、青松针各一两，煎汤代水煮药，再用淡竹沥三瓢，姜汁三滴，和匀同冲服。

【主治】着痹，麻木不仁。

66311 除湿蠲痹汤

《类证治裁》卷五。为《准绳·类方》卷四"除湿蠲痛汤"之异名。见该条。

66312 除寒四物汤

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】熟地黄 南芎 白芍（酒炒） 白茯苓（去皮） 当归身（酒洗）各一钱 干姜五分 石菖蒲七分 黄耆（蜜炒） 人参各七分 甘草三分

【用法】上锉。水煎服，不拘时候。

【主治】气血虚，身体怯冷，但逢时少寒，为之耸肩。

【加减】寒战，加官桂。

66313 除瘵四物汤

【方源】《鲁府禁方》卷三。

【组成】当归（酒洗） 川芎 白芍（酒炒） 熟地黄 菟丝子（酒洗） 肉苁蓉（酒洗） 白术（去芦油）各一钱 五味子十个 陈皮 香附子 骨碎补各八分 鹿茸（酥炙）七分 破故纸（酒炒）七分

【用法】上锉。水煎，空心服。

【主治】身虚，四肢瘵弱，倦怠。

66314 除痰降火丸

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】前胡四十八两 花粉四十八两 黄芩六十四两 大黄一百一十二两 栀子（炒）四十八两 连翘四十八两 枳壳（炒）四十八两 橘皮十六两 枳实（炒）四十八两 桔梗四十八两

【用法】上为细末，用冷开水泛为小丸，每服二钱，温开水送下，一日二次。

【功用】清肺胃热，化痰止嗽。

【主治】肺胃不清,咳嗽痰盛,烦躁口渴,咽干声哑。

66315　**除障复明汤**

【方源】《会约》卷六。

【组成】羯羊肝一具(瓦上焙干)　熟地二两　菟丝子　蕤仁　麦冬各一两　车前子　地肤子　五味子　防风　黄芩　茯苓各一两　杏仁(炒)　枸杞子　茺蔚子　苦葶苈　青葙子各一两　细辛四钱　(加肉桂四钱更妙)

【用法】上为末,炼蜜为丸。每日三次。

【主治】内障失明。

66316　**除瘟化毒汤**

《喉证指南》卷四。为《时疫白喉捷要》"除瘟化毒散"之异名。见该条。

66317　**除瘟化毒汤**

【方源】《喉科家训》卷三。

【组成】粉葛根　忍冬花　霜桑叶　薄荷叶　生甘草　川尖贝　小生地　童木通　枇杷叶　淡竹叶

【功用】清解肺胃。

【主治】白喉初起,肺胃受邪,伏热未发,形寒发热,汗少心烦,咽喉红痛,脉来浮数,舌苔底绛薄白。

【加减】大便闭,加瓜蒌仁二钱,郁李仁二钱;胸下胀闷,加焦栀壳一钱五分,炒麦芽二钱;小便短赤,加车前子三钱,灯芯一钱。

66318　**除瘟化毒汤**

【方源】《中医喉科学讲义》。

【异名】桑葛汤。

【组成】桑叶四钱　葛根一钱　薄荷三钱　川贝母四钱　甘草二钱　木通三钱　竹叶三钱　银花四钱　瓜蒌皮四钱　土牛膝根六钱

【用法】水煎服。以上系成人用量,小儿酌减。

【功用】疏表,清热,解毒。

【主治】风热型白喉。

【加减】大便闭结者,加郁李仁四钱;胸下胀满者,加枳实、炒麦芽各三钱;小便短者,加车前、灯心各三钱。

66319　**除瘟化毒散**

【方源】《时疫白喉捷要》。

【异名】除瘟化毒汤(《喉证指南》卷四)。

【组成】粉葛二钱　黄芩二钱　生地三钱　栀仁二钱　僵蚕二钱(炒)　浙贝三钱　豆根二钱　木通二钱　蝉退一钱　甘草五分　冬桑叶二钱

【主治】白喉初起,及单蛾双蛾,喉痛。

【备考】《验方新编》本方用法:水煎服,生青果三个为引(如无生青果,或干橄榄亦可)。《喉症指南》引本方用川贝,不用浙贝。

66320　**除瘟化毒散**

【方源】《揣摩有得集》。

【组成】葛粉三钱　酒芩一钱半　生地一钱半　土茯苓五钱　贝母一钱半(去心)　射干一钱半　连翘一钱　归尾一钱半　降香一钱　赤芍一钱　人中黄一钱　牛子一钱　莲子心一钱　生草一钱　霜桑叶一钱

【用法】水煎服。

【主治】一切咽喉肿痛,不论有蛾无蛾。

66321　**除瘟化痰汤**

【方源】《喉科心法》卷下。

【组成】粉葛根二钱　金银花二钱　枇杷叶一钱五分(去毛,蜜炙)　竹叶一钱　大生地二钱(当用鲜者)　冬桑叶二钱　小木通八分　川贝母二钱　生甘草八分　薄荷五分

【功用】除瘟化痰。

【主治】白喉。

66322　**除瘟救苦丹**

【方源】《仙拈集》卷一。

【异名】除疫救苦丹(《验方新编》卷十五)。

【组成】天麻　麻黄　松萝茶　绿豆粉各一两二钱　雄黄　朱砂　甘草各八钱　生大黄二两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,如弹子大,收瓷器内,勿令泄气。大人每服一丸,小儿半丸,凉水调服,出汗即愈,重者连二服。

【主治】一切瘟疫时症,伤寒感冒,不论已传未传。

【宜忌】未汗之时切不可饮热汤，食热物，汗出之后不忌。

【备考】《验方新编》有干姜一两二钱。

66323 **除瘟救苦丹**

【方源】《北京市中药成方选集》。

【组成】薄荷一两 玄参（去芦）三两 花粉二两 银花三两 连翘三两 葛根一两 川芎一两五钱 黄芩一两 桔梗三两 白芷一两五钱 赤芍三两 淡竹叶二两 生地三两 甘草一两

【用法】上为细末，炼蜜为丸，重二钱。每服二丸，温开水送下，一日二次。

【功用】除瘟解毒，清热透表。

【主治】瘟疫传染，感冒风寒，憎寒壮热，骨节痠痛。

66324 **除瘴消痛散**

【方源】《准绳·疡医》卷三。

【组成】紫金藤（又名开心草）

【用法】上擂酒服。以滓敷患处。

【主治】蛇头疔及一切蝮蛇瘴。

66325 **除翳扫云散**

【方源】《眼科全书》卷六。

【组成】当归 防风 栀子 薄荷 川芎各二两 大黄三两 甘草 羌活各一两七钱 木贼 玄明粉各五钱

【用法】上为细末。热汤调下。

【主治】大小眦赤肿痛生肉翳者。

66326 **除翳明目汤**

【方源】《眼科阐微》卷三。

【组成】黄连 生地 赤芍 归尾 赤茯苓 防风 细辛 大黄 桑白皮各二钱 南谷精草 甘菊花 生甘草各三钱

【用法】水煎，食远服。点扫雾丹。

【主治】云翳初结，翳嫩火盛者。

66327 **除风湿羌活汤**

【方源】《内外伤辨》卷中。

【异名】除湿羌活汤（《回春》卷二）、除湿汤（《金鉴》卷三十九）

【组成】羌活七分 防风 升麻 柴胡各五分 藁本 苍术各一钱

【用法】上锉，如麻豆大，作一服。水二盏，煎至一盏，去滓，空心食前大温服之。

【主治】湿从外受，或一身尽痛，或头重如蒙，甚而昏冒。

①《内伤外辨》：风湿相搏，一身尽痛者。②《金鉴》：湿因外中，得之于天阴淫雨，晴后湿蒸，早晨雾露，及久卧湿地，远行涉水，瘴气山岚，其证头身重痛，甚而昏冒，大便溏薄，皮肤浮肿。③《杂病源流犀烛》：湿似疸（熏黄黑晦一症，若兼一身尽痛，乃是湿病，非疸，当从湿治），霍乱因湿，及因于湿四肢重着，骨节烦痛，胸膈滞闷。④《一盘珠》：风湿上冲，头重如裹，似有物蒙之，兼有热者。

66328 **除风湿羌活汤**

【方源】《脾胃论》卷中。

【组成】羌活一两 防风（去芦） 苍术（酒浸，去皮） 黄耆各一钱 升麻七分 炙甘草 独活 柴胡各五分 川芎 黄柏 橘皮 藁本各三分 泽泻（去须） 猪苓（去黑皮） 茯苓各三分 黄连（去须）一分

【用法】上㕮咀。每服三钱或五钱，水二盏煎至一盏，去滓，稍热服。量虚实施用。

【主治】风湿热痹，痿证，眩晕麻木。

①《脾胃论》：痿，湿气胜，风证不退，眩晕麻木不已者。②《准绳·类方》：着痹。③《证治宝鉴》：热痹，或痛风挟热者，肌肉热极，体上如鼠走，唇裂。

【方论选录】《医钞类编》：二活祛风胜湿，兼通关节；防风风药卒徒，善散太阳风湿；藁本专治太阳寒湿；川芎能升厥阴清气，上治头眩；六者辛温升散，又能解表之药，使湿从汗出也；苍术除湿，二苓、泽泻渗湿利水，四者使湿从人小便出也；黄耆固表，陈皮利气，黄柏除下焦之热，黄连除中焦之热，升柴升清降浊也。

【备考】本方方名，《玉机微义》引作"羌活汤"。

66329 **除风湿羌活汤**

【方源】《保命歌括》卷五。

【组成】羌活五分　防风　苍术(酒洗)　黄耆各一钱　独活　柴胡各五分　升麻七分　甘草(炙)　川芎　黄柏　橘皮　藁本各三分

【用法】水煎,食前服。

【主治】腰痛不可俯仰及四肢麻木。

【加减】脐下痛,加熟地五分;如不止,大寒也,加肉桂二分;胸中气滞,加枳实三分;胁下气滞,加青皮三分,如气促、少气者去之;身有疼痛,湿重者,加去桂五苓散一钱。

66330　除热丹参摩膏

《圣惠》卷八十五。为《千金》卷五"丹参赤膏"之异名。见该条。

66331　除热地黄汁汤

【方源】《幼幼新书》卷十一。

【组成】地黄汁半合　黄芩三分　大黄　甘草(炙)各一分　栀子仁二分

【用法】水八合,煮四合,去滓,下地黄汁。每服一合,日三夜一。

【主治】变蒸时患惊痫。已服四味汤紫丸,下后犹热,腹胀目视。

66332　除湿热和血汤

《东垣试效方》卷七。为《兰室秘藏》卷下"升阳去热和血汤"之异名。见该条。

66333　除五劳七伤万病散

【方源】《圣惠》卷五十六。

【组成】附子(炮裂,去皮脐)　川乌头(炮裂,去皮脐)　朱砂(细研)　芫青(糯米拌炒令黄色,去翅足)　川椒(去目及闭口者,微炒去汗)　雄黄(细研)　干姜(炮裂,锉)　人参(去芦头)　细辛　莽草(微炙)　鬼臼(去须)各半两　蜈蚣一枚(微炙,去足)　蜥蜴一枚(微炙)

【用法】上为散。每服半钱,以温酒调下,不拘时候。

【主治】风尸,及飞尸,鬼疰,风痹,身上痛如针所刺,呕逆痰癖。

66334　除痰清热保幼化风丹

【方源】《清太医院配方》。

【组成】羌活　独活　天麻　甘草　防风各二两　黄芩　荆芥穗　全蝎各一两　人参　川芎各五钱　胆南星三两

【用法】上为细末,炼蜜为丸,朱砂为衣,每丸重一钱。每服一丸,白开水化下;惊风,薄荷煎汤化下;伤食,山楂煎汤化下;夜啼,灯草煎汤化下;痰嗽,梨汤化下,一日二次。

【主治】小儿惊风潮热,痰涎壅盛,吐乳吐痰,消化不良,大便燥热,睡卧不安。

眉

66335　眉心膏

【方源】《理瀹》。

【组成】斑蝥　巴豆霜　蟾酥　朱砂　雄黄　麝

【用法】枣肉为丸,如绿豆大。先用生姜汁、烧酒、麦面捣匀,作饼七枚,涂天柱、颈骨及背心、胸坎、臂弯、腿弯七处,再用此贴眉心神庭穴,周时揭去。

【主治】久疟经年,寒热连绵,体壮实者。

66336　眉毛脱落丹

【方源】《青囊秘传》。

【组成】大皂角　鹿角　松毛各等分

【用法】上烧炭存性,为末。姜汁调擦,立出。

【主治】毛发脱落。

姚

66337　姚氏蟾酥丸

【方源】《霍乱论》卷下。

【组成】杜蟾酥(烧酒浸烊,如无杜酥,可以东酥加倍)　明雄黄(研)　朱砂(飞)各二两　木香(晒)　丁香(晒)　茅术(炒)　滑石(飞)各四钱　当门子一两

【用法】上各为极细末,和入蟾酥杵匀为丸,如黍米大,每药丸就四两,以火酒喷湿,盖在碗内,加入飞净朱砂六钱,竭力摇播,以光亮为度。

【主治】暑月食凉饮冷,食物不慎,兼吸秽

恶，成痧胀腹痛，或霍乱吐泻。

贺

66338 贺兰先生解毒丸

【方源】《御药院方》卷七。

【异名】保命丹、化毒丹。

【组成】贯仲 茯苓 黄药子 蓝根 干葛 地黄 雄大豆 甘草 滑石 缩砂仁 阴地厥 薄荷各三两（好者用） 土马鬃 绿豆粉 益智 寒水石 山豆根 紫河车 马簪孛 草龙胆 白僵蚕 百药煎 山栀子 大黄各一两

【用法】上为细末，蜜水浸蒸饼为丸，如弹子大。每服一丸，细嚼，新水送下；小儿一丸分作四服，煎薄荷汤放冷磨下；小儿急惊，磨刀水下。此药长宜将带备急，若夏月频服，使诸疾不生。

【功用】善解诸毒。

【主治】药毒，酒毒，山岚瘴毒，果毒，肉毒，面食鱼菜毒，冬月丹毒，夏月暑毒，伤风后余热，小儿疮疹后毒，及喉闭之患，小儿急惊。

蚤

66339 蚤休散

【方源】《青囊全集》卷下。

【组成】蚤休（即血山七兜） 飞天蜈蚣（草名红马鞭草，覆地形似蜈蚣者） 鲜水晶花苗并梗（均收存阴干听用）

【用法】水煎服。

【功用】取汗解表。

【主治】一切恶疔。

66340 蚤休散

【方源】《药奁启秘》。

【组成】蚤休不拘多少（晒干，研末）

【用法】上药用菊花露同蜜调敷。

【主治】疔疮肿疼。

柔

66341 柔金丸

【方源】《丹溪心法附余》卷二十四。

【组成】山栀子（去皮，炒焦黑）

【用法】上为末，面糊为丸。

【功用】解五脏结气，补少阴经血。

66342 柔脾汤

【方源】《千金翼》卷十五。

【组成】干地黄三两 黄耆 芍药 甘草（炙）各一两

【用法】上切，以酒三升渍之，三斗米下蒸，以铜器承取汁。随多少服之。

【主治】脾气不足，下焦虚冷，胸中满塞，汗出，胁下支满，或吐血、下血。

66343 柔脾汤

【方源】《妇人良方》卷七引《养生必用》。

【组成】甘草 白芍药 黄耆各一两 熟地黄三两

【用法】上为末。每服四钱，水、酒各一盏，煎至七分，去滓，取六分清汁，食前温服。

【主治】妇人虚劳吐血、衄血、下白，汗出。

【备考】《鸡峰》有桂一两。

66344 柔肝宣肺汤

【方源】《医门补要》卷中。

【组成】石决明 羚羊角 丹皮 白菊花 白前 杏仁 苏子 桑叶 象贝 枇杷叶

【主治】肝火冲肺咳。

66345 柔肝息风煎

【方源】《重订通俗伤寒论》引胡在兹方。

【组成】制首乌 黄甘菊 辰茯神 归身 石斛 川断 广郁金各三钱 白蒺藜 远志肉各一钱半 川芎 明矾各八分

【功用】柔肝育阴，息风除涎。

【主治】肝阴虚，内风上冒神明，兼挟涎沫，而为失心癫狂，延久不愈。

癸

66346 癸字化毒丸

【方源】《疮疡经验全书》卷六。

【组成】牛黄五分　鹿角屑三钱　沉香　生生乳各一钱　朱砂　雄黄　月月红　白鲜皮　乳香　穿山甲各一钱半　神水一钱(用出山铅十斤打薄片二十块,块上贴银箔,取尖底缸二只一样的,上缸开一孔,底中绳穿铅片悬上缸,下缸盛米醋、火酒各十隅,缸口架瓷盆一个,将缸合好,用面条封固,以文火下烧,俟酒醋干,取出盆中者是)　人中白二钱五分(择乡间诚实人家,不生疮毒疾病者,取制入药有效)　制何首乌三钱

【用法】上为末,用神曲末五钱,打稠糊,入药捣均为丸,如梧桐子大,另研朱砂为衣。每早空心服十五丸,晚空腹服九丸,人参汤送下;枸杞汤亦可。

【主治】毒结于膀胱并肾经,内作骨痛流注,上下抽掣,时痛发块,百会、委中、涌泉等穴,或阳物腐烂不已,或阴囊肿胀作溃,或生独脚杨霉疮,或传他经,致生别病。

【宜忌】病去药减,如余毒未尽,药不可撤,百日内勿使大劳大怒,顺时调理。

孩

66347　孩儿散

【方源】《东医宝鉴·外形篇》卷四引《医学入门》。

【组成】熊胆五分　孩儿茶二分　片脑一分

【用法】上为末,人乳调。涂肛上,热汁自出而肛收。

【主治】肛脱热肿。

【备考】本方方名,疑为"孩儿茶散"。

66348　孩儿茶散

【方源】《杏苑》卷八。

【组成】黄连一钱　孩儿茶一钱　炉甘石五钱(火煅红,黄连煎滚汤淬七次)　轻粉五分　龙脑五分

【用法】各研细和匀。时常用甘草汤温洗净,干敷。

【主治】茎上湿痒作疮,及注干疮。

绒

66349　绒花散

【方源】《回春》卷二。

【组成】鳖甲(醋炙九次)　鹿茸　乳香　没药　绒花树皮(即夜合花根)各二钱

【用法】上各为细末,合一处研匀。每服五钱,五更以黄酒送下。男子至重者,二服出汗;女子至重,止用一服。

【主治】左瘫中痪。

结

66350　结子油

【方源】《外科全生集》卷四。

【组成】白明矾(研粉,铺棉纸上,卷成长条,打成结子几个,入菜油内浸透,取油结子放铁筛上,用火烧,结于内所滴下油,仍滴于浸油碗内,烧至焦枯,以诸结研粉)　制松香(末)约一半

【用法】共调油内。日以拂疮,早、晚两次。五六日愈。

【主治】头面肥疮。

【宜忌】戒食猪肉、虾、蟹,并忌煎炒、熬油发毒等物,食则延开难愈。

66351　结水汤

【方源】《圣济总录》卷八十。

【组成】黄连(去须)　大黄(锉碎,醋拌炒干)各一两　甘遂(微炒)　葶苈(炒令紫)各一两

【用法】上为粗末。每服二钱匕,水一盏半,煎至七分,去滓温服,一日二次。

【主治】水蛊,内肿即冷,外肿即热,气急无力。

66352　结杀膏

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】结杀(香木,产西方诸国,花极馨香,熬之成膏)　胡桃仁　香油

【用法】和涂。

【主治】头风白屑。

66353 **结阴丸**

【方源】《活人方》卷二。

【组成】生地四两 白芍二两五钱 山药二两五钱 槐米一两五钱 川黄连一两五钱 黑荆芥一两五钱 茜草一两五钱 地榆一两五钱 乌梅肉一两 升麻一两 扁柏一两 罗汉松叶一两

【用法】炼蜜为丸。每服三钱,早上空心吞服。

【功用】清热凉血,祛风散滞。

【主治】脾虚气滞,肝虚血热,血随气而沉陷于阳明大肠,始为肠风脏毒,久则渗漏无度,传为结阴便血之症。

66354 **结阴丹**

【方源】《御药院方》卷八。

【组成】枳壳(麸炒,去瓤) 威灵仙 黄耆 椿根白皮 陈皮 何首乌 荆芥穗各等分

【用法】上为细末,酒而为糊,纳入蜜少许同和为丸,如梧桐子大。每服五十丸至七十丸,食前以米饮送下。

【主治】肠风下血及脏毒下血,诸大便下血疾。

【方论选录】《医钞类编》:此方用枳壳以破滞气;灵仙宣通五脏,通行十二经络;黄耆补气;陈皮理逆气;椿皮苦燥湿,寒胜热,涩收敛,入血分而涩血;首乌甘益血,涩敛血;荆芥通利血脉,散瘀破结;加酒者,和血行气以助药力也。

66355 **结肠丸**

【方源】《外台》卷二十五引《集验方》。

【组成】苦参 橘皮 独活 阿胶(炙) 芍药 干姜 黄柏 甘草(炙) 鬼臼各四分

【用法】上为末,蜜与胶共烊以和丸,如梧桐子大,晒燥。每服十丸,以饮送下,一日三次,不知稍加。

【主治】热毒下不断,不问久新;诸疰下及卒下。

【宜忌】《普济方》:忌海藻、菘菜。

66356 **结乳膏**

【方源】《全国中药成药处方集》(天津方)。

【组成】香油十五斤 章丹九十两

【用法】以上香油炼至滴水成珠,入章丹搅匀成膏,每膏药油二斤兑韭菜汁、铜绿面、血竭面、乳香面、没药面各五钱,白砒面三钱,麝香六分,搅匀,每张净油一钱重。贴患处。

【功用】活血化瘀,消肿止痛。

【主治】妇女乳岩,乳肿乳痛,吹乳乳疼,乳房坚硬有核,初起红肿,疼痛难忍,瘰疬结核。

【宜忌】已破勿贴。

66357 **结毒丸**

【方源】《广笔记》。

【组成】钟乳石(研如飞面,水飞)一两五钱 真牛黄(研如飞面)三钱 珍珠(研如飞面)四钱 猪牙皂角(去皮膜,为极细末)七钱 桦皮灰(存性,研如飞面)四钱 百草霜(庄家锅底者佳)七钱

【主治】结毒。

66358 **结痂散**

【方源】《疡医大全》卷三十三。

【组成】白芷一钱 何首乌七分 川芎 甘草各五分 木通 蝉蜕各三分 白术 荷叶各二分

【用法】水煎服。

【主治】痘不收,作痒。

66359 **结毒灵药**

【方源】《外科正宗》卷三。

【组成】水银一两 朱砂 雄黄 硫黄各三钱

【用法】上为细末,入阳城罐内,泥固,铁盏梁兜固紧封口,点三炷香为度,用水擦盏内,火毕,次日取出盏底灵药,约有一两五六钱。治寻常腐烂之症,灵药五钱,轻粉五钱,和匀碾细,小罐盛贮,纱封罐口,临用甘草汤洗净患上,将罐倒悬,纱眼内筛药患上,用后单油膏药盖之,一日一换,自效。男子、妇人咽烂者,灵药一钱,加人中白二分研细吹之,日用三次,内服不二散,其疼即止,随可饮食。

【主治】杨梅结毒，腐烂作臭，或咽喉、唇鼻腐坏日甚者并效。

66360 结毒灵膏

《药奁启秘》。为《疡医大全》卷三十四"结毒膏药"之异名。见该条。

66361 结毒膏药

【方源】《疡医大全》卷三十四。

【异名】结毒灵膏(《药奁启秘》)。

【组成】葱头七个 麻油四两(熬葱头，去葱滓) 黄丹一两(搅匀) 黄蜡 白蜡各五钱(熔化) 去油乳香 没药各二钱 轻粉三钱 犀牛黄一分 珍珠二分

【用法】搅成膏，摊贴。

【主治】结毒腐烂。

66362 结毒擦药

【方源】《疡医大全》卷三十四。

【组成】水银一两五钱 生大黄 大腹皮(炒) 胆矾各一钱 轻粉一钱二分 甘草 番打麻六分(患重者加三分)

【用法】上为细末，用真麻油作四十八丸，每日早、午、晚共用十二丸，擦手四弯、脚四弯。口含冷水，热则吐去，又换冷水含之。

【主治】结毒。

【宜忌】忌盐、酱、醋、酒、辛辣之物，房事断要忌一百天。

66363 结毒牛黄丸

【方源】《疡医大全》卷三十四引胡鸣岐方。

【组成】透明雄黄四两(研细)

【用法】取芦柴截筒，将雄黄末装入，面塞筒口，将锅内放水，上用芦柴作架，取雄黄筒横放架上，离水二寸许，蒸四炷香足，火候方到；次早取出雄黄，每雄黄一两，入好牛黄四分，不可少，麝香五厘，配定研匀，老面糊为丸，如黍米大。每早空心服四分，用猪胰子煎汤送下。服至四两，痊愈。

【主治】杨梅结毒，小儿胎毒，下疳。

【宜忌】忌虾、蛋。

66364 结毒生肌散

【方源】《青囊秘传》。

【组成】赤石脂(浸淡)一两 龙骨一两 乳香(炙) 没药(炙) 枯矾(炙)各五分 文蛤(炙)五分 白芷 轻粉 血竭 朱砂 象皮(炙)各一钱

【用法】上为末，加麝香，龙脑香各少许，和匀。

【主治】下疳。

66365 结毒神效方

【方源】《玉案》卷六。

【组成】当归 川芎各三钱 肥皂子七个 防风 生地 白鲜皮 赤芍 金银花 牛膝 人参 防己 威灵仙各二钱 土茯苓四两

【用法】水四碗，煎二碗，温服。服后饮酒，以助药力。

【主治】一切结毒，并筋骨痛。

66366 结毒清烂丸

【方源】《青囊秘传》。

【组成】乳香 没药 辰砂 雄黄 硫黄各二钱 白砒一钱

【用法】上为细末，用黄占五钱，熬化入水，浮，取出，再熬入，再取出，如此三次，再入前药末为丸，如芥子大。每用土茯苓四两五钱，又人皂角三钱，再煎汤送药七八厘，每日早、中、晚分服。能补完全耳鼻，复长肾茎，一服止痛，二三日愈。如流臭脓，毒尚未尽；如不臭，毒已尽，自然渐渐完全。

【主治】结毒，耳、鼻、肾茎溃烂。

【宜忌】不宜多服，恐患处长高。只治此三处，别处不治。

66367 结毒紫金丹

【方源】《外科正宗》卷三。

【异名】治毒紫霞丹(《中国医学大辞典》)。

【组成】龟版(放炭火上炙焦，用新安酒浆浓笔蘸浆涂上，反复炙涂三次，以焦黄为末)二两 石决明(用九孔大者，煅红，童便内渍之一次) 朱砂(明亮者)各(末)二钱

【用法】上为极细末，烂米饭为丸，如麻子大。每服一钱，量病上下，食前后服；筋骨疼

痛,以酒送下;腐烂者,以土茯苓汤送下。至重者四十日而愈。

【主治】远年近日杨梅结毒,筋骨疼痛,日久腐烂,臭败不堪闻者,或咽喉唇鼻破坏,诸药不效者。

66368 **结毒紫金膏**

【方源】《性病》。

【组成】明净松香 皂矾各一斤(煅赤)

【用法】共研极细末。香油调稠,先用葱艾甘草汤洗净患处,再搽此药,油纸盖住,以软布扎紧,三日一换。

【主治】杨梅结毒,腐烂作臭,脓水淋漓。

66369 **结核消解散**

【方源】《证治宝鉴》卷九。

【组成】南星(姜制) 半夏(姜制) 枳实 桔梗 柴胡 连翘 黄连 赤芍 防风 独活 白附子 苏子 莪术 蔓荆子 木通 甘草

【用法】加生姜、灯心,煎服。

【主治】瘰疬。

【加减】有痰,加竹沥。

绛

66370 **绛雪**

【方源】《医统》卷十四。

【组成】龙脑一钱二厘半 硼砂一钱 珍珠三钱

【用法】上研匀。每服一字,掺于舌上,津咽之。

【主治】唇口生疮,声哑。

66371 **绛雪**

《医统》卷六十四。为《圣济总录》卷一二四"桃红散"之异名。见该条。

66372 **绛雪**

【方源】《简明医彀》卷五。

【组成】软石膏(煅,飞) 玄明粉各二钱 朱砂(飞) 硼砂各一钱 冰片二分

【用法】上研细匀。频掺患处,咽下不妨;喉痛,芦管吹入。

【主治】舌疮,口疮,咽喉肿痛。

66373 **绛雪**

【方源】《玉钥》卷上。

【异名】绛雪丹(《急救经验良方》)。

【组成】寒水石二钱 蓬砂一钱 辰砂三钱 大梅片三分 孩儿茶二钱

【用法】上为极细末。每用一字,掺于舌上,津液咽之;或吹患处。

【主治】咽喉肿痛,咽物妨碍,及喉癣,口舌生疮。

66374 **绛玉散**

【方源】《卫生宝鉴》卷十九。

【组成】黄丹(炒红)二两重 绿豆粉(炒黄)三两重

【用法】上为末。清油调,鸡翎扫于疮上,后掺胜金散覆之。

【主治】小儿头上并身上湿疳,时复痒痛,皮肤湿烂,久不愈。

66375 **绛朱丹**

【方源】《卫生总微》卷六。

【组成】南星二两(炮) 半夏三两(汤洗七次去滑) 白矾(枯)一两半 滑石二两(火煅通赤) 铅霜半两(研)

【用法】上为末,糊为丸,如麻子大,朱砂为衣。每服十丸,乳食前以生姜汤送下。

【主治】惊痫涎痰,咳嗽喘满。

66376 **绛红膏**

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】真银朱(为末)

【用法】以真生桐油调,摊如膏,先用加味神灯捻照毕,次用此贴之。

【主治】一切肿毒已成。

66377 **绛矾丸**

【方源】《重订广温热论》卷二。

【异名】黄病绛矾丸(《全国中药成药处方集》杭州方)。

【组成】皂矾五钱(面裹烧红) 杜苍术五钱 真川朴八钱 广皮六钱 炒焦甘草三钱

【用法】煮红枣肉为小丸,姜半夏粉一两为

衣。每服一钱半或二钱,淡姜汤送下,每日两次。

【主治】①《重订广温热论》:湿遏热伏,发为阴黄,黄而昏暗,如熏黄色,而无烦渴热象者。②《全国中药成药处方集》(杭州方):湿热黄胖,脱力劳伤,腹胀肠红,食积痞块,腿足浮肿,小便不利。

【宜忌】《全国中药成药处方集》(上海、南昌方):忌食茶面,孕妇忌服。

66378　绛矾丸

【方源】《中国医学大辞典》。

【组成】绛矾六两　厚朴　白术(炒焦)　茯苓各三两　枳壳(炒焦)　茅术(炒焦)　广皮各二两

【用法】上为细末,米汤泛为丸,如梧桐子大。每服三二十丸,熟汤送下。

【主治】湿热肠红,脱力劳伤,黄病腹胀,腿足浮肿,食积痞块,疟痢。

66379　绛矾丸

【方源】《中国内科医鉴》后篇。

【组成】绛矾　厚朴　橘皮　三棱　莪术　黄连　苦辛　术　甘草　水莎

【用法】用醋糊为丸。

【主治】黄疸。

66380　绛宫丸

《鸡峰》卷十八。为《普济方》卷四十三引《旅舍方》"火府丹"之异名。见该条。

66381　绛宫丸

【方源】《医学纲目》卷十九。

【组成】大黄(酒蒸)二两　山楂　连翘　川芎　当归(酒洗)　麦芽　桃仁　芦荟　甘草　芸苔子各一两　黄连(酒浸)　南星(酒浸)　海藻(酒洗)各一两半　升麻　羌活　桔梗　防风各半两　白术二两　黄芩(酒炒)半两

【用法】上用神曲糊为丸。

【主治】瘰疬。

【加减】已破,加人参一两作膏;用甘草节、僵蚕同煎。

66382　绛宫汤

【方源】《瑞竹堂方》卷二。

【组成】露蜂房　血余各三两　白茅根五钱

【用法】上为细末,入生麝香少许。每服二钱,食前温酒调下。淋止不须服,甚者不过三五服有效。

【主治】三焦气滞,腹胁生痛,因服热药,引入下焦,膀胱受热,小便淋沥,脐下胀痛。

66383　绛珠膏

【方源】《外科大成》卷一。

【组成】麻油十两　鸡子黄十个　血余五钱　天麻子肉八十一粒　白蜜蜡三两　黄丹(飞)二两　乳香　没药　轻粉　珍珠　血竭　儿茶各三钱　朱砂二钱　冰片一钱　麝香五分

【用法】上将油煤血余化,麻子肉枯,去滓入蜡,候化离火,少时入黄丹搅匀,再加细药,和匀收用。

【功用】去腐,定痛,生肌。

【主治】溃疡。

【加减】乳岩,加银朱一两。

66384　绛袍散

【方源】《慈幼新书》卷十一。

【组成】五倍子　真降香各二钱

【用法】为末。敷上。

【主治】刀伤。

66385　绛雪丸

【方源】《圣济总录》卷二十八。

【组成】消石一两　丹砂一分

【用法】上研如粉,烧粟米饭和为丸,如弹子大。每服一丸,沙糖冷水化下。服药后便睡,移时汗出为效。

【主治】伤寒,发狂眼赤,大小便血出,身如金色,及六七日狂躁发热。

66386　绛雪丹

【方源】《圣济总录》卷一七九。

【组成】丹砂(研)半两　焰消(研)一两

【用法】上各为细末,再同研,炼蜜和为丸,

如梧桐子大。每服一丸，沙糖水调化，取下涎即安。

【主治】小儿阳毒，烦躁，吐血，衄血，渐生赤斑。

66387 **绛雪丹**

【方源】《卫生总微》卷七。

【组成】朱砂半两（水飞） 消石二两（研） 龙脑少许

【用法】上为细末，白米饭和为丸，如鸡头子大。沙糖水化下。

【主治】伤寒五六日，发黄，小便不利，烦躁热闷，饮水烦躁不解。

66388 **绛雪丹**

【方源】《普济方》卷三八四引《全婴方》。

【组成】芒消一两 朱砂一两

【用法】上为末，饭饼为丸，如鸡头子大。三岁儿每服一丸，沙糖水化下，不拘时候。

【主治】小儿诸热阳盛，发狂躁，眠卧不安，目赤烦渴。

66389 **绛雪丹**

【方源】《卫生鸿宝》卷二引《方氏喉科参指掌》。

【组成】飞消一两（马牙消，用大西瓜上好头藤者一二个，挖去瓤，装满消，悬屋檐下，用瓷盆接其所滴之水，冰凝成雪；冬令其雪凝于瓜皮上者名银粉雪，更佳，其瓜内不尽之消取出，加消，另装入一瓜，如法再取，其消装过四五个瓜者，虽未飞雪亦可用） 朱砂（水飞）一钱 冰片 麝香各二分

【用法】研匀，每用少许吹患处，其凉如雪。

【主治】喉风肿痛，重舌，重腭，牙痈，悬痈，燕口，舌疔，及喉癣，喉疳溃烂者。

66390 **绛雪丹**

《急救经验良方》。为《玉钥》卷上“绛雪”之异名。见该条。

66391 **绛雪丹**

《华佗神医秘传》卷三。为《圣济总录》卷一二二“绛雪散”之异名。见该条。

66392 **绛雪散**

【方源】《圣济总录》卷一〇七。

【组成】红雪半两 生麦门冬（去心） 萎蕤 秦皮（去粗皮） 赤茯苓（去黑皮）各一两半 升麻一两 淡竹叶五十片

【用法】上除红雪外，捣罗为散。每服三钱匕，水二盏，煎至一盏，抄红雪半钱匕调匀，食后温服。

【主治】肝心风热邪毒上攻，目赤痒。

66393 **绛雪散**

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】木通（锉） 桔梗（锉，炒） 槟榔各二两 枳壳（去瓤，麸炒） 犀角（镑）各一两半 柴胡（去苗） 升麻 木香 赤茯苓（去黑皮）各二两 桑根白皮（锉） 山栀子仁各四两 桂（去粗皮） 人参各二两 苏枋木五两 朴消（研）一斤 丹砂（研）一两 麝香（研）一分 诃黎勒（去核）五枚

【用法】上除朴消、丹砂、麝香外，各锉细，以水二斗，于银器内慢火熬至七升，以生绢滤去滓，再煎至五升，下朴消，以柳木篦搅，勿住手，候稍凝，即去火，倾入盆中，将丹砂、麝香末拌令匀，瓷器盛之，勿令透气。每服一钱或二钱，食后临卧，以冷蜜汤调下。

【主治】热结喉间，连颊肿不消，心膈烦满。

66394 **绛雪散**

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【异名】代针散（《御药院方》卷九）、绛雪丹（《华佗神医秘传》卷三）。

【组成】硇砂（研） 白矾（研）各一钱 消石（研）四两 铅丹（研）半两 马牙消（研）一分 巴豆（去皮）六枚

【用法】上将五味入罐子内烧，候有火焰，乃入巴豆，良久又入蛇蜕皮一条取出，煅熟。放冷研末。每用少许，吹入喉中。腊月合尤佳。

【主治】咽喉肿痛，气息难通。

66395 **绛雪散**

【方源】《宣明论》卷十。

【组成】黄芩 黄丹 汉防己 栝楼实各等分

【用法】上为细末。每服二钱,临卧时以温浆水调下,并进三二服,即止。

【主治】消渴,饮水无度,小便数者。

【备考】《普济方》有黄连。

66396　绛雪散

《杨氏家藏方》卷十一。为《圣济总录》卷一二四"桃红散"之异名。见该条。

66397　绛雪散

【方源】《寿世保元》卷五。

【组成】白矾(枯)一两　朱砂一钱　生姜二片

【用法】上为末。每服一钱五分,轻者一钱,空心以白汤送下。

【主治】诸心气痛不可忍者。

66398　绛雪散

【方源】《救急选方》卷上引刘长春方。

【组成】朱砂一钱　金箔三叶　明矾一两(枯)

【用法】上为细末。每服一钱半,轻者一钱,空心以白汤送下。

【主治】诸心气痛,不可忍者。

66399　绛雪散

【方源】《痯疹选要》。

【组成】石膏　枯矾　硼砂　皂荚　文蛤　青盐　薄荷　青黛　白盐梅　人中白　雄黄　冰片　血余

【用法】上为末。敷患处。

【主治】牙疳。

66400　绛雪散

【方源】《治痧全书》卷下。

【组成】石膏二钱　薄荷　硼砂　血竭各五钱　朱砂三分　明矾二分　冰片二分

【用法】共为末。敷患处。

【主治】牙疳疼痛,口疮舌破,喉痛腮肿,并目赤鼻皶,面风。

66401　绛雪散

【方源】《喉科心法》。

【组成】硼砂二钱　生石膏一钱　熟石膏一钱半　牙消一钱　朱砂一钱　冰片五分(或加制姜虫一钱　蒲黄粉一钱)

【用法】上为极细末。吹患处。

【主治】阳症喉痹重症,红肿俱甚者。

66402　绛雪膏

《张氏医通》卷十五。为《卫生宝鉴》卷十"加味春雪膏"之异名。见该条。

66403　绛硼膏

【方源】《外科大成》卷二。

【组成】香油半斤　荆芥　防风　川椒各一两　槐枝二两　杏仁五钱(浸七日)

【用法】煎枯,去滓,入黄蜡一两溶化,离火,再下硼砂五钱,乳香、没药、儿茶各二钱,黄丹一钱,血竭二钱,搅匀收用。

【主治】下部一切寒湿血风顽臁。

【加减】一加樟脑五钱,白花蛇(炙)一钱五分。

络

66404　络石汤

《圣济总录》卷一二二。为《圣惠》卷三十五"络石散"之异名。见该条。

66405　络石汤

【方源】《圣济总录》卷一二四。

【组成】络石　紫菀(去苗土)各半两　升麻　射干各三分　桔梗(炒)　木通(锉)　赤茯苓(去黑皮)各一两

【用法】上为粗末。每服五钱匕,水一盏半,煎至八分,去滓,食后温服。

【主治】咽喉中如有物噎塞。

【加减】如要通利,即汤成加芒消末一钱匕,搅匀服之。

66406　络石汤

【方源】《普济方》卷三五二。

【组成】络石(亦名石龙藤)

【用法】煎叶服之。亦浸酒服。

【主治】产后瘦损,不能饮食,腹中有血块,淋沥不尽,赤白带下,天行心闷。

66407　络石散

【方源】《圣惠》卷十。

【组成】络石 玄参 川升麻 射干 子芩 木通(锉)各半两 甘草一分(生用)

【用法】上为散。每服四钱，以水一中盏，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】伤寒，毒气攻咽喉痛。

66408 络石散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【异名】络石汤、络石叶饮(《圣济总录》卷一二二)。

【组成】络石一两半 木通二两 川升麻 射干一两 犀角屑一两 玄参一两 栀子仁半两 桔梗一两半(去芦头) 赤芍药一两 马牙消二两

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入青竹茹一分，煎至六分，温服，不拘时候。

【主治】咽喉肿痛，热毒气在于胸心，及一切风热。

66409 络石散

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】络石半两 细辛一分 玄参半两 黄药三分 甘草半两(生，锉) 赤芍药半两 川大黄三分(锉碎，微炒)

【用法】上为散。每服三钱，以水一中盏，入竹叶二七片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

【主治】咽喉卒肿痛。

66410 络石叶饮

《圣济总录》卷一二二。为《圣惠》卷三十五"络石散"之异名。见该条。

66411 络石煎丸

【方源】《圣惠》卷三十五。

【组成】络石半两 射干半两 川大黄一分 木通一分(锉) 白药 川升麻半两 牛蒡子一分 玄参一分 甘草半两 白蜜二两 白蒺藜一分 马牙消一分 黄药一分 地黄汁半斤

【用法】上除药汁外，捣罗为末，先以地黄汁及蜜，于银锅中，以慢火煎成膏，后入诸药末，相和令匀为丸，如小弹子大。用绵裹一丸，含咽津。

【主治】咽喉干燥热疼。

66412 络石射干汤

【方源】《圣济总录》卷一二二。

【组成】络石三分 射干一两半 芍药 升麻各一两一分 露蜂房(炙) 蒺藜子(炒去角)各一两

【用法】上为粗末。每服三钱匕，水一盏，煎至六分，去滓，入马牙消一钱匕，搅匀，食后临卧温服。细细含咽亦得。

【主治】咽喉肿痛，咽物不得。

绝

66413 绝疟丹

【方源】《痘疹传心录》卷十七。

【组成】常山 槟榔各二两 草果一两 朱砂 雄黄各三钱

【用法】上为末，神曲为丸，如黍米大。每用三十丸，发日五更冷水送下。

【主治】疟疾。

66414 绝疟丹

【方源】《痘疹传心录》卷十七。

【组成】人言一钱五分 绿豆粉五钱 雄黄三钱 朱砂三钱

【用法】上为末，端午日用粽子角为丸，如黍米大。每用一丸，五更冷水送下。

【主治】疟。

66415 绝疟饮

【方源】《郑氏家传女科万金方》卷五。

【组成】常山 陈皮 青皮 茯苓 槟榔 半夏 甘草 柴胡 苍术 草果 乌梅 生姜

【用法】加酒一杯煎服。

【主治】疟母。

66416 绝疟煎

【方源】《仙拈集》卷一引《养生主论》。

【组成】常山(酒煮，晒干) 知母 贝母 草果各一钱半

【用法】水煎，五更热服。

【主治】疟。

66417　**绝疟膏**

【方源】《惠直堂方》卷一。

【组成】斑蝥一个(去头足翅)　红枣一个(去核)

【用法】同捣烂,包在眉心,先发时半日包上。过时即除下,迟则起泡矣。须发过三五次后方可用,此药倘早用之,恐风邪未净,终有后患。

【主治】疟疾。

66418　**绝梦丹**

【方源】《辨证录》卷八。

【组成】人参三钱　麦冬五钱　茯神三钱　白术三钱　熟地一两　芡实五钱　山药五钱　北五味一钱　玄参一两　菟丝子三钱　丹参三钱　当归三钱　莲子心三钱　炒枣仁三钱　陈皮三分　沙参三钱

【用法】水煎服。

【主治】人有专攻书史,诵读不辍,至四鼓不寝,肾火随心火之奔越,遂成梦遗之症,久则玉茎着被,精随外泄,不著则否,饮食减少,倦怠困顿。

66419　**绝痫丹**

【方源】《外科方外奇方》卷四。

【组成】消煅礞石五钱　天竺黄六钱　当门子二分　煨明天麻三钱　辰州朱砂三钱　蛇含石五钱(醋煅)　陈胆星四钱　法半夏八钱

【用法】上为末,以姜汁五钱,竹沥二两炼蜜为丸,如龙眼大。童便磨服半丸。立止,服三十一丸全愈。

【主治】因惊恐而致之颠仆眼直,口吐痰沫,作羊鸣不省人事。

66420　**绝痧方**

【方源】《痧胀玉衡》卷下。

【异名】木八(《痧症全书》卷下)、六十四号归妹方(《杂病源流犀烛》卷二十一)。

【组成】甘草　明矾　食盐各一两　川乌一钱　干姜三钱

【用法】上为细末,米饭捣为丸。每服五分,白汤温下。新犯痧者,一二服即愈;久犯痧者,十服全愈,不复发矣。若人属虚寒者,必加倍多服,方能有效。

【主治】数患痧症。

【宜忌】必痧症已愈,然后可服,以绝其根,否则稍有痧气未除,断不可服,恐甘草作胀,热者助邪,反害之矣。

【方论选录】用甘草以助胃,用干姜、川乌以充胃,用明矾以解毒,用食盐以断痧,乌姜性热,恐人有宜有不宜,故每服止用五分为则,惟取其能绝痧根焉尔。

66421　**绝瘴散**

【方源】《圣济总录》卷三十三。

【组成】麻黄(去节)　桂(去粗皮)　升麻　细辛(去苗叶)　干姜(炮)　附子(炮裂,去皮脐)　防己　蜀椒(去目并闭口,炒出汗)　防风(去叉)　桔梗(炒)　白术　芎䓖各半两

【用法】上为细散。每服二钱匕,空心以温酒调下。

【功用】辟时气疫疠。

66422　**绝疟药枣**

【方源】《活人方》卷三。

【组成】白术一钱　黄芩一钱　槟榔一钱　常山(醋酒煮)一钱　半夏一钱　柴胡八分　茯苓七分　橘红五分　炙甘草三分　白姜蚕(炙黄)三条　乌梅一枚　生姜五钱　红枣四十九枚

【用法】水、酒各一大碗,用武火煮三五滚后,再用文火煮一枝香,去滓,露一宿,黎明空心热服,即以枣子过药一齐吃完,毋剩。

【功用】和中健脾,清痰止疟。

【主治】疟。

66423　**绝疟青蒿丸**

《医学纲目》卷六。为《丹溪心法》卷二"截疟青蒿丸"之异名。见该条。